Analysen von *TRIM*-Genen bei Primaten

Dissertation
zur Erlangung des Doktorgrades
der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultäten
der Georg-August-Universität zu Göttingen

vorgelegt von
Anna-Maria Herr
aus Brunsbüttel

Göttingen, 2008

D7

Referent: Frau Prof. Dr. Hoyer-Fender

Korreferent: Herr Prof. Dr. Fritz

Tag der mündlichen Prüfung:

Die vorliegende Dissertation wurde in der Abteilung Primatengenetik im Deutschen Primatenzentrum unter der Leitung von PD Dr. Walter angefertigt. Die Arbeit wurde durch die Volkswagenstiftung (Themenimpuls "Evolutionenbiologie") finanziert.

„Die Endlosigkeit des wissenschaftlichen Ringens sorgt unablässig dafür,
dass dem forschenden Menschegeist seine beiden edelsten Antriebe erhalten
bleiben und immer wieder von neuem angefacht werden:
Die Begeisterung und die Ehrfurcht.“

Max Planck

Für meine Familie!

1	EINLEITUNG.....	1
1.1	Evolution.....	1
1.2	Das Immunsystem.....	2
1.3	Evolution des Immunsystems.....	3
1.3.1	Retrovirale Infektionen.....	3
1.4	Die <i>TRIM</i> -Gen-Familie.....	5
1.4.1	Antivirale Aktivität von TRIM5 α	7
1.5	Ziele der vorliegenden Arbeit.....	9
2	MATERIAL UND METHODEN.....	10
2.1	Untersuchte Tiere.....	10
2.2	Humane Probanden.....	10
2.3	Chemikalien.....	10
2.4	Verbrauchsmaterial.....	13
2.5	Verwendete Enzyme.....	14
2.6	Gebrauchsfertige Reaktionssysteme.....	15
2.7	Sterilisationsverfahren.....	15
2.8	Lösungen.....	15
2.9	Benutzte Geräte.....	19
2.10	Medien, Antibiotika, Agarplatten.....	21
2.10.1	Medien für Bakterien.....	21
2.10.2	Agarplatten.....	21
2.10.3	Medien für eukaryotische Zellkulturen.....	22
2.11	Biologisches Material.....	22
2.11.1	Bakterienstämme.....	22
2.11.2	Eukaryotische Zelllinien.....	22
2.11.3	Plasmide.....	23
2.11.4	Synthetische DNA-Oligonukleotide.....	23

2.11.5	Antikörper	24
2.11.6	Datenbanken und Computerprogramme.....	25
2.12	Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren	26
2.12.1	Minipräparation von Plasmid-DNA.....	26
2.12.2	Herstellung von Bakterien-Glycerin-Stocks	26
2.12.3	Midipräparation von Plasmid-DNA.....	26
2.12.4	Isolierung von genomischer DNA aus Mundschleimhautzellen	27
2.12.5	Isolierung von genomischer DNA aus Blut	27
2.12.6	Ethanol-fällung von DNA aus wässrigen Lösungen	28
2.12.7	Phenol/Chloroform-Aufreinigung von Nukleinsäuren	28
2.12.8	Isolierung von Gesamt-RNA aus Zellkulturen	28
2.12.9	Konzentrationsbestimmung von Nukleinsäuren	28
2.13	Klonierungstechniken	29
2.13.1	Spaltung von DNA mit Restriktionsendonukleasen	29
2.13.2	Isolierung von DNA-Fragmenten aus Agarosegelen.....	29
2.13.3	Dephosphorylierung von Plasmid-DNA	30
2.13.4	Ligation von DNA-Fragmenten	30
2.13.5	Subklonierung von PCR- und RT-PCR-Produkten	31
2.13.6	Herstellung kompetenter Zellen.....	31
2.13.7	Transformation kompetenter Bakterienzellen mit Plasmid-DNA	32
2.14	Gelelektrophorese	32
2.14.1	Gelelektrophorese von DNA.....	32
2.14.2	Längenstandards.....	33
2.15	Polymerase-Kettenreaktion (PCR)	33
2.15.1	Reverse Transkription.....	34
2.15.2	Mutagenese PCR.....	35
2.16	Sequenzanalyse.....	36
2.17	Proteinchemische Techniken.....	37
2.17.1	Isolierung von Gesamtprotein aus Zellkulturen.....	37
2.17.2	SDS-Polyacrylamidgelelektrophorese (SDS-PAGE)	37
2.17.3	Färbung von Proteingelen	38
2.17.4	Immunoblot-Analysen von Proteinen auf Nitrozellulose-Membranen	38
2.17.5	Isolierung GST-markierter Proteine aus Bakterienkulturen.....	39
2.18	Zellbiologische Methoden	39
2.18.1	Zellkultur eukaryotischer Zellen	39
2.18.2	Kryokonservierung und Revitalisierung von eukaryotischen Zellen	40

2.18.3	Mycoplasmen-PCR	40
2.18.4	Transfektion eukaryotischer Zellen mittels Lipofektion	41
2.18.5	Transfektion eukaryotischer Zellen mittels Nukleofektion	42
2.19	Methoden zur subzellulären Lokalisierung eines Proteins	42
2.19.1	Immunzytochemische Färbung eukaryotischer Zellen	42
2.19.1.1	Konfokale Laserscanning Mikroskopie	43
2.19.1.2	Analyse von fluoreszierenden Zellen mittels AxioObserver	44
2.20	Isolierung von intrazellulären Einschlusskörpern aus <i>E. coli</i>	45
2.20.1	Induktion der Proteinexpression	45
2.20.2	Isolierung der bakteriellen Einschlusskörper	46
2.20.3	Solubilisieren des rekombinanten Proteins	46
2.21	Apoptose	47
2.21.1	Analysen zur Apoptose mittels Annexin V-Färbung	47
2.21.1.1	Qualitative Analysen zur Apoptose mittels Fluoreszenzmikroskopie	47
2.21.1.2	Quantitative Analysen zur Apoptose mittels Durchflusszytometrie	48
2.22	Zellproliferationsassay	49
2.23	Koimmunpräzipitation	49
2.24	Durchflusszytometrie	51
2.25	Herstellung von Antikörpern	52
2.25.1	Immunisierung von Mäusen	52
2.25.1.1	Herstellung monoklonaler Antikörper	52
2.25.2	ELISA	54
2.25.3	Selektion auf antikörperproduzierende Zellen	54
3	ERGEBNISSE	56
3.1	Evolution von <i>TRIM</i>-Genen bei Primaten	56
3.1.1	Phylogenetische Analysen von Mitgliedern der TRIM-Protein-Familie	57
3.1.2	Vergleich der Aminosäuresequenz von TRIM-Proteinen zwischen Mensch und Rhesusaffe	58
3.1.3	Bestimmung des dN/dS-Verhältnisses	63
3.2	Untersuchungen zur Funktion von TRIM-Proteinen	65
3.2.1	Etablierung von TRIM-Expressionskonstrukten	65
3.2.2	Nachweis der TRIM-GFP Proteinexpression mittels Immunoblot-Analysen	66
3.2.3	Subzelluläre Lokalisation verschiedener TRIM-Proteine	67
3.2.4	Vergleich von humanem und Rhesusaffen-TRIM22	69
3.2.5	Analyse zur subzellulären Lokalisation von rhTRIM22	70

3.2.6	Untersuchung der subzellulären Lokalisation von TRIM22 in unterschiedlichen Zelllinien	72
3.2.7	Analyse der subzellulären Lokalisation von TRIM22-V5/His-Fusionsproteinen	72
3.2.8	Vergleich der subzellulären Lokalisation von TRIM22 und TRIM5 α	74
3.2.9	Untersuchungen der rhTRIM22-Proteinanhäufungen	75
3.2.10	Analyse der hTRIM22-GFP Proteinaggregate.....	77
3.2.11	Analysen zur subzellulären Lokalisation von kotransfiziertem hTRIM22 und rhTRIM22.....	78
3.2.12	Interaktionsnachweis mittels Koimmunpräzipitation.....	79
3.2.13	Etablierung von chimärischen TRIM22-Expressionskonstrukten.....	80
3.2.14	Untersuchungen zur subzellulären Lokalisation der chimärischen TRIM22-Konstrukte.....	82
3.2.15	Analysen zur Identifizierung der für die Lokalisation verantwortlichen Aminosäuren.....	84
3.2.16	Etablierung weiterer chimärischer Konstrukte mittels gerichteter Mutagenese	85
3.2.17	Analysen zur Proteinstruktur der B30.2-Domäne von TRIM22.....	88
3.3	Herstellung von anti-TRIM22-Antikörpern.....	91
3.3.1	Etablierung eines GST-TRIM22-Fusionsproteins	91
3.3.2	Aufreinigung des GST-TRIM22-cc-Fusionsproteins mittels Glutathion-Agarose.....	92
3.3.3	Isolierung von intrazellulären Einschlusskörpern.....	93
3.3.4	Immunisierung von Mäusen.....	95
3.3.5	Überprüfung der Seren mittels ELISA	95
3.3.6	Immunoblot-Analyse mit polyklonalem anti-TRIM22-Antikörper.....	96
3.3.7	Indirekte Immunzytochemie mit polyklonalem anti-TRIM22-Antikörper	97
3.3.8	Herstellung monoklonaler Antikörper.....	99
3.3.8.1	Analyse der Hybridomzellen mittels ELISA	99
3.3.8.2	Analyse der Überstände von Hybridomzellen mittels Immunoblot	100
3.4	Untersuchungen zur Apoptose.....	102
3.4.1	Beobachtung morphologischer Veränderungen von HeLa-Zellen nach Transfektion mit hTRIM22	102
3.4.2	Nachweis der Apoptose mittels Annexin V	103
3.4.2.1	Qualitativer Nachweis der Apoptose am Fluoreszenzmikroskop.....	103
3.4.2.2	Quantitativer Nachweis der Apoptose mittels Durchflusszytometrie	104
3.4.3	Zellproliferationsassay.....	108
4	DISKUSSION	109
4.1	Evolution von <i>TRIM</i>-Genen	109
4.2	Funktionelle Analysen	112
4.2.1	Untersuchungen zur subzellulären Lokalisation verschiedener TRIM-Proteine	112
4.2.2	Vergleich der subzellulären Lokalisation von TRIM22 von Mensch und Rhesusaffe.....	113
4.2.3	Die positiv selektionierte B30.2-Domäne ist verantwortlich für die subzelluläre Lokalisation von TRIM22.....	114
4.2.4	Untersuchungen zur subzellulären Lokalisation von rhTRIM22.....	116

4.2.5	Untersuchungen zur subzellulären Lokalisation von hTRIM22	119
4.2.6	Putative Rolle von TRIM22 in der Immunabwehr	122
4.2.6.1	TRIM22 besitzt E3-Ligase-Aktivität.....	122
4.2.6.2	TRIM22-Expression wird durch p53 induziert.....	123
4.2.6.3	TRIM22 inhibiert Zellproliferation und induziert Apoptose	124
5	FAZIT UND AUSBLICK.....	128
6	ZUSAMMENFASSUNG	129
7	VERÖFFENTLICHUNGEN	132
8	LITERATURVERZEICHNIS	133
9	ANHANG.....	139
9.1	Abkürzungsverzeichnis	147

1 Einleitung

1.1 Evolution

Positive Selektion, also die Fixierung vorteilhafter Mutationen durch natürliche Selektion, ist ein interessantes Thema der Evolutionsbiologie, weil adaptive Veränderungen in Genen und im Genom direkt verantwortlich für evolutionäre Neuerungen und Artbildung sind. Analysen zur Natürlichen Selektion und Evolution besitzen eine enorme Bedeutung für die moderne Molekularbiologie, Biochemie und Virologie und für das Verständnis der Funktion neuer Gene, insbesondere, seit komplette Genomsequenzen von Primaten und anderen Säugetieren zugänglich sind. In seinem Buch „*On the Origin of Species*“ beschrieb Darwin 1859 ausführlich den Zusammenhang von Natürlicher Selektion und Evolution. Natürliche Selektion tritt auf, wenn Individuen mit Merkmalen, die für das Überleben und die Fortpflanzung von Vorteil sind, mehr Nachkommen zeugen, als Individuen ohne diese Merkmale. Dies führt dazu, dass vorteilhafte Merkmale mit der Zeit häufiger werden, während negative verschwinden.

Gillespie (1984) beschrieb in der *selektionierenden Theorie der molekularen Evolution* die Evolution von Molekülen durch genetische *Drifts*, also rein zufällig entstehende Mutationen und daraus resultierende zufällige Schwankungen in der Häufigkeit der Allele. Solche zufälligen Mutationen können sich vorteilhaft, neutral oder nachteilig auf die molekulare Struktur auswirken. Nachteilige oder vorteilhafte Mutationen können negativ bzw. positiv gerichtet sein, was bedeutet, dass eine bestimmte molekulare Struktur entweder ausgelöscht oder favorisiert wird. Weiterhin können die Mutationen balanciert sein, wobei mehrere molekulare Strukturen im Gleichgewicht gehalten werden. Diese Vorgänge, also die gerichtete oder balancierte Selektion bestimmen nach Gillespies Theorie den genetischen Polymorphismus molekularer Strukturen.

Um herauszufinden, welche Art von Selektion (positiv, neutral oder negativ) auf ein Gen eingewirkt hat, werden Sequenzen eines Genes von verschiedenen Spezies miteinander verglichen und die Anzahl der Basensubstitutionen ermittelt. Dabei wird zwischen synonymen Substitutionen (keine Veränderung der Aminosäure) und nichtsynonymen Substitutionen (Änderung der Aminosäure) unterschieden. Überwiegt die Anzahl an synonymen Substitutionen, wird dies als gerichtete negative Selektion angesehen. Eine etwa

gleiche Anzahl synonymer und nichtsynonymer Substitutionen beschreibt eine neutrale Selektion und mehr nichtsynonyme als synonyme Substitutionen deuten auf eine gerichtete positive Selektion hin. Viele positiv selektionierte Gene konnten auf diese Art bereits identifiziert werden.

1.2 Das Immunsystem

Insbesondere Gene, die in die Immunantwort involviert sind, stehen unter enormem selektiven Druck, da sich Wirt und Pathogen in einem ständigen evolutionären Wettlauf befinden.

Alle Organismen sind ständig einer Vielzahl von Erregern wie Bakterien, Pilzen, Viren, Protozoen, vielzelligen Parasiten und deren Giften ausgesetzt. Das Immunsystem schützt höhere Lebewesen vor Gewebeschädigung durch diese Krankheitserreger und ist weiterhin in der Lage, entartete körpereigene Zellen (Krebszellen) zu zerstören. Es wird zwischen der angeborenen (unspezifischen) und der erworbenen (adaptiven) Immunabwehr unterschieden. Die angeborene Immunabwehr entwickelte sich schon früh in der Stammesgeschichte, schon einfache Organismen besitzen einen solchen Abwehrmechanismus, der durch verschiedene physikalische und biologische Schutzmechanismen zustande kommt. Beispielsweise schützt die Haut-Schleimhaut-Barriere den Körper vor dem Eindringen vieler Krankheitserreger. Weitere Beispiele für biologische und biochemische Mechanismen sind Phagozytose, Komplementfaktoren und antimikrobiell wirksame Enzyme (Janeway und Medzhitov, 2002). Wirbeltiere entwickelten neben diesen Schutzmechanismen die komplexe, anpassungsfähige adaptive Immunabwehr, die hauptsächlich durch ein vielschichtiges Zusammenspiel verschiedener Leukozytenarten gewährleistet wird. Die adaptive Immunantwort ist in der Lage, virusinfizierte oder maligne transformierte körpereigene Zellen zu überwachen und zu zerstören. Die spezifische Immunität wird zum einen durch spezifische Antikörper (humorale Immunität), zum anderen durch spezialisierte immunkompetente Zellen (zelluläre Immunität) vermittelt. B-Lymphozyten bzw. Plasmazellen stellen dabei die Antikörper vermittelte humorale Immunität sicher, während bei der zellulären Immunität den T-Lymphozyten eine Schlüsselrolle zukommt (Vivier und Malissen, 2005).

1.3 Evolution des Immunsystems

Wird die komplexe Wechselbeziehung zwischen Wirtsorganismen und Erregern unter evolutionären Gesichtspunkten betrachtet, so kann dies als ein Angreifer-Verteidiger-System angesehen werden: Es findet ein ständiges „Wettrüsten“ zwischen Immunsystem und Erreger statt. Durch die Abwehrmechanismen des Immunsystems stehen die Erreger unter einem starken Selektionsdruck, wodurch sich diese immer besser an den Wirtsorganismus anpassen müssen, um weiter bestehen zu können. Im Gegenzug wird durch die Krankheitserreger oder Parasiten ein Selektionsdruck auf das Immunsystem des Wirtes ausgeübt, so dass es zu einer Koevolution von Wirt und Erreger kommt (Brunham et al., 1993).

Säugetiere waren über viele Millionen Jahre der Evolution verschiedensten retroviralen Infektionen ausgesetzt, was durch die Präsenz endogener retroviraler Elemente im Genom der Spezies nachgewiesen werden kann (Boeke, 1997; Herniou et al., 1998). Retrovirale Epidemien haben optimal angepasste angeborene und adaptive Immunantworten hervorgerufen (de Groot et al., 2002). Das bekannteste Beispiel hierfür sind die MHC-Klasse-I- und -II- Gene, die als die am meisten polymorphen Gene gelten und essentiell an der Immunantwort beteiligt sind. Beispielsweise sind mehr als 1000 Allele des MHC-Klasse-I-Gens *HLA-B* in der menschlichen Bevölkerung bekannt (<http://www.ebi.ac.uk/ipd/mhc/>). Die MHC-Klasse-I- und -II- Moleküle sind ein Paradebeispiel der Pathogen getriebenen positiven Selektion, da diese Gene in den Codons, die in die Antigenbindung involviert sind, eine deutlich höhere Rate an nichtsynonymen als an synonymen Substitutionen besitzen. Die Evolution dieser Gene ist somit direkt mit der Resistenz oder Anfälligkeit gegenüber Pathogenen verbunden (Prugnolle et al., 2005).

1.3.1 Retrovirale Infektionen

Wie bereits erwähnt, befinden sich Wirt und Erreger (Virus) in einem evolutionären Wettrüsten. Aus diesem Grund koevolviert ein Virus mit seinem Wirt und ist normalerweise nur an wenige Spezies adaptiert. Allerdings besteht in einigen Fällen die Möglichkeit einer Virustransmission von einer Spezies auf die andere. Für HIV-1 (Humanes Immundefizienz-Virus) und HIV-2 wird beispielsweise angenommen, dass um 1930 in West Afrika erstmals Menschen durch Transmission von SIV (Simianes Immundefizienz-Virus)-infizierten Schimpansen und Mangaben mit diesen Viren infiziert wurden (Gao et al., 1999). HIV ist an

Affenspezies adaptiert, während Menschen normalerweise keine Resistenz gegen das HI-Virus besitzen. HIV gehört zu der Familie der Retroviren (*Retroviridae*). Bei diesen Viren liegt die Erbinformation in Form von RNA vor, die sich zusammen mit Enzymen wie Reverse Transkriptase oder Integrase in einem Capsid befinden.

Abb. 1: Schematische Darstellung eines HIV-1-Virus und der Ablauf einer Infektion (nach Beyer: http://commons.wikipedia.org/wiki/Image:Hiv_gross_german.png).

Der Lebenszyklus eines Retrovirus lässt sich in mehrere Schritte gliedern. Zunächst bindet das Glykoprotein der Virushülle an zelluläre Rezeptoren der Wirtszelle, verschmilzt mit deren Plasmamembran und entlässt das virale Capsid in das Zytoplasma. Dort zerfällt das Capsid und die viralen Enzyme wie die Reverse Transkriptase, die Integrase und die virale RNA gelangen in das Zytoplasma der Wirtszelle. Anschließend wird die virale RNA mit Hilfe der Reversen Transkriptase in DNA transkribiert und nach Eintritt in den Nukleus durch die Integrase in das Genom des Wirtes integriert. Dort verbleibt die virale DNA als so genanntes Provirus, bis zelluläre Transkriptionsmechanismen die Information transkribieren. Aus den

viralen Proteinen entsteht dann ein neues Virus, das in der Lage ist, weitere Zellen zu infizieren (Abb. 1) (Tripathi und Agrawal, 2007).

Wird HIV-1 nicht gehemmt, entsteht AIDS, eine Immundefizienzkrankung, bei der es zu einer Depletion von CD4-positiven T-Lymphozyten kommt. T-Lymphozyten können normalerweise Antigene erkennen und Infektionen bekämpfen (Letvin et al., 1985; Van Kaer und Joyce, 2005).

Wirtsorganismen haben verschiedene Möglichkeiten der Restriktion von retroviralen Infektionen entwickelt. Vor wenigen Jahren entdeckten Stremlau et al. (2004) bei Untersuchungen einer Rhesusaffen-cDNA-Bank TRIM5 α als einen Restriktionsfaktor von HIV-1. TRIM5 α ist innerhalb der Primaten stark positiv selektioniert und diese rapide Evolution hat dazu geführt, dass unterschiedliche retrovirale Infektionen in verschiedenen Spezies inhibiert werden (Sawyer et al., 2005). Das humane TRIM5 α vermittelt im Gegensatz zum TRIM5 α von Neuweltaffen keine HIV-1-Resistenz, ist dafür aber in der Lage Infektionen mit N-MLV (N-tropisches Mäuseleukämie-Virus) zu verhindern (Perron et al., 2004).

1.4 Die *TRIM*-Gen-Familie

TRIM5 α gehört zur Familie der *TRIM*-Gen-Familie. Bisher wurden mehr als 70 Mitglieder dieser Familie identifiziert, deren Funktion bisher größtenteils unklar ist. TRIM-Proteine zeichnen sich durch das so genannte ***Tripartite Motif*** aus, das aus einer RING-, einer B-box- und einer Coiled-Coil-Domäne besteht (RBCC-Motiv) (Reddy et al., 1992). Die RING-Domäne ist in Protein-Protein-Interaktionen involviert und vermittelt E3 Ubiquitin-Ligase-Aktivität (Freemont et al., 1991; Joazeiro und Weissman, 2000; Nisole et al., 2005). Die B-box-Domäne wurde bisher nur in TRIM-Proteinen identifiziert und könnte ebenfalls in Protein-Protein-Interaktionen involviert sein (Borden, 1998; Nisole et al., 2005). Coiled-Coil-Domänen sind in vielen Proteinen verbreitet und sind verantwortlich für Homo- und Heteromultimerisierung (Reymond et al., 2001). Einige TRIM-Proteine besitzen neben den namensgebenden Domänen noch eine zusätzliche C-terminale Domäne. Etwa 60% aller bekannten menschlichen *TRIM*-Gene, wie auch TRIM5 α , kodieren für die zusätzliche B30.2-Domäne (Nisole et al., 2005), die ursprünglich in Butyrophilin identifiziert wurde (Henry et al., 1997b). Weiterhin wurden NHL-, ARF/SAR-, WD40-, Fibronectin III-, Filamin-, Bromo-

und MATH-Domänen (Nisole et al., 2005) als mögliche C-terminale Domänen von *TRIM*-Genen identifiziert (Abb. 2).

Abb. 2: Darstellung verschiedener C-terminaler Domänen bei TRIM-Proteinen. Das konservierte *Tripartite Motif* (RING-, B-box 1- und/oder B-box 2-, *Coiled-Coil*-Domäne, RBCC) ist in Grau dargestellt, die unterschiedlichen C-terminalen Domänen sind farbig markiert.

TRIM-Proteine homomultimerisieren über ihre *Coiled-Coil*-Domäne und bilden so hochmolekulare Proteinkomplexe. Diese Komplexe sind in unterschiedlichen subzellulären Kompartimenten lokalisiert und bestimmen so die jeweilige Funktion der TRIM-Proteine (Reymond et al., 2001). Bisher wurden erst wenige TRIM-Proteine hinsichtlich ihrer Funktion untersucht. Es gibt Hinweise, dass TRIM-Proteine in verschiedene Prozesse wie Zellproliferation, Genregulation, Apoptose, Tumorsuppression, Ubiquitinierung sowie DNA-Rekombination und DNA-Reparatur involviert sind (Joazeiro und Weissman, 2000; Reymond et al., 2001; Tissot und Mechti, 1995; Tissot et al., 1996).

1.4.1 Antivirale Aktivität von TRIM5 α

Song et al. (2005b) konnten zeigen, dass die innerhalb der Primaten stark positiv selektionierte B30.2-Domäne von TRIM5 α essentiell für die antivirale Funktion ist. TRIM5 α interagiert über diese Domäne mit dem viralen Capsid und verhindert durch bisher noch nicht vollständig bekannte Vorgänge dessen Zerfall (Stremlau et al., 2006; Towers, 2007). Es wird vermutet, dass TRIM5 α als E3 Ubiquitin-Ligase eine Ubiquitinierung des retroviralen Capsid-Proteins bewirkt und dieses so proteosomal abgebaut wird (Diaz-Griffero et al., 2006; Nisole et al., 2005).

Durch Untersuchungen von *TRIM5 α* und anderen verwandten *TRIM*-Genen in verschiedenen Primatenspezies und in Nagern wurden innerhalb der B30.2-Domäne vier variable Regionen (v1, v2, v3, v4) identifiziert, die spezies-spezifische Sequenz- und Längenunterschiede aufweisen (Song et al., 2005b). Die B30.2-Domäne des TRIM5 α -Proteins ist insbesondere innerhalb der v1 und v3 Region polymorph. Für die erfolgreiche Restriktion von HIV-1 beim Rhesusaffen sind drei Aminosäuren verantwortlich, die innerhalb der v1-Region lokalisiert sind. Werden bei dem humanen TRIM5 α diese Aminosäuren durch die korrespondierenden Aminosäuren des Rhesusaffen ersetzt, ist dieses chimärische Konstrukt ebenfalls in der Lage, Infektionen mit HIV-1 zu inhibieren (Yap et al., 2005).

James et al. (2007) analysierten die Kristallstruktur der B30.2-Domäne von TRIM21 und konnten feststellen, dass es sich bei der B30.2-Domäne um eine Immunglobulin-ähnliche β -Faltblattstruktur handelt. Zwischen den konservierten β -Strängen befinden sich Loops, die mit den von Song et al. (2005b) beschriebenen variablen Bereichen korrespondieren. Diese Loops stellen Interaktionsplattformen dar, über die beispielsweise TRIM5 α mit anderen (viralen) Proteinen interagieren kann (Woo et al., 2006). Die spezies-spezifischen Unterschiede innerhalb dieser variablen Regionen bewirken demnach Unterschiede der Interaktionsplattformen und folglich die artspezifische Resistenz gegenüber verschiedenen Retroviren (Ohkura et al., 2006). So inhibiert das TRIM5 α des Rhesusaffen Infektionen mit HIV, während TRIM5 α des Menschen und des Schimpansen dieses Virus nur in geringem Maße restringieren können (Himathongkham und Luciw, 1996; Hofmann et al., 1999; Shibata et al., 1995; Stremlau et al., 2005). Dagegen weist das TRIM5 α des Menschen und auch das TRIM5 α der Grünen Meerkatze spezifische Aktivität gegenüber N-MLV auf (Hatzioannou et al., 2004; Keckesova et al., 2004; Perron et al., 2004). Das Immundefizienz-Virus der *Macaca* (SIV_{mac}) wird durch das TRIM5 α -Protein der meisten Neuweltaffen und der Grünen

Meerkatze inhibiert.

Neben TRIM5 α sind weitere TRIM-Proteine in die angeborene Immunantwort involviert. Die Transkription mehrerer *TRIM*-Gene, wie z.B. *TRIM22*, wird durch Typ I Interferon stimuliert (Barr et al., 2008; Gongora et al., 2000; Orimo et al., 2000; Rhodes et al., 2002). TRIM34 inhibiert in gewissem Maße Infektionen mit SIV (Zhang et al., 2006) und TRIM32 interagiert mit dem Tat-Protein von HIV-1 und HIV-2 (Fridell et al., 1995). TRIM1 restringiert N-MLV-Infektionen und die Überexpression von TRIM19 führt zur Resistenz gegenüber CMV (Zytomegalie-Virus), VSV (Vesicular-Stomatitis-Indiana-Virus), HSV (Herpes-simplex-Virus) und Influenzavirus A (Chelbi-Alix et al., 1998; Everett et al., 2006; Tavalai et al., 2006).

Die Mitglieder der *TRIM*-Gen-Familie sind, bis auf zwei Cluster, über das gesamte Genom verteilt. Ein Cluster ist beim Menschen innerhalb der Klasse-I-Region des MHC auf Chromosom 6p21.33, der andere auf Chromosom 11p15 lokalisiert (Abb. 3). Im Gegensatz zu den Mitgliedern des 11p15-Clusters (TRIM5 α , TRIM6, TRIM21, TRIM22, TRIM34) wurde über die innerhalb des MHC kodierten TRIM-Moleküle TRIM10, TRIM15, TRIM26, TRIM27 und TRIM39 noch nicht im immunologischen Kontext berichtet. Alle hier genannten TRIM-Proteine besitzen eine identische Domänen-Organisation wie TRIM5 α (RING-, B-box-, *Coiled-Coil*- und B30.2-Domäne).

Abb. 3: Schematische Darstellung der *TRIM*-Gene auf den Chromosomen 11 und 6 von *H. sapiens*. (1) 11p15-TRIM-Cluster (modifiziert nach Asaoka et al. (2005)). (2) 6p21.33-TRIM-Cluster (modifiziert nach Meyer et al. (2003)).

Einige der innerhalb des 11p15-Clusters lokalisierten *TRIM*-Gene wurden bereits hinsichtlich ihrer antiviralen Aktivität beschrieben (TRIM5 α , TRIM22, TRIM34). Die *TRIM*-Gene des 6p21.33-Clusters sind innerhalb des Haupthistokompatibilitätskomplexes (MHC) lokalisiert, der bekanntermaßen Gene beinhaltet, die essentiell an der Immunantwort beteiligt sind (z.B.

HLA-A, *HLA-B*). Aus diesem Grund wurden in dieser Arbeit insbesondere die *TRIM*-Gene dieser zwei Cluster im Hinblick auf ihre Evolution innerhalb der Primaten untersucht.

1.5 Ziele der vorliegenden Arbeit

Viele Gene, die an der Immunantwort beteiligt sind, zeichnen sich durch eine schnelle Evolution aus. Von *TRIM5 α* , einem Mitglied der *TRIM*-Gen-Familie, ist bereits bekannt, dass es eine positive Selektion innerhalb der Primaten aufweist und spezies-spezifische anti-retrovirale Aktivität besitzt. Im Rahmen dieser Arbeit sollten neben *TRIM5 α* weitere *TRIM*-Gene mit vergleichbarer Domänenstruktur (RBCC-B30.2) hinsichtlich ihrer Evolution innerhalb der Primaten untersucht werden. Geeignete Kandidatengene sollten dann im Hinblick auf ihre Funktion und ihre mögliche Beteiligung an der Immunantwort analysiert werden.

2 Material und Methoden

2.1 Untersuchte Tiere

Für die Experimente dieser Arbeit wurde Blut der Rhesusaffen (*Macaca mulatta*) mit den Tiernummern 2441 und 4991 verwendet. Alle Tiere stammen aus Kolonien des Deutschen Primatenzentrums (DPZ). Die Blutentnahmen wurden von Dr. med. vet. Annette Schrod, Dr. med. vet. Tamara Becker oder Jessica Ladermann (Abteilung Primatenhaltung, DPZ) durchgeführt.

2.2 Humane Probanden

Zur Generierung von menschlicher cDNA aus Blut standen freiwillige Spender (Mitarbeiter der FG Primatengenetik) zur Verfügung. Die Spender wurden über die Verwendung des Blutes informiert und gaben ihr Einverständnis. Die Blutabnahme wurde von Dr. med. Ralf Dressel, Universität Göttingen, durchgeführt.

2.3 Chemikalien

Chemikalien	Hersteller
β-Mercaptoethanol	Sigma
1,4-Dithiothreitol	Sigma
2-Propanol	Roth
Acrylamid 40 % / Bisacrylamid	Biorad
Agar-Agar	Roth
Agarose	Biozym
Ammoniumacetat	Merck
Ammoniumchlorid	Merck
Ammoniumperoxodisulfat (APS)	Sigma
Ampicillin	Sigma
BiothermTM <i>Taq</i>	GeneCraft
BiothermTM <i>Taq</i> 10 x Puffer	GeneCraft
Biotinyliertes Protein A	Pierce
Borsäure	Roth
Bovines Serumalbumin (BSA)	Sigma

Bromphenolblau	Sigma
Cell culture freeze medium (DMSO)	Gibco
Chloramphenicol	Sigma
Chloroform	J.T.Baker
Coomassie Brilliant Blue G 250	Roth
Coomassie Brilliant Blue R 250	Roth
DAPI	Sigma
DEPC	Roth
Desoxycholat	Sigma
Dextransulfat	Pharmacia
Dimethylformamid	Roth
Dimethylsulfoxid (10%)	Roth
Dinatriumhydrogenphosphat	Roth
dNTP	Invitrogen
dNTP	GeneCraft
DTT	Sigma
Dulbecco's modified eagle medium (DMEM)	PAA
Eisessig	Roth
Entwickler	Kodak
Ethanol, reinst	Merck
Ethanol, vergällt	Roth
Ethidiumbromid	Roth
Ethylendiamintetraessigsäure (EDTA)	Sigma
Fixierer Polymax	Kodak
Fixierer-Lösung	Tetenal
<i>Fluorescent Mounting Medium</i>	Dako
Formaldehyd	Roth
Fötales Kälberserum	PAA
Glukose	Sigma
Glutathion, reduziert	Sigma
Glycerol	J.T. Baker
Glycerol	Sigma
Glycin	Sigma
Glykogen	Biozym
Harnstoff	Roth
HAT-Zusatz	Gibco
Hefeextrakt	Becton Dickinson
Hepes	Sigma
HiDi™ Formamid	Applied Biosystems
HT-Zusatz	Gibco
Isopropyl-β-D-Thiogalactoside	DakoZytomation
Isopropyl-β-D-thiogalaktopyranosid	Biomol, Roth
Kaliumacetat	Roth
Kaliumchlorid	Merck
Kaliumdihydrogenphosphat	Roth
Kaliumhydrogencarbonat	Merck
Kanamycin	Sigma
Luminol	Fluka
Magnesiumchlorid	Roth
Magnesiumsulfat	Merck

Metafectene	Biontex
Methanol	Merck
Methanol	Roth
Milchpulver	Neuform
N, N-Dimethylformamid	Sigma
Natriumacetat	Roth
Natriumazid	Roth
Natriumchlorid	Roth
Natrium-Desoxycholat	Sigma
Natriumdodecylsulfat	Roth
Natriumhydrogenphosphat	Roth
Natriumhydroxid	Roth
Natriumjodid	Roth
Natriumphosphat	Merck
NP40	Sigma
Paraformaldehyd	Merck
PBS-Dulbecco (10x)	Biochrom AG
p-Courmarsäure	Sigma
Penicillin/Streptomycin (100 x)	PAA
Phenol	Roth
Phosphorsäure	Roth
Polyacrylamid 30%	Roth
Polyethylen-Glycol (PEG)	Merck
Ponceau-S	Sigma
Proteinase K	Sigma
RNase A	Sigma
Roswell Park Memorial Institute Medium (RPMI)	PAA
Saccharose	Merck
Salzsäure	Roth
SDS	Roth
Silica-Glasmilch	Sigma
Stickstoff, flüssig	Vesper
Streptomycin	Sigma
TEMED	Fluka
TRIS	Roth
Triton-X-100	Sigma
Trypanblau	PAA
Trypton	Becton Dickinson
Tween 20	Sigma
Unifix Fixierer Emulsion	Kodak
Wasser (HPLC-Qualität)	Merck
Wasserstoffperoxid (30%)	Roth
X-Gal	Roth

2.4 Verbrauchsmaterial

Verbrauchsmaterial	Hersteller
0,20 µm Filter	Heinemann Labortechnik
0,45 µm Filter	Heinemann Labortechnik
6-Well-Schalen für adhärenzte Zellen	Sarstedt
96-Well-Platte (runder Boden)	Nunc
Amersham Hyperfilm® ECL	GE Healthcare
Amicon Ultra Zentrifugen Filter Röhrchen	Millipore
Deckgläschen	Menzel-Gläser
Deckgläschen, beschichtet	Sarstedt
Einmalspritzen, 10 ml	Henke Sass Wolf
Einmalspritzen, 50 ml	Henke Sass Wolf
Elektroporationsküvetten, 2 mm, 4 mm	Biozym
FACS-Röhrchen	Greiner
Falconröhrchen, 15 ml, 50 ml	Greiner
Faltenfilter	Sartorius
Filter Top Zellkulturflaschen 250 ml	Greiner Bio-One
Filter Top Zellkulturflaschen 50 ml	Greiner Bio-One
Flachdeckel für PCR-Platten	Thermo Scientific
Gaze	Hartmann
Hybond-N+ Nylon Transfer Membrane	Amersham
Hyperfilm ECL	Amersham
Kryokonservierungsröhrchen	Sarstedt
Nitrozellulosemembran	Macherey-Nagel
Objektträger	Menzel-Gläser
PCR-Platten (96 Well)	Thermo Scientific
Petrischalen (beschichtet)	Sarstedt
Petrischalen (unbeschichtet)	Greiner
Pipetten (5 ml)	Sarstedt
Pipettenspitzen 2,5 µl; 20 µl	Biozym
Pipettenspitzen 2,5; 100 µl; 1000µl	Sarstedt
Quarzküvette	Hellma
Reaktionsgefäß 0,2 ml	Sarstedt
Reaktionsgefäß 0,5 ml	Sarstedt
Reaktionsgefäß 1,5 ml	Sarstedt
Reaktionsgefäß 2 ml	Roth/Eppendorf
Serologische Pipetten 10 ml	Sarstedt
Serologische Pipetten 5 ml	Sarstedt
Wachskugeln	Adamas Instruments
Whatman-Papier	Schleicher & Schuell
Zählkammer für eukaryotische Zellen	Neubauer
Zellkulturschalen für adhärenzte Zellen (10 ml)	Sarstedt

2.5 Verwendete Enzyme

Bezeichnung	Hersteller
<i>Afl</i> III	New England BioLabs
<i>Bam</i> HI	New England BioLabs
<i>DNase</i> I	Biozym (Epicentre)
<i>Eco</i> RI	New England BioLabs
<i>Hind</i> III	New England BioLabs
<i>Kpn</i> I	New England BioLabs
<i>M-Mu</i> LVReverse Transkriptase (200 U/ μ l)	Promega
<i>Not</i> I	New England BioLabs
<i>Pst</i> I	New England BioLabs
<i>RNase</i> -Inhibitor (<i>RNasin</i> , 40 U/ μ l)	Promega
<i>Sac</i> II	New England BioLabs
<i>Sal</i> I	New England BioLabs
<i>Shrimps Alkaline Phosphatase</i> (SAP)	Amersham Biosciences
<i>Taq</i> -DNA-Polymerase	Gene Craft
T4-DNA-Ligase	New England BioLabs
<i>Xho</i> I	New England BioLabs

2.6 Gebrauchsfertige Reaktionssysteme

Bezeichnung	Bezugsquelle
Annexin V:PE Apoptose Detection Kit	BD Bioscience
BigDye® Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit	Applied Biosystems
EZ4U Proliferationsassay	Biozol
pcDNA-3.1/V5-His-Topo	Invitrogen
pGEM®-T Easy Cloning Kit	Promega
QIAquick® Plasmid Midi/Maxi Kit	Qiagen
RNeasy Mini Kit	Qiagen
Glutathion-Agarose-Säulen	Sigma-Aldrich

2.7 Sterilisationsverfahren

Gebrauchswaren, Lösungen und Kulturmedien wurden bei 121°C und 1,5 bar autoklaviert. Hitzeempfindliche Lösungen wurden steril filtriert. Wässrige Lösungen für RNA-Präparationen und RNA-Analysen wurden mit 1% (v/v) Diethylpyrocarbonat versetzt, für 12 bis 24 h bei RT inkubiert und anschließend autoklaviert.

2.8 Lösungen

Lösungen für den routinemäßigen Gebrauch wurden nach Sambrook et al. (1989) angesetzt. Die benötigten Chemikalien wurden den Erfordernissen gemäß in bidestilliertem oder DEPC-behandeltem Wasser gelöst und nach Bedarf autoklaviert oder steril filtriert.

Bezeichnung	Zusammensetzung
Anti-Maus-IgG/HRP-Antikörperlösung	anti-Maus-IgG-Antikörper 1:5000 mit Blockierungslösung verdünnen
Auftragspuffer für Agarosegele	6,6 g Saccharose 0,04 g Bromphenolblau in 10 ml H ₂ O
Bindungspuffer (10x)	0,2 M Na ₃ PO ₄ pH 7,0
Blocklösung I (Immunoblot)	5% Milchpulver in 1x TBS 0,05% Tween20
Blocklösung II (Immunzytochemie)	5% BSA in 1x PBS

Blocklösung III (Immunzytochemie)	0,5% BSA in PBS
BSA-Triton Puffer (BT)	500 mg BSA 250 mg Triton X-100 mit H ₂ O auf 50 ml auffüllen
Coomassie-Lösung	A: 0,7% Coomassie Brilliant Blue R250 in Methanol B: 20% Essigsäure Lösung A und B 1:1 mischen
DEPC-H ₂ O	0,1% DEPC in H ₂ O
dNTP-Mix	25 mM dATP 25 mM dCTP 25 mM dGTP 25 mM dTTP
ECL-Lösung I	100 µl 250 mM Luminol 44 µl 90 mM p-CA 1 ml 1 M Tris-HCl pH 8,5 8,8 ml H ₂ O
ECL-Lösung II	6 µl 30% H ₂ O ₂ 1 ml 1 M Tris-HCl pH 8,5 9 ml H ₂ O
Elektrophoresepuffer (5x) für Immunoblot	125 mM Trisbase 1,25 M Glycine 50 ml SDS (10%) mit H ₂ O auf 1 l auffüllen
ELISA Blockierungslösung	1% Gelatine in PBS
ELISA Coating Puffer	Lsg.A: 0,2 M Na ₂ CO ₃ Lsg.B: 0,2 M NaHCO ₃ vor Gebrauch 85 ml A + 40 ml B auf 500 ml mit H ₂ O auffüllen
ELISA Substratreaktion	10 ml ELISA-Substratreaktions-Puffer 500 µl 40 mM ABTS 10 µl H ₂ O ₂ 30%
ELISA Substratreaktions- Puffer	0,1 M NaAc 0,05 M NaH ₂ PO ₄ pH 4,0
Elutionspuffer (GST)	5 mM reduziertes Glutathion 50 mM Tris-HCl, pH 8,0 pH-Wert auf 7,5 einstellen
Elutionspuffer (10x)	1 M Glycin-HCl pH 2,7
Entfärbelösung I	40% Methanol 7% Essigsäure in H ₂ O
Entfärbelösung II	5% Methanol 7% Essigsäure in H ₂ O

Ery-Lyse-Puffer	8 g Ammoniumchlorid 0,53 g Kaliumhydrogencarbonat 0,1 mM EDTA (pH 8,0) mit H ₂ O auf 1000 ml auffüllen pH 8,0
KMT-Puffer (5x)	2,5 ml 1 M TRIS 860 µl 1 M HCl 5 ml 2,5 M KCl 500 µl MgCl ₂ auf 50 ml mit H ₂ O auffüllen pH 8,4
Laemmli-Puffer (6x)	4,53 g TRIS 12 g SDS 15 g Saccharose mit Wasser auf 80 ml auffüllen pH 6,8 (mit 1 M HCl) 90 mg Bromphenolblau mit H ₂ O auf 100 ml filtrieren
Lösung D	94,5 g GTC (Guanidinthiocyanat) 5 ml 1 M Na-Citrat 200 ml DEPC-H ₂ O 360 µl β-ME pro 50 ml Lösung D vor Gebrauch zugeben
Lysis-Puffer	50 mM TRIS 150 mM Natriumchlorid 2 mM DTT pH 7,2
Neutralisierungspuffer	1 M Tris-HCl pH 9,0
NP-40-Puffer	1% NP-40 150 mM NaCl 50 mM Tris-HCl pH 8,0
P1-Lösung	50 mM Tris (pH 8,0) 10 mM EDTA (pH 8,0) pH-Wert auf 8,0 einstellen vor Gebrauch 100 µg/ml RNase A hinzufügen
P1-Puffer (Plasmidpräparation)	2% RNase A (10 mg/ml), 50 mM Tris, 1 mM EDTA (pH 8,0)
P2-Lösung	P2a: 400 mM NaOH P2b: 2% PBS vor Gebrauch 1:1 mischen
P3-Lösung	3 M KAc pH 4,8 einstellen mit Essigsäure
PBS (10x)	1,37 M NaCl 27 mM KCl 81 mM Na ₂ HPO ₄ 14,7 mM KH ₂ PO ₄

PBS/EDTA	1% PBS (10x) 100 mM EDTA steril filtrieren
Probenpuffer	1% SDS 100 mM DTT 50 mM Tris (pH 7,5)
RIPA-Puffer	50 mM Tris pH 8,0 150 mM NaCl 1% NP40 0,5% Na-Desoxy-cholat 0,1% SDS
Sammelgel 4%	0,54 ml 30% Polyacrylamid 1 ml 4x Tris/SDS (pH 6,8) 2,46 ml H ₂ O 50 µl 10% APS 20 µl TEMED
SDS-Sammelgel (5%)	1,7 ml PAA (30 %) 1,25 ml Tris/SDS (pH 6,8) 6,8 ml H ₂ O 50 µl APS (10 %) 20 µl TEMED
SDS-Trenngel (8%/10%)	5,3/6,7 ml PAA (30%) 5 ml Tris/SDS (pH 8,8) 10,6/9,3/7,9 ml H ₂ O 75 µl APS 25 µl TEMED
Semi-Dry-Transferpuffer (pH 8,3)	25 mM Trisbase 150 mM Glycin 20% Methanol
SE-Puffer	75 mM NaCl 5 mM EDTA
Silica-Glasmilch	0,1 g/ml Silica mit 1x PBS mischen 2 h inkubieren, Überstand abnehmen (2x), abzentrifugieren (2000xg, 2 min), restlichen Überstand abnehmen, in 3 M NaJ aufnehmen, Milchkonzentration: 100 mg/ml
TBE-Agarosegel (1%)	1x TBE 1% Agarose aufkochen und auf 55°C abkühlen lassen 0,5 µg/ml Ethidiumbromid hinzufügen
TBE-Puffer (10x)	1 M Tris 0,8 M Borsäure 10 mM EDTA pH 8,0
TBS (10x)	1,37 M NaCl 100 mM Tris/HCl (pH 7,2)
TE-Puffer	10 mM Tris 1 mM EDTA

Tris/SDS (pH 6,8) 4x	0,5 M Trisbase 140 mM SDS pH-Wert auf 6,8 einstellen nach zwei Tagen pH nachjustieren
Tris/SDS (pH 8,8) 4x	1,5 M Trisbase 14 mM SDS pH-Wert auf 8,8 einstellen nach zwei Tagen pH nachjustieren
Trypanblau-Lösung	1x PBS 0,5% Trypanblau
Waschlösung	1x TBS 0,05% Tween 20

2.9 Benutzte Geräte

Gerät	Typ	Hersteller
Autoklav	Varioklav® 400E	H+P Labortechnik
Autoradiographiekassette	Cronex-Kassette	DuPont de Nemours
Blotter, Semi-Dry	V20-SDB	Roth
Brutschränke	B12 (Bakterien)	Heraeus
	B6060 (Säugetierzellen)	
Durchflusszytometer	BD LSR II	BD Biosciences
Elektrophoresekammer	Horizon 58	Gibco BRL
Elektroporationsgerät	Gene Pulser II	Bio Rad
Entwicklermaschine	Kodak M35 X-Omat Processor	Kodak
ELISA-Reader		Dynatech
Gel-Dokumentation (Agarosegele)	Gel Jet Imager 2000	Intas
Gel-Dokumentation (SDS-PAGE)	L 600	Reflecta
Hamiltonspritze	Mikroliter Syringes	Hamilton
Kühlschränke	Superöko Energiesparer	Privileg
Magnetrührer	M32	GLW
Mikroskope	AxioObserver	Zeiss
	LSM 5 PASCAL	
Mikrowellen	Mikromat	AEG
	NN-K458W	Panasonic
Nukleofektor	Amaza	Amaza AG
Netzteile	Power Pack P25	Biometra
	Etron-S	Etron
	PP3000	Biometra
pH-Meter	pH 535 Multi Cal®	WTW
	Komet	Variomag
Photometer	Gene Quant II	Pharmacia Biotech

Pipetten	Research 0.1-2.5 µl Reference 10 µl Research 10 µl Research 100 µl Research 20-200 µl Research 1000 µl	Eppendorf
Rundschüttler	3033	GFL
	Unimax 1010	Heidolph
Schüttelinkubator	Thermomixer comfort	Eppendorf
	SGD 2000	Heidolph
SDS-PAGE Kammer	EPH-1010-V	Bridge
Sequenziergerät	ABI3100avant	Applied Biosystem
Sonifiziergerät	W-370	Sonicator
Spectrophotometer	NanoDrop® ND1000	PeqLab
Sterilbank	K-Safety-KR	Kojair
Thermocycler	GeneAmp PCR System 2700	Applied Biosystem
	PTC-200	Bio-Rad
	Labcycler	Sensoquest
Thermoheizblock	50126101	Liebisch
Tiefkühlschrank (-20°C)	Premium	Liebherr
Tiefkühlschrank (-80°C)	U 725	NB Scientific
Trockengerät für SDS-PAGE	Titramax 1000	H. Saur
Vakuumentrifuge	Speedvac	H. Saur
Vortexer	L46	GLW
Waage	BP 310 s	Sartorius
Wasserbad	1083	GFL
Zentrifugen	Centrifuge 5415 R Centrifuge 5415 D Minispin	Eppendorf
	Biofuge Pico Fresco 21 Pico 21	Heraeus
	113	Sigma

2.10 Medien, Antibiotika, Agarplatten

2.10.1 Medien für Bakterien

Bezeichnung	Zusammensetzung
LB-Medium	10 mg/ml Trypton 5 mg/ml Hefeextrakt 10 mg/ml NaCl
SOC-Medium	20 mg/ml Trypton 5 mg/ml Hefeextrakt 10 mM NaCl 2,5 mM KCl 10 mM MgCl ₂ 10 mM MgSO ₄ 20 mM Glukose

Die Medien wurden mit bidestilliertem Wasser angesetzt, autoklaviert und bei 4°C aufbewahrt. Für die Selektion wurden der jeweiligen Resistenz entsprechend Ampicillin (Endkonzentration 50-200 µg/ml) bzw. Kanamycin (Endkonzentration 25 µg/ml) zugegeben.

2.10.2 Agarplatten

Zur Herstellung von Agarplatten wurde dem LB-Medium vor dem Autoklavieren 1,5% (w/v) Agar zugefügt, nach dem Autoklavieren auf 55°C abgekühlt, ggf. mit den unten angegebenen Reagenzien versetzt und in Petrischalen gegossen. Nach dem Aushärten wurden die Agarplatten bei 4°C aufbewahrt.

Ampicillin: Endkonzentration 50 µg/ml

Kanamycin: Endkonzentration 25 µg/ml

IPTG: Endkonzentration 24 µg/ml

X-Gal: Endkonzentration 0,2%

2.10.3 Medien für eukaryotische Zellkulturen

Die zur Kultur eukaryotischer Zellen verwendeten Medien wurden käuflich erworben (PAN) und vor Gebrauch mit fetalem Kälberserum (FKS) und Antibiotika (Penicillin/Streptomycin) versetzt. Für die Zellkultur wurden folgende Medien verwendet:

Medium	Inhaltsstoffe
DMEM-Medium	1x DMEM (<i>High Glucose</i>) 10% FKS Gold (45 min bei 65°C hitzeinaktiviert) 1% Pen/Strep
HAT-Medium	1x DMEM (<i>High Glucose</i>) 20% FKS Gold (45 min bei 65°C hitzeinaktiviert) 1% Pen/Strep 2% HAT-Zusatz
HT-Medium	1x DMEM (<i>High Glucose</i>) 20% FKS Gold (45 min bei 65°C hitzeinaktiviert) 1% Pen/Strep 1% HT-Zusatz
RPMI-Medium	1x RPMI 10% FKS 1% Pen/Strep

2.11 Biologisches Material

2.11.1 Bakterienstämme

Für die Transformation von Plasmiden in kompetente Bakterienstämme wurden die Bakterienstämme *Escherichia coli* TOP10 (Invitrogen, Karlsruhe), BL21(DE3)pLysS (Promega, Madison) und XL1-Blue (Stratagene, La Jolla) verwendet.

2.11.2 Eukaryotische Zelllinien

Bezeichnung	Beschreibung	Kulturbedingungen
HEK293T	<i>Human embryonic kidney cells</i> , mit Adenovirus 5 immortalisiert (Hay, 1994)	DMEM, 10% FCS, Pen/Strep, 5% CO ₂ , 37°C
HeLa	menschliche Epithelzellen eines Zervixkarzinoms	RPMI, 10% FCS, Pen/Strep, 5% CO ₂ , 37°C
COS-7	Fibroblasten-Zelllinie der Grünen Meerkatze	DMEM, 10% FCS, Pen/Strep,

		5% CO ₂ , 37°C
X63Ag8.653	Mausmyelomzellen	DMEM, 10% FCS, Pen/Strep, 10% CO ₂ , 37°C
Jurkat	Humane T-Lymphozyten	RPMI, 10% FCS, Pen/Strep, 5% CO ₂ , 37°C
K562	Humane Erythroleukämie-Zelllinie aus einem Patienten mit chronischer myeloischer Leukämie	DMEM, 10% FCS, Pen/Strep, 5% CO ₂ , 37°C

2.11.3 Plasmide

Bezeichnung	Bezugsquelle
pAcGFP1-N1	BD Biosciences (Clontech)
pGEM [®] -T easy	Promega
pcDNA-3.1/V5-His-Topo	Invitrogen
pUC-19	Fermentas
pGEX-4T3	Amersham

2.11.4 Synthetische DNA-Oligonukleotide

Für die Sequenzierung von Konstrukten bzw. die Generierung von cDNA-Produkten wurden synthetische Oligonukleotide der Firma Metabion (Martinsried) verwendet.

Name	Sequenz 5'-3'	Annealing-temp.	Schnittstellen
Oligonukleotide zur Amplifikation verschiedener <i>TRIM</i> -Gene			
TRIM10fw	GAA TTC ATG GCC TCT GCT GCC TCT GTG	64	<i>EcoRI</i>
TRIM10rev	GAA TTC TCA GGA GCT CAG GGA GAA ACT GG	63	<i>EcoRI</i>
TRIM15fw	GAA TTC ATG CCC GCA ACC CCG TCC CTG AAG G	67	<i>EcoRI</i>
TRIM15rev	GAA TTC TCA GCC TTT CAG CGT AAG GCA GG	64	<i>EcoRI</i>
rhTRIM15-fw	GAA TTC ATG CCC TCA ACC CCG TCC CTG	62	<i>EcoRI</i>
TRIM26fw	GGA TCC CCA TGG CCA CGT CAG CC	61	<i>BamHI</i>
TRIM26rev	GGA TCC TCA GGG TCT TAG CAG GAG GCG	65	<i>BamHI</i>
TRIM27fw	GAA TTC ATG GCC TCC GGG AGT GTG GCC G	66	<i>EcoRI</i>
TRIM27rev	GAA TTC TCA AGG GGA GGT CTC CAT GGA ATG	62	<i>EcoRI</i>
TRIM39fw	GAA TTC ATG GCA GAG ACA AGT CTG TTA G	59	<i>EcoRI</i>
TRIM39rev	GAA TTC TCA CTC CCA ATC TGT TGG G	56	<i>EcoRI</i>
TRIM5alpha.fw	GAA TTC ATG GCT TCT GGA ATC CTG	56	<i>EcoRI</i>
TRIM5alpha.rev	GAA TTC TCA AGA GCT TGG TGA GC	56	<i>EcoRI</i>
hTRIM21.fw	AAG CTT GAC AAT GGC TTC AGC AGC	62	<i>HindIII</i>
hTRIM21.rev	GAA TTC CAT AGT CAG TGG ATC CTT G	62	<i>EcoRI</i>
hTRIM22.fw	AAG CTT GCA ATG GAT TTC TCA GTA AAG	62	<i>HindIII</i>
hTRIM22.rev	AAG CTT GGA AAA CCC CAA TAC GAC AG	62	<i>HindIII</i>

rhTRIM22.rev	AAG CTT GGA GCT CGG TTG GCA CAG	62	<i>HindIII</i>
hTRIM22.rev.2	AAG CTT CCA GGA GCT CGG TGG GCA C	62	<i>HindIII</i>
hTRIM22.pGEX.fw	GTC GAC GCA ATG GAT TTC TCA GTA AAG	62	<i>SaI</i>
pGEX.h22SPRY.rev	GCG GCC GCT CAG GAG CTC GGT GG	58	<i>NotI</i>
rh22SPRY-ScaI-fw	AG TAC TAC TGG GTG GAC GTG ATG CTG	58	<i>ScaI</i>
rh22TRIM-ScaI-rev	A GTA CTG GAC ATC TGT CAG CTC	58	<i>ScaI</i>
Oligonukleotide für Sequenzierungen			
T7	TAATACGACTCACTATAGGG		
BGH.rev	TAG AAG GCA CAG TCG AGG C		
pGEX.fw	ATA TAG CAT GGC CTT TGC AG		
pGEX.rev	GAG CTG CAT GTG TCA GAG GT		
pAcGFP2f	CAAATGGGCGGTAGGCGTG		
pAcGFP2r	GTGGCCATTACATCGCCAT		
pGEMF	GTTTTCCCAGTCACGAC		
pGEMR	GGATAACAATTCACACAGG		
h21.int	GAA AGC AGG AGT TGG CTG AG		
hTRIM27.942F	CTC AGT GGA CGT GAC TCT GG		
hTRIM39.611F	GGA TGA AGA GCA GCA GGT G		
hTRIM10.583F	AAG GAT GCA AGT CCT CCT GAC		
hTRIM5a.545F	TGG CAG ATT TTG AGC AAC TG		
hTRIM15.561F	GCT GGA GGA GAA GTG TCA GC		
hTRIM26.577F	AGC AGG GTC ATC AGT TCC TG		
Oligonukleotide für <i>site directed Mutagenesis</i>			
476-fw	GTT CTC TGG ATG TCG CTT TTC TCA ACC TGC TTA TCC G		
476-rev	CGG ATA AGC AGG TTG AGA AAA GCG ACA TCC AGA GAA C		
395,396,400-fw	CCA AGT GTA AAT TAT GCA AAT GTT TAC TCC AAA TAT AGA CCT C		
395,396,400-rev	GAG GTC TAT ATT TGG AGT AAA CAT TTG CAT AAT TTA CAC TTG G		
488.fw	CAA TCC TTG GAA CTG CCA AGT CCC CAT GAC		
488.rev	GTC ATG GGG ACT TGG CAG TTC CAA GGA TTG		
Oligonukleotide für Mykoplasmen-PCR			
MYCF1	ACACCATGGGAGCTGGTAAT	58	
MYCR1	CTTCWTCGACTTYCAGACCCAAGGCAT	59	
MYCF2	GTTCTTTGAAAACCTGAAT	45	
MYCR2	GCATCCACCAWAWACTCT	51	

2.11.5 Antikörper

Bezeichnung	Hersteller	Anwendung
Goat-anti-mouse IgG (HRP-gekoppelter Sekundär-AK)	SantaCruz	IB
BD Living Colors A. v. Monoclonal Antibody (JL-8) (anti-GFP-AK)	BD Biosciences	IB, IP
Rabbit-anti-mouse-IgG-TRITC (TRITC-gekoppelter Sekundär-AK)	DakoCytomation	IC

Anti-V5	Invitrogen	IB, IP, IC
Anti-V5-HRP	Invitrogen	IB
Anti- α -Tubulin	Sigma-Aldrich	IC
Anti- α -Tubulin-FITC	Sigma-Aldrich	IC

2.11.6 Datenbanken und Computerprogramme

Folgende Datenbanken und Computerprogramme wurden während dieser Arbeit verwendet:

- Genbank (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/>):
 - Analyse von DNA- und Protein-Sequenzen mit der Datenbank (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/Blahcgi>)
 - Vergleich von zwei DNA-Sequenzen (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gorf/bl2.html/>)
- Genbank (<http://www.ensembl.org>)
- Übersetzung von DNA-Sequenzen in AS-Sequenzen (<http://www.expasy.ch/tools/dna.html>)
- Berechnung des Molekulargewichts von Proteinen (http://bioinformatics.org/sms/prot_mw.html)
- Konvertierung von DNA-Sequenzen in ihre reverse, komplementäre Sequenz (http://bioinformatics.org/sms/rev_comp.html)
- Finden und Prüfen von Restriktionsstellen in DNA-Sequenzen (<http://rna.lundberg.gu.se/cutter2/>)
- Überprüfung von Oligonukleotid-Eigenschaften (<http://www.basic.northwestern.edu/biotools/oligocalc.html>)
- Bestimmung von dN/dS-Verhältnissen: PAL2NAL (<http://coot.embl.de/pal2nal>)
- Textverarbeitung: *Word 2004* (Microsoft)
- Erstellen von Tabellen und Graphen: *Excel 2004* (Microsoft)
- Bildbearbeitung: *Powerpoint 2004* (Microsoft)
- Literaturverwaltung (Erstellung des Literaturverzeichnisses): *EndNote X* (Niles Software Inc.)
- Sequenzierung: *Sequence Analysis* (Applied Biosystems)
- Sequenzauswertung: *4Peaks* ([Mekentosj.com](http://mekentosj.com)), *CodoncodeAligner* (<http://www.codoncode.com/aligner/>)
- Sequenzvergleich: *ClustalX 1.81* (Thompson *et al.*, 1997)
- Genbaumerstellung: *Mega 3.1* (Kumar *et al.*, 2004)

- Messung am Durchflusszytometer: *BD FACSDiva Software* (BD Biosciences)
- Auswertung von FACS-Analysen: *FlowJo 8.7.1* (Tree Star Inc.)

2.12 Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren

2.12.1 Minipräparation von Plasmid-DNA

Zur schnellen Isolierung rekombinanter Plasmide wurde zunächst eine geringe Menge an Plasmid-DNA präpariert. Hierzu wurden 2 ml einer angeimpften Übernachtskultur bei 16000xg zentrifugiert und das Pellet in 200 µl P1-Lösung resuspendiert. Nach Zugabe von 200 µl P2 (modifizierte alkalische Lyse (Birnboim und Doly, 1979)) und 200 µl P3 (Neutralisierung) wurde die Probe bei 16000xg zentrifugiert. Der Überstand wurde in ein neues Gefäß überführt, mit 1 Vol Isopropanol versetzt und bei 16000xg die Plasmid-DNA gefällt. Anschließend wurde das DNA-Pellet mit 500 µl 70% Ethanol gewaschen und nach dem Trocknen in 20-50 µl H₂O aufgenommen.

2.12.2 Herstellung von Bakterien-Glycerin-Stocks

1 ml einer Bakteriensuspension wurde mit 100 µl sterilem Glycerin versetzt, gut gemischt und bei -80°C aufbewahrt.

2.12.3 Midipräparation von Plasmid-DNA

Zur Isolierung größerer Mengen hochreiner Plasmid-DNA wurde das Plasmid-Midi Kit der Firma Qiagen verwendet. Die DNA wird dabei über Säulen aus dem Kit affinitätschromatographisch aufgereinigt. Die Aufarbeitung erfolgte nach dem Protokoll des Herstellers. Die mit dieser Methode isolierte Plasmid-DNA kann u. a. für die Transfektion von Zelllinien, für Restriktionsanalysen und zur Subklonierung oder Sequenzierung eingesetzt werden.

2.12.4 Isolierung von genomischer DNA aus Mundschleimhautzellen

Zur Isolierung von genomischer DNA aus Mundschleimhautzellen spülten die Probanden den Mund gründlich mit zwei mal 30 ml Leitungswasser und gaben anschließend die Flüssigkeit in 50-ml-Falcon-Röhrchen. Zur Sedimentation der Mundschleimhautzellen wurde bei 200xg bei RT 10 min zentrifugiert und der Überstand anschließend vorsichtig dekantiert. Das entstandene Zellpellet wurde in 600 µl Lysis-Puffer resuspendiert, in ein 2-ml-Reaktionsgefäß überführt und die Zellen bei 65°C und 850 rpm auf einem Schüttelinkubator inkubiert. Zur vollständigen Lyse der Zellen wurden 200 µl 5 M NaCl hinzugefügt. Nach kurzem Vortexen wurde bei 12000xg und 4°C 15 min zentrifugiert, um Zellreste und Proteine zu sedimentieren. Der Überstand wurde anschließend in ein neues 2-ml-Reaktionsgefäß überführt und zur DNA-Fällung 800 µl Isopropanol hinzugefügt. Nach 15 min Zentrifugation bei 12000xg und 4°C wurde das DNA-Pellet mit 500 µl 70% EtOH gewaschen (5 min bei 16000xg bei RT), der Überstand verworfen und die DNA in einer Vakuumzentrifuge 5 min getrocknet. Abschließend wurde die DNA in 30 µl H₂O durch 10 min Inkubation bei 55°C und 900 rpm auf einem Schüttelinkubator gelöst.

2.12.5 Isolierung von genomischer DNA aus Blut

Zur Isolierung von genomischer DNA aus Blut wurden zunächst die Erythrozyten mit Hilfe des Ery-Lyse-Puffers vollständig lysiert. Hierzu wurden 2-5 ml Blut mit Ery-Lyse-Puffer auf 15 ml aufgefüllt und etwa 20 min inkubiert. Anschließend wurden die Blutzellen durch Zentrifugieren bei 200xg für 10 min bei 7°C sedimentiert. Der Überstand wurde vorsichtig dekantiert und das Zellpellet mit 10 ml Ery-Lyse-Puffer gewaschen. Nach einem weiteren Zentrifugationsschritt (200xg, 10 min, 7°C) wurde der Überstand vorsichtig verworfen, das Pellet in 2 ml SE-Puffer gelöst und über Nacht bei 37°C und 140 rpm in einem Schüttelinkubator inkubiert. Am nächsten Tag wurden 800 µl 5 M NaCl hinzu gegeben, kurz geschwenkt und bei 1200xg 10 min bei RT zentrifugiert. Der Überstand wurde durch eine Gaze in ein neues 50-ml-Falcon-Röhrchen überführt und die DNA mit 2-2,5 Vol 100% EtOH präzipitiert. Der Überstand wurde vorsichtig dekantiert und die DNA mit 2 ml 70% EtOH gewaschen. Das DNA-Pellet wurde in ein 1,5-ml-Reaktionsgefäß überführt und 1-2 h an der Luft getrocknet. Abschließend wurde die DNA in 100 µl TE-Puffer gelöst.

2.12.6 Ethanolfällung von DNA aus wässrigen Lösungen

(Sambrook J., 1989)

Die Ethanolfällung wurde eingesetzt, um DNA zu konzentrieren und sie von Salzverunreinigungen zu befreien. Zur Fällung von Plasmid-DNA oder PCR-Produkten wurde der Ansatz mit 1/10 Vol 3 M Kaliumacetat, pH 4,8 und 3 Vol 99% Ethanol versetzt. Der Ansatz wurde für 15 min bei 16000xg und 4°C zentrifugiert und das Pellet mit 500 µl 70%igem Ethanol gewaschen. Anschließend wurde das Pellet getrocknet und in einem entsprechenden Volumen H₂O aufgenommen.

2.12.7 Phenol/Chloroform-Aufreinigung von Nukleinsäuren

Die Phenol/Chloroform-Extraktion dient der Reinigung von Nukleinsäuren von Proteinen und Membranbestandteilen. Die zu extrahierenden DNA- oder RNA-Proben wurden mit gleichen Volumina Phenol und Chlorophorm versetzt und intensiv gemischt. Die Phasentrennung erfolgte durch Zentrifugation bei 16000xg für 2-5 min. Die wässrige Phase wurde in ein neues Reaktionsgefäß überführt und die Extraktion nun mit 1 Vol Phenol/Chloroform/Isoamylalkohol (25:24:1) wiederholt. Die sich in der wässrigen Phase befindende DNA wurde anschließend einer Ethanolfällung (2.12.6) unterzogen.

2.12.8 Isolierung von Gesamt-RNA aus Zellkulturen

Die Isolierung von Gesamt-RNA aus Zellkulturen erfolgte mit Hilfe des RNeasy Mini Kits der Firma Qiagen nach dem Protokoll des Herstellers. Bei Isolierung von RNA aus Blut wurde vorher eine Ery-Lyse zur Eliminierung der Erythrozyten durchgeführt (2.12.5).

2.12.9 Konzentrationsbestimmung von Nukleinsäuren

Die Konzentrationsbestimmung von DNA wurde zum einen mit Hilfe eines Spectrophotometers (NanoDrop®) zum anderen mittels eines DNA-Standards über Gelelektrophorese durchgeführt. Hierzu wurde eine bestimmte Menge der DNA neben einen pUC-19-Standard mit bekannter DNA-Konzentration (0,5 µg/µl) auf ein 1%iges Agarosegel

aufgetragen. Nach 2 min bei 120 V wurde die Bandenintensität der zu bestimmenden DNA mit der des pUC-19-Standards unter UV-Licht verglichen und so die DNA-Konzentration abgeschätzt.

Die Konzentrationsbestimmung von RNA erfolgte photometrisch bei einer Wellenlänge von 260 nm. Die RNA wurde 1:100 mit DEPC-H₂O verdünnt und die Konzentration mit Hilfe eines Photometers gegen DEPC-H₂O als Referenz gemessen.

Die Berechnung der Konzentration erfolgte nach der Gleichung:

Extinktion (OD_{260}) 1 = 40 µg ssRNA / ml

$c(ssRNA) = OD_{260} \times \text{Verdünnung} \times 40 \text{ µg ssRNA / ml}$

2.13 Klonierungstechniken

2.13.1 Spaltung von DNA mit Restriktionsendonukleasen

Zur enzymatischen Spaltung von DNA wurde der Restriktionsansatz in einem Volumen von mindestens 10 µl bei der für das Enzym optimalen Temperatur für 1-2 h oder über Nacht inkubiert, wobei pro µg DNA 2-3 U des jeweiligen Restriktionsenzym eingesetzt wurden. Für eine simultane Restriktionsanalyse mit zwei Restriktionsendonukleasen wurde ein Puffer eingesetzt, der beiden Enzymen eine ausreichende Aktivität erlaubte.

2.13.2 Isolierung von DNA-Fragmenten aus Agarosegelen

Die Isolierung von DNA-Fragmenten aus Agarosegelen erfolgte mit Hilfe von Glasmilch (Silica-Milch). Silikate binden in der Gegenwart hoher Konzentrationen chaotroper Salze spezifisch an DNA, die nach einem Waschschrift mit H₂O eluiert werden kann.

Die über ein Agarosegel aufgetrennten DNA-Fragmente wurden mit einem sterilen Skalpell aus dem Gel geschnitten und die Agarose in 300-600 µl 6 M NaJ bei 55°C unter Schütteln gelöst. Anschließend wurden 10-20 µl Glasmilch hinzu gegeben und für 10 min bei 55°C auf einem Schüttelinkubator bei 1000 rpm inkubiert. Die Suspension wurde für 30 sec bei 16000xg zentrifugiert und das entstandene Pellet zweimal mit 300 µl 70%igem EtOH

gewaschen. Das getrocknete Pellet wurde in 20 µl H₂O resuspendiert und die DNA 10 min bei 55°C unter Schütteln eluiert.

2.13.3 Dephosphorylierung von Plasmid-DNA

Um eine Religation linearisierter Plasmid-DNA zu verhindern, wurde eine Dephosphorylierung durchgeführt. Endständige 5'-Phosphatgruppen des Vektors werden mit Hilfe des Enzyms Alkalische Phosphatase (SAP, *shrimp alkaline phosphatase*) entfernt. Dazu wurde die DNA mit 2 U Alkalische Phosphatase für 1 h bei 37°C inkubiert. Anschließend wurde eine Hitzeinaktivierung für 15 min bei 65°C durchgeführt und die DNA mit Hilfe einer Ethanol-Fällung (2.12.6) aufgereinigt.

2.13.4 Ligation von DNA-Fragmenten

Die Ligation wurde zur Verknüpfung von linearer Plasmid-DNA mit DNA-Fragmenten genutzt. Das Enzym T4-DNA-Ligase katalysiert dabei die Bildung von Phosphodiesterbindungen zwischen 3'-Hydroxyl- und 5'-Phosphatenden der linearisierten DNA, so dass rekombinante DNA-Moleküle entstehen. Es wurde folgender Ligationsansatz verwendet:

25-50 ng	Vektor-DNA
30-120 ng	Insert-DNA
0,2 µl	T4-DNA-Ligase (5 U/µl)
1 µl	10 x Ligationspuffer
ad 10 µl H ₂ O	

Die einzusetzenden DNA-Mengen wurden mit Hilfe folgender Formel berechnet:

$$\text{Insert-DNA (ng)} = (\text{Vektor-DNA (ng)} \times \text{kb Insert/kb Vektor}) \times 3$$

Der Ansatz wurde über Nacht bei 4°C oder 2 h bei RT inkubiert.

2.13.5 Subklonierung von PCR- und RT-PCR-Produkten

Taq-Polymerasen besitzen eine terminale Transferase-Aktivität, die zu einer Addition von einem Nukleotid an das 3'-Ende von PCR-Produkten führt. In Anwesenheit aller 4 Nukleotide wird hauptsächlich dA angehängt. Diese terminale Transferase-Aktivität ist die Grundlage für die TA-Klonierungsstrategie. Für die Subklonierung von PCR- und RT-PCR-Produkten wurde das pGEM-Teasy Vektor System verwendet, welches 5' T-Überhänge besitzt. Folgende Komponenten wurden gemischt:

50 ng pGEM-T Easy Vektor
PCR-Produkt (3:1, Insert: Vektor-Verhältnis)
5 µl T4-DNA-Ligase 2 x Puffer
1 µl T4-DNA-Ligase
in einem Gesamtvolumen von 10 µl

Die Bestandteile wurden gemischt und 2 h bei Raumtemperatur oder über Nacht bei 4°C inkubiert. Die Produkte einer Ligation wurden anschließend in kompetente *E. coli* Bakterien transformiert (siehe 2.11.7).

2.13.6 Herstellung kompetenter Zellen

Zur Herstellung kompetenter *E.coli*-Zellen für Elektroporation wurde zunächst 5 ml LB-Medium mit entsprechendem Antibiotikum mit TOP10-Zellen angeimpft und über Nacht in einem Schüttelinkubator bei 240 rpm und 37°C inkubiert. Die Übernachtskultur wurde in 400 ml vorgewärmtes LB-Medium mit entsprechendem Antibiotikum überführt und bei 200 rpm und 37°C bis zu einer OD₆₀₀ von 0,5 inkubiert. Nach 30 minütiger Inkubation auf Eis wurde der Ansatz in gekühlte 50-ml-Röhrchen gegeben und 15 min bei 1500xg bei 4°C zentrifugiert. Der Überstand wurde verworfen und die Bakterienpellets in 30 ml sterilem, kaltem 10% Glycerol resuspendiert. Nach 15 min Zentrifugation bei 4°C und 1200xg wurde der Überstand gründlich dekantiert und die Bakterienpellets im Rückfluss resuspendiert. Abschließend wurden die Bakterien in 50 µl Aliquots schockgefroren und bei -80°C gelagert.

2.13.7 Transformation kompetenter Bakterienzellen mit Plasmid-DNA

Für die Transformation mit Hilfe von Elektroporation wurden zunächst die elektrokompetenten Zellen 5 min auf Eis aufgetaut und 3-5 µl des Ligationsansatzes zu 50 µl kompetenten Zellen hinzugefügt. Der Ansatz wurde in gekühlte Elektroporationsküvetten (ø 1 mm) überführt und eine Elektroporation bei 1,6 kV, 250 µF und 200 Ω durchgeführt. Nach Zufügen von 1 ml SOC-Medium wurde der Transformationsansatz für 1 h bei 37°C unter Schütteln inkubiert. Danach wurden 50-500 µl der transformierten Zellen auf geeigneten Agarplatten ausgestrichen und über Nacht bei 37°C inkubiert.

Für die Transformation von käuflich erworbenen chemokompetenten Zellen durch Hitzeschock wurden zunächst die kompetenten Zellen auf Eis 5 min aufgetaut, 3-5 µl des Ligationsansatzes zu 50 µl kompetenten Zellen hinzugefügt und für 20 min auf Eis inkubiert. Dann wurden die Zellen einem Hitzeschock bei 42°C für 45 sec ausgesetzt und sofort wieder für 2 min auf Eis gestellt. Nach Zufügen von 1 ml SOC-Medium wurde der Transformationsansatz für 1 h bei 37°C unter Schütteln inkubiert. Danach wurden 50-500 µl der transformierten Zellen auf geeigneten Agarplatten ausgestrichen und über Nacht bei 37°C inkubiert.

2.14 Gelelektrophorese

2.14.1 Gelelektrophorese von DNA

Zur Auftrennung von DNA-Fragmenten wurden Agarose-Gelelektrophoresen durchgeführt. Je nach Größe der Fragmente wurden Gele mit 0,5-2,0% (w/v) Agaroseanteil verwendet. Die Agarose wurde in 1x TBE-Puffer durch Kochen gelöst, mit Ethidiumbromid (Endkonzentration 0,5 µl/ml) versetzt und in den Gelträger überführt. Nach vollständiger Verfestigung des Gels wurde die Elektrophorese in einer mit 1x TBE-Puffer gefüllten Gelkammer bei konstanter Spannung von 50-120 V durchgeführt.

2.14.2 Längenstandards

Um die Größe von DNA-Fragmenten in Agarosegelen zu bestimmen, wurden Längenstandards parallel mitgeführt.

GeneRuler™ 100 bp DNA Ladder Plus Fermentas

Lambda DNA/*Eco*RI + *Hind*III-Marker, 3 Fermentas

2.15 Polymerase-Kettenreaktion (PCR)

(Saiki et al., 1985)

Um unspezifische Bindungen der Oligonukleotide an die DNA zu vermeiden, wurden die PCR-Reaktionen als „Hot-Start“-PCR durchgeführt. Dabei werden die Oligonukleotide durch eine Wachsschicht von der *Taq*-DNA-Polymerase und der Ausgangs-DNA getrennt und erst beim ersten Denaturierungsschritt vereint.

Die Methode wurde mit folgendem Reaktionsansatz durchgeführt:

x µl	<i>template</i> -DNA (10–50 ng)
1 µl	Oligonukleotid 1 (10 pmol/µl, sequenzspezifisch)
1 µl	Oligonukleotid 2 (10 pmol/µl, sequenzspezifisch)
0,2 µl	dNTPs (2 mM)
6 µl	KMT-Puffer (5 x)
4 µl	BT-Puffer
1 U	<i>Taq</i> -DNA-Polymerase
ad 30 µl	HPLC-H ₂ O

Die DNA-Amplifikation erfolgte mittels 30-40 Zyklen in einem Thermocycler. Die Anzahl der Zyklen, die einzelnen Temperaturschritte und die jeweilige Dauer der Zyklen mussten für jedes DNA-Fragment und die dafür eingesetzten Oligonukleotide neu gewählt werden. Ein Zyklus bestand aus folgenden Einzelschritten:

95°C	30–60 sec	Denaturierung
50–65°C	30–90 sec	Annealing
72°C	30–90 sec	Elongation

Vor Beginn des ersten Zyklus wurde 2-5 min bei 95°C denaturiert. Nach Beendigung der gewünschten Zyklen schloss sich ein letzter Elongationsschritt von 7-10 min bei 72°C an. Nach Entfernen des Wachses wurde 1/10 Vol des Ansatzes mit 10x Ladepuffer gemischt, je nach Größe des PCR-Produkts auf ein 1-2%iges Agarosegel aufgetragen und elektrophoretisch aufgetrennt.

2.15.1 Reverse Transkription

Um eine repräsentative Population von cDNA aus Gesamt-RNA zu erhalten, wurde die Reverse Transkription mit *M-MLV* Reverse Transkriptase (Promega, Madison) und oligo(dT)-Primern, die mit den poly(A)⁺-Sequenzen der mRNA paaren, durchgeführt. Es entsteht ein sog. cDNA-Strang (für *complementary* DNA), der zur mRNA komplementär ist und später DNA-abhängigen DNA-Polymerasen zugänglich gemacht werden kann.

Für die reverse Transkription wurden 2,5 µg RNA mit 1 µl oligo(dT)-Primer (0,5 µg/µl) in 15 µl Gesamtvolumen gemischt und 10 min bei 70°C inkubiert. Nach Zugabe von:

5 µl *M-MLV*-RT-5x Puffer
1 µl *M-MLV* Reverse Transkriptase
0,5 µl dNTP (25mM)
0,7 µl *RNasin*
ad 25 µl DEPC-H₂O

wurde die Reverse Transkription 50 min bei 42°C durchgeführt. Die erhaltene cDNA konnte für die Amplifikation verschiedener Gene in PCR-Reaktionen eingesetzt werden.

2.15.2 Mutagenese PCR

Die Erzeugung von Mutationen ist ein wichtiges Hilfsmittel zur Charakterisierung von Genfunktionen. In den klassischen *in vivo* Mutageneseverfahren werden in einem Organismus durch Einwirkung von Mutagenen (z.B. Röntgenstrahlung, chemische Substanzen) ungerichtete, zufällige Mutationen hervorgerufen. Anschließend sind aufwendige Screening-Methoden erforderlich, um die gewünschten Mutanten zu identifizieren.

Mit Hilfe der gerichteten Mutagenese (*site directed mutagenesis*) können gezielt einzelne Basen in einer Gensequenz modifiziert werden, so dass es zur Substitution bestimmter Aminosäuren im Protein kommt. Auf diese Weise können Rückschlüsse auf die Funktionen einzelner Aminosäuren innerhalb eines Proteins gezogen werden.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde die gerichtete Mutagenese mit Hilfe des QuikChange® II Site-Directed Mutagenesis Kit (Stratagene) durchgeführt. In Abbildung 4 ist die Methode der gerichteten Mutagenese schematisch dargestellt.

Abb. 4: Schematischer Überblick über die QuikChange II site-directed Mutagenese Methode (modifiziert nach Instruction Manual: QuikChange® II site-directed Mutagenesis Kit, Stratagene).

Diese Methode wird dafür verwendet, Punktmutationen, Aminosäuresubstitutionen und Deletionen oder Insertionen in doppelsträngigen Plasmiden herbeizuführen. Grundlegend

wird *supercoiled* doppelsträngige Plasmid-DNA (dsDNA,) die das zu mutierende Insert beinhaltet, zusammen mit zwei synthetischen Oligonukleotiden, die beide die gewünschte Mutation aufweisen, verwendet. Die Oligonukleotide, die beide komplementär an beiden Seiten des Plasmids binden, werden während eines spezifischen PCR-Programms durch die *PfuUltra* HF DNA-Polymerase verlängert, so dass ein mutiertes Plasmid generiert wird. Anschließend an das PCR-Programm wird eine *DpnI*-Restriktion durchgeführt, bei der durch das Enzym die methylierte und hemimethylierte DNA restringiert und so das eingesetzte parentale Plasmid zerschnitten wird.

Nach Angaben des Herstellers wurde 25 ng *supercoiled* doppelsträngige Plasmid-DNA (dsDNA) mit dem zu mutierenden Insert, jeweils 125 ng der mutagenen Oligonukleotide, 1 µl dNTP-Mix, 5 µl des 10x-Reaktionspuffers mit ddH₂O auf 50 µl aufgefüllt. Anschließend wurde 1 µl der *PfuUltra* HF DNA-Polymerase hinzugefügt. Die Mutagenese-PCR wurde nach folgendem Programm durchgeführt:

Temperatur	Zyklenzahl	Dauer	
95°C	1	1 min	Denaturierung
95°C	16	50 sec	Denaturierung
60°C		50 sec	Annealing
68°C		1 min/kb Plasmidlänge	Elongation
68°C	1	7 min	Elongation

Nach Beenden des PCR-Programmes wurde der Ansatz für 2 min auf Eis auf etwa 37°C gekühlt, 1 µl *DpnI* hinzugefügt und 1 h bei 37°C inkubiert, um die methylierte und hemimethylierte Ausgangs-DNA zu restringieren. Anschließend wurde eine Transformation in XL1-Blue superkompetente Zellen (Stratagene) nach Angaben des Herstellers durch Hitzeschock durchgeführt.

Um zu überprüfen, ob die gewünschte Mutation in den Plasmiden zu finden war, wurden Mini-Plasmidpräparationen (2.12.1) durchgeführt und die erhaltene Plasmid-DNA sequenziert (2.16).

2.16 Sequenzanalyse

Die nichtradioaktive Sequenzierung basiert auf dem Prinzip des Kettenabbruchverfahrens (Sanger et al., 1977), wobei vier Didesoxynukleotide zum Einsatz kommen, die jeweils mit

verschiedenen Fluoreszenzfarbstoffen markiert sind, welche wiederum während der gelelektrophoretischen Analyse über Laserabtastung automatisch detektiert werden. Die Sequenzreaktion wurde mit 200 ng Plasmid-DNA bzw. 20-30 ng PCR-Produkt, 3,3 pmol sequenzspezifischem Primer und 1 µl BigDye®, 1,5 µl 5x Sequenzier-Puffer in einem Gesamtansatz von 10 µl nach folgendem Programm durchgeführt:

95°C	30 sec	} 25 Zyklen	Denaturierung
50°C	15 sec		Annealing
60°C	4 min		Elongation

Im Anschluss daran wurde der Ansatz der Sequenzreaktion gefällt (2.12.6), das erhaltene DNA-Pellet in 10 µl Formamid (HiDi™) gelöst und in einem ABI 3100-Avant Kapillar-Sequenziergerät (Applied Biosystem) analysiert. Die Auswertung der Sequenzen erfolgte mit Hilfe der Programme 4Peaks, CLUSTALX und BLAST.

2.17 Proteinchemische Techniken

2.17.1 Isolierung von Gesamtprotein aus Zellkulturen

Um Gesamtprotein aus Zellkulturen zu isolieren, wurde die benötigte Anzahl an Zellen mit 1x PBS gewaschen und pro 1×10^7 -Zellen 1 ml RIPA oder NP40-Puffer hinzu gegeben. Das Lysat wurde durch mehrmaliges Aufziehen durch eine Kanüle homogenisiert und feste Bestandteile durch Zentrifugation (10 min, 16000xg, 4°C) entfernt.

2.17.2 SDS-Polyacrylamidgelelektrophorese (SDS-PAGE)

Die Auftrennung der Proteine erfolgte unter denaturierenden Bedingungen mittels diskontinuierlicher SDS-PAGE nach der Methode von Laemmli (1970). Hierzu wurden 8-15%ige Trenngele und 5%ige Sammelgele verwendet. Die zu analysierenden Proben wurden im Verhältnis 1:1 mit IB-Probenpuffer versetzt, 10 min bei 95°C inkubiert und mit einer Hamilton-Mikroliter-Spritze auf das Gel aufgetragen. Die Elektrophorese wurde zunächst bei einer Stromstärke von 20-25 mA (Sammelgel) und anschließend bei einer

Stromstärke von 30-35 mA durchgeführt.

2.17.3 Färbung von Proteingelen

SDS-PAGE-Gele konnten zwecks Proteinfärbung 5 min in Coomassie Brilliant Blau Färbelösung geschwenkt werden. Anschließend wurden die Gele über Nacht in Entfärbelösung I und danach 2 h in Entfärbelösung II geschwenkt. Mit Hilfe eines Trockengerätes wurden die Gele für 2 h bei 50°C unter Vakuum auf Whatman-Filterpapier getrocknet.

2.17.4 Immunoblot-Analysen von Proteinen auf Nitrozellulose-Membranen

Eine auf die Größe des zu blottenden Polyacrylamidgels zugeschnittene Nitrozellulose-Membran und drei zurechtgeschnittene Whatman-Filterpapiere wurden in Semi-Dry-Transferpuffer equilibriert. Das nach der elektrophoretischen Auftrennung der Proteine mit Wasser abgespülte Polyacrylamidgel wurde auf die Filterpapiere und die Membran mit der matten Seite auf das Gel gelegt. Drei weitere mit Transferpuffer getränkte Filterpapiere wurden nach dem *sandwich*-Model oben aufgesetzt. Der Transfer der Proteine auf die Nitrozellulosemembran wurde in einem Elektrobloetter (Biometra) bei 2 mA pro cm² Membran für 1 h durchgeführt.

Um unspezifische Bindungsstellen zu blockieren, wurde die Membran zunächst in Blocklösung I für 1 h bei RT inkubiert. Danach erfolgte die Inkubation mit dem Primärantikörper bei einer für den jeweiligen Antikörper entsprechenden Verdünnung in Blocklösung I bei 4°C über Nacht. Anschließend wurde die Membran 5x 5 min in 1x Waschlösung III gewaschen und mit einem entsprechenden Sekundärantikörper in einer Verdünnung von 1:2000 bis 1:10000 in Blocklösung I für 2 h bei RT inkubiert. Für den Nachweis der Proteine über Chemilumineszenz wurde die Membran nach Waschen mit Waschlösung III 4x 5 min und 1x 5 min mit TBS gewaschen, um Milchpulverrückstände zu entfernen. Anschließend wurden ECL-Lösung I und II frisch angesetzt und 1:1 gemischt. Die HRP setzt das Substrat der Arbeitslösung um und die Produkte bilden ein sichtbares Präzipitat um den Antigen-Antikörperkomplex. Die Lösung wurde auf die Membran gegeben und 1 min inkubiert. Anschließend wurde die abgetropfte Membran in Plastik eingeschweißt und in eine Filmkammer gelegt. Der Film wurde in der Dunkelkammer aufgelegt und nach 60 sec

entwickelt. Je nach Intensität der Banden konnte die Entwicklungszeit verlängert oder verkürzt werden.

2.17.5 Isolierung GST-markierter Proteine aus Bakterienkulturen

GST-markierte Proteine konnten mit Hilfe von Glutathion gekoppelter Agarose-Säulen (Sigma) aus *E.coli*-Bakterien isoliert werden. Dazu wurde zunächst eine Vorkultur BL21-*E.coli*-Zellen, die das entsprechende GST-Fusionskonstrukt beinhalteten, in 10 ml LB-Medium (+Ampicillin und Chloramphenicol) über Nacht kultiviert. 1 ml der Vorkultur wurde zu 100 ml vorgewärmtem LB-Medium gegeben und bis zu einer OD von 0,6 unter Schütteln bei 37°C kultiviert. Nach Zugabe von 0,5 M IPTG wurden die Zellen für weitere 4-5 h im Schüttelinkubator bei 30-37°C inkubiert und anschließend die Zellen bei 4700 rpm pelletiert. Das erhaltene Bakterienpellet wurde in 3 ml RIPA-Puffer aufgenommen und die Zellen durch 5x Sonifizieren auf Eis lysiert. Danach wurde Triton X-100 bis zu einer finalen Konzentration von 1% zu dem Zelllysate gegeben und für 10 min bei 4°C bei 10000xg zentrifugiert. Der Überstand wurde dann auf die vorher 5x mit 1x PBS equilibrierte Säule gegeben. Anschließend wurde 4x mit 1x PBS mit 1% Triton X-100 gewaschen. Zum Eluieren wurde 3x 1 ml Elutionspuffer auf die Säule gegeben, der Durchfluss getrennt aufgefangen und jede Fraktion mittels SDS-PAGE und anschließender Coomassie-Färbung auf aufgereinigtes GST-Fusionsprotein hin analysiert.

2.18 Zellbiologische Methoden

2.18.1 Zellkultur eukaryotischer Zellen

Die adhärent wachsenden Zelllinien HEK239T und COS-7 wurden in DMEM, die adhärente Zelllinie HeLa in RPMI1640 jeweils mit Zusatz von 1,2% Penicillin/Streptomycin und 10% FKS in oberflächenbehandelten Petrischalen kultiviert. Die Inkubation erfolgte im Brutschrank bei 5% CO₂ und 37°C.

In Abhängigkeit von der Proliferationsrate wurden die Zellen ein- bis dreimal pro Woche geteilt. Die adhärent wachsenden Zellen COS-7 und HeLa wurden dabei mit 1x PBS (Biochrom) gewaschen und mit einer Trypsin-Lösung (PAA) bis zur Ablösung der Zellen

vom Boden der Kulturflasche inkubiert. Die Trypsinierung der Zellen wurde durch Zugabe von Medium beendet und die Zellen in einem Verhältnis von 1:2 bis 1:5 in frischem Medium ausgesät. Die schwach adhärent wachsenden HEK293T-Zellen wurden mit 1x PBS gewaschen, anschließend mit frischem Medium vom Boden der Petrischale abgelöst und im Verhältnis von 1:5 neu ausgesät.

Um die Suspensionszellen X63Ag8.653 zu teilen, wurden die Zellen mit Medium in 15 ml Röhrchen überführt und 10 min bei 300xg zentrifugiert. Das Medium wurde verworfen, die Zellen mit 3 ml 1x PBS gewaschen und nochmals 10 min bei 300xg zentrifugiert. Das Zellpellet wurde in frischem Medium resuspendiert und im Verhältnis 1:6 bis 1:10 neu ausgesät.

2.18.2 Kryokonservierung und Revitalisierung von eukaryotischen Zellen

Die bis zu einer Konfluenz von >80% gewachsenen Zellen wurden mit 1x PBS gewaschen, trypsinisiert und anschließend in 1 ml DMSO resuspendiert. Um ein langsames und schonendes Einfrieren (1-3°C/min) der Zellen zu gewährleisten, wurden diese in einem mit Isopropanol gefüllten Kryo-Einfriercontainer (Nalgene Mister Frosty®) für 3 Tage bei -80°C eingefroren. Zur Langzeitlagerung wurden die Zellen in flüssigem Stickstoff gelagert. Zur Revitalisierung wurden die Zellen schnell bei 37°C im Wasserbad aufgetaut und in vorgewärmtes Kulturmedium überführt.

2.18.3 Mycoplasmen-PCR

Um eventuelle Kontaminationen der Zellkulturen mit Mycoplasmen festzustellen, wurden in regelmäßigen Abständen PCR-Reaktionen durchgeführt. Hierfür wurden Oligonukleotide verwendet, die für eine Reihe von Mycoplasmen-Stämmen spezifisch sind.

Zunächst wurden aus den jeweiligen zu untersuchenden Zellkulturen 200 µl Überstand entnommen. Der Überstand wurde 5 min bei 95°C inkubiert, 1 min bei 1000xg zentrifugiert und anschließend 1 µl zu einem PCR-Ansatz (2.15) mit den Oligonukleotiden MYCF1 und MYCR1 gegeben. Die PCR-Reaktion wurde bei folgendem Programm durchgeführt:

Temperatur	Zyklenzahl	Dauer	
94°C	1	3 min	Denaturierung
94°C	35	30 sec	Denaturierung
55°C		20 sec	Annealing
72°C		1 min	Elongation
72°C	1	7 min	Elongation

Nach Abschluss dieser PCR-Reaktion wurde eine zweite PCR-Reaktion mit identischem Programm durchgeführt. Hierbei wurde 1 µl der ersten PCR-Reaktion zu einem PCR-Ansatz mit den Oligonukleotiden MYCF2 und MYCR2 gegeben. Je nach Mycoplasmenspezies wurden PCR-Produkte zwischen 200-500 bp erhalten.

2.18.4 Transfektion eukaryotischer Zellen mittels Lipofektion

Die Transfektion eukaryotischer Zellen erfolgte zum Nachweis der subzellulären Lokalisation von Fusionsproteinen, zum Nachweis der Koloikalisierung mit Hilfe von immunzytochemischen Experimenten und zum Nachweis von Interaktionen (Koimmunpräzipitation) ausgewählter Proteine.

Das verwendete Transfektionsreagenz Metafectene stellt ein polykationisches Lipid dar. Es bildet mit der DNA einen stabilen Komplex aufgrund der entgegengesetzten Ladungen. Die DNA wird in diesem Fall nicht in den Liposomen verpackt, sondern lagert sich außen an. Beim Kontakt der Liposomen mit der Zellmembran wird die DNA in die Zelle aufgenommen, wobei der genaue Mechanismus noch nicht bekannt ist. Bei der Transfektion besitzt jede Kombination von Zelllinie und Plasmid einen Satz von optimalen Parametern in Hinblick auf die Transfektionseffizienz. Für jede Zelllinie muss daher das beste Verhältnis von Transfektionsreagenz und DNA ermittelt werden. Zu beachten ist aber, dass Transfektionsreagenzien unterschiedlich toxisch auf verschiedene Zellen wirken, was auch bei ansonsten sehr guter Transfektionseffizienz die Menge der DNA im Transfektionsansatz limitiert. Es wurden für die Transfektionsexperimente nur Zellen verwendet, die sich in einer permanenten Wachstumsphase befanden. Einen Tag vor der Transfektion wurden die Zellen so ausplattiert, dass am folgenden Tag eine Konfluenz von 70-90% erreicht wurde. Das entsprechende Medium (RPMI1640 oder DMEM) ohne Zusätze wurde mit DNA und Transfektionsreagenz nach Vorschrift des Anbieters gemischt, bei RT 20 min inkubiert und

vorsichtig auf die Zellen aufgetropft. Anschließend wurden die Zellen zwecks Proteinexpression 24-48 h unter Kulturbedingungen inkubiert.

2.18.5 Transfektion eukaryotischer Zellen mittels Nukleofektion

Einige schwer zu transfizierende Zelllinien, wie z.B. die Zelllinie Jurkat, wurden mit Hilfe der Nucleofector[®]-Technologie (Amaxa) transfiziert. Die Methode bewirkt einen effizienten Transfer von DNA nicht nur in das Zytoplasma sondern auch direkt in den Zellkern von Zelllinien und Primärzellen. Sie basiert auf der physikalischen Methode der Elektroporation kombiniert mit spezifisch auf den jeweiligen Zelltyp abgestimmten Reagenzien.

Zur Nukleofektion von Jurkatzellen wurden diese zwei Tage vor der Nukleofektion passagiert und bis zu einer Dichte von 3×10^5 Zellen pro ml in geeignetem Kulturmedium kultiviert.

Für jeden Nukleofektionsansatz wurden 4×10^6 Zellen mit 1x PBS gewaschen (10 min, 200xg) und anschließend das Zellpellet in 100 µl Puffer 1b (Raumtemperatur) resuspendiert. Dem Ansatz wurden 1 µg DNA hinzugefügt und dieser in eine Elektroporationsküvette (ø 4 mm) überführt. Nach der Nukleofektion (Programm T-014) wurden sofort 500 µl 37°C warmes RPMI mit Zusätzen (10% FKS, Pen/Strep) hinzu gegeben und die Zellen in 12-Well Schalen mit 1 ml vorgewärmten RPMI-Medium mit Zusätzen überführt.

Nach 12-48 h Inkubation bei 37°C und 5% CO₂ konnten die Zellen auf Proteinexpression hin untersucht werden.

2.19 Methoden zur subzellulären Lokalisierung eines Proteins

2.19.1 Immunzytochemische Färbung eukaryotischer Zellen

Die jeweiligen Zellen wurden bis zu einer 20-80%igen Konfluenz auf beschichteten Deckgläschen in entsprechendem Kulturmedium kultiviert. Die Zellen wurden einmal mit 1x PBS gewaschen und mit 3% Paraformaldehyd in PBS für 15 min fixiert. Nach Permeabilisierung der Zellmembran für 3 min in 0,5% Triton X-100 in PBS wurden die Zellen mit 1x PBS gewaschen und 30 min bei RT mit Blocklösung II zur Blockierung unspezifischer Bindungsstellen inkubiert. Anschließend erfolgte die Inkubation mit dem Primärantikörper in entsprechender Konzentration in Blocklösung III 2h bei RT oder über

Nacht bei 4°C in einer feuchten Kammer. Danach wurden die Zellen 3x mit Blocklösung III gewaschen und mit dem Sekundärantikörper in entsprechender Verdünnung in Blocklösung III 1-2 h bei RT inkubiert. Für Kernfärbungen wurden die Zellen 15 min bei RT mit DAPI-Lösung inkubiert (300 ng/ml in PBS). Nach intensivem Waschen mit 1x PBS (3x) und 2x mit demineralisiertem Wasser wurde Fluorescent Mounting Medium auf Objektträger gegeben und anschließend die Deckgläser mit den Zellen aufgelegt. Die fluoreszierenden Zellen wurden mit dem AxioObserver-Mikroskop oder einem konfokalen Laser Scanning Mikroskop analysiert.

2.19.1.1 Konfokale Laserscanning Mikroskopie

Der Vorteil der konfokalen Laserscanning-Mikroskopie besteht darin, dass das reflektierte und emittierte Licht einer Ebene des Präparates erfasst wird. Ein Laser rastert das Präparat pixel- und zeilenweise ab. Zur Fokusebene ist eine Lochblende (Pinhole) parallel angeordnet, so dass nur das Licht aus der Fokusebene von einem Detektor erfasst wird. Hinter der Lochblende befindet sich ein Filter, durch den das Anregungslicht vom emittierten Fluoreszenzlicht getrennt wird und von einem Lichtdetektor fortlaufend gemessen wird. Diese Daten werden durch einen Computer zu einem elektronischen Bild zusammengesetzt. Mehrere Bilder, die bei schrittweise verschobenen Positionen der Fokusebene erzeugt werden, lassen sich zu einem 3D-Bildstapel kombinieren und digital verarbeiten.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde das LSM 5 PASCAL der Firma Zeiss verwendet (Abb. 5). Dieses Mikroskop besitzt einen Argon- ($\lambda = 488 \text{ nm}$) und einen Helium/Neon-Laser ($\lambda = 543$ und 633 nm), so dass mit Hilfe verschiedener Photomultiplier unterschiedliche Wellenlängen detektiert werden können. Da dieses Mikroskop jedoch nicht über einen UV-Laser ($\lambda = 375 \text{ nm}$) verfügte, war es nicht möglich, das durch das Kernfärbemittel DAPI emittierte Fluoreszenzlicht zu detektieren.

Abb. 5: Schematische Darstellung eines konfokalen Laserscanning Mikroskopes (nach www.Zeiss.de).

2.19.1.2 Analyse von fluoreszierenden Zellen mittels AxioObserver

Bei dem AxioObserver handelt es sich um ein inverses Mikroskop, bei dem sich die Objektive unterhalb der zu analysieren Probe befinden (Abb. 6). So können auch lebende Zellen in Petrischalen beobachtet werden.

Abb. 6: Schematische Darstellung des Axio Observer Mikroskops (nach www.Zeiss.de).

Mit Hilfe dieses Mikroskops ist es weiterhin möglich, Zellen im Phasenkontrast darzustellen. Außerdem können mittels einer HBO-Lampe und drei verschiedenen Filtern verschiedene Fluoreszenzen dargestellt werden: DAPI, FITC bzw. AcGFP und TRITC.

Die AxioCam nimmt die Bilder auf und überträgt die Daten auf einen Computer, wo diese mit Hilfe des Programms AxioVision bearbeitet werden können.

2.20 Isolierung von intrazellulären Einschlusskörpern aus *E. coli*

Die Akkumulation hoher Mengen inaktiven Proteins in der Wirtszelle führt zur Bildung von intrazellulären Einschlusskörpern, den so genannten *inclusion bodies*. Einschlusskörper sind dichte, granuläre Strukturen, die meist bei der heterologen Expression von Fremdprotein in einer Zelle entstehen. Die in den Einschlusskörpern befindlichen Proteine liegen in der Regel missgefaltet vor und müssen nach Isolierung durch geeignete Verfahren in ihre native Form rückgefaltet werden.

2.20.1 Induktion der Proteinexpression

Zur Induktion der Proteinexpression wurden 50 ml SOB/Amp mit 1 ml Bakterienkultur angeimpft und über Nacht bei 37°C inkubiert (Vorkultur). In 1 l vorgewärmtes LB-Medium wurden 40 ml der Vorkultur gegeben und bei 37°C und 200 rpm bis zu einer OD₆₀₀ von 0,7 inkubiert. Zur späteren Expressionskontrolle mittels SDS-PAGE wurde 1 ml der uninduzierten Bakterienlösung entnommen, bei 16000xg zentrifugiert, der Überstand verworfen und das Bakterienpellet bei -20°C eingefroren.

Zur Induktion der Überexpression des GST-Fusionsproteines wurde 1 mM IPTG zu der Bakterienlösung gegeben und der Ansatz für weitere 3-4 h in einem Schüttelinkubator bei 37°C und 200 rpm inkubiert. Anschließend wurden die Bakterien in 50 ml Falcon-Röhrchen bei 4700 rpm und 4°C pelletiert, nachdem wiederum 1 ml zur Expressionskontrolle nach Induktion entnommen wurde. Die Bakterienpellets konnten über Nacht bei -80°C gelagert werden.

2.20.2 Isolierung der bakteriellen Einschlusskörper

Zur Isolierung der *inclusion bodies* wurden die Bakterienpellets zunächst in 13 ml Suspensionspuffer resuspendiert und mit einem Dounce-Homogenisator mit Stempel S homogenisiert. Nach Zugabe von Lysozym, DNase und MgCl_2 wurde das Homogenat durchmischt, 12,5 ml Lyse-Puffer hinzu gegeben und der Ansatz für 30-60 min bei RT inkubiert. Danach wurden 350 μl 0,5 M NaEDTA (pH 8,0) hinzugefügt, der Ansatz in flüssigem N_2 für 5 min eingefroren und für 30 min bei 37°C inkubiert. Anschließend wurden 25 μl 1 M MgCl_2 hinzu gegeben und für 30-60 min inkubiert, bis die Viskosität deutlich nachließ. Nach Zugabe von 350 μl NaEDTA wurde das Homogenat bei 4°C und 11000xg 20 min pelletiert. Der Überstand wurde verworfen und die erhaltenen *inclusion bodies* durch Waschen von zurückgebliebenen Bakterienproteinen befreit. Hierzu wurde das Pellet mit Hilfe eines Dounce-Homogenisators mit Stempel S in Waschpuffer mit Triton-X-100 auf Eis resuspendiert und bei 4°C und 11000xg 20 min zentrifugiert. Der Überstand wurde verworfen, die *inclusion bodies* in Waschpuffer ohne Triton X-100 mit dem Dounce-Homogenisator auf Eis resuspendiert und wiederum für 20 min bei 4°C und 11000xg zentrifugiert. Der Überstand wurde verworfen.

2.20.3 Solubilisieren des rekombinanten Proteins

Proteine in *inclusion bodies* werden durch nicht-kovalente Kräfte zusammengehalten, so dass das Protein zur Solubilisierung denaturiert werden muss. Dieses wird durch hohe Konzentrationen an Harnstoff im Solubilisierungs-Puffer erreicht.

Die *inclusion bodies* wurden in 9 ml Solubilisierungs-Puffer mit einem Dounce-Homogenisator mit einem Stempel S homogenisiert und 30-60 min bei RT geschwenkt. Nach 30 sec Zentrifugation bei 16000xg wurde der Überstand durch einen Sterilfilter ($\varnothing$ 0,2 μm) filtriert und eine Probe des Pellets aufbewahrt. Das solubilisierete Protein wurde bei 4°C gelagert und konnte unter anderem für Immunisierungen der Mäuse zur Herstellung von anti-TRIM22-Antikörpern verwendet werden (2.25).

Zur Expressionskontrolle wurden die entnommenen Proben vor und nach Induktion mit IPTG, eine Probe aus dem erhaltenen Pellet und die solubilisierten Proteine mit Laemmli-Puffer 1:1 verdünnt und mittels SDS-PAGE aufgetrennt. Anschließend wurde eine

Coomassie-Färbung durchgeführt und die Konzentration anhand einer BSA-Eichreihe ermittelt.

2.21 Apoptose

Apoptose ist die häufigste Form von Zelltod im Organismus. In der Wissenschaft wird zwischen zwei Arten des Zelltodes unterschieden: Apoptose und Nekrose. Nekrose tritt auf, wenn eine Schädigung von Gewebe oder der Zelle von außen vorliegt. Die Apoptose wird von der betreffenden Zelle selbst ausgeführt.

2.21.1 Analysen zur Apoptose mittels Annexin V-Färbung

Bei lebenden Zellen ist die Plasmamembran asymmetrisch aufgebaut. Ein frühes Zeichen der Apoptose ist der Verlust dieser Asymmetrie. Während Phosphatidylserin (PS) unter normalen Bedingungen auf der zytoplasmatischen Innenseite der Membran lokalisiert ist, tritt es während der Apoptose vermehrt in der nach außen gerichteten Membranseite auf. Annexin V ist ein Ca^{2+} -abhängiges, Phospholipid-bindendes Protein mit einer hohen Affinität für Phosphatidylserin. Dieses Protein kann somit als empfindliche Sonde für die Phosphatidylserin-Exposition auf der Membranaußenseite aller exprimierenden apoptotischen Zellen eingesetzt werden. Durch Annexin V, an das ein Fluoreszenzfarbstoff gekoppelt ist, können apoptotische Zellen durchflusszytometrisch bzw. fluoreszenzmikroskopisch nachgewiesen werden.

2.21.1.1 Qualitative Analysen zur Apoptose mittels Fluoreszenzmikroskopie

Zur Untersuchung der Apoptose mittels Fluoreszenzmikroskopie wurden COS-7-Zellen transient mit verschiedenen Konstrukten transfiziert und nach 24-48 h trypsinisiert. Anschließend wurden die Zellen 2x mit 1x PBS gewaschen und danach $0,5 \cdot 10^6$ Zellen in 500 μl PBS aufgenommen. Auf einen mit Poly-L-Lysin beschichteten Objektträger wurden 50 μl der Zellsuspension gegeben und bei RT 10 min inkubiert. Die Flüssigkeit wurde mit Zellstoffpapier vorsichtig abgesaugt, ohne die Zellen zu beschädigen. Die Zellen wurden 3x mit je 50 μl Bindungspuffer gewaschen, wobei die Flüssigkeit wiederum mit Zellstoffpapier

entfernt wurde. Danach wurden 50 µl Färbelösung (Annexin V-Cy3.18 1:100 in 1x Bindungspuffer) auf die Zellen gegeben und im Dunkeln bei RT 10 min inubiert. Nach weiteren 5 Waschschritten wurden 35 µl Bindungspuffer auf die Zellen gegeben, diese mit einem Deckgläschen eingedeckelt und die Zellen mit Hilfe eines Fluoreszenzmikroskops analysiert. Bei einer 100 fachen Vergrößerung wurden in fünf zufällig ausgewählten Bildausschnitten die Anzahl der GFP-positiven sowie die Anzahl der GFP- und Annexin V-positiven Zellen bestimmt.

2.21.1.2 Quantitative Analysen zur Apoptose mittels Durchflusszytometrie

Zur Untersuchung der Apoptose mittels Durchflusszytometrie wurde das Annexin V:PE-Apoptosis Detection Kit von BD verwendet. Dieses Kit beinhaltet neben PE gekoppeltem Annexin V den Avitalfarbstoff 7-Aminoactinomycin (7-AAD). 7-AAD interkaliert in der DNA spezifisch zwischen Zytosin und Guanin und verändert dabei seine Fluoreszenzeigenschaften (Emissionsmaximum: 647 nm). Wie Propidium-Iodid färbt es dabei nur tote Zellen. In der Kombination mit Annexin V ist es daher mit Hilfe der Durchflusszytometrie möglich, zwischen intakten Zellen (Annexin V negativ, 7-AAD negativ), frühapoptotischen Zellen (Annexin V positiv, 7-AAD negativ) und spätapoptotischen oder nekrotischen Zellen (Annexin V positiv, 7-AAD positiv) zu unterscheiden.

Hierfür wurden zunächst 2×10^5 -HeLa-Zellen in 6-Well-Schalen ausgesät und am nächsten Tag transient mit 2 µg der zu untersuchenden Konstrukte transfiziert. Nach 24-72 h wurden die Zellen mit Hilfe von 500 µl Trypsin vom Schalenboden abgelöst, 2x mit kaltem 1x PBS gewaschen (5 min, 300xg) und anschließend nach Protokoll des Herstellers in 100 µl Bindungspuffer aufgenommen und in FACS-Röhrchen überführt. Es wurden pro Transfektion vier Ansätze benötigt:

1. unmarkierte Zellen
2. Zellen inkubiert mit 7-AAD (5 µl pro Ansatz)
3. Zellen inkubiert mit Annexin V-PE (5 µl pro Ansatz)
4. Zellen inkubiert mit Annexin V-PE und 7-AAD (jeweils 5 µl pro Ansatz)

Die Inkubationszeit mit den Farbstoffen betrug 15 min, anschließend wurden 400 µl Bindungspuffer zu den Ansätzen gegeben und die Zellen innerhalb von 1 h durchflusszytometrisch analysiert. Die Auswertung erfolgte mit dem Programm FlowJo 8.7.1.

2.22 Zellproliferationsassay

In der Zellbiologie sind Proliferationstests eine häufig verwendete Methode zum Studium von Wachstumsfaktoren, Zytokinen und anderen in das Wachstumsverhalten der Zellen eingreifenden Substanzen. Unter den verschiedenen Möglichkeiten, die Zellzahlen zu bestimmen, wurde ein Proliferationsassay (3Z4U-Kit, Biomedica) gewählt, der auf der Entdeckung beruht, dass schwach gefärbte Tetrazoliumsalze von lebenden Zellen in intensiv gefärbte Formazanderivate umgewandelt werden können. Diese Reduktion erfordert intakte Mitochondrien, die nach Absterben der Zelle innerhalb weniger Minuten inaktiv werden. Daraus ergibt sich eine Unterscheidungsmöglichkeit zwischen lebenden und abgestorbenen Zellen. Der Proliferationsassay wurde nach dem Protokoll des Herstellers durchgeführt. Die Zellzahl zu Beginn des Tests betrug 3×10^3 Zellen pro Well auf einer 96-Well-Platte. Die Messung des Farbumschlags des Chromophors erfolgte in einem Mikrotiterplatten-Lesegerät (EL 800 Universal Microplate Reader, BIO-TEK Instr. Inc.). Die Absorption wurde bei 450 nm gegen 620 nm (Referenzwellenlänge zum Abzug des Hintergrundes) im Abstand von 3, 24, 48, 72 und 96 h gemessen.

2.23 Koimmunpräzipitation

Mit Hilfe der Immunpräzipitation lassen sich Proteine gezielt aus einem Zelllysat isolieren. Hierzu benutzt man spezifische Antikörper, die an eine Matrix gebunden sind. Die Proteine binden somit über den Antikörper an die Matrix und können durch Zentrifugation von den übrigen Proteinen getrennt werden. Als Matrix wird normalerweise an Agarose oder Sepharose gebundenes Protein A, G oder L benutzt.

Durch nachfolgende SDS-PAGE und Immunoblot-Analysen lassen sich unter anderem Protein-Proteininteraktionen nachweisen (Koimmunpräzipitation). Hierfür werden zwei verschiedene Antikörper verwendet, die für die beiden Proteine, für die eine Interaktion nachgewiesen werden soll, spezifisch sind. Der eine Antikörper wird für die Immunpräzipitation verwendet und an die Matrix gebunden, der jeweils andere für die

Immunoblot-Analyse eingesetzt. Interagieren die beiden Proteine, so werden beide zusammen als Komplex an die Matrix gebunden und können aufgereinigt werden. Nach Auftrennung über SDS-PAGE kann mit dem zweiten Antikörper das jeweils andere Protein nachgewiesen werden.

In den hier durchgeführten Analysen wurden die Zielproteine parallel in HEK293T-Zellen exprimiert. Dazu wurden HEK293T-Zellen in Petrischalen ($\varnothing$ 100 mm) so in DMEM-Medium ausgesät, dass die Zellen am nächsten Morgen eine Konfluenz von 60-80% zeigten. Diese Zellen wurden mit den jeweiligen Plasmiden (je 7 μ g DNA pro Petrischale) transfiziert, für die Interaktionen gezeigt werden sollten. Nach 48 h Inkubation in einem Brutschrank wurden die HEK293T-Zellen vom Boden der Kulturschale abgelöst und 10 min bei 400xg pelletiert. Anschließend wurden die Zellen 2x mit 10 ml kaltem 1x PBS gewaschen (4°C, 400xg, 10 min). Pro 1×10^7 Zellen wurde 1 ml kalter NP-40-Lyse-Puffer (inkl. Proteaseinhibitoren) zu dem Zellpellet gegeben und dieses vorsichtig resuspendiert. Das Lysat wurde in ein 2-ml-Reaktionsgefäß überführt und für 30 min unter gelegentlichem Schwenken auf Eis inkubiert. Danach wurde bei 4°C 15 min bei 10000xg zentrifugiert und der Überstand in ein neues 2-ml-Reaktionsgefäß überführt.

Um auszuschließen, dass die zu untersuchenden Proteine unspezifisch an die verwendete Protein-G-Sepharose binden, wurde eine Vorreinigung (*Preclearing*) des Zelllysats durchgeführt. Hierfür wurde zunächst die Protein-G-Sepharose vorbereitet, indem zu 50 μ l Protein-G-Sepharose 450 μ l kalter NP-40-Lyse-Puffer gegeben wurde. Die Suspension wurde zentrifugiert (4°C, 10000xg, 30 sec), der Überstand verworfen und die Protein-G-Sepharose nochmals in 500 μ l kaltem NP-40-Lyse-Puffer aufgenommen. Nach einem weiteren Zentrifugationsschritt (4°C, 10000xg, 30 sec) wurde die Protein-G-Sepharose in 50 μ l kaltem NP-40-Lyse-Puffer resuspendiert. Zum *Preclearing* wurden nun 500 μ l des Zelllysates zu der Protein-G-Sepharose gegeben und 30-60 min auf Eis inkubiert. Anschließend wurde 10 min bei 4°C und 10000xg zentrifugiert. Der Überstand wurde als gereinigtes Zelllysate für die Koimmunpräzipitation verwendet, die Protein-G-Sepharose wurde mit 50 μ l Proben-Puffer versetzt, 10 min bei 95°C inkubiert und anschließend mittels SDS-PAGE und Immunoblot-Analysen auf unspezifisch gebundene Proteine hin analysiert.

Für die Koimmunpräzipitation wurden 5-10 μ g des ersten Antikörpers zu dem gereinigten Proteinlysate gegeben und auf einem Rotator üN bei 4°C inkubiert. Anschließend wurden 50 μ l vorbereitete Protein-G-Sepharose (siehe oben) hinzu gegeben und für 1 h auf einem Rotator bei 4°C inkubiert. Danach wurde bei 4°C und 10000xg für 30 sec zentrifugiert. Der Überstand wurde mittels SDS-PAGE und Immunoblot-Analyse auf ungebundene Proteine hin

analysiert. Die Protein-G-Sepharose wurde 5x mit je 500 µl kaltem NP40-Lyse-Puffer gewaschen (4°C, 10000xg, 1 min). Nach dem 5. Waschschrift wurde wiederum der Überstand als Kontrolle mittels SDS-PAGE und Immunoblot-Analyse auf noch vorhandene ungebundene Proteine hin untersucht. Zu der Protein-G-Sepharose wurden 50 µl Proben-Puffer gegeben, kurz gevortext und 10 min bei 95°C inkubiert. Anschließend wurde 5 min bei RT und 10000xg zentrifugiert und der Überstand in ein neues 1,5-ml-Reaktionsgefäß überführt. Das erhaltene Eluat wurde über SDS-PAGE aufgetrennt. In der anschließenden Immunoblot-Analyse konnte mit Hilfe des zweiten Antikörpers Interaktionen nachgewiesen werden.

2.24 Durchflusszytometrie

Mit Hilfe der Durchflusszytometrie (FACS, *Fluorescence Activated Cell Sorting*) ist es möglich, Partikel (Zellen, Kunststoffkügelchen, usw.) in einem Flüssigkeitsstrom zu zählen und deren physikalischen und molekularen Eigenschaften zu analysieren. Hauptsächlich wird diese Methode verwendet, um mit Hilfe von Fluoreszenzfarbstoff-markierten Proben (Antikörper, Rezeptoren, Streptavidin, usw.) bestimmte Eigenschaften von Zellen oder Zellpopulationen auf Einzelzellebene zu analysieren. Die fluoreszenzaktivierte Zellanalyse wird demnach zur quantitativen Bestimmung von Oberflächenmolekülen und intrazellulären Proteinen verwendet.

Zur Analyse werden die Zellen einer Einzelzellsuspension durch hydrodynamische Fokussierung an einem gebündelten Laserstrahl geeigneter Wellenlänge vorbeigeleitet. Anhand der Lichtbeugung und -streuung der Laserstrahlen können Informationen über die Zellgröße (*forward scatter*, FSC) und Binnenstruktur (*sideward scatter*, SSC) wie Granularität des Zytoplasmas oder Größe des Zellkerns erhalten werden.

Werden die Elektronen eines Fluoreszenzfarbstoffes durch einen monochromatischen Laserstrahl angeregt und somit auf ein höheres Energieniveau angehoben, fallen diese nach dem Laserimpuls unter Abgabe von Energie auf ihr Ursprungsniveau zurück. Die so emittierten Photonen werden dann durch einen Photodetektor registriert. Die Menge an gebundenem Antikörper/Zelle verhält sich dabei proportional zu der emittierten Photonenkonzentration.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Methode der Durchflusszytometrie verwendet, um Apoptose in bestimmten Zellpopulationen nachzuweisen. Hierfür wurden Zellen mit GFP-gekoppelten Konstrukten transfiziert und tote Zellen mit PE-gekoppeltem Annexin V und

dem Peptid 7-AAD markiert (2.21.1.2). Mit Hilfe des Durchflusszytometers war es möglich, die Anzahl der GFP-positiven Zellen und der apoptotischen Zellen zu bestimmen. Weiterhin konnte die Anzahl der mehrfach positiven Zellen bestimmt werden, um herauszufinden wie viel Prozent der GFP-positiven Zellen ebenfalls Annexin V positiv und somit apoptotisch waren.

2.25 Herstellung von Antikörpern

2.25.1 Immunisierung von Mäusen

Zur Herstellung von Antikörpern wurden Mäuse verschiedener Stämme (C3H, BALB/c und C57BL/6) mit 100 µg Antigen in 8 M Urea peritoneal immunisiert. Anschließend wurden die Mäuse zwei bis drei Mal im Abstand von 10-14 Tagen mit jeweils 100 µg Antigen immunisiert. Nach der dritten Immunisierung wurde aus dem Blut der Mäuse Serum gewonnen und dieses mittels ELISA auf vorhandene Antikörper hin analysiert (2.26). Das so gewonnene Serum wurde aliquotiert, bei -20°C eingefroren und kann als polyklonaler Antikörper zum Nachweis von TRIM22 in Immunoblot- und immunzytochemischen Analysen verwendet werden.

2.25.1.1 Herstellung monoklonaler Antikörper

Zur Herstellung monoklonaler Antikörper (MAK) werden die Antikörper bildenden Lymphozyten der Maus verwendet. Da diese Zellen nur wenige Wochen in der Zellkultur kultivierbar sind und so nicht für die Gewinnung ausreichender Mengen monoklonaler Antikörper geeignet sind, wurde die Hybridomtechnik (Kohler und Milstein, 1975) verwendet. Hierbei werden die Antikörper produzierenden Lymphozyten (B-Zellen) der Maus mit murinen Myelomzellen mit Hilfe von Polyethylenglycol (PEG) fusioniert, so dass Hybridzellen (Hybridome) entstehen, die die wesentlichen Eigenschaften der Elternzellen vereinen: permanentes, krebsartiges Wachstum und Antikörpersekretion.

Die für die MAK-Herstellung verwendeten B-Zellen wurden aus der Milz immunisierter Mäuse gewonnen. Drei Tage vor der Milzentnahme wurden die Mäuse ein weiteres Mal mit 100 µg Antigen immunisiert, um die antigenspezifischen B-Zellen erneut zu aktivieren. Die murinen Myelomzellen (X63Ag8.653) wurden so kultiviert, dass sie sich am Tag der Fusion

in der logarithmischen Wachstumsphase befanden, so dass gewährleistet war, dass sich beide Zelltypen in gleicher Phase des Zellzyklus befanden (Mitose).

Nach cervicaler Dislokation wurde der immunisierten Maus die Milz entnommen und diese mit Hilfe eines Dounce-Homogenisators mit Stempel S in DMEM-Medium homogenisiert. Die Zellzahl wurde bestimmt und Milzzellen mit Myelomzellen vermischt. Das Verhältnis zwischen Milz- und Myelomzellen sollte zwischen 10:1 bis 10:10 liegen. Nach 10 min Zentrifugation (300xg) wurde der Überstand sorgfältig dekantiert und das Zellpellet im Rückfluss vorsichtig resuspendiert. Über einen Zeitraum von 1 min wurde unter Schwenken 1 ml vorgewärmtes (37°C) 50% PEG auf die Zellen getropft und für 1 min bei RT inkubiert. Anschließend wurde über 1 min 1 ml DMEM unter Schwenken hinzugefügt, danach 20 ml DMEM innerhalb von 5 min auf die Zellen getropft. Anschließend wurde für 5 min bei 300xg zentrifugiert, der Überstand dekantiert und das Zellpellet in 100 ml vorgewärmtem DMEM-Medium mit Zusatz von 20% FKS, 1% Pen-Strep und 2% HAT resuspendiert.

Die Zugabe von HAT (Hypoxanthin, Aminopterin, Thymidin) in das Medium hat zur Folge, dass nicht fusionierte Myelomzellen nicht überleben können, da es sich bei den verwendeten Zellen um Enzymdefektmutanten handelt. Zellen verfügen normalerweise über zwei Stoffwechselwege zur Herstellung der fünf für die DNA bzw. RNA-Synthese notwendigen Nukleosid-Triphosphate. Der Hauptweg ist auf die aktive Mitwirkung von THF (Tetrahydrofolsäure) angewiesen, das durch Aminopterin blockiert wird. Werden die fertigen Molekylvorstufen Thymidin und Hypoxanthin zur Verfügung gestellt, sind die Zellen normalerweise dazu in der Lage über einen Nebenweg mit Hilfe der Enzyme TK (Thymidin-Kinase) und HGPRT (Hypoxanthin-Guanin-Phosphoribosyl-Transferase) die benötigten Nukleotide zu synthetisieren. Die verwendeten Myelomzellen weisen einen Defekt für das Enzym HGPRT auf, so dass sie nach Zugabe von Aminopterin nicht mehr in der Lage sind, die benötigten Nukleosid-Triphosphate zu synthetisieren und in Folge dessen absterben.

Mit Hilfe einer Glaspipette wurde die Zellsuspension tropfenweise in 96-Well-Platten überführt und bei 37°C und 10% CO₂ inkubiert. Alle 2 Tage wurden 100 µl des Mediums entfernt und durch frisches DMEM/FKS/Pen-Strep/HAT-Medium ersetzt. Nach 14 Tagen wurde das Medium einmal gegen DMEM/FKS/Pen-Strep/HT-Medium ausgetauscht und danach den Zellen DMEM/FKS/Pen-Strep-Medium zugesetzt.

2.25.2 ELISA

Um Antikörper in den Seren der immunisierten Mäuse und Antikörperproduktion der Hybridome nachzuweisen, wurde der enzymgekoppelte Immunadsorptionstest (ELISA, *Enzyme Linked Immunosorbent Assay*) verwendet.

Zunächst wurden 96-Well Platten mit dem für die Immunisierung der Mäuse verwendeten Protein beschichtet. Hierzu wurde 0,5 µg Protein mit jeweils 50 µl Coating-Puffer in die Wells pipettiert und über Nacht bei 4°C inkubiert. Danach wurde die Platte 1x mit 1x PBS gewaschen und unspezifische Bindungstellen durch 1,5 h Inkubation bei 37°C mit 150 µl 1% Gelatine in PBS abgesättigt. Nach 1x Waschen mit 0,05% Tween in 1x PBS wurden die Seren hinzugegeben. Um Antikörper in den Seren der immunisierten Mäuse nachzuweisen, wurden die Seren 1:10-1:1280 mit 1x PBS verdünnt und jeweils 50 µl in die Wells gegeben. Als Vergleich wurden die Nullseren mitgemessen. Zum Nachweis der Antikörperproduktion der Hybridome wurden 50 µl Überstand in die Wells pipettiert. Anschließend wurde für 2 h bei 37°C inkubiert, 3x mit 0,05% Tween in 1x PBS gewaschen und danach 50 µl eines 1:4000 verdünnten HRP gekoppelten Ziege-anti-Maus IgG-Antikörpers hinzugefügt. Nach 1 h Inkubation bei 37°C wurde 5x mit PBS gewaschen, 50 µl Substratlösung in die Wells pipettiert und die Farbänderung mit Hilfe eines ELISA-Readers (Dynatech) bei einer Wellenlänge von 405 nm gemessen.

2.25.3 Selektion auf antikörperproduzierende Zellen

Für die Herstellung monoklonaler Antikörper war es nötig, die mit Hilfe des ELISA positiv getesteten Hybridomzellen soweit zu vereinzeln, dass eine Zellpopulation aus nur einer Zelle erhalten wurde. Dazu wurden 50 µl der Zellsuspension aus einem Well einer 96-Well Platte entnommen und mit 1 ml DMEM-Medium verdünnt. In eine 96-Well-Platte wurden in jedes Well 100 µl DMEM-Medium vorgelegt. Jeweils 50 µl der Zellsuspension wurden in die Well 1A bis 1H gegeben. Anschließend wurde eine geometrische Verdünnungsreihe durchgeführt. Das Wachstum der Zellen wurde über mehrere Tage beobachtet. Konnte in nur 1-3 Wells einer Reihe Zellwachstum beobachtet werden, konnte davon ausgegangen werden, dass es sich hier um klonalen Wachstum einer Ausgangszelle handelte. Mit Hilfe einer weiteren ELISA-Analyse wurde erneut überprüft, ob Antikörperproduktion vorlag. Bei positivem

Ergebnis wurden diese Zellen so lange kultiviert, dass eine ausreichende Anzahl kryokonserviert werden konnte.

Der Überstand dieser Kulturen enthält die benötigten Antikörper, die für Immunoblot-Analysen und immunzytochemische Experimente verwendet werden kann.

3 Ergebnisse

3.1 Evolution von *TRIM*-Genen bei Primaten

Menschen und andere Primaten besitzen eine Reihe von intrazellulären Proteinen, die in der Lage sind, Infektionen mit Retroviren zu verhindern. Ein solches Protein ist TRIM5 α , das mit dem viralen Capsid (CA) von Retroviren interagiert und durch bisher noch ungeklärte Mechanismen den Zerfall des Capsids und somit die Freisetzung der verschiedenen retroviralen Enzyme und der viralen RNA verhindert (Liu et al., 2005; Sawyer et al., 2005; Stremlau et al., 2004). Das humane TRIM5 α vermittelt Resistenz gegenüber verschiedenen Retroviren wie beispielsweise N-MLV (N-tropischer Mäuseleukämie-Virus) (Perron et al., 2004). Es ist jedoch nicht in der Lage Infektionen mit HIV (Humanes Immundefizienz-Virus) zu verhindern, während das TRIM5 α -Protein des Rhesusaffen und verschiedener anderer Primaten eine effiziente Resistenz gegen das HI-Virus vermittelt. Der Grund für diese Spezies-spezifischen Inhibitionen verschiedener retroviraler Infektionen liegt in der rapiden Evolution von TRIM5 α (Sawyer et al., 2005).

TRIM5 α gehört zur Familie der *TRIM*-Gene, die sich durch das so genannte *Tripartite Motif* auszeichnen (RING-, B-box- und *Coiled-Coil*-Domäne). Zusätzlich zu den namensgebenden Domänen besitzt TRIM5 α eine C-terminale B30.2-Domäne (Abb. 6). Da gezeigt wurde, dass diese Domäne essentiell für die Restriktion von Retroviren ist, war es im Rahmen dieser Arbeit von Interesse, weitere TRIM-Proteine mit identischer Domänenstruktur wie TRIM5 α zunächst hinsichtlich ihrer Evolution innerhalb der Primaten zu untersuchen.

Tripartite Motif

Abb. 7: Schematische Darstellung eines TRIM-Moleküls. Mitglieder der TRIM-Protein-Familie besitzen das charakteristische *Tripartite Motif*, bestehend aus einer RING-, einer B-box- und einer *Coiled-Coil*-Domäne (cc). Weiterhin besitzen einige TRIM-Proteine eine zusätzliche C-terminale Domäne, z.B. die hier dargestellte B30.2-Domäne.

TRIM-Gene liegen über das gesamte Genom verstreut, allerdings existieren zwei *TRIM*-Gen-Cluster, zum einen auf Chromosom 11 (11p15, *TRIM5α*, *TRIM6*, *TRIM21*, *TRIM22*, *TRIM34*), zum anderen auf Chromosom 6 innerhalb des MHC (6p21.33, *TRIM10*, *TRIM15*, *TRIM26*, *TRIM27*, *TRIM39*). Im Rahmen dieser Arbeit wurden insbesondere die *TRIM*-Gene dieser zwei Cluster analysiert.

3.1.1 Phylogenetische Analysen von Mitgliedern der TRIM-Protein-Familie

Da viele nah miteinander verwandte Proteine häufig ähnliche Funktionen aufweisen, wurde das Verwandtschaftsverhältnis innerhalb der oben genannten humanen *TRIM*-Proteine analysiert. Dazu wurde mit Hilfe des Programms MEGA ein phylogenetischer Stammbaum anhand der Aminosäuresequenzen (NCBI, ensembl) der *TRIM*-Proteine des MHC- und des 11p15-Clusters sowie *TRIM4*, *TRIM11* und *TRIM17* erstellt (Abb. 8). Es konnte gezeigt werden, dass diejenigen *TRIM*-Proteine, die auf einem Chromosom innerhalb eines Clusters lokalisiert sind, auch phylogenetisch eng miteinander verwandt sind. Die Lage auf den Chromosomen und die phylogenetisch enge Verwandtschaft der *TRIM*-Proteine weisen auf eine Genduplikation auf Chromosom 6 und Chromosom 11 hin.

Abb. 8: Phylogenetische Analyse von TRIM-Proteinen mit RBCC-B30.2-Domänenstruktur. Mit Hilfe des Programms MEGA wurde anhand der Aminosäuresequenzen von TRIM10, TRIM15, TRIM26, TRIM27 und TRIM39 (MHC-Cluster), TRIM5, TRIM6, TRIM21, TRIM22 und TRIM34 (11p15-Cluster) sowie von TRIM4 (Chr. 7) und TRIM11 und TRIM17 (Chr.1) ein phylogenetischer Stammbaum erstellt.

3.1.2 Vergleich der Aminosäuresequenz von TRIM-Proteinen zwischen Mensch und Rhesusaffe

Ein Vergleich der Aminosäuresequenzen von Mensch und Rhesusaffe zeigte, dass etwa 90% aller Transkripte zwischen 95-100% Aminosäureidentität aufweisen. Nur etwa 5% aller Transkripte besitzen weniger als 88% Aminosäureidentität (Abb. 9) (Magness et al., 2005). Viele Proteine, die in die Immunantwort involviert sind, zeichnen sich durch eine schnelle Evolution aus. Da verschiedenste Pathogene, insbesondere viele Viren, schnell evolvieren, verändern sich im Laufe der Evolution auch die Abwehrmechanismen der Wirte. Dieser ständige Wettlauf zwischen Wirt und Erreger wird als Koevolution bezeichnet. Proteine, die sich im Laufe der Evolution stark verändert haben, sind mit hoher Wahrscheinlichkeit in die Immunantwort involviert. Ein Beispiel dafür ist TRIM5 α : Ein Aminosäuresequenzvergleich von humanem und Rhesusaffen-TRIM5 α zeigt, dass die Transkripte eine Aminosäureidentität von 89% aufweisen.

Abb. 9: Verteilung der Aminosäuresequenz-Ähnlichkeit zwischen Mensch und Rhesusaffe (modifiziert nach Magness et al. (2005)).

Um die Aminosäuresequenzen zwischen Mensch und Rhesusaffe der TRIM-Proteine mit RBCC-B30.2-Domänenstruktur vergleichen zu können, wurde der gesamte offene Leserahmen der *TRIM*-Gene von Mensch und Rhesusaffe mit Hilfe von RT-PCR aus cDNA-Proben amplifiziert und sequenziert. Die verwendete cDNA wurde aus RNA, die aus

Blutproben vom Rhesusaffen und freiwilligen menschlichen Spendern isoliert wurde, generiert. Die so erhaltenen Sequenzen wurden zunächst mit den in den Datenbanken (NCBI, ensembl) vorhandenen Sequenzen abgeglichen und anschließend mit Hilfe der Software-Programme BLAST und CLUSTALX verglichen. In Abbildung 10 sind die Sequenzidentitäten auf Nukleotid- und auf Proteinbasis in Prozent dargestellt.

Es ist deutlich zu erkennen, dass die untersuchten Cluster zwischen Mensch und Rhesusaffe unterschiedlich konserviert sind. Die Sequenzidentität von Mensch und Rhesusaffe innerhalb des MHC-Clusters liegt bei allen untersuchten TRIM-Sequenzen sowohl auf Nukleotid- als auch auf Aminosäurebasis über 95%. Innerhalb des 11p15-Clusters liegen die Sequenzidentitäten bis auf TRIM6 (97%) auf Proteinebene unter oder gleich 95%. Insbesondere TRIM22 weist neben TRIM5 α (89%) mit 91% Aminosäureidentität einen Wert deutlich unter 95% auf.

Abb. 10: Vergleich der Nukleotid- und Aminosäuresequenz zwischen Mensch und Rhesusaffe.

Die Nukleotid- und Aminosäuresequenzen von TRIM10, TRIM15, TRIM26, TRIM27, TRIM39 (MHC-Cluster) und TRIM5, TRIM6, TRIM21, TRIM22, TRIM34 (11p15-Cluster) von Mensch und Rhesusaffe wurden jeweils mit Hilfe der Programme BLAST und CLUSTALX verglichen und die Sequenzidentität prozentual dargestellt.

In Tabelle 1 ist die Anzahl der synonymen (s) und nichtsynonymen (ns) sowie die Gesamtanzahl der Substitutionen aufgeführt. Synonyme Substitutionen sind Basenaustausche, die nicht in einer Änderung der Aminosäure resultieren, während nichtsynonyme Basensubstitutionen zu einer Aminosäureänderung führen.

Tabelle 1: Anzahl der synonymen und nichtsynonymen Basensubstitutionen verschiedener *TRIM*-Gene. (ORF= *open reading frame*)

	ORF		
	synonym	nicht synonym	gesamt
TRIM10	38	18	56
TRIM15	33	15	48
TRIM26	33	2	35
TRIM27	19	1	20
TRIM39	4	0	4
TRIM5	45	66	111
TRIM6	25	16	41
TRIM21	20	20	40
TRIM22	23	42	65
TRIM34	29	26	55

Die *TRIM*-Gene innerhalb des MHC-Clusters weisen deutlich weniger Substitutionen auf als die *TRIM*-Gene des 11p15-Clusters. Des Weiteren ist auffällig, dass bei allen *TRIM*-Genen des MHC-Clusters die synonymen Substitutionen die nichtsynonymen Substitutionen überwiegen. *TRIM10* und *TRIM15* sind mit 38 s und 18 ns bzw. 33 s und 15 ns Substitutionen deutlich polymorpher als *TRIM26* (33 s, 2 ns), *TRIM27* (19 s, 1 ns) und *TRIM39* (4 s, 0 ns). Innerhalb des 11p15-Clusters ist *TRIM6* mit 25 synonymen und 16 nichtsynonymen Substitutionen im Vergleich zu den übrigen *TRIM*-Genen am konserviertesten. *TRIM34* besitzt ebenfalls weniger nichtsynonyme (26) als synonyme (29) Austausche. *TRIM21* weist mit je 20 eine identische Anzahl synonyme und nichtsynonyme Substitutionen auf, während bei *TRIM22* ähnlich wie bei *TRIM5α* die Anzahl der nichtsynonymen Substitutionen die der synonymen deutlich übersteigt (*TRIM22*: 23 s, 42 ns; *TRIM5α*: 45 s, 66 ns). Um die Menge der Substitutionen zwischen den *TRIM*-Genen besser vergleichen zu können, wurde die Anzahl an synonymen bzw. nichtsynonymen Substitutionen im Bezug auf die Anzahl der Gesamtnukleotide prozentual berechnet (Abb. 11). Es wird wiederum deutlich, dass das MHC-Cluster eher konserviert ist, während das 11p15-Cluster insbesondere bei *TRIM5α* und *TRIM22* auch prozentual im Bezug auf die Anzahl der Gesamtnukleotide deutlich mehr nichtsynonyme Substitutionen aufweist.

Abb. 11: Darstellung der synonymen und nichtsynonymen Substitutionen verschiedener *TRIM*-Gene von Mensch und Rhesusaffe in Prozent. Die *TRIM*-Gene des MHC-Clusters (*TRIM10*, *TRIM15*, *TRIM26*, *TRIM27*, *TRIM39*) und des 11p15-Clusters (*TRIM5 α* , *TRIM6*, *TRIM21*, *TRIM22*, *TRIM34*) von Mensch und Rhesusaffe wurden hinsichtlich der auftretenden synonymen und nichtsynonymen Substitutionen analysiert. Die Anzahl der Substitutionen ist prozentual im Verhältnis zur Sequenzlänge dargestellt.

Da bei *TRIM5 α* insbesondere die B30.2-Domäne einer rapiden Evolution unterworfen ist, sollten die Domänen der *TRIM*-Gene separat untersucht werden. Hierzu wurde zum einen das *Tripartite Motif* (RING-, B-box-, *Coiled-Coil*-Domäne) zum anderen die B30.2-Domäne von Mensch und Rhesusaffe auf Substitutionen hin analysiert. In Abbildung 12 sind die Sequenzunterschiede des *Tripartite Motifs* und der B30.2-Domäne von Mensch und Rhesusaffe in Prozent gegenübergestellt.

Abb. 12: Darstellung der synonymen und nichtsynonymen Substitutionen verschiedener *TRIM*-Gene von Mensch und Rhesusaffe in Prozent. Das *Tripartite Motif* und die B30.2-Domäne der *TRIM*-Gene des MHC-Clusters und des 11p15-Clusters von Mensch und Rhesusaffe wurden hinsichtlich der auftretenden synonymen und nichtsynonymen Substitutionen analysiert. Die Anzahl der Substitutionen ist prozentual im Verhältnis zur Sequenzlänge dargestellt.

Die *TRIM*-Gene des MHC-Clusters weisen sowohl im Bereich des *Tripartite Motifs* als auch der B30.2-Domäne nur geringe Sequenzunterschiede auf. Die synonymen Substitutionen überwiegen in beiden untersuchten Abschnitten die nichtsynonymen Substitutionen. *TRIM15* weist innerhalb der B30.2-Domäne keine Sequenzunterschiede auf.

Die Untersuchung der *TRIM*-Gene des 11p15-Clusters zeigte interessante Ergebnisse. Während *TRIM6* und *TRIM34* keine auffälligen Unterschiede im Vergleich der untersuchten Abschnitte aufweist, konnte bei *TRIM21* festgestellt werden, dass der Grossteil der Substitutionen innerhalb des *Tripartite Motif* lokalisiert ist, während die B30.2-Domäne

nahezu konserviert ist. Im Gegensatz dazu zeigte sich bei *TRIM22*, dass die B30.2-Domäne große Sequenzunterschiede aufweist und die Mehrzahl der hier auftretenden Substitutionen nichtsynonym ist. Die B30.2-Domäne von *TRIM22* scheint also ähnlich wie die B30.2-Domäne von *TRIM5α* einer rapiden Evolution unterworfen zu sein.

3.1.3 Bestimmung des dN/dS-Verhältnisses

Um herauszufinden, welche Art von Selektion auf ein Gen eingewirkt hat, werden die Anzahl der nichtsynonymen mit der der synonymen DNA-Substitutionen verglichen. Dieses Verhältnis von nichtsynonymen zu synonymen Substitutionen zweier Nukleotidsequenzen kann Informationen über evolutionäre Prozesse geben und zur Bestimmung von An- oder Abwesenheit eines Selektionsdrucks verwendet werden (Gillespie, 1984; Miyata und Yasunaga, 1980). Im Rahmen dieser Dissertation wurde zur Berechnung des Verhältnisses von nichtsynonymen zu synonymen Substitutionen das Verfahren von Goldman und Yang (1994) verwendet. Hierbei wird die Zahl der synonymen Substitutionen im Verhältnis zu nichtsynonymer Nukleotidposition berechnet (dS- bzw. dN-Wert). Der Quotient von dN (Dividend) und dS (Divisor) ergibt die Substitutionsrate. Des Weiteren wird in der Berechnung berücksichtigt, dass ein gewisser Prozentsatz an Nukleotiden nach einer ersten Substitution zu der ursprünglichen Base zurück mutiert.

Bei einem Wert >1 liegen mehr nichtsynonyme als synonyme Substitutionen vor und somit eine gerichtete positive Selektion. Ein Wert <1 beschreibt eine gerichtete negative Selektion, hier liegen mehr synonyme als nichtsynonyme Substitutionen vor. Bei einer etwa gleichen Anzahl synonyme und nichtsynonyme Substitutionen wird ein Wert von ~ 1 erhalten, was auf eine neutrale Selektion hindeutet.

Sawyer et al. (2007) konnten zeigen, dass *TRIM5α* innerhalb der Primaten einer positiven Selektion unterworfen ist. Um herauszufinden, ob neben *TRIM5α* weitere *TRIM*-Gene positiv selektioniert werden und somit eventuell in die Immunantwort involviert sind, wurden die Vollängen-Sequenzen der *TRIM*-Gene von Mensch und Rhesusaffe hinsichtlich der dN/dS Ratio untersucht. Zur Bestimmung der Substitutionsraten wurde eine Maximalwahrscheinlichkeitsschätzung (Maximum-likelihood-analysis) mit der Computersoftware CODML des PAML 3.14 Softwarepaketes mit Hilfe des Computerprogramms PAL2NAL (Suyama et al., 2006) durchgeführt. Das Programm basiert auf dem Rechenverfahren von Goldman und Yang (1994).

Die analysierten *TRIM*-Gene zeigten unterschiedliche Selektionsmodi. Die Ergebnisse des Vergleiches der Volllängen-Sequenzen zwischen Mensch und Rhesusaffe sind in Abbildung 13 dargestellt. Die *TRIM*-Gene des MHC-Clusters (*TRIM10*, *TRIM15*, *TRIM26*, *TRIM27*, *TRIM39*) weisen mit Werten deutlich <1 eine gerichtete negative Selektion auf. Innerhalb des 11p15-Clusters zeigen nur *TRIM6* und *TRIM34* eine deutliche negative Selektion, während *TRIM21* und *TRIM22* mit Werten nahe 1 neutral und *TRIM5α* wie erwartet mit einem Wert >1 positiv selektioniert sind.

Zusätzlich wurden die Domänen wiederum getrennt analysiert. Die auf Chromosom 6 lokalisierten *TRIM*-Gene weisen auch im separaten Vergleich der einzelnen Domänen sowohl im *Tripartite Motif* als auch in der B30.2-Domäne negative Selektion auf. Die auf Chromosom 11 lokalisierten *TRIM*-Gene zeigen dagegen ein anderes Bild. *TRIM21* ist innerhalb des *Tripartite Motif* neutral selektioniert, die B30.2-Domäne dagegen weist eine deutliche negative Selektion auf. Im Gegensatz dazu ist die B30.2-Domäne von *TRIM22* wie auch die B30.2-Domäne von *TRIM5α* positiv selektioniert, während das *Tripartite Motif* von *TRIM22* eher negativ selektioniert ist.

Abb. 13: Darstellung des dN/dS-Verhältnisses zwischen Mensch und Rhesusaffe verschiedener *TRIM*-Gene. Die Sequenzen von *TRIM10*, *TRIM15*, *TRIM26*, *TRIM27* und *TRIM39* (MHC-Cluster) und *TRIM5α*, *TRIM6*, *TRIM21*, *TRIM22* und *TRIM34* (11p15-Cluster) von Mensch und Rhesusaffe wurden mit Hilfe des Programms PAL2NAL hinsichtlich des dN/dS-Verhältnisses untersucht. Werte <1 weisen auf negative Selektion, Werte =1 auf neutrale Selektion und Werte >1 auf positive Selektion hin. Zum einen wurden die Volllängen-Sequenzen untersucht, zum anderen das *Tripartite Motif* und die B30.2-Domäne separat.

Zusammenfassend kann also aus den evolutiven Untersuchungen geschlossen werden, dass unterschiedliche Arten von Selektion auf die untersuchten *TRIM*-Gene wirken. Die *TRIM*-Gene innerhalb des MHC-Clusters sind hoch konserviert und weisen eine gerichtete negative Selektion auf. Innerhalb des 11p15-Clusters weisen *TRIM6* und *TRIM34* eine negative Selektion auf und *TRIM5α* wird deutlich positiv selektioniert, wobei insbesondere die B30.2-Domäne einer rapiden Evolution unterworfen ist. *TRIM21* und *TRIM22* weisen im Gesamten betrachtet eine neutrale Selektion auf, Untersuchungen der einzelnen Domänen zeigten jedoch, dass bei *TRIM21* das *Tripartite Motif* und bei *TRIM22* die B30.2-Domäne positiv selektioniert werden. Aufgrund der Ähnlichkeit der Evolution von *TRIM22* zu *TRIM5α* ist *TRIM22* ein viel versprechendes Kandidaten-Gen für funktionelle Untersuchungen.

3.2 Untersuchungen zur Funktion von TRIM-Proteinen

Bisher ist wenig über die Funktion verschiedener TRIM-Proteine bekannt. Reymond et al. (2001) konnten zeigen, dass TRIM-Proteine Homomultimere über ihre *Coiled-Coil*-Domänen formen und so Proteinkomplexe bilden. Diese Komplexe sind in unterschiedlichen subzellulären Kompartimenten lokalisiert und bestimmen dadurch die verschiedenen Funktionen von TRIM-Proteinen.

3.2.1 Etablierung von TRIM-Expressionskonstrukten

Um erste Hinweise auf die Funktionen der verschiedenen TRIM-Proteine zu erhalten, sollte zunächst die subzelluläre Lokalisation ermittelt werden. Dazu wurde der gesamte offene Leserahmen des humanen *TRIM5α*, 10, 21, 22, 26, 27 und 39 in den eukaryotischen Expressionsvektor pAcGFP1-N1 kloniert. Dieser Vektor kodiert für das *green fluorescent protein* von *Aequorea coerulescens* (AcGFP), so dass nach erfolgreicher Integration der *TRIM*-Gene in die MCS (*multiple cloning site*) ein TRIM-GFP-Fusionsprotein exprimiert wird (Abb. 14).

Abb. 14: Schematische Darstellung eines TRIM-GFP-Fusionsproteins. Der gesamte offene Leserahmen verschiedener *TRIM*-Gene mit RBCC-B30.2-Domäne wurde in die MCS des Vektors pAcGFP1-N1 kloniert, so dass ein TRIM-GFP-Fusionsprotein exprimiert wurde.

Zur Amplifikation der *TRIM*-Gene aus cDNA wurden Oligonukleotide anhand der in der NCBI- oder ensemble-Datenbank vorliegenden Sequenzen so generiert, dass das Vorwärtsoligonukleotid das Startcodon sowie die Kozak-Konsensussequenz enthielt. Bei der Generierung des Rückwärtsoligonukleotids musste beachtet werden, dass kein Stopcodon den offenen Leserahmen zwischen TRIM und GFP unterbrach. Des Weiteren wurden Restriktionsschnittstellen in die Oligonukleotide integriert, um ein Umklonieren aus dem Klonierungsvektor pGEM-Teasy in den Expressionsvektor pAcGFP1-N1 zu ermöglichen (2.11.4). TRIM 10, TRIM26, TRIM27, TRIM39, TRIM21 und TRIM22 wurden erfolgreich mittels PCR aus cDNA aus humanem Blut amplifiziert und in den Klonierungsvektor pGEM-Teasy ligiert. Nach Transformation in TOP10 *E.coli*-Bakterien und anschließender Mini-Plasmidpräparation wurde das jeweilige *TRIM*-Gen mittels Sequenzanalyse überprüft. Anschließend wurde das *TRIM*-Gen mit den in 2.11.4 angegebenen Restriktionsenzymen aus dem pGEM-Teasy-Vektor isoliert und nach einer Gelextraktion in den mit den gleichen Restriktionsenzymen geschnittenen Vektor pAcGFP1-N1 ligiert. Wurde mit nur einem Restriktionsenzym geschnitten, so wurde der Vektor vor der Ligation dephosphoryliert. Nach Transformation in TOP10-Bakterien und Mini-Plasmidpräparation der Plasmide wurde mittels Sequenzanalyse der offene Leserahmen der TRIM-GFP-Fusionskonstrukte überprüft. Um größere Mengen Plasmid-DNA zu erhalten, wurden Midi-Plasmidpräparationen durchgeführt.

3.2.2 Nachweis der TRIM-GFP Proteinexpression mittels Immunoblot-Analysen

Um die Expression der TRIM-GFP-Fusionsproteine in eukaryotischen Zellen zu überprüfen, wurden die Konstrukte zunächst in die Zelllinie HEK239T transfiziert (2.18.4). Nach 48 h wurden die Gesamtproteine mit Hilfe von RIPA-Puffer isoliert (2.17.1) und für die

Expressionsanalyse der TRIM-GFP-Fusionsproteine mittels SDS-PAGE aufgetrennt. Die anschließende Immunoblot-Analyse wurde mit GFP-spezifischem Antikörper durchgeführt.

Abb. 15: Immunoblot-Analyse zum Nachweis der TRIM-Protein-Expression. HEK293T-Zellen wurden mit TRIM-GFP-Konstrukten transient transfiziert. Nach 24 h wurden die Gesamt-Proteine isoliert, diese mittels SDS-PAGE aufgetrennt und die Expression der TRIM-GFP-Proteine mit Hilfe eines anti-GFP-Antikörpers (JL-8) nachgewiesen. Als Negativkontrolle wurden Proteine von untransfizierten HEK293T-Zellen mit aufgetragen. In der Tabelle ist das Molekulargewicht (MW) in Kilodalton (kDa) der TRIM-Proteine mit und ohne GFP-Anhang aufgelistet.

Es wurden Banden in den erwarteten Größen erhalten (Abb. 15), so dass davon ausgegangen werden konnte, dass die jeweiligen TRIM-GFP-Fusionsproteine in den HEK293T-Zellen tatsächlich exprimiert werden. Da sowohl TRIM26 als auch TRIM22 ein weiteres Startcodon stromabwärts des ersten ATG besitzen, sind bei diesen Proteinen im Immunoblot weitere Banden zu beobachten.

3.2.3 Subzelluläre Lokalisation verschiedener TRIM-Proteine

Um die subzelluläre Lokalisation von Proteinen in eukaryotischen Zellen analysieren zu können, wurde zum einen ein konfokales Laserscanning-Mikroskop (LSM) verwendet und zum anderen ein inverses Mikroskop (AxioObserver). Der Vorteil des LSM besteht darin, dass das reflektierte oder emittierte Licht von einer Ebene des Präparates erfasst wird. Da jedoch bei dem zur Verfügung stehenden LSM kein UV-Laser zur Verfügung stand, war es nicht möglich, mit DAPI gefärbte Kerne zu visualisieren. Um die genaue zelluläre Lokalisation der untersuchten Proteine darzustellen, wurde das AxioObserver-Mikroskop

verwendet. Des Weiteren war es mit diesem Mikroskop möglich, lebende Zellen in Petrischalen zu beobachten.

Zur Analyse der subzellulären Lokalisation der verschiedenen TRIM-Proteine wurden zunächst auf beschichteten Objektträgern ausgesäte HEK293T- oder COS-7-Zellen mit TRIM-GFP-Expressionskonstrukten transient transfiziert und die Zellen nach 24-48 h mit Hilfe von 3% Paraformaldehyd fixiert. Mittels Phalloidin, an das der Farbstoff TRITC-gekoppelt war, wurde das Zytoskelett (F-Aktin) der Zellen angefärbt. Phalloidin bindet spezifisch an den Übergängen der F-Aktin Untereinheiten. Die Mikrotubuli wurden mit Hilfe eines α -Tubulin-Antikörpers visualisiert. Kernfärbungen wurden mit Hilfe von DAPI-Färbung durchgeführt.

Fluoreszenzmikroskopische Untersuchungen zeigten, dass TRIM10 diffus zytoplasmatisch lokalisiert, während TRIM26, TRIM27 und TRIM39 durch punktuelle Proteinaggregate unterschiedliche intrazelluläre Kompartimente identifizieren (Abb. 16, 17). TRIM21 zeigt zytoplasmatische fadenförmige Strukturen, die mit den Mikrotubuli assoziiert sind (Abb.18).

Abb. 16: Untersuchungen zur subzellulären Lokalisation verschiedener TRIM-GFP-Fusionsproteine. TRIM10-, TRIM26- und TRIM39-GFP wurden transient in HEK293T-Zellen transfiziert und nach 48 h hinsichtlich ihrer subzellulären Lokalisation untersucht (grün). Das Zytoskelett wurde mit Hilfe von Phalloidin-TRITC markiert (rot). Fluoreszenzmikroskopische Aufnahmen mit einem konfokalen LSM zeigten, dass TRIM10 diffus zytoplasmatisch lokalisiert ist, TRIM26 und TRIM39 weisen punktförmige Proteinanhäufungen auf.

Abb. 17: Untersuchung zur subzellulären Lokalisation von TRIM27. COS-7-Zellen wurden mit TRIM27-GFP transient transfiziert, die Zellen nach 24 h fixiert, die Mikrotubuli mit α -Tubulin-Antikörper markiert und die Zellkerne mit DAPI gefärbt. TRIM27 zeigt punktförmige bis diffuse subzelluläre Lokalisation.

Abb. 18: TRIM21 kolokalisiert mit Mikrotubuli. HeLa-Zellen wurden transient mit TRIM21-GFP transfiziert. Nach 24 h wurden die Zellen fixiert und die Mikrotubuli mit Hilfe eines anti- α -Tubulin-Antikörpers und eines TRITC-gekoppelten Sekundärantikörpers visualisiert. In der Überlagerung der beiden mit einem konfokalen LSM aufgenommenen Bilder wird deutlich, dass TRIM21-GFP mit den Mikrotubuli kolokalisiert.

3.2.4 Vergleich von humanem und Rhesusaffen-TRIM22

Da TRIM22 neben TRIM5 α insbesondere im Bereich der C-terminalen B30.2-Domäne innerhalb der Primaten positiv selektioniert wird, kann vermutet werden, dass die rapide Evolution unterschiedlichen Funktionen der TRIM-Proteine zur Folge hat. Das Beispiel TRIM5 α zeigt, dass in diesem Fall die positive Selektion die Fähigkeit zur Restriktion von Retroviren verändert.

Um erste Hinweise auf eventuelle funktionelle Unterschiede zwischen humanen und Rhesusaffen-TRIM-Proteinen zu erhalten, sollte das Rhesusaffen-TRIM22 (rhTRIM22) im

Vergleich zu hTRIM22 zunächst hinsichtlich der subzellulären Lokalisation untersucht werden. Mit Hilfe rhTRIM22-spezifischer Oligonukleotide (hTRIM22.fw; rhTRIM22.rev) wurde rhTRIM22 aus cDNA aus Blut eines Rhesusaffen (2991) amplifiziert und anschließend wie oben beschrieben in den Vektor pAcGFP1-N1 kloniert. Der offene Leserahmen wurde mittels Sequenzanalyse überprüft und ausreichende Mengen DNA mit Hilfe einer Midi-Plasmidpräparation erhalten. Zur Überprüfung der Expression des rhTRIM22-GFP-Fusionsproteins wurde eine Immunoblot-Analyse mit dem monoklonalen anti-GFP-Antikörper (JL-8) durchgeführt. Dazu wurden HEK293T-Zellen transient mit rhTRIM22-GFP bzw. als Positivkontrolle mit hTRIM22-GFP transfiziert. Nach 24 h wurde mit Hilfe von RIPA-Puffer das Gesamtprotein isoliert und mittels SDS-PAGE aufgetrennt. Nach einer anschließenden Immunoblot-Analyse mit anti-GFP-Antikörper und HRP-gekoppeltem Sekundärantikörper konnte die erwartete Bande in der Größe von 84 kDa nachgewiesen werden (Abb.19). Wie auch hTRIM22 besitzt rhTRIM22 ein stromabwärts gelegenes zweites ATG, so dass auch hier ein zweites Signal unterhalb der 84 kDa Bande erhalten wurde. Somit konnte gezeigt werden, dass rhTRIM22-GFP in eukaryotischen Zellen exprimiert wird.

Abb. 19: Analyse zur Expression von rhTRIM22-GFP mittels Immunoblot-Analyse. HEK293T-Zellen wurden transient mit hTRIM22-GFP oder rhTRIM22-GFP transfiziert, nach 48 h die Gesamtproteine isoliert und die Proteine mit SDS-PAGE aufgetrennt. In einer anschließenden Immunoblot-Analyse wurden hTRIM22-GFP und rhTRIM22-GFP mit Hilfe eines GFP-spezifischen Antikörpers (JL-8) nachgewiesen (84 kDa).

3.2.5 Analyse zur subzellulären Lokalisation von rhTRIM22

Um die subzelluläre Lokalisation von hTRIM22-GFP und rhTRIM22-GFP vergleichen zu können, wurden die TRIM22-GFP-Fusionskonstrukte transient in COS-7-Zellen transfiziert. Nach 24 h wurden die Zellen fixiert, das Zytoskelett (F-Aktin) mit Phalloidin-TRITC

markiert und die Zellkerne mittels DAPI gefärbt. Mit Hilfe des konfokalen LSM wurden die Zellen hinsichtlich der subzellulären Lokalisation des TRIM22-GFP-Fusionsproteins untersucht. Interessanterweise zeigte sich, dass rhTRIM22 tatsächlich eine andere subzelluläre Lokalisation aufweist als hTRIM22: Während das humane TRIM22 diffus im Zytoplasma lokalisiert ist, akkumuliert rhTRIM22 zu punktförmigen Anhäufungen. Diese punktförmigen Anhäufungen variieren von Zelle zu Zelle an Anzahl und Größe (Abb. 20).

Abb. 20: Untersuchungen zur subzellulären Lokalisation von TRIM22. Die Expressionskonstrukte hTRIM22-GFP und rhTRIM22-GFP wurden transient in COS-7-Zellen transfiziert. Nach 24 h wurden die Zellen fixiert und das Zytoskelett (F-Aktin) mit Phalloidin-TRITC markiert. Fluoreszenzmikroskopische Untersuchungen zeigten, dass hTRIM22 diffus im Zytoplasma lokalisiert ist, während rhTRIM22 zu punktförmige Proteinanhäufungen akkumuliert.

Zur weiteren Untersuchung der genauen Lokalisation von hTRIM22 und rhTRIM22 innerhalb der Zelle wurden zusätzliche Bilder mit dem AxioObserver-Mikroskop aufgenommen, da es hier zusätzlich möglich war, die Kernfärbung zu visualisieren (Anhang).

3.2.6 Untersuchung der subzellulären Lokalisation von TRIM22 in unterschiedlichen Zelllinien

Um auszuschließen, dass die unterschiedlichen subzellulären Lokalisationen Zelltyp bedingt auftreten, wurden weitere Zelllinien transient mit den hTRIM22-GFP und rhTRIM22-GFP-Expressionskonstrukten transfiziert. So wurden neben COS-7-Zellen die adhärenenten Zelllinien HeLa- und HEK293T sowie die Suspensionszelllinien K562 und Jurkat hinsichtlich der subzellulären Lokalisation von hTRIM22 und rhTRIM22 untersucht. Es zeigte sich in allen Zelllinien die oben beschriebene subzelluläre Lokalisation: hTRIM22-GFP lokalisiert diffus im Zytoplasma, rhTRIM22-GFP akkumuliert zu punktförmigen Proteinanhäufungen (Daten nicht gezeigt).

3.2.7 Analyse der subzellulären Lokalisation von TRIM22-V5/His-Fusionsproteinen

Aufgrund der Größe und des hohen Molekulargewichtes von GFP (26 kDa) ist es möglich, dass Proteine mit GFP-Anhang eine andere Konformation und daraus folgend eine andere subzelluläre Lokalisation aufweisen als das parentale Protein.

Um herauszufinden, ob die beobachtete subzelluläre Lokalisation von TRIM22 abhängig vom GFP-Anhang ist, wurden sowohl hTRIM22 als auch rhTRIM22 in den Expressionsvektor pcDNA3.1-V5/His integriert. Der V5/His-Anhang umfasst ein Molekulargewicht von nur 5 kDa). Es kann davon ausgegangen werden, dass artifizielle subzelluläre Lokalisationen von Proteinen mit V5/His-Anhang unwahrscheinlich sind.

Der pcDNA-3.1-V5/His-Vektor ist ein direkter Klonierungsvektor mit T-Überhang, so dass PCR-Produkte mit A-Überhang direkt in diesen Vektor integriert werden können. Es wurden PCR-Ansätze mit den Oligonukleotiden hTRIM22.fw und hTRIM22.rev bzw. mit hTRIM22.fw und rhTRIM22.rev durchgeführt, wobei jeweils das Plasmid pAcGFP1-N1-hTRIM22 oder -rhTRIM22 als Template eingesetzt wurde. Anschließend wurde eine Ligation der PCR-Produkte in den pcDNA-3.1-V5/His durchgeführt. Nach erfolgreicher Integration von hTRIM22 und rhTRIM22 in den pcDNA-3.1-V5/His-Vektor wurde der offene Leserahmen mittels Sequenzanalyse überprüft und eine Midi-Plasmidpräparation durchgeführt, um ausreichende Mengen DNA zu erhalten. Die so erhaltene DNA wurde transient in HeLa-Zellen transfiziert und die Zellen nach 48 h fixiert. Nach Permeabilisierung

und Absättigung der unspezifischen Bindungsstellen wurde hTRIM22 und rhTRIM22 mit Hilfe eines anti-V5-Antikörpers und eines TRITC-gekoppelten Sekundärantikörpers markiert. Die Zellkerne wurden mit DAPI gefärbt. Anschließend wurden die Zellen hinsichtlich der subzellulären Lokalisation von hTRIM22 und rhTRIM22 mit Hilfe des AxioObserver-Mikroskops untersucht.

Es zeigte sich, dass sowohl hTRIM22-V5 als auch rhTRIM22-V5 vergleichbare subzelluläre Lokalisationen aufweisen wie entsprechend hTRIM22-GFP oder rhTRIM22-GFP. Wie in Abbildung 21 dargestellt, lokalisiert hTRIM22-V5 diffus im Zytoplasma, während rhTRIM22-V5 wiederum punktförmige Proteianhäufungen nahe dem Zellkern bildet. Somit konnte gezeigt werden, dass der GFP-Anhang keine Auswirkungen auf die subzelluläre Lokalisation von TRIM22 besitzt.

Abb. 21: Subzelluläre Lokalisation von TRIM22-V5-Expressionskonstrukten. COS-7-Zellen wurden transient mit den Konstrukten hTRIM22-V5 und rhTRIM22-V5 transfiziert. Nach 48 h wurden die Zellen fixiert, TRIM22-V5 mit Hilfe eines anti-V5-Antikörpers und eines TRITC-gekoppelten Sekundärantikörpers nachgewiesen (rot) und die Zellkerne mit Hilfe von DAPI (blau) gefärbt. hTRIM22-V5 ist diffus im Zytoplasma lokalisiert, rhTRIM22-V5 bildet punktförmige Proteianhäufungen.

3.2.8 Vergleich der subzellulären Lokalisation von TRIM22 und TRIM5 α

Für Vergleiche der subzellulären Lokalisation von TRIM5 α und TRIM22 wurden zunächst hTRIM5 α und rhTRIM5 α mit Hilfe sequenzspezifischer Oligonukleotide aus cDNA von Mensch und Rhesusaffe amplifiziert und in den pAcGFP1-N1-Vektor integriert. Nach Überprüfung des offenen Leserahmens mittels Sequenzierung wurde die aus Midi-Plasmidpräparationen erhaltene DNA transient in COS-7-Zellen transfiziert. Es zeigte sich, dass das humane TRIM5 α vergleichbare subzelluläre Proteinanhäufungen bildet wie rhTRIM22, während rhTRIM5 α und hTRIM22 vergleichbare diffuse Lokalisationen aufweisen (Abb. 22).

Abb. 22: Analyse der subzellulären Lokalisation von TRIM5 α . COS-7-Zellen wurden transient mit den Konstrukten hTRIM5 α -GFP und rhTRIM5 α -GFP transfiziert und mit Hilfe des konfokalen LSMs hinsichtlich der subzellulären Lokalisation untersucht. Dabei zeigte sich, dass hTRIM5 α punktförmige Proteinanhäufungen und rhTRIM5 α diffuse zytoplasmatische Lokalisation aufweisen.

3.2.9 Untersuchungen der rhTRIM22-Proteinanhäufungen

Es konnte beobachtet werden, dass die Anzahl und Größe der rhTRIM22-Proteinanhäufungen von Zelle zu Zelle variiert. Für hTRIM5 α konnte gezeigt werden, dass sich die beobachteten punktförmigen Proteinstrukturen innerhalb der Zelle entlang der Mikrotubuli bewegen und in der Lage sind miteinander zu fusionieren (Campbell et al., 2007).

Um herauszufinden, ob die Anzahl und die Größe der rhTRIM22 Proteinanhäufungen mit unterschiedlich langer Expression korreliert, wurde die rhTRIM22-GFP-Expression zu verschiedenen Zeitpunkten nach der Transfektion (24 h, 48 h, 72 h) mit Hilfe des inversen AxioObserver-Mikroskops visualisiert, mit dem es möglich ist, auch lebende Zellen in den Petrischalen zu beobachten.

Abb. 23: Analyse zur subzellulären Lokalisation von rhTRIM22-GFP zu unterschiedlichen Zeitpunkten nach der Transfektion. HeLa-Zellen wurden transient mit rhTRIM22-GFP transfiziert und die lebenden Zellen mit Hilfe des AxioObserver-Mikroskops nach 24 h, 48 h und 72 h analysiert. Die Zahl der punktförmigen Proteinanhäufungen verringert sich, die Größe der einzelnen Proteinanhäufungen nimmt zu.

Es konnte gezeigt werden, dass die Menge der transfizierten DNA keinen Einfluss auf Größe oder Anzahl der rhTRIM22 Proteinanhäufungen hat. Allerdings verändern sich die Proteinanhäufungen je nach Zeitpunkt nach der Transfektion. Etwa 18 h nach Transfektion sind viele kleine punktförmige Anhäufungen zu beobachten. Je länger rhTRIM22 exprimiert wird desto weniger punktförmige Proteinanhäufungen sind in den Zellen zu finden. Die Anhäufungen weisen jedoch deutlich größere Durchmesser auf (Abb. 23). Es kann somit davon ausgegangen werden, dass es sich auch bei rhTRIM22 wie bei hTRIM5 α um dynamische Strukturen handelt und dass die kleinen Anhäufungen mit der Zeit zu größeren Aggregaten verschmelzen.

Campbell et al. (2007) zeigten weiterhin, dass die von hTRIM5 α gebildeten Proteinanhäufungen hohle Strukturen sind. Um herauszufinden, ob das auch für die von rhTRIM22 gebildeten Proteinanhäufungen zutrifft, wurden die Strukturen am konfokalen LSM bei einer 600 fachen Vergrößerung untersucht. Es war deutlich zu erkennen, dass auch hier hohle Proteinanhäufungen vorliegen, die 48 h nach Transfektion einen Durchmesser von bis zu 2 μ m aufweisen (Abb. 24).

Abb. 24: Analyse der rhTRIM22-Proteinanhäufungen. COS-7-Zellen wurden transient mit rhTRIM22-GFP transfiziert (grün) und die Mikrotubuli mit anti- α -Tubulin-Antikörper und TRITC-gekoppeltem Sekundärantikörper markiert (rot). Mit Hilfe eines konfokalen LSM konnte bei einer 600 fachen Vergrößerung gezeigt werden, dass die rhTRIM22-Proteinanhäufungen hohle Strukturen mit einem Durchmesser von bis zu 2 μ m bilden.

Bei der Analyse von COS-7-Zellen, die rhTRIM22 transient exprimieren, wurde beobachtet, dass diese Proteinanhäufungen schon in Phasenkontrastaufnahmen als zytoplasmatische Granula sichtbar sind (Abb. 25).

Abb. 25: rhTRIM22-Proteinanhäufungen sind in Phasenkontrastaufnahmen sichtbar. 48 h nach transienter Transfektion mit rhTRIM22-GFP wurden COS-7-Zellen fixiert und die Zellkerne mit DAPI gefärbt. Die von rhTRIM22-GFP gebildeten Proteinanhäufungen sind bereits bei Phasenkontrastaufnahmen sichtbar (Pfeile).

3.2.10 Analyse der hTRIM22-GFP Proteinaggregate

Zur näheren Analyse der diffusen hTRIM22-GFP Proteinaggregate wurden COS-7-Zellen auf beschichteten Objektträgern ausgesät und transient mit hTRIM22-GFP transfiziert. Um herauszufinden, ob diese Proteinanhäufungen eventuell mit den Mikrotubuli assoziiert sind, wurden nach 48 h die Zellen fixiert und die Mikrotubuli mit anti- α -Tubulin-Antikörper und TRITC-gekoppeltem Sekundärantikörper markiert. Es zeigte sich, dass hTRIM22-GFP tatsächlich mit α -Tubulin kolokalisiert. Überraschenderweise konnte festgestellt werden, dass in hTRIM22 exprimierenden Zellen kein Zentrosom gefunden werden konnte. In untransfizierten Zellen dagegen war das Zentrosom als Ausgangspunkt für die Mikrotubuli leicht erkennbar (Abb. 26). Das Zentrosom spielt bei der Organisation des Mikrotubuli-Zytoskeletts eine wichtige Rolle. Während der Zellteilung ist das Zentrosom für die Ausbildung des Spindelapparates verantwortlich.

Abb. 26: Überexpression von hTRIM22 führt zu Inhibition der Zentrosombildung. COS-7-Zellen wurden transient mit hTRIM22-GFP transfiziert und nach 48 h fixiert. Die Mikrotubuli wurden mit Hilfe eines anti- α -Tubulin-Antikörpers und eines TRITC-gekoppelten Sekundärantikörpers markiert. Mit Hilfe eines LSMs konnte gezeigt werden, dass Zellen, die hTRIM22-GFP exprimieren, kein Zentrosom besitzen, während in hTRIM22-GFP negativen Zellen das Zentrosom deutlich erkennbar ist (Pfeil).

3.2.11 Analysen zur subzellulären Lokalisation von kotransfiziertem hTRIM22 und rhTRIM22

Um die unterschiedlichen subzellulären Lokalisationen von hTRIM22 und rhTRIM22 in einer Zelle zu visualisieren, sollten beide Expressionskonstrukte kotransfiziert werden. Auf Objektträgern ausgesäte COS-7- oder HeLa-Zellen wurden mit den Konstrukten pcDNA3.1-hTRIM22 und pAcGFP1-N1-rhTRIM22 transfiziert. Nach 24 h wurden die Zellen fixiert, das humane TRIM22-V5 Expressionskonstrukt mittels Immunzytochemie mit anti-V5-Antikörper markiert und die Zellkerne mit Hilfe von DAPI gefärbt. Mit dem AxioObserver-Mikroskop wurden die Zellen auf die subzelluläre Lokalisation von humanem und Rhesusaffen-TRIM22 hin analysiert. Unerwarteterweise kolokalisieren hTRIM22 und rhTRIM22, obwohl sie bei Einzel-Expression unterschiedliche Lokalisationen aufweisen. Bei gleichzeitiger Expression konnten sowohl diffuse als auch punktförmige subzelluläre Lokalisationen von hTRIM22 und rhTRIM22 beobachtet werden (Abb. 27).

Abb. 27: Analyse der subzellulären Lokalisation von hTRIM22 und rhTRIM22 nach Kotransfektion. Die Expressionskonstrukte hTRIM22-V5 und rhTRIM22-GFP wurden transient in HeLa-Zellen kotransfiziert. Nach 48 h wurden die Zellen fixiert, hTRIM22-V5 mit Hilfe eines anti-V5-Antikörpers und eines TRITC-gekoppelten Sekundärantikörpers markiert und die Zellkerne mittels DAPI gefärbt. Fluoreszenzmikroskopische Aufnahmen zeigten, dass hTRIM22-V5 und rhTRIM22-GFP kolokalisieren.

3.2.12 Interaktionsnachweis mittels Koimmunpräzipitation

Reymond et al. (2001) zeigten, dass viele TRIM-Proteine über die *Coiled-Coil*-Domäne homomultimerisieren. Um zu überprüfen, ob hTRIM22 und rhTRIM22 ebenfalls interagieren und somit heteromultimerisieren, wurde eine Koimmunpräzipitation durchgeführt (2.23). Dazu wurden die Expressionskonstrukte hTRIM22-V5/His und rhTRIM22-GFP in am Vortag ausgesäte, etwa 80-90%-konfluente HEK293T-Zellen kotransfiziert. Nach 24 h wurden 1×10^7 -Zellen mit Hilfe von NP40-Lyse-Puffer lysiert und eine Koimmunpräzipitation mit anti-GFP-Antikörper und Protein-G-Sepharose durchgeführt. Die Proteine wurden in 50 µl Probenpuffer von der Sepharose eluiert und mittels SDS-PAGE aufgetrennt. In einer anschließenden Immunoblot-Analyse mit anti-V5-Antikörper konnte eine distinkte Bande in der erwarteten Größe von 62 kDa (hTRIM22+V5-tag) nachgewiesen werden (Abb. 28). Zur Kontrolle wurden eine Koimmunpräzipitation mit anti-V5-Antikörper und eine Immunoblot-Analyse mit anti-GFP-Antikörper durchgeführt. Hier wurde eine distinkte Bande in der erwarteten Größe von 86 kDa (rhTRIM22+GFP-tag) nachgewiesen. Somit konnte gezeigt werden, dass hTRIM22 und rhTRIM22 tatsächlich miteinander interagieren und aus diesem Grund bei gleichzeitiger Expression in Säugerzellen kolokalisieren.

Abb. 28: Interaktionsnachweis zwischen humanem und Rhesusaffen-TRIM22 mittels einer Koimmunpräzipitation. HEK293T-Zellen wurden transient mit den Konstrukten hTRIM22-V5 und rhTRIM22-GFP transfiziert. Nach 24 h wurden die Zellen mit Hilfe von NP40-Lyse-Puffer lysiert und eine CoIP mit anschließender Immunoblot-Analyse durchgeführt. Der anti-GFP-Antikörper wurde für die CoIP und der HRP-gekoppelte anti-V5-Antikörper für die Immunoblot-Analyse verwendet. Als Negativ-Kontrolle wurden untransfizierte HEK293T-Zellen verwendet.

3.2.13 Etablierung von chimärischen TRIM22-Expressionskonstrukten

Um herauszufinden, welche Domäne verantwortlich für die differentielle subzelluläre Lokalisation von humanen und Rhesusaffen-TRIM22 ist, sollten chimärische Konstrukte etabliert werden. Da, wie schon beschrieben, insbesondere die B30.2-Domäne große Unterschiede zwischen Mensch und Rhesusaffe aufweist, sollte zunächst diese Domäne ausgetauscht werden (Abb. 29).

hTRIM	22	1	MDFSVKVDIEKEVTCPICLELLTEPLSLDCGHSFCQACITAKIKESVIISRGESSCPVCQ	60
rhTRIM	22	1	T.....	60
hTRIM	22	61	TRFQPGNLRPNRHLANIVERVKEVKMSPOEGQKRDVCEHHGKKLQIFCKEDGKVICWVCE	120
rhTRIM	22	61	S.....K.....I.....	120
hTRIM	22	121	LSQEHQGHQTFRINEVVKECQEKLOVALQRLIKEDQAEKLEDDIRQERTAWKNYIQIER	180
rhTRIM	22	121	A...K.T.....V.....V.....L..	180
hTRIM	22	181	QKILKGFNEMRVILDNEEQRELQKLEEGEVNVLNLAATDQLVQQRQDASTLISDLQRR	240
rhTRIM	22	181	S.....R.....K.....	240
hTRIM	22	241	LRGSSVEMLQDVIDVMKRSESWTLKKPKSVSKKLKSVFRVPDLSGMLQVLKELTDVQYYW	300
rhTRIM	22	241	I.....N.....P.....A....R....H.....C..	300
hTRIM	22	301	VDVMLNPGSATSINVAISVDQRQVKTVRTCTFKNSNPCDFSAGVFGCQYFSSGKYYWEVD	360
rhTRIM	22	301	N.TI....V.....A....F.....R...D...L.....	360
hTRIM	22	361	VSGKIAWILGVHISKISSLNKRKSSGFADFPSVNYSKVYSRYRPQYGYWVIGLQNTCEYNA	420
rhTRIM	22	361	Y.....P.....V.....AN...K.....	420
hTRIM	22	421	FEDSSSDPKVLTFLMAVPPCRIGVFLDYEAGIVSFFNVTNHGALIYKFSGCRFSRPAYP	480
rhTRIM	22	421	A.....V...N.....Q....	480
hTRIM	22	481	YFNPWNCLVPMTVCPPSS	498
rhTRIM	22	481	Q....L.Q...	498

Abb. 29: Vergleich der Aminosäuresequenz von hTRIM22 und rhTRIM22. Die Aminosäuresequenzen von hTRIM22 und rhTRIM22 wurden mit Hilfe des Programms BLAST verglichen. Die B30.2-Domäne ist blau, die Aminosäuresubstitutionen innerhalb dieser Domäne sind rot markiert.

Mit Hilfe der Restriktionsenzyme *ScaI* und *SacII* konnte die B30.2-Domäne von hTRIM22 aus dem Konstrukt pAcGFP1-N1-hTRIM22 isoliert werden. Da rhTRIM22 an Position 896 keine *ScaI* Schnittstelle besitzt, musste diese mit Hilfe einer gerichteten Mutagenese generiert werden. Dazu wurden Oligonukleotide mit der benötigten Sequenz verwendet und die Mutagenese mit Hilfe des *Site-Directed* Mutagenesis Kit der Firma Stratagene durchgeführt. Nach erfolgreicher Mutation konnte aus dem so erhaltenen Konstrukt ebenfalls die B30.2-Domäne isoliert werden.

Um die in Abbildung 30 dargestellten chimärischen Konstrukte zu erhalten, wurde die B30.2-Domäne von hTRIM22 in das verbliebene rhTRIM22 Konstrukt, das nur das *Tripartite Motif* von TRIM22 beinhaltet, ligiert (pAcGFP1-N1-rhTRIM-hB30.2-22). Für das gegenteilige Konstrukt wurde sinngemäß die B30.2-Domäne von rhTRIM22 mit dem *Tripartite Motif* von hTRIM22 ligiert (pAcGFP1-N1-hTRIM-rhB30.2-22). Die so erhaltenen chimärischen TRIM22-Konstrukte wurden mittels Sequenzierung auf den erfolgreichen Austausch der B30.2-Domänen und auf einen intakten ORF hin untersucht. Abschließend wurde eine Midi-Plasmidpräparation durchgeführt, um ausreichende Mengen DNA zu erhalten.

Abb. 30: Etablierung chimärischer TRIM22-Konstrukte. Die B30.2-Domäne von hTRIM22 wurde mit dem *Tripartite Motif* von rhTRIM22 ligiert und die B30.2-Domäne von rhTRIM22 mit dem *Tripartite Motif* von hTRIM22.

3.2.14 Untersuchungen zur subzellulären Lokalisation der chimärischen TRIM22-Konstrukte

Zur Untersuchung der subzellulären Lokalisation der Konstrukte pAcGFP1-N1-hTRIM-rhB30.2-22 und pAcGFP1-N1-rhTRIM-hB30.2-22 wurden diese transient in COS-7 und HeLa-Zellen transfiziert und die Zellen 24 h nach Transfektion fixiert, das Zytoskelett mit Phalloidin-TRITC gefärbt und die Zellkerne mit DAPI markiert. Fluoreszenzmikroskopische Aufnahmen zeigten, dass das chimärische Konstrukt pAcGFP1-N1-rhTRIM-hB30.2-22 (*Tripartite Motif* des Rhesusaffen, humane B30.2-Domäne) eine vergleichbare diffuse subzelluläre Lokalisation wie das parentale hTRIM22 aufweist. Im Vergleich dazu aggregiert das chimärische Konstrukt pAcGFP1-N1-hTRIM-rhB30.2-22 (humanes *Tripartite Motif*, B30.2-Domäne des Rhesusaffen) zu zytoplasmatischen punktförmigen Proteinanhäufungen wie das parentale rhTRIM22 (Abb. 31 und Anhang). Somit konnte gezeigt werden, dass tatsächlich die positiv selektionierte B30.2-Domäne von TRIM22 verantwortlich für die differentielle subzelluläre Lokalisation von hTRIM22 und rhTRIM22 ist.

Abb. 31: Subzelluläre Lokalisation von TRIM22-GFP-Konstrukten. COS-7-Zellen wurden transient mit humanem (hTRIM22) oder Rhesusaffen (rhTRIM22) GFP-TRIM22-Fusionskonstrukten oder den chimärischen Konstrukten (hTRIM-rhB30.2-22 bzw. rhTRIM-hB30.2-22) transfiziert (grün). Das Zytoskelett (F-Aktin) wurde mit Phalloidin-TRITC gefärbt. Das chimärische Konstrukt mit der humanen B30.2-Domäne weist eine vergleichbare subzelluläre Lokalisation auf wie das parentale hTRIM22, während das chimärische Konstrukt mit der B30.2-Domäne des Rhesusaffen vergleichbare Proteinanhäufungen bildet wie das parentale rhTRIM22.

3.2.15 Analysen zur Identifizierung der für die Lokalisation verantwortlichen Aminosäuren

Um des Weiteren herauszufinden, welche Aminosäuren innerhalb der B30.2-Domäne für die unterschiedliche subzelluläre Lokalisation verantwortlich sind, wurden weitere chimärische Konstrukte etabliert. Hierzu wurde zunächst ausgenutzt, dass TRIM22 an Position 1029 innerhalb der B30.2-Domäne eine *Bam*HI-Schnittstelle aufweist. So konnten der Bereich der Aminosäuren 368-498 von hTRIM22 und rhTRIM22 untereinander ausgetauscht werden, so dass die in Abbildung 32 dargestellten chimärischen Konstrukte erhalten wurden.

A

hTRIM	22	301	VDVMLNPGSATSNSVAISVDQRQVKTVRTCTFKNSNPCDFSAGVFGCQYFSSGKYYWEVD	360
rhTRIM	22	301	N.TI...V.....A...F.....R...D...L.....	360
hTRIM	22	361	VSGKIAWILGVHISKISSLNKRKSSGFAFDPSVNYSKVYSRYRPOYGYWVIGLQNTCEYNA	420
rhTRIM	22	361	Y.....P.....V.....AN...K.....	420
hTRIM	22	421	FEDSSSSDPKVLTLFMAVPPCRIGVFLDYEAGIVSFFNVTNHGALIYKFSGCRFSRPAYP	480
rhTRIM	22	421	A.....V...N.....Q....	480
hTRIM	22	481	YFNPWNCLVPMTVCPSS	498
rhTRIM	22	481	Q.....L.Q...	498

B

Abb. 32: Etablierung von TRIM22-Chimären mit Hilfe von internen Restriktionsschnittstellen. Mit Hilfe des Programms CLUSTLX wurden die Aminosäuresequenzen der B30.2-Domäne von hTRIM22 und rhTRIM22 verglichen. Der Bereich, der mit Hilfe der *Bam*HI-Schnittstelle ausgetauscht werden kann, ist grau hinterlegt (A). Die Konstrukte hTRIM22-GFP und rhTRIM22-GFP wurden mit dem Restriktionsenzym *Bam*HI geschnitten und die erhaltenen Fragmente in das verbliebene gegenteilige Konstrukt integriert, so dass die Konstrukte pAcGFP1-N1-hTRIM-rhB30.2(368-498)-22 und pAcGFP1-N1-rhTRIM-hB30.2(368-498)-22 erhalten wurden (B).

Die Konstrukte wurden mit Hilfe von Sequenzanalysen überprüft und nach Midi-Plasmidpräparationen transient in COS-7-Zellen transfiziert. Fluoreszenzmikroskopische

Aufnahmen zeigten, dass das chimärische Konstrukt pAcGFP1-N1-hTRIM-rhB30.2(368-498)-22 wiederum vergleichbare subzelluläre Proteinanhäufungen wie das parentale rhTRIM22 zeigt. Das chimärische Konstrukt pAcGFP1-N1-rhTRIM-hB30.2(368-498)-22 dagegen weist eine vergleichbare subzelluläre Lokalisation wie das parentale hTRIM22 auf (Abb. 33). Somit kann angenommen werden, dass der Bereich von Aminosäure 301-367 nicht für die subzelluläre Lokalisation verantwortlich ist, sondern dass die verantwortlichen Aminosäuren in dem Bereich 368-498 lokalisiert sein müssen.

Abb. 33: Vergleich der subzellulären Lokalisation verschiedener TRIM22-Konstrukte. Die Konstrukte rhTRIM22-GFP, hTRIM-rhB30.2, hTRIM-rhB30.2(368-498)-22 weisen nach transients Transfektion in COS-7-Zellen punktförmige Proteinanhäufungen auf (A), während die gegenteiligen TRIM22-Konstrukte hTRIM22-GFP, rhTRIM-hB30.2, rhTRIM-hB30.2(368-498)-22 diffuse subzelluläre Lokalisation aufweisen (B).

3.2.16 Etablierung weiterer chimärischer Konstrukte mittels gerichteter Mutagenese

Da mit Hilfe der oben beschriebenen chimärischen Konstrukte der für die subzelluläre Lokalisation verantwortliche Bereich von TRIM22 auf die Aminosäuren 368-498 eingeschränkt werden konnte, sollten nun einzelne Aminosäuren mutiert werden. Hierfür

wurde die Methode der gerichteten Mutagenese verwendet, mit deren Hilfe einzelne Aminosäuren von hTRIM22 zu den bei rhTRIM22 auftretenden Aminosäuren mutiert wurden. Die hierfür benötigten Oligonukleotide wurden so gewählt, dass nach durchgeführter Mutagenese-PCR die Aminosäuren an Position 395, 396, 400 (pAcGFP1-N1-hTRIM22-rh395, 396, 400), an Position 476 (pAcGFP1-N1-hTRIM22-rh476) und an Position 488 (pAcGFP1-N1-hTRIM22-rh488) substituiert wurden (Abb. 34).

Abb. 34: Darstellung der durch gerichtete Mutagenese erhaltenen chimärische Konstrukte. Mit Hilfe der gerichteten Mutagenese wurden einzelne Aminosäuren von hTRIM22 zu den bei rhTRIM22 auftretenden Aminosäuren mutiert. Es wurden die chimärischen Konstrukte pAcGFP1-N1-hTRIM22-rh395,396,400, pAcGFP1-N1-hTRIM22-rh476 und pAcGFP1-N1-hTRIM22-rh488 erhalten. Außerdem wurde das Konstrukt pAcGFP1-N1-hTRIM22-rh493,495 mit Hilfe einer PCR mit hTRIM22 als Template und dem für die Amplifikation von rhTRIM22 etablierten Oligonukleotid rhTRIM22.rev generiert.

Nach Sequenzierung und Midi-Plasmidpräparationen wurden HeLa- oder COS-7-Zellen mit den verschiedenen Konstrukten transient transfiziert und die Zellen hinsichtlich der subzellulären Lokalisation der Konstrukte fluoreszenzmikroskopisch untersucht. Es konnte gezeigt werden, dass keine der so etablierten chimärischen Konstrukte eine Veränderung der subzellulären Lokalisation im Vergleich zum parentalen hTRIM22 aufwies. Somit konnte ausgeschlossen werden, dass diese Aminosäuren allein für die subzelluläre Lokalisation verantwortlich sind.

Da die bis dahin erhaltenen Ergebnisse darauf hindeuten, dass keine einzelne Aminosäure für die subzelluläre Lokalisation verantwortlich ist, wurden die Mutationen kombiniert. Dazu wurde eine gerichtete Mutagenese mit den Oligonukleotiden 395,396,400.fw und 395,396,400.rev mit dem chimärischen Konstrukt pAcGFP1-N1-hTRIM-rhB30.2(368-498)-

22 durchgeführt, so dass das in Abbildung 35 dargestellte Konstrukt (A) pAcGFP1-N1-hTRIM-rhB30.2(368-398)h395,396,400-22 erhalten wurde.

A

B

Abb. 35: Etablierung der chimärischen Konstrukte pAcGFP1-N1-hTRIM-rhB30.2(368-498)h395,396,400-22 und pAcGFP1-N1-rhTRIM-hB30.2(368-498)rh395,396,400-22. Mit den Oligonukleotiden 395,396,400.fw und 395,396,400.rev wurde eine gerichtete Mutagenese mit dem Konstrukt pAcGFP1-N1-hTRIM-rhB30.2(368-498)-22 durchgeführt, um das chimärische Konstrukt pAcGFP1-N1-hTRIM-rhB30.2(368-398)h395,396,400-22 zu erhalten (A). Um das gegenteilige Konstrukt pAcGFP1-N1-rhTRIM-hB30.2(368-498)rh395,396,400-22 zu generieren, wurde eine gerichtete Mutagenese mit den Oligonukleotiden rh395,396,400.fw und rh395,396,400.rev an dem Konstrukt pAcGFP1-N1-rhTRIM-hB30.2(368-498)-22 durchgeführt (B).

Fluoreszenzmikroskopische Analysen zeigten, dass die Kombination aus diesen mutierten Aminosäuren tatsächlich zu einer Veränderung der subzellulären Lokalisation im Vergleich mit dem parentalen rhTRIM22 führt. Dieses chimärische Konstrukt weist eine vergleichbare subzelluläre Lokalisation wie das parentale hTRIM22 auf.

Zur weiteren Überprüfung wurde das gegenteilige Konstrukt pAcGFP1-N1-rhTRIM-hB30.2(368-498)rh395,396,400-22 mit den Oligonukleotiden rh395,396,400.fw und rh395,396,400.rev und pAcGFP1-N1-hTRIM-rhB30.2(368-498)-22 als Ausgangsplasmid

etabliert. Nach transienter Transfektion der Midi-Plasmid-DNA in COS-7- oder HeLa-Zellen konnte beobachtet werden, dass dieses chimärische Konstrukt tatsächlich die erwartete punktuelle subzelluläre Lokalisation aufweist wie das parentale rhTRIM22.

Somit konnte bestätigt werden, dass eine Kombination der Aminosäuren aus dem Bereich 301-360 und den Aminosäuren 395, 396 und 400 für die subzelluläre Lokalisation von TRIM22 verantwortlich ist (Abb. 36).

Abb. 36: Zusammenfassung der etablierten und analysierten chimärischen TRIM22-Konstrukte. Dargestellt sind alle untersuchten chimärischen Konstrukte und die beobachtete subzelluläre Lokalisation (diffus oder punktuell). Aminosäurebereiche von hTRIM22 sind jeweils blau, von rhTRIM22 grau markiert.

3.2.17 Analysen zur Proteinstruktur der B30.2-Domäne von TRIM22

Die B30.2-Domäne verschiedener Proteine wurde bereits hinsichtlich der Proteinstruktur untersucht. James et al. (2007) beispielsweise analysierten die Kristallstruktur der B30.2-Domäne von TRIM21 und konnten zeigen, dass die B30.2-Domäne eine β -Faltblattstruktur aufweist. Zwischen den konservierten β -Strängen befinden sich variable Loops. Variable Bereiche wurden von Song et al. (2005b) unabhängig auch für TRIM5 α beschrieben.

Davon ausgehend, dass die B30.2-Domäne von TRIM22 ähnliche Strukturen aufweist, wurden die Aminosäuresequenzen der B30.2-Domänen von TRIM21 und TRIM22 zunächst mit Hilfe des Programms CLUSTALX verglichen. In Abbildung 37 ist der Sequenzvergleich der Proteinsequenzen dargestellt. Des Weiteren wurden die für TRIM21 beschriebenen Proteinstrukturen wie die β -Stränge und die variablen Loops in die Abbildung integriert, so dass dadurch Rückschlüsse auf die Struktur von TRIM22 geschlossen werden können. Weiterhin wurden die von Song et al. (2005b) beschriebenen variablen Bereiche mit eingezeichnet.

Abb. 37: Vergleich der Aminosäuresequenzen der B30.2-Domäne von TRIM21 mit hTRIM22 und rhTRIM22. Die Aminosäuresequenzen der B30.2-Domänen von TRIM21, hTRIM22 und rhTRIM22 wurden mit Hilfe des Programms CLUSTALX miteinander verglichen. Die β -Faltblatt-Strukturen (blaue Pfeile) sowie die variablen Loops (rote Wellen) wurden entsprechend der Bereiche von TRIM21 aus der Publikation von James et al. (2007) eingezeichnet. Die von Song et al. (2005b) beschriebenen variablen Bereiche v1-v4 sind grau hinterlegt. Die Aminosäuresubstitutionen zwischen Mensch und Rhesusaffe sind farblich nach Eigenschaft gekennzeichnet: blau=neutral; rot=basisch; grün=sauer.

Viele Aminosäuresubstitutionen, so genannte Mutationshotspots, befinden sich zwischen hTRIM22 und rhTRIM22 in den variablen Bereichen, insbesondere innerhalb von VL1 und VL3. Interessanterweise weisen einige der hier lokalisierten Aminosäuren im Vergleich zwischen Mensch und Rhesusaffe unterschiedliche Eigenschaften auf. Beispielsweise besitzt hTRIM22 innerhalb der VL1-Region an Position 338 die neutrale Aminosäure Cystein (C), rhTRIM22 weist an dieser Position die basische Aminosäure Arginin (R) auf. An Position 342 besitzt hTRIM22 die neutrale Aminosäure Alanin (A), rhTRIM22 die saure Aminosäure Asparaginsäure (D). Innerhalb der VL3-Region weist hTRIM22 an Position 400 die basische Aminosäure Lysin (K) und rhTRIM22 das neutrale Asparagin (N) auf.

Wird ein 3D-Modell der Proteinstruktur betrachtet (Abb. 38), so wird deutlich, dass VL1 und VL3 einander gegenüber stehen und in der Lage sind, in Wechselwirkung miteinander zu treten. Interessanterweise sind genau die Aminosäuren, für die gezeigt werden konnte, dass diese für die unterschiedlichen subzellulären Lokalisationen von hTRIM22 und rhTRIM22 verantwortlich sind, in den variablen Bereichen VL1 und VL3 lokalisiert. Insbesondere die Aminosäuren, die unterschiedliche Eigenschaften zwischen hTRIM22 und rhTRIM22 aufweisen, weisen im 3D-Modell eine deutliche räumliche Nähe auf. Mit Hilfe weiterer chimärischer Konstrukte muss nun geklärt werden, welche Aminosäuren genau für die Lokalisation verantwortlich sind.

Abb. 38: 3D-Modell der B30.2-Domäne von TRIM21. Die B30.2-Domäne von TRIM21 weist eine β -Faltblattstruktur (Pfeile) mit Loops (farbige Schleifen) zwischen den konservierten β -Strängen auf. TRIM22 weist innerhalb der VL1 (orange) und VL3-Loops (grün) Mutationshotspots auf. Die zu TRIM21 korrespondierenden Aminosäuren, die zwischen hTRIM22 und rhTRIM22 unterschiedliche Eigenschaften aufweisen sind mit 1-3 gekennzeichnet: 1: C338R, neutral-basisch; 2: A342D; neutral-sauer; 3: K400N; basisch-neutral.

3.3 Herstellung von anti-TRIM22-Antikörpern

Bisherige Analysen zur subzellulären Lokalisation von hTRIM22 wurden mit Hilfe überexprimierter Fusionsproteine (GFP, V5/His) durchgeführt. Um Aussagen über die Lokalisation des nativen TRIM22-Proteins treffen zu können, ist es daher sinnvoll, das Protein direkt mit Hilfe eines Antikörpers zu detektieren. Da bisher noch keine anti-TRIM22-Antikörper käuflich zu erwerben sind, sollten im Rahmen dieser Arbeit in Zusammenarbeit mit Dr. med. Ralf Dressel aus der Abteilung „Zelluläre und Molekulare Immunologie“ monoklonale TRIM22-Antikörper etabliert werden.

3.3.1 Etablierung eines GST-TRIM22-Fusionsproteins

Das für die Immunisierungen von Mäusen benötigte TRIM22-Protein sollte in *E. coli*-Zellen überexprimiert und anschließend isoliert werden. Dazu wurde zunächst der offene Leserahmen von hTRIM22 mit den Oligonukleotiden hTRIM22.pGEX.fw und pGEX.h22SPRY.rev amplifiziert und in den Klonierungsvektor pGEM-Teasy ligiert. Nach Transformation, Mini-Plasmidpräparation und anschließender Sequenzierung wurde TRIM22 mit den Restriktionsenzymen *SalI* und *NotI* aus dem pGEM-Teasy-Vektor isoliert und in den ebenfalls mit den genannten Enzymen restringierten Vektor pGEX-4T3 integriert. Da weiterhin geplant war, mit Hilfe des so erhaltenen GST-Fusionsproteins Interaktionsstudien durchzuführen, wurde die *Coiled-Coil*-Domäne mit Hilfe des Restriktionsenzym *XhoI* entfernt. So sollte gewährleistet werden, dass nur Proteine identifiziert werden, die mit der B30.2-Domäne oder der RING- bzw. B-box-Domäne interagieren. Nach erneuter Ligation, Transformation, Mini-Plasmidpräparation und Sequenzanalyse wurde das so erhaltene Konstrukt in BL21-*E. coli*-Zellen mittels Elektroporation transformiert. Um zu überprüfen, ob das GST-TRIM22-cc-Fusionsprotein in *E. coli*-Zellen exprimiert wird, wurde zunächst 10 ml Medium mit den transformierten BL21 Zellen angeimpft. Bei einer OD von 0,5-0,7 wurde 1 ml der Bakterienlösung als Kontrolle vor der Induktion entnommen und die übrige Lösung mit 1 mM IPTG induziert. Nach 4 h Inkubation bei 37°C und 200 rpm in einem Schüttelinkubator wurden die Zellen durch Zentrifugation bei 16000xg und 4°C pelletiert. Das Zellpellet wurde in RIPA-Puffer aufgenommen und durch mehrmaliges Einfrieren bei -80°C und Inkubieren bei 95°C lysiert. Die so gewonnen denaturierten Proteine wurden mittels

SDS-PAGE aufgetrennt und die Proteine mit Hilfe von Coomassie-Färbung detektiert. Es konnte gezeigt werden, dass TRIM22 nach Induktion mit IPTG deutlich exprimiert wird.

3.3.2 Aufreinigung des GST-TRIM22-cc-Fusionsproteins mittels Glutathion-Agarose

Das in *E. coli*-Zellen exprimierte GST-TRIM22-cc-Fusionsprotein sollte mit Hilfe von Glutathion-S-Transferase aus dem Zelllysats aufgereinigt werden.

Dazu wurden 100 ml LB- oder SOB-Medium mit einer Vorkultur GST-TRIM22-cc transformierter BL21-Zellen angeimpft und bis zu einer OD von 0,5 unter Schütteln bei 37°C inkubiert. Nach Zugabe von IPTG wurde weitere 5 h bei 37°C inkubiert. Die Zellen wurden durch Zentrifugieren pelletiert und durch Sonifizieren lysiert. Das Zelllysats wurde nach einem weiteren Zentrifugationsschritt auf die Glutathion-Agarose-Säulen (Sigma) gegeben und die gebundenen Proteine nach mehreren Waschschritten von der Säule eluiert. Mittels SDS-PAGE wurden die Proteine der drei jeweiligen Eluate aufgetrennt und anschließend durch Coomassie angefärbt. Als Kontrollen wurden nicht induzierte BL21-Zellen, Proben aus dem erhaltenen Pellet nach dem Sonifizieren und der so erhaltene Überstand, bevor dieser über die Säule gereinigt wurde, mit aufgetragen.

In Abbildung 39 ist deutlich zu erkennen, dass GST aus den mit dem Plasmid pGEX-4T3 kontrolltransfizierten Zellen erfolgreich mit Hilfe der Glutathion-Agarose-Säulen aufgereinigt werden konnte. GST-TRIM22-cc dagegen konnte nicht eluiert werden. Analysen des Pellets und des Überstandes vor Aufreinigung über die Säule zeigten, dass das GST-TRIM22-cc-Protein nahezu vollständig im Pellet vorlag und nicht im Überstand. Es kann also davon ausgegangen werden, dass GST-TRIM22-cc innerhalb der BL21-Zellen *inclusion bodies* bildet. Durch verschiedene Wachstumsbedingungen der BL21-Zellen sollte die Löslichkeit des GST-TRIM22-cc optimiert werden. Es wurden verschiedene Wachstumstemperaturen (25-37°C), verschiedene IPTG-Konzentrationen (0,2-0,5 mM), verschiedene Induktionszeitpunkte (OD 0,3-1) und unterschiedlich lange Inkubationszeiten nach Induktion mit IPTG getestet. Bei keinem dieser Ansätze konnte eine ausreichende Löslichkeit des GST-TRIM22-cc-Proteins erzielt werden (Daten nicht gezeigt).

Abb. 39: Isolierung von GST-Fusionsproteinen. Mit den Konstrukten pGEX-4T3 und pGEX-4T3-TRIM22-cc transformierte BL21-Zellen wurden mit 0,5 M IPTG induziert und nach 4 h lysiert. Anschließend wurde das Lysat über eine Glutathion-Agarose-Säule aufgereinigt und das Eluat mit Hilfe von SDS-PAGE und Coomassie-Färbung analysiert. Es zeigte sich, dass das TRIM22-Protein im Gegensatz zum GST nicht aufgereinigt werden konnte, sondern unlöslich im Pellet vorlag.

3.3.3 Isolierung von intrazellulären Einschlusskörpern

Wie oben beschrieben, liegt TRIM22 nach Überexpression in *E. coli*-Zellen in großen Mengen unlöslich und missgefaltet in intrazellulären Einschlusskörpern (*inclusion bodies*) vor. Der Vorteil hierbei ist, dass das Protein in großen Mengen durch einfache Verfahren (2.20) isoliert werden kann. Allerdings werden die Proteine in *inclusion bodies* durch nicht-kovalente Kräfte zusammengehalten, so dass das Protein mit Hilfe von hohen Konzentrationen an Harnstoff zur Solubilisierung denaturiert werden muss. Das so erhaltene Protein kann direkt zur Immunisierung der Mäuse verwendet werden, da die hohen Urea-Konzentrationen bereits als Adjuvants wirken. Für Interaktionsstudien kann das so erhaltene Protein jedoch nur nach erfolgreicher Rückfaltung verwendet werden.

Für die Isolierung des GST-TRIM22-cc-Proteins wurde 1 l Bakterienkultur verwendet. Die *inclusion bodies* wurden wie unter 2.20 beschrieben isoliert und das GST-TRIM22-cc-Protein

durch 8 M Urea-Lösung solubilisiert. Das so erhaltene denaturierte Protein wurde mittels SDS-PAGE und anschließender Coomassie-Färbung analysiert. Als Kontrollen wurde Bakterienlysat ohne Induktion durch IPTG, nach Induktion durch IPTG ohne Aufreinigung der *inclusion bodies* und das nach Solubilisierung verbliebene Pellet mit aufgetragen. Aus Abbildung 40 wird deutlich, dass große Mengen GST-TRIM22-cc-Protein isoliert werden konnten.

Um die Konzentration des Proteins zu bestimmen, wurde eine BSA-Standard-Reihe von 100 ng, 1 µg, 5 µg und 10 µg mit aufgetrennt. Das GST-TRIM22-cc-Protein wurde dabei in verschiedenen Mengen aufgetragen und die Bandenintensitäten nach der Coomassie-Färbung mit denen der BSA-Reihe verglichen. In dem in Abbildung 40 dargestellten Fall wurden 9 ml TRIM22-Protein mit einer Konzentration von 2 µg/µl aus den intrazellulären Einschlusskörpern isoliert.

Abb. 40: Isolierung von TRIM22-Protein aus intrazellulären Einschlusskörpern. Aus 1 l Bakterienkultur wurden die intrazellulären Einschlusskörper isoliert und das GST-TRIM22-cc-Fusionsprotein mit Hilfe von 8 M Urea-Lösung solubilisiert. **A:** Mittels SDS-PAGE und anschließender Coomassie-Färbung wurde die erfolgreiche Aufreinigung von TRIM22 überprüft. Als Kontrollen wurde Zelllysat vor Induktion mit IPTG, nach Induktion mit 0,5 M IPTG und das nach dem letzten Zentrifugationsschritt erhaltene Pellet aufgetragen. **B:** Zur Bestimmung der TRIM22-Proteinkonzentration wurden 5 µl, 1 µl, 0,5 µl und 0,1 µl Proteinlösung zusammen mit verschiedenen BSA-Konzentrationen (10 µg, 5 µg, 1 µg, 100 ng) mittels SDS-PAGE aufgetrennt und durch Coomassie gefärbt.

3.3.4 Immunisierung von Mäusen

Für die Immunisierung wurden Mäuse der Stämme Balb/c, C3H und C57BL/6 drei-vier Mal im Abstand von 10-14 Tagen mit jeweils 100 µg TRIM22-Protein in 8 M Urea peritoneal immunisiert. Nach der dritten Immunisierung wurde den Mäusen Blut entnommen und das Serum mittels ELISA auf das Vorhandensein von Antikörpern gegen TRIM22 hin analysiert.

3.3.5 Überprüfung der Seren mittels ELISA

Für die Analyse der Seren der mit TRIM22 immunisierten Mäuse mittels ELISA wurden zunächst 96-Well-Platten mit 0,5 µg TRIM22-Protein in Coating-Puffer beschichtet. Nach Sättigung der unspezifischen Bindungsstellen mit Hilfe von 1%iger Gelatine wurden die Seren in 1:10-1:1280 Verdünnung in die 96-Well-Platte pipettiert. Als Negativkontrolle wurden die Seren der Mäuse vor der Immunisierung (Nullserum) verwendet. Nach Inkubation und mehrmaligem Waschen wurde ein Peroxidase-gekoppelter Ziege-anti-Maus-Antikörper hinzu gegeben und für 2 h bei 37°C inkubiert. Um Antikörperrückstände vollständig zu entfernen, wurde gründlich (mindestens 5x) mit 1x PBS gewaschen und anschließend die Substratlösung hinzugegeben. Nach wenigen Minuten konnte der Farbumschlag mit Hilfe eines ELISA-Readers bei einer OD von 405 gemessen werden.

In Abbildung 41 ist das Ergebnis des ELISA dargestellt. Da es keinen Unterschied zwischen den einzelnen Verdünnungen gab, wurde hier nur die Verdünnung 1:40 dargestellt. Bei allen drei Mausstämmen ist ein deutlicher Unterschied zwischen Nullseren und Seren nach dreimaliger Immunisierung erkennbar, so dass von einer erfolgreichen Immunisierung der Mäuse ausgegangen werden kann. Weiterhin konnte kein Unterschied in der Reaktivität der Seren zwischen den einzelnen Mausstämmen festgestellt werden, so dass die drei Mäuse der verschiedenen Stämme für die Herstellung monoklonaler Antikörper verwendet werden konnten.

Abb. 41: ELISA zur Ermittlung von TRIM22-Antikörpern im Serum immunisierter Mäuse. Je eine Maus der Stämme Balb/c, C3H und C57BL/6 wurde drei Mal im Abstand von 10-14 Tagen mit 100 µg TRIM22-Protein peritoneal immunisiert. 10 Tage nach der dritten Immunisierung wurde aus dem Blut der Mäuse Serum gewonnen und ein ELISA durchgeführt. Als Kontrolle wurde das Serum der Mäuse vor Immunisierung (Nullserum) verwendet.

Die Seren wurden aliquotiert, bei -20°C eingefroren und können als polyklonale anti-TRIM22-Antikörper verwendet werden.

3.3.6 Immunoblot-Analyse mit polyklonalem anti-TRIM22-Antikörper

Um zu testen, ob der polyklonale anti-TRIM22-Antikörper für Immunoblot-Analysen verwendet werden kann, wurden HEK293T-Zellen transient mit hTRIM22-GFP und rhTRIM22-GFP transfiziert und die Proteine 24 h nach Transfektion mit Hilfe von RIPA-Puffer lysiert. Die so erhaltenen Proteine wurden mittels SDS-PAGE aufgetrennt und die anschließende Immunoblot-Analyse mit einer 1:5000-Verdünnung des polyklonalen anti-TRIM22-Antikörpers in Blocklösung III bei 4°C üN durchgeführt. Anschließend wurde 2 h bei RT mit HRP-gekoppeltem Sekundärantikörper inkubiert.

Es zeigte sich, dass ein deutliches Signal in der erwarteten Größe von 84 kDa (TRIM22+GFP) erhalten wurde, so dass davon ausgegangen werden kann, dass der polyklonale anti-TRIM22-Antikörper an das transfizierte, überexprimierte TRIM22 spezifisch bindet. Weiterhin konnte ein schwaches Signal in der Höhe von 57 kDa beobachtet werden, was vermutlich dem nativen TRIM22 der HEK293T-Zellen entspricht. Allerdings ist ein

deutlicher unspezifischer Hintergrund zu erkennen, woraus geschlossen werden kann, dass der polyklonale anti-TRIM22-Antikörper neben TRIM22 auch weitere Proteine unspezifisch bindet (Abb. 42).

Abb. 42: Immunoblot-Analyse mit polyklonalem anti-TRIM22-Antikörper. Mit hTRIM22-GFP oder rhTRIM22-GFP transient transfizierte HEK293T-Zellen wurden mit Hilfe von RIPA-Puffer lysiert und die erhaltenen Proteine mittels SDS-PAGE aufgetrennt. Die folgende Immunoblot-Analyse wurde mit polyklonalem anti-TRIM22-Antikörper und HRP-gekoppeltem Sekundärantikörper durchgeführt.

3.3.7 Indirekte Immunzytochemie mit polyklonalem anti-TRIM22-Antikörper

Um herauszufinden, ob der polyklonale anti-TRIM22-Antikörper für indirekte immunzytochemische Experimente verwendet werden kann, wurden COS-7- und HeLa-Zellen auf beschichteten Objektträgern ausgesät und transient mit hTRIM22-GFP transfiziert. Nach 24-48 h wurden die Zellen mit Hilfe von 3% Paraformaldehyd fixiert, mit 1% Triton X-100 permeabilisiert und die unspezifischen Bindungsstellen durch 5% BSA abgesättigt. Der polyklonale anti-TRIM22-Antikörper wurde 1:400 in 0,5% BSA verdünnt und die Zellen üN bei 4°C mit dieser Lösung inkubiert. Mittels eines TRITC-gekoppelten

Sekundärantikörpers konnte die Bindung des Antikörpers an TRIM22 visualisiert werden. Die Zellkerne wurden mit Hilfe von DAPI markiert.

Es zeigte sich, dass der polyklonale Antikörper in COS-7- spezifisch an das transfizierte hTRIM22-GFP bindet. In untransfizierten Zellen konnte eine diffuse zytoplasmatische Verteilung von TRIM22 beobachtet werden (Abb. 43).

Abb. 43: Indirekte Immunzytochemie mit polyklonalem anti-TRIM22-Antikörper. Transient mit hTRIM22-GFP transfizierte COS-7-Zellen wurden 48 h nach der Transfektion fixiert und eine indirekte Immunzytochemie mit polyklonalem anti-TRIM22-Antikörper durchgeführt. Es zeigte sich, dass der Antikörper spezifisch an das transfizierte hTRIM22-GFP bindet. In untransfizierten Zellen lokalisiert das native TRIM22 diffus im Zytoplasma.

Kofärbung mit FITC-gekoppeltem anti- α -Tubulin-Antikörper zeigt eine deutliche Kolokalisation zwischen dem nativen TRIM22 und α -Tubulin. Allerdings konnte beobachtet werden, dass TRIM22 weniger feine Filamente aufweist als die Mikrotubuli, dennoch ist eine deutliche Kolokalisation erkennbar (Abb. 44).

Abb. 44: TRIM22 kolokalisiert mit Mikrotubuli. HeLa-Zellen wurden auf beschichteten Objektträgern ausgesät, fixiert und TRIM22 mit polyklonalem anti-TRIM22-Antikörper und TRITC-gekoppeltem Sekundärantikörper visualisiert. Die Mikrotubuli wurden mittels FITC-gekoppeltem anti- α -Tubulin-Antikörper angefärbt, die Zellkerne mit DAPI sichtbar gemacht. In der Überlagerung ist deutlich die Kolokalisation zwischen TRIM22 und den Mikrotubuli zu erkennen.

3.3.8 Herstellung monoklonaler Antikörper

Da polyklonale Antikörper häufig unspezifisch binden und die Menge an polyklonalem Antikörper besonders bei Mäusen begrenzt ist, sollten monoklonale anti-TRIM22-Antikörper etabliert werden.

Für die Herstellung monoklonaler Antikörper wurde die Maus des C3H-Stammes ein weiteres Mal mit 100 µg TRIM22-Protein immunisiert. Drei Tage nach dieser Immunisierung wurde Blut entnommen und anschließend nach cervicaler Dislokation die Milz entfernt. Aus dem entnommenen Blut wurde Serum gewonnen, als Aliquots bei -20°C gelagert und als polyklonaler TRIM22-Antikörper verwendet. Die Milz wurde in DMEM ohne Zusätze mit Hilfe eines Dounce-Homogenisators homogenisiert und die erhaltenen Zellen wie in Abschnitt 3.3.8.1 beschrieben mit Myelomzellen fusioniert. Die Zellen wurden zwei Wochen in HAT-Medium auf Hybridomzellen selektioniert, anschließend für einige Tage in HT-Medium und danach in DMEM-Vollmedium kultiviert.

3.3.8.1 Analyse der Hybridomzellen mittels ELISA

Um die erhaltenen Hybridomzellen auf die Bildung von Antikörpern hin zu testen, wurden ELISA-Analysen durchgeführt. Hierzu wurden 96-Well-Schalen mit dem für die Immunisierung verwendeten Protein beschichtet. Nach Absättigung der unspezifischen Bindungsstellen durch 1% Gelatine wurden 50 µl der Überstände der zu testenden Hybridomzellen hinzu gegeben. Es wurden diejenigen Zellen zum Testen ausgewählt, die ein deutliches Wachstum aufweisen konnten. Als Positivkontrolle wurde der polyklonale anti-TRIM22-Antikörper verwendet. Nach Inkubation mit den Überständen wurde mit Hilfe eines HRP-gekoppelten Ziege-anti-Maus-Antikörpers und ABTS-Lösung die ELISA-Reaktion durchgeführt. Als positiv wurden diejenigen Ereignisse gewertet, die mit der Positivkontrolle vergleichbare Werte aufwiesen. In dem hier dargestellten Beispiel (Abb. 45) wurden alle Ereignisse mit Werten <150 als positiv eingestuft. Diese Zellen wurden anschließend in 48-Well-Schalen überführt, um nach und nach eine größere Anzahl an eventuell Antikörper produzierenden Zellen zu erhalten.

Abb. 45: Beispiel eines ELISA-Tests zur Analyse der Antikörper-produzierenden Hybridome. Mit den Überständen von gut proliferierenden Hybridomzellen wurde eine ELISA-Analyse durchgeführt. Als Positivkontrolle wurde der polyklonale anti-TRIM22-Antikörper verwendet (Stern, rote Markierung). Alle Ergebnisse mit Werten über 150 wurden als positiv gewertet.

3.3.8.2 Analyse der Überstände von Hybridomzellen mittels Immunoblot

Positiv im ELISA getestete Hybridomzellen wurden zunächst von 96-Well-Schalen in 48-Well-Schalen dann in 24-Well-Schalen überführt und einige Tage kultiviert, um eine ausreichende Anzahl an Antikörper-produzierenden Zellen zu erhalten. Der so erhaltene Überstand (etwa 1 ml) wurde für Immunoblot-Analysen verwendet. Da für die Immunisierung der Mäuse ein GST-Fusionsprotein verwendet wurde, konnte davon ausgegangen werden, dass viele im ELISA positiv auf Antikörperproduktion getestete Hybridomzellen Antikörper gegen den GST-Anteil des Proteins bilden. Um nun diejenigen Hybridomzellen zu identifizieren, die Antikörper gegen TRIM22 bilden, wurde für die Immunoblot-Analyse

Zelllysate von HEK293T-Zellen verwendet, die mit TRIM22-GFP transfiziert wurden. Weiterhin wurde Zelllysate von untransfizierten Zellen verwendet, um zu testen, ob der Antikörper ebenfalls mit dem nativen TRIM22 reagiert. Das Zelllysate aus untransfizierten und mit TRIM22 transfizierten HEK293T-Zellen wurde mittels SDS-PAGE aufgetrennt. Für die Immunoblot-Analyse wurde der Antikörper enthaltende Überstand der Hybridomzellen 1:1 mit 5% Milchpulver verdünnt und damit die Membran in bei 4°C inkubiert. Nach Inkubation (2 h RT) mit dem HRP-gekoppelten Sekundärantikörper konnte gezeigt werden, dass etwa ein Drittel der getesteten Zellüberstände sowohl an das transfizierte hTRIM22-GFP als auch an das native TRIM22 der HEK293T-Zellen binden (Abb. 46).

Abb. 46: Immunoblot-Analyse mit Überständen der im ELISA positiv getesteten Hybridomzellen. HEK293T und mit hTRIM22-GFP transfizierte HEK293T wurden mit Hilfe von RIPA-Puffer lysiert und die Proteine mittels SDS-PAGE aufgetrennt. In einer anschließenden Immunoblot-Analyse wurden die Überstände der im ELISA positiv getesteten Hybridomzellen auf anti-TRIM22-Antikörperproduktion hin getestet. Es zeigte sich, dass TRIM22 (transfiziert, 84 kDa und nativ, 57 kDa) tatsächlich durch die eingesetzten Überstände detektiert wird.

Da die bisher kultivierten Hybridomzellen noch nicht klonal vorliegen, werden die positiv auf Antikörperproduktion getesteten Zellen mit Hilfe einer *Limiting Dilution* kloniert (2.26.1) und können anschließend nach erneuter Analyse mittels Immunoblot für weitere Versuche eingesetzt werden.

3.4 Untersuchungen zur Apoptose

Apoptose ist die häufigste Form von Zelltod im Organismus. In der Wissenschaft wird zwischen zwei Arten des Zelltodes unterschieden: Apoptose und Nekrose. Nekrose tritt auf, wenn eine Schädigung von Gewebe oder der Zelle von außen vorliegt. Die Apoptose wird als Reaktion auf einen Stimulus von der betreffenden Zelle selbst ausgeführt. Mit Hilfe eines Mikroskops lassen sich apoptotische Zellen leicht von nekrotischen unterscheiden: die Apoptose zeichnet sich durch Schrumpfen der Zelle, Zerteilung der DNA durch Endonukleasen und durch Ausbildung von membranumschlossenen Vesikeln aus, während bei der Nekrose die Zellen anschwellen, die Plasmamembran zerstört wird und das Zytosol und die Zellorganellen in den Interzellulärraum freigesetzt werden.

3.4.1 Beobachtung morphologischer Veränderungen von HeLa-Zellen nach Transfektion mit hTRIM22

HeLa-Zellen wurden transient mit hTRIM22-GFP transfiziert und täglich mit Hilfe des AxioObserver-Mikroskops beobachtet. Das verwendete Mikroskop ist dafür geeignet, lebende Zellen in den Kulturschalen zu untersuchen. Es konnte beobachtet werden, dass die mit hTRIM22-GFP transfizierten Zellen nach 2 Tagen eine Veränderung ihrer Morphologie aufwiesen. Die Zellen wurden rund und lösten sich vom Untergrund ab. Im Gegensatz dazu wurden in den Schalen mit rhTRIM22-GFP und GFP transfizierten Zellen nur wenige Zellen beobachtet, die sich ebenfalls vom Untergrund lösten (Abb. 47). Da apoptotische Zellen vergleichbare morphologische Veränderungen aufweisen, sollte untersucht werden, ob hTRIM22 bei Überexpression Apoptose induziert.

Abb. 47: Analysen zur Morphologie von transient transfizierten HeLa-Zellen. HeLa-Zellen wurden transient mit den Konstrukten hTRIM22-GFP und rhTRIM22-GFP transfiziert und die lebenden Zellen täglich mit dem AxioObserver analysiert. 30 h nach Transfektion zeigte sich, dass viele hTRIM22-GFP positive Zellen Änderungen ihrer Morphologie aufwiesen und sich vom Untergrund ablösten, während bei rhTRIM22-GFP positiven Zellen deutlich weniger dieses Phänomen zeigten.

3.4.2 Nachweis der Apoptose mittels Annexin V

Ein frühes Zeichen der Apoptose ist der Verlust der Asymmetrie der Plasmamembran. Phosphatidylserin (PS), das normalerweise auf der zytoplasmatischen Innenseite der Membran lokalisiert ist, tritt während der Apoptose vermehrt in der nach außen gerichteten Membranseite auf. Annexin V bindet in Gegenwart von Ca^{2+} spezifisch an Phosphatidylserin. Somit können durch Annexin V, an das ein Fluoreszenzfarbstoff gekoppelt ist, apoptotische Zellen durchflusszytometrisch bzw. fluoreszenzmikroskopisch nachgewiesen werden.

3.4.2.1 Qualitativer Nachweis der Apoptose am Fluoreszenzmikroskop

Für den Nachweis der Apoptose mittels Fluoreszenzmikroskopie wurden COS-7-Zellen transient mit hTRIM22 und rhTRIM22 transfiziert. Nach 48 h wurden die Zellen mit Hilfe von Trypsin vom Schalenboden abgelöst und nach Waschen mit PBS auf Poly-L-Lysin

beschichtete Objektträger gegeben. Die Zellen wurden mehrmals mit Ca^{2+} -haltigem Bindungspuffer gewaschen und anschließend mit Annexin V-Cy3.18 inkubiert. Nach weiteren Waschschritten wurden die Zellen mit Deckgläschen überschichtet und sofort mit Hilfe eines Fluoreszenzmikroskops untersucht. Durch Anlagerung von Annexin V-Cy3.18 an apoptotische Zellen konnten diese von gesunden Zellen unterschieden werden (Abb. 47). Bei einer 100 fachen Vergrößerung wurden in fünf zufällig ausgewählten Bildausschnitten die Anzahl der GFP positiven sowie die Anzahl der GFP und Annexin V positiven Zellen bestimmt. Es zeigte sich, dass ein Drittel aller hTRIM22 positiven Zellen auch Annexin V-Cy3.18 positiv und somit apoptotisch waren.

Abb. 47: Nachweis von Apoptose mittels Annexin V-Cy3.18 am Fluoreszenzmikroskop. COS-7-Zellen wurden transient mit hTRIM22-GFP transfiziert, nach 48 h trypsiniert und auf Poly-L-Lysin beschichteten Objektträgern adhärirt. Nach Färbung mit Annexin V-Cy3.18 wurden die Zellen fluoreszenzmikroskopisch analysiert. Apoptotische Zellen zeigten eine rote Membranfärbung, lebende Zellen waren nicht mit Annexin V-Cy3.18 gefärbt. Ein Drittel der hTRIM22-GFP positiven (grün) COS-7-Zellen war apoptotisch (rot).

3.4.2.2 Quantitativer Nachweis der Apoptose mittels Durchflusszytometrie

Um quantitative Aussagen über die Anzahl der apoptotischen Zellen einer Zellpopulation machen zu können, wurden durchflusszytometrische Analysen durchgeführt. Hierbei wurde ausgenutzt, dass nicht nur die Anzahl der apoptotischen Zellen in der Gesamtpopulation bestimmt werden sondern dass außerdem gezielt die GFP-positiven Zellen auf die Anzahl apoptotischer Zellen hin analysiert werden konnte. Somit konnte genau bestimmt werden, wie viele Zellen sowohl GFP-positiv als auch Annexin V-positiv und somit apoptotisch waren.

Für die durchflusszytometrische Analyse wurden HeLa-Zellen zunächst mit hTRIM22-GFP, rhTRIM22-GFP und als Kontrolle mit pAcGFP1-N1 transient transfiziert. Weiterhin wurden als Negativkontrolle untransfizierte HeLa-Zellen verwendet, die ebenfalls mit dem Transfektionsreagenz Metafectene inkubiert wurden. Nach 24 h, 48 h und 72 h wurden die Zellen mit Hilfe von Trypsin vom Schalenboden abgelöst, mit PBS gewaschen und mit Annexin V-PE und 7-AAD markiert. Als Kontrollen wurden jeweils unmarkierte und nur mit Annexin V-PE oder 7-AAD markierte Zellen eingesetzt. Um die Anzahl falsch positiver Zellen zu reduzieren, wurde die Messung innerhalb 1 h nach der Färbung an einem Durchflusszytometer (BD) durchgeführt. Die Auswertung erfolgte mit Hilfe des Programms FlowJo 8.7.1. In Abbildung 48 ist die Vorgehensweise der Analyse schematisch dargestellt. Die Analyse erfolgte auf lebende GFP-positive Zellen. Anhand von unmarkierten GFP-positiven Zellen wurden vier Quadranten so gewählt, dass 95% der Ereignisse im linken unteren Quadranten zum liegen kamen. Der Quadrant unten links (LL, *lower left*) beinhaltete die GFP-positiven aber 7-AAD und Annexin V-PE negativen Ereignisse, der Quadrant unten rechts (LR, *lower right*) umfasste GFP positive und Annexin V-PE positive Ereignisse, der Quadrant oben links (UL, *upper left*) die GFP und 7-AAD positiven und der Quadrant oben rechts (UR, *upper right*) GFP, Annexin V-PE und 7-AAD positive Ereignisse. Diese Auswahl wurde für alle übrigen zu analysierenden Messungen eines Versuches übernommen.

Abb. 48: Schematischer Ablauf einer Auswertung der durchflusszytometrischen Daten. HeLa-Zellen wurden transient mit GFP-Expressionskonstrukten transfiziert. Nach 24-72 h wurden die Zellen mit Hilfe von Trypsin vom Schalenboden abgelöst. Für jede Transfektion wurden 4 Messröhrchen benötigt: unmarkierte Zellen, mit 7-AAD, mit Annexin V-PE und mit 7-AAD und Annexin V-PE inkubierte Zellen. (A): Die lebende Zellpopulation wurde im FSC/SSC-*Dot-Blot* bestimmt. (B): Die Population der GFP-positiven Zellen wurde zur weiteren Analyse ausgewählt. (C-F): Die Anzahl der GFP-positiven, apoptotischen Zellen sollte analysiert werden. Dafür wurden die vorher ausgewählten Ereignisse hinsichtlich ihrer PE- (Annexin V) und 7-AAD-Fluoreszenz analysiert. Die Auswahl der Quadranten erfolgte im *Dot-Blot* einer unmarkierten, GFP-positiven Population (C) und wurde auf alle zu analysierenden Messungen eines Versuches übertragen (D-F).

Anhand der so erhaltenen Daten konnte anschließend die prozentuale Anzahl der GFP-positiven, apoptotischen Zellen bestimmt werden. Die Darstellung dieser Daten in einem Histogramm (Abb. 49), in dem die Rate der Annexin V-PE positiven Zellen der verschiedenen Transfektanten überlagert wurde, verdeutlicht die erhaltenen Ergebnisse. Alle Versuche wurden mindestens drei Mal wiederholt und zeigten jedes Mal die gleiche Tendenz. Am Beispiel eines repräsentativen Versuches wird bei Betrachtung der mittleren Fluoreszenzintensitäten (MFI) im Histogramm deutlich, dass HeLa-Zellen, die mit hTRIM22 transient transfiziert wurden, eine höhere Apoptoserate aufweisen (MFI=187), als HeLa-

Zellen, die mit der GFP-Kontrolle (MFI=10) oder rhTRIM22 (MFI=45) transfiziert wurden. Nach 24 h wurden allerdings nur geringe Unterschiede in der Apoptoserate der unterschiedlichen Transfektanten mit MFI-Werten von 25 (pAcGFP1-N1), 28 (rhTRIM22) und 32 (hTRIM22) festgestellt.

hTRIM22 induziert demnach bei Überexpression Apoptose, während dieser Effekt bei rhTRIM22 deutlich geringer ist.

Abb. 49: Nachweis der Apoptoseinduktion durch Überexpression von hTRIM22. Die verschiedenen Transfektanten (pAcGFP1-N1, hTRIM22-GFP und rhTRIM22-GFP) wurden hinsichtlich der Anzahl der apoptotischen (Annexin V-PE-positiven) Zellen untersucht. Die Ergebnisse wurden als Histogramm dargestellt, in dem die einzelnen Transfektanten überlagert wurden. Als Kontrolle wurden untransfizierte, mit Metafectene behandelte HeLa-Zellen mit dargestellt (grau hinterlegt). 24 h nach Transfektion konnten kaum Unterschiede in der Apoptoserate beobachtet werden, nach 48 h wird deutlich, dass hTRIM22-GFP Apoptose induziert.

3.4.3 Zellproliferationsassay

Da apoptotische Zellen nicht mehr proliferieren, kann angenommen werden, dass Unterschiede in der Proliferationsrate zwischen Apoptose induzierten und gesunden Zellen bestehen. Somit ist anzunehmen, dass mit hTRIM22 transfizierte Zellen weniger stark proliferieren als nicht bzw. kontroll-transfizierte (z.B. GFP) Zellen. Um den Unterschied in der Proliferationsrate zu messen, wurde der Proliferationsassay EZ4U (Biomedica) benutzt. Hier wird ausgenutzt, dass lebendige Zellen dazu in der Lage sind, das schwach gefärbte Tetrazoliumsalz in intensiv gefärbte Formazanderivate umzuwandeln. Je mehr lebende Zellen also vorhanden sind, desto stärkerer Farbumschlag ist messbar.

In 96-Well Platten wurden 3×10^3 Zellen ausplattiert und nach etwa 12 h transient mit den Expressionskonstrukten hTRIM22-GFP, hTRIM22-V5/His, rhTRIM22-GFP und rhTRIM22-V5/His transfiziert. Als Kontrollen wurden pAcGFP1-N1 als Leervektor transfiziert und untransfizierte Zellen verwendet. Es wurden verschiedene Zelllinien (HeLa, HEK293T, COS-7, K562) hinsichtlich ihrer Proliferation nach Transfektion untersucht. Nach 24 h, 48 h und 72 h wurden Messungen durchgeführt.

Aufgrund der starken Hintergrundfärbung dieses Testes bei einer zu großen Zellzahl konnten nur wenige Zellen ausgesät werden. Wegen der geringen Anzahl an Zellen und der teilweise geringen Transfektionseffizienz waren die Ergebnisse des Proliferationsassays jedoch nicht reproduzierbar. Einige Messungen zeigten zwar die erwarteten Ergebnisse mit einer Reduzierung der Proliferation bei TRIM22 transfizierten Zellen, aber in allen fünf unabhängig von einander durchgeführten Experimenten wurden unterschiedliche Werte erhalten. Es kann also davon ausgegangen werden, dass diese Art von Proliferationsassay nicht für die hier benötigten Zwecke geeignet ist.

4 Diskussion

4.1 Evolution von *TRIM*-Genen

Gene, die in die Immunantwort involviert sind, zeichnen sich häufig durch eine schnelle Evolution aus, da sich das Immunsystem in einem ständigen Wettrüsten gegen verschiedene Pathogene befindet. Evolutionäre Analysen sind daher ein nützlicher Ansatz, um Proteine zu identifizieren und zu charakterisieren, die in die Immunantwort involviert sind. Weiterhin lassen sich so Regionen innerhalb eines Proteins identifizieren, die für Wirt-Pathogen-Interaktionen verantwortlich sind. Die Identifizierung von genetischen Konflikt-Signaturen kann neue Wege eröffnen, um durch biologische Versuche Hypothesen bezüglich der Funktion der Wirts-Proteine zu testen. Beispiele für den Erfolg solcher Vorgehensweisen sind die antiretroviralen Abwehrgene *APOBEC3G*, ein Gen, das für eine Cytidin-Deaminase kodiert, die die virale DNA hypermutiert (Sawyer et al., 2004; Sheehy et al., 2002; Zhang und Webb, 2004), und *TRIM5 α* , das einen retroviralen Restriktionsfaktor darstellt, der am viralen Capsid ansetzt (Sawyer et al., 2005; Stremlau et al., 2004). Beide Gene weisen eine positive Selektion auf, die zur rapiden Fixierung von adaptiven Aminosäuresubstitutionen geführt hat. Insbesondere eine Region, die B30.2-Domäne, von *TRIM5 α* weist eine rapide Evolution innerhalb der Primaten auf, sowohl bezüglich Aminosäuresubstitutionen als auch im Hinblick auf Sequenzverlängerungen (Sawyer et al., 2005). Es wurde nachgewiesen, dass die B30.2-Domäne von *TRIM5 α* für die spezies-spezifische Resistenz gegenüber Retroviren essentiell ist (Stremlau et al., 2005). Während das *TRIM5 α* des Rhesusaffen in der Lage ist, Infektionen mit HIV zu verhindern, inhibiert das *TRIM5 α* -Protein des Menschen beispielsweise N-MLV (Perron et al., 2004).

Für weitere *TRIM*-Proteine konnte ebenfalls gezeigt werden, dass sie antivirale Aktivität besitzen. Beispielsweise wird die Transkription mehrerer *TRIM*-Gene (*TRIM22*, *TRIM19*) durch Typ I Interferon stimuliert (Barr et al., 2008; Gongora et al., 2000; Orimo et al., 2000; Rhodes et al., 2002). Für *TRIM34* konnte gezeigt werden, dass es in gewissem Maße Infektionen mit SIV inhibiert (Zhang et al., 2006) und *TRIM32* interagiert mit dem Tat-Protein von HIV-1 und HIV-2 (Fridell et al., 1995). *TRIM1* restringiert, wie auch *TRIM5 α* , N-MLV-Infektionen und eine Überexpression von *TRIM19* führt zur Resistenz gegenüber CMV (Zytomegalie-Virus), VSV (Vesicular-Stomatitis-Indiana-Virus), HSV (Herpes-

Simplex-Virus) und Influenzavirus A (Chelbi-Alix et al., 1998; Everett et al., 2006; Tavalai et al., 2006).

Diese Überlegungen lassen vermuten, dass Pathogene die Evolution gewisser TRIM-Proteine beeinflusst haben. Aus diesem Grund ist es ein viel versprechender Ansatz, zunächst die Evolution von Genen zu untersuchen und anschließend positiv selektionierte Gene funktionell zu analysieren. Ziel dieser Arbeit war es daher, weitere *TRIM*-Gene zu identifizieren, die eine rapide Evolution aufweisen und somit eventuell in die Immunantwort involviert sind. Dabei wurden diejenigen *TRIM*-Gene untersucht, die eine identische Domänenstruktur aufweisen wie *TRIM5 α* , da ähnliche Proteine häufig vergleichbare Funktionen aufweisen. *TRIM5 α* besitzt neben dem namensgebenden *Tripartite Motif* (RING-, B-box- und Coiled-Coil-Domäne, RBCC) wie etwa 60% aller *TRIM*-Gene die zusätzliche C-terminale B30.2-Domäne. *TRIM*-Gene sind über das gesamte Genom verstreut, allerdings existieren zwei *TRIM*-Gen-Cluster mit B30.2-Domäne: ein Cluster ist auf Chromosom 11 (11p15) lokalisiert und umfasst neben *TRIM5 α* außerdem die *TRIM*-Gene *TRIM6*, *TRIM21*, *TRIM22* und *TRIM34*. Ein weiteres Cluster befindet sich auf Chromosom 6 (6p21.33) innerhalb des MHC. Hier sind *TRIM10*, *TRIM15*, *TRIM26*, *TRIM27* und *TRIM39* lokalisiert.

Beide Cluster sind interessant für evolutionäre Analysen: das 11p15-Cluster beinhaltet *TRIM*-Gene, über die bereits im antiviralen Kontext berichtet wurde (*TRIM5 α* , *TRIM22*, *TRIM34*) und das 6p21.33-Cluster ist innerhalb der hochpolymorphen MHC-Region lokalisiert. Die MHC-Region weist eine hohe Gendichte auf und etwa 40% aller exprimierten Loci sind mit dem Immunsystem assoziiert (Kelley und Trowsdale, 2005). Da der MHC viele Cluster verwandter Gene umfasst, eignet er sich als Modell, um die Genetik und Evolution von Multi-Gen-Familien zu untersuchen.

Untersuchungen zur phylogenetischen Verwandtschaft der TRIM-Proteine des 11p15- und MHC-Cluster des Menschen zeigen, dass diejenigen *TRIM*-Gene, die auf einem Chromosom lokalisiert sind, auch eng miteinander verwandt sind. Diese Tatsache deutet auf Genduplikation innerhalb der *TRIM*-Gen-Cluster hin. Solche Genduplikationen können zur Folge haben, dass ein Gen die ursprüngliche Funktion beibehält, während die weiteren Gene dieses Clusters sich weiter entwickeln können und andere Funktionen erlangen.

Um herauszufinden, ob neben *TRIM5 α* weitere *TRIM*-Gene mit der RBCC-B30.2-Domänenstruktur positiv selektionierte sind, wurden die Vollängen-Sequenzen von den *TRIM*-Genen des 11p15- und MHC-Clusters zwischen Mensch und Rhesusaffe verglichen und hinsichtlich der synonymen (keine Aminosäureänderung) und nichtsynonymen (Aminosäureänderung) Substitutionen analysiert. Hierbei wurde zum einen die Anzahl der

Substitutionen verschiedener *TRIM*-Gene verglichen, zum anderen das Verhältnis der synonymen zu nichtsynonymen Substitutionen ermittelt. Die dN/dS-Verhältnisse können als Information über evolutionäre Prozesse dienen, da auf diese Weise die An- oder Abwesenheit eines Selektionsdrucks ermittelt werden kann (Gillespie, 1984; Miyata und Yasunaga, 1980). Bei Werten >1 kann auf eine gerichtete positive Selektion geschlossen werden, bei der nichtsynonyme Substitutionen zu einem evolutionären Vorteil führten und in der Aminosäuresequenz fixiert wurden. Ein dN/dS-Verhältnis <1 weist dagegen auf eine gerichtete negative Selektion hin, hier wurde die bestehende Aminosäuresequenz beibehalten, da nichtsynonyme Substitutionen keinen evolutiven Vorteil erbrachten (Miyata und Yasunaga, 1980).

Im Rahmen dieser Arbeit wurde gezeigt, dass unterschiedliche evolutionäre Mechanismen auf die verschiedenen *TRIM*-Gen-Cluster gewirkt haben. Die *TRIM*-Gene innerhalb des MHC-Clusters sind weitgehend konserviert und weisen nur wenige nichtsynonyme Substitutionen auf, des Weiteren besitzen sie dN/dS-Werte um 0, so dass davon ausgegangen werden kann, dass hier eine gerichtete negative Evolution vorliegt. Es ist zu vermuten, dass die *TRIM*-Gene dieses Clusters essentielle Funktionen innerhalb der Primaten aufweisen, so dass Mutationen, die zum Verlust dieser Funktionen führen, sich evolutionär nicht durchsetzen können.

Innerhalb des 11p15-Clusters zeigt sich ein anderes Bild. Während *TRIM6* und *TRIM34* weitgehend konserviert sind, zeigen *TRIM21* und *TRIM22* Anzeichen von positiver Selektion. Die Untersuchung einzelner Domänen macht deutlich, dass *TRIM21* innerhalb des *Tripartite Motif* positiv selektioniert ist, während die B30.2-Domäne nahezu konserviert ist. Es konnte gezeigt werden, dass *TRIM21* ein IgG-Rezeptor ist, der jedoch über andere Mechanismen an den Liganden bindet als die bekannten FcGamma-Rezeptoren. Die Bindung erfolgt über die innerhalb der Säugetiere konservierte B30.2-Domäne (James et al., 2007; Keeble et al., 2008). *TRIM22* dagegen zeigt, ähnlich wie *TRIM5 α* , eine positive Selektion innerhalb der B30.2-Domäne, während das *Tripartite Motif* keine Anzeichen einer rapiden Evolution aufweist.

Ergänzend zu den in dieser Arbeit erhaltenen Daten zeigten Sawyer et al. (2007), dass *TRIM5 α* und *TRIM22* innerhalb der Säugetiere gegensätzliche Evolution aufweisen. Beide Gene weisen eine rapide Evolution auf, aber während beispielsweise *TRIM5 α* innerhalb des Rinder-Genoms expandiert ist, besitzen Rinder kein *TRIM22*. Im Gegensatz dazu codiert das Genom des Hundes für *TRIM22* nicht jedoch für *TRIM5 α* . *TRIM6* und *TRIM34*, ebenfalls innerhalb des 11p15-Clusters lokalisiert, sind innerhalb der Säugetiere weitestgehend konserviert, was auch die Daten dieser Arbeit belegen. Innerhalb der Primaten weist entweder *TRIM5 α* oder aber *TRIM22* eine positive Selektion auf.

Die Tatsache, dass *TRIM22*, wie auch *TRIM5 α* , innerhalb der B30.2-Domäne positiv selektioniert ist, lässt *TRIM22* als ein geeignetes Kandidatengen für funktionelle Untersuchungen erscheinen. Über *TRIM22* wurde bereits im immunologischen Kontext berichtet. So wird *TRIM22* beispielsweise durch Typ I Interferon induziert. Weiterhin wurde berichtet, dass es bei Überexpression die Replikation von HIV-1 inhibiert (Barr et al., 2008). Des Weiteren ist *TRIM22* in eine Restriktion des Epstein-Barr-Virus involviert (Cameron et al., 2008).

4.2 Funktionelle Analysen

4.2.1 Untersuchungen zur subzellulären Lokalisation verschiedener TRIM-Proteine

Um erste Hinweise auf die Funktion von TRIM-Proteinen zu erhalten, wurden TRIM-GFP-Fusionskonstrukte etabliert und deren subzelluläre Lokalisation in verschiedenen Zelllinien (HeLa, COS-7, HEK293T) untersucht.

Reymond et al. (2001) konnten zeigen, dass TRIM-Proteine in der Lage sind, über ihre *Coiled-Coil*-Domänen miteinander zu homomultimerisieren und so hochmolekulare Proteinstrukturen zu bilden. Diese Proteinkomplexe lokalisieren in unterschiedlichen Zellbereichen und definieren so die unterschiedlichen Funktionen der TRIM-Proteine.

Das bisher am besten charakterisierte TRIM-Protein ist PML (TRIM19). PML ist ein Bestandteil eines Multiproteinkomplexes, der als *PML-nuclear bodies* bezeichnet wird und innerhalb des Nukleus punktförmige Proteianhäufungen ausbildet, die mit keinen bisher bekannten nukleären Strukturen kolokalisieren (Brasch und Ochs, 1992; Hodges et al., 1998; Weis et al., 1994). Ursprünglich wurde TRIM19 bei Patienten mit APL (*acute promyelocytic leukaemia*) identifiziert, die mit einer reziproken chromosomalen Translokation der Chromosomen 15 und 17 assoziiert ist. Diese Translokalisierung führt zu einem Fusionsprotein aus PML und dem *retinoid acid receptor α* (RAR α) (Zhu et al., 1999). Die Expression des Fusionsproteins PML-RAR α ist verantwortlich für die Transformation in APL-Zellen und führt zur Entwicklung von Leukämie. APL zeichnet sich durch eine Blockierung in der Differenzierung von Promyelocyten aus und interessanterweise ist PML in diesen Zellen,

anders als in normalen Zellen, in hunderte kleine Punkte innerhalb des Nukleus und des Zytoplasmas zerstreut (Dong et al., 2004; Weis et al., 1994).

Eine große Anzahl an Proteinen wurde beschrieben, die mit den PML-*nuclear bodies* kolokalisieren. Einige, wie beispielsweise PML, Sp100 und ISG20, können durch Interferon (IFN) α und β (Typ I) und IFN γ (Typ II) induziert werden, was vermuten lässt, dass die PML-*nuclear bodies* ein Teil der angeborenen zellulären Immunantwort darstellen (Chelbi-Alix et al., 1995; Gongora et al., 1997; Lavau et al., 1995). Diese Vermutung wird durch die Tatsache unterstützt, dass die PML-*nuclear bodies* durch verschiedene virale Regulierungsproteine zerstört werden und so vermutlich diese Verteidigungsmechanismen inaktiviert werden (Seeler und Dejean, 1999). Das Beispiel PML (TRIM19) zeigt also, dass die Lokalisation innerhalb bestimmter Zellkompartimente der TRIM-Proteine wahrscheinlich essentiell für deren Funktion ist.

Die hier untersuchten TRIM-GFP-Fusionsproteine sind alle im Zytoplasma lokalisiert. TRIM10 zeigt eine ubiquitäre diffuse zytoplasmatische Verteilung, TRIM26, TRIM27 und TRIM39 weisen unterschiedliche punktförmige Lokalisationen auf und TRIM21 zeigt fadenförmige Strukturen, die mit den Mikrotubuli assoziieren (3.2.3).

4.2.2 Vergleich der subzellulären Lokalisation von TRIM22 von Mensch und Rhesusaffe

Da TRIM22 eine positive Selektion aufweist und somit große Unterschiede zwischen dem humanen TRIM22 (hTRIM22) und TRIM22 des Rhesusaffen (rhTRIM22) vorliegen, wurde untersucht, ob diese Unterschiede Änderungen in der subzellulären Lokalisation bewirken.

Es zeigte sich, dass hTRIM22 und rhTRIM22 tatsächlich unterschiedliche subzelluläre Lokalisationen aufweisen: Während das humane TRIM22 eine diffuse zytoplasmatische Lokalisation mit Aggregation nahe des Zellkerns aufweist, zeigt das TRIM22-Protein des Rhesusaffen punktförmige Proteinanhäufungen. Diese Beobachtungen konnten in verschiedenen Zelllinien und mit verschiedenen Fusionsproteinen (TRIM-GFP, TRIM-V5/His) gemacht werden (3.2.4, 3.2.6).

Das verwendete Plasmid pAcGFP1-N1 bewirkt eine starke Überexpression der TRIM-GFP-Fusionskonstrukte. Um auszuschließen, dass die beobachteten Strukturen Artefakte aufgrund von dieser Überexpression darstellen, wurden die transfizierten Zellen bereits 18 h nach Transfektion hinsichtlich ihrer subzellulären Lokalisation analysiert. Die punktförmigen

Anhäufungen von rhTRIM22-GFP ließen sich bereits nach kurzer Expressionszeit beobachten. hTRIM22-GFP zeigte 18 h nach Transfektion bereits eine diffuse zytoplasmatische Lokalisation, allerdings wurden die Aggregate nahe des Zellkerns nur in wenigen Zellen beobachtet, was darauf hindeutet, dass die Aggregation ein Resultat der Überexpression von hTRIM22 ist.

Die Unterschiede in der subzellulären Lokalisation zwischen hTRIM22 und rhTRIM22 weisen auf unterschiedliche Funktionen hin.

4.2.3 Die positiv selektionierte B30.2-Domäne ist verantwortlich für die subzelluläre Lokalisation von TRIM22

Um herauszufinden, welche Domäne für die unterschiedlichen subzellulären Lokalisationen von hTRIM22 und rhTRIM22 verantwortlich ist, wurden chimärische TRIM22-Konstrukte etabliert. Da insbesondere die B30.2-Domäne große Unterschiede zwischen hTRIM22 und rhTRIM22 aufweist, wurde zunächst diese Domäne ausgetauscht. Untersuchungen zur subzellulären Lokalisation dieser chimärischen Konstrukte zeigten, dass tatsächlich die B30.2-Domäne für die Unterschiede in der Lokalisation verantwortlich ist (3.2.12).

Die aus einem Exon bestehende, etwa 170 Aminosäuren umfassende B30.2-Domäne wurde zuerst als eine C-terminale Domäne der Butyrophilin-Gen-Familie identifiziert (Henry et al., 1998; Henry et al., 1997a; Henry et al., 1997b). Diese Gene sind innerhalb des MHC lokalisiert und kodieren für transmembrane Proteine, die zur Familie der Immunglobuline gehören. Die genaue Funktion der B30.2-Domäne ist bisher unklar, allerdings wird vermutet, dass sie in Protein-Protein-Interaktionen und/oder in RNA-Bindung involviert ist (Rhodes et al., 2005). In der Literatur wird synonym für diese Domäne ebenfalls die Bezeichnung SPRY-Domäne verwendet. Die B30.2-Domäne ist jedoch evolutiv jünger als die SPRY-Domäne und scheint aus einer Fusion der SPRY-Domäne und einer PRY-Domäne hervorgegangen zu sein. Die B30.2-Domäne ist nur in Vertebraten mit adaptivem Immunsystem zu finden, während die SPRY-Domäne auch in Pflanzen und Pilzen beschrieben wurde. Sowohl die B30.2-Domäne als auch die SPRY-Domäne ähneln in ihrer Struktur der Faltung von Immunglobulinen, da sie ebenfalls eine antiparallele β -Faltblatt-Struktur aufweisen (Rhodes et al., 2005). Song et al. (2005b) beschrieben innerhalb der B30.2-Domäne verschiedener TRIM-Proteine vier variable Bereiche (v1-v4). Bei TRIM5 α konnten innerhalb der Primaten insbesondere in den variablen Bereichen v1 und v3 viele Aminosäuresubstitutionen und

Sequenzverlängerungen gefunden werden. Außerdem wurde herausgefunden, dass die für die Restriktion von HIV verantwortlichen Aminosäuren in dem variablen Bereich v1 lokalisieren. James et al. (2007) analysierten die Kristallstruktur der B30.2-Domäne von TRIM21 (Abb. 50).

Abb. 50: Kristallstruktur der B30.2-Domäne von TRIM21 (James et al., 2007). Bei der Proteinstruktur von TRIM21 handelt es sich um eine β -Faltblattstruktur mit Loops variabler Länge (gelb). Gelbe Kreise zeigen die für TRIM21 wichtigen Kontakte mit den Fc-Rezeptoren, in Grün sind wichtige Mutationen innerhalb von TRIM5 α angegeben und Rot zeigt Purin-Mutationen innerhalb von TRIM20 auf, die mit dem familiären Mittelmeerfieber (FMF) assoziiert sind.

Sie konnten feststellen, dass es sich bei der B30.2-Domäne um eine β -Faltblatt-Struktur handelt, bei der sich konservierte β -Stränge mit Loops variabler Länge abwechseln. Diese Loops korrespondieren mit den von Song et al. (2005b) beschriebenen variablen Bereichen. Die Aminosäuren, die bei TRIM5 α verantwortlich für die Restriktion von Retroviren sind, lokalisieren innerhalb dieser Loops, so dass zu vermuten ist, dass diese Strukturen Plattformen für Protein-Virus-Interaktionen darstellen. Auch bei TRIM22 lokalisieren viele Aminosäuresubstitutionen zwischen Mensch und Rhesusaffe innerhalb dieser variablen Bereiche, insbesondere in den Loops zwischen β 2- β 3 (VL1) und β 5- β 6 (VL3). Diese Bereiche entsprechen den variablen Bereichen v1 bzw. v2. Bei TRIM5 α dagegen wurden insbesondere in den Bereichen v1 und v3 vermehrte Aminosäuresubstitutionen identifiziert (Sawyer et al., 2005).

Weiterhin konnte in dieser Dissertation gezeigt werden, dass die Aminosäuren, die für die subzelluläre Lokalisation von hTRIM22 und rhTRIM22 verantwortlich sind, vermutlich in den variablen Bereichen lokalisiert sind. Analysen der Kristallstruktur der B30.2-Domäne von

TRIM21 zeigen, dass die Loops VL1 und VL3 einander gegenüber stehen und somit in der Lage sind, in Wechselwirkung miteinander zu treten. Allerdings weist der Bereich VL3 von TRIM22 im Vergleich zu TRIM21 Sequenzverlängerungen auf, so dass ein genauer Vergleich der korrespondierenden Aminosäuren nicht möglich ist. Dennoch können Vermutungen darüber angestellt werden, was zu den unterschiedlichen Lokalisationen von hTRIM22 und rhTRIM22 führt. Werden die Aminosäureunterschiede innerhalb dieser beiden Loops zwischen hTRIM22 und rhTRIM22 hinsichtlich der Aminosäureeigenschaften verglichen, wird deutlich, dass teilweise unterschiedlich geladene Aminosäuren an den jeweiligen Positionen auftreten. Während hTRIM22 an den Positionen 338 und 342 mit Cystein (C) und Alanin (A) neutrale Aminosäuren aufweist, besitzt rhTRIM22 an Position 338 mit Arginin (R) eine basische Aminosäure und an Position 342 mit Asparaginsäure (D) eine saure Aminosäure. Auch innerhalb des VL3 Loops treten an Position 400 Aminosäuren mit unterschiedlichen Eigenschaften auf: bei hTRIM22 lokalisiert dort die basische Aminosäure Lysin (K), bei rhTRIM22 die neutrale Aminosäure Asparagin (N). Diese Aminosäuren innerhalb der unterschiedlichen Loops könnten von ihrer Lage innerhalb des Proteins miteinander in Wechselwirkung treten und auf diese Weise die Konformation der gesamten B30.2-Domäne beeinflussen. Weiterhin ist es möglich, dass die Unterschiede innerhalb dieser Loops nicht nur zu einer Konformationsänderung führen, sondern auch zu Unterschieden in der Bindung von Interaktionspartnern. Dieses kann verschiedene Auswirkungen auf TRIM22 besitzen: Zum einen könnte es die subzelluläre Lokalisation beeinflussen, wenn beispielsweise die bei rhTRIM22 beobachteten Proteinanhäufungen aufgrund eines Proteinkomplexes ähnlich den PML-*nuclear bodies* von TRIM19 (PML) gebildet werden. Wenn hTRIM22 aufgrund der Unterschiede in der B30.2-Domäne nicht mit Proteinen dieses Komplexes interagiert, so bildet es keine punktuellen Proteinanhäufungen wie rhTRIM22. Weiterhin können diese Unterschiede dazu führen, dass hTRIM22 und rhTRIM22 unterschiedliche Viren inhibieren könnten, so wie es bei TRIM5 α verschiedener Spezies der Fall ist.

4.2.4 Untersuchungen zur subzellulären Lokalisation von rhTRIM22

Nähere Untersuchungen der von rhTRIM22 gebildeten Proteinanhäufungen zeigten, dass es sich um hohle Strukturen handelt, die einen Durchmesser von bis zu 2 μm besitzen. Weiterhin scheint es sich bei den Proteinanhäufungen um dynamische Strukturen zu handeln, da kurz

nach der Transfektion viele kleine Proteinhäufungen vorhanden sind, die nach und nach miteinander zu wenigen großen Anhäufungen verschmelzen (3.2.8). Diese Beobachtungen sind vergleichbar mit der subzellulären Lokalisation von TRIM5 α . TRIM5 α weist vergleichbare punktförmige Proteinhäufungen auf, die ebenfalls hohle Strukturen bilden (Campbell et al., 2007).

Es konnte weiterhin mit Hilfe von *live-cell-imaging* gezeigt werden, dass diese Proteinhäufungen von TRIM5 α tatsächlich dynamische Strukturen sind. Sie bewegen sich entlang der Mikrotubuli, wobei sowohl multidirektionale kreisförmige Bewegungen als auch Bewegungen über größere Distanzen in eine Richtung beobachtet wurden. Einzelne zytoplasmatische Proteinhäufungen können dabei miteinander verschmelzen. Außerdem wurde gezeigt, dass ein Teil des TRIM5 α -Proteins diffus im Zytoplasma lokalisiert und die einzelnen Proteine zwischen Proteinhäufung und diffuser Lokalisation wechseln können (Campbell et al., 2007).

Bei rhTRIM22 konnte kein diffus im Zytoplasma lokalisierendes Protein beobachtet werden. Da jedoch die Intensität der Fluoreszenz der rhTRIM22-Proteinhäufungen sehr stark ist, ist es möglich, dass bei Aufnahmen am Fluoreszenzmikroskop das zytoplasmatisch lokalisierende rhTRIM22 nicht detektiert wurde, weil die Signalstärke herunterreguliert werden musste, damit die Fluoreszenz der punktförmigen Proteinhäufungen nicht das gesamte Bild überstrahlt.

Für TRIM5 α wird angenommen, dass die Proteinhäufungen als „Lagerungsort“ für TRIM5 α dienen könnten, das die Konzentration des zytoplasmatischen TRIM5 α reguliert. Die antivirale Funktion von TRIM5 α ist unabhängig von den beobachteten Proteinhäufungen (Song et al., 2005a). Ein ähnlicher Mechanismus findet zur Regulierung der Aktivität gewisser Splicing-Faktoren im Zellkern statt wie z.B. beim Tuftelin-Interaktionsprotein (TFIP) 11. TFIP11 ist ein Splicing-Faktor, der in einer subnukleären Struktur, den sogenannten TFIP-Körperchen, lokalisiert ist. Es wurde gezeigt, dass TFIP-Körperchen durch Behandlung mit RNA-Polymerase II-Inhibitoren an Größe zunehmen und in ihrer Anzahl abnehmen. TFIP-Körperchen bilden ebenfalls hohle Strukturen. Es wird davon ausgegangen, dass diese Strukturen eine Lagerungsstätte für Splicing-Komponenten darstellen und keine aktiven Gebiete (Wen et al., 2005). Die Tatsache, dass im Rahmen dieser Arbeit auch für rhTRIM22 beobachtet werden konnte, dass die punktförmigen Proteinhäufungen bei vermehrter Expression größer werden, lässt vermuten, dass es sich hier ebenfalls um Protein-Lagerungsstätten handeln könnte.

Für TRIM5 α konnte gezeigt werden, dass es sich bei den Strukturen nicht um Aggresomen handelt (Campbell et al., 2007). Aggresomen sind vergleichbar mit *inclusion bodies* in Prokaryoten. Sie bilden sich, wenn die intrazelluläre Degradierungsmaschinerie überlastet ist, was zu einer Akkumulation von Abfallprotein führt. Es wird angenommen, dass die Ausbildung von Aggresomen ein Schutzmechanismus der Zellen vor zu viel abnormalem oder geschädigtem Protein im Zytoplasma der Zelle ist, das nicht auf dem normalen Ubiquitin-Proteasom-System für Protein-Degradierung beseitigt werden kann (Garcia-Mata et al., 2002).

Aggresome bilden sich um das Mikrotubuli-Organisationszentrum in eukaryotischen Zellen neben dem Zentrosom der Zelle. In diesen Prozess ist das Protein Dynein involviert, verschiedene Proteine, wie HDAC6 (Histon-Deacetylase 6), sind vermutlich als Adapterproteine zwischen Dynein und den akkumulierten polyubiquitinierten Substratproteinen involviert (Wigley et al., 1999). Die Proteine innerhalb der Aggresome werden durch intermediate Filamente, wie beispielsweise das Strukturprotein Vimentin, zusammengehalten (Johnston et al., 1998). Vimentin kann daher als Markerprotein für Aggresome verwendet werden. Aggresomausbildung ist stress-induzierbar, da zellulärer Stress zu großen Mengen missgefaltetem oder teilweise denaturiertem Protein führt (Netzer und Hartl, 1998).

Es wurde gezeigt, dass die TRIM5 α -Proteinanhäufungen nicht mit Vimentin kolokalisieren, so dass davon ausgegangen werden kann, dass es sich nicht um missgefaltete Proteinanhäufungen handelt (Campbell et al., 2007). Die vergleichbaren Strukturen der rhTRIM22-Proteinanhäufungen weisen darauf hin, dass es sich hier ebenfalls um aktives Protein handelt.

Auch Viruspartikel, z.B. HIV, bewegen sich entlang der Mikrotubuli. Für TRIM5 α konnte gezeigt werden, dass es teilweise mit den HIV-Partikeln kolokalisiert. Es wird vermutet, dass es durch diese Kolokalisationen an den Mikrotubuli zur Inhibierung des Virus kommt (Cohen, 2005; Freed und Mouland, 2006). TRIM5 α interagiert mit dem Capsid von HIV und verhindert so dessen Zerfall (Stremlau et al., 2006).

Live-Bild-Aufnahmen der rhTRIM22-Proteinanhäufungen könnten Aufschluss darüber geben, ob auch rhTRIM22 dynamisch im Zytoplasma lokalisiert und sich entlang des Mikrotubuli-Netzwerkes bewegt. TRIM22 des Rhesusaffen könnte demnach eine vergleichbare Funktion wie TRIM5 α besitzen. In bisherigen Studien wurde nur die Funktion des humanen TRIM22 untersucht und es konnte bisher keine spezifische antivirale Aktivität wie bei TRIM5 α nachgewiesen werden. Infektionsversuche mit Zellen, die das TRIM22-

Protein des Rhesusaffen exprimieren, wurden bisher nicht durchgeführt. Die vergleichbaren subzellulären Strukturen von TRIM5 α und TRIM22 des Rhesusaffen lassen aber vermuten, dass rhTRIM22 tatsächlich ebenfalls antivirale Funktionen aufweist. In Infektionsassays mit verschiedenen Viren könnte geklärt werden, gegen welches Virus rhTRIM22 wirkt. Sawyer et al. (2007) zeigten, dass TRIM22 episodisch positiv selektioniert ist, was darauf hinweist, dass sich zu bestimmten Zeiten die pathogene Umgebung verändert hat und zu rapiden Veränderungen des TRIM22-Proteins geführt hat. Es ist jedoch durchaus möglich, dass TRIM22 des Menschen und des Rhesusaffen Resistenzen gegenüber nicht mehr rezenten Viren vermitteln.

4.2.5 Untersuchungen zur subzellulären Lokalisation von hTRIM22

Die differentielle subzelluläre Lokalisation zwischen hTRIM22 und rhTRIM22 deutet zunächst einmal auf eine unterschiedliche Funktion hin. Da hTRIM22 keine punktförmigen Anhäufungen bildet, die sich entlang der Mikrotubuli bewegen, scheint es nicht wie TRIM5 α und vermutlich rhTRIM22 auf diese Weise mit Viruspartikeln in Kontakt zu kommen.

Um herauszufinden, wo TRIM22 natürlicherweise ohne Überexpression in Zellen lokalisiert, wurde ein Antikörper gegen TRIM22 benötigt. Da zum jetzigen Zeitpunkt kein anti-TRIM22-Antikörper käuflich zu erwerben ist, sollte ein anti-TRIM22-Antikörper in Zusammenarbeit mit Dr. med. Ralf Dressel aus der Abteilung „Zelluläre und Molekulare Immunologie“ etabliert werden.

Ursprünglich sollte das TRIM22-Protein mit Hilfe einer Aufreinigung über Glutathion-Agarose-Säulen aus TRIM22 überexprimierenden prokaryotischen Zellen isoliert werden, um das so erhaltene Protein neben der Immunisierung der Mäuse für Interaktionsversuche zu verwenden. Doch trotz verschiedener Versuche konnte TRIM22 nicht löslich in prokaryotischen Zellen exprimiert werden. Aus diesem Grund wurde TRIM22 aus intrazellulären Einschlusskörpern isoliert, was den Vorteil hat, dass große Mengen an Protein gewonnen werden können (3.3.3). Allerdings sind hohe Konzentrationen Urea nötig (8 M), um das missgefaltete Protein zu solubilisieren. Diese Proteinlösung kann direkt zur Immunisierung der Mäuse verwendet werden, da Urea bereits als starkes Adjuvans wirkt. Der Nachteil ist, dass das Protein durch Harnstoff denaturiert wird und somit nicht für Interaktionsversuche verwendet werden kann. Es besteht die Möglichkeit, dass denaturierte Protein mit geeigneten Verfahren zurückzufalten, doch erste Versuche resultierten in

unlöslichen Proteinaggregaten. Da es jedoch viele Möglichkeiten gibt, ein Protein erfolgreich rückzufalten, müssen noch weitere Versuche erfolgen. Aus diesem Grund wurden jedoch bisher keine Proteininteraktionsversuche durchgeführt.

Das erhaltene denaturierte TRIM22-Protein wurde für die Etablierung der anti-TRIM22-Antikörper verwendet. Der im Serum aus dem Blut immunisierter Mäuse erhaltene polyklonale anti-TRIM22-Antikörper konnte bereits für indirekte Immunzytochemie verwendet werden. Mit Hilfe des polyklonalen Antikörpers konnte erstmals die subzelluläre Lokalisation des parentalen TRIM22 in HeLa- sowie in COS-7-Zellen visualisiert werden. Es zeigte sich, dass das parentale TRIM22 tatsächlich diffuse bis fadenförmige Strukturen im Zytoplasma bildet. Weiterhin konnte nachgewiesen werden, dass die beobachteten Strukturen mit den Mikrotubuli assoziiert sind. So könnte eine Interaktionsebene zwischen TRIM22 und viralen Partikeln gewährleistet sein (3.3.7).

Neben TRIM22 wurden weitere TRIM-Proteine identifiziert, die ebenfalls mit den Mikrotubuli koloalisieren. Wie bereits erwähnt, bewegen sich die für TRIM5 α beschriebenen punktförmigen Proteinhäufungen entlang des Mikrotubuli-Netzwerkes (Campbell et al., 2007). Im Rahmen der vorliegenden Dissertation konnte gezeigt werden, dass TRIM21 fadenförmige Strukturen aufweist, die mit α -Tubulin koloalisieren. Weiterhin wurde für einige TRIM-Proteine ein so genanntes COS-Motiv identifiziert, das mit einer Koloalisation an den Mikrotubuli assoziiert ist. Die TRIM-Familien-Mitglieder, wie z.B. TRIM9 und MID1, weisen dieses Motiv auf und zeigen eine Assoziation mit dem Mikrotubuli-Netzwerk. Interessanterweise führt eine Deletion der COS-Domäne zu einer zwar veränderten aber noch immer vorhandenen Koloalisation mit den Mikrotubuli (Short und Cox, 2006). Die hier beobachtete subzelluläre Lokalisation weist große Ähnlichkeit mit der Lokalisation des parentalen hTRIM22 auf. Für hTRIM22 konnte kein COS-Motiv nachgewiesen werden, dennoch weist es eine deutliche Assoziation mit den Mikrotubuli auf. Short und Cox (2006) konnten eine weitere interessante Beobachtung machen: Mutationen innerhalb der B30.2-Domäne führten bei TRIM9 zu einer punktuellen Proteinhäufung, vergleichbar mit der hier beschriebenen subzellulären Lokalisation von rhTRIM22. Das TRIM-Protein MID1 weist ebenfalls diese Lokalisation auf, wenn Mutationen innerhalb der B30.2-Domäne vorliegen. Diese Mutationen innerhalb von MID1 sind mit dem Opitz-Syndrom assoziiert (Cox et al., 2000).

Daraus kann also geschlossen werden, dass viele TRIM-Proteine mit dem Mikrotubuli-Netzwerk assoziiert sind, selbst wenn sie kein COS-Motiv besitzen. Weiterhin ist die B30.2-Domäne auch in anderen TRIM-Proteinen für die subzelluläre Lokalisation und außerdem für

deren Funktion verantwortlich. In nachfolgenden Versuchen könnte die subzelluläre Lokalisation der TRIM-Proteine nach Deletion der B30.2-Domäne untersucht werden, um herauszufinden, ob diese Domäne für die Assoziation mit dem Mikrotubuli-Netzwerk notwendig ist.

Bei einer Überexpression von hTRIM22-GFP kommt es zu einer Anhäufung des Proteins nahe des Zellkerns. Diese Strukturen ähneln den für Aggresomen beschriebenen Proteinaggregaten. In folgenden Versuchen sollte daher analysiert werden, ob diese Proteinanhäufungen mit Vimetin assoziiert sind. Allerdings spricht die Lokalisation des nativen Proteins dafür, dass es sich nicht um Aggresomen handelt. Vielmehr ist TRIM22 mit den Mikrotubuli assoziiert und wird vermutlich bei Überexpression an den Zentrosomen angehäuft. Zentrosome sind Zellorganellen, die während der Interphase in direkter Nähe des Nukleus lokalisieren. Ihre Struktur ist innerhalb der höheren Eukaryoten hoch konserviert. Sie bestehen aus einem Paar rechtwinklig zueinander angeordneter, zylinderförmiger Zentriolen, die in eine Proteinmatrix, die perizentriolare Matrix (PCM) eingebettet sind (Andersen et al., 2003; Fukasawa, 2005). Zentrosome spielen eine wichtige Rolle bei der Organisation des Mikrotubuli-Zytoskeletts und werden daher auch als MTOC (Mikrotubuli-Organisations-Centrum) bezeichnet. Das MTOC ist für die Anordnung und Orientierung der Mikrotubuli verantwortlich und kontrolliert Mikrotubuli-abhängige Prozesse wie den Transport von zytoplasmatischen Vesikeln und die Orientierung zellulärer Organellen. Die Anzahl der Zentrosome pro Zelle wird genau kontrolliert. In der G1-Phase besitzt jede Zelle ein Zentrosom mit zwei Zentriolen. Während des Überganges von der G1- zur S-Phase bilden sich neue Zentriolen orthogonal zu den beiden schon vorhandenen. Innerhalb der G2-Phase verlängern sich diese Zentriolen. In der frühen Mitose zerbricht die Verbindung zwischen den beiden Zentriolenpaaren und jedes Paar ist an der Ausbildung des mitotischen Spindelapparates beteiligt (Tsou und Stearns, 2006a, b).

Interessanterweise konnte in dieser Arbeit gezeigt werden, dass eine Überexpression von TRIM22 zu einer Anhäufung des Proteins an den MTOC führt und weiterhin zu einer Zerstörung dieser Zellorganellen. Diese Zerstörung führt dazu, dass die Zelle im Zellzyklus inhibiert wird, da sie nicht mehr dazu in der Lage ist, den für die Mitose wichtigen Spindelapparat auszubilden.

Es wurde gezeigt, dass viele Retroviren entlang der Mikrotubuli durch die Zelle zum Nukleus gelangen und dass sie ebenfalls das Zentrosom passieren, zum einen auf dem Weg in die Zelle, zum anderen auf dem Weg aus der Zelle. TRIM22 könnte also durch die Zerstörung des Zentrosoms den Zellzyklus und somit die Replikation der Viren verhindern. Außerdem

könnte es auf diese Weise den Transport der viralen Partikel innerhalb der Zellen inhibieren. Es sollte in nachfolgenden Versuchen untersucht werden, in welchem Zellzyklus-Abschnitt diese Inhibition erfolgt. Da das Zentrosom zerstört wird, ist zu vermuten, dass der Zellzyklus in der G1-Phase inhibiert wird, da es wahrscheinlich nicht zu einer Bildung der weiteren Zentriolen kommt.

4.2.6 Putative Rolle von TRIM22 in der Immunabwehr

4.2.6.1 TRIM22 besitzt E3-Ligase-Aktivität

Über verschiedene Funktionen von TRIM22 wurde in der Literatur bereits berichtet. Es wurde gezeigt, dass TRIM22 wie auch andere TRIM-Proteine E3-Ligase-Aktivität besitzt. E3-Ligasen sind in Prozesse der Ubiquitinierung involviert. Als Ubiquitinierung wird der Prozess des Markierens von Zielproteinen mit Ubiquitin bezeichnet. Durch die Art und Anzahl an Ubiquitin-Bindungen an ein Protein wird dessen Halbwertszeit, Funktion oder Lokalisation innerhalb der Zelle reguliert, so dass das Ubiquitin-System essentiell an den zellulären Prozessen des Protein-Abbaus, der Signaltransduktion und der Zellzyklus-Kontrolle beteiligt ist. Die Ubiquitinierung wird durch drei Enzyme katalysiert, die als E1, E2 und E3-Ligasen bezeichnet werden.

Abb. 51: Schematischer Ablauf der Ubiquitinierung (modifiziert nach: www.calbiochem.com/ubiquitin-proteasome).

In Abbildung 51 ist der Prozess der Ubiquitinierung schematisch dargestellt. E3-Ligasen (wie beispielsweise viele TRIM-Proteine) übertragen das Ubiquitin in einem letzten Schritt auf das Zielprotein. Es wurden bisher viele hundert Proteine mit E3-Ligase-Aktivität identifiziert, die strukturell zu drei Unterfamilien gehören: Proteine mit HECT-, RING- oder U-box-Domänen. Barr et al. (2008) konnten zeigen, dass TRIM22 durch Interferon induziert wird und bei Überexpression die Replikation von HIV inhibiert. Sie schlossen aus der E3-Ligase Aktivität von TRIM22, dass es auf diese Weise eventuell den Gag-Proteintransport durch Ubiquitin-Anlagerung an verschiedene wichtige Zielproteine behindert. Weiterhin wurde gezeigt, dass TRIM22 in der Lage ist, sich selbst zu ubiquitinieren (Duan et al., 2008).

4.2.6.2 TRIM22-Expression wird durch p53 induziert

Weiterhin konnte nachgewiesen werden, dass TRIM22-Expression durch p53 induziert wird. *TRIM22* besitzt im Intron 1 ein *p53-response element*, so dass es direkt durch p53 aktiviert wird. *p53* ist ein Tumorsuppressorgen, das als Transkriptionsfaktor nach DNA-Schädigung Gene, die an der Kontrolle des Zellzyklus, an der Induktion von Apoptose oder an der DNA-Reperatur beteiligt sind, reguliert. Normalerweise liegt p53 in geringen Konzentrationen in gesunden Zellen vor, da es durch MDM2 ubiquitiniert wird, was zur Proteolyse von p53 führt (Gu et al., 2000). Bei Schäden in der DNA wird p53 in der Zelle überexprimiert, was zur Folge hat, dass p53 als Transkriptionsfaktor zunächst die Produktion von beispielsweise p21 bewirkt. p21 setzt eine Signalkaskade in Gang, die dafür verantwortlich ist, dass der Zellzyklus gestoppt wird. So können vor der Zellteilung DNA-Reparatur-Mechanismen die Schäden reparieren. Ist dies nicht möglich, werden durch p53 Gene der *Bcl2*-Familie aktiviert, die wiederum in Form einer Signalkaskade Caspasen auslösen und somit zu Apoptose führen (King und Cidlowski, 1998).

Es wurde außerdem beschrieben, dass p53 eine Rolle in Differenzierungsprozessen verschiedener Gewebearten spielt, wie z.B. Pankreaskrebszellen, Muskelzellen, Keratinocyten, Neuronen und verschiedenen hämatopoetischen Zelllinien (Almog und Rotter, 1997; Soddu et al., 1996).

Weiterhin wurde über *p53* in immunologischen Zusammenhängen berichtet. Zum einen konnte gezeigt werden, dass *p53* durch Interferon induziert werden kann und in Virus-infizierten Zellen aktiviert ist und dass es außerdem für die viral induzierte Apoptose notwendig ist. Es wurde gezeigt, dass dieser Mechanismus die virale Replikation reduziert, so

dass daraus geschlossen werden kann, dass die durch Interferon induzierte Aktivierung von p53 eine wichtige Rolle in der antiviralen Immunität spielt (Munoz-Fontela et al., 2008).

p53 wird durch das de-ubiquitinierende Enzym HAUSP/USP7 (*herpes-virus-associated ubiquitin-specific protease*) stabilisiert, da vermutet wird, dass USP7 das Protein MDM2 reguliert, dass für die Ubiquitinierung von p53 sorgt. USP7 scheint weiterhin in der Lage zu sein, p53 zu de-ubiquitinieren und auf diese Weise zu stabilisieren (Hu et al., 2006) (Abb. 52).

Abb. 52: Schematische Darstellung der p53-Regulierung. p53-Expression wird durch Ubiquitinierung mittels MDM2 in normalen Zellen niedrig und somit inaktiv gehalten, so dass ein normaler Zellzyklus vorliegt. Bei Schäden der DNA wird p53 überexprimiert und durch De-Ubiquitinierung durch USP7 stabilisiert. Das aktive p53 führt zu Zellzyklusarrest, so dass beschädigte DNA repariert werden kann. Ist das nicht möglich, führt die Überexpression von p53 zu Apoptose (nach http://www.emdbiosciences.com/sharedimages/calbiochem/P53_pathway_spotlight.jpg).

Interessanterweise konnte mit Hilfe eines Yeast-Two-Hybrid-Screens nachgewiesen werden, dass hTRIM22 auch mit USP7 interagiert (Lim et al., 2006), so dass zu vermuten ist, dass TRIM22 im p53-Signalweg eine essentielle Rolle spielt.

4.2.6.3 TRIM22 inhibiert Zellproliferation und induziert Apoptose

TRIM22 könnte bei verschiedenen Funktionen von p53 involviert sein. Zum einen wurde gezeigt, dass die Überexpression von TRIM22 in der Leukämie-Zelllinie U-937 zu einer Wachstumsreduzierung führt. Außerdem wird TRIM22 in ruhenden T-Zellen auch ohne Interferon oder p53 Stimulierung exprimiert, während es in differenzierenden T-Zellen

herunterreguliert wird. Somit scheint TRIM22 ebenfalls in Zell-proliferative Mechanismen involviert zu sein. Im Rahmen dieser Arbeit konnte zusätzlich beobachtet werden, dass TRIM22 überexprimierende HeLa- oder COS-7-Zellen nicht weiter proliferieren und nach einiger Zeit Anzeichen von Apoptose aufweisen. Bei mit hTRIM22 transfizierten HeLa-Zellen wurde bereits 30 h nach Transfektion ein Ablösen der Zellen vom Untergrund beobachtet. Auch konnte keine Vermehrung der transfizierten Zellen beobachtet werden. Diese Beobachtung muss jedoch noch durch geeignete quantifizierende Methoden bestätigt werden, da der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte Proliferationsassay für diese Zwecke nicht optimal war.

Es konnte jedoch eindeutig gezeigt werden, dass eine Überexpression von hTRIM22 über einen Zeitraum von mehr als 24 h zu Apoptose führt, so dass davon ausgegangen werden kann, dass hTRIM22 tatsächlich in Prozesse wie Proliferation, Zelldifferenzierung und Apoptose involviert ist.

Der Apoptose kommt im Immunsystem eine entscheidende Rolle zu: zum Beispiel werden Lymphozyten, die zur Abwehr einer Infektion benötigt wurden und nach Ausheilung der Infektion nicht mehr gebraucht werden, durch Apoptose entfernt und die Immunantwort so abgeschaltet. Weiterhin werden autoreaktive Lymphozyten, die sich gegen körpereigenes Gewebe richten würden, durch Apoptose unschädlich gemacht. Die Apoptose ist also ein Bestandteil der Selbsttoleranz des Immunsystems. Für die Gewebekomöostase ist die Apoptose wichtig, da auf diesem Wege Zellen eliminiert werden, die durch Mutationen oder virale Infekte geschädigt sind.

Der genaue Signalweg, über den TRIM22 Apoptose induziert, muss allerdings noch geklärt werden. Bei der Apoptose wird zwischen zwei verschiedenen Signalwegen unterschieden: dem extrinsischen und dem intrinsischen Signalweg. Der extrinsische Weg wird durch Ligandenbindung an einen Rezeptor der TNF-Rezeptorfamilie (z.B. CD95) eingeleitet. Im weiteren Verlauf werden Caspase-Kaskaden über Caspase-8 angeregt (Wajant, 2003). Beim intrinsischen Signalweg kommt es zur Freisetzung von Zytocrom c und anderen pro-apoptotischen Faktoren wie Smac/DIABOLO aus den Mitochondrien in das Zytoplasma. Hier wird die Caspase-Kaskade durch die Caspase-9 induziert. Dieser Weg wird unter anderem durch p53 ausgelöst, indem es die Expression der pro-apoptotisch wirkenden Mitglieder der Bcl-2-Familie (z.B. Bax, Bad) aktiviert (Green und Kroemer, 2004).

Für ein weiteres Mitglied der TRIM-Protein-Familie, TRIM27, konnte bereits nachgewiesen werden, dass es bei Überexpression Apoptose induziert. Für TRIM27 wurde gezeigt, dass es

Apoptose Mitochondrien-unabhängig über Stress-Kinasen und Caspasen aktiviert (Dho und Kwon, 2003).

Es sollte in nachfolgenden Versuchen untersucht werden, ob TRIM22 ähnlich wie TRIM27 Apoptose über den extrinsischen Signalweg induziert oder ob es wie p53 Apoptose über den intrinsischen Weg einleitet.

TRIM22 scheint demnach in zellregulatorische Prozesse involviert zu sein. Eine Überexpression von TRIM22 führt zu einer Akkumulation von TRIM22 an den MTOC, wodurch diese inhibiert werden. Das führt zunächst zu einem Zellzyklusarrest. Dauert diese Überexpression an, ist die Zelle nicht dazu in der Lage, den Zellzyklus weiter zu führen, was zur Induktion von Apoptose führt. Da sowohl Interferon als auch p53 eine Expression von TRIM22 induzieren, liegt die Vermutung nahe, dass es sich dabei um Schutzmechanismen der Zelle handelt. Ist eine Zelle beispielsweise durch einen Virus infiziert, wird Interferon ausgeschüttet, was zur Expression von p53 führt. Durch p53 und Interferon wird TRIM22 überexprimiert und scheint nun unterschiedliche Funktionen auszuüben. Zum einen besitzt es E3-Ligase-Aktivität, durch die es in der Lage ist, wichtige Proteine zu ubiquitinieren. Zum anderen akkumuliert es an den MTOC und könnte so zu einer Inhibition des Zellzyklus und der Proliferation führen, so dass eine virusinfizierte Zelle am Wachstum und somit an der Produktion weiterer Viruspartikel gehindert wird. Es wäre demnach wichtig zu untersuchen, ob eine Induktion der hTRIM22-Expression durch Interferon zu ähnlich hohen Mengen an Protein führt, wie es bei der Expression nach Transfektion der Fall ist. Weiterhin kann dann untersucht werden, ob diese natürliche Überexpression ebenfalls zu einer Akkumulation des TRIM22-Proteins an den MTOC und somit zur Inhibierung der Proliferation und im weiteren Verlauf zur Apoptose führt (Abb. 53).

Abb. 53: Schematische Darstellung der putativen Signalwege von TRIM22. Die Expression von TRIM22 wird sowohl durch Interferon als auch durch p53 induziert. Überexpression von TRIM22 bewirkt eine Anhäufung an den MTOC und führt zur Inhibition der Proliferation und zur Apoptose. Weiterhin interagiert TRIM22 mit USP7, das p53 durch De-Ubiquitinierung stabilisiert. Eventuell wird TRIM22, das sich selbst ubiquitiniert, ebenfalls durch USP7 stabilisiert. Barr et al. (2008) zeigten, dass TRIM22-Überexpression zur Inhibition der HIV-Replikation führt.

5 Fazit und Ausblick

Zusammenfassend zeigen die Daten dieser Dissertation, dass evolutionäre Untersuchungen sehr nützlich sein können, um systematisch die Funktionen von Wirtsproteinen mit eventuellen antiviralen Aktivitäten zu untersuchen. Zeichen von positiver Selektion, ebenso wie das Fehlen eben solcher, stellen relevante Informationen für das Verständnis der Natur von Wirt-Pathogen-Interaktionen dar.

Sowohl hTRIM22 als auch rhTRIM22 scheinen eine wichtige Rolle in der zellulären Immunantwort zu besitzen, auch wenn der genaue Zusammenhang noch geklärt werden muss. Während rhTRIM22 jedoch wahrscheinlich ähnlich wie TRIM5 α direkt an der Restriktion von Viren beteiligt sein könnte, scheint hTRIM22 eher indirekt durch antiproliferative Mechanismen und Induzierung von Apoptose an der Inhibierung von Pathogenen mitzuwirken.

In nachfolgenden Versuchen wäre es zunächst von großem Interesse, Interaktionspartner von TRIM22 zu identifizieren, um weitere Anhaltspunkte für die Funktion von TRIM22 zu erhalten. Dabei sollte außerdem untersucht werden, ob hTRIM22 und rhTRIM22 unterschiedliche Interaktionspartner aufweisen.

Für rhTRIM22 wäre es weiterhin von Interesse, Infektionsassays mit verschiedenen Viren durchzuführen, da erste Hinweise darauf hindeuten, dass rhTRIM22 ähnlich wie TRIM5 α Viren durch direkten Kontakt inhibieren könnte. Bisherige Infektionsassays wurden nur mit hTRIM22 durchgeführt und es konnten keine direkten Ziele wie bei TRIM5 α identifiziert werden.

Für hTRIM22 sollte zunächst die antiproliferative Wirkung mit geeigneten Nachweisverfahren quantifiziert werden und weiterhin herausgefunden werden, in welchem Abschnitt des Zellzyklus die Proliferation inhibiert wird. Außerdem sollte analysiert werden, über welchen Signalweg (extrinsisch oder intrinsisch) Apoptose induziert wird. Des Weiteren wäre es von Interesse, zu untersuchen, ob USP7 eine ähnlich stabilisierende Wirkung durch De-Ubiquitinierung auf hTRIM22 ausübt wie auf p53.

Auf diese Weise wäre es möglich, die Funktionen von hTRIM22 und rhTRIM22 in der Immunantwort besser zu beschreiben.

6 Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Dissertation wurde die Evolution von *TRIM*-Genen mit identischer Domänenstruktur wie das antivirale *TRIM5 α* (RBCC-B30.2) untersucht. Die analysierten *TRIM*-Gene lokalisieren innerhalb zweier Gencluster auf Chromosom 6 und Chromosom 11 (MHC- und 11p15-Cluster). Diejenigen *TRIM*-Gene, die innerhalb eines Clusters auf einem Chromosom lokalisieren, sind auch phylogenetisch eng miteinander verwandt, so dass auf Genduplikation von *TRIM*-Genen auf Chromosom 6 und 11 geschlossen werden kann. Vergleiche der Vollängensequenzen der *TRIM*-Gene des MHC- und 11p15-Clusters zwischen Mensch und Rhesusaffe zeigten, dass die *TRIM*-Gene des MHC-Clusters stark konserviert sind und nur wenige synonyme und nichtsynonyme Substitutionen aufweisen, während innerhalb des 11p15-Clusters *TRIM21* und *TRIM22* neben *TRIM5 α* Anzeichen von positiver Selektion aufweisen. Insbesondere bei getrennten Analysen von *Tripartite Motif* und B30.2-Domäne konnte festgestellt werden, dass bei *TRIM21* das *Tripartite Motif* leichte Anzeichen einer positiven Selektion aufweist, während die B30.2-Domäne negativ selektioniert ist. *TRIM22* dagegen weist innerhalb des *Tripartite Motif* eine negative Selektion auf und ist innerhalb der B30.2-Domäne positiv selektioniert, vergleichbar mit der B30.2-Domäne von *TRIM5 α* . Somit konnte mit *TRIM22* ein geeignetes Kandidateng für funktionelle Analysen identifiziert werden.

Für die funktionellen Analysen wurde zunächst der gesamte offene Leserahmen verschiedener *TRIM*-Proteine in den pAcGFP1-N1-Vektor kloniert, um das daraus resultierende *TRIM*-GFP-Fusionsprotein hinsichtlich der subzellulären Lokalisation untersuchen zu können. Es zeigte sich, dass *TRIM*-Proteine unterschiedliche subzelluläre Kompartimente identifizieren. *TRIM10* ist diffus im Zytoplasma lokalisiert, *TRIM26*, *TRIM27* und *TRIM39* weisen unterschiedliche punktuelle Proteinanhäufungen auf und *TRIM21* zeigt fadenförmige Strukturen, die mit den Mikrotubuli assoziieren.

Untersuchungen der subzellulären Lokalisation des humanen *TRIM22* (h*TRIM22*) und *TRIM22* des Rhesusaffen (rh*TRIM22*) zeigten, dass beide Proteine unterschiedliche Lokalisationen aufweisen: h*TRIM22* ist diffus im Zytoplasma verteilt, während rh*TRIM22* punktförmige Proteinanhäufungen nahe des Zellkernes aufweist. Diese Lokalisationen konnten in verschiedenen Zelllinien und mit verschiedenen Anhängen (GFP, V5/His) beobachtet werden. Die punktförmigen Proteinanhäufungen von rh*TRIM22* sind hohle Strukturen, die je nach Dauer der Expression in Größe zunehmen und in Anzahl abnehmen.

Vergleiche mit der subzellulären Lokalisation des antiviralen TRIM5 α zeigten, dass hTRIM5 α mit rhTRIM22 vergleichbare Proteinhäufungen zeigt, während die subzelluläre Lokalisation von rhTRIM5 α vergleichbar mit der von hTRIM22 ist.

Mit Hilfe von chimärischen Konstrukten, bei denen die B30.2-Domäne von TRIM22 zwischen Mensch und Rhesusaffe ausgetauscht wurde, konnte nachgewiesen werden, dass die B30.2-Domäne für die unterschiedliche subzelluläre Lokalisation verantwortlich ist. Durch verschiedene weitere chimärische Konstrukte, bei denen Aminosäuren mit Hilfe von Restriktionsschnittstellen oder mittels gerichteter Mutagenese ausgetauscht wurden, konnten die Bereiche, die für die Lokalisation verantwortlich sind, näher bestimmt werden. Es zeigte sich, dass die dafür verantwortlichen Aminosäuren innerhalb variabler Loops lokalisieren, die vermutlich miteinander in Wechselwirkung treten können.

Weiterhin wurde im Rahmen dieser Arbeit ein anti-TRIM22-Antikörper etabliert. Mit Hilfe des polyklonalen anti-TRIM22-Antikörpers konnte bereits die Lokalisation des nativen TRIM22 in HeLa- und COS-7-Zellen visualisiert werden. Das native Protein lokalisiert innerhalb des Zytoplasmas und ist mit dem Mikrotubuli-Netzwerk assoziiert. Eine Überexpression von hTRIM22 führt zu einer Anhäufung des Proteins an den Zentrosomen und zerstört diese. Weiterhin konnte gezeigt werden, dass die Überexpression von hTRIM22 nach etwa 30 h zu Apoptose führt.

Abstract

In this work, the evolution of *TRIM* genes with identical domain structure as the antiviral *TRIM5 α* was studied. The analysed *TRIM* genes form two clusters on chromosome 6 and 11 (MHC and 11p15 cluster). *TRIM* genes located on one chromosome are phylogenetically related, indicating gene duplication on chromosome 6 and 11. Sequence comparisons of *TRIM* genes of the MHC and 11p15 cluster between human and rhesus macaque revealed that the *TRIM* genes of the MHC cluster are highly conserved, showing only few synonymous and non-synonymous changes, while *TRIM21* and *TRIM22* of the 11p15 cluster show signs of rapid evolution. Similar to *TRIM5 α* , especially the B30.2 domain of *TRIM22* is positively selected. Therefore, *TRIM22* is an interesting candidate gene for functional analyses.

For functional analyses, the whole open reading frame of different *TRIM* genes was cloned in the pAcGFP1-N1 mammalian expression vector in order to analyse the subcellular localisation of TRIM-GFP fusion proteins. It could be shown that different TRIM proteins identify different subcellular compartments. TRIM10 localises diffuse in the cytoplasm, while TRIM26, TRIM27 and TRIM39 show different point-shaped speckles. TRIM21 forms filamentary structures, which co-localise to microtubules.

Analysis of the subcellular localisation of human TRIM22 (hTRIM22) and rhesus macaque TRIM22 (rhTRIM22) showed that both proteins exhibit different subcellular localisation: hTRIM22 is localised diffuse in the cytoplasm, while rhTRIM22 forms speckles near the nucleus. These localisations were observed in different cell lines and with different tags (GFP, V5/His). rhTRIM22 speckles are hollow structures, which increase in size and decrease in number depending on expression time. Comparison of the subcellular localisation of TRIM22 and TRIM5 α revealed that hTRIM22 exhibits similar localisation as rhTRIM5 α , while rhTRIM22 forms similar speckles as hTRIM5 α .

By establishing chimeric TRIM22 constructs, the B30.2 domain was identified to be responsible for the different subcellular localisation of hTRIM22 and rhTRIM22. Using site directed mutagenesis, the amino acids responsible for the localisation were narrowed down to a certain region.

Finally, an anti-TRIM22-antibody was established and detects the native TRIM22 protein in COS-7 and HeLa cells. The native TRIM22 is localised in the cytoplasm and associates with the microtubule network. Overexpression of hTRIM22 leads to accumulation of the protein at the centrosome, leading to destruction of this cell organelle. Furthermore, overexpression of hTRIM22 appears to induce apoptosis about 30 h post transfection.

7 Veröffentlichungen

Ein Teil der Arbeit wurde am 28.7.08 unter dem Titel „*Different subcellular localisation of TRIM22 suggests species-specific function*“ (Anna-Maria Herr, Olivia Sövegjarto, Christian Roos und Lutz Walter) bei dem Journal „Immunogenetics“ eingereicht.

8 Literaturverzeichnis

- Almog, N. und Rotter, V.** 1997. Involvement of p53 in cell differentiation and development. *Biochim Biophys Acta* 1333:F1-27
- Andersen, J.S., Wilkinson, C.J., Mayor, T., Mortensen, P., Nigg, E.A. und Mann, M.** 2003. Proteomic characterization of the human centrosome by protein correlation profiling. *Nature* 426:570-4
- Asaoka, K., Ikeda, K., Hishinuma, T., Horie-Inoue, K., Takeda, S. und Inoue, S.** 2005. A retrovirus restriction factor TRIM5alpha is transcriptionally regulated by interferons. *Biochem Biophys Res Commun* 338:1950-6
- Barr, S.D., Smiley, J.R. und Bushman, F.D.** 2008. The interferon response inhibits HIV particle production by induction of TRIM22. *PLoS Pathog* 4:e1000007
- Birnboim, H.C. und Doly, J.** 1979. A rapid alkaline extraction procedure for screening recombinant plasmid DNA. *Nucleic Acids Res* 7:1513-23
- Boeke, J.D.** 1997. LINEs and Alus--the polyA connection. *Nat Genet* 16:6-7
- Borden, K.L.** 1998. RING fingers and B-boxes: zinc-binding protein-protein interaction domains. *Biochem Cell Biol* 76:351-8
- Brasch, K. und Ochs, R.L.** 1992. Nuclear bodies (NBs): a newly "rediscovered" organelle. *Exp Cell Res* 202:211-23
- Brunham, R.C., Plummer, F.A. und Stephens, R.S.** 1993. Bacterial antigenic variation, host immune response, and pathogen-host coevolution. *Infect Immun* 61:2273-6
- Cameron, J.E., Yin, Q., Fewell, C., Lacey, M., McBride, J., Wang, X., Lin, Z., Schaefer, B.C. und Flemington, E.K.** 2008. Epstein-Barr virus latent membrane protein 1 induces cellular MicroRNA miR-146a, a modulator of lymphocyte signaling pathways. *J Virol* 82:1946-58
- Campbell, E.M., Dodding, M.P., Yap, M.W., Wu, X., Gallois-Montbrun, S., Malim, M.H., Stoye, J.P. und Hope, T.J.** 2007. TRIM5 alpha cytoplasmic bodies are highly dynamic structures. *Mol Biol Cell* 18:2102-11
- Chelbi-Alix, M.K., Pelicano, L., Quignon, F., Koken, M.H., Venturini, L., Stadler, M., Pavlovic, J., Degos, L. und de The, H.** 1995. Induction of the PML protein by interferons in normal and APL cells. *Leukemia* 9:2027-33
- Chelbi-Alix, M.K., Quignon, F., Pelicano, L., Koken, M.H. und de The, H.** 1998. Resistance to virus infection conferred by the interferon-induced promyelocytic leukemia protein. *J Virol* 72:1043-51
- Cohen, P.** 2005. Making a monkey out of HIV. More is becoming clear about a novel host factor that appears central to governing the species-specificity of retroviruses like HIV and could be a future antiviral target. *IAVI Rep* 9:9-12
- Cox, T.C., Allen, L.R., Cox, L.L., Hopwood, B., Goodwin, B., Haan, E. und Suthers, G.K.** 2000. New mutations in MID1 provide support for loss of function as the cause of X-linked Opitz syndrome. *Hum Mol Genet* 9:2553-62
- de Groot, N.G., Otting, N., Doxiadis, G.G., Balla-Jhagjhoorsingh, S.S., Heeney, J.L., van Rood, J.J., Gagneux, P. und Bontrop, R.E.** 2002. Evidence for an ancient selective sweep in the MHC class I gene repertoire of chimpanzees. *Proc Natl Acad Sci U S A* 99:11748-53
- Dho, S.H. und Kwon, K.S.** 2003. The Ret finger protein induces apoptosis via its RING finger-B box-coiled-coil motif. *J Biol Chem* 278:31902-8
- Diaz-Griffero, F., Li, X., Javanbakht, H., Song, B., Welikala, S., Stremlau, M. und Sodroski, J.** 2006. Rapid turnover and polyubiquitylation of the retroviral restriction factor TRIM5. *Virology* 349:300-15

- Dong, S., Stenoien, D.L., Qiu, J., Mancini, M.A. und Tweardy, D.J.** 2004. Reduced intranuclear mobility of APL fusion proteins accompanies their mislocalization and results in sequestration and decreased mobility of retinoid X receptor alpha. *Mol Cell Biol* 24:4465-75
- Duan, Z., Gao, B., Xu, W. und Xiong, S.** 2008. Identification of TRIM22 as a RING finger E3 ubiquitin ligase. *Biochem Biophys Res Commun* 374:502-6
- Everett, R.D., Rechter, S., Papior, P., Tavalai, N., Stamminger, T. und Orr, A.** 2006. PML contributes to a cellular mechanism of repression of herpes simplex virus type 1 infection that is inactivated by ICP0. *J Virol* 80:7995-8005
- Freed, E.O. und Mouland, A.J.** 2006. The cell biology of HIV-1 and other retroviruses. *Retrovirology* 3:77
- Freemont, P.S., Hanson, I.M. und Trowsdale, J.** 1991. A novel cysteine-rich sequence motif. *Cell* 64:483-4
- Fridell, R.A., Harding, L.S., Bogerd, H.P. und Cullen, B.R.** 1995. Identification of a novel human zinc finger protein that specifically interacts with the activation domain of lentiviral Tat proteins. *Virology* 209:347-57
- Fukasawa, K.** 2005. Centrosome amplification, chromosome instability and cancer development. *Cancer Lett* 230:6-19
- Gao, F., Bailes, E., Robertson, D.L., Chen, Y., Rodenburg, C.M., Michael, S.F., Cummins, L.B., Arthur, L.O., Peeters, M., Shaw, G.M., Sharp, P.M. und Hahn, B.H.** 1999. Origin of HIV-1 in the chimpanzee *Pan troglodytes troglodytes*. *Nature* 397:436-41
- Garcia-Mata, R., Gao, Y.S. und Sztul, E.** 2002. Hassles with taking out the garbage: aggravating aggresomes. *Traffic* 3:388-96
- Gillespie, J.H.** 1984. The Status of the Neutral Theory: The Neutral Theory of Molecular Evolution. *Science* 224:732-733
- Goldman, N. und Yang, Z.** 1994. A codon-based model of nucleotide substitution for protein-coding DNA sequences. *Mol Biol Evol* 11:725-36
- Gongora, C., David, G., Pintard, L., Tissot, C., Hua, T.D., Dejean, A. und Mechti, N.** 1997. Molecular cloning of a new interferon-induced PML nuclear body-associated protein. *J Biol Chem* 272:19457-63
- Gongora, C., Tissot, C., Cerdan, C. und Mechti, N.** 2000. The interferon-inducible Staf50 gene is downregulated during T cell costimulation by CD2 and CD28. *J Interferon Cytokine Res* 20:955-61
- Green, D.R. und Kroemer, G.** 2004. The pathophysiology of mitochondrial cell death. *Science* 305:626-9
- Gu, J., Chen, D., Rosenblum, J., Rubin, R.M. und Yuan, Z.M.** 2000. Identification of a sequence element from p53 that signals for Mdm2-targeted degradation. *Mol Cell Biol* 20:1243-53
- Hatzioannou, T., Perez-Caballero, D., Yang, A., Cowan, S. und Bieniasz, P.D.** 2004. Retrovirus resistance factors Ref1 and Lvl are species-specific variants of TRIM5alpha. *Proc Natl Acad Sci U S A* 101:10774-9
- Henry, J., Mather, I.H., McDermott, M.F. und Pontarotti, P.** 1998. B30.2-like domain proteins: update and new insights into a rapidly expanding family of proteins. *Mol Biol Evol* 15:1696-705
- Henry, J., Ribouchon, M., Depetris, D., Mattei, M., Offer, C., Tazi-Ahnini, R. und Pontarotti, P.** 1997a. Cloning, structural analysis, and mapping of the B30 and B7 multigenic families to the major histocompatibility complex (MHC) and other chromosomal regions. *Immunogenetics* 46:383-95
- Henry, J., Ribouchon, M.T., Offer, C. und Pontarotti, P.** 1997b. B30.2-like domain proteins: a growing family. *Biochem Biophys Res Commun* 235:162-5

- Herniou, E., Martin, J., Miller, K., Cook, J., Wilkinson, M. und Tristem, M.** 1998. Retroviral diversity and distribution in vertebrates. *J Virol* 72:5955-66
- Himathongkham, S. und Luciw, P.A.** 1996. Restriction of HIV-1 (subtype B) replication at the entry step in rhesus macaque cells. *Virology* 219:485-8
- Hodges, M., Tissot, C., Howe, K., Grimwade, D. und Freemont, P.S.** 1998. Structure, organization, and dynamics of promyelocytic leukemia protein nuclear bodies. *Am J Hum Genet* 63:297-304
- Hofmann, W., Schubert, D., LaBonte, J., Munson, L., Gibson, S., Scammell, J., Ferrigno, P. und Sodroski, J.** 1999. Species-specific, postentry barriers to primate immunodeficiency virus infection. *J Virol* 73:10020-8
- Hu, M., Gu, L., Li, M., Jeffrey, P.D., Gu, W. und Shi, Y.** 2006. Structural basis of competitive recognition of p53 and MDM2 by HAUSP/USP7: implications for the regulation of the p53-MDM2 pathway. *PLoS Biol* 4:e27
- James, L.C., Keeble, A.H., Khan, Z., Rhodes, D.A. und Trowsdale, J.** 2007. Structural basis for PRYSPRY-mediated tripartite motif (TRIM) protein function. *Proc Natl Acad Sci U S A* 104:6200-5
- Janeway, C.A., Jr. und Medzhitov, R.** 2002. Innate immune recognition. *Annu Rev Immunol* 20:197-216
- Joazeiro, C.A. und Weissman, A.M.** 2000. RING finger proteins: mediators of ubiquitin ligase activity. *Cell* 102:549-52
- Johnston, J.A., Ward, C.L. und Kopito, R.R.** 1998. Aggresomes: a cellular response to misfolded proteins. *J Cell Biol* 143:1883-98
- Keckesova, Z., Ylinen, L.M. und Towers, G.J.** 2004. The human and African green monkey TRIM5alpha genes encode Ref1 and Lv1 retroviral restriction factor activities. *Proc Natl Acad Sci U S A* 101:10780-5
- Keeble, A.H., Khan, Z., Forster, A. und James, L.C.** 2008. TRIM21 is an IgG receptor that is structurally, thermodynamically, and kinetically conserved. *Proc Natl Acad Sci U S A* 105:6045-50
- Kelley, J. und Trowsdale, J.** 2005. Features of MHC and NK gene clusters. *Transpl Immunol* 14:129-34
- King, K.L. und Cidlowski, J.A.** 1998. Cell cycle regulation and apoptosis. *Annu Rev Physiol* 60:601-17
- Kohler, G. und Milstein, C.** 1975. Continuous cultures of fused cells secreting antibody of predefined specificity. *Nature* 256:495-7
- Laemmli, U.K.** 1970. Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage T4. *Nature* 227:680-5
- Lavau, C., Marchio, A., Fagioli, M., Jansen, J., Falini, B., Lebon, P., Grosveld, F., Pandolfi, P.P., Pelicci, P.G. und Dejean, A.** 1995. The acute promyelocytic leukaemia-associated PML gene is induced by interferon. *Oncogene* 11:871-6
- Letvin, N.L., Morimoto, C., Aldrich, W.R. und Schlossman, S.F.** 1985. Definition of the T-lymphocyte inducer of suppression in primates using a monoclonal antibody. *Cell Immunol* 94:360-8
- Lim, J., Hao, T., Shaw, C., Patel, A.J., Szabo, G., Rual, J.F., Fisk, C.J., Li, N., Smolyar, A., Hill, D.E., Barabasi, A.L., Vidal, M. und Zoghbi, H.Y.** 2006. A protein-protein interaction network for human inherited ataxias and disorders of Purkinje cell degeneration. *Cell* 125:801-14
- Liu, H.L., Wang, Y.Q., Liao, C.H., Kuang, Y.Q., Zheng, Y.T. und Su, B.** 2005. Adaptive evolution of primate TRIM5alpha, a gene restricting HIV-1 infection. *Gene* 362:109-16
- Magness, C.L., Fellin, P.C., Thomas, M.J., Korth, M.J., Agy, M.B., Proll, S.C., Fitzgibbon, M., Scherer, C.A., Miner, D.G., Katze, M.G. und Iadonato, S.P.** 2005.

- Analysis of the *Macaca mulatta* transcriptome and the sequence divergence between *Macaca* and human. *Genome Biol* 6:R60
- Meyer, M., Gaudieri, S., Rhodes, D.A. und Trowsdale, J.** 2003. Cluster of TRIM genes in the human MHC class I region sharing the B30.2 domain. *Tissue Antigens* 61:63-71
- Miyata, T. und Yasunaga, T.** 1980. Molecular evolution of mRNA: a method for estimating evolutionary rates of synonymous and amino acid substitutions from homologous nucleotide sequences and its application. *J Mol Evol* 16:23-36
- Munoz-Fontela, C., Macip, S., Martinez-Sobrido, L., Brown, L., Ashour, J., Garcia-Sastre, A., Lee, S.W. und Aaronson, S.A.** 2008. Transcriptional role of p53 in interferon-mediated antiviral immunity. *J Exp Med* 205:1929-38
- Netzer, W.J. und Hartl, F.U.** 1998. Protein folding in the cytosol: chaperonin-dependent and -independent mechanisms. *Trends Biochem Sci* 23:68-73
- Nisole, S., Stoye, J.P. und Saib, A.** 2005. TRIM family proteins: retroviral restriction and antiviral defence. *Nat Rev Microbiol* 3:799-808
- Ohkura, S., Yap, M.W., Sheldon, T. und Stoye, J.P.** 2006. All three variable regions of the TRIM5alpha B30.2 domain can contribute to the specificity of retrovirus restriction. *J Virol* 80:8554-65
- Orimo, A., Tominaga, N., Yoshimura, K., Yamauchi, Y., Nomura, M., Sato, M., Nogi, Y., Suzuki, M., Suzuki, H., Ikeda, K., Inoue, S. und Muramatsu, M.** 2000. Molecular cloning of ring finger protein 21 (RNF21)/interferon-responsive finger protein (ifp1), which possesses two RING-B box-coiled coil domains in tandem. *Genomics* 69:143-9
- Perron, M.J., Stremlau, M., Song, B., Ulm, W., Mulligan, R.C. und Sodroski, J.** 2004. TRIM5alpha mediates the postentry block to N-tropic murine leukemia viruses in human cells. *Proc Natl Acad Sci U S A* 101:11827-32
- Prugnolle, F., Manica, A., Charpentier, M., Guegan, J.F., Guernier, V. und Balloux, F.** 2005. Pathogen-driven selection and worldwide HLA class I diversity. *Curr Biol* 15:1022-7
- Reddy, B.A., Etkin, L.D. und Freemont, P.S.** 1992. A novel zinc finger coiled-coil domain in a family of nuclear proteins. *Trends Biochem Sci* 17:344-5
- Reymond, A., Meroni, G., Fantozzi, A., Merla, G., Cairo, S., Luzi, L., Riganelli, D., Zanaria, E., Messali, S., Cainarca, S., Guffanti, A., Minucci, S., Pelicci, P.G. und Ballabio, A.** 2001. The tripartite motif family identifies cell compartments. *Embo J* 20:2140-51
- Rhodes, D.A., de Bono, B. und Trowsdale, J.** 2005. Relationship between SPRY and B30.2 protein domains. Evolution of a component of immune defence? *Immunology* 116:411-7
- Rhodes, D.A., Ihrke, G., Reinicke, A.T., Malcherek, G., Towey, M., Isenberg, D.A. und Trowsdale, J.** 2002. The 52 000 MW Ro/SS-A autoantigen in Sjogren's syndrome/systemic lupus erythematosus (Ro52) is an interferon-gamma inducible tripartite motif protein associated with membrane proximal structures. *Immunology* 106:246-56
- Saiki, R.K., Scharf, S., Faloona, F., Mullis, K.B., Horn, G.T., Erlich, H.A. und Arnheim, N.** 1985. Enzymatic amplification of beta-globin genomic sequences and restriction site analysis for diagnosis of sickle cell anemia. *Science* 230:1350-4
- Sambrook, J., Fritsch, E.F. und Maniatis, T.:** Molecular cloning: a laboratory manual. Cold Spring Harbour, New York, USA, 1989
- Sambrook J., F.E.F., Maniatis T.:** Molecular cloning: a laboratory manual (2nd edition), Cold Spring Harbor, New York, USA, 1989
- Sanger, F., Nicklen, S. und Coulson, A.R.** 1977. DNA sequencing with chain-terminating inhibitors. *Proc Natl Acad Sci U S A* 74:5463-7

- Sawyer, S.L., Emerman, M. und Malik, H.S.** 2004. Ancient adaptive evolution of the primate antiviral DNA-editing enzyme APOBEC3G. *PLoS Biol* 2:E275
- Sawyer, S.L., Emerman, M. und Malik, H.S.** 2007. Discordant Evolution of the Adjacent Antiretroviral Genes TRIM22 and TRIM5 in Mammals. *PLoS Pathog* 3:e197
- Sawyer, S.L., Wu, L.I., Emerman, M. und Malik, H.S.** 2005. Positive selection of primate TRIM5alpha identifies a critical species-specific retroviral restriction domain. *Proc Natl Acad Sci U S A* 102:2832-7
- Seeler, J.S. und Dejean, A.** 1999. The PML nuclear bodies: actors or extras? *Curr Opin Genet Dev* 9:362-7
- Sheehy, A.M., Gaddis, N.C., Choi, J.D. und Malim, M.H.** 2002. Isolation of a human gene that inhibits HIV-1 infection and is suppressed by the viral Vif protein. *Nature* 418:646-50
- Shibata, R., Sakai, H., Kawamura, M., Tokunaga, K. und Adachi, A.** 1995. Early replication block of human immunodeficiency virus type 1 in monkey cells. *J Gen Virol* 76 (Pt 11):2723-30
- Short, K.M. und Cox, T.C.** 2006. Subclassification of the RBCC/TRIM superfamily reveals a novel motif necessary for microtubule binding. *J Biol Chem* 281:8970-80
- Soddu, S., Blandino, G., Scardigli, R., Coen, S., Marchetti, A., Rizzo, M.G., Bossi, G., Cimino, L., Crescenzi, M. und Sacchi, A.** 1996. Interference with p53 protein inhibits hematopoietic and muscle differentiation. *J Cell Biol* 134:193-204
- Song, B., Diaz-Griffero, F., Park, D.H., Rogers, T., Stremlau, M. und Sodroski, J.** 2005a. TRIM5alpha association with cytoplasmic bodies is not required for antiretroviral activity. *Virology* 343:201-11
- Song, B., Gold, B., O'Huigin, C., Javanbakht, H., Li, X., Stremlau, M., Winkler, C., Dean, M. und Sodroski, J.** 2005b. The B30.2(SPRY) domain of the retroviral restriction factor TRIM5alpha exhibits lineage-specific length and sequence variation in primates. *J Virol* 79:6111-21
- Stremlau, M., Owens, C.M., Perron, M.J., Kiessling, M., Autissier, P. und Sodroski, J.** 2004. The cytoplasmic body component TRIM5alpha restricts HIV-1 infection in Old World monkeys. *Nature* 427:848-53
- Stremlau, M., Perron, M., Lee, M., Li, Y., Song, B., Javanbakht, H., Diaz-Griffero, F., Anderson, D.J., Sundquist, W.I. und Sodroski, J.** 2006. Specific recognition and accelerated uncoating of retroviral capsids by the TRIM5alpha restriction factor. *Proc Natl Acad Sci U S A* 103:5514-9
- Stremlau, M., Perron, M., Welikala, S. und Sodroski, J.** 2005. Species-specific variation in the B30.2(SPRY) domain of TRIM5alpha determines the potency of human immunodeficiency virus restriction. *J Virol* 79:3139-45
- Suyama, M., Torrents, D. und Bork, P.** 2006. PAL2NAL: robust conversion of protein sequence alignments into the corresponding codon alignments. *Nucleic Acids Res* 34:W609-12
- Tavalai, N., Papior, P., Rechter, S., Leis, M. und Stamminger, T.** 2006. Evidence for a role of the cellular ND10 protein PML in mediating intrinsic immunity against human cytomegalovirus infections. *J Virol* 80:8006-18
- Tissot, C. und Mechti, N.** 1995. Molecular cloning of a new interferon-induced factor that represses human immunodeficiency virus type 1 long terminal repeat expression. *J Biol Chem* 270:14891-8
- Tissot, C., Taviaux, S.A., Diriong, S. und Mechti, N.** 1996. Localization of Staf50, a member of the Ring finger family, to 11p15 by fluorescence in situ hybridization. *Genomics* 34:151-3
- Towers, G.J.** 2007. The control of viral infection by tripartite motif proteins and cyclophilin A. *Retrovirology* 4:40

- Tripathi, P. und Agrawal, S.** 2007. Immunobiology of human immunodeficiency virus infection. *Indian J Med Microbiol* 25:311-22
- Tsou, M.F. und Stearns, T.** 2006a. Controlling centrosome number: licenses and blocks. *Curr Opin Cell Biol* 18:74-8
- Tsou, M.F. und Stearns, T.** 2006b. Mechanism limiting centrosome duplication to once per cell cycle. *Nature* 442:947-51
- Van Kaer, L. und Joyce, S.** 2005. Innate immunity: NKT cells in the spotlight. *Curr Biol* 15:R429-31
- Vivier, E. und Malissen, B.** 2005. Innate and adaptive immunity: specificities and signaling hierarchies revisited. *Nat Immunol* 6:17-21
- Wajant, H.** 2003. Death receptors. *Essays Biochem* 39:53-71
- Weis, K., Rambaud, S., Lavau, C., Jansen, J., Carvalho, T., Carmo-Fonseca, M., Lamond, A. und Dejean, A.** 1994. Retinoic acid regulates aberrant nuclear localization of PML-RAR alpha in acute promyelocytic leukemia cells. *Cell* 76:345-56
- Wen, X., Lei, Y.P., Zhou, Y.L., Okamoto, C.T., Snead, M.L. und Paine, M.L.** 2005. Structural organization and cellular localization of tuftelin-interacting protein 11 (TFIP11). *Cell Mol Life Sci* 62:1038-46
- Wigley, W.C., Fabunmi, R.P., Lee, M.G., Marino, C.R., Muallem, S., DeMartino, G.N. und Thomas, P.J.** 1999. Dynamic association of proteasomal machinery with the centrosome. *J Cell Biol* 145:481-90
- Woo, J.S., Suh, H.Y., Park, S.Y. und Oh, B.H.** 2006. Structural basis for protein recognition by B30.2/SPRY domains. *Mol Cell* 24:967-76
- Yap, M.W., Nisole, S. und Stoye, J.P.** 2005. A single amino acid change in the SPRY domain of human Trim5alpha leads to HIV-1 restriction. *Curr Biol* 15:73-8
- Zhang, F., Hatzioannou, T., Perez-Caballero, D., Derse, D. und Bieniasz, P.D.** 2006. Antiretroviral potential of human tripartite motif-5 and related proteins. *Virology* 353:396-409
- Zhang, J. und Webb, D.M.** 2004. Rapid evolution of primate antiviral enzyme APOBEC3G. *Hum Mol Genet* 13:1785-91
- Zhu, J., Gianni, M., Kopf, E., Honore, N., Chelbi-Alix, M., Koken, M., Quignon, F., Rochette-Egly, C. und de The, H.** 1999. Retinoic acid induces proteasome-dependent degradation of retinoic acid receptor alpha (RARalpha) and oncogenic RARalpha fusion proteins. *Proc Natl Acad Sci U S A* 96:14807-12

9 Anhang

hTRIM10:

ATGGCCTCTGCTGCCTCTGTGACCAGCCTGGCAGATGAAGTCAACTGCCCCATCTGTCAGGGTACCCTGAGGGAG
CCGGTCACTATCGACTGCGGCCACAACCTTCTGCCGGGCTGCCTTACCCGCTACTGTGAGATACCAGGCCAGAC
CTGGAGGAGTCCCTACTTGCCCACTCTGCAAAGAACCCTTCCGTCTGGGAGCTTCCGGCCCAACTGGCAGCTG
GCTAACGTGGTGGAGAACATTGAGCGCCTCCAGCTGGTGTCCACACTGGGTTTGGGAGAGGAGGATGTCTGCCAA
GAGCACGGAGGGAAGATCTACTTCTTCTGTGAGGATGATGAGATGCAGTTGTGCGTGGTGTGCCGGGAGGCTGGG
GAGCACGCTACCCACACCATGCGCTTCCCTGGAGGATGCAGCGGCTCCCTATAGGGAACAAATCCATAAGTGTCTT
AAATGTCTAAGAAAAGAGAGAGAGAGATTCAGAAATCCAGTCAAGAGAAAATAAAAGGATGCAAGTCCTCCTG
ACTCAGGTGTCCACCAAGAGACAACAGGTGATTTCTGAGTTTCGCACACCTGAGGAAGTTTCTAGAGGAACAGCAG
AGCATCCTCTTAGCACAATTGGAGAGCCAGGATGGGGACATCTTGAGGCAACGGGATGAATTTGATTTGCTGGTT
GCTGGGGAGATCTGCCGGTTTAGTGCTCTTATTGAAGAACTGGAGGAGAAGAATGAGAGGCCAGCAAGGGAGCTC
CTGACGGACATCAGAAGCACTCTAATAAGATGTGAAACCAGAAAAGTGCCGGAACCCGGTGGCTGTGTGCCAGAG
CTGGGCCAGAGGATTTCGGGACTTTCCCCAGCAGGCCCTCCCGCTGCAGAGGGAGATGAAGATGTTTCTGGAAAAA
CTATGCTTTGAGTTGGACTATGAGCCAGCTCACATTTCTCTAGACCTCAGACTTCCCACCCCAAGCTCCTCTTG
TCCGAGGACCACCAGCGAGCTCAGTTCTCCTCAAAATGGCAGAACTCACCAGACAACCCCCAGCGTTTTGACCGG
GCCACCTGTGTTCTGGCCCACTGGCATCACAGGGGGGAGACACACGTGGGTGGTGAATATAGACCTGGCCCAT
GGGGCGAGCTGCACCGTGGGCGTGGTGAGCGAGGATGTGCAGCGGAAGGGGGAGCTTCGGCTGCCGCCAGAGGAG
GGGGTGTGGGCTGTGAGGCTGGCTTGGGGCTTCGTCTCGGCTCTGGGCTCCTTCCCACACGGCTGACCTGAAG
GAGCAGCCCCGGCAGGTGAGGGTGTCTCTTGACTATGAGGTGGGCTGGGTGACCTTCACCAACGCTGTACCCGA
GAGCCCATCTACACCTTCACTGCTCCTTCACTAGGAAGGTCAATCCCTTCTTTGGGCTCTGGGGCCGAGGGTCC
AGTTTCTCCCTGAGCTCCTGA

rhTRIM10:

ATGGCCTCTGCTGCCTCTGTGACCAGCCTGGCAGATGAAGTCAACTGCCCCATCTGCCAGGGTACCCTGAGGGAG
CCGGTCACTATCGACTGCGGCCACAACCTTCTGCCGGGCTGCCTTACTCGCTACTGTGAGATCCCAGGCCAGAC
CTGGAGGAGTTCGCTACTTGCCCACTCTGCAAAGAACCCTTCCGTCTGGGAGCTTCCGGCCCAACTGGCAGCTG
GCTAACGTGGTGGAGAACATCGAGCGCCTCCAGCTGGTGTCCACACTGGGTTTGGGAGAGGAGGATGCCTGCCAG
GAGCACGGAGAGAAGATCTACTTCTTCTGTGAGGATGATGAGATGCAGTTGTGCGTGGTGTGCCGGGAGGCTGGA
GAGCACGCTGCCCACACCATGCGCTTCCCTAGAGGATGCGGCGGCTCCCTATAGGGAACAAATACATAAGTGTCTT
AAATGTCTAAGAAAAGAGAGAGAGGAGATTCAGAAATCCAGTCAAGAGAAAATAAAAGGATGCAAGTCCTCCTG
ACTCAGGTGTCCACCAAGAGACAACAGGTGATTTCTGAGTTTCGCACACCTGAGGAAGTTTCTAGAGGAACAGCAG
AGCATCCTCTTAGCACAACCTGGAGAGCCTGGATGGAGACATCTTGAAGCAACAGGATGAATTTGATTTCTGCTT
GCTGGAGAGATCTGCCGGTTTAGTACTCTTATTGAAGAACTGGAGGAGAAGAATGAGAGGCCAGCAAGGGAGCTC
CTGACGGATATCAGAAGCACTCTAATAAGATGTGAAACCAGAAAAGTGCCGGAACCCAGTGGCTGTGTCCCCAGAG
CTGGGCCAGAGGATTTCGGGACTTTCCCCAGCAGGCCCTCCCGCTACAGAGGGAGATGAAGATGTTTCTGGAAAAA
CTACACTTTGAGTTGGACTATGAGCCAGCTCACATTTCTCTAGACCTCAGACTTCCCACCCCAAGCTCCTCTTG
TCCGAGGACCACCAGCGGGCTCAGTTCTCCTACAAATGGCAGAACTCTCCAGACAATCCCAGCGTTTTGACCGG
GCCACCTGTGTTCTGGCCCACTGGCATCACAGGGGGGAGACACACGTGGGTGGTCAATATAGACCTGGCACAC
GGGGGCAGTTGCACCGTGGGCGTGGTGAGCGAGGATGTGCAGCGGAAGGGAGAGCTTCGACTGCCGCCAGAGGAG
GGCGTGTGGGCTGTGAGGCTGGCTTGGGGCTTTGTCTCGGCTCTGGGCTCCTTCCCACACGGCTGACCTGAAG
GAGCAGCCCCAGCAGGTGCGGGTGTCTCTTGACTATGAGGTGGGCTGGGTGACCTTCACCAATGCTGCCACCCGA
GAGCCCATCTACACCTTCACTGCTCCTTCACTAGGAAGGTCAATCCCTTCTTTGGGCTCTGGGGCCGAGGGTCC
AGTTTCTCCCTGAGCTCCTGA

hTRIM15:

ATGCCCCAACCCTGCTCCCTGAAGGTGGTCCATGAGCTGCCTGCCTGTACCTCTGTGCGGGGCGCTGGAGGAG
CGGTGACCATTCCCTGTGGACACACCTTCTGCCGGCTCTGCCTCCCCGCGCTCTCCCAGATGGGGGCCAATCCT
CGGGCAAGATCCTGCTCTGCCCGCTCTGCCAAGAGGAGGAGCAGGCAGAGACTCCCATGGCCCCCTGTGCCCTGG
GCCCCGTGGGAGAACTTACTGCGAGGAGCACGGCGAGAAGATCTACTTCTTCTGCGAGAACGATGCCGAGTTCC
TCTGTGTGTTCTGCAGGGAGGGTCCACGCACCAGGCGCACACCGTGGGGTTCCTGGACGAGGCCATTACAGCCCT
ACCGGGATCGTCTCAGGAGTCGACTGGAAGCTCTGAGCACGGAGAGAGATGAGATTGAGGATGTAAAGTGTCAAG
AAGACCAGAAGCTTCAAGTGCTGCTGACTCAGATCGAAAGCAAGAAGCATCAGGTGGAACAGCTTTTGGAGAGGC
TGCAGCAGGAGCTGGAGCAGCAGCGATGTCTCCTGCTGGCCAGGCTGAGGGAGCTGGAGCAGCAGATTGGAAGG
AGAGGGATGAATATATCACAAAGGTCTCTGAGGAAGTCACCCGGCTTGGAGCCCAGGTCAAGGAGCTGGAGGAGA
AGTGTACGACGCCAGCAAGTGAGCTTCTACAAGATGTGAGATCAACCAGAGCAGGTGTGAGATGAAGACTTTTG
TGAGTCCTGAGGCCATTTCTCCTGACCTTGTCAAGAAAGATCCGTGATTTCCACAGGAAAATACCTACCCCTCCAG
AGATGATGAGGATGTTCTCAGAAAACCTGGCGCATCATCTGGAATAGATTACAGGGGTATCACTCTGGACCCTC
AGACCGCCAGCCGGAGCCTGGTTCTCTCGGAAGACAGGAAGTCAGTGAGGTACACCCGGCAGAAGAAGAGCCTGC

CAGACAGCCCCCTGCGCTTCGACGGCCTCCCGGCGGTTCTGGGCTTCCCGGGCTTCTCCTCCGGGCGCCACCGCT
GGCAGGTTGACCTGCAGCTGGGCGACGGCGGCGGCTGCACGGTGGGGGTGGCCGGGGAGGGGGTGAGGAGGAAGG
GAGAGATGGGACTCAGCGCCGAGGACGGCGTCTGGGCCGTGATCATCTCGCACCAGCAGTGTGGGCCAGCACCT
CCCCGGGCACCGACCTGCCGCTGAGCGAGATCCCGCGCGGCGTGAGAGTCGCCCCTGGACTACGAGGCGGGGCGAGG
TGACCTCCACAACGCCCAGACCCAGGAGCCCATCTTCACCTTCACTGCCCTTTCTCCGGCAAAGTCTTCCCTT
TCTTTGCCGTCTGGAAAAAGGTTCTTGCCTTACGCTGAAAGGCTGA

rhTRIM15:

ATGCCCTCAACCCCGTCCCTGAAGGTGGTCCACGAGCTGCCCGCCTGTACCCTCTGTGTGGGGCCGCTGGAGGAT
GCGGTGACCGCTCCCTGTGGGCACACCTTCTGCCGGCTCTGCCCTCCCCACGCTCTCCAGATGGGGGCCAGTCC
TCGGGCAAGATCCTGCTCTGCCCGCTCTGCCAAGAGGAGGAGCAGGCAGAGACTCCCATGGCCCCCTGTGCCCTG
GGCCCGCTGGGAGAGACTTACTGTGAGGAGCACGGGGAGAAGATCTACTTCTTCTGCGAGAACGACGCCGAGTTC
CTCTGTGTGTTCTGCAGAGAAGGTCTTACCACCAGGCGCACACCGTGGGATTCCTGGACGAAGCCATTTCAGCCC
TACCGGGATCGTCTCAGGAGTCGACTGGAAGCTCTGAGCATGGAGAGAGATGAGATTGAGGATGTAAAGTGTCTGA
GAAGACCAGAAGCTTCAAGTGCTGCTGACTCAGATTGAAAACAAGAAGCATCAGGTGGAAGCAGCTTTTGTAGAGG
CTGCAGCAGGAGCTGGAGCAACAGCGGTGTCTCCTGCTGGCCAGGCTGCGGGAGCTGGAACAGCAGATT'TGGAAG
GAGAGGGATGAATATATCACAAAGGTCTCTGAGGAAGTCTCCCGGCTTGGAGCCCAGGTCAAGGAGCTGGAGGAG
AAGTGTGAGCAGCCAGCAAGTGAGCTTCTACAAGACATCAGAGTCAACCAGAGCAGGTGTGAAATGAAGACTTTT
GTGAGTCTTGAGGCCATCTCTCCTGACCTTGTCAAGAAGATCCGTGATT'TCCACAGGAAAATACTCACCCTCCCA
GAGATGATGAGGATGTTCTCAGAAAACCTGGCGCATCATCTGGAAATAGATTTCAGGGGTCACTACTCTGGACCCT
CAGACCGCCAGCCGGAGCCTGGTTCTCTCGGAAGACAGGAAGTCAGTGAGGTACACCCGGCAGAAGAAGAACCTG
CCAGACAGCCCCCTGCGCTTCGACGGCCTCCCGGCGGTGCTGGGCTTCCCGGGTTTCTCCTCGGGGCGCCACCGC
TGGCAGGTTGACCTGCAGCTCGGCGACGGCGGCGGCTGCACCGTGGGGGTGGCCGGGGAGGGGGTGAGGAGGAAG
GGGAGATGGGCCTTAGCGCCGAGGACGGCGTCTGGGCCGTGATCATCTCGCACCAGCAGTGTGGGCCAGCACC
TCCCCGGGCACCGACCTGCCGCTGAGCGAGATCCCGCGCTATGTGGGCGTCGCCCTGGACTACGAGGCCGGACAG
GTGACCCTCTTCAACGCCCAGACCCAGGAGCCCATCTTACCTTTCGCTGCCCTTTTCTCCGGCAAAGTCTTTCTCT
TTCTTTTGCCGTCTGGAAAAAGGTTCTTGCCTTACTCTGAAAGGCTGA

hTRIM26:

ATGGCCACGTCAGCCCCACTACGGAGCCTGGAAGAGGAGGTGACCTGCTCCATCTGTCTTGATTACCTGCGGGAC
CCTGTGACCATTTGACTGTGGCCACGTCTTCTGCCGAGCTGCACCACAGACGTCCGCCCCATCTCAGGGAGCCGC
CCCGTCTGCCCCACTCTGCAAGAAGCCTTTTAAGAAGGAGAACATCCGACCCGTGTGGCAACTGGCCAGCCTGGTG
GAGAACATTGAGCGGCTGAAGGTGGACAAGGGCAGGCAGCCGGGAGAGGTGACCCGGGAGCAGCAGGATGCAAAG
TTGTGCGAGCGACACCCGAGAGAAGCTGCACTACTACTGTGAGGACGACGGGAAGCTGCTGTGCGTGATGTGCCGG
GAGTCCCGGGAGCACAGGCCCCACACGGCCGTCTCATGGAGAAGGCCGCCAGCCCCACAGGGAAAAAATCCTG
AACCACCTGAGTACCCTAAGGAGGGACAGAGACAAAATTCAGGGCTTCCAGGCAAAGGGAGAAGCTGATATCCTG
GCCGCGCTGAAGAAGCTCCAGGACCAGAGGCAGTACATTGTGGCTGAGTTTGAGCAGGGTCATCAGTTCTGAGG
GAGCGGGAGGAACACCTGCTGGAACAGCTGGCGAAGCTGGAGCAGGAGCTCACGGAGGGCAGGGAGAAGTTCAAG
AGCCGGGGCGTCGGGGAGCTTGCCCGGCTGGCCCTGGTTCATCTCCGAACCTGGAGGGCAAAGGCGCAGCAGCCAGCT
GCAGAGCTCATGCAGGACACGAGAGACTTCCTAAACAGGTATCCACGGAAGAAGTTCTGGGT'TGGGAAACCCATT
GCTCGAGTGGTTAAAAAAGACCCGAGAAATCTCAGATAAACTCCTCTCTCTGCAACGAGGCCCTGAGGGAATTC
CAGGGGAAGCTGCTGAGAGACTTGAATATAAGACAGTGAGCGTCACCTTGGACCCACAGTCGGCCAGTGGGTAC
CTGACGTGTGAGAGGACTGGAAGTGCGTGACCTACACCAGCCTGTACAAGAGTGCCCTACCTGCACCCCCAGCAG
TTTGACTGTGAGCCTGGGGTGCTAGGCAGCAAGGGCTTACCTGGGGCAAGGCTCTACTTGGGAAGTGGAAGTGGAG
AGGGAGGGCTGGTCTGAGGATGAAGAAGAGGGGGATGAGGAGGAAGAGGGAGAAGAGGAGGAGGAAGAGGAG
GCCGGCTATGGGGATGGATATGACGACTGGGAAACGGACGAAGATGAGGAATCGTTGGGCGATGAAGAGGAAGAA
GAGGAGGAGGAAGAGGAGGAAGTTCTGGAAAGCTGCATGGTGGGGGTGGCTAGAGACTCTGTGAAGAGGAAGGGA
GACCTCTCCCTGCGGCCAGAGGATGGCGTGTGGGCGCTGCGCCTCTCCTCCTCCGGCATCTGGGCCAACACCAGC
CCCGAGGCTGAGCTTTTCCAGCACTGCGGCCCGGAGAGTGGGCATCGCCCTGGATTATGAAGGGGGCACCCTG
ACTTTCACCAACGCAGAGTCACAGGAATCATCTACACCTTCACTGCCACCTTCAACCCGGCGCCTGGTCCCCTTC
CTGTGGCTCAAGTGCCAGGAACACGCCCTCTGCTAAGACCTGA

rhTRIM26:

ATGGCCACGTCAGCCCCACTACGGAGCCTGGAAGAGGAGGTGACCTGCTCCATCTGTCTCGATTACCTGCGGGAC
CCTGTGACCATTTGACTGTGGCCACGTCTTCTGCCGAGCTGCACCACAGACGTCCGCCCCATCTCAGGGAGCCGC
CCTGTCTGCCCCACTCTGCAAGAAGCCTTTTAAGAAGGAGAACATCCGACCCGTGTGGCAGCTGGCCAGCCTGGTG
GAGAACATTGAGCGGCTGAAGGTGGACAAGGGCAGGCAGCCGGGAGAGGTGACCCGGGAGCAGCAGGACGCGAAG
TTGTGTGAGCGACACCCGAGAGAAGCTGCACTACTACTGCGAGGACGACGGGAAGCTGCTGTGCGTGATGTGCCGG
GAGTCCCGGGAGCACAGGCCCCACACGGCCGTCTCATGGAGAAGGCCGCCAGCCCCACAGGGAAAAAATCCTG
AACCACCTGAGTACCCTAAGGAGAGACAGAGACAAAATTCAGGGCTTCCAGGCAAAGGGAGAAGCTGATATCCTG
GCCGCGCTGGAAGCCCTGAGGTGGTGCACCCGTGTAGGGCAGGGTGAGCCTGGGCAAGCAGGCGGCAGCTGGGAG
GTGTCTCTAGCACTGTTTGTAGGGAGGACGGGCGTCAGCCTGGCAGTGGCAGACCTGGGTTTTAGCCCAGAATGT
CATCTCCATAAAAAACGGACCACATTTGTTTGTTCACCTGATATGTCCACCTCTGCTACAGTGTGGGTGCAAA
TGCATTGAAGACACGAGAGACTTCCTAAACAGGTATCCACGGAAGAAGTTCTGGGT'TGGGAAACCCATCGCTCGA

GTGGTTAAAAAAGACCGGAGAATTCTCAGACAACTCCTGTCTCTGCAGCGAGGCCCTGAGGGAATTCAGGGG
 AAGCTGCTGAGAGACTTGGAATATAAGACAGTGAGTGTACCCTGGACCCACAGTCGGCCAGTGGGTACCTGCAG
 CTGTGAGAGGACTGGAAGTGCCTGACCTACCCAGCTTGTACAAGAGTGCCCTACCTGCACCCCCAGCAGTTTGAC
 TGTGAGCCTGGGGTGTCTGGGCAGCAAGGGCTTCACCTGGGGCAAGGTCTACTGGGAAGTGGAAGTGGAGAGGGAG
 GGCTGGTCTGAGGATGAAGAAGATGGGGATGAGGAGGAAGAAGGAGAAGAGGAGGAAGAGGAAGAGGAGGCCGC
 TATGGGGATGGATACGATGACTGGGAAACAGACGAAGATGAGGAATCGTTGGGCGATGAAGAGGAAGAAGAGGAG
 GAGGAAGAGGAGGAAGTTCTGGAAAGCTGCATGGTAGGGGTGGCCAGAGACTCTATGAAGAGGAAGGGAGACCTC
 TCCCTGCGGCCAGAGGATGGCGTGTGGGCACTGCGCCTCTCCTCTTCCGGCATATGGGCCAACACCAGCCCCGAG
 GCCGAGCTTTTCCCAGCACTGCGGCCCGGAGAGTGGGCATCGCCCTGGATTATGAAGGGGGCACTGTGACTTTC
 ACCAACGCAGAGTCACAGGAACCTATCTACACCTTCACTGCCACCTTCACCCGGCGCCTGGTCCCCCTTCTGTGG
 CTCAAGTGCCAGGAACGCGCCTCCTGCTGAGACCCCTGA

hTRIM27:

ATGGCCTCCGGGAGTGTGGCCGAGTGCCTGCAGCAGGAGACCACCTGCCCCGTGTGCCCTGCAGTACTTCGCAGAG
 CCCATGATGCTCGACTGCGGCCATAACATCTGTTGCGCGTGCCTCGCCCCGTGTGGGGCACGGCAGAGACTAAC
 GTGTCTGTCGCCGAGTGCCGGGAGACCTTCCCGCAGAGGCACATGCGGCCAACCGGCACCTGGCCAACGTGACC
 CAACTGGTAAAGCAGCTGCGCACCGAGCGGCCGTGGGGCCCCGGCGGCGAGATGGGCGTGTGCGAGAAGCACCGC
 GAGCCCCCTGAAGCTGTACTGCGAGGAGGACCAGATGCCCATCTGCGTGGTGTGCGACCGCTCCCGCGAGCACCGC
 GGCCACAGCGTGTGCTGCCGCTCGAGGAGGCGGTGGAGGGCTTCAAGGAGCAAATCCAGAACCAGCTCGACCATTTA
 AAAAGAGTGAAAGATTTAAAGAAGAGACGTGCGGCCCAAGGGGAAACAGGCACGAGCTGAACCTTTGAGCCTAAC
 CAGATGGAGAGGGAGAAGATTGTTTGGGAGTTTGAGCAGCTGTATCACTCCTTAAAGGAGCATGAGTATCGCCTC
 CTGGCCCCCTTGAGGAGCTAGACTTTGGCCATCTACAATAGCATCAATGGTGCCATCACCCAGTTCTCTTGCAAC
 ATCTCCACCTCAGCAGCCTGATCGCTCAGCTAGAAGAGAAGCAGCAGCAGCCACCAGGGAGCTCCTGCAGGAC
 ATTGGGGACACATTGAGCAGGGCTGAAAGAATCAGGATTCTGAACCTTGGATCACACCTCCAGATTTGCAAGAG
 AAAATCCACATTTTTGCCCAAAAATGTCTATTCTTGACGGAGAGTCTAAAGCAGTTTACAGAAAAAATGCAGTCA
 GATATGGAGAAAAATCCAAGAATTAAGAGAGGCTCAGTTATACCTCAGTGGACGTGACTCTGGACCCAGACACGGCC
 TACCCCAGCCTGATCCTCTCTGATAATCTGCGGCAAGTGCGGTACAGTTACCTCCAACAGGACCTGCCTGACAAC
 CCCGAGAGGTTCAATCTGTTTCCCTGTGTCTTGGGCTCTCCATGCTTCATCGCCGGGAGACATTATTGGGAGGTA
 GAGGTGGGAGATAAAGCCAAGTGAGCCATAGGTGTCTGTGAAGACTCAGTGTGCAGAAAAGGTGGAGTAACCTCA
 GCCCCCAGAATGGATTCTGGGCAGTGTCTTTGTGGTATGGGAAAGAATATTGGGCTCTTACCTCCCCAATGACT
 GCCCTACCCCTGCGGACCCCGCTCCAGCGGGTGGGGATTTCTTGAGCTATGATGCTGGTGAGGTCTCCTTTCTAC
 AACGTGACAGAGAGGTGTACACCTTCACTTTCTCTCATGCTACCTTTTGTGGGCTGTCCGGCCCTACTTTCAGT
 CTGAGTTACTCGGGAGGGAAAAAGTGCAGCTCCTCTGATCATCTGCCCCATGAGTGGGATAGATGGGTTTTCTGGC
 CATGTTGGGAATCATGGTCAATCCATGGAGACCTCCCCCTGA

rhTRIM27:

ATGGCCTCCGGGAGCGTGGCCGAGTGCCTGCAGCAGGAGACCACCTGCCCCGTGTGCCCTGCAGTACTTCGCAGAG
 CCCATGATGCTCGACTGCGGCCATAACATCTGTTGCGCGTGCCTCGCCCCGTGTGGGGCACGGCAGAGACTAAC
 GTGTCTGTCGCCGAGTGCCGGGAGACCTTCCCGCAGAGGCACATGCGGCCAACCGGCACCTGGCCAACGTGACC
 CAGCTGGTGAAGCAGCTGCGCACCGAGCGGCCGTGGGGCCCCGGCGGCGAGATGGGCGTGTGCGAGAAACACCGC
 GAGCCCCCTGAAGCTCTACTGCGAGGAGGACCAGATGCCCATCTGCGTGGTGTGCGACCGCTCCCGCGAGCACCGC
 GGCCACAGCGTGTGCTGCCGCTCGAGGAGGCACTGGAGGGCTTCAAGGAGCAAATCCAGAACCAGCTTGACCATTTA
 AAAAGAGTGAAAGATTTAAAGAAGAGACGTGCGGCCCAAGGGGAAACAGGCACGAGCTGAACCTTTGAGCCTAAC
 CAGATGGAGAGGGAGAAGATTGTTTGGGAGTTTGAGCAGCTGTATCACTCCTTAAAGGAGCATGAGTATCGCCTC
 CTGGCCCCGTCTTGAGGAGCTAGACTTTGGCCATCTACAATAGCATCAATGGTGCCATCACCCAGTTCTCTTGCAAC
 ATCTCCACCTCAGCAGCCTGATCGCTCAGCTAGAAGAGAAGCAGCAGCAGCCACCAGGGAGCTCCTGCAGGAC
 ATTGGGGACACATTGAGCAGGGCTGAAAGAATCAGGATTCTGAACCTTGGATCACGCTCCAGACTTGCAAGAG
 AAAATCCACATTTTTGCCCAAAAATGTCTATTCTTGACGGAGAGTCTAAAGCAGTTTACAGAAAAAATGCAGTCA
 GATATGGAGAAAAATCCAAGAATTAAGAGAGGCTCAGTTATACCTCAGTGGACGTGACTCTGGACCCAGACACGGCC
 TACCCCAGCCTGATCCTCTCTGACAATCTGCGGCAAGTGCGGTACAGTTACCTCCAACAGGACCTGCCTGACAAC
 CCCGAGCGGTTCAATCTGTTTCCCTGTGTCTTGGGCTCTCCATGCTTCATCGCTGGGAGACATTATTGGGAGGTA
 GAGGTGGGAGATAAAGCCAAGTGAGCCATAGGTGTCTGTGAAGACTCAGTGTGCAGAAAAGGTGGAGTAACCTCA
 GCCCCCAGAATGGATTCTGGGCAGTGTCTTTGTGGTATGGGAAAGAATATTGGGCTCTTACCTCCCCGATGACT
 GCCCTCCCCCTGCGGACCCCGCTTCAGCGGGTGGGGATTTCTTGAGCTATGATGCTGGCGAGGTCTCCTTCTAC
 AACGTGACAGAGAGGTGTACACTTTCACTTTCTCTCATGCTACCTTTTGTGGGCTGTCCGGCCCTACTTTCAGT
 CTGAGTTACTCGGGAGGGAAAAAGTGCAGCTCCTCTGATCATCTGCCCCATGAGTGGGATAGATGGGTTTTCTGGC
 CATGTTGGGAATCATGGTCAATCCATGGAGACCTCCCCCTGA

hTRIM39:

ATGGCAGAGACAAGTCTGTTAGAGGCTGGGGCCTCTGCAGCCTCTACAGCTGCGGCTTTGGAGAAGTTACAGGTG
 GAGGCGAGCTGCTCTGTGTGCTGGAGTATCTGAAGGAACCTGTATCATTTAGTGTGGGCACAAGTTCTGCAAA
 GCTTGATCACCCGCTGGTGGGAGGACCTAGAGAGGAGTTCCCTTGTCTGTCTGTGCGAAAGACATCCCGCTAC
 CGCAGTCTCCGACCTAATCGGCAACTAGGCAGTATGGTGGAAATTTGCCAAGCAGCTCCAGGCCGTCAAGCGGAAG
 ATCCGGGATGAGAGCCTCTGCCCCAACACCATGAGGCCCTCAGCCTTTTCTGTTATGAGGACCAGGAGGCTGTA

TGCTTGATATGTGCAATTTCCACACCCACCGGGCCACACCGTTGTGCCACTGGACGATGCTACACAGGAGTAC
 AAGGAAAACTGCAGAAGTGTCTGGAGCCCCGGAACAGAAGCTGCAGGAGATCAGTCGCTGCAAGTCCCTGAG
 GAGAAGAAGCCTGGTGAGCTCAAGAGACTAGTGGAAAGTCGCCGACAGCAGATCTTGAGGGAGTTTGAAGAGCTT
 CATAGGCGGCTGGATGAAGAGCAGCAGGTGTTGCTTTCACGACTGGAAGAAGAGGAACAGGACATTTCTGCAGCGA
 CTCCGAGAAAAATGCTGCTCACCTTGGGGACAAGCGCCGGGACCTGGCCCACTTGGCTGCCGAGGTGGAGGGCAAG
 TGCTTACAGTCAGGCTTCGAGATGCTTAAGGATGTCAAAAGTACCTTGAAAAATGTGAAAAGGTGAAGACCATG
 GAGGTGACTTCAGTATCCATAGAGCTGGAAAAGAACTTCAGCAATTTTCCCGACAGTACTTTGCCCTAAGGAAA
 ATCCTTAAACAGCTAATTGCGGATGTGACCCCTGGACCCCTGAGACAGCTCATCCTAACCTAGTCCCTGTCAGAGGAT
 CGTAAGAGCGTCAAGTTTCGTGGAGACAAGACTCCGGGATCTCCCTGACACACCAAGGCGTTTACCTTCTACCCCT
 TGCGTCTGGCTACTGAGGGTTTACCTCAGGTCGACACTACTGGGAGGTGGAGGTGGGCGACAAGACCCACTGG
 GCAGTGGGTGTATGCCGGGACTCCGTGAGCCGAAAGGGCGAGTTGACTCCACTCCCTGAGACTGGCTACTGGCGG
 GTGCGGCTATGGAATGGGGACAAATATGCAGCCACCACCACACCTTTTACCCCTTTGCACATCAAGGTGAAACCC
 AAGCGGGTAGGCATATTCTTAGACTATGAGGCCGGCAGACTGTCTTTCTACAATGTACAGACCGCTCTCATATC
 TACACCTTCACTGATACTTTTACTGAGAACTTTGGCCCCCTTCTTACCCAGGCATCCGGGCTGGACGGAAGAAT
 GCTGCACCACTTACCATCAGGCCCCCAACAGATTGGGAGTGA

rhTRIM39:

ATGGCAGAGACAAGTCTGTTAGAGGCTGGGGCCTCTGCAGCCTCTACAGCTGCGGCTTTGGAGAAGTTACAGGTG
 GAGGCAAGCTGCTCTGTGTGCTGGAGTATCTGAAGGAACCTGTCATCATTGAGTGTGGGCACAACCTTCTGCAA
 GCTTGCATCACCCGCTGGTGGAAGACCTAGAGAGGGACTTCCCTTGTCTGTCTGTCGAAAGACATCCCGCTAC
 CGCAGTCTCCGACCTAATCGGCAACTAGGCAGTATGGTGGAAATTGCCAAGCAGCTCCAGGCCGTCAAGCGGAAG
 ATCCGGGATGAGAGCCTCTGCCCCAACACCATGAGGCCCTCAGCCTTTTCTGTTATGAGGACCAGGAGGCTGTA
 TGCTTAATCTGTGCAATTTCCACACCCACCGGGCCACACCGTTGTGCCACTGGATGACGCTACACAGGAGTAC
 AAGGAAAACTGCAGAAGTGTCTGGAGCCCCGGAACAGAAGCTGCAGGAGATCAGTCGCTGCAAGTCCCTGAG
 GAGAAGAAGCCTGGTGAGCTCAAGAGACTAGTGGAAAGTCGCCGACAGCAGATCTTAAGGGAGTTTGAAGAGCTT
 CACAGGCGGCTGGATGAAGAGCAGCAGGTGTTGCTTTCACGACTAGAAGAAGAGGAACAGGACATTTCTGCAGCGA
 CTCCGAGAAAAATGCTGCCCACCTTGGGGACAAGCGCCGGGACCTGGCCCACTTGGCTGCAGAGGTGGAGGGCAAG
 TGCTTACAGTCGGGCTTCGAGATGCTTAAGAAATGTTTATTGTGCCCATGATGCCAGGAATATTCCTAGAAAGTTC
 AGAGGCTCACTCTCAAGGATCTGTCCACGGGATCATAAGGCTCTCCCTTGGATTAGTAAAAGAAAGCAACAGATGT
 GAGAAGGTGAAGACCATGGAGGTGACTTCAGTATCCATAGAGCTGGAAAAGAACTTCAGCAATTTCCCCCGACAG
 TACTTTGCCCTAAGGAAAAATCCTTAAACAGCTAATTGCGGATGTGACCTGGACCTGAGACAGCTCATCCTAAC
 CTAGTCTGTGCGGAGGATCGTAAGAGCGTCAAGTTTCGTGGAGACAAGACTCCGGGATCTCCCTGACACACCAAGG
 CGTTTACCTTCTACCTTTCGCTCCTGGCTACTGAGGGTTTACCTCAGGTCGACACTACTGGGAGGTGGAGGTG
 GCGGACAAGACCCACTGGGCAGTGGGTGTATGCCGGGACTCCGTGAGCCGAAAGGGCGAGTTGACTCCACTCCCT
 GAGACTGGCTACTGGCGGCTGCGGCTATGGAATGGGGACAAATATGCGGCCACCACCACACCTTTTACCCCTTTG
 CACATCAAAGTGAAACCAAGCGGGTAGGCATATTCTTAGACTATGAGGCCGGCAGACTGTCTTTCTACAATGTC
 ACAGACCGCTCTCATATCTACACCTTCACTGATACTTTTACTGAGAACTTTGGCCCCCTTCTTACCCAGGCATC
 CGGGCTGGACGGAAGAATGCTGCACCACTTACCATCAGGCCCCCAACAGATTGGGAGTGA

hTRIM5α:

ATGGCTTCTGGAATCCTGGTTAATGTAAAGGAGGAGGTGACCTGCCCCATCTGCCTGGAACCTCTGACACAACCC
 CTGAGCCTGGACTGCGGCCACAGCTTCTGCCAAGCATGCCCTCACTGCAAACCACAAGAAGTCCATGCTAGACAAA
 GGAGAGAGTAGCTGCCCTGTGTGCCGGATCAGTTACCAGCCTGAGAACATACGGCCTAATCGGCATGTAGCCAAAC
 TTAGTGGAGTAAGCTCAGGGAGGTCAAGTTGAGCCAGAGGGGCGAGAAAGTTGATCATTGTGCACGCCATGGAGAG
 AAACCTTCTACTCTTCTGTGTCAGGAGGACGGGAAGTCAATTTGCTGGCTTTGTGAGCGGTCTCAGGAGCACCGTGGT
 CACCACACGTTCCCCACAGAGGAGGTGCCCCAGGAGTACCAAGTGAAGCTCCAGGCAGCTCTGGAGATGCTGAGG
 CAGAAGCAGCAGGAAGCTGAAGAGTTGGAAGCTGACATCAGAGAAGAGAAAGCTTCTTGGAAGACTCAAATACAG
 TATGACAAAACCAACGCTCTTGGCAGATTTTGGACAACTGAGAGACATCCTGGACTGGGAGGAGAGCAATGAGCTG
 CAAAACCTGGAGAAGGAGGAGGAAGACATTTGAAAAGCCTTACGAACCTTGAAACTGAGATGGTGCAGCAGACC
 CAGTCCCTGAGAGAGCTCATCTCAGATCTGGAGCATCGGCTGCAGGGGTGAGTATGGAGCTGCTTACGGGTGTG
 GATGGCGTCATAAAAAGGACGAGAGACGTGACCTTGAAGAAGCCAGAACTTTTCCAAAAAATCAAAGGAGAGTG
 TTTTCGAGCTCCTGATCTGAAAGGAATGCTAGAAGTGTTTAGAGAGCTGACAGATGTCCGACGCTACTGGGTTGAT
 GTGACAGTGGCTCCAAACAACATTTTCAATGTGCTGTCATTTCTGAAGATAAGAGACAAGTGAAGTCTCCGAAACCA
 CAGATAATATATGGGGCAGAGGGACAAGATACCAGACATTTGTGAATTTCAATTTATGTACTGGCATCCTGGGC
 TCTCAAAGTATCACATCAGGGAAACATTTACTGGGAGGTAGACGTGTCCAAGAAAACCTGCTTGGATCCTGGGGTA
 TGTGCTGGCTTCAAACCTGATGCAATGTGTAATTTGAAAAAATGAAAAATATCAACCTAAATACGGTCACTGG
 GTTATAGGGTTAGAGGAAGAGTTAAATGTAGTGTCTTCCAGGATAGTTCCCTTCCATAGCTTCTGTTCTCTTTT
 ATTGTGCCCCCTCTCTGTGATTATTTGTCTGATCGTGTGGAGTTTTTCCCTAGACTATGAGGCTTGCACTGTCTCA
 TTCTTCAATATCACAAACCATGGATTTCTCATCTATAAGTTTCTCTCACTGTTCTTTTTCTCAGCCTGTATTTCCA
 TATTTAAATCCTAGAAAAATGTGGAGTCCCCATGACTCTGTGCTACCAAGCTCTTGA

rhTRIM5α:

ATGGCTTCTGGAATCCTGCTTAATGTAAAGGAGGAGGTGACCTGTCCCATCTGCCTGGAACCTCTGACAGAACCC
 CTGAGTCTGCACTGCGGCCACAGCTTCTGCCAAGCGTGCATCAGTGCGAACCACAAGAAGTCCATGCTATACAAA

GAAGGAGAGAGAAGCTGCCCTGTGTGCCGGATCAGTTACCAGCCTGAGAACATACAGCCTAATCGGCATGTAGCC
AACATAGTGGAGAAGCTCAGGGAGGTCAAGTTGAGCCCAGAAGAGGGGCAGAAGGTTGATCACTGTGCACGCCAT
GGAGAGAACTCCTACTCTTCTGTTCAGGAGGACAGCAAGGTCATTTGCTGGCTTTGTGAGCGGTCTCAGGAGCAC
CGTGGTCAACCACACTTTCTCATGGAGGAGGTTGCCCAGGAGTACCATGTGAAGCTCCAGACAGCTCTGGAGATG
CTGAGGCAGAAGCAGCAGGAAGCTGAAAAGTTGGAAGCTGACATCAGAGAAGAGAAAGCTTCCTGGAAGACTCAA
ATACAGTATGACAAAACCAACGTCTTGGCAGATTTTGTAGCAACTGAGAGACATCCTGGACTGGGAGGAGAGCAAT
GAGCTGCAAAACCTGGAGAAGGAGGAGGAAGACATTTCTGAAAAGCCTTACGAACCTCTGAAACTGAGATGGTGCAG
CAGACCCAGTCCCTGAGAGAGCTCATCTCAGATCTGGAGCATCGGCTGCAGGGGTCACTGATGGAGCTGCTTCAG
GGTGTGGATGGCATCATTAATAAGGATTGAGAACATGACCTTGAAGAAGCCAAAAACTTTTTCACAAAAATCAAAGG
AGAGTGTTCGAGCTCCTGATCTGAAAGGAATGCTAGACATGTTTAGAGAGCTAACAGATGCCCGACGCTACTGG
GTTGATGTGACACTGGCTCCAAACAACATTTTCGCATGCTGTCATTGCTGAAGATAAGAGACAAGTGAGCTCTCGG
AACCACAGATAATGTATCAGGCACCAGGGACATTATTTACGTTTCCGTCACCTCACGAATTTCAATTATTGTACT
GGCGTCTGGGCTCCCAAAGTATCACATCAGGGAAGCATTACTGGGAGGTAGATGTGTCCAAGAAAAGTGCTTGG
ATCCTGGGGGTATGTGCTGGCTTCCAATCCGATGCAATGTATAATATTGAACAAAATGAAAATTATCAACCTAAA
TATGGCTACTGGGTTATAGGGTTACAGGAAGGAGTTAAATATAGTGTTTTCCAGGATGGTTCTTCACATACTCCT
TTTGCTCCTTTTCAATTGTGCCCTCTCTGTGATTATTTGTCTCTGATCGTGTGGAGTTTTCGTAGACTATGAGGCT
TGCACTGTCTCATTTCTCAATATCACAAACCATGGATTTCATCTATAAGTTTTCTCAGTGTTCTTTTTCTAAG
CCTGTATTTCCATATTTAAATCCCAGAAAATGTACAGTCCCCATGACTCTGTGCTCACCAAGCTCTTGA

hTRIM6:

ATGACTTCACCAGTACTGGTGGACATACGAGAAGAGGTGACCTGCCCTATCTGCCTGGAGCTCCTAACAGAACCC
CTGAGCATAGACTGTGGCCACAGCTTCTGCCAAGCCTGCATCACACCAAATGGCAGGGAATCAGTGATTGGTCAA
GAAGGGGAAAGAAGCTGCCCTGTGTGCCAGACCAGCTACCAGCCAGGGAACCTGCGGCCAATCGGCATCTGGCC
AACATAGTGAGGCGGCTCAGAGAGGTAGTGTTGGGCCCTGGGAAGCAGCTGAAAGCAGTTCTTTGTGCAGACCAT
GGAGAAAACTGCAGCTCTTCTGTTCAGGAGGATGGGAAGGTCATTTGCTGGCTTTGTGAGCGGTCTCAGGAGCAC
CGTGGTCAACCACACGTTCTCTGTGGAGGAGGTTGCCCAGGAGTACCAGGAGAAGTTTCAGGAGTCTCTAAAGAAG
CTGAAGAACGAGGAGCAGGAAGCTGAGAAGCTAACAGCTTTTATCAGAGAGAAGAAAACATCCTGGAAGAATCAG
ATGGAGCCTGAGAGATGCAGGATCCAGACAGAGTTTAAATCAGCTGCGAAATATCCTAGACAGAGTGGAGCAACGG
GAGCTGAAAAAGCTGGAACAGGAAGAGAAGAGGGGCTACGAATTATAGAAGAGGCTGAGAATGATCTGGTCCAC
CAGACCCAGTCGCTGCGAGAGCTCATCTCGGATCTGGAGCGTCGATGTCAGGGGTCAACAATGGAGCTGCTGCAG
GATGTGAGTGATGTACAGAAAGGAGTGAGTTCTGGACCTGAGGAAGCCAGAAGCTCTCCCTACAAAGCTGAGA
AGTATGTTCCGAGCCCCAGATCTGAAAAGGATGCTGCGAGTGTTGTAGAGAGCTGACAGATGTCCAAAGCTACTGG
GTTGACGTGACCCTGAATCCACACACAGCTAATTTAAATCTTGTCTGGCTAAAAACCGGAGACAAGTGAGGTTT
GTGGGAGCTAAAGTATCTGGACCTTCTGTCTGGAAAAGCATTATGACTGTAGTGCTCTGGGCTCCCAGCACTTC
TCCTCTGGTAAGCATTACTGGGAGGTAGATGTGGCCAAGAAGACTGCCCTGGATCCTGGGGGTATGCAGCAATTCA
CTGGGACCTACATTCTCTTTCAACCATTTTGTCTCAAAATCACAGTGCTTACTCCAGGTATCAGCCTCAGAGTGGA
TACTGGGTGATTGGGTTACAGCATAACCATGAATATAGGGCCTATGAGGATTCTTCCCTTCCCTGCTTCTCTCC
ATGACAGTGCCCCCTCGCCGTGTTGGGGTTTTCTTAGATTATGAGGCTGGTACTGTCTCCTTTTATAATGTCACA
AACCATGGCTTCCCCATCTACACTTTCTCTAAATATTACTTTCCCACTACTCTTTGTCCATATTTTAAATCCTTGC
AACTGTGTAATTCTATGACCTGCGTCTGCCAAGCTCTTGA

rhTRIM6:

ATGACTTCACCAGTACTGGTGGACATACGAGAAGACGTGACCTGCCCTATCTGCCTGGAGCTCCTAACAGAACCC
CTGAGCATAGACTGTGGCCACAGCTTCTGCCAAGCCTGCATCACACCGAATAGCAGGGAATCAATGATTGGTCAA
GAAGGGGAAAGAAGCTGCCCTGTGTGCCAGACCAGCTACCAGCCAGGGAACCTGCGGCCAATCGGCATCTGGCC
AACATAGTGAGGCGGCTCAGAGAGGTGGTGTTGGGCCCTGGGAAGCAGCTGAAAGCAGTTCTTTGTGCAGACCAT
GGAGAAAACTGCAGCTCTTCTGTTCAGGAGCATGGGAAGGTCATTTGCTGGCTTTGTGAGCGGTCTCAGGAGCAC
CGTGGTCAACCACACGTTCTCTGTGGAGGAGGTTGCCCAGGAGTACCAGGAAAAGTTTCAGGAGTCTCTAAAGAAG
CTGAAGAATGAGGAGCAGGAAGCTGAGAAGCTAACAGCTTTTATCAGAGAGAAGAAGACATGCTGGAAGAATCAG
ATGGAGCCCCGAGAGACACAGGATCCAGACAGAGTTTAAATCAGCTGCGAAACATCCTAGACAGAGTGGAGCAGCGA
GAGCTGAAAAAGCTGGAAGAGGAAGAGAAGAGGGGCTACGAATTATAGAAGAGGCTGAGAATGATCTGGTCCAC
CAGAGCCAGTCACTGCGAGAGCTCATCTGGATCTGGAGCGTCGATGTCAGGGGTCAACAATGGAGCTGCTTCAG
GATGTGAGTGATGTACAGAAAGGAGTGATTCTGGACCTGAGGAAGCCAGAAGCTCTCCCTACAAAGCTGAGAA
GTATGTTTCGAGCCCCAGATCTGAAAAGGATGCTGCGAGTGTTTAGAGAGCTGACAGATGTCCAAAGCTACTGGG
TGGACGTGACCCTGAATCACACACAGCTAATTTAAATCTTGTCTGGCTAAAAACCGGAGACAGGTGAGGTTTGT
GGGAGCTAAAGTATCTGGACCTTCCCGTCTGGAAAAGCATTATGACTGTAGTGCTCTGGGCTCCGAGCACTTCTC
CTCCGGAAAGCATTACTGGGAGGTAGATGTGGCCAAGAAGACTGCCCTGGATCCTGGGGGTATGCAGCAATTCACT
GGGACCTACATTCTCTTTCAACCAGTATGCTCAAAATCACAAATGCTTACTCCAGGTATCAGCCTCAGAGAGGATA
CTGGGTGATTGGGTTACAGCATAACCATGAATACAGGGCCTATGAGGATTCTTCCCTTCTCTGCTCCTCTCCAT
GACGGTGCCCCCTCGCCGTGTTGGGGTTTTCTTAGATTATGAGGCTGGCACCCTTCTTTTATAATGTCACAAA
CCATGGCTTCCCCATCTACACTTTCTCTAAATATTACTTTCCCACTACTCTTTGTCCATATTTTAAATCCTTGC
CTGTGTAATTCTATGACCTGCGTCTGCCAAGCTCTTGA

hTRIM21:

ATGGCTTCAGCAGCACGCTTGACAATGATGTGGGAGGAGGTCACATGCCCTATCTGCCCTGGACCCCTTCGTGGAG
 CCTGTGAGCATCGAGTGTGGCCACAGCTTCTGCCAGGAATGCATCTCTCAGGTTGGGAAAGGTGGGGGCAGCGTC
 TGTCTGTGTGCCGGCAGCGCTTTCTGCTCAAGAATCTCCGGCCCAATCGACAGCTAGCCAACATGGTGAACAAC
 CTTAAAGAAATCAGCCAGGAGGCCAGAGAGGGGCACACAGGGGGAACGGTGTGCAGTGCATGGAGAGAGACTTCAC
 CTGTTCTGTGAGAAAGATGGGAAGGCCCTTTGCTGGGTATGTGCCCAGTCTCGGAAACACCGTGACCACGCCATG
 GTCCCTCTTGAGGAGGCTGCACAGGAGTACCAGGAGAAGCTCCAGGTGGCATTAGGGGAACAGAGAAGAAAGCAG
 GAGTTGGCTGAGAAGTTGGAAGTGGAATTCGAATAAAGAGAGCAGACTGGAAGAAAAACAGTGGAACACAGAAA
 TCTAGGATTACGCAGAGTTTGTGCAGCAAAAAAATTCCTGGTTGAAGAAGAAGAGAGGCAGCTGCAGGAGCTG
 GAGAAGGATGAGAGGGAGCAGCTGAGAATCCTGGGGGAGAAAGAGGCCAAGCTGGCCAGCAGAGCCAGGCCCTA
 CAGGAGCTCATCTCAGAGCTAGATCGAAGGTGCCACAGCTCAGCACTGGAACCTGCTGCAGGAGGTTATAGTGTTA
 GGCCCCAGGAGTGAGTCTTGAACCTGAAGGACCTGGATATTACCTCTCCAGAACTCAGGAGTGTGTGCCATGTG
 CCAGGGCTGAAGAAGATGCTGAGGACATGTGCAGTCCACATCACTCTGGATCCAGACACAGCCAATCCGTGGCTG
 ATACTTTCAGAAGATCGGAGACAAGTGAGGCTTGGAGACACCCAGCAGAGCATACCTGGAATGAAGAGAGATTT
 GATAGTTATCCTATGGTCCTGGGTGCCCAGCACTTTCACCTCTGGAAAACATTACTGGGAGGTAGATGTGACAGGA
 AAGGAGGCCTGGGACCTGGGTGTCTGCAGAGACTCTGTGCGCAGGAAGGGGCAC'TTTTGTCTAGTTCCAAGAGT
 GGCTTCTGGACAATTTGGTTGTGGAACAAAAAATATGAGGCTGGCACCTACCCCCAGACTCCCTCCACCTT
 CAGGTGCCTCCATGCCAAGTTGGGATTTTCTGGACTATGAGGCTGGCATGGTCTCCTTCTACAACATCACTGAC
 CATGGCTCCCTCATCTACTCCTTCTCTGAATGTGCCTTTACAGGACCTCTGCGGCCCTTCTTTCAGTCTGGTTTC
 AATGATGGAGGAAAAACACAGCCCTCTAACCCTCTGTCCACTGAATATTGGATCACAAGGATCCACTGACTAT
 TGA

rhTRIM21:

ATGGCTTCAGCAGCACGCTTGACAATGATGTGGGAGGAGGTCACGTGCCCTATCTGCCCTGGACCCCTTCGTGGAG
 CCTGTGAGCATCGAGTGTGGCCACAGCTTCTGCCAGGAATGCATCTCTCAGGTTGGGAAAGATGGGGGCAGCGTC
 TGTCTGTGTGCCGGCAGCACTTTCTGCTCAGGAATCTCCGGCCCAATCGACAAC'TAGCCAACATGGTGGACAAC
 CTTAGAGAAATCAGCCAGGAAGCCAGAGAGGGTGCACAGGAGGAACAGTGTGCAGTGCATGGAGAGAGACTTCAC
 CTGTTCTGTGAGAAAGATGGGAAGGCCCTTTGCTGGGTGTGTGCCCAATCTCGGAAACACCGTGACCACACCATG
 GTCCCTCTTGAGGAGGCTGCACAGGAGTACCAGGAGAAGCTCCAGGTGGCATTAGGGGAACAGAGAAGAAAGCAG
 GAGTTGGCTGAGAAGTTGGAAGTGGAATTCGAATGAAGAGAGCAGACTGGAAGAAAAACGGTGGAGACACAGAAA
 TGTAGGATTACGCAGAGTTTGTGCAGCAAAAAAATTCCTGGTTGAAGAAGAAGAGAGGCAGCTGCAGGAGCTG
 GAGAAGGATGAGAGGGAGCAGCTGAGAATCCTAGGGGAGAAAGAGGCCGAAC'TGGCCCAACAGAGCCAGGCCCTG
 CAGGAGCTCATCTCAGAGCTAGAGAGAAGGCGCCAGGGCTCAGCACTGGAACCTGCTGCAGGAGGTGATAATTGTC
 CTGGAAGGAGTGAGTCTTGAACCTGAAGGGCTGGATATTGCCCTCTCCAGAACTCAGGAGTGTGTGCCATGTG
 CCAGGGCTGAAGAAGATGCTGAGGACATGTGCAGTCCACATCACTCTGGATCCAGACACAGCCAATCCATGGCTC
 ATACTTTCAGAAGATCGGAGACAAGTGAGGCTTGGAGACACCCAGCAGAGCATACCTGGAATGAAGAGAGATTT
 GATAGTTATCCTATGGTCCTGGGTGCCCAGCACTTCCACTCTGGAAAACATTACTGGGAGGTAGATGTGACAGGA
 AAGGAGGCCTGGGACCTGGGTGTCTGCAGAGACTCTGTGCGCAGGAAGGGGCAC'TTTTTGTCTAGTTCCAAGAGT
 GGCTTCTGGACAATTTGGTTGTGGAACAAAAAATATGAGGCTGGCACCTACCCCCAGACCCCTCCACCTT
 CAGGTGCCTCCATGCCAAATTTGGGATTTTCTGGACTATGAGGCCGGCATGGTCTCCTTCTACAACATCACTGAC
 CATGGCTCCCTCATCTACTCCTTCTCTGAATGTGCCTTTACAGGACCTCTGCGGCCCTTCTTTCAGTCTGGTTTC
 AATGACGGAGGAAGAAACACAGCCCTCTAACCCTCTGTCCACTGAATATTGGATCACAAGGATCCACTGACTAT
 TGA

hTRIM22:

ATGGATTTCTCAGTAAAGGTAGACATAGAGAAGGAGGTGACCTGCCCCATCTGCCCTGGAGCTCCTGACAGAACCT
 CTGAGCCTAGATTGTGGCCACAGCTTCTGCCAAGCCTGCATCACTGCAAAGATCAAGGAGTCAGTGATCATCTCA
 GAGGGGAAAGCAGCTGTCTGTGTGTGACACCAGATTCCAGCCTGGGAACCTCCGACCTAATCGGCATCTGGCCA
 ACATAGTTGAGAGAGTCAAAGAGGTCAAGATGAGCCACAGGAGGGGCAGAAGAGAGATGTCTGTGAGCACCATG
 GAAAAAACTCCAGATCTTCTGTAAGGAGGATGGAAAAGTCATTTGCTGGGTTTGTGAAC'TGTCTCAGGAACACC
 AAGGTCAACAAACATTCCGCATAAACGAGGTGGTCAAGGAATGTCAGGAAAAGCTGCAGGTAGCCCTGCAGAGGC
 TGATAAAGGAGGATCAAGAGGCTGAGAAGCTGGAAGATGACATCAGACAAGAGAGAACCCTGGAAGAATTATA
 TCCAGATCGAGAGACAGAAGATTCTGAAAGGGTTCAATGAAATGAGAGTCATCTTGGACAATGAGGAGCAGAGAG
 AGCTGCAAAAGCTGGAGGAAGGTGAGGTGAATGTGCTGGATAACCTGGCAGCAGCTACAGACCAGCTGGTCCAGG
 AGAGGCAGGATGCCAGCACGCTCATCTCAGATCTCCAGCGGAGGTTGAGGGGATCGTCAGTAGAGATGCTGCAGG
 ATGTGATTGACGTCAATGAAAAGGAGTGAAAGCTGGACATTGAAGAAGCCAAAATCTGTTTCCAGAAAGAAATGAAGA
 GTGTATTCGAGTACCAGATCTGAGTGGGATGCTGCAAGTTCTTAAAGAGCTGACAGATGTCCAGTACTACTGGG
 TGGACGTGATGCTGAATCCAGGCAGTGCCACTTCGAATGTTGCTATTTCTGTGGATCAGAGACAAGTGAAAACCTG
 TACGCACCTGCACATTTAAGAATTCAAATCCATGTGATTTTTCTGCTTTTGGTGTCTTCGGCTGCCAATATTTCT
 CTTCCGGGAAATATTACTGGGAAGTAGATGTGTCTGGAAAGATTGCCCTGGATCCTGGGCGTACACAGTAAAATAA
 GTAGTCTGAATAAAAGGAAGAGCTCTGGGTTTGTCTTTGATCCAAGTGTAATTTATTCAAAAGTTTACTCCAGAT
 ATAGACCTCAATATGGCTACTGGGTTATAGGATTACAGAATACATGTGAATATAATGCTTTTGGAGACTCCTCCT
 CTTCTGATCCCAAGGTTTTGACTCTCTTTATGGCTGTGCCCTCCCTGTCGTATTGGGGTTTTCTCTAGACTATGAGG

CAGGCATTGTCTCATTTTTCAATGTCACAAACCACGGAGCACTCATCTACAAGTTCTCTGGATGTCGCTTTTCTC
GACCTGCTTATCCGTATTTCAATCCTTGGAAGTGCCTAGTCCCCATGACTGTGTGCCACCGAGCTCCTGA

rhTRIM22:

ATGGATTTCTCAGTAAAGGTAGACATAGAGAAGGAGGTGACCTGCCCCATCTGCCTGGAGCTCCTAACAGAACCT
CTGAGCCTAGATTGTGGCCACAGCTTCTGCCAAGCCTGCATCACTGCAAAGATCAAGGAGTCAGTGACCATCTCA
AGAGGAGAAAGCAGCTGTCTGTGTGTCAGAGCAGATTCCAGCCTGGGAAGCTCCGACCTAATCGGCATCTGGCC
AACATAGTTGAGAGAGTCAAGGAGGTCAAGATGAGCCACAGGAGGGGCAGAAGAGAGACATCTGTGAGCACCAT
GGAAAAAACTCCAGATCTTCTGTAAGGAAGATGGAAAAGTCATTTGCTGGGTTTGTGAACGTCTCAGGAACAC
CAAGGTCAACAAACATTCCGCATAAACGAGGTGGTCAAGGAATGTCAGGAAAAGCTGCAGGCAGCCCTGCAGAAG
CTGACAAAGGAGGATCAAGAAGCTGAGAAGCTGGAAGATGACGTCAGACAAGAGAGAACCAGGCAAGAATTAT
ATCCAGCTCGAGAGACAGAAGATTCTGAAAGGGTTCAATGAAATGAGAGTCATCTTGGACAGTGAGGAGCAGAGA
GAGCTGCAAAGCTGGAGGAAGGTGAGGTGAATGTGCTGGATAACCTGGCAGCAGCTAGAGACCAGCTGGTCCAG
CAGAGGCAGGATGCCAGCAAGCTCATCTCAGATCTCCAGCGGAGGTTGAGGGGGTCATCAATAGAGATGCTGCAG
GATGTGATTGACGTCATGAAAAAGGAGTGAAAACTGGACACTGAAGAAGCCAAAACCTGTTTCCAAGAACTGAAG
AGTGTATTTCAGAGCACCAGATCTCAGTAGGATGTTGCAAGTTCACAAAGAGCTGACAGATGTCCAGTGCTACTGG
GTGGACGTGATGCTGAATCCAAACAGTACCATTTGCAATGTTGCTGTTTCTGTGGATCAGAGACAAGTGGCAACT
GTACGCACCTTCACATTTAAGAATTCAAATCCACGTGATTTTTCTGATTTTGGTGTCTTGGGCTGCCAATATTTT
TCTTCGGGAAATATTACTGGGAAGTAGATGTGTCTGGAAAGATTGCCCTGGATCCTGGGCGTATACAGTAAAAA
AGTGTCTTAATAAAAAGGAAGAGCTCTGGGTTTGTCTTTTGATCCAAAGTGTAATTTATGCAAATGTTTATTCCAAA
TACAGACCTCAATATGGCTACTGGGTTATAGGATTACAGAATACATGTGAATATAATGCTTTTGAGGACTCCTCC
TCGGCTGATCCCAAGGTTTGTACTCTCTTTATGGCTGTGCCCTCCCTGCCGTGTTGGGGTTTTCCTAAACTATGAG
GCAGGCATTGTCTCATTTTTCAATGTCACAAACCATGGAGCACTCATCTACAAGTTCTCTGGATGTCGCTTTTCT
CAACCTGCTTATCCGTATTTCAATCCTTGGAAGTGCCAAGTCCCCATGACCTGTGCCAACCGAGCTCCTGA

hTRIM34:

ATGGCTTCAAAAAATCTTGCTTAACGTACAAGAGGAGGTGACCTGTCCCATCTGCCTGGAGCTGTTGACAGAACCC
TTGAGTCTAGACTGTGGCCACAGCCTCTGCCGAGCCTGCATCACTGTGAGCAACAAGGAGGCAGTGACCAGCATG
GGAGGAAAAAGCAGCTGTCTGTGTGTTATCAGTTACTCATTTGAACATCTACAGGCTAATCAGCATCTGGCC
AACATAGTGGAGAGACTCAAGGAGGTCAAGTTGAGCCCAGACAATGGGAAGAAGAGAGATCTCTGTGATCATCAT
GGAGAGAAACTCTACTCTTCTGTAAGGAGGATAGGAAAGTCATTTGCTGGCTTTGTGAGCGGTCTCAGGAGCAC
CGTGGTCACCACACAGTCTCACGGAGGAAGTATTTCAAGGAATGTCAGGAGAAAACCTCAGGCAGTCCCTCAAGAGG
CTGAAGAAGGAAGAGGAGGAAGCTGAGAAGCTGGAAGCTGACATCAGAGAAGAGAAAACCTCCTGGAAGTATCAG
GTACAAACTGAGAGACAAAAGGATACAAAACAGAATTTGATCAGCTTAGAAGCATCCTAAATAATGAGGAGCAGAGA
GAGCTGCAAAGATTGGAAGAAGAAAGAAAGACGCTGGATAAGTTTGCAGAGGCTGAGGATGAGCTAGTTTCAG
CAGAAGCAGTTGGTGAGAGAGCTCATCTCAGATGTGGAGTGTCCGAGTCAGTGGTCAACAATGGAGCTGCTGCAG
GACATGAGTGGAATCATGAAATGGAGTGAGATCTGGAGGCTGAAAAAGCCAAAAATGGTTTCCAAGAACTGAAG
ACTGTATTCCATGCTCCAGATCTGAGTAGGATGCTGCAAATGTTTAGAGAACTGACAGCTGTCCGGTGCTACTGG
GTGGATGTCACACTGAATTCAGTCAACCTAAATTTGAATCTTGTCTTTTTCAGAAGATCAGAGACAAGTGATATCT
GTGCCAATTTGGCCTTTTTCAGTGTTATAATTATGGTGTCTTGGGATCCCAATATTTCTCCTCTGGGAAACATTAC
TGGGAAGTGGACGTGTCCAAGAAAACCTGCCCTGGATCCTGGGGGTATACGTGTAAGCATATTTCCCGCCATATGAAG
TATGTTGTTAGAAGATGTGCAAATCGTCAAAATCTTTACACCAAATACAGACCTCTATTTGGCTACTGGGTTATA
GGGTACAGATAAAATGTAAGTATGGTGTCTTTGAAGAGTCTTTGTCTCTGATCCCAGGTTTGTACTCTCTCC
ATGGCTGTGCCTCCCTGCCGTGTTGGGGTTTCTCCTGCATGATGAAGCAGGCATTGTCTCATTTTTTCAATGTCA
AGCCATGGCTCCCTCATTTTACAAGTTCTCTAAATGTTGCTTTTCTCAGCCTGTTTATCCATATTTTCAATCCTTGG
AACTGTCCAGCTCCCATGACTCTATGCCCAACCAAGCTCTTGA

rhTRIM34:

ATGGCTTCAAAAAATCTTGCTTAATGTGCAAGAGGAGGTCACTTGTCCCATCTGCCTCGAGCTGTTGACAGAACCC
TTGAGTCTAGGCTGTGGCCACAGCCTCTGCCGAGCCTGCATCACTGTGACCAACAAGGAGGCAGTGACCAGCCCA
GGAGGAAAAAGCAGCTGTCTGTGTGTTATCAGTTACTCATTTGAAAACCTACAACTAATCGGCATCTGACC
AACATAGTGGAGAGACTCAAGGAGGTCAAGTTGAGTTCAGACAATGGGAAGAAGAGAGATCTCTGTGATCATCAT
GGAGAGAACTCCTACTCTTCTGTAAGGAGGACAGGAAAGTCATTTGCTGGCTTTGTGAGCGGTCTCAGGAGCAC
CGTGGTCACCACACAGTCTCACGGAGGAATTTTCAAGGAATGTCAGGGGAACTCCAGGCAGTCCCTCAAGAGG
CTGAAGAAGGAGGAACAGGAAGCTGAGAAGCTAGAAGCTGACATCAGAGAAGAGAAAACCTCCTGGAAGTATCAG
GTACAAACTGAGAGACAAAGGATACAAAACAGAATTTGATCAGCTTAGAAGCATCCTAAATAGTGAGGAGCAGAGA
GAGCTGCAAAGATTGGAAGAAGAGGAAAAAGAGGCTGGATAAGTTTGCAGAGGCTGAGGATGAGCTAGTTTCAG
CAGAAGCAGTTGGTGAGAGAGCTAATCTCAGATGTGGAGTGTCCGAGTCAGTGGTCAACAATGGAGCTGCTACAG
GACATGAGTGGAATCATGAAATGGAGTGAGATCTGGAGGCTGAAAAAGCCAAAAAAGGTTTCCAAGAACTGAAG
ACTGTATTCCGTGCTCCAGATCTGAGTAGGATGCTGCAAATGTTTAGAGAACTGACAGCTGTCCGATGCTACTGG
GCGGATGTCACACTGAATTCAGTCAACCTAAATTTGAATCTTGTCTTTTTCAGAAGATCAGAGACAAGTGATATCT
GTGCCAATTTGGCCTTTTTCAGTGTTATAATTATGGTGTCTTGGGATCCCAATATTTCTCCTCTGGGAAACATTAC
TGGGAAGTGGATGTGTCCAAGAAAACCTGCCCTGGATCTTGGGAGTATATTGTAGAACATGTTCCCGCAATATAAAG
TATGTTGTTAGAAGATGTGCAAATCATCAAAATGTTTACTCCAAATACAGACCTTTATTTGGCTACTGGGTTATA

GGGTTACAGAATAAATGTAAGTATAGTGCCTTTGAGGAGTCTTTGTCCTCTGATCCTGAGGTTTTGACTCTCTCC
 ATGGCTGTGCCTCCCTGCCGTGTTGGGGTTTTCTTAGACTATGAAGCAGGTATAGTCTCATTTTTTCAATGTCACA
 AGCCATGGCTCCCTCATTTACAAGTTCTCTAAATGTTGCTTTTCTCAGCCTGTTTATCCATATTTCAATCCTTGG
 AACTGTCCAGCTCCCATGACGCTATGCCACCAAGCTCTTGA

Abb. 54: Auflistung der *TRIM*-Gen-Sequenzen des MHC- und 11p15-Clusters.

Abb. 55: Subzelluläre Lokalisation von TRIM22-Expressionskonstrukten. Die TRIM22-Expressionskonstrukte hTRIM22-GFP, rhTRIM22-GFP, hTRIM-rhB30.2-22-GFP und rhTRIM-hB30.2-22-GFP wurden transient in HeLa-Zellen transfiziert. Nach 48 h wurden die Zellen fixiert, das Mikrotubuli-Netzwerk mit anti- α -Tubulin-Antikörper und die Zellkerne mit DAPI gefärbt.

9.1 Abkürzungsverzeichnis

A	Adenin
Abb.	Abbildung
Amp	Ampicillin
AS	Aminosäure
ATP	Adenosintriphosphat
bp	Basenpaar
BSA	<i>Bovine serum albumin</i> (Rinderserumalbumin)
bzw.	beziehungsweise
C	Zytosin
°C	Grad Celsius
ca.	circa (ungefähr)
cDNA	komplementäre DNA
cm	Zentimeter
DAPI	4',6'-Diamidino-2-Phenylindol
dATP	Desoxyadenosintriphosphat
dCTP	Desoxyzytosintriphosphat
dGTP	Desoxyguanosintriphosphat
DEPC	Diethylpyrocarbonat
DMSO	Dimethylsulfoxid
DNA	Desoxyribonukleinsäure
dNTPs	Desoxynukleotidtriphosphate
DPZ	Deutsches Primatenzentrum
ds	doppelsträngig
DTT	1,4-Dithiothreitol
<i>E. coli</i>	<i>Escherichia coli</i>
ECL	<i>enhanced chemiluminescent</i>
EDTA	Ethylendiamintetraessigsäure
<i>et al.</i>	<i>et alteri</i> (und andere)
FACS	<i>Fluorescence activated cell sorting</i> (Durchflusszytometrie)
FITC	Fluoreszeinisothiocyanat
g	Gramm, Erdbeschleunigungskonstante
G	Guanin
GFP	<i>Green fluorescent protein</i>
h	Stunde
HCl	Chlorwasserstoffsäure
HLA	<i>Human Leucocyte Antigene</i>
IgG	Immunglobulin G
IPTG	Isopropyl- β -thiogalactopyranosid
KAc	Kaliumacetat
Kan	Kanamycin
kb	Kilobasenpaare
kDa	Kilodalton
kg	Kilogramm
KMT	Kalium-Magnesium-Tris
kV	Kilovolt
LB	Luria-Bertani
μ	micro = 10^{-6}
μ g	Microgramm
μ l	Microliter

µm	Micrometer
µM	Micromolar
m	milli = 10 ⁻³
M	Molar
mA	Milliampere
MCS	<i>multiple cloning site</i> (Polylinker)
mg	Milligramm
MgCl ₂	Magnesiumchlorid
MgSO ₄	Magnesiumsulfat
MHC	Haupthistokompatibilitätskomplex
min	Minute
ml	Milliliter
mM	Millimolar
mRNA	<i>messenger</i> RNA = Boten-RNA
n	nano = 10 ⁻⁹
NaAc	Natriumacetat-Trihydrat
NaCl	Natriumchlorid
NaOH	Natriumhydroxid
ng	Nanogramm
nm	Nanometer
OD	Optische Dichte
p	pico = 10 ⁻¹²
PAGE	Polyacrylamidgelelektrophorese
PBS	Phosphat-gepufferte Kochsalzlösung
PCR	Polymerase-Kettenreaktion
PFA	Paraformaldehyd
pH	Negativer dekadischer Logarithmus der Protonenkonzentration
RNA	Ribonukleinsäure
RNase	Ribonuklease
rpm	Umdrehungen pro Minute
RT	Raumtemperatur; reverse Transkription
SDS	Natriumdodecylsulfat
sec	Sekunde
sog.	sogenannt
ss	einzelsträngig
T	Thymin
Tab.	Tabelle
<i>taq</i>	<i>Thermus Aquaticus</i>
TBE	Tris-Borsäure-EDTA
TEMED	Tetramethylethylendiamin
Tris	Tris(hydroxymethyl)ammoniummethan
U	Unit = definierte Enzymeinheit
UV	ultraviolettes Licht
u.a.	unter anderem
V	Volt
Vol	Volumen
X-Gal	5-Brom-4-Chlor-3-Indolyl-β-D-Galactopyranosid
z.T.	zum Teil
z.B.	zum Beispiel

Tabelle 2: Abkürzungen der Aminosäuren:

Aminosäure	Dreibuchstabencode	Einbuchstabencode
Alanin	Ala	A
Arginin	Arg	R
Asparagin	Asn	N
Aspartat	Asp	D
Cystein	Cys	C
Glutamin	Gln	Q
Glutamat	Glu	E
Glycin	Gly	G
Histidin	His	H
Isoleucin	Ile	I
Leucin	Leu	L
Lysin	Lys	K
Methionin	Met	M
Phenylalanin	Phe	F
Prolin	Pro	P
Serin	Ser	S
Threonin	Thr	T
Tryptophan	Trp	W
Tyrosin	Tyr	Y
Valin	Val	V

Danksagungen

„Nichts beflügelt die Wissenschaft so, wie der Schwatz mit Kollegen auf dem Flur.“

Arno Penzias, Physiker und Nobelpreisträger

Zuallererst möchte ich mich ganz herzlich bei Frau Prof. Dr. Hoyer-Fender für die Betreuung meiner externen Doktorarbeit bedanken.

Herrn Prof. Dr. Fritz danke ich für die freundliche Übernahme des Korreferats.

Bei meinem Betreuer PD Dr. Lutz Walter bedanke ich mich für die Überlassung des interessanten Themas, für die Möglichkeiten, meine Ideen zu verwirklichen und für die vielen hilfreichen Tipps und Anregungen.

PD Dr. med. Ralf Dressel danke ich für die Immunisierungen der Mäuse, für die Hilfe bei den ersten FACS-Analysen und für die vielen hilfreichen Tipps bei Fragen zur Apoptose.

Bei Leslie Elsner bedanke ich mich ganz besonders für ihre Unterstützung bei der Herstellung der monoklonalen Antikörper und den ELISA-Messungen.

Der Volkswagenstiftung (Themenimpuls „Evolutionsbiologie“) danke ich für die Finanzierung meines Projektes.

Ein ganz besonderer Dank geht an die gesamte Abteilung Primatengenetik für die freundschaftliche Arbeitsatmosphäre. Ihr seid die beste Abteilung, die man sich wünschen kann!

Ein weiteres Dankeschön geht an Christiane Schwarz für ihre unermüdliche Hilfe bei den Sequenzierungen. Nicole Otto danke ich für die Unterstützung in der Zellkultur und die umsichtige Urlaubspflege meiner Zellen.

Christian Roos danke ich für die Beantwortung sämtlicher Fragen bezüglich der Auswertung der evolutiven Daten und natürlich für die aus der *Gene Bank of Primates* zur Verfügung gestellten DNA-Proben.

Bei Conny, Meike, Martin und Philip bedanke ich mich für die vielen „perfekten Dinner“ und sämtliche sonstige Unternehmungen.

Ein großes Dankeschön geht an meinen Freund Alexander Weismann, dafür, dass er mit mir die ganze Zeit zusammen durchgestanden hat, mich immer wieder motiviert und immer an mich geglaubt hat.

Mein größter Dank gilt meinen Eltern für das Vertrauen, dass sie immer in mich gesetzt haben und für die erholsame Rückzugsmöglichkeit nach Hause.

Lebenslauf

Anna-Maria Herr

Diplombiologin

geboren am 15.04.1980 in Brunsbüttel

Seit August 2005

Anfertigung der vorliegenden Dissertation in der Forschergruppe Primatengenetik bei PD Dr. L. Walter am Deutschen Primatenzentrum Göttingen.

ab 07/06: Stipendiumsförderung durch die Volkswagenstiftung Schwerpunkt “Evolutionsbiologie”

08/05-12/05: Stipendiumsförderung im Rahmen des Graduiertenkollegs GRK 289

2004-2005

Diplomarbeit “Analysen zur Expression und Funktion des Leupaxin Gens in humanen Karzinomzellen” am Insitut Humangenetik in Göttingen, Diplom in Biologie

1999-2004

Studium der Biologie an der Georg-August-Universität in Göttingen

1990-1999

Besuch des Leibniz-Gymnasiums, Bad Schwartau, und des Ostsee-Gymnasiums, Timmendorfer Strand

1986-1990

Grundschule in Westensee und Pansdorf