**Konstruktion und Durchmusterung von Metagenombanken:
Identifizierung und Charakterisierung von Genen und
Genprodukten von am Polyol-Stoffwechsel beteiligten
Oxidoreduktasen und Coenzym B₁₂-abhängigen
Dehydratasen**

Dissertation
zur Erlangung des Doktorgrades
der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultäten
der Georg-August-Universität zu Göttingen

vorgelegt von
Anja Knietsch
aus Salzgitter

Göttingen, 2002

Diese Arbeit wurde in Teilen zur Veröffentlichung eingereicht:

Knietsch, A., Waschkowitz, T., Bowien, S., Henne, A., Daniel, R. (2002). The metagenomes of complex microbial consortia derived from different soils as sources for novel genes conferring formation of carbonyls from short-chain polyols on *Escherichia coli*. (Journal of Molecular Microbiology and Biotechnology; im Druck)

Knietsch, A., Waschkowitz, T., Bowien, S., Henne, A., Daniel, R. (2002). Construction and screening of metagenomic libraries derived from enrichment cultures: generation of a gene bank for genes conferring alcohol oxidoreductase activity on *Escherichia coli*. (Applied and Environmental Microbiology, akzeptiert)

D7

Referent: Prof. Dr. G. Gottschalk

Korreferent: Prof. Dr. B. Bowien

Tag der mündlichen Prüfung: 28.01.2003

*Meiner Mutter, Beate, Michael
und dem Andenken
an meinen Vater gewidmet*

INHALTSVERZEICHNIS

Inhaltsverzeichnis

I

Abkürzungsverzeichnis

VII

1	<u>EINLEITUNG</u>	1
2	<u>MATERIAL UND METHODEN</u>	8
2.1	<u>Verwendete Organismen, Plasmide und Oligonukleotide</u>	8
2.2	<u>Nährmedien</u>	11
2.2.1	<u>LB-Medium</u>	11
2.2.2	<u>DYT-Medium</u>	11
2.2.3	<u>SOB-Medium</u>	11
2.2.4	<u>M9-Mineralmedium</u>	12
2.2.5	<u>Carbonyl-Indikator-Medium</u>	12
2.2.6	<u>Citrobacter-Mineralmedium mit Hefeextraktzusatz</u>	13
2.2.7	<u>Spurenelementelösung SL-4</u>	13
2.2.8	<u>Spurenelementelösung SL-9</u>	14
2.2.9	<u>Vitaminlösung</u>	14
2.2.10	<u>Antibiotika und andere Medienzusätze</u>	15
2.3	<u>Zellanzucht</u>	15
2.3.1	<u>Aerobe Anzucht</u>	15
2.3.2	<u>Anaerobe Anzucht</u>	15
2.3.3	<u>Stammhaltung</u>	16
2.3.4	<u>Anzucht von rekombinanten <i>E. coli</i>-Stämmen zur heterologen Genexpression</u>	16
2.3.4.1	<u>Expression mit dem „pET Directional TOPO-Expression“-Kit</u>	16
2.4	<u>Bestimmung von Wachstumsparametern</u>	19
2.4.1	<u>Bestimmung der optischen Dichte</u>	19
2.4.2	<u>Bestimmung des pH-Wertes</u>	19
2.5	<u>Standardtechniken für das Arbeiten mit Nukleinsäuren</u>	19
2.5.1	<u>Behandlung von Geräten und Lösungen</u>	19
2.5.2	<u>Puffer und Lösungen</u>	20
2.5.3	<u>Fällung, Reinigung und Konzentration von Nukleinsäuren</u>	20
2.5.3.1	<u>Fällung von Nukleinsäuren</u>	20
2.5.3.2	<u>DNA-Fällung nach Saccharose-Dichtegradientenzentrifugation</u>	21
2.5.3.3	<u>Mikrodialyse von DNA</u>	21
2.5.3.4	<u>Dialyse von Umwelt-DNA</u>	21
2.5.3.5	<u>Gelfiltration von DNA-Lösungen</u>	22
2.5.3.6	<u>Konzentrationsbestimmung von Nukleinsäuren</u>	22

2.5.3.7	<u>Isolierung von DNA-Fragmenten mittels „QIAquick Gel Extraction“-Kit</u>	22
2.5.3.8	<u>Reinigung von DNA-Fragmenten mittels „QIAquick PCR Purification“-Kit</u>	23
2.6	<u>Isolierung von Nukleinsäuren</u>	23
2.6.1	<u>Isolierung von DNA aus Umweltproben</u>	23
2.6.2	<u>Reinigung von Umwelt-DNA</u>	24
2.6.3	<u>Isolierung von RNA aus Umweltproben</u>	25
2.6.4	<u>Reinigung von Poly(A)-RNA aus Gesamt-RNA</u>	26
2.6.5	<u>Isolierung von chromosomaler DNA</u>	27
2.6.6	<u>Isolierung von Plasmid-DNA</u>	28
2.6.6.1	<u>„Cracking“ von Plasmiden</u>	28
2.6.6.2	<u>Plasmidschnellpräparation</u>	28
2.6.6.3	<u>Minipräparation von Plasmiden mittels „Wizard™ Plus Minipreps DNA Purification System“</u>	29
2.6.6.4	<u>Minipräparation von Plasmiden mittels „QIAprep Spin Miniprep“-Kit</u>	30
2.6.6.5	<u>Präparative Plasmidisolierung über Anionenaustauschchromatographie</u>	30
2.7	<u>Gelelektrophorese von Nukleinsäuren</u>	31
2.7.1	<u>Standard-Agarose-Gelelektrophorese</u>	31
2.7.2	<u>Größenbestimmung von Nukleinsäuren</u>	32
2.8	<u>Enzymatische Modifikation von DNA</u>	32
2.8.1	<u>Schneiden von DNA durch Restriktionsendonukleasen</u>	32
2.8.2	<u>Dephosphorylierung von DNA-Fragmenten</u>	32
2.8.3	<u>Ligation von DNA-Fragmenten</u>	33
2.8.3.1	<u>Ligation mit T4-DNA-Ligase</u>	33
2.8.3.2	<u>Ligation mit dem „TOPO-TA-Cloning“-Kit</u>	33
2.8.4	<u>Radioaktive Markierung von DNA-Fragmenten</u>	34
2.9	<u>Saccharose-Dichtegradientenzentrifugation</u>	35
2.10	<u>Übertragung von DNA in <i>E. coli</i> und Selektion rekombinanter Klone</u>	36
2.10.1	<u>Hocheffiziente Transformation in <i>E. coli</i></u>	37
2.10.2	<u>Transformation in <i>E. coli</i> durch Elektroporation</u>	37
2.10.3	<u>Transduktion</u>	37
2.10.3.1	<u>Transduktion mit dem „Gigapack II Gold Packaging Extract“</u>	37
2.10.4	<u>Der X-Gal-Test zur Selektion rekombinanter Klone</u>	38
2.10.5	<u>Screening auf die Verwertung von C2-C4-Polyolen</u>	39
2.11	<u>DNA-DNA-Hybridisierung</u>	40
2.11.1	<u>Vorbereitung von Nylonmembranen für Koloniehybridisierungen</u>	40
2.11.2	<u>Southern-Blot</u>	41
2.11.3	<u>Dot-Blot</u>	41
2.11.4	<u>Hybridisierung mit radioaktiv-markierten Sonden</u>	42
2.12	<u>Polymerase-Kettenreaktion (PCR)</u>	43
2.12.1	<u>Reaktionsbedingungen der „Megaprime“-PCR</u>	44

2.13	<u>Sequenzierung und Analyse von Sequenzdaten</u>	45
2.14	<u>Herstellung von Rohextrakten</u>	46
2.14.1	<u>Zellaufschluß mit der Frenchpresse</u>	46
2.14.2	<u>Zellaufschluß durch Ultraschallbehandlung</u>	47
2.15	<u>Proteinbestimmung</u>	47
2.16	<u>Bestimmung von Enzymaktivitäten</u>	48
2.16.1	<u>Glycerin-Dehydratase</u>	49
2.16.1.1	<u>Nach TORAYA et al.</u>	49
2.16.1.2	<u>Nach CHASE</u>	49
2.16.2	<u>Alkohol-Dehydrogenase</u>	50
2.17	<u>Methoden zur Proteinanreicherung</u>	51
2.17.1	<u>Metall-Chelat-Affinitätschromatographie</u>	51
2.17.1.1	<u>Vorbereitung der Säule</u>	51
2.17.1.2	<u>Reinigung löslicher Proteine unter nativen Bedingungen</u>	52
2.17.1.3	<u>Regeneration der Säule</u>	52
2.17.2	<u>Entsalzen von Proteinlösungen</u>	53
2.18	<u>Inaktivierung der Glycerin- und Diol-Dehydratasen</u>	53
2.19	<u>Polyacrylamid-Gelelektrophorese</u>	53
2.19.1	<u>SDS-PAGE</u>	53
2.19.2	<u>Native Gradienten-PAGE</u>	55
2.20	<u>Proteinfärbung in Polyacrylamidgelen</u>	56
2.20.1	<u>Coomassie-Färbung</u>	56
2.20.2	<u>Aktivitätsfärbung der Glycerin- und Diol-Dehydratasen</u>	57
2.21	<u>Molekularmassenbestimmung</u>	58
2.21.1	<u>Molekularmassenbestimmung durch SDS-PAGE</u>	58
2.21.2	<u>Molekularmassenbestimmung durch Gradienten-PAGE</u>	58
2.22	<u>Chemikalien, Enzyme und Gase</u>	59
3	<u>EXPERIMENTE UND ERGEBNISSE</u>	61
3.1	<u>Konstruktion von Metagenombanken in <i>Escherichia coli</i></u>	62
3.1.1	<u>Isolierung von chromosomaler DNA aus verschiedenen Umweltproben</u>	62
3.1.2	<u>Klonierung der Umwelt-DNA</u>	64
3.1.3	<u>Charakterisierung der konstruierten Metagenombanken</u>	67
3.2	<u>Isolierung von RNA aus Umweltproben</u>	68
3.3	<u>Durchmusterung der Metagenombanken auf Gene für Glycerin- und Diol-Dehydratasen</u>	71
3.3.1	<u>Durchmusterung mittels eines auf Enzymaktivität basierenden Verfahrens</u>	72
3.3.1.1	<u>Stand der Vorarbeiten</u>	72

3.3.1.2	<u>Durchmusterung durch Komplementation des <i>E. coli</i>-Stammes ECL707/pAK1</u>	73
3.3.2	<u>Durchmusterung mittels auf Sequenzähnlichkeiten basierender Verfahren</u>	75
3.3.3	<u>Charakterisierung der identifizierten Glycerin- und Diol-Dehydratase-Gene und ihrer Genprodukte</u>	80
3.3.3.1	<u>Molekulare Analyse der Plasmide pAK2 bis pAK8</u>	81
3.3.3.2	<u>Komplementation der unvollständigen Dehydratase-Gene und Subklonierung in Expressionsvektoren</u>	96
3.3.3.3	<u>Heterologe Expression und Reinigung der Glycerin- und Diol-Dehydratasen</u>	99
3.3.3.4	<u>Molekularmassenbestimmung der Glycerin- und Diol-Dehydratasen durch Aktivitätsfärbung</u>	102
3.3.3.5	<u>Bestimmung der Substratspezifität der Glycerin- und Diol-Dehydratasen</u>	103
3.3.3.6	<u>Inaktivierung der Glycerin- und Diol-Dehydratasen durch Glycerin</u>	105
3.3.3.7	<u>Reaktivierung der Glycerin- und Diol-Dehydratasen durch den Reaktivierungsfaktor aus <i>C. freundii</i></u>	108
3.3.3.8	<u>Inaktivierung der Glycerin- und Diol-Dehydratasen durch 1,3-Propandiol</u>	112
3.4	<u>Durchmusterung der Metagenombanken auf Gene für Polyol-verwertende Oxidoreduktasen</u>	114
3.4.1	<u>Prinzip der Durchmusterung auf Gene, die Alkohol-Oxidoreduktase-Aktivität vermitteln</u>	115
3.4.2	<u>Durchmusterung der Anreicherungsdatenbanken SLA, GEA, ZRA und GIIA</u>	117
3.4.2.1	<u>Biochemische Charakterisierung der rekombinanten <i>E. coli</i>-Stämme pAK101 bis 116</u>	118
3.4.2.2	<u>Molekulare Analyse der Plasmide pAK101 bis 116</u>	121
3.4.3	<u>Durchmusterung der nicht angereicherten Umweltgenbanken WN, FN und ZB</u>	133
3.4.3.1	<u>Biochemische Charakterisierung der rekombinanten <i>E. coli</i>-Stämme pAK201 bis 215</u>	135
3.4.3.2	<u>Molekulare Analyse der Plasmide pAK201 bis 215</u>	137
4.	<u>DISKUSSION</u>	149
4.1	<u>Konstruktion von Metagenombanken</u>	149
4.1.1	<u>Isolierung und Reinigung von chromosomaler DNA aus Umweltproben</u>	150
4.1.2	<u>Klonierung der Umwelt-DNA</u>	154
4.2	<u>Aktivitäts- und Sequenz-basierende Durchmusterungsverfahren</u>	158
4.3	<u>Isolierung von RNA aus Bodenproben</u>	164

4.4	<u>Identifizierung und Charakterisierung von Coenzym B₁₂-abhängigen Glycerin- und Diol-Dehydratasen</u>	166
4.5	<u>Identifizierung und Charakterisierung von Alkohol-Oxidoreduktasen</u>	177
4.6	<u>Ausblick</u>	184
5.	<u>ZUSAMMENFASSUNG</u>	187
6.	<u>LITERATURVERZEICHNIS</u>	190
7.	<u>ANHANG</u>	206

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

α	alpha
Abb.	Abbildung
AG	Aktiengesellschaft
Ap ^r	Ampicillin-Resistenz
APS	Ammoniumpersulfat
ATP	Adenosin-5'-triphosphat
β	Beta
Bp	Basenpaare
bzw.	beziehungsweise
C.	<i>Citrobacter</i>
°C	Grad Celsius
Cl.	<i>Clostridium</i>
ca.	Circa
Ci	Curie
cm	Zentimeter
C-Quelle	Kohlenstoffquelle
CTAB	Cetyl-Trimethyl-Ammoniumbromid
C-terminal	Carboxyterminal
Da	Dal ton
DDH	Diol-Dehydratase
dATP	Desoxyadenosin-5'-triphosphat
dCTP	Desoxycytidin-5'-triphosphat
dest.	Destilliert
dGTP	Desoxyguanosin-5'-triphosphat
d.h.	das heisst
DH	Dehydrogenase
DHA	Dihydroxyaceton
Dht	Dehydratase
DNA	Desoxyribonukleinsäure
dNTP	Desoxynukleotid-5'-triphosphat
DSM	Deutsche Stammsammlung
E.	<i>Escherichia</i>
ϵ	Extinktionskoeffizient
EDTA	Ethylendiamintetraessigsäure
ed(s).	Herausgeber
et al.	et alteri (und andere)
Fa.	Firma
g	Gramm
xg	-fache Erdbeschleunigung (9,81 m/s ²)
γ	Gamma
GDH	Glycerin-Dehydratase
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GWDG	Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung Göttingen
h	Stunde
Hrsg.	Herausgeber
IPTG	Isopropyl- β -thiogalaktosid
k	Kilo

K	Kalium
<i>K.</i>	<i>Klebsiella</i>
K _m	Michaelis-Menten Konstante
KP	Kaliumphosphat
l	Liter
LB	Luria Bertani
M	molar (Mol pro Liter); Mega-
m	Meter
Mg	Magnesium
μ	Mikro-
MBTH	3-Methyl-2-benzothiazolinonhydrazon
min	Minute
N ₂	Stickstoff
n	Nano-
NAD ⁺	Nikotinamidadenindinukleotid
NADH	Nikotinamidadenindinukleotid, reduziert
Nr.	Nummer
NTA	Nitrilotriessigsäure
N-terminal	Aminoterminal
Ω	Ohm
OD	optische Dichte
<i>orf</i>	offener Leserahmen
<i>P.</i>	<i>Pseudomonase</i>
PAGE	Polyacrylamid-Gelelektrophorese
PCR	„polymerase chain reaction“
PEG	Polyethylenglykol
pH	negativer dekadischer Logarithmus der Protonenkonzentration
R _f	elektrophoretische Mobilität
RNA	Ribonukleinsäure
rRNA	ribosomale RNA
RT	Raumtemperatur
S	Svedberg-Einheit
s	Sekunde
s.	Siehe
SSC	Standard Saline-Citrat
SDS	Natriumdodecylsulfat
s.o.	siehe oben
<i>sp.</i>	<i>Species</i>
T	Temperatur
Tab.	Tabelle
<i>Taq</i>	<i>Thermus aquaticus</i>
TEMED	N, N, N', N'-Trimethylethylendiamid
T _m	Schmelztemperatur
™	Trademark
Tricine	N-[Tris(hydroxymethyl)-methyl]-glycin
Tris	Tris(hydroxymethyl)-aminomethan
U	Unit (Einheit der Enzymaktivität)
Upm	Umdrehungen pro Minute
V	Volt
Vol.	Volumen

v/v	Volumen pro Volumen
W	Watt
w/v	Masse pro Volumen
x g	-fache Erdbeschleunigung (9,81 m/s ²)
X-Gal	5-Brom-4-Chlor-3-Indolyl-D-Galaktosid
z.B.	zum Beispiel

Abkürzungen für Aminosäuren

A	Ala	Alanin	M	Met	Methionin
C	Cys	Cystein	N	Asn	Asparagin
D	Asp	Aspartat	P	Pro	Prolin
E	Glu	Glutamat	Q	Gln	Glutamin
F	Phe	Phenylalanin	R	Arg	Arginin
G	Gly	Glycin	S	Ser	Serin
H	His	Histidin	T	Thr	Threonin
I	Ile	Isoleucin	V	Val	Valin
K	Lys	Lysin	W	Trp	Tryptophan
L	Leu	Leucin	Y	Tyr	Tyrosin

1 EINLEITUNG

Die in unserer Umwelt vorkommenden Mikroorganismen zeigen eine erstaunliche Diversität an physiologischen, metabolischen und genetischen Eigenschaften. Ihr Substratspektrum entspricht dabei in seiner Gesamtheit der Vielfalt der natürlich vorkommenden Verbindungen und geht sehr wahrscheinlich noch darüber hinaus (GOTTSCALK und KNACKMUSS, 1993). Verdeutlicht wird dies unter anderem dadurch, dass sich auf der Erdoberfläche oder in Gewässern keine natürliche organische Substanz auf Dauer anhäuft. Molekular-ökologische Studien an verschiedenen Ökosystemen belegten, dass mehr als 99 % der Mikroorganismen nicht bekannt sind (AMANN et al., 1995; PACE, 1997). Erst ca. 5000 prokaryotische Organismen wurden bisher beschrieben, Schätzungen gehen jedoch davon aus, dass die Gesamtzahl der prokaryotischen Arten zwischen 1.000.000 und 100.000.000 liegt (WILSON, 1992; STRICKBERGER, 1996). Im Vergleich dazu sind ca. 70.0000 Pilzarten und mehr als eine halbe Million Insektenspezies bekannt (BULL et al., 1992). Begründet ist diese Diskrepanz vor allem durch die Grenzen der Kultivierung und Vereinzelung von Mikroorganismen unter Laborbedingungen. Für die Forschung und letztlich auch für die Industrie bedeutet dies die Notwendigkeit zur Entwicklung alternativer Methoden und Strategien, um dieses enorme Potential zu analysieren und zu nutzen.

Einige der bisher kultivierten Mikroorganismen haben sich als reichhaltige Quellen für die Naturprodukt-Chemie erwiesen. Zu den wichtigsten Produkten gehören u.a. Antibiotika, Fungizide, Enzyme und Insektizide (RONDON et al., 1999). Geht man davon aus, dass weniger als 1 % der vorkommenden Mikroorganismen bekannt sind, so stellen diese natürlichen Habitate ein nahezu unerschöpfliches Reservoir an neuen Biokatalysatoren und anderen Wirkstoffen dar.

In den vergangenen Jahrzehnten wurden neue Enzyme und Wirkstoffe vorwiegend durch groß angelegte Screeningverfahren nach Mikroorganismen mit den gewünschten Eigenschaften identifiziert. Nach erfolgreicher Anreicherung und Vereinzelung des Organismus wurde das gesuchte Enzym bzw. die entsprechenden Gene aus diesem isoliert. Dieses klassische Verfahren setzt jedoch die Kultivierbarkeit der Mikroorganismen voraus. Erst seit wenigen Jahren werden Verfahren entwickelt, die auf der Isolierung von DNA basieren, um die Biodiversität von Böden, Sedimenten und anderen natürlichen Habitaten in seiner Gesamtheit zugänglich zu machen und zu nutzen (SEOW et al., 1997; Handelsmann et al., 1998; COTTRELL et al., 1999;

HENNE et al., 1999; RONDON et al., 1999 und 2000). In diesem Zusammenhang wurde von RONDON et al. (2000) der Begriff des Metagenoms als Bezeichnung für die gesamte genetische Information aller Mikroorganismen eines Habitats geprägt. In einer Vielzahl von molekular-ökologischen Studien wurde die isolierte DNA genutzt, um universell konservierte Genmarker, zumeist die 16S rRNA-Gene, mittels PCR zu amplifizieren und phylogenetisch zu analysieren. So wurden z.B. aus einer Bodenprobe aus Darmstadt 300 verschiedene 16S-rDNA-tragende Klone untersucht. Die Sequenzierung der partiell-amplifizierten 16S-rRNA Gene und der Vergleich mit den in der Datenbank gespeicherten Sequenzen zeigte, dass keine davon identisch zu einer 16S-rDNA-Sequenz einer bis dahin kultivierten Spezies war. Die Klone konnten in 11 verschiedene Phyla (Hauptabstammungslinien) eingeordnet werden, von denen einige hauptsächlich oder sogar ausschließlich durch Umweltsequenzen repräsentiert wurden (SCHLEPER und ECK, 2000).

Ein weitergehender Ansatz ist die direkte Klonierung der aus Umweltproben isolierten genomischen DNA in Vektoren und ihre Durchmusterung auf das Vorhandensein von Genen für verschiedene biologisch aktive Substanzen und Enzyme (s. Abb. 1). Die ersten Arbeiten in denen die Konstruktion solcher Metagenombanken aus komplexen Habitaten und die Identifizierung neuartiger, funktioneller Genprodukte beschrieben werden konnte, wurden 1999 von HENNE et. al. und COTTRELL et al. publiziert. Bis heute konnte diese Strategie zur Isolierung von Genen für Enzyme verschiedener Klassen wie 4-Hydroxybutyrat-Dehydrogenasen, Chitinasen, Lipasen/Esterasen und Amylasen (COTTRELL et al., 1999; HENNE et al., 1999 und 2000; RONDON et al., 2000; RICHARDSON et al., 2002), sowie für Na^+/H^+ -Antiporter (MAJERNIK et al., 2001), für die Synthese von Biotin (ENTCHEVA et al., 2001) oder auch für antibakterielle Wirkstoffe (RONDON et al., 2000; OSBURNE et al., 2000; BRADY et al., 2001) genutzt werden.

Abbildung 1: Strategie der Metagenomik

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden Umweltgenbanken konstruiert und als Quelle für die industriell interessanten Coenzym B₁₂-abhängigen Glycerin- und Diol-Dehydratasen, sowie zur Identifizierung neuartiger Alkohol-Oxidoreduktasen verwendet.

Die bekannten Coenzym B₁₂-abhängigen Glycerin- und die isofunktionellen Diol-Dehydratasen (EC 4.1.2.30 bzw. EC 4.2.1.28) katalysieren die Umsetzung von Glycerin, 1,2-Propandiol und 1,2-Ethandiol zu den entsprechenden Aldehyden (PAWELKIEWICZ und ZAGALAK, 1965; SMILEY und SEBOLOV, 1962). Sie sind die Schlüsselenzyme in der anaeroben Verwertung von Glycerin und 1,2-Propandiol und konnten bisher bei Vertretern der Enterobakterien, der Propionsäurebakterien, der Clostridien und der Milchsäurebakterien nachgewiesen werden. Durch ausführliche Untersuchungen der Glycerinfermentation und der daran beteiligten Enzyme in den Enterobakterien *Citrobacter freundii* und *Klebsiella pneumoniae* (SCHNEIDER et al., 1970; McGregor et al., 1974; FORAGE und FOSTER, 1979; JOHNSON et al., 1984;

JOHNSON und LIN, 1987; DANIEL et al., 1995b; SEYFRIED et al., 1996) konnte das in Abbildung 2 dargestellte Stoffwechselschema entwickelt werden. Das Substrat Glycerin unterliegt dabei einer Disproportionierung, an der als Schlüsselenzyme die Glycerin-Dehydrogenase, die Dihydroxyaceton-Kinase, die Glycerin- oder Diol-Dehydratase und die 1,3-Propandiol-Dehydrogenase beteiligt sind (s. Abb. 2). Im oxidativen Zweig des Stoffwechselweges wird Glycerin unter Reduktion von NAD^+ zu Dihydroxyaceton oxidiert und anschließend phosphoryliert. Das entstehende Dihydroxyacetonphosphat kann dann in den Embden-Meyerhoff-Parnas-Weg eingeschleust werden. Der reduktive Zweig des Stoffwechsels beginnt mit der Dehydratisierung des Glycerins. Das entstehende β -Hydroxypropionaldehyd wird nachfolgend zu 1,3-Propandiol reduziert. Das Endprodukt der Fermentation, 1,3-Propandiol ist eine Substanz, die von großem wirtschaftlichen Interesse ist, da sie zur Herstellung von Polyestern, Polyurthanen, Heterozyklen und Pharmazeutika genutzt wird. Seit einigen Jahren wird die Verwendung von 1,3-Propandiol auch im Zusammenhang mit biologisch-abbaubaren Polymeren beschrieben (WITT et al., 1994). Da die Herstellung von 1,3-Propandiol auf chemischer Basis sehr kostenintensiv ist, haben die Firmen DuPont und Genencor International in den vergangenen Jahren einen biotechnologischen Produktionsprozeß entwickelt. Mit Hilfe eines rekombinanten *E. coli*-Stammes wird dabei das 1,3-Propandiol direkt aus dem preiswerten Rohstoff Glukose gewonnen (CHOTANI et al., 2000). Die Dehydratase stellt in diesem biotechnologischen Verfahren aufgrund ihrer biochemischen Eigenschaften einen limitierenden Faktor dar und ist deshalb das Objekt eingehender Untersuchungen.

Die bisher untersuchten Coenzym B_{12} -abhängigen Glycerin- und Diol-Dehydratasen stellen eine sehr homogene, hoch konservierte Gruppe von Enzymen dar. Dies gilt für die genetische Organisation, sowie für die strukturellen und biochemischen Eigenschaften der Proteine. Beide Dehydratase-Typen bestehen aus 3 strukturellen Untereinheiten, die im nativen Zustand einen Komplex aus $\alpha_2\beta_2\gamma_2$ bilden (DANIEL et al., 1998). Ein weiteres Charakteristikum ist die sogenannte „suicide-Inaktivierung“ bei der Katalysereaktion mit Glycerin. *In vivo* wird Glycerin-inaktiviertes Enzym durch einen als Reaktivierungsfaktor bezeichneten Proteinkomplex reaktiviert. Für die Dehydratasen aus *Klebsiella pneumoniae*, *Klebsiella oxytoca* und *Citrobacter freundii* konnten die dafür kodierenden Gene und die korrespondierenden Genprodukte bereits identifiziert und charakterisiert werden (MORI et al., 1997, TORAYA und MORI, 1999; SEIFERT et al., 2001; KAJIURA et al., 2001).

Abbildung 2: Schematische Darstellung der Glycerinfermentation in Enterobakterien

(1): Glycerin-Dehydrogenase; (2): Dihydroxyaceton-Kinase; (3): Glycerin- oder Diol-Dehydratase; (4): 1,3-Propandiol-Dehydrogenase.

Eine weitere Durchmusterung der Metagenombanken hatte Gene zum Ziel, die Alkohol-Oxidoreduktase-Aktivität in *E. coli* vermittelten. Die Umwandlung von Alkoholen, Aldehyden und Ketonen spielt in einer großen Anzahl von metabolischen Prozessen eine tragende Rolle. Diese Reaktionen werden durch Oxidoreduktasen katalysiert, zu denen auch die Alkohol-Dehydrogenasen zählen. Die bisher bekannten Alkohol-Oxidoreduktasen stellen im Vergleich zu den Glycerin- und Diol-Dehydratasen eine sehr heterogene Gruppe mit unterschiedlichen Kofaktor-Bedürfnissen dar. REID und FEWSON (1994) haben folgende Einteilung in drei Gruppen für diese Enzyme formuliert:

1. NAD(P)⁺-abhängige Dehydrogenasen: Man unterscheidet langkettige, Zink-enhaltene Dehydrogenasen (Typ I, z.B. die Alkohol-DH I aus *Zymomonas mobilis*), kurzkettige und Zink-unabhängige Dehydrogenasen (Typ II, z.B. die Ribitol-DH aus *Enterobacter aerogenes*) und die Eisen-aktivierten Enzyme (Typ III, z.B. die 1,3-Propandiol-DH aus *C. freundii*). 2. NAP(P)⁺-unabhängige Dehydrogenasen: Die Enzyme dieser Gruppe besitzen statt NAD(P)⁺ andere Kofaktoren wie FAD, PQQ oder F₄₂₀ (z.B. die Alkohol-DH aus *Acetobacter aceti*). 3. Oxidasen: Die Oxidasen katalysieren eine irreversible Oxidation von Alkoholen (z.B. die Alkohol-Oxidase 1 aus *Candida boidinii*).

Die Nikotinamid-abhängigen Alkohol-Dehydrogenasen sind dabei von besonderer biotechnologischer Relevanz. Diese Enzyme besitzen zumeist eine hohe

Enantioselektivität und werden in der Industrie für die Produktion von Carbonylverbindungen, Hydroxysäuren, Aminosäuren und chiralen Alkoholen eingesetzt, die chemisch nur schwer zu synthetisieren sind (REID und FEWSON, 1994; FANG et al., 1995; HUMMEL, 1997 und 1999). Abbildung 3 zeigt ein typisches Reaktionsschema zur Synthese von chiralen Verbindungen durch Dehydrogenasen. Weitere Anwendungsgebiete sind die Herstellung von Deuterium- oder Tritium-markierten Substanzen, die Produktion von Dihydroxyaceton und die enzymatische Analyse von Serumlipiden (YAMADA et al., 1982; FANG et al., 1995). Aufgrund der hohen Kosten für die Nikotinamid-Komponenten, ist für eine Anwendung der Alkohol-Dehydrogenasen im industriellen Maßstab eine Regeneration des Kofaktors durch effiziente Systeme notwendig. Häufig verwendete Systeme basieren auf der Glukose-6-Phosphat-Dehydrogenase- oder der Formiat-Dehydrogenase-Reaktion (CHENAULT und WHITESIDES, 1987). Auf diese Weise können zum einen die Prozeßkosten gesenkt werden und zum anderen thermodynamisch ungünstige Reaktionsgleichgewichte in Richtung des gewünschten Produktes verschoben werden (FANG et al., 1995; HUMMEL, 1999).

Abbildung 3: Reaktionsschema zur Bildung von chiralen Verbindungen durch NAD(P)H-abhängige Dehydrogenasen (nach HUMMEL, 1999)

Wenn das X für ein Sauerstoffatom steht, handelt es sich bei dem Produkt um einen Alkohol, steht es für NH, entsteht eine Aminosäure.

Ziel der vorliegenden Arbeit war die molekularbiologische Analyse von komplexen, mikrobiellen Konsortien wie sie in natürlichen Habitaten wie Sediment- und Bodenproben vorhanden sind. Dazu gehörte die Konstruktion und Nutzung von komplexen Metagenombanken als Quelle für Gene und Genprodukte für den Einsatz in verschiedenen biotechnologischen Prozessen. Durch eine Kombination von Anreicherungstechniken und der direkten Isolierung von DNA aus Umweltproben wurden Genbanken erstellt und anschließend mit auf Enzymaktivität oder Sequenzähnlichkeiten basierenden Verfahren durchmustert. Ziel war die Identifizierung

von Genen für Coenzym B₁₂-abhängige Glycerin- und Diol-Dehydratasen sowie von Genen, die Alkohol-Oxidoreduktase-Aktivität mit kurzkettigen Polyolen vermitteln.

2 MATERIAL UND METHODEN

2.1 Verwendete Organismen, Plasmide und Oligonukleotide

Die im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Organismen sind in Tabelle 1, die Plasmide in Tabelle 2 aufgeführt. Tabelle 3 gibt eine Übersicht über die verwendeten Oligonukleotide.

Tabelle 1: Verwendete Organismen

Stamm	relevanter Geno- oder Phänotyp	Herkunft/Referenz
<i>Citrobacter freundii</i>	Wildtyp	DSM 30040
<i>Klebsiella oxytoca</i>	Wildtyp	DSM 4798
<i>Escherichia coli</i> ECL707	F^- <i>gld</i> :: Δ Tn10, <i>glpK</i> :: Δ Tn10 <i>ptsD</i> :: Δ Tn10, <i>araD139</i> , <i>flbB</i> Δ (<i>lacU169</i>), <i>ptsF25</i> , <i>relA</i> , <i>rpsL</i> , <i>thi</i>	YANISCH-PERRON et al., 1985
<i>Escherichia coli</i> DH5 α	F^- <i>endA1</i> , ϕ 80 <i>lacZ</i> Δ M15 Δ (<i>lacZYA-argF</i>) <i>U169</i> , <i>endA1</i> , <i>recA1</i> , <i>hsdR17</i> (r_K^- m_K^+), <i>deoR</i> , <i>thi-1</i> , <i>supE44</i> , λ^- , <i>gryA96</i> , <i>relA1</i>	HANAHAN, 1983
<i>Escherichia coli</i> BL21(DE3)	F^- <i>ompT</i> <i>hsdS_B</i> (r_B^- m_B^-), <i>gal dcm</i> <i>rne131</i> (DE3)	Invitrogen, Carlsbad, USA
<i>Escherichia coli</i> TOP10	F^- <i>mcrA</i> Δ (<i>mrr-hsdRMS-mcrBC</i>) Φ 80 <i>lacZ</i> Δ M15 Δ <i>lacX74</i> <i>recA1</i> <i>deoR</i> <i>araD139</i> Δ (<i>ara-leu</i>)7697 <i>galU</i> <i>galK</i> <i>rpsL</i> (Str ^R) <i>endA1</i> <i>nupG</i>	Invitrogen, Carlsbad, USA

Tabelle 2: Vektoren und rekombinante Plasmide

Plasmid	relevantes Merkmal	Herkunft/Referenz
pBluescript [®] SK+	Ap ^r , <i>lacPOZ</i> , pMB1-Replikon	Stratagene, San Diego, USA
pSTV28	Cml ^r , <i>lacPOZ</i> α, p15A-Replikon	
pCR2.1-TOPO	Ap ^r , Kan ^r , pMB1-Replikon	Invitrogen, Carlsbad, USA
pET100/D-TOPO	Ap ^r , His ₆ -tag N-terminal, Xpress-epitop	Invitrogen, Carlsbad, USA
pET101/D-TOPO	Ap ^r His ₆ -tag C-terminal, V5-epitop-tag	Invitrogen, Carlsbad, USA
pRD1	Ap ^r , <i>dhaK</i> , <i>dhaD</i> , <i>dhaR</i> , <i>orfW</i> , <i>orfX</i> , <i>dhaT</i> , <i>orfY</i> , <i>dhaB</i> , <i>dhaC</i> , <i>dhaE</i> , <i>orfZ</i>	DANIEL, 1994
pGEX2T/dhaB	Ap ^r , <i>dhaB</i>	RÖSKENS, 1997
pFL1	Ap ^r , <i>dhaT</i> , <i>orfY</i> , <i>orfW</i> , <i>orfX'</i> , <i>orfZ'</i>	LUERS, 1997
pLM3	Ap ^r , <i>dhaB</i> , <i>dhaC</i> , <i>dhaE</i>	MACIS et al. , 1998
pMS2	Ap ^r , <i>dhaB</i> , <i>dhaC</i> , <i>dhaE</i> , <i>orfZ</i>	SEYFRIED, 1996
pCS120	Ap ^r , <i>dhaB</i> , <i>dhaC</i> , <i>dhaE</i> , (3`His ₆ -Tag)	SEIFERT, 2001
pCS111	Ap ^r , <i>dhaFG</i> (<i>C. freundii</i>), (3`His ₆ -Tag)	SEIFERT, 2001
pCS211	Ap ^r , <i>dhaFG</i> (<i>Cl. pasteurianum</i>), (3`His ₆ -Tag)	SEIFERT, 2001

Tabelle 3: Verwendete Oligonukleotide

Bezeichnung	Sequenz
alpha3	5'-GAYTTYGAYGAYTAYAAAY-3'*
beta1	5'-YTTNGTYTCYTDDATRTG-3'*
pAK2-1	5'- <u>CACCAT</u> GAGAAGATCAAAACGATTC-3'
pAK2-2A	5'-TTACTGGCTGCCTTTACGCAG-3'
pAK2-2B	5'-CTGGCTGCCTTTACGCAG-3'
pAK3-1	5'-CGGTACCGAACTACGACAACATGTTTG-3'
pAK3-2A	5'-TCACTGACTGCCTTTACGCAG-3'
pAK3-2B	5'-CTGACTGCCTTTACGCAG-3'
pAK4-1	5'-TCCGGTTATTCCGCGGTGCCGAACACTAC-3'
pAK4-2	5'-TCAAGGATGCGATCGTCT-3'
pAK5-1	5'-TGCTGCGCCAGATAATTGAAGACGTAC-3'
pAK5-2A	5'-TTAATCGTCACCTTTGACTTT-3'
pAK5-2B	5'-ATCGTCACCTTTGACTTT-3'
pAK7-1	5'- <u>CACCAT</u> GAGAAGATCAAAACGATTTG-3'
pAK7-2A	5'-TTACTGGCTGCCTTTACGCAG-3'
pAK7-2B	5'-CTGGCTGCCTTTACGCAG-3'
CF-1 (B1)	5'- <u>CACCAT</u> GAGAAGATCAAAACGATTC-3'
CF-2 (B2)	5'-CAAACATGTTGTCGTAGTTCGGTACCG-3'
ST/KO-1	5'- <u>CACCAT</u> GAGATCGAAAAGATTTGA-3'
ST/KO-2	5'-TTAATCGTCGCCTTTGAGTTT-3'
ST-3 (α-Ende)	5'-GTACGTCTTCAATTATCTGGCGCAGCA-3'
KO-3 (α-Ende)	5'-GTAGTTCGGCACGGCGGAATAACCGGA-3'

* Y= C+T, N= A+C+T+G, D= A+T+G, R= A+G

Die Erkennungssequenz für die gerichtete Klonierung in die Expressionsvektoren pET100/D-TOPO bzw. pET101/D-TOPO ist unterstrichen.

2.2 Nährmedien

Alle aufgeführten Medien wurden durch 30-minütiges Autoklavieren bei 121°C sterilisiert. Die C- Quellen für Mineralmedien wurden separat autoklaviert und erst unmittelbar vor dem Animpfen zugegeben. Zur Herstellung von Agarplatten wurde dem Medium vor dem Autoklavieren 1,5 % (w/v) Agar zugefügt.

Anaerobe Medien wurden nach der von COSTILOW (1981) beschriebenen Methode unter Begasung mit sauerstofffreiem Stickstoff hergestellt.

2.2.1 LB- (Luria-Bertani) Medium (SAMBROOK et al., 1989)

Trypton	10	g
Hefeextrakt	5	g
NaCl	10	g
H ₂ O _{dest.}	ad 1000	ml

2.2.2 DYT-Medium (SAMBROOK et al., 1989)

Trypton	16	g
Hefeextrakt	10	g
NaCl	5	g
H ₂ O _{dest.}	ad 1000	ml

2.2.3 SOB-Medium (HANAHAHAN, 1983)

Trypton	20	g
Hefeextrakt	5	g
NaCl	0,58	g
KCl	0,18	g
MgCl ₂	2,0	g
MgSO ₄	2,5	g
H ₂ O _{dest.}	ad 980	ml

2.2.4 M9-Mineralmedium (MILLER, 1972; modifiziert)

KH ₂ PO ₄	3,0	g
Na ₂ HPO ₄	6,0	g
NH ₄ Cl	3,0	g
NaCl	0,5	g
MgSO ₄ x 7 H ₂ O	0,05	g
CaCl ₂ x 12 H ₂ O	0,002	g
FeSO ₄	0,02	g
Hefeextrakt	0,2	g
SL-4	1	ml
Vitaminlösung nach Wolin	1	ml
pH-Wert einstellen auf	7,4	

Dem Medium wurde Glycerin, 1,2 Propandiol, 2,3-Butandiol oder Ethylenglykol in einer Endkonzentration von 100 mM und Thiamin-HCl in einer Konzentration 10 mM zugesetzt.

2.2.5 Carbonyl-Indikator-Medium (CONWAY et al., 1987, modifiziert)

Um 1 l Indikatormedium zu erhalten, wurde 1 l LB-Medium (s. 2.2.1) hergestellt, autoklaviert und auf ca. 45 °C abgekühlt. Zugefügt wurden:

Pararosanilin	20	mg
Na ₂ S ₂ O ₅	100	mg

Pararosanilin und Natriumbisulfit wurden vor der Zugabe im Dunkeln in 20 bis 30 ml H₂O gelöst und der pH-Wert auf 7,0 eingestellt. Als C-Quellen wurden dem Medium Glycerin, 1,2 Propandiol, 2,3-Butandiol oder Ethylenglykol in einer Endkonzentration von 1 % zugesetzt.

2.2.6 *Citrobacter*-Mineralmedium mit Hefeextraktzusatz (AVERHOFF, 1988; modifiziert)

KH ₂ PO ₄	6,0	g
K ₂ HPO ₄	14,0	g
(NH ₄) ₂ SO ₄	3,0	g
MgSO ₄ x 7 H ₂ O	0,2	g
CoCl ₂ (50 mM)	85,0	μl
Hefeextrakt	1	%
SL-4	1,0	ml
H ₂ O _{dest.}	ad 1000	ml
pH-Wert einstellen auf	7,5	
zusätzlich bei anaeroben Medien:		
Resazurin (0,1%)	1,0	ml
Cystein-HCl (200 g/l)	1,0	ml

Für die Anzucht von rekombinanten *E. coli*-Stämmen enthielt das Medium zusätzlich Thiamin-HCl (10 mM). Anschließend wurde das Medium für 25 min mit einem N₂/CO₂ Gasgemisch (80 %/20 %, (v/v)) durchgast, mit einem Butyl-Gummistopfen verschlossen und für 30 min bei 121 °C autoklaviert. Als Reduktionsmittel diente eine Cystein-HCl-Lösung, die direkt vor dem Animpfen zugesetzt wurde.

2.2.7 Spurenelementelösung SL-4 (PFENNIG und LIPPERT, 1966)

Na ₂ -EDTA	5,0	g
FeSO ₄ x 7 H ₂ O	2,0	g
ZnSO ₄ x 7 H ₂ O	0,1	g
MnCl ₂ x 4 H ₂ O	0,03	g
H ₃ BO ₄	0,3	g
CoCl ₂ x 6 H ₂ O	0,2	g
CuCl ₂ x 2 H ₂ O	0,01	g
NiCl ₂ x 6 H ₂ O	0,02	g
NaMoO ₄ x 2 H ₂ O	0,03	g
H ₂ O _{dest.}	ad 1000	ml

Der pH-Wert wurde auf 6,7 eingestellt und die Lösung lichtgeschützt bei 4 °C gelagert.

2.2.8 Spurenelementelösung SL-9 (TSCHECH und PFENNIG; 1984)

Titriplex	12,8	g
FeCl ₂ x 4 H ₂ O	2,0	g
CoCl ₂ x 6 H ₂ O	190	mg
MgCl ₂ x 2 H ₂ O	100	mg
ZnCl ₂	70	mg
H ₃ BO ₃	6	mg
NiCl ₂ x 6H ₂ O	24	mg
CuCl ₂ x 2 H ₂ O	2	mg
Na ₂ MoO ₄ x 2 H ₂ O	36	mg
H ₂ O _{dest.}	ad 1000	ml

2.2.9 Vitaminlösung (WOLIN et al., 1964, modifiziert)

Biotin	2	mg
Folsäure	2	mg
Pyridoxin x HCl	10	mg
Thiamin x HCl	15	mg
Riboflavin	5	mg
Nikotinsäure	5	mg
Ca-Pantothenat	5	mg
Vitamin B ₁₂	10	µg
p-Aminobenzoessäure	5	mg
α-Liponsäure	1	mg
H ₂ O _{dest.}	ad 1000	ml

2.2.10 Antibiotika und sonstige Medienzusätze

Für die Anzucht rekombinanter *E. coli*-Stämme wurden die in Tabelle 4 aufgeführten Medienzusätze verwendet.

Tabelle 4: Verwendete Medienzusätze und Konzentrationen

Medienzusatz	Stammlösung	Arbeitskonzentration
Ampicillin	50 mg/ml 50 % Ethanol	50-100 µg/ml
Chloramphenicol	25 mg/ml Ethanol	25-50 µg/ml
Coenzym B ₁₂	1 mg/ml H ₂ O _{dest.}	1 mg/l
IPTG	25 mg/ml H ₂ O _{dest.}	50 µg/ml
X-Gal	20 mg/ml Dimethylformamid	40 µg/ml

Die Stammlösung von Coenzym B₁₂ wurde gegebenenfalls steril filtriert und für 20 min steril mit N₂ durchgast. Die IPTG-Stammlösung wurde ebenfalls steril filtriert. Die Zugabe der Komponenten erfolgte erst nach dem Abkühlen der autoklavierten Medien auf mindestens 60 °C. Die Lagerung erfolgte bei -20 °C.

2.3 Zellanzucht

2.3.1 Aerobe Anzucht

Die aerobe Anzucht von *E. coli* erfolgte in Reagenzgläsern oder Erlenmeyerkolben. Das Kulturvolumen betrug ca. 20 % des Füllvolumens der Reagenzgläser bzw. Erlenmeyerkolben. Die Kulturen wurden unter Schütteln bei 30 ° oder 37 °C inkubiert.

2.3.2 Anaerobe Anzucht

Anaerobe Kulturen wurden mit einem 1 bis 10 %igen (v/v) Inokulum aus einer Stammkultur (s. 2.3.3) oder aus einer aeroben oder anaeroben Vorkultur beimpft. Die Inkubation erfolgt bei 30 °C. Für Kulturen mit einem Volumen bis zu 10 ml wurden Hungate-Röhrchen (Anaerobe Test Tubes, Hungate Type, 16 × 125 mm, Fa. Bellco Glass Inc., Vineland, New Jersey, USA) und für Anzuchten bis 50 ml 125-ml-Serumflaschen ("Hypovials", Fa. Pierce, Rockford, England) verwendet. Bei einem

Kulturvolumen von bis zu 500 ml fanden 1-l-Serumflaschen (Fa. Müller und Krempel AG, Bülach, Schweiz) Verwendung. Für das Überimpfen wurden sterile Einwegspritzen benutzt.

2.3.3 Stammhaltung

Agarplatten mit *E. coli* konnten maximal bis zu 8 Wochen bei 4 °C gelagert werden. Zur längerfristigen Konservierung wurden Stammkulturen angelegt. Dazu wurden diese bei 30 °C in LB-Medium (s. 2.2.1) angezogen. In der logarithmischen Wachstumsphase wurden dann 0,75 ml Zellsuspension entnommen, mit 0,25 ml Glycerin (87 %, (v/v)) versetzt und bei -70 °C gelagert.

Die Stammhaltung von *Ilyobacter polytrophus* erfolgte in 5 ml Mineralmedium (s. 2.2.7) bei 4 °C.

2.3.4 Anzucht von rekombinanten *E. coli*-Stämmen zur heterologen Genexpression

2.3.4.1 Expression mit dem „pET Directional TOPO[®] Expression“-Kit

Der „pET Directional TOPO[®] Expression“-Kit (Fa. Invitrogen, Carlsbad, USA) nutzt die Klonierungsstrategie des „TOPO-Cloning“ (s. Abb. 6 und detaillierte Erklärung des Grundprinzips unter 2.8.3.2), um blunt-end-PCR-Produkte gerichtet in einen „high-level“-Expressionsvektor zu klonieren. Außerdem besteht die Möglichkeit das Zielgen N- oder C-terminal mit einem Tag (u. a. His₆-Tag) zu versehen, der später eine einfache Detektion mit Antikörpern oder die Reinigung des gebildeten Proteins ermöglicht. Die physikalische Karten der verwendeten Vektoren pET100/D/*lacZ* und pET101/D/*lacZ* sind in Abbildung 4 dargestellt.

Abbildung 4: Physikalische Karten der Expressionsvektoren pET100/D/*lacZ* und pET101/D/*lacZ*.

lacO, lac-Operator; *lacI*, lac-Repressor; RBS, Ribosomenbindestelle; EK, Enterokinase-Erkennungsstelle; *rop*, erleichtert „low-copy“-Replikation in *E. coli*

Die gerichtete TOPO-Klonierung (s. Abb. 5) wurde durch das Anhängen einer spezifischen Sequenz (5'-CACC) an das durch PCR amplifizierte Zielgen erreicht, die komplementär (3'-GTGG) als Einzelstrang-Überhang auf dem Vektor vorhanden war.

Dieser Überhang drang in das 5'-Ende des PCR-Produkts ein und stabilisierte so die korrekte Orientierung des inserierten Gens.

Das pET-Expressionssystem machte sich die hohe Aktivität und Spezifität der T7-RNA-Polymerase zu Nutze. Dies ermöglichte ausgehend vom T7-Promotor eine regulierte Expression von heterologen Genen in *E. coli* (ROSENBERG et al., 1987; STUDIER und MOFFATT, 1986; STUDIER et al. 1990). Für die Expression wird der *E. coli*-Stamm BL21 Star™ (DE3) herangezogen. Dieser Stamm trägt den defekten, lysogenen Bakteriophagen DE3 des λ -Phagen, der folgende Elemente chromosomal codiert enthält:

- den Lac-Repressor *lacI*
- die T7-RNA-Polymerase-Gene unter der Kontrolle des *lacUV5*-Promotors
- einen Teil des *lacZ*-Gens

Abbildung 5: Schematische Darstellung der gerichteten TOPO-Klonierung.

Wenn dieser Vektor in einem DE3-lysogenen Stamm etabliert wurde, wirkte der gebildete *lac*-Repressor zum einen an dem *lacUV5*-Promotor im Wirtschromosom und reprimierte dort die Expression der T7-Polymerase und zum anderen am T7-Promotor des Vektors. Letzteres verhinderte die Expression der inserierten Gene. Die Expression der T7-RNA-Polymerase und der inserierten Gene ließ sich somit durch die Zugabe von IPTG induzieren.

2.4 Bestimmung von Wachstumsparametern

2.4.1 Bestimmung der optischen Dichte

Die Bestimmung der optischen Dichte (OD) erfolgte anhand von Trübungsmessungen bei einer Wellenlänge von 600 nm gegen sterile Nährlösung in einem Spektralphotometer (UV-VIS Spektrophotometer V-550, Fa. Jasco, Jena) in Plastikkuvetten mit einer Schichtdicke von 1 cm. Bei Zelldichten $E_{600} > 0,3$ wurden die Proben mit steriler Nährlösung entsprechend verdünnt. Die Messungen erfolgten gegen Medium als Leerwert.

Die OD von Hungate-Kulturen konnte direkt im Röhrchen mit Hilfe eines Photometers der Fa. Milton Roy (Spectronic 21, Rochester, New York, USA) bei 600 nm in einem Extinktionsbereich zwischen 0 und 2,0 verfolgt werden. Als Referenz dienten Röhrchen mit unbeimpftem Medium.

2.4.2 Bestimmung des pH-Wertes

Der pH-Wert wurde mit einem WTW pH-Meter pH 526 (Fa. WTW GmbH, Weilheim) mit einer Glas-Calomel-Elektrode (Fa. Cahn-Ingold, Frankfurt) bestimmt. Vor den Messungen wurde das Gerät für den entsprechenden Meßbereich mit Eichlösungen (pH 4,0 und pH 7,0 der Fa. Riedel de Haen AG, Hannover) geeicht.

2.5 Standardtechniken für das Arbeiten mit Nukleinsäuren

2.5.1 Behandlung von Geräten und Lösungen

Alle hitzestabilen Lösungen und Geräte wurden zur Inaktivierung von Nukleasen für 20 min bei 121 °C autoklaviert. Hitzelabile Geräte wurden mit 70 % (v/v) Ethanol gewaschen und Metalloberflächen abgeflammt. Hitzelabile Biochemikalien wurden sterilfiltriert.

2.5.2 Puffer und Lösungen

Im folgenden sind die Zusammensetzungen einiger Puffer und Lösungen aufgeführt, die im nachfolgenden Text nicht näher erläutert werden. Die Herstellung niedrigerer Pufferkonzentrationen erfolgte durch Verdünnung des Puffers mit H₂O_{dest.}.

10 x TE-Puffer

1 M Tris-Puffer (pH 8,0)	100 ml
0,5 M EDTA (pH 8,0)	10 ml
H ₂ O _{dest.}	ad 1000 ml

20 x SSC-Puffer

NaCl	175 g
Na ₃ Citrat	88 g
H ₂ O _{dest.}	ad 1000 ml

50 x TAE-Puffer

Tris	242 g
Eisessig	57 ml
0,5 M EDTA (pH 8,0)	100 ml
H ₂ O _{dest.}	ad 1000 ml

2.5.3 Fällung, Reinigung und Konzentration von Nukleinsäuren

2.5.3.1 Fällung von Nukleinsäuren

Die Konzentration von Nukleinsäuren erfolgte durch Fällung mit Ethanol oder Isopropanol. Durch Zugabe von 3 M Na-Acetat (pH 5,5) wurde, falls notwendig, die Ionenstärke erhöht (Endkonzentration 0,3 M). Zur Präzipitation der Nukleinsäuren erfolgte die Zugabe von 2 Vol. Ethanol (96 %) bzw. 1 Vol. Isopropanol (96 %). Die Ethanolfällung erfolgte durch Inkubation bei -70 °C für mindestens 20 min, bei Isopropanol wurde mindestens 5 min bei Raumtemperatur inkubiert. Die Nukleinsäuren wurden durch Zentrifugation (13000 bis 16000 x g, 4 °C oder RT, 30 min) pelletiert. Das Pellet wurde mit 1 ml eiskaltem Ethanol (70 %, v/v) gewaschen, getrocknet und in dem gewünschten Volumen sterilem H₂O oder TE-Puffer aufgenommen.

2.5.3.2 DNA-Fällung nach Saccharose-Dichtegradientenzentrifugation

Ziel dieser Fällung war die Abtrennung von Saccharose nach der Saccharose-Dichtegradientenzentrifugation (s. 2.9). Dazu wurde jedes Aliquot aus dem Gradienten mit 0,5 Vol. PEG-NaCl-Lösung (20 % PEG 6000, 2,5 M NaCl) versetzt und über Nacht bei RT inkubiert. Anschließend erfolgte eine Zentrifugation der Lösungen (30 min, 22650 x g, RT). Der Überstand wurde abgenommen, das Pellet mit 0,5 ml Ethanol (70 % (v/v), RT) versetzt und nochmals unter den gleichen Bedingungen zentrifugiert. Wiederum wurde der Überstand abgenommen, das Pellet getrocknet und in 20 - 30 µl sterilem H₂O aufgenommen. Alle Schritte wurden bei RT durchgeführt, da bei Einsatz niedrigerer Temperaturen das Polyethylenglykol ausfällt.

2.5.3.3 Mikrodialyse von DNA

Um die Effizienz der Elektroporation (s. 2.10.2) zu erhöhen, wurden die Salze aus Ligationsansätzen durch eine Mikrodialyse entfernt. Die Dialyse wurde in einer kleinen Petrischale gegen steriles H₂O als Dialysepuffer durchgeführt. Zunächst wurden kleine Membranfilterscheiben (Porengröße 0,025 µm, Fa. Milipore, Eschborn) mit der glänzenden Seite nach oben auf die Wasseroberfläche gegeben. Dann wurden mit einer Pipette vorsichtig 5 bis 10 µl der Probe auf die Dialysemembran aufgetragen. Nach 30 min konnten die dialysierten Proben abgenommen werden.

2.5.3.4 Dialyse von Umwelt-DNA

Enthielt die aus den Standort-Proben isolierte DNA zu hohe Salzkonzentrationen, mußte sie vor einer weiteren Reinigung zunächst einer Dialyse unterzogen werden.

Zu diesem Zweck wurden 20 bis 30 cm lange Dialyseschlauchstücke in TE-Puffer autoklaviert. Anschließend wurde die DNA-Lösung in die Schläuche eingefüllt, die an beiden Enden mit Dialyseschlauch-Klammern verschlossen wurden. Die DNA-Lösung wurde dann 24 h gegen TE-Puffer dialysiert. Nach etwa 4 bis 5 h wurde der Puffer ausgewechselt. Anschließend erfolgte eine Fällung der DNA mit Ethanol (s. 2.5.3.1).

2.5.3.5 Gelfiltration von DNA-Lösungen

Die Abtrennung niedermolekularer Bestandteile, wie z.B. einzelner Nukleotide von DNA-Fragmenten, erfolgte durch eine Gelfiltration mit NAP-5-Säulen (Fa. Amersham Pharmacia LKB GmbH, Freiburg). Die Säulen wurden mit 10 ml H₂O_{dest.} äquilibriert. Danach wurde 0,5 ml DNA-Lösung aufgetragen und mit 1,0 ml H₂O eluiert.

2.5.3.6 Konzentrationsbestimmung von Nukleinsäuren

Die Bestimmung der Konzentration von Nukleinsäuren in wässriger Lösung erfolgte photometrisch bei einer Wellenlänge von 260 nm.

Eine Extinktion von 1 entspricht etwa:

- ⇒ 50 µg/ml doppelsträngiger DNA,
- ⇒ 40 µg/ml einzelsträngiger DNA oder
- ⇒ 30 µg/ml einzelsträngiger Oligonukleotide.

Die Reinheit von Nukleinsäure-Lösungen konnte durch das Verhältnis OD₂₆₀ zu OD₂₈₀ bestimmt werden. Bei reinen DNA-Lösungen sollte dieser Wert zwischen 1,8 und 2,0 liegen (SAMBROOK et al., 1989), niedrigere Werte weisen auf Verunreinigungen mit Proteinen hin.

2.5.3.7 Isolierung von DNA-Fragmenten mittels „QIAquick Gel Extraction“-Kit

Zur Isolierung von DNA-Fragmenten wurde der „QIAquick Gel Extraction“-Kit (Fa. Qiagen GmbH, Hilden) herangezogen. Die Methode beruht auf der Bindung der DNA an eine Silica-Membran in Gegenwart von hohen Salzkonzentrationen. Der Kit kann zur Extraktion von DNA-Fragmenten von einer Größe von 0,1 bis 10 kbp aus Agarosegelen in TAE-Puffer genutzt werden. Die Extraktion erfolgte nach den im Herstellerprotokoll beschriebenen Arbeitsschritten. Die DNA wurde mit H₂O_{dest.} eluiert und bis zur weiteren Verwendung bei –20°C aufbewahrt.

2.5.3.8 Reinigung von DNA-Fragmenten mittels „QIAquick PCR Purification“-Kit

Zur Reinigung von PCR-Produkten und anderen linearen DNA-Fragmenten wurde der „QIAquick PCR Purification“-Kit (Fa. Qiagen GmbH, Hilden) genutzt. Wie auch beim „QIAquick Gelextraction“-Kit (s. 2.5.3.7) wird die DNA bei hohen Salzkonzentrationen an eine Silica-Membran gebunden. Die Reinigung wurde nach den Anweisungen des Herstellers durchgeführt. Die Elution der DNA erfolgte mit $\text{H}_2\text{O}_{\text{dest.}}$. Die so gereinigten PCR-Produkte wurden bis zu ihrer weiteren Verwendung bei -20°C gelagert.

2.6 Isolierung von Nukleinsäuren

2.6.1 Isolierung von DNA aus Umweltproben (ZHOU et al., 1996)

Diese Methode der DNA-Isolierung aus Bodenproben beruht auf der direkten Lyse der Zellen, so daß sie vor dem Aufschluß nicht von den Bodenpartikeln abgetrennt werden müssen. Weiterhin wird so die zusätzlich im Boden frei vorliegende DNA erhalten.

Zur DNA-Isolierung wurden 50 g Boden mit 135 ml DNA-Extraktionspuffer (DEP) und 1 ml Proteinase K (10 mg/ml) versetzt und für 30 min bei 37°C horizontal geschüttelt (225 Upm). Nach der Zugabe von 15 ml 20 % SDS (oder 30 ml 10 %) wurde das Gemisch für 2 h bei 65°C inkubiert und dabei alle 15 bis 20 min vorsichtig geschüttelt. Zur Trennung der bereits gelösten DNA von der Bodenmatrix wurde anschließend zentrifugiert (10 min, 7000 Upm, Rotor GS3, Sorvall Zentrifuge, Fa. Du Pont Instruments, Newton, USA, RT) und der Überstand in einen GS3-Zentrifugenbecher überführt. Das Pellet wurde noch zweimal in je 45 ml DEP und 5 ml 20 % SDS suspendiert und nach einer 10-minütigen Inkubation bei 65°C wie oben beschrieben zentrifugiert.

Zur Extraktion der DNA wurde den gesammelten Überständen 1 Vol. Chloroform/Isoamylalkohol (24:1) zugesetzt und für 10 min bei 7000 Upm (Rotor GS3, Sorvall Zentrifuge, Fa. Du Pont Instruments, Newton, USA) und RT zentrifugiert.

Die Fällung der DNA erfolgte durch Zugabe von 0,6 Vol. Isopropanol für 1 h bei RT. Nach einer Zentrifugation bei 9000 Upm für 20 min bei RT wurde das Pellet mit eiskaltem Ethanol (70 % v/v) gewaschen und in 4 bis 5 ml sterilem H_2O aufgenommen.

DNA-Extraktionspuffer (DEP)

Tris	100	mM
EDTA	100	mM
Na ₂ HPO ₄	100	mM
NaCl	1,5	M
CTAB	1	%
pH 8,0		

2.6.2 Reinigung von Umwelt-DNA (HENNE et al., 1999)

Bei der verwendeten Methode zur Isolierung von DNA aus Standortproben (s. 2.6.1) wurden neben der DNA auch Huminsäuren gefällt, die in nachfolgenden Klonierungsschritten Restriktionsenzyme und Ligase inhibieren können. Durch Reinigung über das „WizardTM Plus Minipreps DNA Purification System” (Fa. Promega Deutschland GmbH, Mannheim) und eine anschließende Anionenaustauschchromatographie (Qiagen-tip-100 Säulen, Fa. Qiagen GmbH, Hilden), konnten die Huminsäuren zum größten Teil abgetrennt werden. Jedoch ist diese Methode mit einem hohen Verlust an DNA verbunden.

Der erste Reinigungsschritt erfolgte nacheinander über zwei Minisäulen. Dazu wurden 150 µl DNA-Lösung mit 150 µl H₂O verdünnt, mit 1 ml „DNA Purification Resin” versetzt und auf den Säulenkörper gegeben. Nach dem Waschen mit 2 ml „Wash”-Puffer wurde zum Trocknen des Säulenmaterials bei 2000 Upm für 2 min zentrifugiert. Die Elution der DNA aus der Säulenmatrix erfolgte mit jeweils 50 µl TE-Puffer (65 – 70 °C). Da bei dieser Methode die Bindekapazität des Säulenmaterials stark überschritten wird, wurde die Elution sechsmal wiederholt. Das vereinigte Eluat wurde wieder mit 1 ml Resin versetzt und auf die zweite Säule aufgetragen. Die Elution wurde viermal wiederholt.

Eluate aus mehreren Ansätzen wurden wiederum vereinigt und mit 1 Vol. eines MOPS/NaCl-Puffers (1,5 M NaCl, 100 mM MOPS, pH 7,0) versetzt, um eine effiziente Bindung an die nachfolgende Anionenaustauschchromatographie-Säule zu gewährleisten. Die verwendeten Qiagen-tip-100-Säulen wurden mit 4 ml QBT-Puffer äquilibriert und die DNA-Lösung aufgetragen, und entsprechend der mitgelieferten

Vorschrift mit den Puffern QC gewaschen, mit QF eluiert und mit Isopropanol gefällt. Die Puffer QBT, QC und QF wurden vom Hersteller Qiagen mitgeliefert.

2.6.3 Isolierung von RNA aus Umweltproben (HURT et al., 2001; modifiziert)

Diese Methode der RNA-Isolierung ist eine Variation der Methode zur DNA-Isolierung aus Umweltproben nach ZHOU et al. (1996) (s.2.6.1). DNA und RNA werden parallel isoliert und anschließend durch Anionenaustauschchromatographie an Qiagen-tip 500-Säulen (QIAGEN RNA/DNA-Kit) getrennt. Ein entscheidender Unterschied zur DNA-Isolierung ist die Erniedrigung des pH-Wertes des DEP-Puffers (s. 2.6.1) auf 7,0, was eine Stabilisierung der RNA bewirkt.

Analog zu der in 2.6.1 beschriebenen Methode werden 50 g Probe mit 135 ml DEP-Puffer (pH 7,0), 1 ml Proteinase K (10 mg/ml) und 15 ml SDS (20 %, w/v) versetzt und für 30 min bei 37 °C horizontal geschüttelt (225 Upm).

Anschließend wurde das Gemisch in flüssigem N₂ eingefroren und auf Eis wieder aufgetaut (ca. 2 h). Es folgte eine 1-stündige Inkubation bei 65 °C im Wasserbad. Zur Abtrennung der gelösten RNA und DNA wurde 10 min bei 7000 Upm und RT zentrifugiert (Rotor GS3, Sorvall Zentrifuge, Fa. Du Pont Instruments, Newton, USA) und der Überstand in einen sterilen GS3-Zentrifugenbecher überführt. Zur Extraktion des RNA/DNA-Gemisches wurde 1 Volumen Chloroform/Isoamylalkohol (24:1) zugesetzt und für 10 min bei 7000 Upm und RT zentrifugiert (s.o.).

Die Nukleinsäuren wurden dann für 1 h mit 0,6 Vol. Isopropanol bei –20 °C gefällt und durch Zentrifugation bei 9000 Upm für 20 min pelletiert, mit eiskaltem Ethanol (70 %, v/v) gewaschen und in 5 bis 10 ml sterilem H₂O suspendiert.

Die Trennung der so koextrahierten Nukleinsäuren wurde mittels Anionenaustauschchromatographie an Qiagen-tip 500 Säulen (Fa. Qiagen) durchgeführt. Zunächst wurden 8 ml RNA/DNA-Lösung mit 2,5 ml QRL-Puffer und 22,5 ml QRV2-Puffer versetzt und zur Sedimentation von eventuell ausgefallenen Salzen für 5 min bei 4 °C zentrifugiert. Diese Behandlung diente zur Einstellung des pH-Werts und einer geeigneten Salzkonzentration für eine effektive Bindung der Nukleinsäuren an das Säulen-Material. Die so vorbereitete Lösung wurde auf die Säulen gegeben, die zuvor mit 10 ml QRE-Puffer äquilibriert wurde. In diesem ersten Schritt band nur die RNA an das Säulenmaterial, der die DNA enthaltende Durchfluß mußte

daher aufgefangen werden und wurde bis zur weiteren Verarbeitung bei RT aufbewahrt. Anschließend wurde die Säule mit 28 ml QRW-Puffer gewaschen und die RNA mit 15 ml QRU-Puffer (vorgewärmt auf 45 °C) in einen sterilen, RNase-freien Zentrifugenbecher (SS34, Sorvall) eluiert. Das Eluat wurde mit 1 Vol. eiskaltem Isopropanol versetzt, vorsichtig gemischt und auf Eis aufbewahrt.

Nachfolgend wurde der zuvor aufgefangene Durchfluß zur Bindung der DNA 2 mal hintereinander auf die Säule aufgetragen, die Säule mit 28 ml QC-Puffer gewaschen und die DNA mit 15 ml QF-Puffer eluiert. Die Fällung erfolgte mit 0,7 Vol. Isopropanol (RT) für 10 min bei RT.

Zur Pelletierung wurden die gefällte RNA und DNA für 30 min bei 15000 Upm und 4 °C zentrifugiert (Rotor SS34, Sorvall Zentrifuge, Fa. Du Pont Instruments, Newton, USA). Die Pellets wurden mit 4 ml eiskaltem Ethanol (70 %, v/v) versetzt, kurz gevortext und nochmals für 20 min zentrifugiert (s.o.). Anschließend wurden die Pellets bei RT für 10 min getrocknet und in 0,1 bis 2 ml H₂O gelöst (ü.N. bei RT, auf einem Schüttler).

Die Puffer QRL, QRV2, QRE, QRW, QC, QBT und QF wurden vom Hersteller Qiagen migeliefert.

2.6.4 Reinigung von Poly(A)-RNA aus Gesamt-RNA

Bei der Isolierung von RNA werden in der Mehrheit tRNA- und rRNA-Moleküle erhalten, da der Anteil der mRNA in einer Zelle nur ca. 1 bis 5 % beträgt. Die meiste eukaryotische mRNA (und auch einige virale RNAs) besitzen einen poly(A)-Schwanz von 20 bis 250 Adenosinnukleotiden. Zur Abtrennung von mRNA von der isolierten Gesamt-RNA aus Umweltproben wurde der Oligotex-Kit der Firma Qiagen genutzt, der sich diese Eigenschaft zu Nutze macht. Oligotex besteht aus Polystyren-Latex-Partikeln mit einer Größe von ca. 1,1 µm Durchmesser, kovalent gebunden befindet sich ein dC₁₀T₃₀-Oligonukleotid an der Oberfläche. Die Poly(A)-mRNA kann also durch Hybridisierung mit dem dT-Oligomer, das an eine feste Phase gebunden ist, gereinigt werden. Die Hybridisierung erfolgt dabei unter Hochsalzbedingungen, die Elution der RNA bei niedriger Ionenstärke, was zur Destabilisierung der RNA/Oligotex-Hybride führt.

Für die Reinigung wurden 250 µl RNA-Lösung mit 250 µl OBB-Puffer und 15 µl Oligotex-Suspension versetzt und anschließend durch Pipettieren gemischt. Zur Auflösung der Sekundärstruktur der RNA wurde das Gemisch für 3 min bei 70 °C inkubiert, die Bindung der RNA erfolgte durch eine 10-minütige Inkubation bei Raumtemperatur. Durch Zentrifugation (14000 –18000 x g) wurde das Oligotex-Material pelletiert, der Überstand entfernt (bis auf ca. 50 µl) und das Pellet für einen Waschschrift in 400 µl QW2-Puffer suspendiert und anschließend auf die Säulenkörper aufgetragen. Es folgte eine Zentrifugation bei 14000 –18000 x g. Dieser Waschschrift wurde einmal wiederholt. Zur Elution der RNA wurde der OEB-Puffer auf 70 °C erhitzt und 20 –100 µl davon auf die Säule gegeben und anschließend wieder zentrifugiert. Um eine möglichst hohe Ausbeute zu erhalten wurde das Eluat nochmals auf die Säule aufgetragen und abermals zentrifugiert.

2.6.5 Isolierung von chromosomaler DNA (AUSUBEL et al., 1987)

Zur Isolierung der chromosomalen DNA aus *Ilyobacter polytrophus* und *Klebsiella oxytoca* wurde eine 500-ml-Kultur bis zur stationären Phase bei 30 °C inkubiert und die Zellen anschließend geerntet.

Das Pellet wurde in 9,5 ml TE-Puffer und 0,5 ml SDS (10 %, (w/v)) suspendiert. Anschließend erfolgte die Zugabe von 50 µl Proteinase K (20 mg/ml) und eine Inkubation für 1 h bei 37 °C. Danach wurden 1,8 ml 5 M NaCl-Lösung und 1,5 ml CTAB/NaCl-Lösung zugefügt, durch Schwenken des Gefäßes gemischt und für 20 min bei 65 °C inkubiert. Zur Abtrennung der Proteine erfolgte eine Extraktion mit 1 Volumen Chloroform/Isoamylalkohol (24:1, (v/v)). Der Überstand wurde abgenommen und zweimal mit 0,5 Volumen Phenol/Chloroform/Isoamylalkohol (24:24:1, (v/v)) extrahiert. Die Fällung der DNA erfolgte durch Zugabe von 0,6 Volumen Isopropanol und anschließende Zentrifugation für 15 min bei 13000 Upm (Rotor SS34, Sorvall, Fa. Du Pont Instruments, Newton, USA). Das Pellet wurde mit 1 ml Ethanol (70 %, (v/v)) gewaschen, getrocknet und in sterilem H₂O suspendiert.

CTAB/NaCl-Lösung

NaCl 700 mM

CTAB 275 mM

2.6.6 Isolierung von Plasmid-DNA**2.6.6.1 „Cracking“ von Plasmiden**

Für die schnelle Analyse einer großen Anzahl von Plasmiden wurde die Methode des „Crackings“ eingesetzt.

Die Kolonien wurden direkt von der Agarplatte mit einem Zahnstocher abgenommen und in 50 µl 10 mM EDTA-Lösung suspendiert. Es folgte die Zugabe von 50 µl frisch angesetztem „Cracking“-Puffer und eine Inkubation bei 70 °C für 5 min. Nach dem Abkühlen auf Raumtemperatur wurden 1,5 µl 4 M KCl und 2 µl Stop-Mix (s. 2.7.1) zugegeben und die Proben für 3 min auf Eis inkubiert. Im Anschluß erfolgte eine Zentrifugation bei 16000 x g und 4 °C. Ca. 20-25 µl des Überstandes wurden in einer Standard-Agarose-Gelelektrophorese (s. 2.7.1) analysiert.

„Cracking“-Puffer

NaOH-Lösung (2N)	100	µl
SDS-Lösung (10 %(w/v))	50	µl
Saccharose	0,2	g
H ₂ O	ad 1000	µl

2.6.6.2 Plasmidschnellpräparation (HOLMES & QUIGLEY, 1981)

Diese Methode diente vor allem zum schnellen Nachweis und zur Charakterisierung von Klonierungsergebnissen.

1,5 ml einer über Nacht gewachsenen Kultur wurden geerntet (5000 x g, 5 min, RT) und in 350 µl STET-Puffer suspendiert. Nach Zugabe von 25 µl Lysozym-Lösung (10 mg/ml 10 mM Tris-HCl, pH 8,0) und einer kurzen Inkubation des Ansatzes bei RT erfolgte anschließend eine Denaturierung für 1 min bei 100 °C. Zellreste und

denaturierte Proteine wurden nach Zentrifugation (16000 x g, 10 min) mit einem sterilen Zahnstocher entfernt. Nach der Zugabe von 40 µl Na-Acetat (2,5 M, pH 5,2) und 420 µl Isopropanol wurde das Plasmid durch Zentrifugation (16000 x g, 5 min) pelletiert. Das enthaltene Pellet wurde mit Ethanol (70 %, (v/v)) gewaschen, getrocknet und in 50 µl H₂O_{dest.} suspendiert.

STET-Puffer

NaCl	100 mM
Tris-HCl	10 mM
EDTA	1 mM
Triton X-100	5 %
pH 8,0	

2.6.6.3 Minipräparation von Plasmiden mittels „Wizard™ Plus Minipreps DNA Purification System“

Eine schnelle Plasmidisolierung zum Erhalt sehr sauberer DNA erfolgte unter anderem durch Verwendung des „Wizard™ Plus Minipreps DNA Purification System“ (Fa. Promega Deutschland GmbH).

1,5 ml einer 5-ml-Übernachtskultur wurden für 5 min bei 6000 x g zentrifugiert und das Zellpellet in 200 µl „Cell Resuspension Solution“ suspendiert. Nach Zugabe von 200 µl „Cell Lysis Solution“ wurde der Ansatz bis zum Aufklaren der Lösung geschwenkt und dann mit 200 µl „Neutralization Solution“ versetzt. Die Probe wurde anschließend 10 min bei 13000 x g zentrifugiert und der Überstand mit 1 ml „DNA-Purification Resin“ gemischt. Das DNA-Resin-Gemisch wurde dann auf eine vom Hersteller mitgelieferte Minisäule gegeben und mit 2 ml „Column Wash Solution“ gewaschen und durch Zentrifugation (2 min, 10000 x g) getrocknet. Die Elution der DNA von der Matrix erfolgte durch Zugabe von 50 µl H₂O_{dest.}, 1-minütiger Inkubation bei Raumtemperatur und anschließender Zentrifugation (30 s, 12000 x g). Bei der Isolierung von Plasmiden > 7 kbp erfolgte die Inkubation bei 65 °C. Das Resin und alle verwendeten Puffer wurden vom Hersteller mitgeliefert.

2.6.6.4 Minipräparation von Plasmiden mittels „QIAprep Spin Miniprep Kit“

Alternativ zum „WizardTM Plus Minipreps DNA Purification System“ (s. 2.6.6.3) wurde zum Erhalt von sehr sauberer Plasmid-DNA der „QIAprep Spin Miniprep Kit“ (Fa. Qiagen) genutzt.

1,5 ml einer 5-ml-Übernachtskultur wurden für 5 min bei 6000 x g zentrifugiert und das Zellpellet in 250 µl Puffer P1 suspendiert. Es folgte die Zugabe von 250 µl Puffer P2, Schwenken bis zum Aufklaren der Lösung und Neutralisation durch Zusatz von 350 µl Puffer N3. Durch Zentrifugation (10 min, 13000 x g) wurden die ausgefällten Proteine und Zelltrümmer sedimentiert. Der Überstand wurde anschließend auf eine QIAprep Säule aufgetragen, die eine Silica-Gel-Membran für die selektive Adsorption von Plasmid-DNA enthält. Durch Zentrifugation (1 min, 13000 x g) erfolgte die Bindung der DNA an die Membran, der Durchfluß wurde verworfen. Nach einem Waschschriff mit 750 µl Puffer PE und dem Trocknen durch Zentrifugation (1 min, 13000 x g) wurde die Plasmid-DNA mit 30 bzw. 50 µl H₂O_{dest.} eluiert.

Alle verwendeten Puffer wurden vom Hersteller mitgeliefert.

2.6.6.5 Präparative Plasmidisolierung über Anionenaustauschchromatographie

Die Isolierung größerer Mengen an Plasmid-DNA erfolgte nach alkalischer Lyse mit den Puffern P1, P2 und P3 über Anionenaustauschchromatographie (Qiagen Plasmid Midi-Kit, Fa. Qiagen).

25 ml Zellkultur wurden bei einer OD₆₀₀ von 1 bis 1,5 geerntet und in 4 ml P1-Puffer suspendiert. Es folgte die Zugabe von 4 ml P2-Puffer und eine Inkubation für 5 min bei RT. Anschließend wurden 4 ml P3-Puffer zugefügt und für 30 min auf Eis inkubiert. Nach Zentrifugation (30 min, 16000 x g, 4 °C) wurde der Überstand abgenommen und zur vollständigen Aufklärung erneut für 15 min zentrifugiert.

Der dabei erhaltene Überstand konnte dann auf eine mit 4 ml QBT-Puffer äquilibrierte Quiagen-tip-100 Säule aufgetragen. Es folgte ein Waschschriff mit 20 ml QC-Puffer und die Elution der Plasmid-DNA durch Zugabe von 5 ml QF-Puffer. Die DNA wurde mit 0,7 Vol. Isopropanol gefällt und durch Zentrifugation (30 min, 16000 x g, 4 °C)

pelletiert. Das Sediment wurde anschließend mit Ethanol (70 %, v/v) gewaschen und getrocknet und in 100 bis 200 µl H₂O aufgenommen.

Für die Isolierung von Plasmid-DNA aus größeren Kulturvolumina als 100 ml wurde die Menge an P1, P2 und P3 entsprechend erhöht. Die Anionenaustauschchromatographie erfolgte dann in mehreren Durchgängen, wobei die Säule nach jeder Elution mit 4 ml QBT-Puffer neu äquilibriert wurde. Auf diese Weise wurde Plasmid-DNA aus Kulturvolumina bis 250 ml isoliert.

Alle verwendeten Puffer wurden vom Hersteller mitgeliefert.

2.7 Gelelektrophorese von Nukleinsäuren

2.7.1 Standard-Agarose-Gelelektrophorese

Zur analytischen Auftrennung von DNA-Fragmenten diente die Standard-Agarose-Gelelektrophorese (SAMBROOK et al., 1989). Es wurden Gele mit einem Volumen von 10 bis 25 ml gegossen. Die Agarosekonzentration variierte zwischen 0,8 und 1,5 %. Die Proben wurden vor dem Auftragen mit 0,2 Volumen Stopp-Mix versetzt, um sie zu beschweren und um die Laufront zu markieren. Als Elektrophoresepuffer wurde 1-fach TAE-Puffer verwendet. Die Elektrophorese wurde bei einer konstanten Spannung zwischen 25 und 120 V durchgeführt, wodurch sich je nach Gelgröße eine Laufzeit von 1 bis 7 h ergab. Nach Beendigung der Elektrophorese wurden die Agarosegele in einem Ethidiumbromidbad (1 µg/ml H₂O) für 10 bis 30 min angefärbt. Nach kurzem Entfärben im Wasserbad konnten die Gele auf der Gel Doc 2000-Anlage (Fa. Biorad, München) bei Licht der Wellenlänge 254 nm begutachtet werden. Zur Dokumentation diente ein Videoprinter (Intas Video Graphic Printer UP-890 CE, Fa. Sony Corporation, Japan), der eine Bildübertragung auf Thermopapier ermöglichte.

Stopp-Mix

Saccharose	50 % (w/v)
Harnstoff	7 M
EDTA	1 mM
Bromphenolblau	0,1 % (w/v)

2.7.2 Größenbestimmung von Nukleinsäuren

Als Größenstandard für lineare DNA-Fragmente wurde der “Ladder-Mix” (Fa. MBI Fermentas, St. Leon-Rot) eingesetzt.

Die Größen der Fragmente betrugen in kBp:

10,0	3,5	1,2	0,6
8,0	3,0	1,03	0,5
6,0	2,5	0,9	0,4
5,0	2,0	0,8	
4,0	1,5	0,7	

und 3 weitere kleinere Fragmente, die meist im Gel nicht mehr sichtbar waren.

2.8 Enzymatische Modifikation von DNA

2.8.1 Schneiden von DNA durch Restriktionsendonukleasen

Die Sequenz-spezifische Spaltung von DNA mit Restriktionsendonukleasen lieferte lineare DNA-Fragmente mit definierten Enden. Die Spaltung erfolgte in den vom Hersteller mitgelieferten Puffersystemen bei den empfohlenen Temperaturen. Die Ansätze wurden mit einem Gesamtvolumen von mindestens 15 µl für 2 bis 15 Stunden durchgeführt. Zur Vermeidung einer zu hohen Glycerinkonzentration im Reaktionsansatz durfte das Volumen der zugegebenen Enzymlösung höchstens 1/10 des Gesamtvolumens betragen.

Die partielle Spaltung von chromosomaler bzw. von Standort-DNA wurde zeitlimitiert durchgeführt. Es wurde routinemäßig mit 1 U Restriktionsenzym gearbeitet. Die Verdauung wurde in bestimmten Zeitabständen durch Zugabe von EDTA (20 mM) und Inkubation auf Eis gestoppt.

2.8.2 Dephosphorylierung von DNA-Fragmenten

Zur Erhöhung der Effizienz einer Ligationsreaktion zwischen Insert-DNA und Vektor-DNA wurde die Vektor-DNA an den 5'-Enden dephosphoryliert. Auf die Weise sollte eine Rezirkularisierung des Vektors verhindert werden. Es wurde die alkalische

Phosphatase der Fa. MBI Fermentas GmbH eingesetzt. Nach vollständiger Spaltung des Vektors wurde 1 U alkalische Phosphatase pro μg DNA zugesetzt und für 30 min bei 37 °C inkubiert.

2.8.3 Ligation von DNA-Fragmenten

2.8.3.1 Ligation mit T4-DNA-Ligase

Zur Verknüpfung von linearisierter, dephosphorylierter Vektor- und Insert-DNA wurde T4-DNA-Ligase eingesetzt, die in Anwesenheit von ATP eine Phosphodiesterbindung zwischen 3'-OH- und 5'-PO₄-Enden von Nukleinsäuren katalysiert. Die Ligationen wurden in einem Volumen von 20 μl durchgeführt. Es wurden jeweils 0,2 bis 1 μg Vektor- bzw. Insert-DNA eingesetzt. Der Ansatz enthielt weiterhin 1 U T4-DNA-Ligase und in 1-facher Konzentration den vom Hersteller mitgelieferten Reaktionspuffer. Die Ligrationsansätze mit kohäsiven Enden wurden über Nacht bei 16 °C, für 2 bis 4 h bei Raumtemperatur oder für 48 h bei 4 °C inkubiert. Zur Ligation glatter Enden wurden 2 U Ligase eingesetzt und die Ansätze für 1 h bei 37 °C inkubiert.

2.8.3.2 Ligation mit dem „TOPO-TA-Cloning®“-Kit

Für eine besonders effektive Klonierung von PCR-Produkten, die mit der *Taq*-DNA-Polymerase in einer Polymerasekettenreaktion (PCR, s. 2.12) amplifiziert wurden, wurde der „TOPO-TA-Cloning®“-Kit (Fa. Invitrogen) verwendet. Für diese Art der Ligation wird keine Ligase benötigt.

Die *Taq*-DNA-Polymerase besitzt eine von der Matrize unabhängige terminale Transferase-Aktivität und hängt an die 3'-Enden von PCR-Produkten einzelne Desoxyadenosine (A) an. Der im Kit vorhandene, bereits linearisierte Vektor pCR2.1-TOPO besitzt analog dazu an den 3'-Enden einzelne Desoxythymidin-Rest (T). Dies erlaubt eine Ligation nach der sogenannten TA-Methode.

Abbildung 6: Schematische Darstellung der TOPO-TA-Klonierung.

Des Weiteren besitzt der Vektor die kovalent gebundene Topoisomerase I des *Vaccinia*-Virus. Die Topoisomerase I bindet an spezifische Sequenzen doppelsträngiger DNA und spaltet dort das Phosphodiester-Gerüst stromabwärts der Sequenz 5'-CCCTT in einem Strang (SHUMAN, 1991). Die Energie dieser Spaltungsreaktion wird durch Ausbildung einer kovalenten Bindung zwischen dem 3'-Phosphat des gespaltenen Stranges und dem Tyrosin-274 der Topoisomerase I konserviert. Die Reaktion zwischen DNA und Protein kann durch den Angriff des 5'-Hydroxyl-Restes umgekehrt werden, was dann zur Abspaltung der Topoisomerase I führt (SHUMAN, 1994). Dieses Prinzip wird zur effizienten Klonierung von PCR-Produkten genutzt (s. Abb. 6).

2.8.4 Radioaktive Markierung von DNA-Fragmenten

DNA-Fragmente, die als Sonden für Hybridisierungen eingesetzt werden sollten, wurden mit Hilfe des "Random Primed Labeling Kit" (Fa. Gibco BRL, Eggenstein) unter Verwendung von [α - 32 P]-dATP radioaktiv markiert. Zur Denaturierung wurden 25 bis 50 ng DNA in 25 μ l H₂O_{dest.} in einem Eppendorf-Reaktionsgefäß mit Schraubdeckel für 10 min bei 95 °C denaturiert und danach schnell auf Eis abgekühlt. Die folgenden Bestandteile des Reaktionsansatzes wurden dann auf Eis zusammen pipettiert:

denaturierte DNA-Lösung	25 µl
dCTP, dGTP, dTTP	je 2 µl
Reaktionspuffer	15 µl
[α - ³² P]-dATP (3000 Ci/mol, 10 µCi/ml)	3 µl

Die Reaktion wurde durch Zugabe von 1 µl Klenow-Fragment (2U/µl) gestartet und für 1 h bei 25 °C inkubiert. Zur Abtrennung nicht eingebauter Nukleotide wurde die DNA-Lösung über NAP-5-Säulen (s. 2.5.3.5) gelchromatographisch gereinigt.

2.9 Saccharose-Dichtegradientenzentrifugation (SAMBROOK et al., 1989; modifiziert)

Die Größenfraktionierung von Fragmenten partiell verdauter, chromosomaler DNA, die zur Klonierung eingesetzt werden sollte, erfolgte mittels einer Saccharose-Dichtegradientenzentrifugation. Bei dieser sehr schonenden Methode werden die verschiedenen Fragmentgrößen entsprechend ihrer Schwebedichte im Saccharosegradienten getrennt. Zunächst wurde ein Saccharose-Stufengradient (10 - 40 %) in 10 ml-Zentrifugenröhrchen (Sorvall Polyallomer 3699, Fa. Du Pont de Nemours Deutschland GmbH, Dreieich) hergestellt. Dazu wurden je 1,9 ml 40 %, 32,5 %, 25 %, 17,5 % und 10 % Saccharose (jeweils w/v in 1 M NaCl, 20 mM Tris-HCl, 5 mM EDTA, pH 8,0) beginnend mit der höchsten Konzentration übereinandergeschichtet und nach jeder Stufe eingefroren. Auf den fertigen Gradienten wurde 100 - 200 µg partiell verdaute chromosomale DNA aufgetragen. Die Zentrifugation erfolgte in einem „swing-out“-Rotor (Sorvall TH641, Fa. Du Pont de Nemours) in einer Ultrazentrifuge (Sorvall OTD 55 B, 27000 Upm, 24 h, 20 °C). Zur Ernte des Gradienten wurden vorsichtig je 400 µl von oben beginnend abgenommen. Anschließend erfolgte eine DNA-Fällung mit PEG/NaCl aus Saccharose (s. 2.5.3.2). 10 µl jeder dritten Fraktion wurden durch Agarosegelelektrophorese (s. 2.7.1) auf Größe und Qualität hin überprüft.

2.10 Übertragung von DNA in *E. coli* und Selektion rekombinanter Klone

2.10.1 Hocheffiziente Transformation in *E. coli* (INOUE et al., 1990)

Zur Herstellung hocheffizienter Transformanten wurde *E. coli* aus einer Stammkultur auf eine LB-Agar-Platte ausgestrichen und über Nacht bei 37 °C inkubiert. Aus 10 bis 12 Einzelkolonien wurde eine 5 ml Vorkultur angeimpft. Diese diente als Inokulum für 250 ml SOB-Medium (s. 2.2.3). Diese Kultur wurde bei 16 °C schüttelnd bis zu einer OD₆₀₀ von 0,6 inkubiert. Nach einer Inkubation für 10 min auf Eis wurden die Zellen zentrifugiert (10 min, 2500 x g, 4 °C), in 80 ml eiskalter TB-Lösung suspendiert und für 10 min auf Eis abgekühlt. Es folgte eine Zentrifugation der Zellen (10 min, 2500 x g, 4 °C) und Suspension in 20 ml TB-Lösung mit DMSO (Endkonzentration 7 %, v/v). Nach einer Inkubation für 10 min auf Eis wurden Aliquots von 200 µl in flüssigem N₂ eingefroren und direkt zur Transformation eingesetzt oder bei - 70 °C gelagert.

Zur Transformation wurden 200 µl Zellsuspension auf Eis aufgetaut und nach der Zugabe von 1 bis 20 µl DNA-Lösung (ca. 10 bis 500 ng) für 30 min auf Eis inkubiert. Es folgte ein Hitzeschock für 1 min bei 42 °C, eine kurze Inkubation auf Eis und die Zugabe von 0,8 ml LB-Medium. Zur Ausprägung der plasmidkodierten Antibiotikaresistenz wurden die Ansätze für 60 min bei 37 °C inkubiert und anschließend die Suspension auf LB-Agarplatten mit entsprechendem Antibiotikum ausplattiert.

TB-Lösung

Pipes	10	mM
MnCl ₂	55	mM
CaCl ₂	15	mM
KCl	250	mM
pH 6,7		

Das MnCl₂ wurde ungelöst und separat autoklaviert.

2.10.2 Transformation in *E. coli* durch Elektroporation (DOWER et al., 1988)

Diese Methode beruht auf der Permeabilisierung der Zellmembran durch Elektroschock. Dieser verursacht einen kurzfristigen reversiblen lokalen Zusammenbruch des Membranpotentials bzw. eine Desorganisation der Membranstruktur (CHASSY et al., 1988) und erleichtert damit die Aufnahme von Makromolekülen wie z. B. Plasmid-DNA in die Zelle.

Zur Herstellung elektrokompenter Zellen wurde eine 5-ml-Übernachtskultur in 250 ml LB-Medium (s. 2.2.1) überimpft und bei 30 °C unter Schütteln bis zu einer OD₆₀₀ von 0,5 bis 1,0 inkubiert. Die Kultur wurde für 15 bis 30 min auf Eis gehalten und danach für 10 min bei 5000 x g und 4 °C zentrifugiert. Das Pellet wurde dann zweimal mit 1 Volumen H₂O_{dest.} gewaschen und anschließend noch einmal mit 10 ml Glycerin (10 %, (v/v)). Abschließend erfolgte die Suspendierung in 0,5 ml Glycerin (10 %, v/v). Aliquots der Suspension wurden bei -70 °C gelagert.

Pro Ansatz wurden 40 µl Zellsuspension auf Eis aufgetaut, in eine sterile, vorgekühlte Elektroporationsküvette (Elektrodenabstand 0,2 cm) überführt und mit 1 bis 5 µl dialysierter DNA-Lösung versetzt. Die Elektroporation erfolgte in einem Gene Pulser TM (Bio Rad Laboratories GmbH, München) bei 25 µF, 200 Ω und 2,5 kV, wodurch eine Feldstärke von 12,5 kV/cm und eine Zeitkonstante von 3,5 bis 4,5 ms erreicht wurde. Nach dem Stromimpuls wurden die Zellen sofort in 1 ml LB-Medium aufgenommen, 60 min bei 37 °C inkubiert und anschließend auf LB-Agarplatten mit den entsprechenden Antibiotika ausplattiert.

2.10.3 Transduktion

2.10.3.1 Transduktion mit den „Gigapack® III Gold Packaging Extract“

Zunächst wurden die vom Hersteller (Fa. Stratagene, San Diego, USA) gelieferten, bei -70 °C gelagerten Lysate durch Reiben zwischen den Fingern aufgetaut. Dann wurden sofort 0,1 - 1,0 µg (max. 4 µl) ligierte DNA hinzugefügt und vorsichtig mit der Pipettenspitze gemischt. Anschließend wurde das Gemisch kurz (3 - 5 s) zentrifugiert, damit sich alle Bestandteile am Boden befinden, und es folgte eine Inkubation von 2 h bei RT. Danach wurden 500 µl SM-Puffer und 20 µl Chloroform zugefügt, vorsichtig

gemischt und zum Sedimentieren des “Abfalls” kurz (5 - 10 s) zentrifugiert. Die in Phagenköpfe verpackte DNA befand sich nun im Überstand und konnte bei 4 °C bis zu 4 Wochen aufgehoben werden.

Für die Infektion mit den durch den „Gigapack® III Gold Packaging Extract” (Fa. Stratagene) *in vitro* verpackten Ligationsansätzen wurden *E. coli* ECL707 oder *E. coli* BM25.8 eingesetzt. Zur Ausbildung des für die Transduktion notwendigen λ -Rezeptors wurden die Stämme in LB-Medium (s. 2.2.1) mit 0,2 % (w/v) Maltose und 10 mM MgSO_4 für 6 bis 8 h bei 37 °C oder für 12 h bei 30 °C angezogen. Das Pellet wurde in MgSO_4 -Lösung (10 mM) suspendiert und auf eine OD_{600} von 0,5 - 1,0 eingestellt. Diese Suspension wurde bei 4 °C gelagert und noch am gleichen Tag zur Transduktion eingesetzt.

Vom Verpackungsansatz wurden verschiedene Verdünnungen (z.B. 1:10, 1:50) in SM-Puffer hergestellt und jeweils 25 μl dieser Verdünnungen wurden mit 25 μl Empfängerzellen vermischt und 30 min bei RT inkubiert. Dann wurden jeweils 200 μl LB-Medium (s. 2.2.1) hinzugefügt und zur Ausbildung der entsprechenden Antibiotikaresistenz erfolgte eine Inkubation für 1 h bei 37 °C. Anschließend wurden die Ansätze 1 min zentrifugiert und der Überstand abgenommen. Die sedimentierten Zellen wurden dann in 50 μl LB-Medium suspendiert und auf Agarplatten mit entsprechendem Antibiotikum ausplattiert.

SM-Puffer

NaCl	5,8	g
$\text{MgSO}_4 \times 7 \text{ H}_2\text{O}$	2,0	g
Tris (1 M)	50,0	ml
Gelatine (2%, (w/v))	5,0	ml
$\text{H}_2\text{O}_{\text{dest.}}$	ad 1000	ml
pH 7,5		

2.10.4 Der X-Gal-Test zur Selektion rekombinanter Klone

Bei Klonierungen ist es entscheidend, Klone, die nach Übertragung von DNA nur den Vektor enthalten, von denjenigen die ein Plasmid mit Insert tragen, zu unterscheiden.

Aus diesem Grund wurde ein zusätzliches Screeningsystem neben der plasmidkodierte Antibiotikaresistenz benutzt. Plasmide der pBluescript-Reihe enthalten neben dem Promotor- und Operator-Bereich des *lac*-Operons auch das 5'-Ende des *lacZ*-Genes (VIEIRA und MESSING, 1982). Dieses kodiert für das sogenannte α -Peptid, welches die inaktive β -Galaktosidase von Wirtsstämmen wie *E. coli* DH5 α komplementieren kann. Da sich die multiple Klonierungsstelle der verwendeten Vektoren innerhalb des aminoterminalen Bereichs des *lacZ*-Gens befindet, ist eine α -Komplementation nur möglich, wenn das Plasmid kein Insert besitzt. Der Nachweis der aktiven β -Galaktosidase auf Agarplatten erfolgte durch Zugabe des Induktors IPTG (Isopropyl- β -thiogalaktopyranosid) und des Substrats X-Gal (5-Brom-4-chlor-indoyl- β -D-galaktosid), welches durch das Enzym gespalten wurde. Dabei entstand in Anwesenheit von Sauerstoff der blaue Farbstoff 5-Brom-4-chlor-indigo, welcher der Indikator für rekombinante *E. coli*-Stämme ist, die ein Plasmid ohne Insert tragen.

2.10.5 Screening auf die Verwertung von C2-C4-Polyolen

Die Überprüfung rekombinanter *E. coli*-Stämme auf die Verwertung von C2-C4-Polyolen wurde auf Carbonyl-Indikator-Medium (s. 2.2.5) durchgeführt. Als Basismedium diente hierbei LB-Medium (s.2.2.1), welches das Wachstum aller *E. coli*-Klone erlaubt. Zusätzlich enthielt es das zu testende Substrat (Glycerin, 1,2-Propandiol, Ethylenglykol oder 2,3-Butandiol; 1%ig) sowie den Farbstoff Pararosanilin und Na-bisulfit. Der Farbstoff bildete zusammen mit dem Na-bisulfit ein Schiff'sches Reagenz, das farblos ist. Wurden nun bei der Substrat-Verwertung Aldehyde bzw. Ketone gebildet, kam es zur Ausbildung einer Schiff'schen Base, die intensiv rot gefärbt war. Daher wiesen Kolonien von zur Polyol-Verwertung befähigten *E. coli*-Klonen in diesem Medium eine rote Farbe auf und färbten auch den Agar rot an.; alle anderen Klone blieben hell.

Für das Screening wurde als Wirtstamm die Glycerin-negative *E. coli*-Mutante ECL707 verwendet. Nach der Transformation von rekombinanten Plasmiden wurde auf den Indikatorplatten ausplattiert und für 16 bis 72 h bei 30 oder 37 °C inkubiert.

Abbildung 7: Testprinzip der Aldehyd/Keton-Indikatorplatten.

2.11 DNA-DNA-Hybridisierung

2.11.1 Vorbereitung von Nylonmembranen für Koloniehybridisierungen

Zur Analyse einer großen Anzahl rekombinanter Klone in Hybridisierungsexperimenten dienten runde Nylonmembranen mit 8,2 cm Durchmesser (HybondTM-N, Fa. Amersham Pharmacia).

Bis zu 100 Klone wurden auf eine „Masterplatte“ mit entsprechendem Antibiotikum übertragen. Nach ca. 20 bis 30 h Inkubation bei 37 °C wurde die Membran aufgelegt, leicht angedrückt und wieder abgezogen, um so das Zellmaterial zu übertragen. Alternativ dazu wurden die Kolonien direkt (ohne Ausstrich) auf die Nylonmembranen übertragen.

Anschließend wurde die Nylonmembran mit dem Impfmateriel nach oben für 2 min auf Filterpapier (Whatman 3MM) gelegt, das mit 2-fachem SSC-Puffer und 5 % SDS (w/v) getränkt war und anschließend für 2,5 min bei 600 W im Mikrowellenherd gebacken. Die auf diese Weise für die Hybridisierung vorbereitete Membran wurden anschließend mit 5-fachem SSC-Puffer und 0,1 % SDS (w/v) 1 h gewaschen und getrocknet und konnten so bis zu 2 Wochen bei RT aufbewahrt werden.

2.11.2 Southern-Blot (SOUTHERN, 1975)

In Agarosegelen aufgetrennte DNA wurde durch Kapillarblotting auf Nylonmembranen (Hybond-XL, Fa. Amersham Pharmacia) übertragen. Dabei wurde Transferpuffer durch das Gel gesaugt, um die DNA auf der darüberliegenden Membran zu fixieren.

Die zu analysierende DNA wurde im Standard-Agarosegel (Volumen 100 ml) aufgetrennt, im Ethidiumbromidbad gefärbt, gewässert und zusammen mit einem Lineal fotografiert. Anschließend wurde das Gel für 10 min in 0,25 M HCl inkubiert, was zu Strangbrüchen in der DNA führt, die den Transfer auf die Membran erleichtern. Dann wurde es für 30 min in Denaturierungslösung (0,4 M NaOH, 0,6 M NaCl) und nochmals 30 min in Neutralisierungslösung (1,5 M NaCl, 0,5 M Tris, pH7,5) geschwenkt. Eine Nylonmembran wurde in Gelgröße zugeschnitten, mit H₂O_{dest.} angefeuchtet und für mindestens 10 min in 10x SSC-Puffer (s. 2.5.1) äquilibriert. Die Blottingkammer eigener Bauart wurde mit 10x-SSC-Puffer gefüllt. In der Mitte der Kammer wurden wie folgt übereinander gelegt:

- ⇒ 3 Lagen Filterpapier (Whatman 3MM), welches in Kontakt mit dem Transferpuffer stand
- ⇒ das Agarosegel mit der Unterseite nach oben
- ⇒ die äquilibrierte Nylonmembran
- ⇒ bis 6 Lagen Filterpapier (Whatman 3MM)
- ⇒ ein ca. 10 cm hoher Stapel Papierhandtücher
- ⇒ ein Gewicht (ca. 200 bis 500 g)

Der Transfer der DNA auf die Nylonmembran benötigt etwa 16 bis 24 h. Um eine vollständige Denaturierung der immobilisierten DNA für die Hybridisierung zu gewährleisten, wurde die Membran für 60 s in 0,4 M NaOH geschwenkt. Nach der Neutralisierung in 2x SSC und 0,2 M Tris (pH 7,5) für 2 min wurde die Nylonmembran bei RT getrocknet. Die auf diese Weise immobilisierte DNA konnte für Hybridisierungen eingesetzt werden.

2.11.3 Dot-Blot

Für die Herstellung von Dot-Blots wurden die DNA-Proben direkt auf eine Nylonmembran getropft und an der Luft getrocknet. Anschließend wurde die Membran

für wenige Minuten auf einem mit 2x SSC, 5% SDS (w/v) getränkten Filterpapier inkubiert. Das Fixieren der DNA erfolgte in der Mikrowelle bei 600 W für 2,5 min. Nach Waschen der Membran in 5x SSC, 0,1% SDS (w/v) für 5 min konnte sie für Hybridisierungen eingesetzt werden.

2.11.4 Hybridisierung mit radioaktiv-markierten Sonden

Auf Nylonmembranen fixierte DNA wurde mit radioaktiv-markierten DNA-Fragmenten (s. 2.8.4) hybridisiert. Vor der Hybridisierung war eine Prähybridisierung notwendig, um unspezifische Bindungsstellen für die DNA-Sonde auf den Nylonmembranen abzusättigen. Hierzu wurden die Membranen in speziellen Hybridisierungsröhrchen (Fa. Ochs, Göttingen) mit 10 ml Prähybridisierungsmix versetzt und 1 bis 4 h in einem Hybridisierungssofen (OV 10, Fa. Biometra, Göttingen) bei 60 °C prähybridisiert.

Für die Hybridisierung wurde die radioaktiv-markierte Sonde, die zuvor für 10 min bei 95 °C denaturiert und anschließend 5 min auf Eis gehalten wurde, zugegeben. Die Membranen wurden dann für 12 bis 16 h bei 60 °C (homologe Sonde) bzw. bei 45 °C (heterologe Sonde) inkubiert.

Nach erfolgter Hybridisierung schlossen sich je nach Bedingungen unterschiedlich stringente Waschschrte an. Bei Einsatz von homologen Sonden wurde wegen der zu erwartenden starken Signale grundsätzlich zweimal für je 5 min in 2-fachem SSC-Puffer (s. 2.5.1), anschließend zweimal für je 30 min in 2-fachem SSC-Puffer mit 1 % (w/v) SDS bei 60 °C gewaschen.

Nach Abschluß der Waschprozeduren wurden die Membranen in Haushaltsfolie eingeschweißt. Die Autoradiographie erfolgte mit Hilfe von Autoradiographiekassetten (Storage Phosphor Screen GP, Fa. Kodak, Stuttgart) und eines Phosphoimagers (Storm 860, Fa. Molecular Dynamics GmbH, Krefeld). Zur Quantifizierung wurde das Programm Image Quant für Macintosh Version 1.2 (Fa. Molecular Dynamics GmbH, Krefeld) verwendet.

Prähybridisierungsmix

Dextransulfat (50 % , w/v)	2	ml
0,5 M Tris	1	ml
5 M NaCl	2	ml
SDS-Lösung (10 % , w/v)	2	ml
H ₂ O _{dest.}	ad 10	ml
pH 7,5		

2.12 Polymerase-Kettenreaktion (PCR)

Die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) wurde zur Herstellung spezifischer DNA-Fragmente für Klonierungen verwendet. Als Enzyme wurden die Taq-DNA-Polymerase (Fa. MBI Fermentas), die Platinum-*Pfx*-DNA-Polymerase (Fa. Invitrogen GmbH), die Deep-Vent-DNA-Polymerase (Fa. New England Biolabs GmbH, Freiburg) und die Herculase Enhanced DNA Polymerase (Fa. Stratagene) eingesetzt. Die Reaktionen wurden entsprechend den Herstellerempfehlungen in einem Volumen von 50 bzw. 100 µl durchgeführt und enthielten folgende Bestandteile:

DNA	0,5 - 1	µg
Oligonukleotide	je 100	pmol
dNTP-Gemisch	200	µM
DNA Polymerase	1	U
Reaktionspuffer (10x)	10	µl
MgCl ₂ oder MgSO ₄	1,5	mM
H ₂ O _{dest.}	ad 100	µl

Die Temperaturzyklen wurden den jeweiligen Anforderungen in Bezug auf die Hybridisierungstemperatur (x) und die Dauer der Kettenverlängerung (y) angepaßt. Sie wurden nach folgendem Schema durchgeführt:

Denaturierung	95 °C	2 min
<u>30 Zyklen</u>		
Denaturierung	95 °C	1 min
Hybridisierung	x°C	1 min
Kettenverlängerung	68, 72 o. 75 °C	y min
<u>Ende der Zyklen</u>		
Kettenverlängerung	68, 72 o. 75 °C	10 min

Für die Einstellung der Parameter waren die zu erwartende Fragmentlänge und die Schmelztemperatur T_m der verwendeten Oligonukleotide entscheidend. Für die Hybridisierung wurde entsprechend der zu erwartenden Fragmentlänge eine Zeit von ca. 1 min/1000 Bp gewählt. Die optimale Hybridisierungstemperatur wurde nach der Schmelztemperatur T_m der Oligonukleotide festgelegt, die über folgende Formel errechnet wurde:

$$T_m = 69,3 + 0,41 (\% \text{ GC-Gehalt}) - 650/L$$

L = Länge des Oligonukleotids

% GC-Gehalt = prozentualer GC-Gehalt des Oligonukleotids

Durch Verkürzung der Hybridisierungsdauer, Verringerung der Oligonukleotidkonzentration und Variation der $MgCl_2$ -Konzentration konnte die Spezifität der PCR optimiert werden.

Die Temperaturzyklen wurden mit einem Primus-Cycler (Fa. MWG AG-Biotech, München) oder dem „Mastercycler Gradient“ (Fa. Eppendorf, Hamburg) durchgeführt. Die PCR-Produkte wurden durch Agarose-Gelelektrophorese (s.2.7.1) analysiert.

2.12.1 Reaktionsbedingungen der „Megaprime“-PCR

Zur Komplettierung der unvollständig klonierten Dehydratase-Genregionen wurden sog. Megaprime-PCR-Reaktionen durchgeführt. Mit Hilfe dieser Technik lassen sich überlappende DNA-Fragmente von einer Größe von mehr als 1000 Bp zusammensetzen (BARIK und GALINSKY, 1997). Die Amplifikation der Einzelfragmente und die anschließende Zusammensetzung in einer weiteren PCR-Reaktion wurden unter den in Tabelle 5 aufgeführten Bedingungen durchgeführt.

Tabelle 5: Verwendete Oligonukleotide und Bedingungen der PCR-Reaktionen zur Komplementation der Dehydratasen von pAK3 bis und 5 sowie zur Subklonierung der Dehydratase-Gene aus pAK2 und pAK7

Die Sequenzen aller Oligonukleotide sind in Tab. 3 (s. 2.1) aufgeführt. Alle PCR-Reaktionen wurden mit 30 Zyklen durchgeführt.

Dehydratase aus:	Primer	DNA-Matrize	Annealing	Kettenverlängerung	Größe des Produktes
pAK2	pAK2-1 pAK2-2	pAK2	60 °C 1:00 min	68 °C 2:40 min	2699 Bp
pAK3	pAK3-1 pAK3-2	pAK3	60 °C ± 5 °C 1:00 min	68 °C 1:30 min	1596 Bp
	CF-1 CF-2	pGEX2T/dhaB	60 °C ± 5 °C 1:00 min	68 °C 1:10 min	1130 Bp
	pAK3-2 CF-1	Produkte aus vorherigen Reaktionen	48 °C ± 10 °C 1:00 min	72 °C 2:40 min	2699 Bp
pAK4	pAK4-1 pAK4-2	pAK4	62 °C ± 5 °C 1:00 min	68 °C 1:40 min	1644 Bp
	ST/KO-1 KO-3	chr. DNA <i>K. oxytoca</i>	59 °C ± 5 °C 1:00 min	68 °C 1:00 min	1064 Bp
	ST/KO-1 pAK4-2	Produkte aus vorherigen Reaktionen	50 °C ± 10 °C 1:00 min	72 °C 2:50 min	2690 Bp
pAK5	pAK5-1 pAK5-2	pAK5	60 °C ± 5 °C 1:00 min	68 °C 1:10 min	1189 Bp
	ST/KO-1 ST-3	chr. DNA <i>S. typhimurium</i>	60 °C ± 5 °C 1:00 min	68 °C 1: 40 min	1725 Bp
	ST/KO-1 pAK5-2	Produkte aus vorherigen Reaktionen	50 °C ± 10 °C 1:00 min	72 °C 3:00 min	2884 Bp
pAK7	pAK7-1 pAK7-2	pAK7	60 °C ± 5 °C 1:00 min	68 °C 2:40 min	2699 Bp

2.13 Sequenzierung und Analyse von Sequenzdaten

Die Isolierung der zu sequenzierenden Plasmide erfolgte unter Verwendung des „WizardTM Plus Miniprep DNA Purification Systems“ (s. 2.6.5.3) bzw. des „QIAprep Spin Miniprep Kits“ (s. 2.6.5.4). Die Sequenzierungen wurde durch das „Göttingen

Genomics Laboratory“ (Institut für Mikrobiologie und Genetik, Universität Göttingen) am ABI PRISM 337 DNA-Sequencer durchgeführt.

Die Auswertung der Sequenzdaten erfolgte mit den Programmen ABI Edit View 1.0.1, DNA-Strider 1.2 (MARCK, 1988) und DNAid 1.8 auf einem Macintosh PowerPC (Fa. Apple Computer Inc., Cupertino, USA). Hiermit konnten offene Leserahmen gefunden, Restriktionskarten erstellt und die Kodon-Nutzung ermittelt werden. Ferner konnten mit diesen Programmen Proteinsequenzen abgeleitet und auf hydrophobe und hydrophile Eigenschaften untersucht werden. Weitergehende Analysen wurden mit dem GCG-Paket („Wisconsin Genetics Computer Group Sequence Analysis Software Package“), Version 8.0 (University of Wisconsin Biotechnology Center, Madison, USA; DEVEREUX et al., 1984) über einen UNIX-Computer (GWDG, Göttingen) und dem im Internet angebotenen Service der NCBI (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov>) durchgeführt. Dazu zählte der Sequenzabgleich mit Daten der PIR-, NBRF-, SWISSPROT-, EMBL- und GenBank-Datenbanken (PEARSON und LIPMAN, 1988).

2.14 Herstellung von Rohextrakten

2.14.1 Zellaufschluss mit der Frenchpresse

Für die Herstellung von Rohextrakten mit der Frenchpresse wurde von einem Kulturvolumen mit mindestens 25 ml ausgegangen. Zunächst wurden die Zellen durch Zentrifugation (6000 Upm, 10 min, 4 °C, GS3-Rotor, Sorvall RC-5B-Zentrifuge, Fa. Du Pont de Nemours GmbH) geerntet und das Pellet in einem geeigneten Puffer aufgenommen. Die Zellsuspension wurde dann in eine vorgekühlte French-Press-Apparatur (Fa. SLM Aminco, Urbana, USA) gefüllt. Der Aufschluß der Zellen fand bei einem Druck von 140 Mpa statt. Der Vorgang wurde zweimal wiederholt, wobei vor dem ersten Mal eine Spatelspitze DNase I (Fa. Boehringer, Mannheim) zugegeben wurde. Anschließend erfolgte eine Zentrifugation bei 15000 Upm und 4 °C für 30 min (SS34-Rotor, Sorvall RC-5B-Zentrifuge, Fa. Du Pont de Nemours GmbH). Der erhaltene Extrakt wurde als Rohextrakt bezeichnet und konnte bis zur weiteren Verwendung bei –20 °C gelagert werden.

Sollten anaerobe Rohextrakte hergestellt werden, wurden alle Zentrifugenröhrchen 24 h vor dem Aufschluß in eine Anaerobenkammer (Microflow Anaerobic System, Fa.

Intermed M.D.H. GmbH, Rüsselsheim) eingeschleust. Vor dem Zellaufschluß wurde die Zellsuspension in der Anaerobenkammer in die vorgekühlte Frenchpresse geföhlt, die am Ausgang mit einem Isoversinic-Schlauch und einer Kanüle versehen war. Die Kanüle wurde in das Septum eines Hungate-Röhrehens eingeföhrt. Für eine Wiederholung des Preßvorgangs wurde die Suspension mit Hilfe des Stempels der Frenchpresse wieder aus dem Hungate-Röhrehen zurück in die Presse gezogen. Die Lagerung der nach der Zentrifugation erhaltenen Rohextrakte erfolgte bei $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ in Hungate-Röhrehen, die zuvor für mindestens 30 min mit N_2 begast wurden.

2.14.2 Zellaufschluss durch Ultraschallbehandlung

Zum Zellaufschluss durch Ultraschall wurden die geernteten Zellen (6000 Upm, 10 min, $4\text{ }^{\circ}\text{C}$, GS3-Rotor, Sorvall RC-5B-Zentrifuge, Fa. Du Pont de Nemours GmbH) zunächst in einem geeigneten Puffer aufgenommen. Das Gefäß mit der Zellsuspension wurde in die Halterung des Ultraschallgerätes (Ultraschallprozessor UP200S, Fa. Dr. Hielscher GmbH, Stahndorf) eingespannt. Um eine zu hohe Erwärmung der Zellsuspension zu vermeiden, wurde das Gefäß während der gesamten Prozedur durch ein Eisbad geköhlt. Es wurde viermal mit einer Amplitude von 80 Micron beschallt. Zwischen den Beschallungen wurde jeweils für eine halbe Minute pausiert. Nach der Ultraschallbehandlung wurde der Extrakt für 30 min bei 15000 Upm und bei $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ in einem SS34-Rotor (Sorvall RC-5B-Zentrifuge, Fa. Du Pont de Nemours GmbH) zentrifugiert, um intakte Zellen abzutrennen. Die erhaltenen Extrakte konnten bis zur weiteren Verwendung bei $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ gelagert werden.

2.15 Proteinbestimmung (BRADFORD,1976)

Die Bestimmung der Proteinkonzentration erfolgte in modifizierter Form nach der Methode von BRADFORD (1976).

Es wurden $20\text{ }\mu\text{l}$ einer Probe zu 1 ml Bradford-Reagenz gegeben. Wenn nötig, konnte die Probe mit $\text{H}_2\text{O}_{\text{dest.}}$ verdünnt werden. Nach einer Inkubation für 10 min bei RT wurde die Absorption bei einer Wellenlänge von 580 nm gegen einen Leerwert gemessen. Zur

Konzentrationsbestimmung wurde eine Eichgerade mit Rinderserumalbumin in einem Bereich von 0 bis 10 µg/ml aufgenommen.

Bradford-Reagenz

Serva Blau G-250	70	mg
Ethanol (96 %, v/v)	50	ml
H ₃ PO ₄ (85 %, v/v)	100	ml
H ₂ O _{dest.}	ad 1000	ml

Nach vollständigem Lösen des Farbstoffs in Ethanol und Zugabe der übrigen Bestandteile erfolgte eine Filtration durch einen Faltenfilter. Das Reagenz wurde lichtgeschützt gelagert und war ca. 1 Jahr haltbar.

2.16 Bestimmung von Enzymaktivitäten

Die Enzymaktivitäten wurden im Bereich der linearen Abhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit von der Proteinmenge bestimmt. Eine Enzymeinheit 1 U entspricht dabei dem Umsatz von 1 µmol Substrat pro Minute. Die Volumenaktivitäten [U/ml] wurden nach folgender Formel berechnet.

$$U/ml = \frac{\Delta E / \text{min} \times V}{\epsilon \times d \times v}$$

$\Delta E/\text{min}$ = Extinktionsänderung pro Minute

V = Volumen der Küvette [ml]

ϵ = Extinktionskoeffizient [$\text{ml} \times \mu\text{mol}^{-1} \times \text{cm}$]

d = Schichtdicke der Küvette [cm]

v = Volumen der eingesetzten Probe

Die spezifische Enzymaktivität [U/mg Protein] ergab sich aus der Division der Volumenaktivität [U/ml] durch die ermittelte Proteinkonzentration [mg/ml] (s. 2.15).

2.16.1 Glycerin-Dehydratase

2.16.1.1 Nach TORAYA et al. (1977)

Die Aktivität der Glycerin- bzw. Diol-Dehydratase wurde hierbei mit der 3-Methyl-2-benzothiazolinonhydrazon (MBTH)-Methode bestimmt. MBTH reagiert mit den Aldehyden, wie dem in der Enzymreaktion aus Glycerin entstandenen 3-Hydroxypropionaldehyd, zu einem Hydrazin-Derivat, welches spektrophotometrisch bei einer Wellenlänge von 305 nm erfaßt werden kann (PAZ et al., 1965).

<u>Testansatz:</u>	280 µl	38,5 mM K-PO ₄ -Puffer (38,5 mM KH ₂ PO ₄ /K ₂ HPO ₄ ; 55 mM KCl; pH 8)
	10 µl	Glycerin (3 M)
	10 µl	Coenzym B ₁₂ (0,45 mM)
Start mit:	10 µl	Probe
		1 min bei 37 °C inkubieren
Stop mit:	300 µl	K-Citrat (0,1 M; pH 3,6)
	500 µl	MBTH (0,1 %)
		30 min bei 37 °C inkubieren

Messung der Extinktion bei 305 nm (Extinktionskoeffizient $\epsilon = 13,3 \times 10^3 \text{ M}^{-1} \times \text{cm}$). Sämtliche Puffer- und Substratlösungen wurden anaerob hergestellt. Für den Test wurden 1,5 ml-Küvetten eingesetzt, die mit einem Septum versehen und für 15 min mit Stickstoff begast worden waren.

Nach Zugabe einer frisch hergestellten anaeroben Coenzym B₁₂-Lösung und 5 min Vorinkubation im Dunkeln bei 37 °C erfolgte der Reaktionsstart. Für jede Probe wurden Parallelansätze gegen einen Leerwert (Reaktionszeit = 0) gemessen.

2.16.1.2 Nach CHASE (persönliche Mitteilung)

Die Aktivität der Glycerin- und Diol-Dehydratasen wird in diesem Test ebenfalls durch die Reaktion von MBTH mit den entstandenen Aldehyden gemessen. Das entstehende

Hydrazin-Derivat reagiert mit Fe(III) und es kommt zu einer Blaufärbung der Reaktionslösung die bei einer OD von 670 nm verfolgt werden kann.

Testsansatz: 100 µl HEPES-Puffer (80 mM HEPES/KOH; pH 8,2)

60 µl Probe

20 µl Coenzym B₁₂ (120 µM)

Start mit: 20 µl Substrat (1,2-Propandiol oder Glycerin, 1M)

⇒ Inkubation bei 37 °C für 1 min

Stop mit: 100 µl MBTH (6 mg/ml in Glycin/HCl-Puffer; 375 mM, pH 2,7)

⇒ Inkubation für 3 min bei 100 °C (Wasserbad oder Heizblock)

⇒ kurzes Abkühlen auf Eis

Zugabe von: 1000 µl FeCl₃ x 6 H₂O (3,3 mg/ml H₂O; jeweils frisch ansetzen)

Nach einer weiteren Inkubation von 15 min bei RT konnte die Extinktion bei 670 nm bestimmt werden (Extinktionskoeffizient $\epsilon = 5,23 \times 10^3 \text{ M}^{-1} \times \text{cm}$). Die Verdünnung der Proben, um eine OD₆₇₀ <1,0 zu erreichen, erfolgte mit H₂O.

Jede Probe wurde parallel gegen einen Leerwert (ohne Coenzym B₁₂) gemessen. Alle Reaktionsschritte wurden unter aeroben Bedingungen durchgeführt.

2.16.2 Alkohol-Dehydrogenase (RUCH et al., 1974; BOENIGK et al., 1991)

Die Aktivität der Alkohol-Dehydrogenasen wurde in Oxidationsrichtung bei Raumtemperatur über die Extinktionsänderung bei 365 nm aufgrund der NAD⁺-Reduktion bestimmt.

Testansatz: 870 – 970 µl K₂CO₃-Puffer (0,1M K₂CO₃, 30 mM (NH₄)₂SO₄; pH 9,0)

10 µl NAD⁺ oder NADP⁺ (180 mM)

10 – 100 µl Probe

Start mit: 20 µl Substrat (5 M)

Das Gesamtvolumen des Testansatzes betrug immer 1 ml.

Zur Feststellung ob die identifizierten Alkohol-Dehydrogenasen auch in der Lage sind die Reduktion von Aldehyden/Ketonen zu Alkoholen zu katalysieren, wurden verschiedenen Aldehyde und Ketone als Substrate eingesetzt. Die Oxidation von NADH wurde photometrisch bei 365 nm in einer Plastikkuvette (d=1) verfolgt.

<u>Testansatz:</u>	950 µl	Triethanolamin-Puffer (0,1 M, pH7,5)
	15 µl	NADH (24,5 mM in 0,6 M NaHCO ₃)
	10 µl	Probe
Start mit:	10 µl	Aldehyd/Keton (1 M)

2.17 Methoden zur Proteinanreicherung

2.17.1 Metall-Chelat-Affinitätschromatographie

Das Prinzip der Metall-Chelat-Affinitätschromatographie beruht auf der Fähigkeit bestimmter Aminosäuren z. B. Histidin als Elektronendonator, an Proteinoberflächen zu fungieren und so an Metallionen wie Ni²⁺ und Cu²⁺ zu binden (HOCHULI et al., 1988; YIP et al., 1989). Die Metallionen wiederum sind über Chelatgruppen an ein Trägermaterial (Agarose oder Sepharose) gebunden.

Die Metall-Chelat-Chromatographie besitzt im neutralen pH-Bereich ihre größte Spezifität und Effizienz. Die Elution der Proteine findet unter Verwendung eines Imidazolgradienten statt. Imidazol führt zu einer kompetitiven Verdrängung des Histidins. Alternativ kann eine Elution durch einen pH-Gradienten erfolgen.

2.17.1.1 Vorbereitung der Säule

Für die Metall-Chelat-Chromatographie wurde Ni²⁺-Nitrilotriessigsäure-Agarose (NTA-Agarose; Fa. Qiagen GmbH) verwendet. Nach dem Einsetzen der unteren Fritte wurden 4 - 6 ml Ni²⁺-NTA-Agarose in eine PD 10-Säule (Fa. Amersham Pharmacia, Freiburg) eingefüllt. Nach der Sedimentation des Trägermaterials wurde die Säule mit dem Zellaufschlußpuffer gespült und bei 4 °C aufbewahrt.

2.17.1.2 Reinigung löslicher Proteine unter nativen Bedingungen

Zur Reinigung löslicher Proteine unter nativen Bedingungen wurde der Rohextrakt mit der Ni^{2+} -NTA-Agarose, die mit Zellaufschlußpuffer äquilibriert worden war, unter Rühren bei 4 °C für 1 h inkubiert. Nach dieser Inkubation wurde die Lösung in den Säulenkörper einer PD-10 Säule gefüllt. Nach dem Absetzen der Agarose wurde diese zunächst mit einem geeigneten Volumen Zellaufschlußpuffer gewaschen. Es folgte ein weiterer Waschschrift mit Puffer I. Die Elution der Proteine erfolgte in mehreren Schritten mit Puffer II.

Vor einer erneuten Verwendung der Säule wurde das Chromatographiematerial mit Puffer II gespült und dann mit dem Zellaufschlußpuffer äquilibriert.

Zellaufschlußpuffer

KH_2PO_4	50	mM
NaCl	300	mM
Imidazol	10	mM
pH 8,0		

Puffer I

KH_2PO_4	50	mM
NaCl	300	mM
Imidazol	20	mM
pH 8,0		

Puffer II

KH_2PO_4	50	mM
NaCl	300	mM
Imidazol	250	mM
pH 8,0		

2.17.1.3 Regeneration der Säule

Die Notwendigkeit einer Regeneration der Ni^{2+} -NTA-Agarose wurde durch eine Farbänderung von grün-blau nach bräunlich-grau angezeigt. Durch das chelatierende Agens EDTA erfolgte die Elution des Nickels von der Säule. Nach einer anschließenden Wiederbeladung mit Ni^{2+} -Ionen stand das Säulenmaterial erneut für mehrere Reinigungszyklen zur Verfügung. Die Regeneration des Säulenmaterials erfolgte anhand des Herstellerprotokolls.

2.17.2 Entsalzen von Proteinlösungen

Für die Entsalzung von Proteinlösungen wurden PD10-Säulen (Fa. Amersham Pharmacia) verwendet. Das Prinzip beruht auf einer Gelfiltration an Sephadex G-25. Das Säulenmaterial musste vor Benutzung mit 25 ml des für die Elution verwendeten Puffers äquilibriert werden. Es konnten pro Lauf maximal 2,5 ml Probe aufgetragen werden, anschließend wurde mit 3,5 ml eluiert.

2.18 Inaktivierung der Glycerin- und Diol-Dehydratasen

Die Inaktivierung der Dehydratasen durch Glycerin erfolgte durch Inkubation des Enzyms mit 50 μ M Coenzym B₁₂ bei 37 °C für 30 min in 2,5 ml HEPES-Puffer (s. 2.16.1.2) und 30 % Glycerin unter aeroben Bedingungen. Glycerin und ungebundene B₁₂-Derivate wurden mittels einer Gelfiltration abgetrennt (s. 2.17.2).

2.19 Polyacrylamid-Gelelektrophorese (PAGE)

Polyacrylamid-Gelelektrophoresen unter denaturierenden und nicht denaturierenden Bedingungen wurden in Minigel-Elektrophorese-Kammern (Fa. Bio-Rad, München) mit 8,5 x 8,0 x 0,1 cm Glasplatten durchgeführt.

2.19.1 SDS-PAGE nach SCHÄGGER und VON JAGOW (1987)

Trenn- und Sammelgel hatten folgende Zusammensetzung (Menge für 2 Gele):

		<u>12,5%ig</u>	<u>15%ig</u>
<u>Trenngel:</u>	Gelpuffer	3 ml	3 ml
	Acrylamidlösung	2,25 ml	2,7 ml
	H ₂ O _{dest.}	3,75 ml	3,3 ml
	APS-Lösung	45 μ l	45 μ l
	TEMED	4,5 μ l	4,5 μ l

<u>Sammelgel:</u>	Gelpuffer	1,13	ml	1,13	ml
	Acrylamidlösung	375	µl	375	µl
	H ₂ O _{dest.}	3	ml	3	ml
	APS-Lösung	45	µl	45	µl
	TEMED	4,5	µl	4,5	µl

Zunächst wurden Acrylamidlösung, Gelpuffer und H₂O_{dest.} gemischt. Nach der Zugabe von TEMED und APS-Lösung wurde das Gel gegossen und mit H₂O_{dest.} überschichtet, um eine ebene Fläche zu erhalten. Nach Polymerisation des Trenngels (ca. 30 min) konnte das H₂O_{dest.} abgenommen und das Sammelgel gegossen werden, in das zur Formung von Geltaschen ein Kamm luftblasenfrei eingesetzt wurde. Nach 30 min war das Gel vollständig polymerisiert und konnte verwendet werden.

Die Proben wurden vor dem Auftragen im Verhältnis 1:3 mit Denaturierungspuffer gemischt. Anschließend wurden die Proben auf das mit Elektrophoresepuffer überschichtete Gel mit Hilfe einer Hamiltonspritze aufgetragen. Die Elektrophorese erfolgte zunächst bei einer Spannung von 100 V, bis die blaue Markerbande das Trenngel erreicht hatte, und wurde dann auf 130 V erhöht. Als Netzgerät diente ein Gene-Power-Supply GPS 200/400 (Fa. Amersham Pharmacia). Die Elektrophorese wurde beendet wenn die Markerbande das Gelende erreicht hatte.

Acrylamidlösung

Acrylamid	96	g
Bisacrylamid	3	g
H ₂ O _{dest.}	ad 200	ml

Gelpuffer

Tris	181,7	g
SDS	1,5	g
H ₂ O _{dest.}	ad 500	ml
pH 8,4		

Kathodenpuffer

Tris	12,1	g
Tricin	17,9	g
SDS	1	g
H ₂ O _{dest.}	ad 1000	ml
pH 8,5		

Anodenpuffer

Tris	24,2	g
H ₂ O _{dest.}	ad 1000	ml
pH 8,9		

<u>Denaturierungspuffer</u>			<u>APS-Lösung</u>		
Tris	0,2	g	Ammoniumpersulfat	0,1	g
SDS	1,2	g	H ₂ O _{dest.}	ad 1	ml
Serva-Blau G250	3	mg			
Glycerin	3	ml			
2-Mercaptoethanol	0,5	ml			
H ₂ O _{dest.}	ad 10	ml			
pH 6,8					

2.19.2 Native Gradienten-PAGE

Für ein Gradientengel von 4 bis 20 % wurden Polyacrylamidlösungen folgender Zusammensetzung verwendet:

„Leichte“ Lösung

Acrylamid	4,0	g
Bisacrylamid	0,2	g
Gelpuffer	ad 100	ml

Die Lösung wurde lichtgeschützt bei 4 °C gelagert.

„Schwere“ Lösung

Acrylamid	20,0	g
Bisacrylamid	1,0	g
Glycerin (87 % [v/v])	8,6	ml
Gelpuffer	ad 100	ml

Die Lösung wurde lichtgeschützt bei 4 °C gelagert.

Für das Trenngel von 4 bis 20 % (w/v) wurden jeweils 2 ml „Leichte“ und „Schwere“ Lösung in die Kammern eines kleinen Gradientenmischers gefüllt und unter Rühren je 3 µl TEMED und 15 µl APS-Lösung (s. 0) in die einzelnen Kammern gegeben. Nach dem Öffnen des Gradientenmischers konnte die Acrylamidlösung mit Hilfe einer Peristaltikpumpe (Meredos GS, Fa. Meredos, Nörten-Hardenberg) zwischen die Glasplatten gegossen werden. Anschließend erfolgte die Überschichtung des Trenngels

2.20.2 Aktivitätsfärbung der Glycerin- und Diol-Dehydratasen (TOBIMATSU et al., 1995)

Die Aktivitätsfärbung der Glycerin- und Diol-Dehydratasen erfolgte entsprechend der für die 1,2-Propandiol-Dehydratase aus *Klebsiella oxytoca* entwickelten Methode von TOBIMATSU et al. (1995). Die Methode beruht darauf, daß das durch die Coenzym B₁₂-abhängige Dehydratisierung von 1,2-Propandiol gebildete Propionaldehyd mit dem Farbstoff 2,4-Dinitrophenylhydrazin ein gelbes Präzipitat bildet. Da Glycerin-Dehydratasen neben Glycerin ebenfalls 1,2-Propandiol dehydratisieren, konnte die Aktivitätsfärbung mit allen vorliegenden Enzymen durchgeführt werden.

Zur Identifizierung der Glycerin- und Diol-Dehydratasen in Rohextrakten, wurde eine native Gradienten-PAGE (s. 2.18.2) durchgeführt. Dabei wurde dem Elektrodenpuffer 1,2-Propandiol (Endkonzentration 100 mM) zugesetzt. Die Elektrophorese wurde durchgeführt, bis die Farbmarkerbande das Gelende erreicht hatte. Das Proteingel wurde dann in 100 ml Reaktionspuffer überführt und für 15 min bei 37 °C inkubiert. Anschließend wurde der Reaktionspuffer entfernt und 100 ml Färbelösung zugefügt. Während einer nachfolgenden 15-minütigen Inkubation bei 37 °C kam es zur Bildung des gelben Präzipitats. Anschließend wurde der Hintergrund durch Inkubation in 2 M HCl entfärbt. Alle Schritte der Aktivitätsfärbung wurden unter aeroben Bedingungen durchgeführt. Der Reaktionspuffer wurde jeweils frisch angesetzt; Coenzym B₁₂ im Dunkeln (unter N₂-Begasung) in H₂O gelöst und erst unmittelbar vor Reaktionsstart zugegeben.

Reaktionspuffer

K-Phosphat-Puffer (pH 8,0)	35 mM
KCl	50 mM
1,2-Propandiol	100 mM
Coenzym B ₁₂	15 µM

Färbelösung:

2,4-Dinitrophenylhydrazin 0,4 % (w/v in 2M HCl)

Die Färbelösung konnte mehrfach verwendet werden.

2.21 Molekularmassenbestimmung

2.21.1 Molekularmassenbestimmung durch SDS-PAGE

SDS lagert sich an Proteine an und zerstört fast alle nicht-kovalenten Wechselwirkungen, so daß die Dissoziation von Proteinen in ihre Untereinheiten erreicht wird. Durch die Bindung des negativ geladenen Detergens wird die Eigenladung der Proteine weitgehend vernachlässigbar und damit eine gelelektrophoretische Auftrennung ermöglicht, die nahezu ausschließlich auf der Masse der Moleküle beruht. Nach der SDS-PAGE und Färbung der Proteine konnte die Molekularmasse eines Proteins ermittelt werden, indem dessen Wanderungsgeschwindigkeit mit der von Markerproteinen verglichen wurde. Die Auftragung des Logarithmus der Molekularmassen der Markerproteine gegen den Rf-Wert (Wanderungsstrecke des Proteins bezogen auf die Wanderungsstrecke des Farbstoffmarkers) ergibt eine Eichgerade, anhand derer die Molekularmasse des jeweiligen Proteins berechnet werden konnte. Als Markerproteine wurden die Proteine des „LMW Calibration“-Kits (Fa. Amersham Pharmacia) eingesetzt.

Markerproteine „LMW Calibration“-Kit

Phosphorylase b	94	kDa
Rinderserumalbumin	67	kDa
Ovalbumin	45	kDa
Carboanhydrase	30	kDa
Trypsininhibitor	20,1	kDa
Laktalbumin	14,4	kDa

2.21.2 Molekularmassenbestimmung durch Gradienten-PAGE (ANDERSON et al., 1972; NISHIZAWA et al., 1988)

Die Auftrennung von Proteinen im nativen Polyacrylamid-Gradientengel (s.2.19.2) hängt in erster Linie von der Größe der Proteine ab. Mit steigender Acrylamidkonzentration nimmt die Porengröße ab und so wird das Weiterwandern von

größeren Proteinen verhindert. Die Eigenladung der Proteine ist hier theoretisch vernachlässigbar (MARGOLIS und KENRICK, 1967).

Nach Auftrennung durch native Gradienten-PAGE (s. 2.19.2) und Anfärben der Proteinbanden (s. 2.20.1) konnte die Molekularmasse von Proteinen ermittelt werden, indem die Wanderungstrecke mit der von Markerproteinen verglichen wurde. Als Markerproteine wurde der „HMW Calibration“-Kit (Fa. Amersham Pharmacia) eingesetzt.

Markerproteine „HMW Calibration“-Kit

Protein	Molekularmasse	RF-Wert
Thyroglobin	669 kDa	0,453
Ferritin	440 kDa	0,570
Katalase	232 kDa	0,651
Laktat-Dehydrogenase	140 kDa	0,714
Rinderserumalbumin	67 kDa	0,957

2.22 Chemikalien, Enzyme und Gase

Es wurden Chemikalien des handelsüblichen Reinheitsgrades der Firmen Boehringer (Mannheim), Fluka (Buchs, Schweiz), Merck (Darmstadt), Riedel de Haen (Hannover), Serva (Heidelberg) und Sigma (Taufkirchen) verwendet. Des Weiteren wurde mit Biochemikalien, Enzymen etc. folgender Firmen gearbeitet:

- Amersham Pharmacia, Freiburg:
Nylonmembranen, NAP-5-Säulen PD10-Säulen
- Biozym GmbH, Hess. Oldendorf
Elektroporationsküvetten
- Eurogentec, Seraing, Belgien:
Agarose
- Gerbu Biotechnik GmbH, Gaiberg:
IPTG, X-Gal, Ampicillin, Proteinase K
- Gibco BRL, Eggenstein:
Random Primed Labeling Kit

- Hartmann Analytic, Braunschweig:
[α -32P]-dATP
- Invitrogen, Carlsbad, CA, USA
pET Directional TOPO Expression Kit, TOPO TA Cloning Kit, Platinum *Pfx*-DNA-Polymerase
- MBI Fermentas GmbH, St. Leon-Rot:
Taq-DNA-Polymerase, T4-DNA-Ligase, Ladder-Mix, Nukleotide, Restriktionsendonukleasen
- Messer Griesheim GmbH, Kassel:
Gase (N_2 , H_2 , N_2/CO_2)
- Metabion, Martiensried
Oligonukleotide
- Millipore, Eschborn:
Mikrodialyse-Filter
- New-England Biolabs GmbH, Freiburg:
Restriktionsendonukleasen, Deep-Vent DNA Polymerase
- Promega, Deutschland GmbH, Mannheim:
WizardTM *Plus* Minipreps DNA Purification System, *Pfu*-DNA-Polymerase
- Qiagen GmbH, Hilden:
Plasmid Midi-Kit, QIAprep Spin Miniprep Kit, Qiaquick PCR-Purification-Kit; Qiaquick Gel Extraction Kit, RNA/DNA Maxi Kit
- Sartorius AG, Göttingen:
Sterilfilter
- Sigma Chemie GmbH, Deisenhofen:
Coenzym B_{12} , Cyano- B_{12} , Hydroxy- B_{12} , Methyl- B_{12}
- Stratagene, USA:
Gigapack® III Gold Packaging Extract, Herculanase enhanced DNA Polymerase
- Whatman, Maidstone, England:
Whatman-Filterpapier 3MM

3 EXPERIMENTE UND ERGEBNISSE

Die Charakterisierung und Nutzbarmachung der bisher weitgehend unerschlossenen mikrobiellen Diversität sind die Hauptziele der Metagenomforschung (RONDON et al., 2000). Diese nutzt die Gesamtheit der in einem Habitat, wie Boden oder Sediment, vorhandenen genetischen Information, einerseits als Quelle für neuartige Enzyme und Wirkstoffe und andererseits zur genomischen Charakterisierung von nicht-kultivierten Mikroorganismen. Daraus ergeben sich interessante Ansätze sowohl für die angewandte als auch für die Grundlagenforschung.

Systematische Untersuchungen verschiedener Standorte, bei denen universell konservierte Genmarker, meist die 16S rRNA Gene, mit Hilfe der PCR direkt aus isolierter Umwelt-DNA amplifiziert und sequenziert wurden, haben gezeigt, dass die bisher bekannten und systematisch erfaßten Organismen nur einen Bruchteil der tatsächlichen vorhandenen Anzahl ausmachen (MUYZER et al., 1992; BORNEMANN et al., 1996; BORNEMANN und TRIPLETT, 1997; SCHLEPER und ECK, 2000).

Eine notwendige Voraussetzung, um dieses enorme Potential an metabolischen und physiologischen Fähigkeiten zu erforschen und auch für die industrielle Nutzung zugänglich zu machen, war die Konstruktion von komplexen Genbanken aus Umweltproben. In einigen wenigen Untersuchungen konnten so Enzyme verschiedener Klassen identifiziert und charakterisiert werden. Dazu gehörten z.B. Lipasen/Esterasen (HENNE et al., 2000; RONDON et al., 2000), Na^+/H^+ -Antiporter (MAJERNIK et al., 2001) und antibakterielle Wirkstoffe (RONDON et al., 2000; OSBURNE et al., 2001; BRADY et al., 2001).

Im Rahmen dieser Arbeit werden Weiterentwicklungen zur Konstruktion und zur Durchmusterung von Metagenomgenbanken vorgestellt. Die DNA wurde nach Anreicherung mit verschiedenen C-Quellen nach der Methode der direkten Lyse aus den Umweltproben isoliert und gereinigt (ZHOU et al., 1996). Für die Konstruktion der Genbanken diente *Escherichia coli* als Wirtsorganismus und pBluescript SK⁺ als Vektor. Anschließend wurden die Genbanken auf das Vorhandensein von Genen für neuartige Glycerin- und Diol-Dehydratasen sowie für Alkohol-Oxidoreduktasen hin untersucht.

3.1 Konstruktion von Metagenombanken in *Escherichia coli*

Zur Identifizierung neuartiger, industriell interessanter Enzyme wurden in der vorliegenden Arbeit vier Metagenombanken aus Umweltproben erstellt. Des Weiteren konnten bereits zuvor in unserer Arbeitsgruppe konstruierte Genbanken aus natürlichen Habitaten für die verschiedenen Durchmusterungsverfahren verwendet werden (s. 3.3.3).

3.1.1 Isolierung von chromosomaler DNA aus verschiedenen Umweltproben

Für die Konstruktion der Metagenombanken wurden vier verschiedene Standorte ausgewählt. Es handelte sich dabei um eine Bodenprobe von einem Zuckerrübenfeld (ZR) in der Nähe von Göttingen und um drei unterschiedliche Sedimentproben aus dem Fluss Grone (GII) bei Göttingen, dem Solar Lake (SL; Sinai, Ägypten) und aus dem Golf von Eilat (GE; Israel) (s. Abb. 8).

Um den Mikroorganismen in den Boden- und Sedimentproben einen Wachstumsvorteil zu verschaffen, die die später identifizierten Zielgene für Glycerin- bzw. Diol-Dehydratasen und Polyol-Oxidoreduktasen (s. 3.2 und 3.3) enthielten, wurde vor der DNA-Isolierung ein Anreicherungsschritt durchgeführt. Diese Vorgehensweise war zuvor von ENTCHEVA et al. (2001) und HEALY et al. (1995) erfolgreich zur Isolierung von neuen Biotinbiosynthese- und Cellulase-Genen eingesetzt worden. Zu diesem Zweck wurden je 50 g der Standortproben mit 500 ml M9-Mineralmedium (s. 2.2.4) überschichtet, das je 50 mM Glycerin und 1,2-Propandiol als Kohlenstoffquellen enthielt. Das Gemisch wurde anschließend für 20 min mit N₂ durchgast und unter anaeroben Bedingungen bei 30° C inkubiert. Nach 24 Stunden wurden die Proben pelletiert, mit frischem Medium überschichtet und für einen weiteren Tag inkubiert. Anschließend wurden die Zellen zusammen mit der Boden- oder Sediment-Matrix geerntet und als Material für die DNA-Isolierung genutzt. Die Anreicherung der Polyol-verwertenden Organismen konnte zum einen durch eine leichte Trübung des Mediums als auch durch den gaschromatographischen Nachweis von erwarteten Produkten, wie 1,3-Propandiol verfolgt werden (Daten nicht gezeigt).

Abbildung 8: Ausgewählte Standorte zur Entnahme von Boden- und Sedimentproben

Dargestellt sind die Standorte Grone II (A), Solar Lake (B), Golf von Eilat (C) und ein Zuckerrübenfeld bei Göttingen (D).

Die Präparation der Roh-DNA erfolgte nach der Methode der direkten Lyse der Zellen von ZHOU et al. (1996). Mit dieser Methode kann sowohl die DNA aus den Bodenbakterien als auch frei vorliegende DNA isoliert werden. Der Zellaufschluß erfolgte dabei durch eine ausgedehnte Hitzeinkubation in einem Hochsalzextraktionspuffer in Anwesenheit von SDS, CTAB, EDTA und Proteinase K. Nach Abtrennung aller Boden- und Zellpartikel wurde die DNA mit Chloroform/Isoamylalkohol extrahiert und anschließend mit Isopropanol gefällt (s. 2.6.1). Bei dieser Methode der DNA-Isolierung wurden je nach Probenzusammensetzung unterschiedliche Mengen an Matrix-Bestandteilen, wie z.B. Huminsäuren, koextrahiert. Dies machte sich durch eine Braunfärbung der Präparation bemerkbar. Wie erwartet war der Anteil der isolierten Huminstoffe in der Bodenprobe am größten. Eine deutlich geringere Färbung zeigte sich bei der Roh-DNA aus dem Grone-Sediment. Die Präparationen aus Solar Lake- und Golf von Eilat-Sediment waren beinahe farblos.

Huminsäuren inhibieren Restriktionsenzyme, Polymerasen und Ligasen (TEBBE und VAHJEN, 1993), die Werkzeuge der nachfolgenden Genbank-Konstruktion. Mit Hilfe des „Wizard DNA Purification System“ und einer anschließenden Anionenaustauschchromatographie an Qiagen-tip-100-Säulen konnten sie jedoch weitgehend abgetrennt werden. Die DNA aus den Proben SL und GE wurde aufgrund der geringen Verunreinigungen lediglich durch Anionenaustauschchromatographie gereinigt.

Aus dem „angereicherten“ Standort-Material konnten auf diese Weise je g Probe zwischen 15 und 28 µg hochmolekulare, gereinigte DNA isoliert werden (s. Tab. 6), die nachfolgend für die Konstruktion von Metagenomgenbanken genutzt wurden.

Tabelle 6: DNA-Ausbeuten aus den verschiedenen Standorten nach Anreicherung von Polyol-fermentierenden Mikroorganismen
Die Bestimmung der DNA-Mengen erfolgte durch Abschätzen der Intensität von Banden im Agarosegel.

Standort/Bezeichnung	DNA-Menge [µg/ g Probe]
Zuckerrübenboden/ZR	28
Sediment Grone/GII	25
Sediment Golf von Eilat/GE	15
Sediment Solar-Lake/SL	15

3.1.2 Klonierung der Umwelt-DNA

Es wurde angestrebt DNA-Fragmente > 3 kBp zu klonieren. Die Gene der bisher bekannten B₁₂-abhängigen Glycerin- und Diol-Dehydratasen umfassen eine Region von 2,6 bis 2,9 kBp (DANIEL et al., 1998). Bei den Alkohol-Oxidoreduktase-Aktivität vermittelnden Genen handelt es sich um eine sehr viel heterogenere Gruppe. Die Längen einiger bisher untersuchter Gene liegen in einem Bereich von ca. 0,75 bis 1,8 kBp (REID und FEWSON, 1994).

Für die Konstruktion der Genbanken wurde der Vektor pBluescript SK⁺ ausgewählt. Dieser Plasmidvektor wird in *E. coli* in hoher Kopienzahl gebildet und eignet sich besonders für die Klonierung von DNA-Fragmenten bis zu einer Größe von 10 kBp. Die Selektion der Transformanten erfolgt durch die auf dem Vektor kodierte

Ampicillin-Resistenz, außerdem ermöglicht das ebenfalls vorhandene *lacZ*-Gen die Identifizierung von rekombinanten Plasmiden durch den X-Gal-Test (s. 2.10.4).

Die gereinigte Umwelt-DNA wurde zunächst zeitlimitiert mit dem Restriktionsenzym *Bsp*143I (ein Isoschizomer von *Sau*3AI) partiell verdaut (s. 2.8.1), um eine statistische Verteilung aller vorkommenden DNA-Fragmente zu gewährleisten. Der Verlauf der DNA-Spaltung wurde dabei in einem Zeitraum von 10 min durch 6 bis 8 Probennahmen und anschließender Analyse in Agarosegel (s. Abb. 9B) überprüft (s. 2.7.1). Um die Klonierung von sehr kleinen DNA-Fragmenten (< 1,0 kBp) zu verhindern, wurde die DNA in einer Saccharose-Dichtegradientenzentrifugation größenfraktioniert (s. 2.9). Nach der Zentrifugation erfolgte die Fällung der DNA und die Größe der DNA-Fragmente in den entnommenen Aliquots wurde überprüft (s. Abb. 9C). Fraktionen, die DNA-Fragmente mit einer Größe zwischen 2 und 15 kBp enthielten, wurden für die Ligation in den Plasmidvektor pBluescript SK⁺ verwendet. Nach der Transformation in *E. coli* DH5 α (s. 2.10.1) wurden die Transformanten auf LB-Ampicillin-Agar, der mit X-Gal und IPTG versetzt war, ausplattiert. Zur Konservierung der so erstellten Genbanken wurden alle Klone von den Platten abgeschwemmt, die Plasmide isoliert und bei -20 °C gelagert.

Abbildung 9: Isolierung von chromosomaler Standort-DNA zur Konstruktion von Metagenombanken

A) Spur 2: Unverdaute chromosomale DNA; B) Spuren 1-4 und 6-9: Proben partiell verdauter Standort-DNA in einem Zeitraum von 10 min (Restriktionsenzym *Bsp*143I); C) Spuren 2-9: DNA-Aliquots ausgewählter Fraktionen nach Saccharosedichtegradienten-Zentrifugation. In den Spuren A)1, B)5 und C)1 ist jeweils der Längenstandard aufgetragen.

Abbildung 10: Schematische Darstellung der Konstruktion von Metagenombanken in Plasmidvektoren

3.1.3 Charakterisierung der konstruierten Metagenombanken

Aus den vier verwendeten Boden- und Sedimentproben wurden Genbanken mit unterschiedlichen Eigenschaften gewonnen, die in Tabelle 7 zusammengefasst sind. Zur Charakterisierung wurden Parameter wie die Gesamtzahl der rekombinanten Plasmide, die durchschnittliche Inserthäufigkeit und die durchschnittliche Insertgröße bestimmt. Die Inserthäufigkeit konnte durch den X-Gal-Test (s. 2.10.4) ermittelt werden. Zur Analyse der Insertgrößen wurden je Genbank 30 *E. coli*-Klone in LB-Medium (s. 2.2.1) angezogen, die Plasmide isoliert und mittels Restriktionsverdau mit verschiedenen Enzymen untersucht. Dabei wurden neben der durchschnittlichen Insertgröße die Daten der jeweils kleinsten und größten gefundenen Inserts festgehalten (s. Tab. 7).

Die Gesamtzahl der abgeschwemmten, Insert-tragenden *E. coli*-Klone betrug 63200 für den Standort Golf von Eilat, 46700 für das Sediment der Grone. Für den Standort Zuckerrübenboden wurden 71050 und für die Anreicherungs-genbank aus dem Sediment des Solar Lake 37300 rekombinante Plasmide gezählt. Die ermittelten durchschnittlichen Insertgrößen lagen bei 3,3 bis 5,6 kBp, wobei Insert-Fragmente bis zu einer Größe von 12,8 kBp gefunden wurden. Der Anteil der Insert-tragenden Plasmide lag bei 60 bis 78 %.

Die Genbanken, die im Folgenden mit GEA (Golf von Eilat Anreicherung); GIIA (Grone II Anreicherung), ZRA (Zuckerrübenboden Anreicherung) und SLA (Solar Lake Anreicherung) bezeichnet werden, waren somit gut für die Durchmusterung auf das Vorhandensein unterschiedlicher Zielgene geeignet.

Tabelle 7: Zusammenfassung der Eigenschaften der Plasmid-Genbanken aus den Standortproben Golf von Eilat (GEA), Grone (GIIA), Zuckerrübenboden (ZRA) und Solar Lake (SLA)

Die Insertgrößen wurden durch Isolierung (s. 2.6.6.2) und Restriktionsverdau (s. 2.8.1) von 30 Plasmiden ermittelt. Die Bestimmung des Anteils der Insert-tragenden Plasmide erfolgte durch den X-Gal-Test (s. 2.10.4). Dazu wurde je Genbank 1 µl Plasmid-DNA in *E. coli* DH5α transformiert (s. 2.10.1) und die Transformanten wurden auf LB-Agar, der mit Ampicillin, X-Gal und IPTG versetzt war, ausplattiert.

Standort/ Bezeichnung der Genbank	Anzahl rekomb. Plasmide	minimale Insertgröße [kBp]	maximale Insertgröße [kBp]	Ø Insert- größe [kBp]	Insert- häufigkeit [%]
Golf von Eilat/ GEA	63200	2,1	12,8	5,6	60
Grone/ GIIA	46700	0,7	5,5	3,3	78
Solar Lake/ SLA	37300	0,7	12,4	4,0	66
Zuckerrübenfeld/ZRA	71050	1,0	11,1	5,4	71

3.2 Isolierung von RNA aus Umweltproben

Ein Lücke beim Screening der Metagenombanken ist, dass dabei keine Wirkstoffe und Biokatalysatoren eukaryotischer Herkunft erhalten werden, obwohl besonders niedere Pilze eine Reihe von ökonomisch bedeutenden Enzymen und biologisch aktiver Substanzen synthetisieren. Dazu gehören verschiedene Antibiotika sowie Lipasen und Proteasen, die in der Waschmittelindustrie eingesetzt werden. Zur Konstruktion von Metagenombanken wird bisher zumeist *E. coli* als Wirt verwendet, der jedoch nicht in der Lage ist, die eukaryotische DNA zu transkribieren und die gebildete RNA zu prozessieren. Eine mögliche Methode zur Umgehung dieses Problems ist die Isolierung intakter eukaryotischer Poly(A)-mRNA aus Umweltproben, Umschreibung in cDNA und die Konstruktion von cDNA-Genbanken. Die RNA/DNA-Rate ist außerdem ein wichtiger Indikator für den metabolischen Status der mikrobiellen Gemeinschaft eines Standortes (HURT et al., 2001). Da RNA nicht so stabil ist wie DNA, ist die Extraktion von intakter mRNA eine schwierige, technologische Herausforderung.

Mit der im Folgenden vorgestellten Methode konnten sowohl DNA als auch RNA parallel aus einer Probe isoliert werden. Sie wurde in Anlehnung an die Methode von

ZHOU et al. (1996) zur Isolierung von chromosomaler DNA aus Bodenproben entwickelt (s. Abb. 11).

Abbildung 11: Methode zur Isolierung von RNA und DNA aus Standort-Proben (HURT et al., 2001; modifiziert)

Zur Stabilisierung der RNA wurde der pH-Wert des Extraktionspuffers (DEP-Puffer, s. 2.6.1) auf 7,0 gesenkt und die Hitzeinkubation bei 65 °C auf 1 h verkürzt. Im Weiteren wurde zum Aufschluß der Zellen ein sogenannter „Freeze and Thaw“-Schritt eingefügt bei dem die Proben zunächst in flüssigem Stickstoff eingefroren und anschließend auf Eis wieder aufgetaut wurden. Die Trennung von RNA und DNA erfolgte an Anionenaustauscher-Säulen. Die beschriebene Methode wurde mit der Sedimentprobe aus der Grone (GII) sowie der Bodenprobe des Zuckerrübenfeldes (ZR) durchgeführt. Sowohl RNA als auch DNA ließen sich auf diese Weise isolieren (s. Abb. 12). Beide Lösungen zeigten jedoch die typische braune Verfärbung durch die die Koextraktion von Huminsäuren angezeigt ist. Die Bestimmung der optischen Dichte der Nukleinsäure-Lösungen bei 260 nm erbrachte Werte von 0,3 bzw. 2,1 mg isolierter RNA je 100 g eingesetzter Bodenprobe.

Abbildung 12: Isolierung von RNA und DNA aus Umweltproben

A) Spur 1: Koextrahierte DNA und RNA; B) Spur 1: Längenstandard, Spur 2: DNA nach Trennung über die Anionenaustauscher-Säule, Spur 3: RNA nach Trennung über die Anionenaustauscher-Säule.

Zur Überprüfung, ob in der isolierten RNA auch eukaryotische RNA vorhanden ist, wurde die Poly(A)-mRNA durch eine Chromatographie an Polystyren-Latex-Partikeln von den anderen RNA-Typen getrennt. Die Mehrheit der von Eukaryoten gebildeten mRNA besitzt ein solches Poly(A)-Segment, das zwischen 50 und 150 Nukleotide lang ist. Die Funktion dieser angehängten Nukleotide ist bisher unklar (KOZAK, 1983). Das Prinzip der Trennung der mRNA von anderen RNA-Typen beruht auf der Bindung des Poly(A)-Restes an ein dT-Oligomer, welches an eine solide Phase einer Säule gekoppelt ist. Durch photometrische Bestimmung der RNA-Menge bei einer Wellenlänge von 260 nm konnten geringe Mengen von Poly(A)-mRNA nachgewiesen werden (s. Tab. 8). Die Messungen ergaben eine Menge von 1,9 µg Poly(A)-mRNA je 100 g der Zuckerrübenfeldprobe. Im Eluat des Grone-Präparats konnte keine RNA mehr detektiert werden. Möglicherweise war die hier zur Reinigung der Poly(A)-mRNA eingesetzte Menge Gesamt-RNA zu gering.

Tabelle 8: RNA-Ausbeuten aus den Standorten Grone-Sediment (GII) und Zuckerrübenboden (ZR)

Die Bestimmung der RNA-Mengen erfolgt photometrisch bei einer Wellenlänge von 260 nm (s. 2.5.3.6). Die Mengenangaben beziehen sich auf je 100 g verwendeter Standortprobe.

Standort/Bezeichnung	Gesamt RNA-Menge [µg]	Anteil der Poly(A)-mRNA [µg]
Grone/GII	341	nicht nachweisbar
Zuckerrübenboden/ZR	2067	1,9

3.3 Durchmusterung der Metagenombanken auf Gene für Glycerin- und Diol-Dehydratasen

Glycerin- und die isofunktionellen Diol-Dehydratasen sind die Schlüsselenzyme des anaeroben Abbaus von Glycerin bzw. 1,2-Propandiol und kommen sowohl bei den Gram-positiven als auch den Gram-negativen Bakterien vor. Dazu gehören u.a. die Enterobakterien wie *Salmonella*, *Klebsiella*, *Enterobacter* und *Citrobacter*, aber auch Vertreter der Propionsäurebakterien, Lösungsmittelbildenden Clostridien und Lactobacilli (DANIEL et al., 1998). Die Dehydratasen sind von großer ökonomischer Bedeutung, da sie in der biotechnologischen Produktion von 1,3-Propandiol eine wichtige Rolle spielen. 1,3-Propandiol wird u.a. als Ausgangssubstanz für die Herstellung verschiedener Polyester, Polyurethane und biologisch-abbaubarer Polymere genutzt. Kürzlich wurde von den Firmen Genencor International und DuPont ein Produktionsprozess entwickelt, in dem mit Hilfe eines rekombinanten *E. coli*-Stammes 1,3-Propandiol direkt aus Glukose gewonnen wird (CHOTANI et al., 2000).

Alle bisher charakterisierten, Coenzym B₁₂-abhängigen Glycerin- und Diol-Dehydratasen setzen Substrate wie z.B. Glycerin, 1,2-Propandiol oder 1,2-Ethandiol in einem radikalischen Mechanismus zu den entsprechenden Aldehyden um. Beide Dehydratase-Typen bestehen aus drei strukturellen Untereinheiten und bilden im nativen Zustand einen Komplex aus $\alpha_2\beta_2\gamma_2$. Ein weiteres charakteristisches Merkmal ist die sogenannte „suicide“-Inaktivierung die bei der Katalysereaktion mit Glycerin *in vitro* schon nach wenigen Minuten einsetzt (DANIEL et al., 1998). Für die Dehydratasen aus *C. freundii*, *K. oxytoca* und *K. pneumoniae* konnten in den

vergangenen Jahren die Reaktivierungsfaktoren für die Glycerin-inaktivierten Enzyme identifiziert und charakterisiert werden (MORI et al. 1997; TORAYA und MORI, 1999; SEIFERT et al., 2001; KAJIURA et al. 2001).

Für die Durchmusterung der Metagenombanken zur Identifizierung neuartiger Glycerin- und Diol-Dehydratasen wurden zwei unterschiedliche Verfahren angewendet. Das erste beruhte auf der enzymatischen Aktivität der gesuchten Genprodukte (s. 3.3.1) und das zweite auf Sequenzähnlichkeiten zu bereits bekannten Dehydratase-Genen (s. 3.3.2).

3.3.1 Durchmusterung auf der Grundlage von Enzymaktivität

3.3.1.1 Stand der Vorarbeiten

Für die Durchmusterung von Metagenombanken ist die Verwendung von einfachen Plattentests von großem Vorteil, da eine große Anzahl von Klonen zu untersuchen ist (HENNE et al., 1999; HENNE et al., 2000; DANIEL, 2002). Als eine besonders vorteilhafte und spezifische Methode hat sich die Verwendung von Defektmutanten erwiesen, die nur nach heterologer Komplementation durch die Zielgene zum Wachstum befähigt sind (MAJERNIK et al., 2001).

Zur Durchführung eines derartigen Verfahrens habe ich bereits im Rahmen meiner Diplomarbeit einen speziellen Screeningstamm konstruiert, der alle Gene für den anaeroben Abbau von Glycerin aus *C. freundii* mit Ausnahme der Glycerin-Dehydratase plasmidkodiert enthielt (KNIETSCH, 1999). Der Screening-Stamm *E. coli* ECL707/pAK1 trägt die Gene für die Glycerin-Dehydrogenase, die Dihydroxyaceton-Kinase und die 1,3-Propandiol-Dehydrogenase auf dem Plasmid pAK1 (s. Abb. 13). Somit war der Stamm in der Lage, unter aeroben Bedingungen mit Glycerin als einziger Kohlenstoff- und Energiequelle zu wachsen (KNIETSCH, 1999), für das anaerobe Wachstum jedoch benötigte er ein Kosubstrat wie Na-Pyruvat als externen Akzeptor von Reduktionsäquivalenten oder mußte durch eine Glycerin- oder Diol-Dehydratase komplementiert werden. Das Plasmid pAK1 trug eine Chloramphenicol-Resistenz als Selektionsmarker und nutzte den Replikationsursprung des p15A-Replikons. Der Vektor war somit kompatibel mit dem Plasmid pBluescript SK⁺ (Replikationsursprung des Replikons pMB1), das für die Konstruktion der Genbanken verwendet wurde.

Um zu zeigen, dass der konstruierte Stamm tatsächlich für ein Screening auf neuartige Glycerin-Dehydratasen geeignet ist, wurden Komplementationsversuche mit den Glycerin-Dehydratasen aus *C. freundii* und *Clostridium pasteurianum* durchgeführt. Zu diesem Zweck wurden die Plasmide pMS2, (SEYFRIED et al., 1996), pFL1 (LUERS, 1997) und pLM3 (MACIS et al., 1998), welche die entsprechenden Dehydratase-Gene enthielten, durch Elektroporation in *E. coli* ECL707/pAK1 übertragen und die Transformanten anschließend unter anaeroben Bedingungen auf M9-Mineralmedium mit Glycerin als einziger Kohlenstoff und Energiequelle inkubiert (s. 2.2.4). Alle drei Plasmide waren in der Lage, *E. coli* ECL707/pAK1 zu komplementieren. Ferner zeigten die entsprechenden Klone Dehydratase-Aktivität und 1,3-Propandiol-Bildung. Somit war der Stamm für eine Durchmusterung der Genbanken auf Gene für Glycerin- und Diol-Dehydratasen geeignet.

Abbildung 13: Genetische Organisation des *dha*-Regulons aus *C. freundii* und schematische Darstellung der klonierten Region im Plasmid pAK1

Die im *dha*-Regulon von *C. freundii* zusammengefassten Gene kodieren für folgende Proteine: *dhaK*: Dihydroxyaceton-Kinase; *dhaD*: Glycerin-Dehydrogenase; *dhaR*: Regulator-Protein; *dhaH*, *dhaI*: bisher unbekannte Funktion, potentielle Adenosyltransferase; *dhaG*, *dhaF*: Reaktivierungsfaktor der Glycerin-Dehydratase; *dhaT*: 1,3-Propandiol-Dehydrogenase; *dhaB*, *dhaC* und *dhaE*: Untereinheiten der Glycerin-Dehydratase.

3.3.1.2 Durchmusterung durch Komplementation des *E. coli*-Stammes ECL/707/pAK1

Für das Screening der zuvor konstruierten Anreicherungs-genbanken GEA, GIIA, ZRA und SLA (s. 3.1) wurden die Genbank-Plasmide in den Stamm *E. coli* ECL707/pAK1 übertragen. Die Transformanten wurden anschließend unter anaeroben Bedingungen auf

M9-Mineralmedium (s. 2.2.4) mit Glycerin oder 1,2-Propandiol (100 mM) als einziger C- und Energiequelle ausplattiert. Des Weiteren enthielt das Medium Coenzym B₁₂, den Kofaktor der bekannten Dehydratasen sowie eine Vitamin- und eine Spurenelementelösung, um auch Enzyme mit möglicherweise völlig anderen Bedürfnissen detektieren zu können.

Je Genbank wurden zwischen 80000 und 240000 Klone auf das Vorhandensein von Genen für Glycerin- und Diol-Dehydratasen überprüft (s. Tab. 9). Beim initialen Screening wurden 2 positive Klone gefunden. Zur Überprüfung des Phänotyps wurden aus diesen rekombinanten Klonen die Plasmide isoliert und erneut in *E. coli* ECL707/pAK1 transformiert. Beide Plasmide vermittelten einen stabilen Phänotyp. Diese wurden mit pAK2 und pAK8 bezeichnet. Die entsprechenden Klone *E. coli* ECL707/pAK1 /pAK2 und *E. coli* ECL707/pAK1 /pAK8 waren zum anaeroben Wachstum auf Glycerin in der Lage und zeigten auch signifikante Dehydratase-Aktivität in den Rohextrakten (s. Tab. 10). Durch Restriktionsanalysen mit verschiedenen Enzymen konnten für die beiden Plasmide Insertgrößen von 7,2 kBp (pAK2) und 6,5 kBp (pAK8) ermittelt werden (Daten nicht gezeigt).

Außerdem wurde durch Enzymtests das Vorhandensein von weiteren im *dha*-Regulon kodierten Genprodukten überprüft. Die Plasmide pAK2 und pAK8 wurden dafür in *E. coli* ECL707 transformiert und die Enzymaktivitäten in den Rohextrakten bestimmt. Sowohl für *E. coli* ECL707/pAK2 als auch für *E. coli* ECL707/pAK8 konnte zusätzlich eine signifikante Aktivität der 1,3-Propandiol-Dehydrogenase gemessen werden (s. Tab. 10). Als Referenz diente der Rohextrakt von *E. coli* ECL707 ohne zusätzliches Plasmid. Aktivitäten für die ebenfalls im *dha*-Regulon kodierte Glycerin-Dehydrogenase und die Dihydroxyaceton-Kinase konnten nicht detektiert werden. Die Ergebnisse der Sequenzierung der Plasmide und weiterer biochemischer Untersuchungen sind in Kapitel 3.2.3 dargestellt.

Tabelle 9: Screening der Metagenombanken auf Gene für Glycerin- und Diol-Dehydratasen durch Komplementation von *E. coli* ECL707/pAK1

Das Screening wurde durch Transformation von je 1 µl Plasmidgenbank in den Stamm *E. coli* ECL707/pAK1 durchgeführt. Die Transformanten wurden bei 30 °C unter anaeroben Bedingungen auf M9-Mineralmedium (s. 2.2.4) mit 100 mM Glycerin oder 1,2-Propandiol als C- und Energiequelle inkubiert.

Genbank	Anzahl getesteter Klone	Positive <i>E. coli</i> -Klone nach initialem Screening	Positive <i>E. coli</i> -Klone mit stabilem Phänotyp	Bezeichnung der Aktivitäts-vermittelnden Plasmide
GIIA	80000	1	1	pAK8
ZRA	240000	1	1	pAK2
SLA	240000	-	-	-
GEA	90000	-	-	-

Tabelle 10: Spezifische Aktivitäten der Glycerin-Dehydratasen und der 1,3-Propandiol-Dehydrogenasen in den Rohextrakten von *E. coli* ECL707/pAK2 und *E. coli* ECL707/pAK8

Die Zellanzucht erfolgte in LB-Medium (s. 2.2.1) in einem Kulturvolmen von 250 ml unter aeroben Bedingungen. Die Herstellung der Rohextrakte und die Bestimmung der Enzymaktivitäten erfolgte wie unter 2.14 und 2.16 beschrieben.

Organismus	1,3-Propandiol-Dehydrogenase [U/mg]	Glycerin-Dehydratase [U/mg]
<i>E. coli</i> ECL707/pAK2	0,6	1,1
<i>E. coli</i> ECL707/pAK8	0,7	0,9
<i>E. coli</i> ECL707	< 0,01	n. n.

n. n. = nicht nachweisbar

3.3.2 Durchmusterung auf der Grundlage von Sequenzähnlichkeiten

Parallel zu dem auf Enzymaktivität basierenden Screening wurde eine Durchmusterung der Anreicherungs-genbanken (s. 3.1) auf der Basis von Sequenzähnlichkeiten durchgeführt. Für diese Art der Vorgehensweise gibt es in der Literatur verschiedene

Beispiele. Zum einen werden mittels der Polymerasekettenreaktion Abschnitte der 16S rRNA-Gene amplifiziert und zur systematischen Analyse von Standorten genutzt (MUYZER et al., 1992; BORNEMANN et al., 1996). Andererseits konnten verschiedene Arbeitsgruppen diese Methode ebenfalls zur Identifizierung von kompletten Genen oder Teilsequenzen von für Enzyme kodierende Gene anwenden (SEOW et al., 1997; ROSADO et al., 1998).

Die Anwesenheit von Glycerin-Dehydratase-Genen in den erstellten Metagenombanken wurden ebenfalls durch eine PCR überprüft. Zu diesem Zweck wurden degenerierte Oligonukleotide aus Bereichen abgeleitet, die in allen bekannten Dehydratasen konserviert sind (s. Abb. 14). Die verwendeten Primer wurden mit alpha3 und beta1 bezeichnet, ihre Sequenz ist in Tabelle 2 aufgeführt. Die PCR-Reaktionen wurden in einem Gradientencycler mit einem Gradienten für die Annaeling-Temperatur von 37 ± 10 °C durchgeführt (s. 2.12). Der Temperaturbereich wurde bewußt niedrig gewählt, um auch Hybridisierungen mit Dehydratase-Genen zu ermöglichen, bei denen die Sequenzidentität in dem ausgewählten Bereich nicht so stark ausgeprägt war. Die erwartete DNA-Region mit einer Länge von ca. 1000 Bp konnte in allen Genbanken amplifiziert werden. Zur Amplifikation wurde mit der *Taq*-DNA-Polymerase gearbeitet. Aufgrund der Matrize-unabhängigen terminalen Transferase-Aktivität dieses Enzyms besitzen alle Amplifikate einzelne, überhängende Adenosinnukleotid-Reste. Das ermöglichte eine anschließende Klonierung der PCR-Produkte in den Vektor pCR2.1 nach der Methode der TOPO-TA-Klonierung (s. 2.8.3.2).

Abbildung 14: Schematische Darstellung der in allen B₁₂-abhängigen Glycerin- und Diol-Dehydratasen konservierten Bereiche, die zur Ableitung von degenerierten Oligonukleotiden benutzt wurden

Abkürzungen: GDH: Glycerin-Dehydratase; DDH: Diol-Dehydratase. Referenzen: *C. pasteurianum*, MACIS et al. (1998); *C. freundii*, SEYFRIED et al. (1996); *K. pneumoniae*, TOBIMATSU et al. (1996); *K. oxytoca*, TOBIMATSU et al. (1995); *S. typhimurium*, BOBIK et al. (1997).

Um zu überprüfen, ob die klonierten DNA-Fragmente den gewünschten Genbereich enthielten, wurden je Genbank zehn rekombinante Plasmide sequenziert. Die Sequenzanalyse zeigte, dass alle überprüften Plasmide den gewünschten Bereich beinhalten. Wie zu erwarten war, wiesen alle Inserts hohe Ähnlichkeiten zu den Dehydratase-Genen der Glycerin- oder 1,2-Propandiol- verwertenden Enterobakterien auf. Die untersuchten Plasmidinserts zeigten die höchsten Übereinstimmungen mit den Dehydratase-Genen aus *C. freundii* (alle Genbanken), *K. oxytoca* (Genbank ZRA) und *S. typhimurium* (Genbank SLA).

Die so erhaltenen PCR-Produkte konnten nachfolgend als Sonden für Hybridisierungsexperimente zur Detektion der vollständigen Dehydratase-Gene eingesetzt werden. Bei der Koloniehybridisierung mit radioaktiv-markierten Sonden handelt es sich um ein zeitaufwendiges und kostenintensives Verfahren. Um die Anzahl der zu überprüfenden Klone daher möglichst gering zu halten und trotzdem eine effiziente Durchmusterung der Genbanken zu gewährleisten, sollten die Plasmide zunächst durch eine Saccharose-Dichtegradientenzentrifugation größenfraktioniert

werden. Zu diesem Zweck wurden Plasmide zunächst mit dem Restriktionsenzym *NotI* linearisiert, da nur lineare DNA-Fragmente im Saccharosegradienten zuverlässig aufgrund ihrer Länge getrennt werden. Bei *NotI* handelt es sich um ein statistisch selten schneidendes Enzym mit einer 8 Purin-Nukleotide umfassenden Erkennungssequenz (5'-GCGGCCGC-3'), die auf dem Vektor pBluescript SK⁺ einmal vorhanden war. Dies garantierte die einfache Linearisierung aller Plasmide, die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Fragmentierung der inserierten DNA-Bereiche war jedoch gering.

Nach der Auftrennung im Saccharosegradienten wurden Aliquots einiger ausgewählter Fraktionen nach dem Dot-Blot-Verfahren (s. 2.11.3) auf Nylonmembranen aufgebracht und fixiert. Anschließend erfolgte eine Hybridisierung mit den radioaktiv-markierten Dehydratase-spezifischen Sonden (s. Abb. 15).

Die Fraktionen, die ein besonders deutliches Signal lieferten (s. Pfeile in Abb. 15), wurden für das Screening verwendet. Zunächst wurden die Plasmide in den betreffenden Fraktionen einer Religation mit der T4-DNA-Ligase unterzogen. Anschließend erfolgte dann die Transformation in *E. coli* DH5 α und das Ausplattieren auf LB-Ampicillin-Agarplatten. Die so erhaltenen Klone wurden direkt, ohne einen weiteren Ausstrich auf runde Nylonmembranen geblottet (s. 2.11.1). Anschließend wurden die Zellen durch Behandlung mit einem SSC/SDS-Puffer aufgeschlossen und durch "Backen" in der Mikrowelle wurde die freigesetzte DNA auf den Membranfiltern fixiert (s. 2.11.3). Die so präparierten Filter wurden nachfolgend ebenfalls einer Hybridisierung mit den zuvor amplifizierten, spezifischen Dehydratase-Fragmenten unterzogen. Positive Klone zeigten bei Autoradiographie der Membranen eine deutliche Schwarzfärbung (s. Abb. 16).

Abbildung 15: Dot-Blot-Hybridisierung ausgewählter Fraktionen (13 bis 24) der Umweltgenbank SLA nach Saccharose-Dichtegradientenzentrifugation

Die Sonde wurde radioaktiv markiert (s. 2.8.4). Die Hybridisierung erfolgte wie unter 2.11.4 beschrieben. Die Pfeile markieren die Fraktionen die für das nachfolgende Screening verwendet wurden.

Abbildung 16: Koloniehybridisierung der Metagenombanken mit Dehydratase-spezifischen Sonden

Die Sonde wurde radioaktiv markiert (s. 2.8.4). Die Hybridisierung erfolgte wie unter 2.11.4 beschrieben. Positive Klone sind durch Pfeile markiert.

Im Rahmen des beschriebenen sequenzabhängigen Durchmusterungsverfahrens wurden zwischen 32000 und 65000 rekombinanter *E. coli*-Klone der Genbanken GIIA, GEA, ZRA und SLA getestet (s. Tab. 11), insgesamt waren es 198000. Fünf verschiedene positive Klone konnten dabei identifiziert werden, deren Plasmide mit pAK3 bis pAK7 bezeichnet wurden. Die durch Restriktionsverdau ermittelten Insertgrößen lagen zwischen 1,7 und 6,3 kBp. Einzig in Genbank GEA konnte somit mit keinem der beiden beschriebenen Durchmusterungsverfahren ein positiver Klon detektiert werden (s. auch 3.3.1).

Tabelle 11: Sequenz-abhängiges Screening der Metagenomgenbanken GIIA, GEA, ZRA und SLA

Genbank	Anzahl der getesteten rekombinanten <i>E. coli</i> -Klone	Anzahl und Bezeichnung der positiven <i>E. coli</i> -Klone
SLA	61000	1 (pAK3)
ZRA	65000	2 (pAK4-5)
GIIA	32000	2 (pAK6-7)
GEA	40000	0

Zur Detektion der Dehydratase-Aktivität wurden die Plasmide pAK3 bis pAK7 in *E. coli* ECL707 transformiert und die rekombinanten Klone in LB-Medium (s. 2.2.1) angezogen. Nur in den Rohextrakten von *E. coli* ECL707/pAK6 und *E. coli* ECL707/pAK7 konnte eine Dehydratase-Aktivität nachgewiesen werden. Die spezifischen Aktivitäten lagen bei 0,9 und 1,2 U/mg Protein. Des Weiteren wurde bei *E. coli* DH5 α /pAK7 wie auch schon bei *E. coli* ECL707/pAK2 und *E. coli* ECL707/pAK8 eine signifikante Aktivität der 1,3-Propandiol-Dehydrogenase gemessen. Die spezifischen Aktivitäten der einzelnen Enzyme sind in Tabelle 12 zusammengefasst. Zusätzlich wurden mit den Plasmiden pAK3-7 Komplementationsversuche im Stamm *E. coli* ECL707/pAK1 durchgeführt. Die Transformation von pAK6 und pAK7 ermöglichte den resultierenden Stämmen *E. coli* ECL707/pAK1/pAK6 bzw. ECL707/pAK1/pAK7 das Wachstum in M9-Mineralmedium (s. 2.2.4) mit Glycerin als alleiniger Kohlenstoff- und Energiequelle. Mit den Plasmiden pAK3 bis pAK5 war die Komplementation nicht erfolgreich. Ein möglicher Grund für die fehlende Enzymaktivität war, dass hier unvollständige Gene kloniert worden waren, da Sequenz-basierende Durchmusterungsverfahren nicht selektiv für komplette Gene sind. Die

Ergebnisse der Sequenzierung der Plasmide und weiterer biochemischer Untersuchungen sind in Kapitel 3.3.3 dargestellt.

Tabelle 12: Spezifische Aktivitäten der Glycerin-Dehydratasen und der 1,3-Propandiol-Dehydrogenasen in den Rohextrakten von *E. coli* ECL707/pAK3 bis *E. coli* ECL707/pAK7

Die Zellanzucht erfolgte in LB-Medium (s. 2.2.1) in einem Kulturvolmen von 250 ml unter aeroben Bedingungen. Die Herstellung der Rohextrakte und die Bestimmung der Enzymaktivitäten erfolgte wie unter 2.14 und 2.16 beschrieben

Organismus	1,3-Propandiol-Dehydrogenase [U/mg]	Glycerin-Dehydratase [U/mg]
<i>E. coli</i> ECL707/pAK3	n. n.	n. n.
<i>E. coli</i> ECL707/pAK4	n. n.	n. n.
<i>E. coli</i> ECL707/pAK5	n. n.	n. n.
<i>E. coli</i> ECL707/pAK6	n. n.	0,9
<i>E. coli</i> ECL707/pAK7	0,5	1,2
<i>E. coli</i> ECL707	< 0,01	n. n.

n. n. = nicht nachweisbar

3.3.3 Charakterisierung der identifizierten Glycerin- und Diol-Dehydratase-Gene und ihrer Genprodukte

Mit Hilfe der in den vorangegangenen Kapiteln (3.3.1 und 3.3.2) beschriebenen Methoden konnten insgesamt 7 positive *E. coli*-Klone aus den Metagenombanken GEA, GIIA, ZRA und SLA (s. 3.1) identifiziert werden, die Gene für Glycerin- oder Diol-Dehydratasen tragen. Die mit pAK2 bis pAK8 bezeichneten Plasmide trugen Inserts mit Größen zwischen 1,8 und 7,1 kBp. Je drei der identifizierten Plasmide entstammen den Genbanken, die aus Proben des Grone-Sediments und des Zuckerrübenbodens konstruiert wurden, eine weitere aus der aus dem Sediment des Solar Lake erstellten Genbank. Vier der Plasmide (pAK2 und pAK6–8) vermittelten in *E. coli* ECL707 eine signifikante, Coenzym B₁₂-abhängige Dehydrataseaktivität.

Im folgenden Kapitel werden die Plasmide, die darauf kodierten Gene und ihre Genprodukte ausführlich charakterisiert. Dazu gehörte die Sequenzierung der Plasmide

und die Analyse der Sequenzdaten, sowie eine eingehende biochemische Untersuchung der von den korrespondierenden *E. coli*-Klonen gebildeten Proteine.

3.3.3.1 Molekulare Analyse der Plasmide pAK2 bis pAK8

Die Sequenzierung der Plasmide erfolgte nach der Methode von SANGER (1977) in beiden Orientierungen. Die Inserts der rekombinanten Plasmide wurden nach dem Verfahren des „primer walking“ durch das „Göttingen Genomics Laboratory“ (Institut für Mikrobiologie und Genetik, Universität Göttingen) am ABI PRISM 337 DNA-Sequencer sequenziert. Die Inserts der Plasmide pAK2 bis 5 und pAK7 konnten auf diese Weise vollständig sequenziert werden. Die Plasmide pAK6 und pAK8 wurden lediglich partiell sequenziert, da die Analyse der ersten Sequenzen gezeigt hatte, dass beide eine 100 %ige Identität zu den Genen für die Glycerin-Dehydratase aus *C. freundii* besaßen. Die beiden Plasmide wurden daher nicht in die weiteren Untersuchungen einbezogen.

Zunächst brachte die Sequenzierung Aufschluß über die genauen Größen der klonierten Inserts. Das Plasmid pAK2 wies eine inserierte Sequenz mit einer Länge von 7115 Bp auf, pAK3 eine von 2157 Bp und pAK4 eine von 1750 Bp. Für pAK5 und pAK7 wurden Insertgrößen von 4236 und 6295 Bp festgestellt (s. Tab. 13). Eine Übersicht über die Insertgrößen und die Größen der klonierten Untereinheiten der Dehydratasen wird in Tabelle 13 gegeben. Die Analyse der Sequenzen der inserierten DNA-Fragmente von pAK2-5 und pAK7 ergab weitgehende Übereinstimmungen zu den DNA-Sequenzen der bekannten Diol- und Glycerin-Dehydratasen aus Enterobakterien. Eine Übersicht über die Sequenzähnlichkeiten aller klonierten Gene zu denen der jeweils nächsten Verwandten geben die Tabellen 14A und 14B. Die DNA-Sequenzen von pAK2 und 3 sowie pAK7 zeigten die größten Identitäten (87 bis 98 %) zu den drei Strukturgenen (*dhaBCE*) der Glycerin-Dehydratase aus *C. freundii*. Beim Vergleich der Proteinsequenzen lagen die Homologien in einem Bereich von 96 bis 99 %. Aufgrund der hohen Sequenzähnlichkeiten wurden die auf pAK2-3 und pAK7 kodierten Dehydratasen in die Gruppe der B₁₂-abhängigen Glycerin-Dehydratasen eingeordnet. Die Sequenzen von pAK4 und pAK5 dagegen besaßen die größte Ähnlichkeit zu den drei Strukturgenen (*pduCDE*) der Diol-Dehydratase aus *Salmonella typhimurium*. Daher wurden die hier kodierten Enzyme in die Gruppe der B₁₂-abhängigen Diol-

Dehydratasen eingeordnet. Die Übereinstimmungen mit Werten von 77 bis 92 % auf DNA-Ebene und 86 bis 97 % auf Protein-Ebene zu der bekannten Diol-Dehydratase waren hier deutlich geringer als bei den von pAK2-3 und pAK7 kodierten Enzymen.

Tabelle 13: Übersicht über die Insertgrößen der vollständig sequenzierten Plasmide pAK2-5 und pAK7, über die Gene für die Untereinheiten der klonierten Dehydratase, sowie die GC-Gehalte in diesen Regionen

Unvollständige Gene sind mit einem Sternchen gekennzeichnet.

Plasmid/ Organismus	Insert- größe [Bp]	GC-Gehalt der Dht*- kodierenden Region [%]	Größe der klonierten Gene für Dehydratase-Untereinheiten [Bp]		
			α	β	γ
pAK2	7115	55,73	1668	585	429
pAK3	2157	54,98	729*	585	429
pAK4	1750	53,66	741*	678	363*
pAK5	4236	52,29	45*	678	519
pAK7	6295	56,33	1668	585	429
<i>C. freundii</i>	-	55,92	1668	585	429
<i>S. typhimurium</i>	-	56,65	1665	678	522

* Dht, Dehydratase.

Tabelle 14: Sequenzähnlichkeiten der auf den Plasmiden pAK2 bis 5 und pAK7 klonierten Gene und der korrespondierenden Genprodukte zu denen der jeweils nächsten Verwandten

Alle Angaben sind in Prozent. Unvollständig klonierte Gene sind mit einem Sternchen gekennzeichnet.

A) pAK2, 3, und 7 im Vergleich zu *C. freundii*

Plasmid	<i>dhaB</i> / DhaB	<i>dhaC</i> / DhaC	<i>dhaE</i> / DhaE	<i>dhaF</i> / DhaF	<i>dhaG</i> / DhaG	<i>dhaH</i> / DhaH	<i>dhaT</i> / DhaT	<i>dhaI</i> / DhaI
pAK2	89/98	89/96	89/96	86/93	-	-	93/98*	87/91
pAK3	90/98*	87/98	89/96	87/92*	-	-	-	-
pAK7	98/99	98/99	98/99	98/100*	98/98	99/100*	98/100	98/98

Fortsetzung Tabelle 14

B) pAK4 und pAK5 im Vergleich zu *S. typhimurium*

Plasmid	<i>pduC</i> / PduC	<i>pduD</i> / PduD	<i>pduE</i> / PduE	<i>pduG</i> / PduG	<i>pduH</i> / PduH	<i>pduJ</i> / PduJ
pAK4	88/97*	81/86	77/87*	-	-	-
pAK5	92/86*	83/91	82/89	89/93	69/62	86/97

Eine Auffälligkeit ergab sich bei der Betrachtung der GC-Gehalte in den Dehydratase-kodierenden Regionen. Die Werte für die Plasmide pAK2-3 und pAK7 weichen nur geringfügig (< 1%) von dem für die entsprechende Genregion aus *C. freundii* (55,92 %) ab. Dagegen waren die Differenzen zwischen pAK4 bzw. pAK5 und *S. typhimurium* in der Dehydratase-Region mit 3,0 und 4,3 % signifikant größer (s. Tab. 13). Besonders auffällig waren diese Unterschiede im Gen für die kleine Untereinheit *pduE*. Zwischen Aminosäure 23 und 38 befand sich ein Abschnitt mit besonders großer Diskrepanz in der Proteinsequenz (s. Abb. 19). Betrachtet man diesen Bereich auf Nukleotid-Ebene (s. Abb. 17) zeigt sich, dass hier der GC-Gehalt in *S. typhimurium* auf 81,0 % ansteigt, während er bei pAK4 und pAK5 mit 64,3 und 52,5 % deutlich darunter liegt. Dies ist ein Hinweis darauf, dass die beiden unbekannten Organismen, aus denen die Dehydratase-kodierenden Genregionen von pAK4 und pAK5 entstammen, eine andere Kodonnutzung aufweisen als *S. typhimurium*.

61	C	A	G	G	G	C	G	A	T	G	C	G	C	C	A	G	C	A	G	C	G	G	C	T	C	C	T	G	C	G	<i>S. typhimurium pduE</i>
61	C	A	G	G	G	A	G	A	G	A	C	C	G	T	C	A	C	T	C	C	A	G	C	C	G	C	G	A	C	T	pAK4 pduE
61	C	A	G	G	G	A	G	A	G	A	C	C	G	T	C	A	C	T	C	C	A	T	C	C	G	C	G	A	C	T	pAK5 pduE
91	G	C	A	G	G	C	G	G	C	A	C	G	T	C	C	C	G	C	A	G	C	G	C	A	A	A	G	G	T	C	<i>S. typhimurium pduE</i>
91	G	G	T	T	C	A	T	C	A	G	C	G	C	A	T	A	C	C	G	C	G	A	A	A	G	T	G	A	C	G	pAK4 pduE
91	G	T	T	T	C	A	T	C	A	A	C	A	C	A	T	A	C	C	G	C	A	A	A	A	G	T	G	A	C	G	pAK5 pduE

Abbildung 17: Alignment partieller Nukleotid-Sequenzen (Bereich von Basenpaar 61 bis 120) von *pduE* aus *S. typhimurium*, pAK4 und pAK5

Referenzen: *S. typhimurium*, BOBIK et al.(1997); pAK4 und pAK5, diese Arbeit. Die für alle angegebenen Gene identischen Nukleotide sind grau unterlegt.

Abbildung 18: Genetische Organisation der klonierten DNA-Regionen aus pAK2-5 und pAK7 (B, C, D, F, G) und der entsprechenden DNA-Regionen aus *C. freundii* (A) und *S. typhimurium* (E)

Pfeile und Pfeilspitzen repräsentieren die Länge, Position und Orientierung von möglichen Genen. Partielle Gene sind durch unterbrochene Pfeile und mit Sternchen gekennzeichnet. Schwarze und graue Pfeile deuten offene Leserahmen an, die homolog zu den Genen für die drei Untereinheiten der Glycerin-Dehydratase aus *C. freundii* bzw. zu denen für die Diol-Dehydratase aus *S. typhimurium* sind.

dhaHI: Adenosyltransferase; *dhaT*: 1,3-Propandiol-Dehydrogenase; *dhaBCE*: Glycerin-Dehydratase; *pduCDE*: Diol-Dehydratase; *dhaFG* und *pduGH*: Reaktivierungsfaktoren.

Nur auf den Inserts der Plasmide pAK2 und pAK7 lagen alle drei Strukturgene für die Dehydratasen vollständig kloniert vor. Bei den anderen fehlten jeweils unterschiedlich große Teile der α -Untereinheit und im Fall von pAK4 außerdem noch das Ende der γ -Untereinheit (s. Abb. 18). Dies erklärte auch die fehlende Dehydratase-Aktivität in den Rohextrakten der korrespondierenden *E. coli*-Klone (s. Tab. 12). Neben den Dehydratase-Genen waren auf allen Inserts, mit Ausnahme von pAK4, noch weitere für die Dehydratase-Regionen (*dha*-Regulon und *pdu*-Operon) typische Gene lokalisiert. Dazu gehörten unter anderem die 1,3-Propandiol-Dehydrogenase bei pAK7 die auf Aminosäure-Ebene eine 100 %ige Übereinstimmung zu der aus *C. freundii* aufwies. Außerdem waren Teile der Untereinheiten der Reaktivierungsfaktoren (*dhaGF* bzw. *pduGH*) auf den Plasmiden vorhanden. pAK5 enthielt die beiden Untereinheiten *pduG* und *pduH* vollständig, sie wiesen eine Übereinstimmung von 89 bzw. 69 % zu *pduH* und *pduG* aus *Salmonella* auf.

Die Bindung des Coenzym B_{12} ist in den Glycerin- und Diol-Dehydratasen sehr komplex. Sie binden den Kofaktor in der sogenannten „Base-on“-Form und gehören damit zur Klasse 2 der B_{12} -bindenden Enzyme. Durch die Kristallisation der Diol-Dehydratase aus *K. oxytoca* und der Glycerin-Dehydratase aus *K. pneumoniae* im Komplex mit 1,2-Propandiol und Cyano- B_{12} wurde erstmals die Struktur eines „Base-on“-Enzyms und seine B_{12} -Bindung beschrieben (SHIBATA et al., 1999, TORAYA, 2000, YAMANISHI et al., 2002). Durch Seitenketten einer ganzen Reihe von Aminosäuren wird dabei ein Raum für die Bindung des Cobalamins geschaffen, der weitgehend von hydrophoben Gruppen umgeben ist. Die Aminosäurereste Thr α 172, Glu α 205, Thr α 222, Asp α 234 und Met α 373 der α -Untereinheit sowie Asp β 112, Asn β 150, Gln β 156 der β -Untereinheit bilden H-Brücken zu den peripheren Amid-Seitenketten des Corrin-Ringes. In der Glycerin-Dehydratase von *K. pneumoniae* ist außerdem das Ser β 122 an der Ausbildung der H-Brücken beteiligt (YAMANISHI et al., 2002). Die korrespondierende Aminosäure in der Diol-Dehydratase von *K. oxytoca* ist das Pro β 155, welches nicht in der Lage ist, H-Brücken zu bilden. Weitere an der Bindung des Coenzym beteiligte Aminosäuren sind das Lys β 135, Thr β 137 und Ser β 200. Die aufgeführten Reste sind in allen bisher untersuchten Dehydratasen hochkonserviert, lediglich das Ser β 200 ist in den Glycerin-Dehydratasen durch ein Alanin ersetzt. Die Alignments der abgeleiteten Aminosäuresequenzen der Glycerin- und Diol-Dehydratasen aus pAK2-5 und pAK7 zeigten, dass diese Reste auch in den

neu identifizierten Enzymen hochkonserviert vorliegen (dunkelgrau unterlegt), sofern die entsprechenden Abschnitte kloniert wurden (s. Abb. 19). Auch die Unterschiede zwischen der Gruppe der Glycerin- und der Gruppe der Diol-Dehydratasen wurden hier bestätigt. Es wurden die Sequenzen aus pAK2 - 3 und pAK7 den Proteinsequenzen von *C. freundii* gegenübergestellt (s. Abb. 19A bis C), während die Sequenzen von pAK4 und 5 mit denen von *S. typhimurium* verglichen wurden (s. Abb. 19D bis F).

Das Substrat 1,2-Propandiol und der essentielle Kofaktor K^+ sind beide innerhalb des TIM-Barrel der α -Untereinheit gebunden. Das O(2) und O(1) des Substrats sind durch Wasserstoffbrücken an die Aminosäurereste Glu α 171, Gln α 297, His α 144 und Asp α 336 im aktiven Zentrum fixiert (s. Abb. 19). Das Kaliumion ist durch die Hydroxylgruppen des Substrats und durch fünf Sauerstoffatome der Aminosäurereste des aktiven Zentrums siebenfach koordiniert.

Das Alignment der Untereinheiten der potentiellen Reaktiverungsfaktoren zeigte, dass auch diese hochkonserviert vorliegen (s. Abb. 20). In den untersuchten Glycerin-Dehydratasen lagen die Abweichungen bei maximal 7 %, dhaF aus pAK7 lag im Vergleich zu *C. freundii* sogar zu 100 % konserviert vor. Auch PduG von pAK5 und *S. typhimurium* wiesen nur geringfügige Unterschiede auf, PduH von pAK5 zeigt jedoch nur 62 % Übereinstimmung zu dem entsprechenden Protein aus *S. typhimurium*.

Abbildung 19: (folgende Seiten)

Alignments der abgeleiteten Aminosäuresequenzen der 3 Strukturgene der Glycerin-Dehydratasen aus pAK2 - 3 und pAK7 mit denen aus *C. freundii* (A bis C), sowie der Diol-Dehydratase-Gene aus pAK4 und 5 mit denen aus *S. typhimurium* (D bis F)

Referenzen: Glycerin-Dehydratase aus *C. freundii*, SEYFRIED et al. (1996); Diol-Dehydratase aus *S. typhimurium*, BOBIK et al. (1997); Glycerin- und Diol-Dehydratasen aus pAK2 bis 5 und pAK7, diese Arbeit.

Die für alle angegebenen Proteine identischen Aminosäuren sind grau, die an der B₁₂-Bindung beteiligten sind dunkelgrau unterlegt. Die Aminosäurereste, die in die Bindung des Substrats und des K^+ -Ion involviert sind, sind durch einen schwarzen Kasten gekennzeichnet.

A) Glycerin-Dehydratasen: α -Untereinheit

1	M R R S K R F E V L A Q R P V N Q D G L I G E W P E E G L I	C.f. DhaB
1	M R R S K R F E V L A Q R P V N Q D G L I G E W P E E G L I	pAK2 DhaB
1	- -	pAK3 DhaB
1	M R R S K R F E V L A Q R P V N Q D G L I G E W P E E G L I	pAK7 DhaB
31	A M E S P Y D P A S S V K V E N G R I V E L D G K S R A E F	C.f. DhaB
31	A M E S P Y D P A S S V K V E N G R I V E L D G K D R A Q F	pAK2 DhaB
1	- -	pAK3 DhaB
31	A M E S P Y D P A S S V K V E N G R I V E L D G K S R A E F	pAK7 DhaB
61	D M I D R F I A D Y A I N V P E A E R A M Q L D A L E I A R	C.f. DhaB
61	D M I D R F I A D Y A I N V A E T E R A M Q L D A L E I A R	pAK2 DhaB
1	- -	pAK3 DhaB
61	D M I D R F I A D Y A I N V P E A E R A M Q L D A L E I A R	pAK7 DhaB
91	M L V D I H V S R E E I I A I T T A I T P A K R L E V M A Q	C.f. DhaB
91	M L V D I H V S R E E I I A I T T A I T P A K A V E V M A K	pAK2 DhaB
1	- -	pAK3 DhaB
91	M L V D I H V S R E E I I A I T T A I T P A K A V E V M A Q	pAK7 DhaB
121	M N V V E M M M A L Q K M R A R R T P S N Q C H V T N L K D	C.f. DhaB
121	M N V V E M M M A L Q K M R A R R T P S N Q C H V T N L K D	pAK2 DhaB
1	- -	pAK3 DhaB
121	M N V V E M M M A L Q K M R A R R T P S N Q C H V T N L K D	pAK7 DhaB
151	N P V Q I A A D A A E A G I R G F S E Q E T T V G I A R Y A	C.f. DhaB
151	N P V Q I A A D A A E A G I R G F S E Q E T T V G I A R Y A	pAK2 DhaB
1	- -	pAK3 DhaB
151	N P V Q I A A D A A E A G I R G F S E Q E T T V G I A R Y A	pAK7 DhaB
181	P F N A L A L L V G S Q C G A P G V L T Q C S V E E A T E L	C.f. DhaB
181	P F N A L A L L V G S Q C G R P G V L T Q C S V E E A T E L	pAK2 DhaB
1	- -	pAK3 DhaB
181	P F N A L A L L V G S Q C G R P G V L T Q C S V E E A T E L	pAK7 DhaB
211	E L G M R G L T S Y A E T V S V Y G T E S V F T D G D D T P	C.f. DhaB
211	E L G M R G L T S Y A E T V S V Y G T E S V F T D G D D T P	pAK2 DhaB
1	- -	pAK3 DhaB
211	E L G M R G L T S Y A E T V S V Y G T E S V F T D G D D T P	pAK7 DhaB
241	W S K A F L A S A Y A S R G L K M R Y T S G T G S E A L M G	C.f. DhaB
241	W S K A F L A S A Y A S R G L K M R Y T S G T G S E A L M G	pAK2 DhaB
1	- -	pAK3 DhaB
241	W S K A F L A S A Y A S R G L K M R Y T S G T G S E A L M G	pAK7 DhaB
271	Y S E S K S M L Y L E S R C I F I T K G A G V Q G L Q N G A	C.f. DhaB
271	Y S E S K S M L Y L E S R C I F I T K G A G V Q G L Q N G A	pAK2 DhaB
1	- -	pAK3 DhaB
271	Y S E S K S M L Y L E S R C I F I T K G A G V Q G L Q N G A	pAK7 DhaB
301	V S C I G M T G A V P S G I R A V L A E N L I A S M L D L E	C.f. DhaB
301	V S C I G M T G A V P S G I R A V L A E N L I A S M L D L E	pAK2 DhaB
1	- -	pAK3 DhaB
301	V S C I G M T G A V P S G I R A V L A E N L I A S M L D L E	pAK7 DhaB
331	V A S A N D Q T F S H S D I R R T A R T L M Q M L P G T D F	C.f. DhaB
331	V A S A N D Q T F S H S D I R R T A R T L M Q M L P G T D F	pAK2 DhaB
18	V A S A N D Q T F S H S D I R R T A R T L M Q M L P G T D F	pAK3 DhaB
331	V A S A N D Q T F S H S D I R R T A R T L M Q M L P G T D F	pAK7 DhaB
361	I F S G Y S A V P N Y D N M F A G S N F D A E D F D D Y N I	C.f. DhaB
361	I F S G Y S A V P N Y D N M F A G S N F D A E D F D D Y N I	pAK2 DhaB
48	I F S G Y S A V P N Y D N M F A G S N F D A E D F D D Y N I	pAK3 DhaB
361	I F S G Y S A V P N Y D N M F A G S N F D A E D F D D Y N I	pAK7 DhaB

391	L Q R D L M V D G G L R P V T E E E E T I A I R N K	A A R A I	C.f.	DhaB
391	L Q R D L M V D G G L R P V T E E E E T I A I R N K	A A R A I	pAK2	DhaB
78	L Q R D L M V D G G L R P V T E E E E T I A I R N Q	A A R A I	pAK3	DhaB
391	L Q R D L M V D G G L R P V T E E E E T I A I R N K	A A R A I	pAK7	DhaB
421	Q A V F R E L G L P L I S D E E V D	A A T Y A H G S K D M P	C.f.	DhaB
421	Q A V F R E L G L P L I S D E E V D	A A T Y A H G S K D M P	pAK2	DhaB
108	Q A V F R E L G L P L I S D E E V D	A A T Y A H G S K D M P	pAK3	DhaB
421	Q A V F R E L G L P L I S D E E V E	A A T Y A H G S K D M P	pAK7	DhaB
451	A R N V V E D L A A V	E E M M K R N I T G L D I V G A L S S	C.f.	DhaB
451	A R N V V E D L A A E	E E M M K R N I T G L D I V G A L N S	pAK2	DhaB
138	A R N V V E D L A A V	E E M M K R N I T G L D V V G A L S A	pAK3	DhaB
451	A R N V V E D L A A V	E E M M K R N I T G L D I V G A L S S	pAK7	DhaB
481	S G F E D I A S N I L N M L R	Q R V T G D Y L Q T S A I L D	C.f.	DhaB
481	S G F E D I A S N I L N M L K	Q R V T G D Y L Q T S A I L D	pAK2	DhaB
168	S G F D D I A S N I L N M L R	Q R V T G D Y L Q T S A I L D	pAK3	DhaB
481	S G F E D I A S N I L N M L R	Q R V T G D Y L Q T S A I L D	pAK7	DhaB
511	R Q F D V V S A V N D I N D Y Q G P G T G Y R I S A E R W A		C.f.	DhaB
511	R Q F E V V S A V N D I N D Y Q G P G T G Y R I S A E R W A		pAK2	DhaB
198	R Q F E V V S A V N D I N D Y Q G P G T G Y R I S A E R W A		pAK3	DhaB
511	R Q F D V V S A V N D I N D Y Q G P G T G Y R I S A E R W A		pAK7	DhaB
541	E I K N I A G V V Q P	G S I E	C.f.	DhaB
541	E I K N I A G V V Q P	S A I E	pAK2	DhaB
228	E I K N I A G V V Q P	G S I E	pAK3	DhaB
541	E I K N I A G V V Q P	G S I E	pAK7	DhaB

B) Glycerin-Dehydratasen: β -Untereinheit

1	M E C T T E R K P V F	T L Q V S E G E A A K A	D E R V D E V	C.f.	DhaC
1	M E C T I E R K P V F	I L Q V S E G E A A K A	G D R A D E V	pAK2	DhaC
1	M E C T T E R K P V F	T L Q V S E G E A A K A	D D R A D E V	pAK3	DhaC
1	M E C T T E R K P V F	T L Q V S E G E A A K A	D E R V D E V	pAK7	DhaC
31	V I G V G P A F D K Y Q H K T L I D M P H K	A I L K E L V A		C.f.	DhaC
31	V I G V G P A F D K Y Q H K T L I D M P H K	A I L K E L V A		pAK2	DhaC
31	V I G V G P A F D K Y Q H K T L I D M P H K	A I L K E L V A		pAK3	DhaC
31	V I G V G P A F D K Y Q H K T L I D M P H N	A I L K E L V A		pAK7	DhaC
61	G I E E E G L H A R V V R I	L R T S D V S F M A W D A A N L		C.f.	DhaC
61	G I E E E G L H A R V V R I	L R T S D V S F M A W D A A N L		pAK2	DhaC
61	G I E E E G L H A R V V R V	L R T S D V S F M A W D A A N L		pAK3	DhaC
61	G I E E E G L H A R V V R I	L R T S D V S F M A W D A A N L		pAK7	DhaC
91	S G S G I G I G I Q S K G T	T V I H Q R D L L P L S N L E L		C.f.	DhaC
91	S G S G I G I G I Q S K G T	T V I H Q R D L L P L S N L E L		pAK2	DhaC
91	S G S G I G I G I Q S K G T	T V I H Q R D L L P L S N L E L		pAK3	DhaC
91	S G S G I G I G I Q S K G T	T V I H Q R D L L P L S N L E L		pAK7	DhaC
121	F S Q A P L L T L E T Y R Q I G K N A A R Y A R K E S P S P			C.f.	DhaC
121	F S Q A P L L T L E T Y R Q I G K N A A R Y A R K E S P S P			pAK2	DhaC
121	F S Q A P L L T L E T Y R Q I G K N A A R Y A R K E S P S P			pAK3	DhaC
121	F S Q A P L L T L E T Y R Q I G K N A A R Y A R K E S P S P			pAK7	DhaC
151	V P V V N D Q M V R P K F M A K A	A A L F H I K E T K H V V Q		C.f.	DhaC
151	V P V V N D Q M V R P K F M A K A	A A L F H I K E T K H V V Q		pAK2	DhaC
151	V P V V N D Q M V R P K F M A K A	A A L F H I K E T K H V V Q		pAK3	DhaC
151	V P V V N D Q M V R P K F M A K A	A A L F H I K E T K H V V Q		pAK7	DhaC
181	D R A P V T L H I A L V R E			C.f.	DhaC
181	D A A P V T L H I A L V K E			pAK2	DhaC
181	D A A P V T L H I A L V R E			pAK3	DhaC
181	D A A P V T L H I A L V R E			pAK7	DhaC

C) Glycerin-Dehydratasen: γ -Untereinheit

1	M N D N I M T A Q D Y P L A T R C P E K I Q T P T G K P L T	C.f. DhaE
1	M N D N I M T A Q D Y P L A T R C P E K I L T P T G K P L T	pAK2 DhaE
1	M N E N I M T A Q D Y P L A T R C P E K I L T P T G K P L T	pAK3 DhaE
1	M N D N I M T A Q D Y P L A T R C P E K I Q T P T G K P L T	pAK7 DhaE
31	E I T L E N V L A G R V G P Q D V R I S Q Q T L E Y Q A Q I	C.f. DhaE
31	D I T L E N V L A G R V G P Q D V R I S Q Q T L E Y Q A Q I	pAK2 DhaE
31	D I T L E N V L A G R V G P Q D V R I S Q Q T L E Y Q A Q I	pAK3 DhaE
31	E I T L E N V L A G R V G P Q D V R I S Q Q T L E Y Q A Q I	pAK7 DhaE
61	A E Q M Q R H A V A R N F R R A A E L I A I P D A R I L E I	C.f. DhaE
61	A E Q M Q R H A V A R N F R R A A E L I A I P D A R I L E I	pAK2 DhaE
61	A E Q M Q R H A V A R N F R R A A E L I A I P D A R I L E I	pAK3 DhaE
61	A E Q M Q R H A V A R N F R R A A E L I A I P D A R I L E I	pAK7 DhaE
91	Y N A L R P F R S S F A E L Q A I A D E L E H T W H A T V N	C.f. DhaE
91	Y N A L R P F R S S L A E L L A I A D E L E H T W H A T V N	pAK2 DhaE
91	Y N A L R P F R S S F T E L Q A I A D E L E H T W H A T V N	pAK3 DhaE
91	Y N A L R P F R S S F A E L Q A I A D E L E H T W H A T V N	pAK7 DhaE
121	A G F V R E S A E V Y L Q R N K L R K G S Q	C.f. DhaE
121	A G F V R E S A E V Y Q Q R N K L R K G S Q	pAK2 DhaE
121	A G F V R E S A D V Y Q Q R N K L R K G S Q	pAK3 DhaE
121	A G F V R E S A E V Y Q Q R N K L R K G S Q	pAK7 DhaE

	M	R	S	K	R	F	E	A	L	A	K	R	P	V	N	Q	D	G	F	V	K	E	I	E	E	G	F	I	A	S.t.	PduC	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pAK4	PduC		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pAK5	PduC		
	M	E	S	P	N	D	P	K	P	S	I	K	I	V	N	G	A	V	T	E	L	D	G	K	P	V	S	E	F	D	S.t.	PduC
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pAK4	PduC		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pAK5	PduC		
	L	I	D	H	F	I	A	R	Y	G	I	N	L	N	R	A	E	E	V	M	A	M	D	S	V	K	L	A	N	M	S.t.	PduC
61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pAK4	PduC		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pAK5	PduC		
	L	C	D	P	N	V	K	R	S	E	I	V	P	L	T	T	A	M	T	P	A	K	I	V	E	V	V	S	H	M	S.t.	PduC
91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pAK4	PduC		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pAK5	PduC		
	N	V	V	E	M	M	A	M	Q	K	M	R	A	R	R	T	P	S	Q	Q	A	H	V	T	N	V	K	D	N	S.t.	PduC	
121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pAK4	PduC		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pAK5	PduC		
	P	V	Q	I	A	A	D	A	A	E	G	A	W	R	G	F	D	E	Q	E	T	T	V	A	V	A	R	Y	A	P	S.t.	PduC
151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pAK4	PduC		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pAK5	PduC		
	F	N	A	I	A	L	L	V	G	S	Q	V	G	R	P	G	V	L	T	Q	C	S	L	E	E	A	T	E	L	K	S.t.	PduC
181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pAK4	PduC		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pAK5	PduC		
	L	G	M	L	G	H	T	C	Y	A	E	T	I	S	V	Y	G	T	E	P	V	F	T	D	G	D	D	T	P	W	S.t.	PduC
211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pAK4	PduC		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pAK5	PduC		
	S	K	G	F	L	A	S	S	Y	A	S	R	G	L	K	M																

511	D G Q V L S A V N D V N D Y A G P A T G Y R L Q G E R W E E	S.t. PduC
189	D G Q V L S A V N D V N D Y A G P A T G Y R L Q G E R W E E	pAK4 PduC
1	- -	pAK5 PduC
541	I K N I P G A L D P N E I D	S.t. PduC
219	I K N I P G A L D P N E L G	pAK4 PduC
1	I K N I P G A L D P N E L G	pAK5 PduC

E) Diol-Dehydratasen: β -Untereinheit

1	M E I N E K L L R Q I I E D V L R D M K G S D K P V S F N A	S.t. PduD
1	M E I N E R L L R Q I I E D V L S E M Q T S D K P V S F R S	pAK4 PduD
1	M E I N E K L L R Q I I E D V L S E M Q T S D K P V S F R S	pAK5 PduD
31	P A A S T A P Q T A A P A G D G F L T E V G E A R Q G T Q Q	S.t. PduD
31	S A A A T A P Q M A T A P G D S F L T E I G E A K Q G Q Q Q	pAK4 PduD
31	S T A A S A P Q A A A A Q G D S F L T E I G E A K Q G Q Q Q	pAK5 PduD
61	D E V I I A V G P A F G L A Q T V N I V G L P H K S I L R E	S.t. PduD
61	D E V I I A V G P A F G L S Q T V N I V G I P H K N I L R E	pAK4 PduD
61	D E V I I A V G P A F G L S Q T V N I V G I P H K S I L R E	pAK5 PduD
91	V I A G I E E E G I K A R V I R C F K S S D V A F V A V E G	S.t. PduD
91	V I A G I G E K A L K H A S S A A L N P S D V A F V A V E G	pAK4 PduD
91	V I A G I E E E G V K A R V I R C F K S S D V A F V A V E G	pAK5 PduD
121	N R L S G S G I S I G I Q S K G T T V I H Q Q G L P P L S N	S.t. PduD
121	N R L S G S G I S I G I Q S K G T T V I H Q Q G L P P L S N	pAK4 PduD
121	N R L S G S G I S I G I Q S K G T T V I H Q Q G L P P L S N	pAK5 PduD
151	L E L F P Q A P L L T L E T Y R Q I G K N A A R Y A K R E S	S.t. PduD
151	L E L F P Q A P L L T L E T Y R Q I G K N A A R Y A K R E S	pAK4 PduD
151	L E L F P Q A P L L T L E T Y R Q I G K N A A R Y A K R E S	pAK5 PduD
181	P Q P V P T L N D Q M A R P K Y Q A K S A I L H I K E T K Y	S.t. PduD
181	P Q P V P T L N D Q M A R P K Y Q A K S A I L H I K E T K Y	pAK4 PduD
181	P Q P V P T L N D Q M A R P K Y Q A K S A I L H I K E T K Y	pAK5 PduD
211	V V T G K N P Q E L R V A L	S.t. PduD
211	V V T G K N P Q E L R V A L	pAK4 PduD
211	V V T G K N P Q E L R V A L	pAK5 PduD

F) Diol-Dehydratasen: γ -Untereinheit

1	M N T D A I E S M V R D V L S R M N S L Q G D A P A A A P A	S.t. PduE
1	M N T D A I E S M V R D V L S R M N S L Q G E T - V T P A A	pAK4 PduE
1	M N T D A I E S M V R D V L S R M N S L Q G E T - V T P S A	pAK5 PduE
31	A G G T S R S A K V S D Y P L A N K H P E W V K T A T N K T	S.t. PduE
30	T G S S A H T A K V T D Y P L A N K H P E W V K T A T N K T	pAK4 PduE
30	T V S S T H T A K V T D Y P L A N K H P E W V K T A T N K T	pAK5 PduE
61	L D D F T L E N V L S N K V T A Q D M R I T P E T L R L Q A	S.t. PduE
60	L D D F T L E N V L S N K V T A Q D M R I T P E T L R I Q A	pAK4 PduE
60	L D D F T L E N V L S N K V T A Q D M R I T P E T L R L Q A	pAK5 PduE
91	S I A K D A G R D R L A M N F E R A A E L T A V P D D R I L	S.t. PduE
90	D I A K D A G R D R L A M N F E R A A E L T A V P D D R I L	pAK4 PduE
90	E I A K D A G R D R L A M N F E R A A E L T A V P D D R I L	pAK5 PduE
121	E I Y N A L R P Y R S T K E E L L A I A D D L E N R Y Q A K	S.t. PduE
120	E V -	pAK4 PduE
120	E I Y N A L R P Y R S T K D E L M A I A D D L E N R Y Q A K	pAK5 PduE
151	I C A A F V R E A A G L Y V E R K K L K G D D	S.t. PduE
121	- -	pAK4 PduE
150	I C A A F V R E A A V L Y V E R K K L K G D D	pAK5 PduE

Abbildung 20: (folgende Seiten)

Alignments der abgeleiteten Aminosäuresequenzen der Strukturgene der Reaktivierungsfaktoren aus pAK2, 3 und 7 mit denen aus *C. freundii* (A, B), sowie der korrespondierenden Gene aus pAK5 mit denen aus *S. typhimurium* (C, D)

Referenzen: Glycerin-Dehydratase aus *C. freundii*, SEYFRIED et al. (1996); Diol-Dehydratase aus *S. typhimurium*, BOBIK et al. (1997); Glycerin- und Diol-Dehydratasen aus pAK2 bis 5 und pAK7, diese Arbeit.

Die für alle angegebenen Proteine identischen Aminosäuren sind grau unterlegt.

α -Untereinheit

	M	P	L	I	A	G	I	D	I	G	N	A	T	T	E	V	A	L	A	Q	H	G	R	F	I	A	S	G	I	V	C.f.	DhaF
1	M	S	L	I	A	G	I	D	I	G	N	A	T	T	E	V	A	L	A	Q	D	G	R	F	V	A	S	G	I	V	pAK2	DhaF
1	M	P	L	I	A	G	I	D	I	G	N	A	T	T	E	V	A	L	A	Q	D	G	R	F	V	A	S	G	I	V	pAK3	DhaF
1	M	P	L	I	A	G	I	D	I	G	N	A	T	T	E	V	A	L	A	Q	H	G	R	F	I	A	S	G	I	V	pAK7	DhaF
31	A	T	T	G	M	K	G	T	R	D	N	I	A	G	V	V	A	S	L	Q	Q	A	L	N	N	T	P	W	S	L	C.f.	DhaF
31	A	T	T	G	M	K	A	T	R	D	N	I	A	G	V	V	A	S	L	Q	Q	A	L	D	N	T	P	W	S	F	pAK2	DhaF
31	A	T	T	G	M	K	G	T	R	D	N	I	A	G	V	V	A	S	L	Q	Q	A	L	E	K	T	S	S	S	L	pAK3	DhaF
31	A	T	T	G	M	K	G	T	R	D	N	I	A	G	V	V	A	S	L	Q	Q	A	L	N	N	T	P	W	S	L	pAK7	DhaF
61	Q	D	V	A	K	I	C	I	N	E	A	A	P	V	I	G	D	V	A	M	E	T	I	T	E	T	I	I	T	E	C.f.	DhaF
61	Q	D	V	A	K	I	F	I	N	E	A	A	P	V	I	G	D	V	A	M	E	T	I	T	E	T	I	I	T	E	pAK2	DhaF
61	Q	D	V	T	K	I	C	I	N	E	A	A	P	V	I	G	D	V	A	M	E	T	I	T	E	T	I	I	T	E	pAK3	DhaF
61	Q	D	V	A	K	I	C	I	N	E	A	A	P	V	I	G	D	V	A	M	E	T	I	T	E	T	I	I	T	E	pAK7	DhaF
91	S	T	M	I	G	H	N	P	Q	T	P	G	G	V	G	V	G	M	G	T	T	I	A	V	E	K	L	A	A	L	C.f.	DhaF
91	S	T	M	I	G	H	N	P	Q	T	P	G	G	V	G	V	G	M	G	T	T	I	A	V	A	K	L	A	S	L	pAK2	DhaF
91	S	T	M	I	G	H	N	P	Q	T	P	G	G	V	G	V	G	M	G	T	T	I	A	V	E	K	L	A	S	L	pAK3	DhaF
91	S	T	M	I	G	H	N	P	Q	T	P	G	G	V	G	V	G	M	G	T	T	I	A	V	E	K	L	A	A	L	pAK7	DhaF
121	S	E	D	R	F	T	Q	G	W	I	P	L	V	G	E	E	R	D	F	L	E	A	V	W	F	I	N	E	A	L	C.f.	DhaF
121	R	E	D	Q	F	A	Q	G	W	I	P	L	V	G	E	E	I	D	F	L	E	A	V	W	L	I	N	E	A	L	pAK2	DhaF
121	S	L	D	R	F	A	Q	G	W	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pAK3	DhaF	
121	S	E	D	R	F	T	Q	G	W	I	P	L	V	G	E	E	R	D	F	L	E	A	V	W	F	I	N	E	A	L	pAK7	DhaF
151	D	R	G	V	N	V	V	A	A	I	L	K	K	D	D	G	V	L	V	N	N	R	L	R	R	T	M	P	V	V	C.f.	DhaF
151	D	R	G	V	N	V	V	A	A	I	L	K	K	D	D	G	V	L	V	N	N	R	L	H	R	T	M	P	V	I	pAK2	DhaF
130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pAK3	DhaF	
151	D	R	G	V	N	V	V	A	A	I	L	K	K	D	D	G	V	L	V	N	N	R	L	R	R	T	M	P	V	V	pAK7	DhaF
181	D	E	V	T	L	L	E	K	V	P	E	G	V	L	A	A	V	E	V	A	A	P	G	Q	V	V	R	V	L	S	C.f.	DhaF
181	D	E	V	T	L	L	E	K	V	P	E	G	V	Q	A	A	V	E	V	A	T	T	G	Q	V	V	R	V	L	S	pAK2	DhaF
130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pAK3	DhaF	
181	D	E	V	T	L	L	E	K	V	P	E	G	V	L	A	A	V	E	V	A	A	P	G	Q	V	V	R	V	L	S	pAK7	DhaF
211	N	P	Y	G	I	A	T	F	F	T	L	T	P	E	E	T	Q	T	I	V	P	I	A	R	A	L	I	G	N	R	C.f.	DhaF
211	N	P	Y	G	I	A	T	F	F	A	L	T	P	E	E	T	Q	T	I	V	P	I	A	R	A	L	I	G	N	R	pAK2	DhaF
130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pAK3	DhaF	
211	N	P	Y	G	I	A	T	F	F	T	L	T	P	E	E	T	Q	T	I	V	P	I	A	R	A	L	I	G	N	R	pAK7	DhaF
241	S	A	V	V	L	K	T	P	Q	G	D	V	R	S	R	V	I	P	A	G	K	I	F	I	R	G	E	K	R	G	C.f.	DhaF
241	S	A	V	V	L	K	T	P	Q	G	D	V	R	S	R	V	I	P	A	G	K	I	F	I	S	G	E	K	R	G	pAK2	DhaF
130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pAK3	DhaF	
241	S	A	V	V	L	K	T	P	Q	G	D	V	R	S	R	V	I	P	A	G	K	I	F	I	R	G	E	K	R	G	pAK7	DhaF
271	G	E	A	D	V	A	Q	G	A	Q	A	I	M	Q	A	M	S	T	C	A	P	V	C	D	I	R	G	E	A	G	C.f.	DhaF
271	G	E	A	D	V	A	Q	G	A	Q	A	I	M	Q	A	M	N	A	C	V	P	V	C	D	I	H	G	E	A	G	pAK2	DhaF
130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pAK3	DhaF	
271	G	E	A	D	V	A	Q	G	A	Q	A	I	M	Q	A	M	S	T	C	A	P	V	C	D	I	R	G	E	A	G	pAK7	DhaF
301	T	H	A	G	G	M	L	E	R	V	R	K	V	M	A	S	L	T	G	H	D	M	N	A	V	Y	I	Q	D	L	C.f.	DhaF
301	T	H	A	G	G	M	L	E	R	V	R	K	V	M	A	S	L	S	G	D	D	M	N	S	V	H	I	Q	D	L	pAK2	DhaF
130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pAK3	DhaF	
301	T	H	A	G	G	M	L	E	R	V	R	K	V	M	A	S	L	T	G	H	D	M	N	A	V	Y	I	Q	D	-	pAK7	DhaF
331	L	A	V	D	T	F	I	P	R	K	V	Q	G	G	I	A	G	E	C	S	M	E	N	A	V	G	I	A	A	M	C.f.	DhaF
331	L	A	V	D	T	F	I	P	R	K	V	H	G	G	I	A	G	E	Y	S	M	E	N	A	V	G	I	A	A	M	pAK2	DhaF
130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pAK3	DhaF	
329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pAK7	DhaF	
361	V	K	S	D	R	L	Q	M	Q	A	I	A	S	E	L	S	A	R	L	N	I	P	V	E	V	G	G	V	E	A	C.f.	DhaF
361	V	K	S	D	R	L	Q	M	Q	A	I	A	S	E	L	S	V	R	L	N	T	P	V	E	V	G	G	V	E	A	pAK2	DhaF
130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pAK3	DhaF	
329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pAK7	DhaF	

391	N M A V A G A L T T P G C A A P L A I L D L G A G S T D A A	C.f. DhaF
391	N M A V A G A L T T P G C A A P L A I L D L G A G S T D A A	pAK2 DhaF
130	- -	pAK3 DhaF
329	- -	pAK7 DhaF
421	I I N S D G V V K A V H L A G A G N M V S L L I Q T E L G L	C.f. DhaF
421	I I N G D G T V K A V H L A G A G N M V S L L I K T E L G L	pAK2 DhaF
130	- -	pAK3 DhaF
329	- -	pAK7 DhaF
451	S D P F L A E E I K K Y P L A K V E S L F S I R H E N G A V	C.f. DhaF
451	S D S F L A E E I K K Y P L A K V E S L F S I R H E N G A V	pAK2 DhaF
130	- -	pAK3 DhaF
329	- -	pAK7 DhaF
481	E F F R E P L S P S V F A K V V Y L K N G E L I P V D N Q T	C.f. DhaF
481	E F F R E P L S P S V F A K V V Y L K A G E L I P V D N Q T	pAK2 DhaF
130	- -	pAK3 DhaF
329	- -	pAK7 DhaF
511	S L E K I R L V R R Q A K E K V F V T N C L R A L R Q V S P	C.f. DhaF
511	S L E K I R L V R R K A K E K V F V T N C L R A L H Q V S P	pAK2 DhaF
130	- -	pAK3 DhaF
329	- -	pAK7 DhaF
541	G G S I R D M T F V V L V G G S S L D F E I P Q M I T D A L	C.f. DhaF
541	G G S I R N I S F V V L V G G S S L D F E I P Q M I T D A L	pAK2 DhaF
130	- -	pAK3 DhaF
329	- -	pAK7 DhaF
571	A H Y G V V A G Q G N I R G T E G P R N A V A T G L V L A G	C.f. DhaF
571	A N Y G V V A G Q G N I R G T E G P R N A V A T G L V L A G	pAK2 DhaF
130	- -	pAK3 DhaF
329	- -	pAK7 DhaF

B) Reaktivierungsfaktor Glycerin-Dehydratasen:**β Untereinheit**

1	M S L S S P G V H L F Y H S R W Q G T R V L D E L C W G L E	C.f. DhaG
1	M L L S S P G V H L F Y H S R W Q G T R V L D E L C W G L E	pAK7 DhaG
31	E Q G V P C R A I C C D D H D C A L A L G K L A A K S S T L	C.f. DhaG
31	E Q G V P C R A I C C D D H D C A L A L G K L A A K S S A L	pAK7 DhaG
61	R V G L G L N A T G D I A L T H A Q L P E D R A L V C G H T	C.f. DhaG
61	R V G L G L N A T G D I A L T H A Q L P E D R A L V C G H T	pAK7 DhaG
91	R A G T A Q I R T L G A N A G Q L V K V L P F S E I K	C.f. DhaG
91	R A G T A Q I R T L G A N A G Q L V K V L P F S E I K	pAK7 DhaG

C) Reaktivierungsfaktor Diol-Dehydratasen: α Untereinheit

1	M R Y I A G I D I G N S S T E V A L A	R Q D E T G A L T I T	S.t.	PduG
1	M R Y I A G I D I G N S S T E V A L A	T L D D A G T L S I K	pAK5	PduG
31	H S A L A E T T G I K G T L R N V F G I Q E A L	A L V A K R	S.t.	PduG
31	A S A L A E T T G I K G T L R N V F G I Q E A L	T L A A K N	pAK5	PduG
61	A G I N V R D I S L I R I N E A T P V I G D V A M E T I T E		S.t.	PduG
61	A G I N V S D I S L I R I N E A T P V I G D V A M E T I T E		pAK5	PduG
91	T I I T E S T M I G H N P K T P G G A	G L G V G I T I T P E	S.t.	PduG
91	T I I T E S T M I G H N P K T P G G V	G L G V G V T I T P E	pAK5	PduG
121	E L L T R P A D S S Y I L V V S S A F D F A D I	A N V I N A	S.t.	PduG
121	E L L T R P A D I P Y I L V V S S A F D F A D V	A T M I N A	pAK5	PduG
151	S M R A G Y Q I T G V I L Q R	D D G V L V S N R L E K S L P	S.t.	PduG
151	S V R A G Y Q L T G V I L Q Q	D D G V L V S N R L T T P L P	pAK5	PduG
181	I V D E V L Y I D R I P L G M L A A I E V A V P G K V I E T		S.t.	PduG
181	I V D E V L Y I D R I P L G M L A A I E V A V P G K V I E T		pAK5	PduG
211	L S N P Y G I A T V F N L N A D	E T K N I V P M A R A L I G	S.t.	PduG
211	L S N P Y G I A T V F N L N A E	E T K N I V P M A R A L I G	pAK5	PduG
241	N R S A V V V K T P S G D V K A R A I P A G N L E L Q	A Q Q G	S.t.	PduG
241	N R S A V V V K T P S G D V K A R A I P A G N L E L Q	S Q Q G	pAK5	PduG
271	R T V R V D V A A G A E A I M K A V D G	C G K L D N V T G E	S.t.	PduG
271	R T V R V D V A A G A E A I M K A V G D	C P R L D N V T G E	pAK5	PduG
301	A G T N I G G M L E H V R Q T M A E L T N K P S	S S E I F I Q	S.t.	PduG
301	A G T N I G G M L E H V R Q T M A E L T N K P S	H E I F I Q	pAK5	PduG
331	D L L A V D T S V P V S V T G G L A G E F S L E Q A V G I A		S.t.	PduG
331	D L L A V D T S V P V S V T G G L A G E F S L E Q A V G I A		pAK5	PduG
361	S M V K S D R L Q M A M I A R	E I E Q K L N I D V Q I G G A	S.t.	PduG
361	S M V K S D R L Q M A M I A Q	E I T Q K L N I D V Q V G G A	pAK5	PduG
391	E A E A A I L G A L T T P G T T R P L A I L D L G A G S T D		S.t.	PduG
391	E A E A A I L G A L T T P G T T R P L A I L D L G A G S T D		pAK5	PduG
421	A S I I N P K G E I I A T H L A G A G D M V T M I I A R E L		S.t.	PduG
421	A S I I N P K G E I I A T H L A G A G D M V T M I I A R E L		pAK5	PduG
451	G L E D R Y L A E E I K K Y P L A K V E S L F H L R H E D G		S.t.	PduG
451	G L D D R Y L A E E I K K Y P L A K V E S L F H L R H E D G		pAK5	PduG
481	S V Q F F P T P L P P A	V F A R V C V V K P D E L V P L P G	S.t.	PduG
481	S V Q F F P S P L P P T	V F A R V C V V K P D E L V P L P G	pAK5	PduG
511	D L A L E K V R A I R R S A K E R V F V T N A L R A L R Q V		S.t.	PduG
511	D L A L E K V R A I R R S A K E R V F V T N A L R A L R Q V		pAK5	PduG
541	S P T G N I R D I P F V V L V G G S S L D F E V P Q L V T D		S.t.	PduG
541	S P T G N I R D I P F V V L V G G S S L D F E V P Q L V T D		pAK5	PduG
571	A L A H Y R L V A G R G N I R G S	E G P R N A V A T G L I L	S.t.	PduG
571	A L A H Y R L V A G R G N I R G T	E G P R N A V A T G L I L	pAK5	PduG
601	S W H K E F A H G Q		S.t.	PduG
601	S W Y K A F A H G K		pAK5	PduG

D) Reaktivierungsfaktor Diol-Dehydratasen: **β Untereinheit**

1	M	D	S	N	H	S	A	P	A	I	V	I	T	V	I	N	D	C	A	S	L	W	H	E	V	L	L	G	I	E	S.t.	PduH
1	M	E	S	N	L	S	A	P	A	I	V	I	F	T	L	G	D	C	T	S	L	W	N	D	V	L	L	G	I	E	pAK5	PduH
31	E	E	G	I	P	F	L	L	Q	H	H	P	A	G	D	I	V	D	S	A	W	Q	A	A	R	S	S	P	L	L	S.t.	PduH
31	E	E	G	I	P	F	V	I	R	E	S	H	S	T	D	T	I	H	S	A	W	L	A	A	C	Q	S	P	L	L	pAK5	PduH
61	V	G	I	A	C	D	R	H	S	L	V	V	H	Y	K	N	L	P	A	S	A	P	L	F	T	L	M	H	H	Q	S.t.	PduH
61	V	G	I	G	C	N	Q	E	Q	L	V	V	H	Y	K	N	L	P	T	S	A	P	L	F	T	L	T	Y	Q	Q	pAK5	PduH
91	D	S	Q	A	Q	R	N	T	G	N	N	A	A	R	L	V	K	G	I	P	F	G	I	S	M	L	N	H	R	R	S.t.	PduH
91	D	S	H	A	R	R	S	I	G	N	N	A	A	R	L	V	K	G	I	P	F	-	-	-	-	-	-	-	R	E	pAK5	PduH
121	T	A	V																											S.t.	PduH	
114	C	H	S																											pAK5	PduH	

3.3.3.2 Komplementation der unvollständigen Dehydratase-Gene und Subklonierung in Expressionsvektoren

Um die Genprodukte der unvollständig klonierten Dehydratase-Gene (pAK3-5) ebenfalls in die biochemische Charakterisierung einbeziehen zu können, wurde eine Komplementation dieser Gene angestrebt. Es wurde versucht, die fehlenden Teile der Gene durch die entsprechenden Abschnitte aus dem nächsten Verwandten mit Hilfe von PCR-Techniken zu ersetzen. Der bei pAK3 fehlende Bereich von *dhaB* sollte somit durch *dhaB* aus *C. freundii* ersetzt werden. Für die Gene *pduC* und *pduE* von pAK4 und pAK5 war eine Vervollständigung mit den entsprechenden Genbereichen aus *S. typhimurium* vorgesehen.

Zu diesem Zweck wurde eine sogenannte „Megaprime“-PCR durchgeführt (s. Abb. 21). Durch diese Technik lassen sich überlappende DNA-Fragmente von einer Größe von mehr als 1000 Bp zusammensetzen (BARIK und GALINSKY, 1997). Am Beispiel der Komplementation von pAK3 soll dies im Folgenden verdeutlicht werden. Die Methode beruhte auf dem Einsatz von vier verschiedenen Oligonukleotiden (CF-1, CF-2, pAK3-1 und pAK3-2, s. 2.1, Tab.3) zur Amplifikation zweier unterschiedlicher PCR-Fragmente. Das 3'-Oligonukleotid des 5'-gelegenen Fragments (CF-2) und das 5'-Oligonukleotid des anderen PCR-Fragments (pAK3-1) wiesen dabei einen komplementären Bereich von mehr als 20 Nukleotiden auf.

Zunächst wurden zwei unterschiedliche PCR-Reaktionen durchgeführt, um die zwei Einzelfragmente zu amplifizieren (s. Abb. 21B und C). Mit den Oligonukleotiden CF-1 und CF-2 wurde ein ca. 1,1 kBp-großes Fragment aus *dhaB* von *C. freundii* amplifiziert (s. Abb. 22), als Template diente das Plasmid pGEX2T/*dhaB* (RÖSKENS, 1997).

Anschließend wurden mit Hilfe der Oligonukleotide pAK3-1 und pAK3-2 die unvollständig klonierten Dehydratase-Genregionen aus pAK3 auf einem ca. 1,6 kBp-großen PCR-Produkt amplifiziert (s. Abb. 22). Beide PCR-Reaktionen wurden mit einer DNA-Polymerase durchgeführt, die PCR-Produkte ohne die für die *Taq*-DNA-Polymerase typischen A-Überhänge bildete.

Die PCR-Produkte wurden gereinigt und dann in einen weiteren PCR-Schritt eingesetzt (Abb. 21D). Hier dienten sie dann sowohl als Matrize der Reaktion als auch als Primer für die DNA-Polymerase. Die denaturierten Einzelstränge banden an die komplementäre Sequenz des Überlappungspartners und fungierten so als Mega-Primer. In den ersten Zyklen der PCR entstehen so zunächst einzelne komplettierte Dehydratase-Genregionen. Um eine exponentielle Amplifikation zu gewährleisten, wurden diesem Ansatz noch die Oligonukleotide CF-1 und pAK3-2 hinzugefügt, die am 5'- und 3'-Ende des Kompletffragments banden. Diese Reaktion wurde mit der Herculase enhanced DNA-Polymerase durchgeführt.

Abbildung 21: Schematische Darstellung der sog. „Megaprime“-PCR zur Komplementation der unvollständig klonierten Glycerin- und Diol-Dehydratasen auf pAK3, pAK4 und pAK5

In A) ist die genetische Organisation der Glycerin- und Diol-Dehydratasen dargestellt. Die kurzen hell- und dunkelgrauen Pfeile markieren die Position der verwendeten Oligonukleotide zur Amplifikation der beiden Einzelfragmente (B und C) bzw. zur exponentiellen Amplifikation des Gesamtkonstruktes (D).

Abbildung 22: Amplifizierte Einzelfragmente und das zusammengesetzte Produkt der „Megaprime“-PCR

In Spur 1 ist jeweils der Längenstandard aufgetragen. Spuren 2 und 3: Amplifizierte Einzelfragmente aus *C. freundii* und pAK3; Spuren 4 – 9: Ergebnisse der PCR-Reaktionen zur Amplifikation des Cf/pAK3-Hybrid-Fragments bei verschiedenen Annealing-Temperaturen im Gradienten-Cycler.

Analog zu dem beschriebenen Verfahren wurden Ergänzungs-Fragmente für pAK4 und pAK5 aus dem entsprechenden Genbereich von *S. typhimurium* bzw. *K. oxytoca* hergestellt. Alle verwendeten Oligonukleotide und die PCR-Bedingungen sind in Tabelle 5 (s. 2.12.1) zusammengestellt. Für pAK5 konnte mit dieser Strategie ebenfalls ein Komplettrragment erhalten werden, für pAK4 war die Methode trotz Variation der Reaktionsbedingungen leider nicht erfolgreich.

Die vollständig klonierten Strukturgene der Dehydratase, die auf pAK2 und pAK7 kodiert waren, wurden ebenfalls in einer PCR-Reaktion amplifiziert (s. Tab. 5). Alle erhaltenen PCR-Produkte sollten anschließend in die Expressionsvektoren pET100/D-TOPO oder pET101/D-TOPO kloniert werden (s. 2.3.4.1). Um eine gerichtete Klonierung in diese Vektoren zu erreichen, besaßen die 5'-Oligonukleotide der Gesamtfragmente die Erkennungssequenz 5'-CACC-3', die auf den Vektoren komplementär als Einzelstrangüberhang vorhanden war. Für eine spätere Reinigung der gebildeten Proteine war auf den Vektoren außerdem ein Fusions-His₆-Tag kodiert, der bei Produktion der auf dem Plasmid kodierten Proteine am N- oder am C-Terminus angehängt wurde. Nach der Ligation der PCR-Produkte in die Vektoren wurden die rekombinanten Plasmide in *E. coli* DH5α transformiert und die Transformanten auf LB-Ampicillin-Agar selektioniert. Die erhaltenen Klone wurden zur Überprüfung des Klonierungserfolges einer Plasmidpräparation und einem Restriktionsverdau unterzogen. So konnten die Größe der Plasmide und die Orientierung des Inserts im

Vektor überprüft werden. Die Plasmidkonstrukte wurden entsprechend der ursprünglich identifizierten Plasmide mit pAK2.1, pAK3.1, pAK5.1 und pAK7.1 bezeichnet und im Weiteren für Expressionsversuche der Diol- und Glycerin-Dehydratasen herangezogen.

3.3.3.3 Heterologe Expression und Reinigung der Glycerin- und Diol-Dehydratasen

Die heterologe Expression der Dehydratase-Gene aus pAK2.1, pAK3.1, pAK5.1 sowie pAK7.1 erfolgte durch Transformation der konstruierten Plasmide in dem Stamm *E. coli* BL21 (DE3) und Anzucht in DYT-Medium (s. 2.2.2). Die Genexpression wurde durch Zugabe von 1 mM IPTG induziert (s. 2.3.4).

Nach der Induktion trat eine Wachstumsverzögerung ein und die Analyse durch SDS-PAGE zeigte mit fortschreitender Inkubationsdauer das Auftreten von drei Proteinbanden mit den Molekularmassen von 60, 21 und 16 kDa in den Rohextrakten von *E. coli* BL21/pAK2.1 und BL21/pAK7.1 sowie von 69, 24 und 19 kDa in den Rohextrakten von *E. coli* BL21/pAK5.1 (Daten nicht gezeigt). Diese Banden sind typisch für die drei Untereinheiten der Coenzym B₁₂-abhängigen Glycerin- bzw. Diol-Dehydratasen. Bei den Rohextrakten von *E. coli* BL21/pAK3.1 waren diese Banden nicht festzustellen, außerdem war im Gegensatz zu den anderen untersuchten Extrakten keine Dehydratase-Aktivität nachweisbar. Aufgrund dessen konnten im Folgenden nur die Enzyme, die von den rekombinanten Plasmiden pAK2.1, pAK5.1 und pAK7.1 kodiert waren in eine biochemische Charakterisierung einbezogen werden.

Die Reinigung der Dehydratasen erfolgte über den bei der Klonierung angehängten His₆-Tag durch eine Affinitätschromatographie an Ni²⁺-NTA-Agarose (s. 2.17.1 und Abb. 23). Die Reinigung erfolgte entgegen dem Herstellerprotokoll mit K⁺-haltigen Puffern (statt Na⁺), da für die bekannten B₁₂-abhängigen Dehydratasen aus *Lactobacillus*, *Klebsiella* und *Citrobacter* eine signifikante Verringerung der Enzymaktivität in Gegenwart von Na⁺-Ionen beschrieben worden ist (SMILEY und SOBOLOLOV, 1962; SCHNEIDER und PAWELKIEWICZ, 1966; TORAYA und FUKUKI, 1977; SEYFRIED, 1996).

Abbildung 23: SDS-PAGE-Analyse der heterologen Produktion und Reinigung der Glycerin- und Diol-Dehydratasen aus pAK2.1, pAK5.1 und pAK7.1

Die Reinigung erfolgte mittels Affinitätschromatographie an Ni^{2+} -NTA-Agarose (s. 2.17.1) und wurde mittels SDS-PAGE (s. 2.10.1) und anschließender Färbung mit Coomassie-Blau (s. 2.20.1) analysiert.

Spur 1: Markerproteine

Spur 2: Rohextrakt von *E. coli* BL21/pAK2.1

Spur 3: Eluat nach Reinigung von *E. coli* BL21/pAK2.1

Spur 4: Rohextrakt von *E. coli* BL21/pAK7.1

Spur 5: Eluat nach Reinigung von *E. coli* BL21/pAK7.1

Spur 6: Rohextrakt von *E. coli* BL21 (DE3)/pAK5.1

Spur 7: Eluat nach Reinigung von *E. coli* BL21/pAK5.1.

Zur Reinigung der Dehydratasen wurden die Rohextrakte auf eine mit Zellaufschlußpuffer äquilibrierte Ni^{2+} -NTA-Agarose-Säule (Bettvolumen 4 ml) aufgetragen. Nach einer Inkubation für 1 h bei 4 °C wurde die Säule mit 10 bis 12 ml Zellaufschlußpuffer gewaschen. Nach einem weiteren Waschschritt mit 10 bis 12 ml Puffer I (enthält 20 mM Imidazol) erfolgte die Elution des Proteins mit 2 bis 4 ml eines Puffers, der 250 mM Imidazol enthielt. Das Imidazol führte dabei zu einer kompetitiven Verdrängung des Histidins und damit zur Elution von Proteinen mit His_6 -Tag. Die nachfolgende Analyse der Reinigung durch eine SDS-PAGE zeigte, dass auf diese Weise nahezu homogene Proteine erhalten wurden (s. Abb. 23). In allen drei untersuchten Eluaten konnten wieder drei Proteinbanden mit den für die Untereinheiten der Glycerin- und der Diol-Dehydratasen typischen Molekularmassen erhalten werden.

Dabei war zu beachten, dass die Diol-Dehydratase aus pAK5.1 den His₆-Tag sowie das V5-Epitop (s. Vektorkarte Abb. 4) am N-Terminus der γ -Untereinheit besaß, so dass die γ -Untereinheit um ca. 3 kDa größer war und somit signifikant höher im Gel lief (s. Abb. 23). Die Glycerin-Dehydratasen dagegen besaßen die zusätzlichen Aminosäuren für den His₆-Tag und das Xress-Epitop (s. Vektorkarte, Abb. 4) am C-Terminus der α -Untereinheit, dies führte jedoch aufgrund der Gesamtgröße des Proteins nur zu geringen Veränderungen des Laufverhalten in der SDS-PAGE.

Im Rahmen dieser Experimente wurde ebenfalls die Coenzym B₁₂-abhängige Glycerin-Dehydratase aus *C. freundii* produziert und gereinigt, um eine Kontrolle für die anschließenden biochemischen Untersuchungen der gereinigten Dehydratase zur Verfügung zu haben. Die Glycerin-Dehydratase aus *C. freundii* ist in den vergangenen Jahren ausführlich in unserem Labor charakterisiert worden (DANIEL et al. 1992, SEYFRIED et al. 1996, SEIFERT et al. 2001). Das rekombinante Plasmid pCS120 (SEIFERT et al. 2001), das die 3 Strukturgene *dhaBCE* zusammen mit einer für einen His₆-Tag kodierenden Sequenz kolinear zum T7-Promotor von pBluescript SK⁺ enthält, konnte als Ausgangsmaterial für die Expression eingesetzt werden. Das Plasmid pCS120 wurde in *E. coli* JM109 transformiert. Die Expression der *dhaBCE*-Gene und die Reinigung der Dehydratase aus *C. freundii* erfolgten wie oben beschrieben.

Tabelle 15: Zusammenfassung der Reinigung der Glycerin- und Diol-Dehydratasen aus *E. coli* BL21/pAK2.1, *E. coli* BL21/pAK5.1, *E. coli* BL21/pAK7.1 und *C. freundii* (pCS120)

Plasmid/ Anreicherungs-schritt	Protein [mg/ml]	Aktivität [U/mg]	Ausbeute [%]	Anreicherung
pAK2.1				
Rohextrakt	15,7	14,7	100	1,0
Ni ²⁺ -NTA-Agarose	0,13	119,5	65	8,1
pAK5.1				
Rohextrakt	9,5	8,7	100	1,0
Ni ²⁺ -NTA-Agarose	0,50	96,4	37	11,1
pAK7.1				
Rohextrakt	15,8	14,1	100	1,0
Ni ²⁺ -NTA-Agarose	0,62	111,8	47	7,9
pCS120 (<i>C. freundii</i>)				

Rohextrakt	12,7	9,7	100	1,0
Ni ²⁺ -NTA-Agarose	0,34	134,1	41	13,8

Die Bilanz der Anreicherung aller Dehydratasen durch die beschriebenen Expressionsversuche und Reinigungsschritte ist in Tabelle 15 zusammengefasst. Es konnten Anreicherungsfaktoren zwischen 7,8 und 13,8 erhalten werden. Somit konnten die Dehydratasen in ausreichender Menge für die folgenden biochemischen Untersuchungen produziert und gereinigt werden.

3.3.3.4 Bestimmung der Molekularmassen der Glycerin- und Diol-Dehydratasen durch Aktivitätsfärbung

Zur Bestimmung der nativen Molekularmasse der Glycerin- und Diol-Dehydratasen wurde eine Aktivitätsfärbung nach TOBIMATSU et al. (1995) (s. 2.20.2) durchgeführt. Die Färbung beruhte darauf, dass das bei Dehydratisierung von 1,2-Propandiol gebildete Propionaldehyd mit 2,4-Dinitrophenylhydrazin ein gelbes Präzipitat bildete. Für die Aktivitätsfärbung wurden Rohextrakte der rekombinanten *E. coli*-Stämme JM109/pCS120, BL21(DE3)/pAK2.1, BL21(DE3)/pAK5.1 und BL21(DE3)/pAK7.1 einer nativen Gradienten-PAGE (s. 2.19.2) unterzogen. Die Aktivitätsfärbung wurde wie unter 2.20.2 beschrieben unmittelbar nach der elektrophoretischen Auftrennung durchgeführt. Dazu wurden die Gele in Reaktionspuffer, der 1,2-Propandiol und Coenzym B₁₂ enthielt für 15 min bei 37 °C inkubiert. Proteinbanden, die eine Dehydratase-Aktivität aufwiesen, konnten anschließend durch Anfärbung mit 2,4-Dinitrophenylhydrazin identifiziert werden. Die Ergebnisse der Aktivitätsfärbungen sind in Abbildung 24 dargestellt.

Die von *E. coli* BL21/pAK2.1 und *E. coli* BL21/pAK7.1 produzierten Dehydratasen zeigten wie das Enzym aus *C. freundii* die für die Glycerin-Dehydratasen typische Bande im Molekularmassenbereich von 190 kDa. Die Hybrid-Diol-Dehydratase aus *E. coli* BL21/pAK5.1 besaß eine größere Molekularmasse von ca. 230 kDa. Auch die Größe der angefärbten Diol-Dehydratase von ca. 230 kDa stimmte gut mit den in der Literatur beschriebenen Werten überein. Die Diol-Dehydratase aus *K. oxytoca* besitzt ebenfalls eine Molekularmasse von ca. 230 kDa (TOBIMATSU et al., 1995).

Abbildung 24: Aktivitätsfärbung der heterolog exprimierten Glycerin- und Diol-Dehydratasen nach Auftrennung von Rohextrakten durch native Gradienten-PAGE

Die Rohextrakte der rekombinanten *E. coli*-Stämme JM109/pCS120, BL21(DE3)/pAK2.1, BL21(DE3)/pAK5.1 und BL21(DE3)/pAK7.1 wurden wie unter 2.14 beschrieben hergestellt und einer nativen Gradienten-PAGE unterzogen. Anschließend wurde die Aktivitätsfärbung nach TOBIMATSU et al. (1995) durchgeführt (s. 2.20.2).

Spur 1: Markerproteine

Spur 2: Rohextrakt von *E. coli* JM109/pCS120

Spur 3: Rohextrakt von *E. coli* BL21(DE3)/pAK5.1

Spur 4: Markerproteine

Spur 5: Rohextrakt von *E. coli* BL21(DE3)/pAK2.1

Spur 6: Markerproteine

Spur 7: Rohextrakt von *E. coli* BL21(DE3)/pAK7.1

3.3.3.5 Bestimmung der Substratspezifität der Glycerin- und Diol-Dehydratasen

Alle bisher beschriebenen Glycerin- und Diol-Dehydratasen katalysieren die Coenzym B₁₂-abhängige Umwandlung von Glycerin, 1,2-Propandiol und 1,2-Ethandiol zu den entsprechenden Aldehyden (PAWELKIEWICZ und ZAGALAK, 1965; SMILEY und SOBOLOV 1962; SEYFRIED et al. 1996). Die unterschiedlichen Spezifitäten der

Glycerin- und der Diol-Dehydratase für die Substrate Glycerin und 1,2-Propandiol gilt als ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal (DANIEL et al., 1998).

Zur Bestimmung der Spezifität der neu identifizierten Dehydratasen für die oben aufgeführten Substrate wurde die spezifische Aktivität mit den gereinigten Proteinen bestimmt. Alle Substrate wurden in einer Konzentration von 100 mM eingesetzt und die jeweils höchste erreichte Aktivität wurde als 100 % festgesetzt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 16 zusammengefasst. Die beiden von *E. coli* BL21/pAK2.1 und *E. coli* BL21/pAK7.1 produzierten Dehydratasen zeigten wie es typisch ist für diese Gruppe von Dehydratasen, die höchste Aktivität mit Glycerin als Substrat. In Gegenwart von 1,2-Propandiol und 1,2-Ethandiol lag die relative Aktivität bei 31 und 21 % sowie bei 7 und 2 %. Diese Werte stimmen gut mit denen überein, die für die Glycerin-Dehydratase aus *C. freundii* bestimmt wurden (SEYFRIED et al. 1996).

Tabelle 16: Substratspezifität der Dehydratasen aus *E. coli* BL21/pAK2.1, pAK5.1, pAK7.1 und *C. freundii*

Die Aktivitätsbestimmung wurde wie unter 2.16 beschrieben durchgeführt. Die getesteten Substrate lagen jeweils in einer Konzentration von 100 mM im Testansatz vor. Die jeweils höchste gemessene Aktivität wurde als 100 % gesetzt. Die jeweils höchsten spezifischen Aktivitäten entsprachen den denen in Tab. 15 angegebenen Werten.

Quelle der Dehydratase	Relative Aktivität [%]		
	Glycerin	1,2-Propandiol	1,2-Ethandiol
pAK2.1	100	31	7
pAK5.1	96	100	41
pAK7.1	100	21	2
<i>C. freundii</i> *	100	30	16

* Daten übernommen von SEYFRIED et al. (1996).

Das als Diol-Dehydratase eingestufte Enzym aus *E. coli* BL21/pAK5.1 zeigte erwartungsgemäß die höchste spezifische Aktivität mit dem Substrat 1,2-Propandiol. Im Gegensatz zu den anderen Diol-Dehydratasen trat mit Glycerin kein großer Aktivitätsabfall im Vergleich zu 1,2-Propandiol auf. Keine der untersuchten Dehydratasen zeigte Aktivität in Abwesenheit des Kofaktors Coenzym B₁₂.

3.3.3.6 Inaktivierung der Glycerin- und Diol-Dehydratasen durch Glycerin

Alle in der Literatur beschriebenen und auch die im Rahmen dieser Arbeit neu identifizierten Coenzym B₁₂-abhängigen Glycerin- und Diol-Dehydratasen waren in der Lage Glycerin, 1,2-Propandiol und 1,2-Ethandiol zu den entsprechenden Aldehyden umzusetzen. Die beiden nahe miteinander verwandten Enzymklassen wurden ausführlich bei den Enterobacteriaceae untersucht. Es ist bekannt, dass die Katalysereaktion über einen radikalischen Mechanismus unter Einbeziehung des Coenzym B₁₂ abläuft. Die Interaktion zwischen Apoenzym und Coenzym bewirkt eine Aktivierung der Co-C-Bindung des Coenzym B₁₂. Das hat die Homolyse dieser Bindung zur Folge und es kommt zur Bildung von Cob(II)alamin und einem Adenosyl-Radikal. Das Adenosyl-Radikal abstrahiert anschließend ein H-Atom vom Substrat. Das so gebildete Substrat-Radikal rearangiert zum Produkt-Radikal durch einen Hydroxylgruppentransfer von C2 zu C1. Das Resultat ist die Bildung des Produkt und die Regeneration des Coenzym.

Gemeinsam ist den B₁₂-abhängigen Dehydratasen auch, dass sie bei Inkubation mit Glycerin als Substrat einer irreversiblen Inaktivierung unterliegen (DANIEL et al., 1998; TORAYA 2000). Die sogenannte „Suicide“-Inaktivierung der Dehydratasen in Gegenwart von Glycerin wird durch eine irreversible Spaltung der Co-C-Bindung hervorgerufen, dabei entsteht 5'-Desoxyadenosin und eine unbekannte Cobalaminspezies (BACHOVCHIN et al., 1977 und 1978; TORAYA 1998). Diese unbekannte Cobalaminspezies bindet mit hoher Affinität an die Dehydratase und inaktiviert diese irreversibel (POPPE und RETEY, 1997).

Die neu identifizierten Glycerin- und Diol-Dehydratasen wurden auf diese Eigenschaft hin untersucht. Innerhalb der ersten Minute erfolgte in Gegenwart von Glycerin bei allen Dehydratasen noch kein signifikanter Aktivitätsverlust (s. Abb. 25). Deutliche Unterschiede traten dann nach ca. 3 min Inkubation auf. Die von *E. coli* BL21/pAK5.1 produzierte Diol-Dehydratase wies hier noch fast 70 % ihrer Ausgangsaktivität auf. Auch die Dehydratase aus *C. freundii* lag noch bei etwa 60 % der zu Beginn gemessenen Aktivität. Die von *E. coli* BL21/pAK2.1 und *E. coli* BL21/pAK7.1 dagegen hatten einen Aktivitätsverlust von 60 bis 70 % zu verzeichnen. Nach einer Inkubationszeit von fünf Minuten betrugen die gemessenen Aktivitäten der Glycerin- und Diol-Dehydratasen zwischen 12 und 45 % der Anfangsaktivität. Nach 42 min

konnte bei allen untersuchten Enzymen nur noch eine geringe Restaktivität von 0,4 bis 2 % detektiert werden.

Inkubiert man die Dehydratasen anstelle von Glycerin mit 1,2-Propandiol als Substrat, ist diese rasche Inaktivierung der Enzyme nicht zu beobachten. Die Glycerin-Dehydratase aus *E. coli* BL21/pAK7 blieb sogar über den gesamten Meßzeitraum von 42 min zu 100 % stabil (s. Abb. 25C). Zum Vergleich zeigten die Messungen bei den Dehydratasen aus *C. freundii* (pCS120) und *E. coli* BL21/pAK2.1 einen Aktivitätsverlust von 5 bzw. 20 % nach 42 min. Ähnliche Werte wurden auch für die Diol- und Glycerin-Dehydratasen aus *K. oxytoca* und *K. pneumoniae* durch die Arbeitsgruppen TORAYA et al. (1976) und POZNANSKAYA et al. (1977) publiziert. Auffällig sind die deutlichen Aktivitätseinbußen während der Messungen mit der Dehydratase aus pAK5.1. Zunächst zeigte sich auch dieses Enzym stabil, nach 21 min liegt die relative Aktivität noch bei 94 %. Danach kommt es jedoch zu einem deutlichen Verlust, so dass nach 42 min nur noch 48 % Aktivität zu detektieren sind.

Ein direkter Vergleich der Inaktivierungskurven aller untersuchter Dehydratasen bei Inkubation mit Glycerin zeigte keine einheitliche Trennung zwischen Diol- und Glycerin-Dehydratasen. Die geringste Inaktivierung innerhalb der ersten 3 min verzeichneten die Glycerin-Dehydratase aus *C. freundii* (pCS120) und die Hybrid-Diol-Dehydratase aus *E. coli* BL21/pAK5.1 mit ca. 40 % Verlust. Deutlich sensitiver waren die Glycerin-Dehydratasen aus *E. coli* BL21/pAK2.1 und *E. coli* BL21/pAK7.1 mit Restaktivitäten von nur 40 bzw. 17 % nach 3-minütiger Katalysereaktion.

Abbildung 25: Inaktivierung der Glycerin-Dehydratasen aus *C. freundii* und aus pAK2.1 bzw. pAK7.1 sowie der Diol-Dehydratase aus pAK5.1

Dargestellt sind die relativen Aktivitäten der aus *E. coli* BL21/pAK2.1 (A), *E. coli* BL21/pAK5.1 (B) *E. coli* BL21/pAK7.1 (C) und *E. coli* JM109/pCS120 (D) gereinigten Dehydratasen im Verlauf der Umsetzung mit Glycerin (●) bzw. 1,2-Propandiol (■). Die Aktivitätsbestimmungen wurden wie unter 2.16.1 beschrieben durchgeführt. Die Konzentration der Substrate betrug 100 mM. Die Aktivität wurde relativ zur Anfangsaktivität berechnet, die als 100 % festgesetzt wurde. Die für die Messungen einsetzten, gereinigten Enzyme zeigten folgende spezifischen Aktivitäten:

pAK2.1: 119,5 U/mg für Glycerin und 37,9 U/mg für 1,2-Propandiol

pAK5.1: 32,8 U/mg für Glycerin und 34,1 U/mg für 1,2-Propandiol

pAK7.1: 111,0 U/mg für Glycerin und 24,3 U/mg für 1,2-Propandiol

pCS120: 97,5 U/mg für Glycerin und 28,1 U/mg für 1,2-Propandiol.

Betrachtet man den Katalyseverlauf bei einer Glycerinkonzentration von nur 1 mM ergibt sich ein deutlich verändertes Bild (Daten nicht gezeigt). Unter diesen

Bedingungen, die im Bezug auf die Substratkonzentration den physiologischen Gegebenheiten in einer Zelle recht nahe kommt, zeigen alle untersuchten Enzyme eine sehr viel höhere Stabilität. Nach 5-minütiger Katalyse war bei alle Dehydratasen außer der aus *E. coli* BL21/pAK7.1 noch kein Aktivitätsverlust zu beobachten. Am stabilsten war die Diol-Dehydratase aus *E. coli* BL21/pAK5.1. Diese zeigte sogar nach 10 Minuten Inkubation noch 90 % ihrer Ausgangsaktivität. Die Tatsache, dass die Glycerin-Dehydratasen in diesem Zeitraum schneller an Aktivität verloren (Restaktivität nach 10 min Inkubation zwischen 9 und 42 %), war möglicherweise nicht nur auf die fortschreitende Inaktivierung des Enzyms durch den Katalysemechanismus zurückzuführen, sondern auch auf die schnellere Umsatzrate dieser Enzyme. Nach 5 Minuten Reaktionszeit waren hier schon zwischen 100 und 300 μ M des Substrats Glycerin verbraucht, was wahrscheinlich eine deutliche Verlangsamung der Reaktionsgeschwindigkeit zur Folge hatte. Ein direkter Vergleich der Reaktionsverläufe ist jedoch kritisch, da nicht die exakt gleichen Enzymmengen eingesetzt wurden. Des Weiteren müßten die Versuche bei konstanter Glycerinkonzentration wiederholt werden.

3.3.3.7 Reaktivierung der Glycerin- und Diol-Dehydratasen durch den Reaktivierungsfaktor aus *C. freundii*

Im vorangegangenen Kapitel konnte gezeigt werden, dass die neu isolierten Glycerin- und Diol-Dehydratasen einer „Suicide“-Inaktivierung durch das natürliche Substrat Glycerin unterliegen. Dies wurde zuvor ebenfalls für alle bisher bekannten B₁₂-abhängigen Dehydratasen beschrieben. Frühere Untersuchung haben gezeigt, dass diese Inaktivierung mit dem radikalischen Katalysemechanismus der Enzyme in Zusammenhang steht. (TORAYA et al. , 1976; BACHOVCHIN et al., 1977 und 1978; POZNANZKAYA et al., 1977). Für die Diol-Dehydratase aus *K. oxytoca* und die Glycerin-Dehydratasen aus *K. pneumoniae*, *C. freundii* und *Cl. pasteurianum* konnten in den vergangenen Jahren Protein-Komplexe identifiziert werden, die die Glycerin-inaktivierten Enzyme reaktivieren konnten (TORAYA und MORI, 1999; SEIFERT, 2001; SEIFERT et al., 2001). In *Klebsiella* besteht der Komplex aus den Proteinen DdrA und DdrB. Die entsprechenden Gene liegen stromabwärts der Dehydratase-Gene und werden mit ihnen kotranskribiert. In *C. freundii* und *Cl. pasteurianum* konnten

ebenfalls zwei Proteine identifiziert werden, die mit DhaF und DhaG bezeichnet wurden. Im *dha*-Regulon von *C. freundii* befindet sich *dhaF* stromabwärts von *dhaE*, der γ -Untereinheit der Dehydratase. Dagegen liegt *dhaG* stromabwärts von *dhaT*, dem für die 1,3-Propandiol-Dehydrogenase kodierenden Gen. SEIFERT et al. 2001 konnten zeigen, dass der DhaFG-Komplex in Anwesenheit von Mg^{2+} und ATP eine Inaktivierung der Dehydratase aus dem eigenen Organismus verhinderte und außerdem in der Lage war, das Glycerin-inaktivierte Enzym zu reaktivieren. Untersuchungen der Spezifität Reaktivierungsfaktors zeigten, dass er ebenfalls in der Lage war, die Glycerin-Dehydratase aus *K. pneumoniae* zu reaktivieren. Eine Reaktivierung der Diol-Dehydratasen von *K. oxytoca* und *S. typhimurium* konnte bei Untersuchungen in Rohextrakten nicht beobachtet werden.

Im Weiteren wurde überprüft, inwieweit der gereinigte Reaktivierungsfaktor DhaFG aus *C. freundii* in der Lage war, die im Rahmen dieser Arbeit identifizierten Dehydratasen nach Inaktivierung durch Glycerin zu reaktivieren. Zu diesem Zweck wurde DhaFG aus *C. freundii* nach der Methode von SEIFERT et al. (2001) heterolog produziert und gereinigt. Für die heterologe Expression des Reaktivierungsfaktors wurde das rekombinante Plasmid pCS111 (SEIFERT et al., 2001) herangezogen, welches beide Gene kolinear zum *tac*-Promotor des Expressionsvektors pKK223-3 trug (s. Abb. 26). Beide Gene besaßen am 3'-Ende eine Sequenz für einen His₆-Tag, der die spätere Reinigung der Proteine durch Affinitätschromatographie an Ni^{2+} -NTA-Agarose ermöglichte.

Abbildung 26: Schematische Darstellung von pCS111

Die grau dargestellten Bereiche bezeichnen den Vektor (pKK223-3). Sowohl *dhaF* als auch *dhaG* besaßen am 3'-Ende eine Sequenz für einen His₆-Tag. *ptac*, *tac*-Promotor, *dhaF* und *dhaG*, Untereinheiten des Reaktivierungsfaktors aus *C. freundii*.

Die heterologe Produktion der beiden Proteine erfolgte nach Transformation des Plasmids in *E. coli* JM109 und Anzucht des resultierenden *E. coli*-Klons in DYT-Medium (s. 2.2.2) bei 30 °C. Induziert wurde die Expression durch Zugabe von 1 mM IPTG. Die Genexpression konnte durch Analyse der Rohextrakte durch SDS-PAGE

verfolgt werden. Nach der Induktion traten mit fortschreitender Inkubationsdauer deutlich 2 Banden mit den Molekularmassen von 64 und 14 kDa auf, die den aus den Proteinsequenzen abgeleiteten Molekularmassen für DhaF und DhaG entsprachen (Daten nicht gezeigt). Unter nativen Bedingungen bildeten die koexprimierten Proteine einen dimeren Komplex aus $\alpha_2\beta_2$ mit einer Molekularmasse von ca. 150 kDa (SEIFERT et al., 2001).

Die Reinigung des DhaFG-Komplexes erfolgte mittels Affinitätschromatographie an Ni^{2+} -NTA-Agarose. Die aus den Expressionsversuchen erhaltenen Zellen wurden in KP-Puffer (100 mM, pH 7,0) aufgenommen und mit der French-Press aufgeschlossen. Nach der Zentrifugation wurde der erhaltene Rohextrakt auf eine mit dem Zellaufschlußpuffer äquilibrierte Ni^{2+} -NTA-Agarose-Säule aufgetragen und für 1 h bei 4 °C inkubiert. Die nachfolgenden Wasch- und Elutionsschritte wurden entsprechend der Reinigung der Dehydratasen durchgeführt. Auf diese Weise konnte der Reaktivierungsfaktor aus *C. freundii* in ausreichender Menge für die nachfolgenden Experimente produziert und gereinigt werden.

Zur Untersuchung der Reaktivierung wurden die gereinigten Dehydratasen aus *E. coli* BL21/pAK2.1, *E. coli* BL21/pAK7.1 und *E. coli* BL21/pAK5.1 wie bei SEIFERT et al. beschrieben, durch eine 30-minütige Inkubation bei 37 °C in Gegenwart von 30 % Glycerin und 50 μM Coenzym B_{12} inaktiviert. Durch eine Gelfiltration an einer PD10-Säule (s. 2.17.2) wurde anschließend ungebundenes Coenzym B_{12} und Glycerin abgetrennt. Die Enzyme wiesen danach nahezu keine meßbare Aktivität mehr auf und wurden für die folgenden Reaktivierungsversuche eingesetzt. Zur Bestimmung der Reaktivierungsraten wurde in den nachfolgenden Versuchen 1,2-Propandiol als Substrat eingesetzt, da die Enzyme während der Umsetzung dieser Substanz keiner signifikanten Inaktivierung unterliegen (s. Abb. 27) und somit keine antagonistischen Effekte zu erwarten waren. Die Ansätze enthielten zwischen 0,8 und 1,6 μg inaktiviertes Enzym und ca. 10 μg des Reaktivierungsfaktors. Zusätzlich wurde ATP/MgCl_2 und Coenzym B_{12} zugefügt, da Untersuchungen von TORAYA und MORI (1999) zum Reaktivierungsfaktor DdrAB der Diol-Dehydratase aus *K. oxytoca* und von SEIFERT et al. (2001) im Bezug auf DhaFG gezeigt hatten, dass die Aktivität der Proteinkomplexe von der Anwesenheit dieser Komponenten abhängig war. Die Ansätze wurden bei 37 °C inkubiert, und nach 10, 20 und 30 min wurden Proben entnommen und die gebildete Aldehydmenge wurde bestimmt. Durch Zugabe des Proteinkomplexes DhaFG konnten

sowohl die Glycerin-Dehydratasen aus *E. coli* BL21/pAK2.1 und *E. coli* BL21/pAK7.1 als auch die Diol-Dehydratase aus *E. coli* BL21/pAK5.1 reaktiviert werden (s. Abb. 27). Die Rate der Produktbildung lag nach Zugabe der Reaktivierungsfaktors bei 1,5 bis 4,5 nmol/min bei den verschiedenen Ansätzen.

Abbildung 27: Reaktivierung der Glycerin-inaktivierten Dehydratasen aus *E. coli* BL21/pAK2.1 (A), *E. coli* BL21/pAK5.1 (B) und *E. coli* BL21/pAK7.1 (C) durch den Reaktivierungsfaktor DhaFG aus *C. freundii*

Die Dehydratasen wurden wie unter 2.18 beschrieben inaktiviert. Die Reaktivierungsexperimente wurden in HEPES-Puffer mit 100 mM 1,2-Propandiol, 21 μ M Coenzym B₁₂ sowie MgCl₂/ATP in einem Volumen von 200 μ l durchgeführt. Die eingesetzten Proteinmengen lagen bei 1,2 μ g für pAK2.1, 0,8 μ g für pAK5.1 und 1,6 μ g für pAK7.1. Die inaktivierten Dehydratasen wurden mit ca. 10 μ g des DhaFG-Komplexes inkubiert, und die Bestimmung der gebildeten Aldehydmenge erfolgte zu den angegebenen Zeitpunkten in Gegenwart des Reaktivierungsfaktors (●). Als Kontrolle diente jeweils ein Ansatz ohne Zugabe des Reaktivierungsfaktors (■)

Zur Ermittlung der Reaktivierungsraten wurden die erreichten spezifischen Aktivitäten vor der Inaktivierung und nach der Zugabe von DhaFG bestimmt. Die Hybrid-Diol-Dehydratase aus *E. coli* BL21/pAK5.1 wurde auf die beschriebene Weise zu 62 %, die Glycerin-Dehydratasen aus *E. coli* BL21/pAK2.1 und *E. coli* BL21/pAK7.1 zu 81 bzw. 85 % reaktiviert (s. Tab. 17). Die Ergebnisse für die Glycerin-Dehydratasen stimmen gut mit den Werten überein, die für die Reaktivierung des Enzyms aus *C. freundii* bestimmt wurden (SEIFERT et al., 2001). Neu dagegen ist die Reaktivierung der Diol-Dehydratasen mit einem Reaktivierungsfaktor einer Glycerin-Dehydratase.

Tabelle 17: **Reaktivierungsraten der Glycerin-inaktivierten Dehydratasen aus *E. coli* BL21/pAK2.1, *E. coli* BL21/pAK5.1 und *E. coli* BL21/pAK7.1 mit dem Reaktivierungsfaktor aus *C. freundii***

Dehydratase aus:	Reaktivierungsrate mit DhaFG
<i>E. coli</i> BL21/pAK2.1	81 %
<i>E. coli</i> BL21/pAK5.1	62 %
<i>E. coli</i> BL21/pAK7.1	85 %

3.3.3.8 Inaktivierung der Glycerin- und Diol-Dehydratasen durch 1,3-Propandiol

Bei der biotechnologischen Produktion von 1,3-Propandiol mit Hilfe eines rekombinanten *E. coli*-Produktionsstammes werden 1,3-Propandiol-Konzentrationen im Bereich von 2 M erreicht (CHOTANI et al., 2000). Der Einfluß des Endprodukts der Glycerin-Fermentation auf die Aktivität der Dehydratasen ist in der Literatur bisher nur unzureichend analysiert worden. POZNANSKAYA et al. (1979) konnten eine kompetitive Hemmung der Dehydratase-Aktivität mit Glycerin und 1,2-Propandiol als Substrate durch 1,3-Propandiol feststellen.

Zur Untersuchung der Wirkung von 1,3-Propandiol auf die Aktivität der Glycerin- und Diol-Dehydratasen wurden die gereinigten Enzyme aus *C. freundii*, *E. coli* BL21/pAK2.1, *E. coli* BL21/pAK5.1 und *E. coli* BL21/pAK7.1 eingesetzt. Es erfolgte eine Inkubation für die Dauer von 10 min mit 1,2-Propandiol in Gegenwart

unterschiedlicher 1,3-Propandiol-Konzentrationen im Bereich von 250 mM bis 2 M (s. Abb. 28).

Abbildung 28: Inaktivierung der Glycerin- und Diol-Dehydratasen in Gegenwart unterschiedlicher Konzentration von 1,3-Propandiol

Die Inaktivierungsversuche wurden in HEPES-Puffer (80 mM, KOH; pH 8,2) mit Coenzym B₁₂ und 1,2-Propandiol (100 mM) als Substrat durchgeführt. 1,3-Propandiol wurde in Konzentrationen von 250 mM bis 2 M eingesetzt. Die gereinigten Enzyme wiesen folgende Volumenaktivitäten auf: pAK2.1: 14,0 U/ml, pAK5.1: 28,3 U/ml, pAK7.1: 26,1 U/ml, pCS120: 28,1 U/ml.

Bereits bei einer 1,3-Propandiol-Konzentration von 250 mM im Testansatz kam es bei allen untersuchten Dehydratasen zu einer Hemmung von 11 bis 18 %. Wurde 1,3-Propandiol in einer Konzentration von 1 M zugesetzt, sank die Aktivität bei den Glycerin-Dehydratasen schon unter 50 %, bei 2 M war lediglich eine Restaktivität zwischen 14 und 28 % detektierbar. Deutlich resistenter gegenüber der Inaktivierung zeigte sich die Hybrid-Diol-Dehydratase aus *E. coli* BL21/pAK5.1, die bei 1 M 1,3-Propandiol noch 70 % der Ausgangsaktivität zeigte. Die Unterschiede zwischen den Glycerin- und Diol-Dehydratasen machte auch die Bestimmung der K_i -Werte für 1,3-Propandiol deutlich (s. Tab. 18). Für die in *E. coli* BL21/pAK5.1 heterolog produzierte Dehydratase wurde ein Wert von 1,36 M bestimmt, die Werte der Glycerin-Dehydratasen lagen bei 0,93 M (*C. freundii* und pAK7.1) bzw. 0,85 M (pAK2.1).

Vergleichbare Werte wurden bei der Verwendung von Glycerin als Substrat erhalten (Daten nicht gezeigt).

Tabelle 18: **K_i -Werte der Glycerin-Dehydratasen aus *C. freundii*, *E. coli* BL21/pAK2.1 und *E. coli* BL21/pAK7.1 sowie der Diol-Dehydratase aus *E. coli* BL21/pAK5.1 bei Inkubation mit 1,3-Propandiol**
Reaktionsbedingungen siehe Legende Abb. 28.

Dehydratase aus:	K_i -Wert
<i>C. freundii</i>	0,93 M
<i>E. coli</i> BL21/pAK2.1	0,85 M
<i>E. coli</i> BL21/pAK5.1	1,36 M
<i>E. coli</i> BL21/pAK7.1	0,93 M

Die durchgeführten biochemischen Untersuchungen der aus den Metagenombanken identifizierten Coenzym B₁₂-abhängigen Glycerin- und Diol-Dehydratasen haben deren enge Verwandtschaft mit den bisher bekannten Enzymen dieser Klasse bestätigt. Im Bezug auf einen industriellen Einsatz der Enzyme in einem rekombinanten Produktionsstamm zeigte die von *E. coli* BL21/pAK5.1 produzierte Hybrid-Diol-Dehydratase die besten Eigenschaften. Besonders gegenüber einer Inaktivierung durch Glycerin bzw. durch 1,3-Propandiol zeigte sie sich deutlich resistenter als die untersuchten Glycerin-Dehydratasen.

3.4 Durchmusterung der Metagenombanken auf Gene für Polyol-verwertende Oxidoreduktasen

Ein weiteres Ziel dieser Arbeit war die Identifizierung und Charakterisierung von Genen aus Metagenombanken, die eine Alkohol-Oxidoreduktase-Aktivität in *E. coli* vermitteln und die Erstellung einer Genbank für diese Art von Biokatalysatoren. Alkohol-Oxidoreduktasen katalysieren Redoxreaktionen und sind an der Umwandlung von Alkoholen, Aldehyden und Ketonen in einer Vielzahl von essentiellen mikrobiellen Reaktionen beteiligt. Die bisher bekannten Alkohol-Oxidoreduktasen stellen im

Vergleich zu den Glycerin- und Diol-Dehydratasen eine sehr heterogene Gruppe mit unterschiedlichen Kofaktor-Bedürfnissen dar. REID und FEWSON (1994) haben folgende Einteilung in 3 Gruppen etabliert: Man unterscheidet die NAD(P)^+ -abhängigen Dehydrogenasen (Typ I, Typ II und Typ III), die NAD(P)^+ -unabhängigen Dehydrogenasen (mit Kofaktoren wie FAD, PQQ oder F_{420}) und die Oxidasen.

Wie auch die Coenzym B_{12} -abhängigen Glycerin- und Diol-Dehydratasen sind auch diese Enzyme und dabei besonders die Gruppe der NAD(P)^+ -abhängigen Dehydrogenasen in der Biotechnologie von großem Interesse. Sie besitzen zumeist eine hohe Enantioselektivität und sind somit hervorragend für die Synthese von chiralen Alkoholen, Hydroxysäuren und Aminosäuren geeignet (HUMMEL, 1997 und 1999).

Ziel der vorliegenden Untersuchungen war die Identifizierung von Genen für Alkohol-Oxidoreduktasen, welche in der Lage sind kurzkettige (C2 bis C4) Polyole mit benachbarten Hydroxylgruppen zu den entsprechenden Carbonylverbindungen umzusetzen. Zu diesem Zweck wurden wiederum die Anreicherungs-Metagenombanken SLA, GEA, ZRA und GIJA (s. 3.1) durchmustert. Zusätzlich konnten noch die Genbanken FN, WN und ZB genutzt werden, die zuvor in unserer Arbeitsgruppe erstellt worden waren (HENNE, 2000). Für diese Genbanken war die chromosomale DNA direkt, ohne einen speziellen Anreicherungsschritt, aus den Umweltproben isoliert worden.

Um eine möglichst große Anzahl von rekombinanten Klonen testen zu können, wurde ein auf Enzymaktivität basierendes Testverfahren eingesetzt (s. 3.4.1).

3.4.1 Prinzip der Durchmusterung auf Gene, die Alkohol-Oxidoreduktase-Aktivität vermitteln

Bei der Umsetzung von kurzkettigen Alkoholen durch Oxidoreduktasen entstehen Carbonylverbindungen. Diese Tatsache wurde zur Identifizierung der Zielgene in einem auf Enzymaktivität basierenden Plattentest genutzt.

Der verwendete Indikatoragar (s. 2.2.5) enthielt neben Komplexbestandteilen, die allen Klonen das Wachstum ermöglichen und dem Testsubstrat eine Mischung aus Pararosanilin und Na-bisulfid. Diese beiden Substanzen bildeten zusammen ein Schiff'sches Reagenz, ein primäres Amin, das bei der Reaktion mit Carbonyl-Verbindungen als Kondensationsprodukt eine rot gefärbte Schiff'sche Base

(Azomethin) bildete (CONWAY et al., 1987; s. Abb. 7). Für das Screening wurden die Plasmide der Metagenombanken in *E. coli* transformiert. Kolonien von positiven Klonen waren aufgrund ihrer Rotfärbung und der Ausbildung eines roten Hof leicht zu identifizieren (s. Abb. 29).

Als Testsubstrate wurden 1,2-Ethandiol, 2,3-Butandiol oder ein Gemisch aus 1,2-Propandiol und Glycerin in einer Konzentration von 1 % eingesetzt. Um während der Durchmusterung der Metagenombanken eine starke Hintergrundfärbung der Agars durch die Glycerin-Dehydrogenase-Aktivität von *E. coli* zu verhindern, wurde die Glycerin-negative *E. coli*-Mutante ECL707 (SPRENGER et al., 1989) als Wirtstamm verwendet. Die Platten mit den *E. coli*-Klonen wurden unter Lichtausschluß bei 30 oder 37 °C inkubiert. Eine Auswertung war maximal bis zu einer Woche nach dem Ausplattieren möglich, da mit fortschreitender Inkubationsdauer zumeist eine Rotfärbung der gesamten Platte auftrat.

Abbildung 29: Phänotyp von Carbonyl-produzierenden *E. coli*-Klonen auf Indikatorplatten

Der Pfeil markiert einen Carbonyl-produzierenden *E. coli*-Klon.

Zur Überprüfung des Screeningsystems wurden zunächst die rekombinanten Cosmide pRD1 (DANIEL und GOTTSCHALK, 1992) und pFL1 (LUERS et al., 1997) in *E. coli* ECL707 transformiert und die erhaltenen Transformanten auf dem Indikatormedium inkubiert. Die beiden Cosmide tragen die Gene für die NAD^+ -abhängigen Alkohol-Dehydrogenasen von *C. freundii* und *Cl. pasteurianum* von denen bekannt ist, dass sie die eingesetzten Testsubstrate oxidieren können (DANIEL und GOTTSCHALK, 1992;

LUERS et al., 1997). Kolonien der beiden rekombinanten Stämme zeigten im Gegensatz zu *E. coli* ECL707 die erwartete intensive Rotfärbung und die Ausbildung eines roten Hofes auf dem Indikatormedium. Somit war das Testsystem für die Detektion von Carbonyl-produzierenden *E. coli*-Klonen geeignet.

3.4.2 Durchmusterung der Anreicherungs-genbanken SLA, GEA, ZRA und GIIA

Für die Konstruktion der Genbanken SLA, GEA, ZRA und GIIA waren Boden- und Sedimentproben aus dem Solar Lake, dem Golf von Eilat, einem Zuckerrübenfeld und dem Fluss Grone verwendet worden (s. 3.1). Nach einer kurzen Anreicherungsphase mit den Substraten Glycerin und 1,2-Propandiol wurde die chromosomale DNA direkt aus dem jeweiligen Standortmaterial isoliert. Die erhaltenen Genbanken waren somit ebenfalls gut geeignet für eine Suche nach Genen für Alkohol-Oxidoreduktasen, die in der Lage waren diese und ähnliche C-Quellen zu oxidieren.

Um Gene für neuartige Alkohol-Oxidoreduktasen in den beschriebenen Metagenombanken zu identifizieren, wurden die rekombinanten Plasmide mittels Elektroporation in *E. coli* ECL707 transformiert und auf Indikatoragar-Platten (s. 2.2.5) mit 1,2-Ethandiol, 2,3-Butandiol oder einem Gemisch aus Glycerin und 1,2-Propandiol als Testsubstrate ausplattiert. Je Genbank und Substrat wurden ca. 100.000 rekombinante *E. coli*-Klone auf die Bildung von Carbonyl-Verbindungen überprüft. Im Rahmen des initialen Screening konnten 24 positive, rot gefärbte Klone erhalten werden (s. Tab. 19). Zur Bestätigung des Phänotyps und zum Nachweis, dass die Fähigkeit zur Produktion der Carbonyl-Verbindung plasmidkodiert war, wurden die enthaltenen Plasmide isoliert und in *E. coli* ECL707 retransformiert. Es folgte eine erneute Inkubation auf dem entsprechenden Indikatormedium. 16 der 24 rekombinanten Plasmide vermittelten einen stabilen Phänotyp in *E. coli* und wurden mit pAK101 bis pAK116 bezeichnet. Damit konnte 1 positiver Klon je 75000 getesteter Klone detektiert werden. Die größte Anzahl positiver Klone (zehn) wurde mit dem Substratgemisch

Glycerin/1,2-Propandiol erhalten. Mit 1,2-Ethandiol konnten zwei und mit 2,3-Butandiol vier , zur Carbonylbildung befähigte Klone identifiziert werden.

Tabelle 19: Durchmusterung der Metagenombanken SLA, GEA, ZRA und GIIA auf Gene für Alkohol-Oxidoreduktasen

Das Screening wurde durch Transformation mittels Elektroporation von je 1 µl Plasmidgenbank in den Stamm *E. coli* ECL707 durchgeführt. Je Genbank und Substrat wurden 100000 Klone getestet. Die Transformanten wurden bei 30 oder 37 °C unter aeroben Bedingungen auf Indikatormedium (s. 2.2.5) mit 1 % 1,2-Ethandiol, 2,3-Butandiol oder einem Glycerin/1,2-Propandiol-Gemisch als Substrat inkubiert.

Testsubstrat	Genbank	Positive <i>E. coli</i> -Klone nach initialem Screening	Positive <i>E. coli</i> -Klone mit stabilem Phänotyp	Bezeichnung der Aktivitäts-vermittelnden Plasmide
Glycerin/1,2-Propandiol	SLA	1	0	-
	GEA	1	1	pAK108
	ZRA	6	6	pAK111-116
	GIIA	5	3	pAK101-103
1,2-Ethandiol	SLA	0	0	-
	GEA	0	0	-
	ZRA	0	0	-
	GIIA	3	2	pAK106-107
2,3-Butandiol	SLA	4	2	pAK109-110
	GEA	0	0	-
	ZRA	1	0	-
	GIIA	3	2	pAK104-105

3.4.2.1 Biochemische Charakterisierung der rekombinanten *E. coli*-Stämme pAK101 bis 116

Für die biochemische Charakterisierung der Genprodukte, die für die Alkohol-Oxidoreduktase-Aktivität der identifizierten *E. coli*-Klone verantwortlich waren, wurden die Plasmide pAK101-116 in *E. coli* DH5α transformiert, in 250 ml LB-Medium (s. 2.2.1) mit dem jeweiligen Testsubstrat angezogen. Anschließend wurden

aus den geernteten Zellen Rohextrakte hergestellt (s. 2.14). Zunächst wurden die Rohextrakte auf das Vorhandensein von Nikotinamid-abhängiger Alkohol-Dehydrogenase-Aktivität getestet. Der Rohextrakt von *E. coli* DH5 α /pBluescript SK⁺ wurde als Referenz herangezogen. In den Rohextrakten der 8 *E. coli*-Stämme DH5 α /pAK103-104, *E. coli* DH5 α /108-110, *E. coli* DH5 α /112-113 und *E. coli* DH5 α /116 konnte eine NAD⁺-abhängige Oxidation einiger Testsubstrate nachgewiesen werden (s. Tab. 20). Eine NADP⁺-vermittelte Substratumsetzung konnte in keinem der Extrakte nachgewiesen werden. In den Rohextrakten der 8 übrigen Klone konnte weder eine NAD⁺- noch eine NADP⁺-abhängige Alkohol-Dehydrogenase-Aktivität ermittelt werden. Die Carbonylbildung in diesen Klonen könnte daher auf die Aktivität von Enzymen anderer oder unbekannter Klassen zurückzuführen sein. Hier kommen z.B. Dehydratasen, Metalloxidasen, PQQ- oder FAD-abhängige Dehydrogenasen in Frage (FANG et al., 1995; HUMMEL, 1997; DANIEL et al., 1998).

Für die oben erwähnten NAD⁺-abhängigen Enzyme wurde ein Substratspektrum mit verschiedenen, kurzkettigen Alkoholen erstellt (s. Tab. 20). Mit Ausnahme von *E. coli*/pAK116, der unter den gewählten Reaktionsbedingungen lediglich 1,2 Propandiol oxidierte, waren alle in der Lage mehr als eines der angebotenen Substrate zu oxidieren oder zu reduzieren. Die Enzyme zeigten zumeist die höchste Aktivität mit Substraten, in denen die Hydroxylgruppen an benachbarten C-Atomen vorlagen. Die bevorzugten Substrate waren Glycerin (pAK103), 1,2-Propandiol (pAK104, pAK108-110 und pAK112-113) und 1,2-Ethandiol (pAK116). Mit primären oder sekundären Alkoholen, die nur einzelne Hydroxylgruppen besaßen, konnte keine Reaktion beobachtet werden. Die Reduktionsreaktion war vergleichsweise spezifischer. Die untersuchten Enzyme zeigten die höchsten Aktivitäten mit Dihydroxyaceton (pAK104, pAK110, pAK112-113) oder Glykolaldehyd (pAK103, pAK109). Dagegen konnte mit den Substanzen Glyceraldehyd, Diacetyl, Acetaldehyd und Aceton keine signifikante Reduktion nachgewiesen werden (Daten nicht gezeigt). In den Extrakten von *E. coli* DH5 α /pAK108 und *E. coli* DH5 α /pAK116 konnte trotz vorhandener Oxidations-Aktivität keines der eingesetzten Aldehyde oder Ketone unter den gegebenen Testbedingungen reduziert werden.

Tabelle 20:

Spezifität der NAD(H)-abhängigen Dehydrogenase-Aktivität in Rohextrakten von *E. coli* DH5 α /pAK103 bis 104, *E. coli* DH5 α /pAK108 - 110, *E. coli* DH5 α /pAK112 - 113 und *E. coli* DH5 α /pAK116

Die Zellanzucht erfolgt in LB-Medium (s. 2.2.1) mit jeweils 1 % des beim Screening eingesetzten Substrats in einem Kulturvolumen von 250 ml. Die Herstellung der Rohextrakte und die Bestimmung der Enzymaktivitäten erfolgte wie unter 2.14 und 2.16.2 beschrieben. Die jeweils höchste gemessene Aktivität wurde gleich 100 % gesetzt.

Reaktion und Substrat	Relative spezifische Alkohol-Dehydrogenase-Aktivität (%)							
	pAK103	pAK104	pAK108	pAK109	pAK110	pAK112	pAK113	pAK116
<u>Oxidation</u>								
1,2-Ethandiol	-	-	-	-	-	5	-	100
1,2-Propandiol	81	100	100	100	100	100	100	-
2,3-Butandiol	-	22	50	31	44	32	43	-
Glycerin	100	35	91	36	40	44	68	-
1,2,4-Butantriol	46	14	27	26	27	16	36	-
<u>Reduktion</u>								
Dihydroxyaceton	76	100	-	78	100	100	100	-
Hydroxyaceton	9	39	-	41	70	-	-	-
Glycolaldehyd	100	19	-	100	93	-	53	-
Methylglyoxal	33	-	-	-	-	-	-	-

^{a, b} Die spezifischen Aktivitäten in den Oxidations- und Reduktionsreaktionen wurden relativ zu den jeweils höchsten angegeben. Oxidation: pAK103, 0,024 U/mg; pAK104, 0,033 U/mg; pAK108, 0,022 U/mg; pAK109, 0,039 U/mg; pAK110, 0,048 U/mg; pAK112, 0,057 U/mg; pAK113, 0,028 U/mg; pAK116, 0,040 U/mg. Reduktion: pAK103, 0,054 U/mg; pAK104, 0,080 U/mg; pAK109, 0,044 U/mg; pAK110, 0,137 U/mg; pAK112, 0,032 U/mg; pAK113, 0,068 U/mg.

3.4.2.2 Molekulare Analyse der Plasmide pAK101 bis pAK116

Die Plasmide pAK101 bis 116 wurden durch das „Göttingen Genomics Laboratory“ (Institut für Mikrobiologie und Genetik, Universität Göttingen) nach der Methode von SANGER (1977) in beiden Orientierungen sequenziert. Die Sequenzierung ergab Insertgrößen im Bereich 651 Bp für pAK108 bis zu 8249 Bp für pAK106 (s. Abb. 30 und Tab. 21). Die GC-Gehalte der klonierten DNA-Fragmente lagen zwischen 39 % (pAK101) und 70 % (pAK106) (s. Tab. 21). Die eingehende Analyse der vorhandenen offenen Leserahmen mit Hilfe des Programms DNA Strider 1.2 und der Vergleich mit den in den Datenbanken der NCBI zur Verfügung stehenden Sequenzen zeigte, dass auf den Inserts insgesamt 38 komplette und 16 unvollständige potentielle Gene kodiert waren (s. Tab. 22 und Abb. 30). 51 davon wiesen Ähnlichkeiten zu bekannten Genen aus Organismen auf, die zu einer Vielzahl von bakteriellen Gattungen gehörten wie z.B. *Salmonella*, *Yersinia*, *Pseudomonas*, *Agrobacterium*, *Thermoanaerobacter* und *Mesorhizobium*. Die Mehrzahl der potentiellen Gene besaß Ähnlichkeiten zu Genen enterobakterieller Herkunft.

Die inserierten DNA-Fragmente aus pAK101 (1201 Bp), pAK105 (1266 Bp) und pAK108 (651 Bp) enthielten je nur einen möglichen offenen Leserahmen mit den Größen von 969, 1137 und 534 Basenpaaren. Die abgeleitete Aminosäuresequenz des mit *orf1* bezeichneten Gens auf pAK101 zeigte weder eine signifikante Ähnlichkeit zu den bekannten Alkohol-Dehydrogenasen noch zu irgend einem anderen Genprodukt in den Datenbanken der NCBI. Die aus *orf5* (pAK105) und *orf12* (pAK108) abgeleiteten Proteine dagegen wiesen Übereinstimmungen zu verschiedenen Oxidoreduktasen anderer Organismen auf. Das *orf5*-Genprodukt zeigte 62 % Identität zu einer möglichen Monooxygenase/Oxidoreduktase aus *Sinorhizobium meliloti* auf, das Genprodukt von *orf12* war zu 31 % identisch mit einer NAD⁺-abhängigen, Zink-haltigen Alkohol-Dehydrogenase (Typ I) aus *Mesorhizobium loti* (s. Tab. 22). Diese Ergebnisse stimmen gut mit den gemessenen Enzymaktivitäten in den Rohextrakten der korrespondierenden *E. coli*-Klone überein, die in beiden Fällen eine signifikante Oxidation mit den getesteten Polyolen gezeigt hatten (s. Tab. 20).

Tabelle 21: Insertgrößen und GC-Gehalte der Plasmide pAK101 bis 116

Plasmid	Insertgröße	GC-Gehalt
pAK101	1201 Bp	39 %
pAK102	4349 Bp	54 %
pAK103	2376 Bp	51 %
pAK104	3290 Bp	51 %
pAK105	1266 Bp	58 %
pAK106	8249 Bp	70 %
pAK107	1109 Bp	63 %
pAK108	651 Bp	52 %
pAK109	1369 Bp	55 %
pAK110	4522 Bp	47 %
pAK111	3593 Bp	49 %
pAK112	3423 Bp	48 %
pAK113	1979 Bp	56 %
pAK114	2255 Bp	52 %
pAK115	5131 Bp	54 %
pAK116	1982 Bp	51 %

Abbildung 30: Genetische Organisation der Plasmide pAK101 bis pAK116

Die Pfeile markieren Länge und Orientierung von möglichen offenen Leserahmen. Die Sternchen zeigen unvollständige Gene an. Bezeichnungen von offenen Leserahmen, deren abgeleitetes Genprodukt Ähnlichkeiten zu Alkohol-Dehydrogenasen bzw. Oxidoreduktasen aus anderen Organismen aufweist, sind in Rot bzw. Blau dargestellt. Gene, die als verantwortlich für den Carbonyl-bildenden Phänotyp der *E. coli*-Klone identifiziert wurden, sind grau markiert.

Tabelle 22: **Identifizierte Gene auf den Plasmiden pAK101 bis pAK116, Accession-Nummern und Ähnlichkeiten zu bekannten Proteinen**
Die Identifizierung der verwandten Proteine zu den vorhergesagten Genprodukten sowie die Determinierung der Sequenzähnlichkeiten (in %) und des Score geschah mit Hilfe der BLAST-Programme der NCBI. Unvollständige Gene sind durch Sterne gekennzeichnet. Die Namen der Gene, die als verantwortlich für die Carbonylbildung identifiziert wurden, sind fettgedruckt.

Plasmid	Identifiziertes Gen	Verwandtes Protein	Organismus (Accession des verwandten Proteins)	Identität (%)	Region mit ähnlichen Aminosäuren	Score
pAK101	orf 1 (AF543467)	Kein ähnliches Protein	-	-	-	-
pAK102	orf2* (AF543469)	Hypothetisches Protein	<i>Yersinia pestis</i> (NP_406777)	77	268	424
pAK102	glpK (AF543469)	Glycerin-Kinase	<i>Y. pestis</i> (NP-406778)	46	498	427
pAK102	orf3 (AF543469)	Mögliche Acetyltransferase	<i>Y. pestis</i> (NP_405514)	44	222	201
pAK102	orf4 (AF543469)	Konserviertes hypothetisches Protein	<i>Salmonella enterica</i> (NP_455160)	83	356	626
pAK103	<i>sbmC</i> (AF543472)	SbmC Protein, unbekannte Funktion	<i>E. coli</i> (NP_288514)	74	155	254
pAK103	<i>dacD</i> (AF543472)	Carboxypeptidase	<i>S. typhimurium</i> (NP_461007)	90	390	723
pAK103	<i>phsC*</i> (AF543472)	Thiosulfat-Reduktase, Cyt.b-Untereinheit	<i>S. enterica</i> (NP_456611)	85	71	128
pAK104	<i>rnb*</i> (AF543475)	RNase II	<i>S. typhimurium</i> (NP_460661)	88	536	957
pAK104	<i>yciR</i> (AF543475)	Hypothetisches Protein	<i>E. coli</i> (NP_415802)	66	106	152
pAK104	<i>sbmC</i> (AF543475)	SbmC Protein, unbekannte Funktion	<i>E. coli</i> (NP_288514)	74	155	254

Fortsetzung Tabelle 22

Plasmid	Identifiziertes Gen	Verwandtes Protein	Organismus (Accession des verwandten Proteins)	Identität (%)	Region mit ähnlichen Aminosäuren	Score
pAK105	<i>orf5</i> (AF543478)	Potentielle Monooxygenase/Oxidoreduktase	<i>Sinorhizobium meliloti</i> (T46818)	62	380	499
pAK106	<i>sodA*</i> (AF543480)	Superoxid-Dismutase	<i>Thermotoga tengcongensis</i> (NP-622509)	34	184	91
pAK106	<i>greA</i> (AF543480)	Transkriptions-Elongationsfaktor	<i>Caulobacter crescentus</i> (NP_421644)	31	151	65
pAK106	<i>mutY</i> (AF543480)	Hypothetische Adenin-Glykosylase	<i>Ralstonia solanacearum</i> (NP_518522)	45	365	286
pAK106	<i>orf6</i> (AF543480)	Hypothetisches Protein	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (NP_254046)	51	111	112
pAK106	<i>orf7</i> (AF543480)	Kein ähnliches Protein	-	-	-	-
pAK106	<i>orf8</i> (AF543480)	Mögliche Aminopeptidase	<i>Agrobacterium tumefaciens</i> (NP_355456)	39	241	144
pAK106	<i>orf9</i> (AF543480)	Potentieller Response-Regulator	<i>R. solanacearum</i> (NP_518671)	52	91	100
pAK106	<i>orf10</i> (AF543480)	Hypothetisches Protein	<i>Mesorhizobium loti</i> (NP_104373)	33	106	58
pAK106	<i>orf11*</i> (AF543480)	Kein ähnliches Protein	-	-	-	-
pAK107	<i>sucB</i> (AF543482)	2-Oxoglutarat-Dehydrogenase, E2 Untereinheit	<i>Vibrio cholerae</i> (NP_231718)	60	225	251
pAK107	<i>sucA*</i> (AF543482)	2-Oxoglutarat-Dehydrogenase, E1 Untereinheit	<i>V. cholerae</i> (NP_231719)	74	123	198
pAK108	<i>orf12</i> (AF543483)	Mögliche Zink-abhängige Alkohol-Dehydrogenase	<i>M. loti</i> (NP_104464)	31	217	118
pAK109	<i>fdhD</i> (AF543481)	Mögliches FdhD-Protein	<i>S. enterica</i> (NP_458012)	88	218	402

Fortsetzung Tabelle 22

Plasmid	Identifiziertes Gen	Verwandtes Protein	Organismus (Accession des verwandten Proteins)	Identität (%)	Region mit ähnlichen Aminosäuren	Score
pAK109	<i>orf13</i> (AF543479)	Mögliches Membranprotein	<i>Y. pestis</i> (NP_404224)	24	148	57
pAK110	<i>trrA</i> (F543479)	Möglicher Transkriptionsregulator	<i>Bacillus cereus</i> (CAB69794)	25	415	121
pAK110	<i>yqhC</i> (AF543479)	Regulator-Protein, ARAC-Typ	<i>E. coli</i> (NP_417483)	89	299	531
pAK110	<i>orf14</i> (AF543479)	Eisen-haltige Alkohol-Dehydrogenas	<i>S. enterica</i> (NP_457557)	90	387	704
pAK110	<i>dkgA*</i> (AF543479)	2,5-Diketo-D-Glukonsäure-Reduktase	<i>E. coli</i> (Q56857)	86	140	254
pAK111	<i>aroD*</i> (AF543477)	3-Dehydroquinat-Dehydratase	<i>S. enteritidis</i> (Q9RN77)	88	90	157
pAK111	<i>ydiF</i> (AF543477)	Potentiellies Membranprotein	<i>E. coli</i> (NP_416209)	85	103	182
pAK111	<i>orf15</i> (AF543477)	Sensor Histidin-Kinase, PleD homolog	<i>Synechocystis sp.</i> (NP_441080)	38	221	150
pAK111	<i>yedA</i> (AF543477)	IS10, Transposase	Plasmid R100 (NP_052934)	99	401	818
pAK111	<i>orf16</i> (AF543477)	Hypothetisches Protein	<i>P. aeruginosa</i> (NP_251460)	46	228	189
pAK112	<i>yjHP*</i> (AF543476)	Mögliche Methyltransferase	<i>E. coli</i> (NP_418726)	93	114	225
pAK112	<i>orf17</i> (AF543476)	Hypothetisches Protein	<i>Y. pestis</i> (NP_405552)	84	277	498
pAK112	<i>orf18</i> (AF543476)	Mögl. transmembranes Efflux-Protein	<i>Streptomyces coelicolor</i> (NP_628101)	46	183	160
pAK112	<i>orf19</i> (AF543476)	Potentiellies integrales Membranprotein	<i>Clostridium perfringens</i> (NP_560977)	95	221	403
pAK113	<i>hutH*</i> (AF543474)	Histidin-Aminolyase	<i>S. typhimurium</i> (NP_459769)	83	361	606

Fortsetzung Tabelle 22

Plasmid	Identifiziertes Gen	Verwandtes Protein	Organismus (Accession des verwandten Proteins)	Identität (%)	Region mit ähnlichen Aminosäuren	Score
pAK113	<i>deoR</i> (AF543474)	Transkriptionsregulator	<i>S. typhimurium</i> (NP_459841)	88	252	454
pAK114	<i>aroD*</i> (AF543473)	3-Dehydroquinat-Dehydratase	<i>S. enterica</i> (Q9RN77)	88	90	157
pAK114	<i>ydiF</i> (AF543473)	Potentielle Membranprotein	<i>E. coli</i> (NP_416209)	85	103	182
pAK114	<i>orf20</i> (AF543473)	Sensor Histidin-Kinase	<i>Synechocystis sp.</i> (NP_441080)	38	221	150
pAK114	<i>orf21*</i> (AF543473)	Mögliche Oxidoreduktase	<i>Xanthomonas axonopodis</i> (NP_641091)	41	244	164
pAK115	<i>glpX*</i> (AF543471)	Glycerin-Metabolismus, Funktion unbekannt	<i>S. typhimurium</i> (NP_462966)	94	308	561
pAK115	<i>glpK</i> (AF543471)	Glycerin-Kinase	<i>E. coli</i> (NP_290555)	92	502	952
pAK115	<i>glpF</i> (AF543471)	Glycerin-Facilitator-Protein	<i>S. enterica</i> (NP_457965)	86	281	490
pAK115	<i>orf22</i> (AF543471)	Mögliche kurzkettige Alkohol-DH	<i>A. tumefaciens</i> (NP_396110)	55	241	243
pAK116	<i>yaaU*</i> (AF543470)	Mögliches Transportprotein	<i>E. coli</i> (NP_414587)	78	66	109
pAK116	<i>orf23</i> (AF543470)	Mögliches Lipoprotein	<i>S. enterica</i> (NP_454690)	83	77	129
pAK116	<i>yabF</i> (AF543470)	Mögl. NAD(P)H-Oxidoreduktase	<i>E. coli</i> (NP_414588)	89	176	355
pAK116	<i>secF</i> (AF543470)	Proteinexport-Protein	<i>E. coli</i> (AAB40165)	88	171	311

Die klonierten DNA-Regionen der anderen 13 Plasmide umfaßten jeweils mehrere potentielle Gene. Zur Identifizierung der für die Carbonylbildung verantwortlichen Proteine in den entsprechenden *E. coli*-Klonen wurden intensive Analysen der Sequenzen vorgenommen und Subklonierungen durchgeführt.

Die Analyse des Inserts von pAK102 ergab vier potentielle offene Leserahmen, die mit *orf2*, *orf3*, *orf4* und *glpK* bezeichnet wurden (s. Abb. 30 u. 31). Der Vergleich mit den Datenbanken ergab für Orf2 und Orf4 Übereinstimmungen von 77 bzw. 83 % zu hypothetischen Proteinen aus *Y. pestis* und *S. typhimurium*, denen bisher noch keine Funktion zugeordnet werden konnte. Orf3 zeigte 44 % Identität zu einer möglichen Acetyltransferase und das *glpK*-Genprodukt zu einer Glycerin-Kinase ebenfalls aus *Y. pestis*. Um das für den Carbonyl-bildenden Phänotyp verantwortliche Gen zu identifizieren wurden 3 Subklone konstruiert (s. Abb. 31). Das Plasmid pAK102.1 wurde durch Restriktionsverdau von pAK102 mit *SalI* und anschließende Religation erhalten. Zur Konstruktion von pAK102.2 und pAK102.3 wurde ein Verdau mit *SacI* durchgeführt, dabei wurde ein ca. 1,8 kb-Fragment in den entsprechend geschnittenen Vektor pBluescript SK⁺ kloniert, und das verbleibende Fragment von pAK102 religiert. Die drei Plasmide wurden mittels Elektroporation in *E. coli* ECL707 transformiert und anschließend mit Hilfe der Indikatorplatten (s. 2.2.5) auf ihren Carbonyl-bildenden Phänotyp hin überprüft. Lediglich pAK102.1, das das unvollständige *orf2*-Gen und das *glpK*-Gen enthielt, zeigte den gleichen Phänotyp wie das Ausgangsplasmid. Da das Gen *orf2* auf diesem Plasmid nicht vollständig kloniert wurde, ist es wahrscheinlich, das GlpK die Carbonylbildung aus den Substraten indirekt katalysiert. Möglicherweise wurden die Substrate durch die heterolog produzierte Glycerin-Kinase phosphoryliert und anschließend durch eine wirtseigene Dehydrogenase (z.B. Glycerin-3-Phosphat-Dehydrogenase) oxidiert. Dies würde auch die fehlende NAD⁺-abhängige Dehydrogenase-Aktivität des Klons erklären.

Abbildung 31: Darstellung der genetischen Organisation von pAK102 (A) und die Positionen der subklonierten Fragmente (B)

Die Pfeile markieren Länge und Orientierung von möglichen offenen Leserahmen. Die für die Subklonierungen relevanten Restriktionsschnittstellen sind angegeben. Bereiche, die den Vektor pBluescriptSK+ darstellen sind grau unterlegt.

Interessanterweise war auch auf dem Plasmid pAK115 ein Genprodukt mit hohen Ähnlichkeiten zu einer Glycerin-Kinase aus *E. coli* kodiert (s. Abb. 30 u. 32). Mit *glpX* und *glpF* waren auf diesem Plasmid noch weitere Gene vorhanden, die dem Glycerin-Metabolismus zugeordnet werden konnten. Ebenso interessant im Bezug auf die Carbonylbildung des entsprechenden *E. coli*-Klons, war der mit *orf22* bezeichnete offene Leserahmen. Das 247 Aminosäuren lange Genprodukt war verwandt zu einer kurzkettigen, Typ II-Alkohol-Dehydrogenase aus *A. tumefaciens*. Die Mitglieder dieser Familie sind Proteine mit zumeist 250 bis 300 Aminosäuren Länge und enthalten außerdem das folgende typische Erkennungsmotiv: ([LIVSPADNK]-x(12)-Y-[PSTAGNCV]-[STAGNQCIVM]-[STAGC]-K-{PC}-[SAGFYR]-[LIVMSTAGD]-x(2)-[LIVMFYW]-x(3)-[LIVMFYWGAAPTHQ]-[GSACQRHM]). Das Motiv enthält zwei perfekt konservierte Reste, ein Tyrosin und ein Lysin, wobei das Tyrosin am katalytischen Mechanismus der Enzyme beteiligt ist (FALQUET et al., 2002). Dieses Sequenzmotiv war bis auf die erste Aminosäure ([LIVSPADNK]), die durch einen Cytosin-Rest ersetzt war, ebenfalls vollständig in Orf22 enthalten (Aminosäuren 143 bis 171). Die Subklonierung des Plasmids pAK115 durch einen Restriktionsverdau mit dem Enzym *HindIII* erbrachte zwei neue Plasmide. pAK115.1 wurde durch Religation erhalten, pAK115.2 enthielt ein ca. 2,6 kBp-großes Fragment mit den Genen *glpF* und *orf22* (s. Abb. 32). Beide Plasmide wurden in *E. coli* ECL707 transformiert und die resultierenden rekombinanten Klone wurden auf den Carbonyl-Indikatorplatten

inkubiert. Es zeigte sich, dass sowohl *E. coli* ECL/pAK115.1 als auch *E. coli* ECL/pAK115.2 die typische Rotfärbung des Agars verursachten. Wiederum war die Glycerin-Kinase in der Lage, den Phänotyp auf indirektem Wege zu vermitteln. Andererseits ermöglichte auch das für eine Alkohol-Dehydrogenase kodierende Orf22-Gen die Carbonylbildung in *E. coli* auf den getesteten Substraten.

Abbildung 32: Darstellung der genetischen Organisation von pAK115 (A) und die Positionen der subklonierten Fragmente (B)

Die Pfeile markieren Länge und Orientierung von möglichen offenen Leserahmen. Die für die Subklonierungen relevanten Restriktionsschnittstellen sind angegeben. Bereiche, die den Vektor pBluescript SK+ darstellen sind grau unterlegt.

Auf dem Plasmid pAK110 konnte ebenfalls ein Gen identifiziert werden, das für eine Alkohol-Dehydrogenase kodierte. Orf14 umfaßte 387 Aminosäuren und zeigte 90 % Identität zu einer möglichen Eisen-haltigen TypIII-Alkohol-Dehydrogenase aus *S. enterica* (s. Abb. 30). Zur Erkennung von Mitgliedern dieser Dehydrogenase-Familie sind in den PROSITE-Datenbanken zwei spezifische Motive vorhanden. Das erste ist [STALIV]-[LIVF]-x-[DE]-x(6,7)-P-x(4)[ALIV]-x-[GST]-x(2)-D-[TAIVM]-[LIVMF]-x(4)-E und das zweite lautet [GSW]-x-[LIVTSACD]-[GH]-x(2)-[GSAE]-[GSHYQ]-x-[LIVTP]-[GAST]-[GAS]-x(3)-[LIVMT]-x-[HNS]-[GA]-x-[GTAC]. Beide Motive waren vollständig im *orf14*-Genprodukt wiederzufinden (Aminosäuren 173 bis 201 und 264 und 284), ferner war der korrespondierende *E. coli*-Klon in der Lage ein Reihe von Polyolen umzusetzen (s. Tab. 20), die für die Typ III Alkohol-Dehydrogenasen typisch sind. Der experimentelle Nachweis, dass das Gen tatsächlich für den Phänotyp verantwortlich war, steht noch aus.

Bei der Subklonierung der Inserts von pAK107, pAK109 und pAK116 konnten weitere für die Carbonylbildung verantwortliche Gene identifiziert werden. Das Plasmid

pAK107 besaß mit 1109 Bp eine relativ kleines Insert, auf dem zwei mögliche offene Leserahmen identifiziert werden konnten (s. Abb. 30 u. 33). Die mit *sucA* und *sucB* bezeichneten Gene zeigten 74 bzw. 60 % Übereinstimmung zu den Untereinheiten der 2-Oxoglutarat-Dehydrogenase aus *V. cholerae*. Die Subklonierung dieses Plasmids zeigte, dass lediglich das für 214 Aminosäuren kodierende SucB-Gen für die Umsetzung der Polyole durch *E. coli* notwendig war. Durch den Verdau des Plasmids mit *KpnI* wurden wiederum 2 Plasmide konstruiert (s. Abb. 33). Nur pAK107.1, auf dem allein *sucB* vorhanden war, konnte in *E. coli* den zuvor beobachteten, rot färbenden Phänotyp vermitteln.

Die Analyse des Inserts von pAK109 ergab zwei potentielle offene Leserahmen, die mit *fdhD* und *orf13* bezeichnet wurden (s. Abb. 30 u. 34). Das von *fdhD* abgeleitete Genprodukt bestand aus 218 Aminosäuren und zeigte 88% Übereinstimmung zum FdhD-Protein aus *S. enterica*, das wahrscheinlich notwendig ist für die Aktivität der Formiat-Dehydrogenase. In *X. campestris* und *M. loti* ist dieses Protein Teil der Formiat-Dehydrogenase. Um nachzuweisen, dass dieses Protein in *E. coli* die Carbonylbildung aus verschiedenen Polyolen ermöglichte, wurde das Plasmid pAK109 subkloniert. Es erfolgte ein Restriktionsverdau mit *EcoO109I* und die anschließende Religation. Das resultierende Plasmid pAK109.1 wurde in *E. coli* ECL707 transformiert und die entsprechenden Klone zeigten die typische Rotfärbung auf den Indikatorplatten (s. 2.2.5).

Abbildung 33: Darstellung der genetischen Organisation von pAK107 (A) und die Positionen der subklonierten Fragmente (B)

Die Pfeile markieren Länge und Orientierung von möglichen offenen Leserahmen. Die für die Subklonierungen relevanten Restriktionsschnittstellen sind angegeben. Bereiche, die den Vektor pBluescriptSK+ darstellen sind grau unterlegt.

Abbildung 34: Darstellung der genetischen Organisation von pAK109 (A) und die Position des subklonierten Fragmentes (B)

Die Pfeile markieren Länge und Orientierung von möglichen offenen Leserahmen. Die für die Subklonierungen relevanten Restriktionsschnittstellen sind angegeben. Bereiche, die den Vektor pBluescriptSK⁺ darstellen sind grau unterlegt.

Das Plasmid pAK116 umfaßte 1982 Bp und beinhaltete fünf mögliche offene Leserahmen (s. Abb. 30). Drei der daraus abgeleiteten Proteine zeigten Ähnlichkeiten zu verschiedenen Transportproteinen und einem Lipoprotein. Für den Carbonyl-bildenden Phänotyp und die ADH-Aktivität des entsprechenden *E. coli*-Klons war wahrscheinlich das *yabF*-Genprodukt verantwortlich, welches aus 176 Aminosäuren besteht und 89 % Identität zu einer NAD(P)H-abhängigen Oxidoreduktase aus *E. coli* zeigte. Der experimentelle Nachweis, dass das Gen in *E. coli* den beschriebenen Phänotyp vermittelt, steht noch aus.

Die offenen Leserahmen *phsC* und *orf21* auf den Plasmiden pAK103 und pAK114 zeigten ebenfalls signifikante Ähnlichkeiten zu einer bekannten Oxidoreduktase bzw. einer Thiosulfat-Reduktase, beide Gene waren jedoch unvollständig kloniert. (s. Abb. 30 und Tab. 22).

Die verbleibenden Plasmide pAK104, pAK106 und pAK111-113 enthielten eine Anzahl von Genen und potentiellen Leserahmen, die einer Reihe von metabolischen Reaktionen zugeordnet werden konnten oder mit unbekannter Funktion. Ähnlichkeiten zu bekannten Genen für Alkohol-Oxidoreduktasen oder anderen Reduktasen traten nicht auf. Eine Identifikation der für den Phänotyp verantwortlichen Gene und Genprodukte war bisher weder durch die Sequenzanalyse noch durch Subklonierungsexperimente erfolgreich. Interessanterweise zeigten die Rohextrakte von *E. coli* DH5α/pAK103-104 und *E. coli* DH5α/pAK112-113 im Enzymtest deutliche NAD(H)-abhängige Alkohol-Dehydrogenase-Aktivität (s. Tab. 20). Die auf den Plasmiden kodierten Gene wiesen jedoch keinerlei Übereinstimmung mit Oxidoreduktasen der bekannten Typen auf.

Möglicherweise waren hier völlig neue Arten von Enzymen und Reaktionen beteiligt oder die heterolog in den rekombinanten *E. coli*-Stämmen produzierten Proteine vermittelten den Carbonyl-bildenden Phänotyp auf einem bisher unbekannten Weg.

3.4.3 Durchmusterung der nicht anreicherten Umweltgenbanken WN, FN und ZB

Für die Konstruktion der Genbanken WN, FN und ZB wurden Bodenproben einer Wiese, eines brachliegenden Feldes bei Northeim und eines Zuckerrübenfeldes bei Göttingen verwendet (HENNE, 2000). Die Isolierung der chromosomalen DNA wurde ohne einen speziellen Anreicherungsschritt vorgenommen, es handelt sich also um Metagenombanken aus natürlichen Habitaten. Die durchschnittlichen Insertgrößen der Plasmide lagen zwischen 3,5 und 4,4 kBp (s. Tab. 23), der Anteil der Insert-tragenden Plasmide bei ca. 80 % (HENNE, 2000). Die Genbanken umfaßten 342000, 360000 und 583000 rekombinanter Plasmide. Diese Werte lagen im Bereich für andere aus ähnlichen Bodenproben konstruierten Genbanken.

Tabelle 23: **Eigenschaften der Umweltgenbanken aus den Umweltproben Wiese bei Northeim (WN), Feld bei Northeim (FN) und Zuckerrübenboden bei Göttingen (ZB), sowie die Anzahl der getesteten Klone**

Die Angaben zur Anzahl der rekombinanten Plasmide und der durchschnittlichen Insertgrößen wurden von HENNE, 2000 übernommen.

Bezeichnung der Genbank	Anzahl rekombinanter Plasmide	Ø Insertgröße [kBp]	Anzahl getesteter <i>E. coli</i> -Klone je Substrat
WN	583000	4,4	500000
FN	324000	3,5	300000
ZB	360000	3,8	200000

Zur Identifizierung von neuartigen, Polyol-verwertenden Oxidoreduktasen wurden die Plasmide der Genbanken per Elektroporation in *E. coli* ECL707 transformiert und die resultierenden Klone auf Carbonyl-Indikatoragar (s. 2.2.5) ausplattiert. Analog zur Durchmusterung der Anreicherungsgenbanken wurden als Substrate 1,2-Ethandiol, 2,3-Butandiol oder ein Gemisch aus 1,2-Propandiol und Glycerin verwendet (s. Kap. 3.4.2). Auf diese Weise wurden 1.000.000 Klone je Substrat getestet, insgesamt 3 Millionen

Klone (s. Tab. 24). Beim initialen Screening konnten 24 Carbonyl-produzierende *E. coli*-Klone detektiert werden. Die enthaltenen Plasmide wurden isoliert und anschließend in den Wirtsstamm *E. coli* ECL707 retransformiert. 15 Plasmide vermittelten einen stabilen Phänotyp, sie wurden mit pAK201 bis pAK215 bezeichnet (s. Tab. 24). Wie auch bei der Durchmusterung der Anreicherungsdatenbanken konnten auf dem Substrat-Gemisch aus Glycerin und 1,2-Propandiol die meisten positiven Klone erhalten werden (neun). Das Screening auf 1,2-Ethandiol und 2,3-Butandiol erbrachte jeweils drei positive Klone. Je 200000 getesteter Klone konnte ein positiver Klon identifiziert werden, die Trefferquote war somit deutlich geringer als bei der Durchmusterung der angereicherten Genbanken (1:75000).

Tabelle 24: Durchmusterung der Metagenombanken WN, FN und ZB auf Gene für Polyol-verwertende Oxidoreduktasen

Das Screening wurde durch Transformation mittels Elektroporation von je 1 µl Plasmidgenbank in den Stamm *E. coli* ECL707 durchgeführt. Die Transformanten wurden bei 30 oder 37 °C unter aeroben Bedingungen auf Indikatormedium (s. 2.2.5) mit 1 % 1,2-Ethandiol, 2,3-Butandiol oder einem Glycerin/1,2-Propandiol-Gemisch als Substrat inkubiert.

Testsubstrat	Genbank	Positive <i>E. coli</i> -Klone nach initialem Screening	Positive <i>E. coli</i> -Klone mit stabilem Phänotyp	Bezeichnung der Aktivitäts-vermittelnden Plasmide
Glycerin/1,2-Propandiol	WN	7	4	pAK201-203 & 207
	FN	5	3	pAK211-213
	ZB	3	2	pAK214-215
1,2-Ethandiol	WN	5	3	pAK206, 208 & 210
	FN	0	0	-
	ZB	0	0	-
2,3-Butandiol	WN	3	2	pAK204-205
	FN	0	0	-
	ZB	1	1	pAK209

Die rekombinanten Plasmide und ihre korrespondierenden *E. coli*-Klone ECL707/pAK201-pAK215 wurden anschließend eingehend charakterisiert. Dazu

gehörte eine biochemische Analyse, die Sequenzierung der Plasmidinserts und die Analyse der Sequenzdaten.

3.4.3.1 Biochemische Charakterisierung der rekombinanten *E. coli*-Stämme pAK201 bis pAK215

Die Experimente zur biochemischen Charakterisierung der von den Plasmiden pAK201 bis pAK215 kodierten Genprodukte konzentrierte sich wiederum auf die Identifizierung von Proteinen, die eine Nikotinamid-abhängige Oxidation von kurzkettigen Polyolen und die Reduktion der korrespondierenden Carbonyle katalysierten. Zu diesem Zweck wurden die Plasmide in *E. coli* DH5 α transformiert und in LB-Medium (s. 2.2.1) mit den entsprechenden Substraten angezogen. Die geernteten Zellen wurden in KP-Puffer aufgenommen und mittels French-Pressen wurden Rohextrakte hergestellt (s. 2.14). Als Referenz diente analog zu den Messungen mit den Extrakten aus *E. coli* pAK101 bis pAK116 der Stamm *E. coli* DH5 α /pBluescriptSK⁺. Anschließend wurden mit Hilfe der unter 2.16.2 beschriebenen Enzymtests die spezifischen Aktivitäten der NAD(P)H-abhängigen Alkohol-Dehydrogenasen bestimmt (s. Tab. 25). Als Substrate in den Oxidationsreaktionen dienten 1,2-Propandiol, Glycerin, 1,2-Ethandiol, 2,3-Butandiol und 1,2,4-Butantriol. Zur Überprüfung der Spezifität der Reduktionsreaktionen wurden Dihydroxyaceton, Hydroxyaceton, Glykolaldehyd und Diacetyl eingesetzt. Eine NADP(H)-abhängige Aktivität konnte bei den gewählten Reaktionsbedingungen in keinem der untersuchten Rohextrakte festgestellt werden. Die Extrakte von *E. coli* DH5 α /pAK204, *E. coli* DH5 α /pAK206, *E. coli* DH5 α /pAK208 und *E. coli* DH5 α /pAK210-213 zeigten jedoch eine signifikante NAD⁺-abhängige Oxidation sowie eine NADH-vermittelte Reduktion von einem oder mehreren Substraten. Die Werte in den Rohextrakten der anderen acht Klone lagen im Bereich der Negativ-Kontrolle. Daher waren auf diesen Plasmiden wahrscheinlich keine Nikotinamid-abhängige Enzyme kodiert. Wie zuvor beschrieben könnten hier andere Arten von Enzymen oder Reaktionen die Carbonylbildung in *E. coli* vermitteln. Andererseits besteht die Möglichkeit, dass die gewählten Expressions- und/oder Reaktionsbedingungen für einige der Enzyme nicht ideal waren.

Tabelle 25:

Spezifität der NAD(H)-abhängigen Dehydrogenase-Aktivität in den Rohextrakten von *E. coli* DH5 α /pAK204, *E. coli* DH5 α /pAK206, *E. coli* DH5 α /pAK208 und *E. coli* DH5 α /pAK210 – 213

Die Zellanzucht erfolgt in LB-Medium (s. 2.2.1) mit jeweils 1 % des beim Screening eingesetzten Substrats in einem Kulturvolumen von 250 ml. Die Herstellung der Rohextrakte und die Bestimmung der Enzymaktivitäten erfolgte wie unter 2.14 und 2.16.2 beschrieben. Die jeweils höchste gemessene Aktivität wurde gleich 100 % gesetzt.

Reaktion und Substrat	Relative spezifische Alkohol-Dehydrogenase-Aktivität (%)					
	pAK204	pAK206	pAK208	pAK210	pAK211	pAK212 pAK213
<u>Oxidation^a</u>						
1,2-Ethandiol	27	-	-	-	-	100
1,2-Propandiol	100	100	100	100	100	-
2,3-Butandiol	54	19	35	31	65	23 -
Glycerin	62	26	45	31	65	46 -
1,2,4-Butantriol	24	29	26	39	43	31 -
<u>Reduktion^b</u>						
Dihydroxyacetone	-	100	88	100	-	- -
Hydroxyacetone	-	-	52	-	-	- -
Glycolaldehyd	-	55	100	-	100	100
Diacetyl	-	-	-	-	-	30

^a, ^b Die spezifischen Aktivitäten in den Oxidations- und Reduktionsreaktionen wurden relativ zu den jeweils höchsten angegeben. Oxidation: pAK204, 0,071 U/mg; pAK206, 0,027 U/mg; pAK208, 0,031 U/mg; pAK210, 0,013 U/mg; pAK211, 0,023 U/mg; pAK212, 0,013 U/mg; pAK213, 0,044 U/mg. Reduktion: pAK206, 0,065 U/mg; pAK208, 0,066 U/mg; pAK210, 0,016 U/mg; pAK211, 0,019 U/mg; pAK213, 0,037 U/mg.

Die *E. coli*-Klone, die die Plasmide pAK204, pAK206, pAK208 und pAK210-212 beinhalten, besaßen ein breites Substratspektrum bei der Oxidation der getesteten Polyole. Bevorzugtes Substrat war in allen Fällen 1,2-Propandiol. Lediglich *E. coli*/pAK213 zeigte eine spezifische Reaktion mit 1,2-Ethandiol (s. Tab. 25). Des Weiteren konnte bei *E. coli*/pAK204 eine Umsetzung von primären und sekundären Alkoholen (Ethanol und 1-Propanol) beobachtet werden. Die relativen, spezifischen Aktivitäten lagen jedoch nur bei 6 bzw. 14 % (Daten nicht gezeigt).

Die Untersuchung der Reduktionsreaktion in den einzelnen Extrakten zeigte vergleichbar mit den Klonen aus den Anreicherungsbanken (s. Kap. 3.4.2.1) eine höhere Spezifität. Die höchsten Aktivitäten wurden mit Dihydroxyaceton (*E. coli*/pAK206 und *E. coli*/pAK210) und Glykolaldehyd (*E. coli*/pAK208, *E. coli*/pAK211 und *E. coli*/pAK213) erhalten. Eine Reduktion der Substrate Glyceraldehyd, Methylglyoxal und Aceton konnte nicht beobachtet werden (Daten nicht gezeigt). Für *E. coli*/pAK204 und *E. coli*/pAK212 konnte unter den gewählten Versuchsbedingungen mit keinem der getesteten Substrate eine signifikante Umsetzung festgestellt werden.

3.4.3.2 Molekulare Analyse der Plasmide pAK201 bis 215

Die inserierten DNA-Fragmente der Plasmide pAK201 bis pAK215 wurden durch das „Göttingen Genomics Laboratory“ (Institut für Mikrobiologie und Genetik, Universität Göttingen) nach der Methode von SANGER (1977) in beiden Orientierungen sequenziert. Die Sequenzierung erbrachte Insertgrößen von 794 Bp (pAK213) bis zu 5555 Bp (pAK208) (s. Tab. 26). Der GC-Gehalt lag bei den meisten Inserts in einem Bereich von 60 bis 69 %, lediglich für die Plasmide pAK214 und pAK215 wurden mit 38 und 44 % niedrigere Werte bestimmt (s. Tab. 26).

Tabelle 26: Insertgrößen und GC-Gehalte der Plasmide pAK201 bis 215

Plasmid	Insertgröße	GC-Gehalt
pAK201	2117 Bp	65 %
pAK202	2301 Bp	63 %
pAK203	2650 Bp	62 %
pAK204	1408 Bp	68 %
pAK205	2052 Bp	66 %
pAK206	2851 Bp	69 %
pAK207	3550 Bp	62 %
pAK208	5555 Bp	61 %
pAK209	2519 Bp	65 %
pAK210	1113 Bp	64 %
pAK211	2596 Bp	64 %
pAK212	1868 Bp	63 %
pAK213	794 Bp	60 %
pAK214	1784 Bp	38 %
pAK215	1427 Bp	44 %

Durch eine eingehende Analyse der DNA-Sequenzen mit dem Programm DNA Strider 1.2 und dem Vergleich der abgeleiteten Aminosäuresequenzen mit den in den Datenbanken der NCBI, von PROSITE und Pfam gespeicherten Proteinen konnten 40 potentielle Protein-kodierende Gene identifiziert werden. 26 davon lagen vollständig, 14 unvollständig kloniert vor (s. Abb. 35 und Tab. 27). 23 der identifizierten Gene zeigten Ähnlichkeiten zu Genen oder Genprodukten einer großen Anzahl unterschiedlicher Mikroorganismen. Dazu gehörten u. a. Vertreter der Gattungen *Sinorhizobium*, *Ralstonia*, *Chlorobium*, *Salmonella*, *Bacillus* und *Xanthomonas*. Das mit *orf17* bezeichnete Gen auf Plasmid pAK208 war außerdem verwandt zu einem Gen für ein hypothetisches Protein des methanogenen Archaeons *Methanosarcina mazei*. Eine Häufung der Ähnlichkeiten zu Genen aus Gattungen der Enterobakterien war im Vergleich zu den Plasmiden pAK101 bis pAK116 nicht festzustellen. Die restlichen 17

potentiellen offenen Leserahmen zeigten keinerlei Übereinstimmungen mit den in den Datenbanken erfaßten Gen- und Proteindaten.

Die Mehrheit der festgestellten Identitäten zu den bereits bekannten Genen lag unter 50 %. Dies und die Tatsache dass beinahe die Hälfte der vorhergesagten Gene keinem Homologen zugeordnet werden konnten, ließ die Schlußfolgerung zu, dass die verwendeten Genbanken, Gene aus einer großen Anzahl von Mikroorganismen enthielten, die bisher noch nicht untersucht oder noch nicht kultiviert worden sind.

Die weiteren Analysen der Gene und Genprodukte beschränkte sich im Wesentlichen auf die Plasmide pAK204, pAK206, pAK208 und pAK210-213, da diese eine signifikante NAD(H)-abhängige Alkohol-Dehydrogenase-Aktivität in *E. coli* vermittelten (s. Tab. 25). Keines der Plasmide beinhaltete Gene, die Ähnlichkeiten zu den bekannten NAD(H)-abhängigen Enzymen dieser Klasse aufwiesen außer *orf27* auf pAK213. Dieses nur partiell klonierte Gen (426 Bp) war zu 26 % identisch zu der C-terminalen Region einer Aldehyd-Dehydrogenase aus *Brucella melitensis* (s. Tab. 27). Ob dieses Gen tatsächlich für den Carbonyl-produzierenden Phänotyp in *E. coli* verantwortlich war, muß noch durch Subklonierungsexperimente überprüft werden.

Die vorhergesagten Gene und Genprodukte auf den anderen 6 Plasmiden zeigten keinerlei Übereinstimmung mit den bisher untersuchten Alkohol-Dehydrogenasen oder zu anderen Oxidoreduktasen. In den meisten Fällen konnte keinerlei Verwandtschaft zu in den Datenbanken der NCBI gespeicherten Proteinsequenzen gefunden werden.

Abbildung 35: Genetische Organisation der Plasmide pAK201 bis pAK215

Die Pfeile markieren Länge und Orientierung von möglichen offenen Leserahmen. Die Sternchen zeigen unvollständige Gene an. Bezeichnungen von offenen Leserahmen, deren abgeleitetes Genprodukt Ähnlichkeiten zu Alkohol-Dehydrogenasen bzw. Oxidoreduktasen aus anderen Organismen aufweist, sind in Rot bzw. Blau dargestellt. Gene, die als verantwortlich für den Carbonyl-bildenden Phänotyp der *E. coli*-Klone identifiziert wurden, sind grau markiert.

Tabelle 27: **Identifizierte Gene auf den Plasmiden pAK201 bis pAK215, Accession-Nummern und Ähnlichkeiten zu bekannten Proteinen**

Die Identifizierung der verwandten Proteine zu den vorhergesagten Genprodukten sowie die Determinierung der Sequenzähnlichkeiten (in %) und des Score geschah mit Hilfe der BLAST-Programme der NCBI. Unvollständige Gene sind durch Sterne gekennzeichnet. Die Namen der Gene, die als verantwortlich für die Carbonylbildung identifiziert wurden, sind fettgedruckt.

Plasmid	Identifiziertes Gen	Verwandtes Protein	Organismus (Accession des verwandten Proteins)	Identität (%)	Region mit ähnlichen Aminosäuren	Score
pAK201	<i>orf1</i> *	Potentielle transmembrane Hydrolase	<i>R. solanacearum</i> (NP_521794)	32	176	89
			<i>Y. pestis</i> (NP_405492)	33	154	86
pAK201	<i>orf2</i>	Kein ähnliches Protein	-	-	-	-
pAK201	<i>orf3</i> *	Kein ähnliches Protein	-	-	-	-
pAK202	<i>orf4</i>	Kein ähnliches Protein	-	-	-	-
pAK202	<i>orf5</i>	Kein ähnliches Protein	-	-	-	-
pAK202	<i>glgB</i> *	1,4- α -Glukan-spaltendes Enzym	<i>Aquifex aeolicus</i> (NP_213496)	48	307	314
			<i>S. typhimurium</i> (NP_462439)	48	300	291
pAK203	<i>orn</i>	Wahrscheinliche Oligoribonuklease	<i>R. solanacearum</i> (NP_519063))	62	174	248
			<i>Neisseria meningitidis</i> (NP_283406)	53	174	218
pAK203	<i>pgi</i>	Glukose-6-phosphat-Isomerase	<i>Chlorobium tepidum</i> (NP_661881)	58	540	630
			<i>N. meningitidis</i> (NP_284321)	55	547	603
pAK204	<i>orf6</i>	Kein ähnliches Protein	-	-	-	-

Fortsetzung Tabelle 27

Plasmid	Identifiziertes Gen	Verwandtes Protein	Organismus (Accession des verwandten Proteins)	Identität (%)	Region mit ähnlichen Aminosäuren	Score
pAK204	<i>orf7</i>	Hypothetisches Protein	<i>S. meliloti</i> (NP_437360) <i>M. loti</i> (NP_103287)	65 53	121 118	162 132
pAK205	<i>orf8</i>	CO-Dehydrogenase, kurze Kette	<i>Hydrogenophaga pseudoflava</i> (P11915) <i>Sulfolobus solfataricus</i> (NP_343786)	64 65	145 144	213 210
pAK205	<i>orf9*</i>	CO-Dehydrogenase, lange Kette; mögliche Aldehyd oder Keton- Oxidoreduktase, große Untereinheit	<i>M. loti</i> (NP_102786) <i>Aeropyrum pernix</i> (NP_147434) <i>Arthrobacter nicotinovorans</i> (CAC37487)	40 39 34	399 391 395	286 257 215
pAK206	<i>orf10</i>	Kein ähnliches Protein	-	-	-	-
pAK206	<i>orf11</i>	Hypothetisches Protein	<i>R. solanacearum</i> (NP_522197) <i>S. coelicolor</i> (NP_628915)	56 57	401 399	412 405
pAK206	<i>orf12</i>	Hypothetisches Protein	<i>P. aeruginosa</i> (NP_250045)	70	51	72
pAK207	<i>orf13</i>	Kein ähnliches Protein	-	-	-	-
pAK207	<i>orf14</i>	Mögliches Membranprotein	<i>E. coli</i> (NP_415890) Lambda (PO3764)	25 22	169 338	52 51
pAK207	<i>orf15</i>	Kein ähnliches Protein	-	-	-	-
pAK208	<i>orf16</i>	Potentieller Transkriptionsregulator	<i>M. loti</i> (NP_107091) <i>R. solanacearum</i> (NP_519114)	42 41	99 101	84 79
pAK208	<i>orf17</i>	Hypothetisches Protein	<i>Methanosarcina mazei</i> (NP_63524) <i>Ms. acetivorans</i> (NP_618485)	47 45	150 153	135 132
pAK203	<i>orf18</i>	Kein ähnliches Protein	-	-	-	-

Fortsetzung Tabelle 27

Plasmid	Identifiziertes Gen	Verwandtes Protein	Organismus (Accession des verwandten Proteins)	Identität (%)	Region mit ähnlichen Aminosäuren	Score
pAK208	<i>orf19</i>	Kein ähnliches Protein	-	-	-	-
pAK208	<i>orf20</i>	Nodulin-verwandtes Protein	<i>M. loti</i> (NP_107091)	43	225	182
			<i>Caulobacter crescentus</i> (NP_419534)	43	224	171
pAK208	<i>orf21</i>	Alpha/beta-Hydrolase	<i>Bacillus anthracis</i> (NP_657047)	28	239	83
pAK209	<i>cysD</i>	ATP-Sulfurylase, kleine Untereinheit	<i>C. crescentus</i> (NP_420294)	76	299	484
			<i>P. aeruginosa</i> (NP_253133)	72	302	457
pAK209	<i>nodO*</i>	ATP-Sulfurylase, große Untereinheit	<i>C. crescentus</i> (NP_420293)	73	425	622
			<i>Xantomonas campestris</i> (NP_638517)	66	414	550
pAK210	<i>orf22*</i>	Kein ähnliches Protein	-	-	-	-
pAK210	<i>orf23*</i>	Kein ähnliches Protein	-	-	-	-
pAK211	<i>orf24</i>	Hypothetisches Protein	<i>S. meliloti</i> (NP_436746)	56	231	259
pAK211	<i>vacJ</i>	Lipoprotein	<i>X. campestris</i> (NP_639546)	44	225	150
			<i>X. axonopodis</i> (NP-644638)	39	237	149
pAK211	<i>yegO*</i>	Mögliches Resistenzprotein, Efflux-Transporter	<i>S. typhimurium</i> (NP_461073)	52	237	242
			<i>E. coli</i> (NP_288584)	52	237	241
pAK212	<i>orf25</i>	Kein ähnliches Protein	-	-	-	-
pAK212	<i>orf26*</i>	Kein ähnliches Protein	-	-	-	-
pAK213	<i>orf27*</i>	Aldehyd-Dehydrogenase	<i>Brucella melitensis</i> (NP_541260)	26	92	29
pAK213	<i>orf28*</i>	Kein ähnliches Protein	-	-	-	-

Fortsetzung Tabelle 27

Plasmid	Identifiziertes Gen	Verwandtes Protein	Organismus (Accession des verwandten Proteins)	Identität (%)	Region mit ähnlichen Aminosäuren	Score
pAK214	<i>orf29*</i>	Kein ähnliches Protein	-	-	-	-
pAK214	<i>orf30</i>	FeS-bindendes Protein, FeS-Oxidoreduktase	<i>B. halodurans</i> (NP_244669) <i>B. anthracis</i> (NP_653806)	44 44	261 258	220 212
pAK214	<i>orf31*</i>	Kein ähnliches Protein	-	-	-	-
pAK215	<i>metF*</i>	5.10-Methylentetrahydrofolat- Reduktase	<i>R. solanacearum</i> (NP_518212) <i>P. aeruginosa</i> (NP_249129)	60 60	243 245	308 300
pAK215	<i>smg</i>	Mögliches Smg-Protein	<i>V. cholerae</i> (NP_229703) <i>X. axonopodis</i> (NP_644110)	30 30	157 156	96 93

Um die Gene zu identifizieren, die für die Carbonylbildung in den korrespondierenden *E. coli*-Klonen verantwortlich waren, wurden Subklonierungen durchgeführt. Diese Methode war erfolgreich für die Plasmide pAK204, pAK211 und pAK212 (s. Abb. 36). Das Plasmid pAK204 wurde zum einen mit dem Restriktionsenzym *NotI* und zum anderen mit *SalI* verdaut, die resultierenden Fragmente wurden religiert und mit pAK204.1 und pAK204.2 bezeichnet (s. Abb. 36B). Nach Transformation in *E. coli* ECL707 und Inkubation auf den Carbonyl-Indikatorplatten mit den Substraten 1,2-Propandiol/Glycerin, 1,2-Ethandiol oder 2,3-Butandiol vermittelte lediglich pAK204.2, das das mit *orf6* bezeichnete Gen enthielt, den gleichen Phänotyp wie das Ausgangsplasmid.

Die Subklonierung von pAK211 erfolgte ebenfalls durch den Einsatz von zwei Restriktionsenzymen. Das Plasmid pAK211.1 wurde nach Religation eines *EcoRV*-Verdau erhalten, pAK211.2 trug das dabei ausgeschnittene Fragment in pBluescript SK⁺. Das Plasmid pAK211.3 enthielt ein ca. 1,0 kb-großes *AccI*-Fragment ebenfalls im Klonierungsvektor pBluescript SK⁺ (s. Abb. 36D). Eine positive Reaktion im anschließenden Plattentest zeigten die *E. coli*-Klone pAK211.1 und pAK211.3, die beide *orf24* trugen.

Das 1868 Bp-große Insert von pAK212 beinhaltete die offenen Leserahmen *orf25* und *orf26*, die beide keine Homologien zu bisher bekannten Proteinen aufwiesen. Die Subklonierung erfolgte mit den Enzymen *SmaI* und *SacII*. Der Verdau mit *SmaI* erbrachte nach Religation bzw. der Klonierung des ausgeschnittenen Fragmentes in pBluescript SK⁺ die Plasmide pAK212.1 und pAK212.2. Für die Konstruktion von pAK212.3 wurde ein 1,3 kbp-großes *SacII*-Fragment ebenfalls in pBluescriptSK⁺ ligiert (s. Abb. 36F). Die Plasmide wurden zur Überprüfung des Phänotyps wiederum in *E. coli* ECL707 transformiert, dabei zeigten lediglich die Kolonien von *E. coli*/pAK212.3 die typische Rotfärbung. Der Carbonyl-bildende Phänotyp ist daher auf die Aktivität des *orf25*-Genprodukts zurückzuführen.

Abbildung 36: Darstellung der genetischen Organisation von pAK204 (A), pAK211 (C) und pAK212 (E) sowie die Positionen der subklonierten Fragmente (B, D und F)

Die Pfeile markieren Länge und Orientierung von möglichen offenen Leserahmen. Die für die Subklonierungen relevanten Restriktionsschnittstellen sind angegeben. Bereiche, die den Vektor pBluescriptSK⁺ darstellen sind grau unterlegt.

Alle drei identifizierten Gene *orf6*, *orf24* und *orf25* wiesen in der Nähe des Startkodons mögliche Ribosomenbindestellen auf. Das *orf6*-Gen (681 Bp) kodierte für ein Protein mit einer vorhergesagten molekularen Masse von 24590 Da, *orf25* (546 Bp) für eines mit 19101 Da. Beide Proteinsequenzen zeigten keinerlei signifikante Ähnlichkeiten zu bekannten Proteinen. Das *Orf24*-Gen kodierte für 269 Aminosäuren (29738 Da) und zeigte 56 % Übereinstimmung zu einem hypothetischen, bisher nicht charakterisierten Protein aus *S. meliloti*. (s. Tab. 27).

Einige der bekannten NAD(P)-abhängigen Alkohol-Dehydrogenasen besitzen in der Aminosäuresequenz Glycin-reiche Regionen, die an der Bindung des Kofaktors beteiligt sind. Die Bindemotive G-X-G-X-X-G (WIERENGA et al., 1985) und G-X-G-X-X-A (SCRUTTON et al., 1990) sind in nahezu allen Enzymen dieser Klassen konserviert (REID und FEWSON, 1994). Das zentrale Glycin erleichtert zusammen mit dem darauffolgenden Rest (Aspartat oder Glutamat) die Bindung des Nikotinamids (WIERENGA et al., 1985). Auch in den abgeleiteten Proteinsequenzen von *orf6* und *orf25* war dieses Motiv vollständig vorhanden. In Orf24 war die dritte konservierte Aminosäure (Glycin oder Alanin) durch ein Prolin ersetzt (s. Abb. 37). Dieser Austausch war auch im Bindemotiv der Glycerin-Dehydrogenase aus *C. freundii* (DANIEL et al., 1995) festgestellt worden. Die Ergebnisse der Sequenzanalyse und der Enzymaktivität der drei Genprodukte mit verschiedenen Polyolen (s. Tab. 25) lassen die Schlußfolgerung zu, dass die Genprodukte Orf6, Orf24 und Orf25 neue Typen von Alkohol-Dehydrogenasen darstellen.

		A													
Motiv		G X G X X G													
Orf6	54	G	C	G	G	G	N	L	A	D	M	I	G	D	V
Orf24	161	A	P	G	P	G	G	K	P	V	R	F	R	V	T
Orf25	54	L	G	G	V	G	F	P	G	G	G	R	V	C	S

Abbildung 37: Aminosäure-Alignment von Orf6, Orf24 und Orf25 im Bereich des konservierten Bindemotivs für Nikotinamid-Kofaktoren

Die grau unterlegten Aminosäuren sind Bestandteile der Bindemotive GXGXXG oder GXGXXA, die von WIERENGA et al. (1985) und SCRUTTON et al. (1990) postuliert wurden. Mögliche Aspartatreste, die ebenfalls an der Bindung des Kofaktors beteiligt sind, sind fettgedruckt.

Die bisherigen Versuche, die für die Carbonylbildung verantwortlichen Gene in pAK206, pAK208 und pAK210 durch Subklonierung zu identifizieren, waren nicht erfolgreich.

Die Sequenzanalyse der übrigen acht Plasmide, für die keine NAD(H)-vermittelte Dehydrogenase-Aktivität in den Rohextrakten gemessen werden konnten, zeigte, dass drei davon (pAK205, pAK214 und pAK215) vollständige oder partiell klonierte Gene beinhalten, die Ähnlichkeiten zu bekannten Oxidoreduktasen aufwiesen. Die mit *orf8* und *orf9* bezeichneten Gene auf pAK205 waren verwandt mit der kleinen und der

großen Untereinheit einer CO-Dehydrogenase und einer möglichen Aldehyd/Keton-Oxidoreduktase, die zur Familie der Xanthin-Oxidasen gehörten (RAMOA et al. 1995). Diese Proteine besitzen einen Molybdopterin-Kofaktor und zwei verschiedene [2Fe-2S]-Zentren. Die [2Fe-2S]-Bindedomäne ist in verschiedenen Enzymklassen verbreitet, dazu gehören auch die Dehydrogenasen und Oxidasen. Eine Überprüfung mit Hilfe der Pfam-Datenbank (BATEMAN et al., 2002) zeigte, dass die [2Fe-2S]-Bindedomäne vollständig in Orf8 und Orf9 konserviert war. Das Bindemotiv des Molybdopterin-Kofaktors war teilweise vorhanden.

Nachfolgende Pfam-Untersuchungen mit dem *orf30*-Genprodukt (20599 Da; pAK214) zeigten das Vorhandensein einer weiteren konservierten Domäne. Die DUF224-Domäne kommt in Heterodisulfid-Reduktasen, in Glykolat-Oxidasen und Glycerin-3-Phosphat-Dehydrogenasen vor, bisher konnte ihr noch keine Funktion zugeordnet werden. Orf30 und MetF (pAK215) weisen Ähnlichkeiten zu FeS-Oxidoreduktasen und zu 5,10-Methylentetrahydrofolat-Reduktasen auf (40 bzw. 60 %). Die Bildung von Carbonylen aus Polyolen ist für Enzyme dieser Klassen bisher nicht beschrieben worden. Es handelt sich also daher um neue Arten von Alkohol-Dehydrogenasen oder die heterolog gebildeten Proteine ermöglichen die Carbonyl-Bildung auf dem Indikatoragar (s. 2.2.5) auf eine bisher noch nicht verstandene Art und Weise.

4 DISKUSSION

4.1 Konstruktion von Metagenombanken

Böden und Sedimente sind sehr heterogene Lebensräume für Mikroorganismen. In einer enormen Anzahl von natürlichen Mikrohabitaten leben Bakterien, Pilze und Archaeen in unterschiedlichen Gemeinschaften, vergesellschaftet mit anderen Mikroben, Pflanzen oder auch Tieren. Innerhalb dieser Gemeinschaften gibt es komplexe Wechselwirkungen und Regulationsnetzwerke. Ziel der Metagenom-Forschung ist einerseits ein besseres Verständnis der Struktur und Funktion dieser mikrobiellen Lebensgemeinschaften und andererseits die biotechnologische Nutzung der vorhandenen und bisher weitgehend unerschlossenen metabolischen und genetischen Diversität. Betrachtet man die kultivierten Bakterien als Indikator für die chemisch-metabolische und genetische Kapazität der unkultivierten Mikroorganismen, so kann man Habitate wie Böden oder Sedimente als eine nahezu unerschöpfliche Quelle für neuartige biologisch-aktive Substanzen und Biosynthesewege betrachten (BULL et al., 1992; BULL et al., 2000).

Molekularbiologische Techniken wie die DNA-DNA-Hybridisierung, die PCR-Technik und die Analyse von 16S rDNA-Sequenzen haben in den vergangenen Jahren dazu geführt, den Begriff der mikrobiellen Diversität zu revolutionieren. Eine Vielzahl an molekularen Untersuchungen unterschiedlichster Habitate auf der Basis von 16S rDNA-Sequenzen zur Determinierung ihrer mikrobiellen Zusammensetzung hat zur Identifizierung von einigen tausend bisher nicht-kultivierten Spezies geführt (z.B. WARD et al., 1990; GIOVANNONI et al., 1990; MUYZER et al., 1992; BORNEMANN et al., 1996; BORNEMANN und TRIPLETT, 1997; SCHLEPER und ECK, 2000). Der von WOESE im Jahr 1987 entwickelte Stammbaum, der 11 unterschiedliche Hauptgruppen in der Domäne der *Bacteria* umfaßte, wurde bereits 10 Jahre später auf 36 Phyla erweitert (HUGENHOLTZ et al., 1998). Mehr als ein Drittel davon wird nur durch 16S rDNA-Sequenzen unkultivierter Mikroorganismen repräsentiert. Mit Hilfe dieser molekularen Techniken konnte eine dritte Hauptgruppe in der Domäne der *Archaea* identifiziert werden, die zuvor in die Zweige der *Crenarcheota* und der *Euryarcheota* unterteilt war. Die als *Korarcheota* bezeichnete dritte Gruppe wurde bei der Analyse von ribosomaler DNA unkultivierter Organismen des Obsidian Pool (Yellow Stone Park, USA) nachgewiesen (BARNES et al., 1996).

Die geringe Kenntnis über das genetische und metabolische Potential natürlicher Mikroorganismen wird auch bei der Genomsequenzierung von kultivierten Organismen deutlich. So zeigten 70 % der im 2,2 MBp-großen Genom von *Pyrobaculum aerophilum* vorhergesagten offenen Leserahmen keinerlei Homologie zu bekannten, in den Datenbanken erfassten Sequenzen. Bei *Haemophilus influenza* konnten 40 % der aus den 1743 identifizierten offenen Leserahmen abgeleiteten Proteine in keine der 12 funktionellen Klassen eingeordnet werden (BULL et al., 2000). Trotz des starken Anstiegs der Anzahl der vollständig sequenzierten Organismen bleibt der Anteil der Gene und Proteine, die keinerlei Verwandtschaft mit bekannten Sequenzen aufweisen, bei etwa 40 %.

Die vorliegende Arbeit zeigt Möglichkeiten auf, das unerschlossene metabolische und genetische Potential von natürlichen Mikroorganismen durch die Konstruktion von komplexen Metagenombanken zu erforschen und auch für industrielle Anwendungen zugänglich zu machen. Das Potential zur Nutzung der mikrobiellen Diversität in Umweltproben als Ressource für neue Biokatalysatoren und Wirkstoffe konnte in einer Reihe von Veröffentlichungen angedeutet werden (HENNE et al., 1999 und 2000; COTTRELL et al., 1999; RONDON et al., 2000; BRADY et al., 2001). Der verwendete Ansatz stellte eine Kombination der klassischen Anreicherungstechniken mit den Methoden zur Konstruktion von Metagenombanken dar. Zur Gewinnung von biotechnologisch-relevanten Genen und Genprodukten wurden Genbanken aus verschiedenen Umweltproben hergestellt, die eine kurze Anreicherungsphase in Mineralmedium mit Glycerin und 1,2-Propandiol als Kohlenstoffquellen durchlaufen hatten. Die zur Konstruktion der Genbanken verwendete DNA wurde anschließend direkt aus den Proben isoliert. Nachfolgend wurden die Metagenombanken mit Hilfe von unterschiedlichen Techniken auf die Existenz von Genen für Glycerin- und Diol-Dehydratasen sowie für Alkohol-Oxidoreduktasen durchmustert. Dabei wurden sowohl Aktivitäts-basierende und als auch Sequenz-abhängige Methoden verwendet. Ein weiterer Aspekt war der Vergleich der aus den angereicherten Genbanken erhaltenen Klone und Gene mit den gewünschten Eigenschaften mit denen aus Genbanken, die ohne einen Anreicherungsschritt erstellt wurden.

4.1.1 Isolierung und Reinigung von chromosomaler DNA aus Umweltproben

Eine wichtige Voraussetzung zur Konstruktion von Metagenombanken ist die Extraktion intakter, hochmolekularer und klonierbarer, genomischer DNA aus den Umweltproben. Die nachfolgende Abtrennung von Polymeren und anderer koextrahierter Hemmstoffe stellt eine weitere technologische Herausforderung dar.

Zur Isolierung von chromosomaler DNA aus Umweltproben wurden in den vergangenen Jahren zahlreiche Methoden in zahlreichen Variationen entwickelt (TORSVIK et al., 1980; OGRAM et al., 1987; TSAI und OLSON, 1991; JACOBSON und RASMUSSEN, 1992; ZHOU et al., 1996; HOLBEN, 1996; SANTOSA, 2001). Man unterscheidet dabei zwei verschiedene Ansätze, zum einen die direkte Lyse der Zelle in der Probe und zum anderen die sogenannte Fraktionierungsmethode, die eine initiale Abtrennung der Zellen von den umgebenden Matrixbestandteilen und eine daran anschließende DNA-Extraktion beinhaltet.

Zur Zellfraktionierung können z.B. Kationenaustauschermaterialie oder verschiedene Filtersysteme (z.B. bei Meerwasserproben) genutzt werden (TORSVIK et al., 1980; JACOBSON und RASMUSSEN, 1992). Eine Alternative ist die Homogenisation der Umweltproben in einem Puffer und die Abtrennung der Bodenpartikel durch niedertourige Zentrifugation (HOLBEN, 1996). Die anschließende Zelllyse wird dann nach Standardprotokollen für die Isolierung von chromosomaler DNA aus Einzelorganismen durchgeführt (z.B. AUSUBEL et al., 1987). Diese Vorgehensweise eignet sich besonders für die DNA-Extraktion aus Proben mit geringer Biomasse (z.B. Wasserproben) oder einem hohen Anteil an störenden Fremdsubstanzen (z.B. Klärwerksproben). Bei dieser Methode der direkten Lyse wird sehr hochmolekulare und nur wenig verunreinigte DNA erhalten, die ohne weitere Reinigungsschritte für die Klonierung eingesetzt werden kann.

Dem gegenüber steht die Methode der direkten Lyse der Zellen ohne vorherige Zellextraktion, die zuerst von OGRAM et al. (1987) beschrieben wurde. Ebenfalls auf dieser Grundlage basieren die von TSAI und OLSON (1991) und die von ZHOU et al. (1996) publizierten Vorgehensweisen. Die Methode von OGRAM et al. (1987) beinhaltet eine Hitzebehandlung der Proben in Gegenwart von SDS und einer anschließenden Homogenisierung mit Glaskugeln in einem „Bead Beater“. TSAI und OLSON (1991) dagegen erreichen den Zellaufschluß durch die Zugabe von Lysozym und einer wiederholten Schockgefrierung der Proben bei -70 °C und anschließendem

Auftauen bei 65 °C. Ein wesentlicher Vorteil der Methode der direkten Lyse ist, dass hier sowohl die DNA aus fest an Bodenpartikeln gebundenen Mikroorganismen als auch die extrazellulär im Boden vorliegende DNA isoliert wird und somit die Ausbeute deutlich höher ist. Die extrazelluläre DNA wird in großen Mengen von toten oder absterbenden Zellen in die Umgebung abgegeben (REANNEY et al., 1983). Sie ist jedoch dem Abbau durch DNasen unterworfen, die ebenfalls von den Mikroorganismen sekretiert werden. Dieser Abbau ist nicht vollständig, denn durch die Bindung an Matrixpartikel wird die DNA vor Spaltung geschützt (AARDEMA, et al., 1983; LORENZ und WACKERNAGEL, 1987; TREVORS, 1996). ROMANOWSKI et al. (1991) haben gezeigt, dass an Sand adsorbierte DNA eine 100-fach stärkere Resistenz gegenüber DNaseI aufweist als ungebundene. Ebenso unterbindet die Anlagerung an Tonminerale die Wirkung der Nukleasen (GORING und BARTHOLOMEW, 1952; GREAVES und WILSON, 1969). Die Adsorption selbst und die Stärke der Bindung ist von verschiedenen Faktoren wie pH-Wert, Ionenkonzentration und von der Länge des DNA-Fragments abhängig (LORENZ und WACKERNAGEL, 1987). Eine Desorption andererseits kann durch den Einsatz von Chelatbildnern wie EDTA erreicht werden (LORENZ und WACKERNAGEL, 1987).

Ein direkter Vergleich zwischen Zellextraktionsmethode und der Methode der direkten Lyse zeigte eine 10-fach höhere Ausbeute bei der direkten Lyse (STEFFAN et al., 1988). Jedoch kommt es bei einigen der beschriebenen Methoden zu einer starken Scherung der DNA, die z.B. durch die Behandlung mit einem „Bead-Beater“ verursacht wird (OGRAM et al., 1987). Die Fragmente weisen dann lediglich eine Größe von 5 -10 kBp auf und sind somit für Klonierungsarbeiten nur bedingt geeignet. Bei der in der vorliegenden Arbeit verwendeten Methode von ZHOU et al. (1996) tritt diese starke Fragmentierung nicht auf. Man erhält große Mengen (15 bis 28 µg/g Probe; s. Tab. 6) hochmolekularer DNA (> 23 kBp; s. Abb. 8). Die Methode beruht auf der Lyse mit einem Hochsalz-Extraktionspuffer (1,5 M NaCl) in Gegenwart von EDTA und Proteinase K sowie der Detergenzien SDS und CTAB. Das kationische Detergenz CTAB bewirkt bei NaCl-Konzentrationen über 0,6 M eine Komplexbildung von Zellwandbestandteilen, denaturierten Proteinen und Polysacchariden (MÜLLER und BRUCHHAUS, 1997) und führt zusammen mit Proteinase K zur Deproteinisierung des DNA-Rohextraktes. Die Effizienz der DNA-Extraktion hängt im Wesentlichen vom Probentyp ab. Dies wurde auch durch die Ergebnisse dieser Arbeit verdeutlicht. Die DNA-Ausbeute bei den Sedimenten aus dem Solar Lake und dem Golf von Eilat sind

um ca. 40 % geringer als bei den beiden anderen Boden- und Sedimentproben (s. Tab. 6). Ein wesentlicher Unterschied, der die Effizienz der Zelllyse bei diesen Proben signifikant beeinflusst, ist die relativ hohe Salzkonzentration, entscheidend ist natürlich ebenso die vorhandene Zelldichte. Die Anzahl der in den Sedimenten angesiedelten Mikroorganismen ist different, und diese zeigen sich unterschiedlich empfindlich gegenüber dem eingesetzten Lyseverfahren. Die hier beschriebenen Verfahren führen hauptsächlich zur Extraktion prokaryotischer DNA, eukaryotische Zellen werden durch die verwendeten Lysemethoden nur wenig effizient aufgeschlossen. Bei der Fraktionierungsmethode ist der Anteil der eukaryotischen DNA vergleichsweise noch geringer, da bei der Zellabtrennung durch niedertourige Zentrifugation beispielsweise die schweren Eukaryoten zusammen mit der Probenmatrix sedimentiert werden (HOLBEN, 1996).

Ein Nachteil der direkten Lyse gegenüber der Zellextraktion ist die besonders bei Bodenproben einhergehende Kopräzipitation von Humin- und Fulvinsäuren (OGRAM et al., 1987; TSAI und OLSON, 1991; ZHOU et al., 1996; HENNE et al., 1999). Je nach Bodentyp können bis zu mehreren Mikrogramm huminer Substanzen pro Mikroliter DNA-Extrakt erhalten werden (TEBBE und VAHJEN, 1993). Die Huminsäuren inhibieren Restriktionsendonukleasen, Polymerasen und Ligasen und sind für eine Herabsetzung der Effizienz bei DNA-DNA-Hybridisierungen und Transformationen verantwortlich (TEBBE und VAHJEN, 1993). Für Klonierungsarbeiten ist die Abtrennung dieser inhibitorisch wirkenden Substanzen unumgänglich. Sie kann durch die unterschiedlichsten Methoden erreicht werden. So wird von ORGAM et al. (1987) und BRUCE et al. (1992) die Durchführung einer CsCl-Gradientenzentrifugation und/oder einer Hydroxyapatit-Chromatographie favorisiert. Diese Methoden sind jedoch sehr zeitaufwendig und führen oft zu hohen DNA-Verlusten. Eine andere Möglichkeit ist die Zugabe von Polyvinylpolypyrrolidon (PVPP; STEFFAN et al., 1988; BERTHELET et al., 1996) und/oder die Reinigung der DNA über verschiedene Säulenmaterialien wie Sephadex G-200 und Sepharose 4B (TSAI und OLSON, 1992; JACKSON et al., 1997). In der vorliegenden Arbeit wurden die Verunreinigungen mit Hilfe von Silicagel-Säulen und einer nachfolgenden Anionenaustauschchromatographie weitgehend abgetrennt (HENNE et al., 1999 und 2000). Die so erhaltene hochmolekulare DNA konnte mit verschiedenen Restriktionsenzymen (z.B. *Bsp*143I oder *Bam*HI) verdaut (s. Abb. 8) und in

Ligationsreaktionen eingesetzt werden. Jedoch ist auch diese Methode mit einem DNA-Verlust von ca. 20 bis 30 % verbunden (ZHOU et al., 1996).

Keine der vorgestellten Methoden zur DNA-Extraktion ist für alle Arten von Proben geeignet. Es empfiehlt sich daher, bei der Isolierung von DNA aus neuen Standorten mehrere Protokolle parallel auf ihre Effizienz hin zu testen.

4.1.2 Klonierung der Umwelt-DNA

In den vergangenen Jahren wurde die aus Umweltproben isolierte, genomische DNA überwiegend zur Analyse der Diversität der Mikroorganismen ausgewählter Habitate genutzt. Die Fortschritte in der PCR-Technik und der DNA-Sequenzierung in großem Maßstab ermöglichten eine Detektion und Identifizierung von Bakterien und Archaeen in ihrer natürlichen Umgebung ohne eine vorherige Anreicherung und Vereinzelung (OLSEN et al., 1986; PACE et al., 1986). Im Rahmen einer Vielzahl von Untersuchungen wurden die für die 16S rRNA kodierenden Gene mittels PCR amplifiziert und anschließend kloniert oder direkt in Analyseverfahren wie die Restriktionsanalyse, die denaturierende Gradientengel-Elektrophorese (DGGE) oder die DNA-Sequenzierung eingesetzt (WARD et al., 1990; GIOVANNONI et al., 1990; MUYZER et al., 1993; FERRIS et al., 1996; TESKE et al., 1998). Auf diese Weise wurden phylogenetische Profile für unterschiedliche mikrobielle Gemeinschaften erstellt, die deutlich zeigten, dass die bisher isolierten und kultivierten Organismen nicht annähernd die tatsächliche Diversität der Bakterien und Archaeen widerspiegeln. Die Analyse von rRNA-Genen allein ist jedoch nicht ausreichend zur Charakterisierung der Diversität von Mikroorganismen, geben sie doch keinerlei Hinweise auf ihre metabolischen und physiologischen Eigenschaften. Ebenfalls über den Zwischenschritt der PCR-Amplifikation führten eine Reihe von weiteren Forschungsarbeiten, bei denen mit speziellen, aus konservierten Genregionen abgeleiteten Oligonukleotiden Gene oder Genfragmente aus gut charakterisierten Enzymklassen amplifiziert wurden. ROSADO et al. (1998) untersuchten mit dieser Technik die Sequenz-Heterogenität von *nifH*-Genen in verschiedenen Bodenproben. Mit Hilfe degenerierter Oligonukleotide konnten verschiedene *nifH*-Gene amplifiziert werden, die anschließend kloniert und sequenziert wurden. Eine ähnliche Vorgehensweise benutzten SEOW et al. (1997) zur Analyse von Genen für Typ II Polyketid-Synthasen aus Bodenproben. Zur Konstruktion von

Oligonukleotiden wurden Konsensus-Sequenzen genutzt, die die KS_{β} -Gene in bekannten Synthasen flankieren. BRUCE (1997) umging den Klonierungsschritt. Zur Erstellung eines Profils von *mer*-(mercury-resistance)-Genen in einem Quecksilber-verseuchten und in einem unverseuchten Habitat wurden ebenfalls auf Konsensus-Sequenzen beruhende Oligonukleotide benutzt, die von Sequenzen Archaea-typischer *mer*-Operons abgeleitet wurden. Nachteil dieser auf der PCR basierenden Methodik ist, dass nur bekannte oder zu bekannten Genen homologe Gene gefunden werden können, da die verwendeten Oligonukleotide auf konservierten Sequenzbereichen von Genen bereits untersuchter Enzymklassen beruhen. Eine neue Variante stellte der von STOKES et al. (2001) publizierte Ansatz dar, bei dem nicht die Gene selbst das Ziel der PCR waren, sondern konservierte flankierende Elemente. Viele bakterielle Gene werden durch horizontalen Gentransfer verbreitet, daran beteiligt sind mobile genetische Elemente wie Plasmide, Transposons oder Integrons. Die konservierten Bereiche in Integrons wurden in diesem Ansatz genutzt um Oligonukleotide zu konstruieren und mittels PCR ganze Gen-Kassetten zu amplifizieren.

In der vorliegenden Arbeit wurde dagegen ein weitergehenden Ansatz verfolgt. Die aus den angereicherten Umweltproben isolierte genomische DNA wurde dazu genutzt um komplexe Metagenombanken zu konstruieren. Zu diesem Zweck wurden die gereinigten Nukleinsäuren mit dem Restriktionsenzym *Bsp143I* partiell verdaut, in den Expressionsvektor pBluescript SK⁺ kloniert und in *E. coli* transformiert. Auf diese Weise wurden vier Genbanken mit 37300 bis 71050 rekombinanten Plasmiden erhalten, die durchschnittliche Insertgrößen zwischen 3,3 und 5,6 kBp aufwiesen (s. Tab. 28). Insgesamt entsprach dies mehr als 1 Gbp klonierter Umwelt-DNA. Legt man für die Größe eines Gens durchschnittlich 1,0 kBp zugrunde, handelt es sich um mehr als 1 Million Gene. Eine solche direkte Klonierung der aus Umweltproben isolierten DNA führt zu Genbanken, die auch Sequenzen völlig unbekannter Gene enthalten. Außerdem sind einmal erstellte Genbanken universell einsetzbar. Für einige zuvor in unserer Arbeitsgruppe konstruierte Genbanken aus verschiedenen Bodenproben waren ähnliche Eigenschaften bestimmt worden. Die durchschnittliche Größe der inserierten DNA-Fragmente lag bei 3,3 bis 7,1 kBp und die Anzahl der erhaltenen Klone zwischen 50000 und 200000 (HENNE, 2001). Diese Genbanken waren erfolgreich zur Identifizierung von neuartigen Genen für 4-Hydroxybutyrat-Dehydrogenasen, Lipasen/Esterasen und $Na^{+}(Li^{+})/H^{+}$ -Antiportern genutzt worden (HENNE et al., 1999 und 2000; MAJERNIK et al., 2001). Die abgeleiteten Aminosäuresequenzen der Enzyme zeigten keine oder nur

sehr geringe Homologien zu den in den Datenbanken vorhandenen Sequenzen funktionell ähnlicher Proteine. Lediglich eine der gefundenen 4-Hydroxybutyrat-Dehydrogenasen wies eine deutliche Übereinstimmung (76,7 %) zu der bekannten 4-Hydroxybutyrat-Dehydrogenase aus *Ralstonia eutropha* auf (HENNE et al., 1999). Diese Ergebnisse bestätigten, dass die konstruierten Genbanken Gene einer großen Vielfalt von Mikroorganismen beinhalten, die bis dahin noch nicht untersucht oder kultiviert wurden. Die Arbeit von WILKINSON et al. (2002) befasste sich ebenfalls mit der Konstruktion von Plasmidgenbanken aus Umweltproben. Alternativ wurde die aus geothermalen Sedimenten aus Island extrahierte DNA mechanisch gesichert und nach einer anschließenden enzymatischen Modifikation der Fragmentenden mittels TA-Klonierung in den Vektor pCR-XL-TOPO inseriert. Vergleichbar mit der von uns verwendeten Methode wurde eine Genbank mit 37000 Klonen und ca. 5,0 kBp durchschnittlicher Insertgröße erhalten (s. Tab. 28). Ein wichtiger Vorteil bei der Nutzung von Plasmiden wie z.B. pBluescript SK⁺ oder pCR-XL-TOPO zur Konstruktion von Genbanken ist die hohe Kopienzahl. Diese erlaubt auch die Detektion von schwach exprimierten Genen bei Screeningstrategien, die auf der biologischen Aktivität der Proteine beruhen. Denn zumeist ist die heterologe Expression von der Aktivität der nativen Promotoren abhängig. Ein Nachteil der Plasmide ist, dass nur relativ kleine DNA-Fragmente kloniert werden können. Die ermittelten durchschnittlichen Insertgrößen in den bisher publizierten Arbeiten lagen unter 8 kBp (s. Tab. 28). Dies bedeutet, dass eine sehr große Anzahl von rekombinanten Klonen auf die gewünschte Aktivität hin untersucht werden muß. Außerdem ist die Klonierung von größeren Genclustern in Plasmiden nicht möglich. Ebenso besteht die Gefahr, dass viele Gene nur unvollständig kloniert werden.

Eine Alternative ist daher die Klonierung von Umwelt-DNA in Cosmide, Fosmide und BAC (bacterial artificial chromosome)-Vektoren. STEIN et al. (1996) isolierten DNA aus marinem Pikoplankton, das aus 30 l Meerwasser aufkonzentriert wurde. Die gewonnenen Nukleinsäuren wurden partiell verdaut und in den Fosmidvektor pFOS1 ligiert. Die so erstellte Genbank mit einer durchschnittlichen Insertgröße von 40 kBp (s. Tab. 28) wurde auf das Vorhandensein von archaeller (STEIN et al., 1996) und *Planctomycetales*-spezifischer DNA (VERGIN et al., 1998) durchsucht. Ein wesentlicher Unterschied zu der in dieser Arbeit verwendeten Methode besteht darin, dass die DNA aus angereicherten Zellen und nicht aus komplexen Sediment- oder Bodenproben isoliert wurde. Jedoch genau dies bringt erhebliche Schwierigkeiten mit

sich, die hauptsächlich auf die unter 4.1.1 beschriebene Kopräzipitation von Humin- und Fulvinsäuren zurückzuführen ist. Die Verunreinigungen können zwar weitgehend entfernt werden, so dass ein Restriktionsverdau vollständig möglich ist, die Effizienz bei Ligationsreaktionen ist jedoch häufig herabgesetzt gegenüber Ligationen mit DNA aus Reinkulturen.

Tabelle 28: Durchschnittliche Insertgrößen von in Plasmiden, Cosmiden oder BACs erstellten Metagenombanken

DNA-Quelle	Vektorart	Durchschnittliche Insertgröße [kbp]	Referenz
Anreicherungskulturen	Plasmid	3,0 bis 5,4	diese Arbeit
Boden	Plasmid	6 bis 8	HENNE et al., 1999
Boden	Plasmid	3,3 bis 7,1	HENNE et al., 2000
Süßwassersediment	Plasmid	5	WILKINSON et al., 2002
Salzwassersediment	Cosmid	23 und 25	KNIETSCH, 1999
Anreicherungskulturen	Cosmid	30 bis 40	ENTCHEVA et al., 2001
Pikoplankton	Fosmid	40	STEIN et al., 1996
Pikoplankton	BAC	80	BÉJÀ et al., 2000
Boden	BAC	27 und 44,5	RONDON et al., 2000

Die ersten Veröffentlichungen, die die Nutzung von BAC-Vektoren zur Klonierung von Genomfragmenten umfangreicher mikrobieller Gemeinschaften in *E. coli* beschrieben, stammen von BÉJÀ et al. (2000) und RONDON et al. (2000). BACs sind modifizierte Plasmide mit einem Replikationsursprung, der vom *E. coli* F-Faktor abgeleitet ist. Sie sind in der Lage, DNA-Fragmente bis zu einer Länge von 600 kbp aufzunehmen und stabil in *E. coli* zu erhalten (ZIMMER und GIBBINS, 1997). Ähnlich wie bei STEIN et al. (1996) wurden hier Mikroorganismen aus Oberflächenwasser der Kalifornischen Küste angereichert und die enthaltene DNA isoliert. RONDON et al. (2000) dagegen verwendeten eine Bodenprobe aus Madison (Wisconsin, USA) als Ausgangsmaterial. Die erhaltenen Genbanken enthielten zwischen 3648 und 24576 rekombinanter *E. coli*-Klone mit inserierten DNA-Fragmenten in einem Größenbereich von 18 bis 155 kbp. Ein Vorteil dieser Methode ist, dass auch große Gencluster isoliert und untersucht werden können. Eine auf der Expression der klonierten Gene basierende

Durchmusterung dieser Genbanken ist jedoch aufgrund der geringen Kopienzahl im Wirt *E. coli* (1 bis 2 Kopien pro Zelle) nur erschwert möglich.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Auswahl eines geeigneten Vektorsystems für die Herstellung von Metagenombanken im Wesentlichen abhängig von der anschließend vorgesehenen Anwendung ist. Wird eine Durchmusterung vorgenommen, die auf der Expression einzelner Gene abzielt, so sind Plasmidgenbanken aufgrund der hohen Kopienzahl von Vorteil. Ist man jedoch daran interessiert durch Sequenzierung großer DNA-Abschnitte mehr über die genetische Organisation und die metabolischen Zusammenhänge in einer mikrobiellen Gemeinschaft zu erfahren, empfiehlt sich die Konstruktion von Cosmid- oder BAC-Genbanken.

Die Gesamtgröße bisher veröffentlichter Genbanken variiert stark. Wie gut eine solche Genbank die Diversität einer Probe reflektiert, ist schwer zu bestimmen, denn trotz der enormen Fortschritte in der genetischen Analyse von Umweltproben ist die genaue mikrobielle Zusammensetzung eines Standorts bisher nicht determinierbar. Schätzungen gehen von ca. 5000 verschiedenen Spezies je Gramm einer Bodenprobe aus (TORSVIK et al., 1990). Bei einer durchschnittlichen Genomgröße von 4 MBp wären etwa 1 Million BAC-Klone mit einer Größe von jeweils 100 kBp notwendig, um eine 4-fache Redundanz dieses Mikrohabitats zu erreichen (SCHLEPER und ECK, 2000).

4.2 Aktivitäts- und Sequenz-basierende Durchmusterungsverfahren

Zur Identifikation von neuen Genen und Genprodukten in Metagenombanken sind zwei prinzipiell unterschiedliche Strategien möglich (s. Abb. 38). Die erste beruht auf der Ausnutzung von Sequenzähnlichkeiten oder konservierten Sequenzmotiven durch Hybridisierungsexperimente mit den entsprechenden Sonden oder durch PCR-Amplifikation der Zielgene. Dem gegenüber stehen Aktivitäts-basierende Screeningverfahren, die zumeist in Form von einfachen Plattentests durchgeführt werden können (s. Abb. 38 und Tab. 29). Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden beide Möglichkeiten zur Identifizierung von neuen Genen für Coenzym B₁₂-abhängige Glycerin- und Diol-Dehydratasen genutzt. Zur Isolierung von Klonen, die Alkohol-Oxidoreduktase-Aktivität vermitteln, wurde ausschließlich ein auf Enzymaktivität basierendes Verfahren genutzt.

Abbildung 38: Strategien zur effizienten Durchmusterung von komplexen Metagenombanken

Der zuerst gewählte, auf Enzymaktivität basierende Ansatz zur Auffindung neuer Dehydratasen beinhaltete die Transformation der Plasmide der Metagenombanken in den speziell konstruierten Screening-Stamm *E. coli* ECL707/pAK1. Der verwendete Stamm trägt die Gene für die Glycerin-Dehydrogenase, die Dihydroxyaceton-Kinase und die 1,3-Propandiol-Dehydrogenase auf dem Plasmid pAK1 (s. Abb. 13). Somit war er in der Lage, unter aeroben Bedingungen mit Glycerin als einziger Kohlenstoff- und Energiequelle zu wachsen (KNIETSCH, 1999). Für das anaerobe Wachstum jedoch benötigte er ein Kosubstrat wie Na-Pyruvat als externen Akzeptor von Reduktionsäquivalenten oder mußte durch eine Glycerin- oder Diol-Dehydratase komplementiert werden. Die auf diese Weise identifizierten Klone wurden anschließend unter selektiven Bedingungen (anaerobes Millieu, Glycerin oder 1,2-Propandiol als Kohlenstoffquellen) auf das Vorhandensein der gewünschten Enzymaktivität untersucht. Die Komplementation eines solchen unter den gewählten Bedingungen Wachstums-defekten Stammes ist ein besonders vielversprechender, methodischer Ansatz. So führte z.B. die Komplementation der Na^+/H^+ -Antiporter-negativen Mutante *E. coli* KNabc (NOZAKI et al., 1996) durch Umweltgenbanken zur Isolierung von neuartigen Genen, die für integrale Membranproteine kodierten (MAJERNIK et al.,

2001; s. Tab. 29). Ein solches Verfahren ist hoch selektiv für den gewünschten Phänotyp und es lassen sich auch bisher nicht bekannte Enzymaktivitäten oder -spezifitäten und Stoffwechselwege identifizieren.

Das für die Selektion der komplementierten *E. coli*-Stämme ausgewählte M9-Mineralmedium (s. 2.2.4) wurde leicht modifiziert, um auch die Detektion von Enzymen mit anderen Kofaktor-Bedürfnissen zu ermöglichen. Ein Hinweis auf die Existenz solcher Enzyme gibt die Identifizierung einer Coenzym B₁₂-unabhängigen Diol-Dehydratase aus *Clostridium glycolicum*, die in der Lage ist 1,2-Ethandiol und 1,2-Propandiol zu den korrespondierenden Aldehyden umzuwandeln (HARTMANIS und STADTMAN, 1986 und 1987). Das Enzym ist jedoch extrem O₂-empfindlich und benötigt die Zugabe von Reduktionsmitteln für maximale Aktivität. Aufgrund von durchgeführten EPR-Messungen und der Empfindlichkeit des Enzyms gegenüber Radikalfängern wie Hydroxyharnstoff wird ein bisher nicht identifiziertes Radikal im aktiven Zentrum vermutet (HARTMANIS und STADTMAN, 1987). Erst kürzlich konnte in *Clostridium butyricum* VPI1718 eine ebenfalls Coenzym B₁₂-unabhängige Glycerin-Dehydratase identifiziert werden. Das ebenfalls extrem O₂-empfindliche Enzym besteht aus zwei verschiedenen Untereinheiten und weist somit deutliche Differenzen zu den bekannten B₁₂-abhängigen Dehydratasen auf (MEYNIAL-SALLE, 2002). Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde zunächst einmal der Eisengehalt des Mediums erhöht, da dies zur Stabilisierung von Radikalen führt, die sehr wahrscheinlich auch bei der nicht Coenzym B₁₂-vermittelten Dehydratisierung von Glycerin und 1,2-Propandiol beteiligt sind. Außerdem wurden geringe Mengen verschiedener Vitamine (s. 2.2.9) und Spurenelemente (s. 2.2.7) zugesetzt. In vorangegangenen Untersuchungen war außerdem in einigen Ansätzen S-Adenosylmethionin als möglicher alternativer Kofaktor für neue Typen von Glycerin- und Diol-Dehydratasen dem Medium zugesetzt worden (KNIETSCH, 1999). S-Adenosylmethionin ist der Kofaktor der clostridialen Lysin-2,3-Aminomutasen (FREY, 1993; FREY et al., 1998), die die Interkonversion von Lysin und β -Lysin katalysieren. Dabei kommt es zu einem formal ähnlichen, radikalischen Reaktionsverlauf wie bei den Coenzym B₁₂-abhängigen Enzymen. Ein inaktiviertes Wasserstoff-Atom, das gebunden an das C3-Atom des Lysin vorliegt, tauscht dabei den Platz mit einer Aminogruppe am C2-Atom. Adenosylcobalamin und S-Adenosylmethionin sind in ihrem Aufbau sehr unterschiedliche Moleküle, besitzen jedoch beide einen 5'-Desoxyadenosyl-Anteil und durch EPR-Spektren wurde nachgewiesen, dass an der Aminomutase-Reaktion ebenfalls ein Substrat-Radikal

beteiligt ist (FREY, 1993). Vermutlich dienen also beide Moleküle in der Natur als Quellen für die sehr reaktiven 5'-Desoxyadenosylradikale (FREY et al., 1998). Leider war der gewählte Ansatz zur Identifizierung Coenzym B₁₂-unabhängiger Glycerin- und Diol-Dehydratasen nicht erfolgreich (KNIETSCH, 1999).

Weitere Möglichkeiten zur Aktivitäts-vermittelten Durchmusterung von Metagenombanken bieten Plattentests, bei denen der Abbau eines bestimmten Substrats direkt beobachtet werden kann. Zur Identifizierung von Enzymen mit lipolytischer Aktivität wurden von HENNE et al. (2000) LB-Tributylin-Agarplatten eingesetzt (s. Tab. 29). War der rekombinante *E. coli*-Stamm in der Lage, das angebotene Substrat zu spalten, kam es zu einer Aufklärung des trüb-milchigen Agars rund um die wachsende Kolonie. Auch der Einsatz ungiftiger Farbstoffe oder unlöslicher bzw. chromatophortragender Derivate von Enzymsubstraten in Agarnährmedien ermöglicht eine leichte Detektion gewünschter metabolischer Fähigkeiten. Ein Beispiel für diese Vorgehensweise war die Verwendung des fluorogenen Chitin-Analogons 4-Methylumbelliferyl- β -D-N,N'-Diacetylchitobiosid zur Identifizierung von *E. coli*-Klonen, die Gene für Chitinasen tragen und exprimieren (COTTRELL et al., 1999; s. Tab. 29). Zur Identifizierung von neuartigen 4-Hydroxybutyrat-Dehydrogenasen wurden erfolgreich Triphenyl-tetrazoliumchlorid (TTC)-Indikatorplatten eingesetzt (HENNE et al., 1999; s. Tab. 29). Die Oxidation des farblosen und wasserlöslichen Testsubstrats 4-Hydroxybutyrat führte zur Reduktion des Tetrazoliums. Dabei entstand die reduzierte Form, das wasserunlösliche, rote Formazan, das in den Zellen präzipitierte. Auf einem ähnlichen Prinzip beruhte der Plattentest, der in der vorliegenden Arbeit zur Detektion von Genen genutzt wurde, die eine Alkohol-Oxidoreduktase-Aktivität in *E. coli* vermitteln. Der im Testagar vorhandene Farbstoff Pararosanilin bildete mit dem ebenfalls zugefügten Natriumbisulfit (Na₂S₂O₅) ein farbloses Schiff'sches Reagenz. Bei der Oxidation der verwendeten Testsubstrate (1,2-Ethandiol, 2,3-Butandiol, 1,2-Propandiol oder Glycerin) entstanden Carbonylverbindungen, die mit dem Schiff'schen Reagenz ein rotgefärbtes Kondensationsprodukt, ein Azomethin bildeten (CONWAY et al., 1987). Daher waren die Kolonien von positiven Klonen aufgrund ihrer Rotfärbung und der Ausbildung eines roten Hofes leicht zu identifizieren (s. Abb. 29). Um während der Durchmusterung der Metagenombanken eine starke Hintergrundfärbung der Agars durch die Glycerin-Dehydrogenase-Aktivität von *E. coli* zu verhindern, wurde die Glycerin-negative *E. coli*-Mutante ECL707 (SPRENGER et al., 1989) als Wirtstamm verwendet. Eine

wichtige Einschränkung ist bei der Betrachtung der Ergebnisse solcher Plattentestverfahren jedoch zu machen. In den meisten Fällen ist nur die Bildung eines bestimmten Produkts zu beobachten. Auf welchem Wege diese Produktbildung zustande kommt, ist zunächst nicht festzustellen. Möglich sind dabei auch Substrat-Umsetzungen, die auf indirektem Wege zustande kommen. Ein deutliches Indiz dafür ist die in *E. coli*/pAK102 aufgetretene Carbonylbildung durch die wahrscheinlich kombinierte Aktivität einer auf dem Plasmid kodierten Glycerin-Kinase (GlpK) und der wirtseigenen Glycerin-3-phosphat-Dehydrogenase. Ein ähnliches Zusammenwirken von eingebrachter Umwelt-DNA und dem Wirtsmetabolismus wären auch für andere positive Klone denkbar. Neben den Plattentestverfahren werden heute auch robotergestützte, „high-throughput“-Verfahren zur Durchmusterung von Metagenombanken entwickelt. Aufgrund der hohen Kosten ist der Einsatz solcher Verfahren bisher auf Metagenombanken beschränkt bei denen eine hohe Anzahl von Klonen mit den gewünschten Eigenschaften erwartet werden kann (DANIEL et al., 2002).

Tabelle 29: Übersicht über die Ergebnisse bisher publizierter Aktivitäts-basierender Durchmusterungen von komplexen Metagenombanken

DNA-Quelle	Zielgen	Anzahl positiver Klone	Referenz
Anreicherung	Cellulase	11	HEALY et al., 1995
	β -Galactosidase	1	
Boden	Hydroxybutyrat-DH	5	HENNE et al., 1999
Boden	Esterase/Lipase	4	HENNE et al., 2000
Boden	Na^+/H^+ -Antiporter	2	MAJERNIK et al., 2001
Sediment	Amylase	3	WILKINSON et al., 2002
Pikoplankton	Chitinase	9	COTTRELL et al., 1999
Boden	Protease	3	SANTOSA, 2001
Anreicherung	Biotin-Synthese	7	ENTCHEVA et al., 2001
Boden	Antibakteriell	2	BRADY et al., 2001
Boden	Antibakteriell	2	RONDON et al., 2000
	DNase	1	
	Lipase	2	
	Amylase	8	
	Hemolytisch	29	

Zur Erhöhung der Trefferanzahl bei der Durchmusterung von Metagenombanken ist die Nutzung von Probenmaterial sinnvoll, das eine natürliche oder im Labor erzeugte Anreicherung der Organismen mit den gewünschten Eigenschaften durchlaufen hat. Zur Detektion von thermostabilen Enzymen wie Lipasen oder Proteasen, die in der Waschmittelindustrie eingesetzt werden, eignen sich daher besonders Proben als Ausgangsmaterial, die aus heißen Quellen entnommen wurden (VIEILLE und ZEIKUS, 2001). Die im Rahmen dieser Arbeit konstruierten Genbanken dagegen stammten aus den Sedimentproben des Solar Lake (SLA), des Golf von Eilat (GEA) und des Flusses Grone (GIIA) sowie der Probe eines Zuckerrübenfeldes (ZRA), in denen vor der DNA-Isolierung eine künstliche Anreicherung durchgeführt wurde (s. 3.1). Nach einer kurzen Inkubationsphase mit den C-Quellen Glycerin und 1,2-Propandiol, zwei möglichen Substraten der gesuchten Dehydratasen und Alkohol-Oxidoreduktasen, wurde die DNA aus den Proben isoliert und verarbeitet. Mit dem verwendeten Durchmusterungsverfahren konnten in diesen Genbanken 16 Plasmide (pAK101-116) identifiziert werden, die in *E. coli* Alkohol-Oxidoreduktase-Aktivität vermittelten. Dies entsprach einem positiven Klon je 75000 untersuchter Kolonien. Parallel dazu wurden Genbanken aus natürlichen Habitaten mit Hilfe der gleichen Methode durchsucht. Die Trefferquote war hier deutlich geringer. Die isolierten 15 Plasmide (pAK201-215) entsprachen einem Verhältnis von ca. 1:200000 (s. 3.2.2). Das verdeutlichte, dass die gewählte Kombination aus Anreicherung und direkter DNA-Isolierung eine Erhöhung der Trefferquote bei der Durchmusterung von Metagenombanken zur Folge hatte und somit eine nützliche Vorgehensweise zur Identifizierung einer großen Anzahl von Zielgenen ist. Allerdings ging der Anreicherungsschritt auch deutlich zu Lasten der erhaltenen Diversität in den Genen und Genprodukten. Die Mehrheit der vorhergesagten, von den Plasmiden pAK101-116 kodierten Proteine zeigten hohe Übereinstimmungen zu bekannten Proteinen mit vorwiegend enterobakterieller Herkunft. Die Genprodukte, die aus den auf den Plasmiden pAK201-215 lokalisierten Genen abgeleitet wurden, zeigten dagegen nur geringe oder gar keine Ähnlichkeiten zu bekannten Proteinen und stammten aus einer sehr viel breiteren Vielfalt an Mikroorganismen.

Die vorgestellten Screeningstrategien ermöglichen die Überprüfung einer sehr großen Anzahl von Klonen aus komplexen Metagenombanken mit relativ einfachen Methoden. Außerdem ermöglichen sie die Entdeckung von bisher völlig unbekannten, strukturell neuartigen Proteinen und Biokatalysatoren. Das Aktivitäts-basierende Screening hat

jedoch auch seine Grenzen, da für die Expression zumeist der native Promotor notwendig ist und dieser vom Wirtstamm erkannt werden muß. In allen bisher publizierten Arbeiten auf diesem Gebiet wurde *E. coli* als Wirtstamm eingesetzt. Ein wichtiger Vorteil ist, dass für diesen Organismus eine Vielzahl von Methoden und Werkzeugen auf molekularbiologischer und proteinchemischer Ebene bereits etabliert sind. Der Stamm wird deshalb häufig für industrielle Produktionsprozesse und Biofermentationen eingesetzt. Auf der Basis von Aktivitäts-abhängigen Durchmusterungsverfahren konnten unter anderem Gene, die für Amylasen, Lipasen oder Chitinasen kodierten, identifiziert werden (s. Tab. 29). Die Sequenzanalyse ergab, dass nahezu alle für neue Genprodukte kodierten, die oft nur geringe oder gar keine Ähnlichkeiten zu bekannten Proteinen mit gleicher Funktion aufwiesen.

Anders sieht dies bei Durchmusterungsverfahren aus, die auf Sequenzähnlichkeiten oder konservierten Genabschnitten beruhen. Die Mehrzahl der bis jetzt publizierten Sequenz-abhängigen Methoden dienten zur Isolierung von rRNA-Genen und somit zur phylogenetischen Charakterisierung der untersuchten Habitate (STEIN et al., 1996; VERGIN et al., 1998; BÉJÀ et al., 2000). Im Vergleich zu der üblichen Vorgehensweise, die 16S- oder 23S-rDNA direkt aus der isolierten Umwelt-DNA zu amplifizieren, ermöglicht die Verwendung von komplexen Genbanken auch eine Sequenzierung und Analyse der Gene in der Umgebung der rRNA-Gene. Man erhält so einen Zugang zu den metabolischen Eigenschaften des identifizierten Organismus. Des Weiteren können durch die sogenannte „random“-Sequenzierung von Metagenombanken wertvolle Hinweise auf die genetische Organisation, die Kodonverteilung und die Stoffwechsellmöglichkeiten von unkultivierten Mikroorganismen erhalten werden. Durch die Sequenzierung der Insertenden von BAC-Genbanken und eine anschließende Ordnung der enthaltenen Genomfragmente konnten schon zusammenhängende Segmente von mehr als 200 kbp für bestimmte phylogenetische Gruppen gefunden werden (BÉJÀ et al., 2000), die u.a. Gene für den Zellstoffwechsel und für bisher unbekannte Enzyme enthielten.

Im Rahmen dieser Arbeit wurden ebenfalls auf Sequenzähnlichkeiten basierende Durchmusterungsverfahren zur Identifikation von biotechnologisch-relevanten Enzymen durchgeführt. Zu diesem Zweck wurden aus in allen bekannten Glycerin- und Diol-Dehydratasen konservierten Regionen degenerierte Oligonukleotide abgeleitet und dazu genutzt, die Genbanken auf das Vorhandensein dieser Gene hin zu überprüfen (s. Abb. 14). Dabei konnte die erwartete ca. 1,0 kbp-große Dehydratase-spezifische

Genregion in allen getesteten Genbanken amplifiziert werden. Anschließend wurden die amplifizierten Sequenzen als Sonden in Koloniehybridisierungsexperimente zur Durchmusterung der Metagenombanken eingesetzt. Alle auf diese Weise detektierten Dehydratase-Gene und die daraus abgeleiteten Genprodukte wiesen wie erwartet hohe Übereinstimmungen mit den schon bekannten Enzymen dieser Klasse auf. Einige der identifizierten Plasmide enthielten aber nur unvollständig klonierte Genbereiche. Dies erklärte auch, warum die entsprechenden Klone in dem Aktivitäts-basierenden Verfahren nicht gefunden wurden. Hierbei zeigten sich, wie bereits erwähnt, die Nachteile von Sequenz-abhängigen Durchmusterungen. Dazu gehört, dass keine völlig neuen Protein- und Enzymstrukturen gefunden werden können und außerdem die fehlende Selektivität für funktionelle Gene. Andererseits können auch geringe Variationen in Enzymen zu wesentlichen Veränderung in ihrer Aktivität und in ihrem Verhalten gegenüber Hemmstoffen führen. Dies ist beispielsweise der Fall wenn der Austausch von einzelnen Aminosäuren eine festere oder auch schlechtere Bindung des Substrats zur Folge hat oder eine Veränderung in der Struktur des Proteins bewirkt. In Mutageneseexperimenten mit der Chorisimat-Mutase aus *Bacillus subtilis* konnte gezeigt werden, dass das in Position 90 befindliche Arginin absolut essentiell für die Aktivität des Enzyms ist. Der gezielte Austausch dieses Restes gegen die 20 anderen möglichen Aminosäuren führte in keinem Fall zu einem aktiven Protein (HILVERT et al., 2002). Dagegen konnte für das Cytochrom P450 aus *Pseudomonas putida* durch den Austausch einzelner Aminosäuren (Tyr96Ala- bzw. Tyr96Phe) eine verbesserte Styren-Bindung und –Oxidation sowie eine gesteigerte Kopplungseffizienz erreicht werden (CIRINO und ARNOLD, 2002).

Unabhängig von der ausgewählten Strategie hat die Durchmusterung von Metagenombanken Vorteile gegenüber der klassischen Anreicherung von Mikroorganismen bei der Identifizierung und Isolierung der gesuchten Produkte. Im Rahmen von traditionellen Screeningprogrammen tritt häufig (in fast 50 % der Fälle) das Phänomen der Refermentation auf (OSBURNE et al., 2000). Mikrobielle Kulturen, insbesondere aus Bodenproben angereicherte, zeigen bei der ersten Anzucht die gewünschten Eigenschaften, verlieren aber bei weiteren Anzuchten die Fähigkeit, diese Aktivität auszubilden oder zu wachsen. Diese Schwierigkeiten treten bei der Durchmusterung von Metagenombanken nur in wenigen Fällen auf. Außerdem liegt die DNA-Region, die für die gesuchte Eigenschaft kodiert, schon fertig kloniert vor. Dies ermöglicht eine schnelle Sequenzierung und Analyse der Gene.

4.3 Isolierung von RNA aus Umweltproben

In den Jahren 1983 bis 1994 basierten 39 % der neu zugelassenen Arzneimittel auf Naturstoffen, bei antibakteriellen und antitumoralen Medikamenten lag ihr Anteil sogar über 60 % (CRAGG et al., 1997). Die meisten dieser heute gebräuchlichen Anti-Infektiva wurden durch Kultivierung von Mikroorganismen gewonnen (HENTSCHEL et al., 2002). Dabei haben sich besonders niedere Pilze als reichhaltige Quellen für ökonomisch interessante Enzyme und biologisch-aktive Substanzen erwiesen. Dazu gehören verschiedene Antibiotika sowie Lipasen und Proteasen, die in der Waschmittelindustrie eingesetzt werden. In den bisher vorgestellten Ansätzen zur Erfassung und Nutzung der Metagenome natürlicher Habitate als Quelle für neue Enzyme und Wirkstoffe werden Gene und Genprodukte aus eukaryotischen Organismen wie Hefen und Pilze nicht erhalten. Auch wenn die konstruierten Umweltgenbanken teilweise klonierte DNA aus Eukaryoten aufweisen, so werden sie mit den verwendeten Screeningmethoden nicht detektiert. Wie zuvor beschrieben wird für die Durchmusterung der Genbanken hauptsächlich *E. coli* als Wirtstamm genutzt. Das Bakterium ist jedoch nicht in der Lage eukaryotische Promotorstrukturen zu erkennen oder die gebildete mRNA zu prozessieren. Die überwiegende Mehrheit der Gene beinhaltet neben den Protein-kodierenden Sequenzen (Exons) eine oder mehrere nicht-kodierende Sequenzen, sogenannte Introns. Das primäre RNA-Transkript enthält sowohl die Exons als auch die Introns und erst durch den Vorgang des Spleißens entsteht dann die verkürzte, für ein funktionelles Protein kodierende mRNA. *E. coli* und auch allen anderen Bakterienspezies besitzen den hierzu notwendigen Enzymapparat nicht.

Hier liegt das Potential der Isolierung von eukaryotischer mRNA aus Umwelthabitaten. Um das in Umweltproben vorhandene eukaryotische Potential für die Identifizierung von neuen Genen und Genprodukten nutzbar zu machen bietet die Isolierung von bereits prozessierter mRNA und die anschließende Erstellung von cDNA-Genbanken neue technische Möglichkeiten. Ein kritischer Punkt dabei ist die Isolierung von reiner und intakter RNA. Dies beinhaltet die effektive Lyse der Zellen in den Umweltproben, die Denaturierung von RNase-Aktivität und das Entfernen von kontaminierender DNA. Die Analyse von mRNA um Strukturen und Aktivitäten von mikrobiellen Gemeinschaften zu untersuchen, wird noch nicht genutzt. Die meisten der bisher entwickelten Methoden zur RNA-Isolierung zielen wiederum auf phylogenetische

Studien ab (MORAN et al., 1993; FELSKE et al., 1996; DUARTE et al., 1998; MISKIN et al., 1999; GRIFFITH et al., 2000; HURT et al., 2001). Zur Lyse der Zellen werden analog zur DNA-Isolierung aus Umweltproben Methoden wie die alkalische Lyse, Behandlung mit Detergenzien, Hitzebehandlung, Ultraschall und „Bead beating“ in unterschiedlicher Art und Weise kombiniert. In einigen der publizierten Arbeiten werden mit den beschriebenen Methoden DNA und RNA koextrahiert (GRIFFITH et al., 2000; HURT et al., 2001). Der in dieser Arbeit verwendete Ansatz wurde in Anlehnung an die Methode zur DNA-Isolierung aus Umweltproben von ZHOU et al. (1996) entwickelt. Die wichtigsten Veränderungen im Vergleich dazu sind der auf 7,0 herabgesetzte pH-Wert des Hochsalzextraktionspuffers zur Stabilisierung der RNA und eine deutlich reduzierte Dauer der Hitzebehandlung (HURT et al., 2001). Die Trennung der koextrahierten DNA und RNA wurde mit Hilfe von Anionenaustauschersäulen erreicht. Durch diese Vorgehensweise konnten zwischen 0,3 und 2,1 µg Gesamt-RNA pro g Probe (Nassgewicht) erhalten werden. Dies stimmte gut mit den von HURT et al. (2001) ermittelten Werten überein. Zur Selektion der eukaryotischen mRNA aus der isolierten Gesamt-RNA kann man sich die Tatsache zu Nutze machen, dass der Großteil dieser mRNA am 3'-Ende ein Poly(A)-Segment besitzt, das zwischen 50 und 150 Nukleotide lang ist. Die physiologische Rolle des Poly(A)-Schwanzes in der Translation ist nicht klar, in einigen Fällen wurden jedoch stabilisierende Effekte beobachtet (KOZAK, 1983). In der vorliegenden Arbeit wurde daher mit der isolierten Gesamt-RNA eine Affinitätschromatographie an an Polystyren-Latex-Partikeln gebundenen dT-Oligomeren durchgeführt. Durch photometrische Bestimmung der RNA-Konzentration bei einer Wellenlänge von 260 nm konnten nur geringe Mengen mRNA nachgewiesen werden. Der Anteil der erhaltenen eukaryotischen Poly(A)-mRNA an der isolierten Gesamt-RNA-Menge war offensichtlich sehr klein und für den Einsatz in die cDNA-Synthese durch eine Reverse Transkriptase zu gering. Für weiterführende Arbeiten auf diesem Gebiet bedeutet das, dass zunächst die Lyseverfahren effizienter auf eukaryotische Zellen ausgerichtet werden müssen.

Für die dann mögliche Synthese von cDNA und die Herstellung von cDNA-Bibliotheken können kommerziell erhältliche Konstruktions-Kits genutzt werden, die eine gerichtete Klonierung in für *E. coli* geeignete Expressionsvektoren erlauben. Als Oligonukleotide für die cDNA-Synthese empfiehlt sich der Einsatz von Oligo(dT)-Oligonukleotiden, die an das Poly(A)-Ende der Transkripte binden können und von sogenannten „random“(Zufalls)-Hexameren.

4.4 Identifizierung und Charakterisierung von Coenzym B₁₂-abhängigen Glycerin- und Diol-Dehydratasen aus Metagenombanken

Zur Identifizierung von neuen Glycerin- und Diol-Dehydratasen für einen möglichen Einsatz in der biotechnologischen Produktion von 1,3-Propandiol wurden sowohl Aktivitäts- als auch Sequenz-abhängige Durchmusterungsverfahren genutzt, die bereits in den vorangegangenen Kapitel diskutiert wurden. Insgesamt konnten auf diese Weise in den vier Anreicherungsgenbanken ZRA, GEA, SLA und GIIA sieben verschiedene Plasmide detektiert werden, die Gene für Glycerin- und Diol-Dehydratasen trugen (s. 3.3). Es wurde sowohl eine molekulare Analyse der klonierten Gene als auch eine biochemische Charakterisierung der korrespondierenden Genprodukte durchgeführt. Schon nach den ersten Sequenzierungsschritten wurde deutlich, dass die auf den Plasmiden pAK6 und pAK8 kodierten Gene eine 100 %ige Übereinstimmung mit den Genen aus *C. freundii* aufwiesen. Beide Plasmide wurden daher in den weiteren Untersuchungen nicht berücksichtigt. Die Analyse der Sequenzdaten der in den Plasmiden pAK2-5 und pAK7 klonierten DNA-Abschnitte zeigte, dass die dort lokalisierten Glycerin- bzw. Diol-Dehydratase-Gene starke Ähnlichkeiten (77 bis 98 %) zu den entsprechenden Genen der Enterobakterien *C. freundii* bzw. *S. typhimurium* aufwiesen. In Abbildung 39 ist die verwandtschaftliche Beziehungen der abgeleiteten Proteinsequenzen für die Dehydratase-Untereinheiten zu denen der Glycerin-Dehydratase aus *C. freundii* (DhaBCE) und der Diol-Dehydratase aus *S. typhimurium* (PduCDE) dargestellt. Es ist zu sehen, dass die auf den Plasmiden pAK2-3 und pAK7 kodierten Untereinheiten Cluster mit denen der Glycerin-Dehydratasen aus *C. freundii* bilden. Aufgrund der starken Ähnlichkeiten, die auch durch die geringen Abstände in den Verzweigungen deutlich werden, konnten die Enzyme in die Klasse der Glycerin-Dehydratasen eingeordnet werden. Die auf den Plasmiden pAK4-5 kodierten Untereinheiten bildeten dagegen eigene Cluster mit denen der Diol-Dehydratase aus *S. typhimurium*, was die Klassifizierung als Diol-Dehydratasen unterstützt.

Abbildung 39: Phylogenetische Beziehungen der einzelnen Untereinheiten der aus den Metagenombanken identifizierten Glycerin- und Diol-Dehydratasen zu den entsprechenden Genprodukten aus *C. freundii* und *S. typhimurium*

Referenzen: Glycerin-Dehydratase aus *C. freundii*, SEYFRIED et al. (1996); Diol-Dehydratase aus *S. typhimurium*, BOBIK et al. (1997); Glycerin- und Diol-Dehydratasen aus pAK2-5 und pAK7, diese Arbeit.

Die beobachteten Ähnlichkeiten waren jedoch nicht beschränkt auf die Sequenzübereinstimmungen der Proteine, sondern zeigten sich auch bei der genetischen Organisation der Untereinheiten und der darüber hinaus auf den Plasmiden klonierten Gene. In allen bisher näher untersuchten Glycerin- oder 1,2-Propandiol-fermentierenden Bakterien liegen die Gene für die entsprechenden Coenzym B₁₂-abhängigen Dehydratasen in sogenannten Operon- oder Regulon-Strukturen mit weiteren Genen für an der Fermentation beteiligter Enzyme vor (DANIEL et al., 1998). In Abbildung 40 ist

die genetische Organisation der Enzyme des reduktiven Zweiges der Glycerinfermentation in *C. freundii*, *K. pneumoniae* und *Cl. pasteurianum*, sowie für die des 1,2-Propandiol-Abbaus in *K. oxytoca* und *S. typhimurium* dargestellt. Auf dem in dem Plasmid pAK7 inserierten DNA-Abschnitt konnten zusätzlich zu den Glycerin-Dehydratase-Genen die Gene für die 1,3-Propandiol-Dehydrogenase (*dhaT*), die Adenosyltransferase (*dhaH*) und für Teile des Reaktivierungsfaktors (*dhaFG*) identifiziert werden. Das Plasmid pAK2 enthielt die Gene *dhaF* und *dhaI* sowie Teile von *dhaT*. Auf pAK3 war ein kurzer Abschnitt von *dhaF* vorhanden. Diese Gene sind in der gleichen Anordnung ebenfalls im *dha*-Regulon von *C. freundii* lokalisiert (s. Abb. 18 und 40). Analog dazu konnten auf dem Plasmid pAK5 zusätzlich zu den Genen für die Diol-Dehydratase-Untereinheiten die Gene *pduGH*, die für den Reaktivierungsfaktor kodieren und *pduJ* identifiziert werden, die ebenfalls zum *pdu*-Operon von *S. typhimurium* gehören (s. Abb. 18 und 40).

Die Herkunft von klonierten DNA-Fragmenten in Metagenombanken ist nicht feststellbar. Die hohen Identitäten der auf pAK2-3 und pAK7 lokalisierten Gene zu denen aus *C. freundii* deuten jedoch darauf hin, dass es sich möglicherweise um Spezies-Varianten dieses Organismus handeln könnte. Ein vergleichbares Ergebnis zum Auftreten von Spezies-Varianten hatte die Sequenzanalyse mehrerer Cosmide aus einer Genbank des unkultivierbaren Archaeobakteriums *Cenarchaeum symbiosum* ergeben, der durch 16S rDNA-Analysen als Symbiont eines marinen Schwammes identifiziert worden war. Dabei isolierte, überlappende DNA-Fragmente wiesen leichte Sequenzvariationen auf, was zeigte, dass ein bakterieller Symbiont schon innerhalb seines spezifischen Wirtes erhebliche genetische Variationen ausbilden kann (SCHLEPER et al., 1998). Für die in pAK4 und pAK5 klonierten Genregionen trifft dies im Vergleich mit *S. typhimurium* nicht zu. Die Unterschiede in den Sequenzen sind hier wesentlich deutlicher und die auftretenden Differenzen im G+C-Gehalt (> 3 %) deuteten außerdem auf eine unterschiedliche Kodonnutzung der unbekannten Organismen hin.

Abbildung 40: Genetische Organisation der Enzyme des reduktiven Zweiges der Glycerin-Fermentation in *C. freundii* (A), *Cl. pasteurianum* (B) und *K. pneumoniae* (C) sowie für die des 1,2-Propandiol-Abbaus in *K. oxytoca* (D) und *S. typhimurium* (E)

Pfeile und Pfeilspitzen repräsentieren die Länge, Position und Orientierung von möglichen Genen. Hellgraue und dunkelgraue Pfeile markieren die Gene für die Diol- bzw. Glycerin-Dehydratasen sowie die ihrer Reaktivierungsfaktoren. Schwarze Pfeile stehen für offene Leserahmen, die für die 1,3-Propandiol-Dehydrogenase kodieren.

Zur Identifizierung der Dehydratase-Gene tragenden Plasmide waren, wie zuvor beschrieben, sowohl Aktivitäts- als auch Sequenz-basierende Durchmusterungsverfahren angewandt worden. Ein auf Sequenzhomologien basierendes Verfahren beschränkt die Detektion von vorn herein auf Gene, die Ähnlichkeiten zu den bekannten Genen der untersuchten Enzymklasse aufweisen. Etwas überraschend war jedoch, dass auch bei der Aktivitäts-abhängigen Durchmusterung der Umweltgenbanken mit Hilfe des Stammes *E. coli* ECL707/pAK1 keine neuartigen

Strukturen identifiziert werden konnten, die eine Dehydratase-Aktivität vermittelten. Alle isolierten Plasmide trugen Gene, die hohe Ähnlichkeiten zu denen der Enterobakterien *C. freundii* und *S. typhimurium* zeigten. Zur Erklärung bieten sich hier mehrere Möglichkeiten an. Die durchgeführte Anreicherung mit M9-Mineralmedium und den Substraten Glycerin und 1,2-Propandiol bot offensichtlich einen Wachstumsvorteil für schnell wachsende, die angebotenen Substrate verwertende Mikroorganismen, wie Enterobakterien. Die Ergebnisse der Durchmusterung der gleichen Genbanken auf die Existenz von Alkohol-Oxidoreduktase-Gene bestätigt dies ebenso wie die Arbeiten von ENTCHEVA et al. (2001), die in ihren Anreicherungskulturen ebenfalls M9-Medium verwendet hatten. In beiden Fällen zeigten die identifizierten Gene hohe Übereinstimmungen mit Genen enterobakterieller Herkunft. Andererseits ist zu beachten, dass die bekannten Coenzym B₁₂-abhängigen Glycerin- und Diol-Dehydratasen in sich homogene und hoch konservierte Enzymklassen darstellen. Sie weisen die Untereinheitenstruktur $\alpha_2\beta_2\gamma_2$ auf und die Übereinstimmungen in den Aminosäuresequenzen liegen zwischen 54 und 99 % (DANIEL et al., 1998). Dies deutet auf eine hohe Konservierung von Reaktionstyp und beteiligter Enzyme im Zuge der Evolution hin.

Zusätzlich zur molekularen Analyse der Dehydratasen aus den Metagenombanken wurden auch die korrespondierenden Proteine einer eingehenden Charakterisierung unterzogen. Zu diesem Zweck wurden die Gene, die auf pAK2 und pAK7 vorlagen in Expressionsvektoren subkloniert. Die unvollständig klonierten Dehydratase-Gene der Plasmide pAK3 und pAK5 konnten in einer sogenannten „Megaprime“-PCR durch entsprechende Teile aus dem nächsten Verwandten komplettiert und ebenfalls subkloniert werden. Die Hybrid-Glycerin-Dehydratase auf pAK3.1 zeigte jedoch nach Produktion in *E. coli* keine Aktivität und konnte somit nicht in die nachfolgenden Untersuchungen einbezogen werden (s. 3.3.3).

Die Rate, mit der die Substrate Glycerin, 1,2-Propandiol oder 1,2-Ethandiol umgesetzt werden, ist ein Unterscheidungsmerkmal für die zwei Klassen Coenzym B₁₂-abhängiger Dehydratasen. Die Glycerin-Dehydratasen bevorzugen Glycerin als Substrat, die Diol-Dehydratasen dagegen zeigen mit 1,2-Propandiol eine höhere spezifische Aktivität (TORAYA und FUKUI, 1977; POZNANAKAJA und KORSOVA, 1979; SEYFRIED et al., 1996). Weitere Kriterien für die Unterscheidung der Enzyme sind die Selektivität bei der Aktivierung durch monovalente Kationen, die Affinität für Coenzym B₁₂ und die

differenten immunochemischen Eigenschaften (TORAYA et al., 1971; TORAYA und FUKUI, 1977; FORAGE und FOSTER, 1979; TORAYA et al., 1980).

Die beiden als Glycerin-Dehydratasen klassifizierten Enzyme, die von *E. coli* BL21/pAK2.1 und *E. coli* BL21/pAK7.1 gebildet wurden, zeigten das für diese Enzyme typische Substratspektrum und wiesen die höchste spezifische Aktivität mit Glycerin als Substrat auf (s. Tab. 16). Die relativen Aktivitäten mit 1,2-Propandiol und 1,2-Ethandiol lagen bei 31 und 21 % bzw. 7 und 2 %. Auch dies stimmte gut überein mit Werten, die für andere Glycerin-Dehydratasen bestimmt wurden (SEYFRIED et al., 1996; MACIS et al., 1998). Die von *E. coli* BL21/pAK5.1 produzierte Hybrid-Diol-Dehydratase zeigte wie erwartet eine Präferenz für das Substrat 1,2-Propandiol. Aber auch mit Glycerin sank die Aktivität nur um 4 %, mit 1,2-Ethandiol konnten 41 % relative Aktivität festgestellt werden. Die Aktivität aller Enzyme war strikt von der Anwesenheit des Kofaktors Coenzym B₁₂ im Reaktionsansatz abhängig. Die Ergebnisse der Sequenzanalyse konnten somit bestätigt werden.

Die Molekularmassen der Dehydratasen konnten anhand ihres Laufverhaltens in einer Gradienten-PAGE unter nicht denaturierenden Bedingungen und eine daran anschließenden Aktivitätsfärbung bestimmt werden (s. 3.2.3.5). Hierzu wurde 1,2-Propandiol als Substrat verwendet, dass von allen bekannten Coenzym B₁₂-abhängigen Dehydratasen umgesetzt werden kann (DANIEL et al., 1998). Das dabei entstehende Propionaldehyd bildete mit 2,4-Dinitrophenylhydrazin ein gelbes Präzipitat, was eine Zuordnung der Proteinbanden ermöglichte (s. Abb. 23). Für die von *E. coli* BL21/pAK2.1 und *E. coli* BL21/pAK7.1 produzierten Glycerin-Dehydratasen wurde eine Molekularmasse von ca. 190 kDa bestimmt. Dies stimmte gut mit den aus den Sequenzen abgeleiteten Molekularmassen und mit den in der Literatur beschriebenen Massen anderer Glycerin-Dehydratasen überein (SEYFRIED et al., 1996; MACIS et al., 1998; FORAGE und FOSTER, 1979). Bei der Aktivitätsfärbung der Hybrid-Diol-Dehydratase aus *E. coli* BL21/pAK5.1 konnte eine Molekularmasse von ca. 230 kDa ermittelt werden. Für die Diol-Dehydratase aus *K. oxytoca* war von POZNANZKAYA et al. (1979) durch Gelfiltration und Sedimentationsgleichgewichtszentrifugation der identische Wert ermittelt worden.

Nachfolgend wurden die Empfindlichkeit der neu isolierten Enzyme gegenüber der „suicide“-Inaktivierung mit Glycerin untersucht. Die inhibitorische Wirkung dieses Substrates ist sowohl für die Glycerin-Dehydratasen aus *K. pneumoniae* und *C. freundii* sowie für die Diol-Dehydratase aus *K. oxytoca* beschrieben worden (TORAYA et al.,

1976; BACHOVCHIN et al., 1977; SEYFRIED et al., 1996). Die Dehydratasen gehören zur Klasse II der Coenzym B₁₂-abhängigen Enzyme, die das Cobalamin in der „base-on“-Form binden (SHIBATA et al., 1999). In Abbildung 41 ist die über einen radikalischen Mechanismus ablaufende Substratumsetzung zusammengefasst. Die Interaktion von Apoenzym und Coenzym aktiviert die Co-C-Bindung des Coenzym. Es kommt zur Homolyse der Co-C-Bindung und zur Bildung von Cob(II)alamin und einem Adenosyl-Radikal. Das Adenosyl-Radikal abstrahiert ein Wasserstoffatom vom Substrat und anschließend rearrangiert das entstandene Substrat-Radikal zu einem Produkt-Radikal durch einen Hydroxylgruppentransfer von C2 zu C1. Das Produkt-Radikal überträgt ein Wasserstoffatom zurück auf das 5'-Desoxyadenosin. Das Resultat ist die Bildung des Endproduktes und die Regeneration von Coenzym B₁₂. Für die Reaktion mit Glycerin wird angenommen, dass das Substrat in zwei verschiedenen Konformationen im aktiven Zentrum der Dehydratasen gebunden werden kann, von denen die eine die Dehydratisierung, die andere hingegen die Inaktivierung begünstigt. Bei der Inaktivierung entsteht ein 5'-Desoxyadenosin und eine unbekannte Cobalaminspezies, die ein Spektrum ähnlich dem von Alkylcobalamin zeigt (BACHOVCHIN et al., 1977). Diese unbekannte Cobalaminspezies wird langsam in Hydroxy-B₁₂ umgewandelt, bindet mit hoher Affinität an die Dehydratase und inaktiviert diese irreversibel. Alle aus den Metagenombanken isolierten Coenzym B₁₂-abhängigen Dehydratasen werden während der Reaktion mit Glycerin innerhalb von wenigen Minuten inaktiviert. Zum Vergleich mit den neu isolierten Dehydratasen wurde die Glycerin-Dehydratase aus *C. freundii* mit Hilfe des rekombinanten Plasmids pCS120 ebenfalls in *E. coli* produziert und gereinigt (SEIFERT et al., 2001). Diese und das Hybrid-Enzym aus *E. coli* BL21/pAK5.1 zeigten sich am wenigsten empfindlich gegenüber der Glycerininaktivierung (s. Abb. 25). Die höhere Resistenz der Diol-Dehydratase im Vergleich mit den beiden Glycerin-Dehydratasen aus *E. coli* BL21/pAK2.1 und *E. coli* BL21/pAK7.1 ist überraschend, da für die Coenzym B₁₂-abhängigen Dehydratasen der *Klebsiella*-Stämme eine schnellere Inaktivierung der Diol-Dehydratasen etabliert ist (BACHOVCHIN et al., 1977; POZNANSKAYA et al., 1977). Diese wurde darauf zurückgeführt, dass die beiden Enzymtypen eine unterschiedliche Affinität zu den beiden (S)- und (R)-Isomeren des Glycerins aufweisen. Die Glycerin-Dehydratase zeigt eine in etwa gleichwertige Affinität zu beiden Isomeren, während die Diol-Dehydratasen das (S)-Isomer bevorzugen (YAMANISHI et al., 2002). Dabei ist der Enzym-(R)-Glycerin-Komplex vorwiegend

für die Produktbildung verantwortlich und der Enzym-(S)-Glycerin-Komplex verursacht die Inaktivierung. Die beobachtete geringere Präferenz für die inaktivierende Form des Substrats ist somit für die langsamere Inaktivierung der Glycerin-Dehydratasen verantwortlich (BACHOVCHIN et al., 1977; YAMANISHI et al., 2002). Die Ergebnisse der Untersuchung der Hybrid-Diol-Dehydratase aus *E. coli* BL21/pAK5.1 zeigten, dass sich dieses Enzym in Bezug auf die Isomer-Präferenz wie eine Glycerin-Dehydratase verhält.

Abbildung 41: Vereinfachter Reaktionsmechanismus der Coenzym B₁₂-abhängigen Glycerin- und Diol-Dehydratasen

Die Reaktivierung der Glycerin-inaktivierten Glycerin- und Diol-Dehydratasen ist für das anaerobe Wachstum auf dem Substrat notwendig, da die Enzyme essentiell für den Fermentationsprozess sind (TORAYA et al., 1980; BOENIGK et al., 1993; DANIEL et al., 1998; LUERS et al., 1997). Es konnte gezeigt werden, dass Glycerin-inaktivierte Dehydratasen durch den Austausch des modifizierten Coenzyms gegen intaktes Cobalamin reaktiviert werden können. Dieser Austausch wird durch einen als Reaktivierungsfaktor bezeichneten heterodimeren Proteinkomplex in Anwesenheit von ATP und Mg²⁺-Ionen vermittelt. Der von SEIFERT (2001) postulierte Reaktivierungsmechanismus ähnelt dem Chaperon-Zyklus aus *E. coli* (s. Abb. 42). Während der Dehydratisierung von Glycerin wird sowohl die Glycerin- als auch die

Diol-Dehydratase inaktiviert. Die Inaktivierung wird durch die irreversible Spaltung der Co-C-Bindung des Coenzym B_{12} hervorgerufen. Das so modifizierte Coenzym bindet an die Dehydratase und inaktiviert diese. Der Reaktivierungsfaktor bindet anschließend an das inaktivierte Enzym, wodurch die Bindung des modifizierten Coenzym zur Dehydratase geschwächt und dieses abgespalten wird. Durch die Bindung von ATP an den Reaktivierungsfaktor und der daraus resultierenden Konformationsänderung dissoziiert der Komplex aus Reaktivierungsfaktor und Dehydratase. Die Dehydratase kann nun erneut enzymatisch aktives Coenzym B_{12} binden und die Dehydratisierung von Glycerin katalysieren. Für *C. freundii* (DhaFG), *K. oxytoca* (DdrAB) und *K. pneumoniae* (GdrAB) konnten die als Reaktivierungsfaktor fungierenden Proteinkomplexe bereits identifiziert und charakterisiert werden (MORI et al., 1997; TORAYA und MORI, 1999; SEIFERT et al., 2001; KAJIURA et al., 2001). Gene, die für homologe Proteine kodieren, befinden sich in Nachbarschaft zu allen bekannten Glycerin- und Diol-Dehydratase-Genen. Auch auf den Plasmiden pAK2-3, pAK5 und pAK7 waren Teile dieser Gene vorhanden (s. Abb. 18). Alle hier untersuchten Umwelt-Dehydratasen konnten in Gegenwart von Coenzym B_{12} , ATP und $MgCl_2$ durch den Reaktivierungsfaktor DhaFG aus *C. freundii* reaktiviert werden. Die gemessenen Reaktivierungsraten lagen für die von *E. coli* BL21/pAK2.1 und *E. coli* BL21/pAK7.1 produzierten Glycerin-Dehydratasen bei 81 und 85 % (S. Tab. 18). Diese Werte stimmten gut mit dem für die Glycerin-Dehydratase aus *C. freundii* erhaltenen Wert von 84 % überein (SEIFERT et al., 2001). Die Diol-Dehydratase aus *E. coli* BL21/pAK5.1 wurde zu 62 % reaktiviert (S. Tab. 18). Eine solche Kreuzreaktion eines Reaktivierungsfaktors einer Glycerin-Dehydratase mit einer inaktiven Diol-Dehydratase war bisher noch nicht beschrieben worden. Frühere Experimente zur Reaktivierung der Diol-Dehydratasen aus *K. oxytoca* und *S. typhimurium* mit DhaFG aus *C. freundii* waren nicht erfolgreich gewesen (SEIFERT et al., 2001). Die Untersuchungen waren jedoch nicht mit den gereinigten Enzymen durchgeführt worden, sondern mit Rohextrakten der jeweiligen Stämme. Die aufgrund dieser Ergebnisse gemachte Annahme der Reaktivierungsfaktor aus *C. freundii* sei spezifisch für Glycerin-Dehydratasen, konnte somit im Rahmen dieser Arbeit widerlegt werden.

Abbildung 42: Von SEIFERT (2001) postulierter Mechanismus der Reaktivierung inaktivierter Glycerin- und Diol-Dehydratasen durch die entsprechenden Reaktivierungsfaktoren

E, Apo-Dehydratase; RF, Reaktivierungsfaktor; AdoH, 5'-Desoxyadenosin; Cbl, Cobalamin.

Erstmalig wurde im Rahmen dieser Arbeit die Hemmung der Dehydratase-Aktivität durch 1,3-Propandiol, das Endprodukt der Glycerin-Fermentation intensiv untersucht. Dass eine solche Hemmung auftritt, war zuvor lediglich in einer Publikation von POZNANSKAYA und KORSOVA (1979) angedeutet worden. Bei der biotechnologischen Produktion treten 1,3-Propandiol-Konzentrationen von bis zu 2 M auf (CHOTANI et al., 2000). 1,3-Propandiol wird von den Dehydratasen nicht umgesetzt, wirkt aber als Inhibitor, der mit den Substraten um die Bindung an das Enzym konkurriert (POZNANSKAYA und KORSOVA, 1979). Die geringste Sensitivität wies dabei die Hybrid-Diol-Dehydratase auf. Sogar in Gegenwart von 2 M 1,3-Propandiol war noch etwa 40 % der Ausgangsaktivität detektierbar, der K_i -Wert lag bei 1,36 M.

Betrachtet man sowohl die relative Stabilität bei der Inaktivierung durch Glycerin als auch die Unempfindlichkeit gegenüber der Hemmung durch 1,3-Propandiol so erscheint die von *E. coli* BL21/pAK5.1 produzierte Hybrid-Diol-Dehydratase am besten für einen Einsatz in der biotechnologischen Produktion von 1,3-Propandiol geeignet. Die Anwendbarkeit des Enzyms muss durch die direkte Integration der korrespondierenden

Gene in den *E. coli*-Produktionsstamm überprüft werden. Im Rahmen dieser Experimente sollte auch die Integration eines entsprechenden, Diol-Dehydratase-spezifischen Reaktivierungsfaktors vorgenommen werden, da die Untersuchungen zur Reaktivierung mit dem Reaktivierungsfaktor aus *C. freundii* eine deutlich verminderte Spezifität von DhaFG für die Hybrid-Diol-Dehydratase gezeigt hatten.

4.5 Identifizierung und Charakterisierung von Alkohol-Oxidoreduktasen in Metagenombanken

Die enzymatische Oxidation und Reduktion von Alkoholen bzw. Carbonylverbindungen ist an einer Vielzahl von metabolischen Prozessen in Tieren, Pflanzen, Hefen und Bakterien beteiligt. Diese Redoxreaktionen werden von Oxidoreduktasen katalysiert (FANG et al., 1995; HUMMEL, 1997). Die bekannten Alkohol-Oxidoreduktasen lassen sich aufgrund ihrer Struktur, der benötigten Kofaktoren und der enthaltenen Metallionen in drei verschiedene Hauptgruppen unterteilen. Man unterscheidet die NAD(P)⁺-abhängigen Dehydrogenasen (Typ I, Typ II und Typ III), die NAD(P)⁺-unabhängigen Dehydrogenasen (mit Kofaktoren wie FAD, PQQ oder F₄₂₀) und die Alkohol-Oxidasen. Zu den natürlichen Substraten dieser Enzyme gehören sowohl primäre und sekundäre, verzweigte wie unverzweigte, aliphatische und aromatische Alkohole als auch die korrespondierenden Aldehyde und Ketone (MACINTOSH und FEWSON, 1987). Viele Mikroorganismen besitzen mehrere verschiedenen Alkohol-Dehydrogenasen, die zumeist unter verschiedenen Wachstumsbedingungen induziert werden und somit unterschiedliche Funktionen im Stoffwechsel ausüben. Der Schimmelpilz *Aspergillus nidulans* besitzt z.B. neun verschiedene NAD⁺-abhängige Alkohol-Dehydrogenasen, die sehr differente Substratspektren aufweisen und deren Bildung unterschiedlich reguliert ist (SEALY-LEWIS und FAIRHURST, 1995). In *Saccharomyces cerevisiae* finden sich drei Alkohol-Dehydrogenasen (REID und FEWSON, 1994). Diese drei Isoenzyme (zwei gehören zu den Zink-beinhaltenden und eines zur Gruppe der Eisen-aktivierten ADHs) unterscheiden sich nicht wesentlich in ihren V_{max}-Werten bei Oxidation und Reduktion, jedoch haben sie eine unterschiedlich hohe Affinität für ihr Hauptsubstrat Ethanol. Die Identitäten in den Aminosäuresequenzen liegen zwischen 78 und 94 % (WILLS, 1976).

In der industriellen Biotechnologie haben sich besonders die NAD(P)^+ -abhängigen Enzyme als nützliche Katalysatoren bei der Synthese von chiralen Alkoholen bewährt (HUMMEL, 1999). Die dort eingesetzten Enzyme weisen hohe Aktivität, Stabilität und Enantioselektivität auf. Trotz bestimmter struktureller und funktioneller Ähnlichkeiten stellen die bisher bekannten NAD(P)^+ -abhängigen Alkohol-Dehydrogenasen eine sehr heterogene Enzymklasse dar. Ein Alignment von 47 Mitgliedern der Gruppe der Typ I NAD^+ -abhängigen Alkohol-Dehydrogenasen hatte gezeigt, dass nur 9 Aminosäurereste konserviert waren. Die acht ermittelten konservierten Glycin-Reste und ein Valin-Rest spielten jedoch keine Rolle in der Katalyse, sie besaßen strukturelle Funktionen (SUN und PLAPP, 1992). Weit verbreitet dagegen sind bei vielen NAD(P)^+ -abhängigen Dehydrogenasen die Glycin-reichen Motive GXGXXG (SCRUTTON et al., 1990) oder GXGXXA (WIERENGA et al., 1985), die an der Bindung des Nikotinamid-Kofaktor beteiligt sind.

Ziel der vorliegenden Untersuchungen war die Identifizierung und Charakterisierung von neuartigen Genen aus Umweltgenbanken, die diese Art von Reaktionen katalysieren und das Anlegen eines Klon- bzw. Gen-Pools für diesen Reaktionstyp. Ein solcher Pool mit einigen Hundert Klonen oder Plasmiden kann als Ausgangsmaterial für neue oder verbesserte Produktionsprozesse verwendet werden. Zur Detektion der Gene wurde ein einfacher Plattentest verwendet, der auf der Expression der eingebrachten Umweltgene und der Aktivität der gebildeten Proteine im Wirtstamm *E. coli* basierte. Die Nachweismethode war zuvor erfolgreich von CONWAY et al. (1987) und JOHNSON et al. (2001) zur Detektion von Alkohol-Dehydrogenase- und Diol-Dehydratase-Aktivität verwendet worden. Die Glycerin-negative *E. coli*-Mutante ECL707 diente als Wirtstamm. Als Ausgangsmaterial für die Durchmusterung wurden wiederum die Anreicherungs-genbanken aus den Sedimentproben des Solar Lake (SLA), des Golf von Eilat (GEA) und der Grone (GIIA) sowie der Bodenprobe des Zuckerrübenfeldes (ZRA) genutzt. Des Weiteren kamen hier die Umweltgenbanken FN, WN und ZB aus nicht angereicherten Bodenproben zum Einsatz. Als Testsubstrate wurden ein Glycerin/1,2-Propandiol-Gemisch, 1,2-Ethandiol oder 2,3-Butandiol verwendet. Es ist bekannt, dass eine ganze Anzahl von NAD(P)^+ -abhängigen Alkohol-Dehydrogenasen in den Abbau von Substraten wie Glycerin und 1,2-Propandiol involviert sind. Die Mehrheit dieser Enzyme wie die Glycerin-Dehydrogenasen, 1,2-Propandiol-Dehydrogenasen und 1,3-Propandiol-Dehydrogenasen gehören zu den Eisen-haltigen Typ III Alkohol-Dehydrogenasen (SUGIURA et al., 1978; QUATTARA

et al., 1992; DANIEL et al., 1995). Sie sind bei einer ganzen Reihe von bakteriellen Spezies bekannt, dazu gehören u.a. *C. freundii*, *Cl. pasteurianum*, *Erwinia aroidea*, *Desulfovibrio* strain HDv, *Cellulomonas* sp., *Lactobacillus reuteri* und *K. pneumoniae*. Auf der Basis der beschriebenen Durchmusterungsmethode konnten in den sieben verschiedenen Umweltgenbanken insgesamt 31 positive *E. coli*-Klone mit stabilem Phänotyp identifiziert werden. 16 dieser *E. coli* Klone enthielten Plasmide, die aus den „angereicherten“ Metagenombanken ZRA, GEA, SLA und GIIA entstammten (s. 3.3.2). Die übrigen 15 Plasmide, die ebenfalls den gewünschten Carbonyl-bildenden Phänotyp vermittelten, entstammten den Umweltgenbanken FN, WN und ZB, die die natürliche Diversität ihrer Habitate repräsentierten (s. 3.3.3). Die verwendeten Anreicherungs-genbanken zeigten im Vergleich mit den nicht-angereicherten Genbanken eine etwa 3-fach höhere Trefferquote (s. Tab. 30).

Tabelle 30: Vergleich der Ergebnisse der Durchmusterung von angereicherten Metagenombanken und solchen aus unveränderten Habitaten zur Identifizierung neuartiger Alkohol-Dehydrogenase-Aktivität vermittelnder Gene

Ergebnisse mit nicht-angereicherten Genbanken	Ergebnisse mit angereicherten Genbanken
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 15 positive <i>E. coli</i>-Klone bei 3000000 überprüften Klonen -> Verhältnis 1:200000 ▪ 7 Plasmide vermittelten NAD(H)-abhängige Alkohol-Dehydrogenase-Aktivität ♦ 50 % der identifizierten Gene zeigten keinerlei Übereinstimmungen mit bekannten Genen ♦ 50 % der identifizierten Gene zeigten schwache Übereinstimmungen mit bekannten Genen ▪ 5 der identifizierten Gene zeigten Ähnlichkeiten zu Oxidoreduktase-kodierenden Genen ▪ keines war ähnlich zu bekannten Alkohol-Dehydrogenase-Genen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 16 positive <i>E. coli</i>-Klone bei 900000 überprüften Klonen -> Verhältnis 1:75000 ♦ 8 Plasmide vermittelten NAD(H)-abhängige Alkohol-Dehydrogenase-Aktivität ♦ 8 % der identifizierten Gene zeigten keinerlei Übereinstimmungen mit bekannten Genen ♦ 33 % der identifizierten Gene zeigten schwache Übereinstimmungen mit bekannten Genen ♦ 59 % der identifizierten Gene zeigten hohe Übereinstimmungen mit bekannten Genen ▪ 12 der identifizierten Gene zeigten Ähnlichkeiten zu Oxidoreduktase-kodierenden Genen ▪ 4 davon waren ähnlich zu bekannten Alkohol-Oxidoreduktase-Genen

Je 75000 überprüfter Kolonien konnte ein positiver Klon erhalten werden. Bei der Durchmusterung der nicht angereicherten Genbanken wurde ein Verhältnis von 1:200000 erzielt. Die identifizierten rekombinanten *E. coli*-Stämme und die enthaltenen Plasmide wurden einer eingehenden molekularen und biochemischen Analyse unterzogen. Tabelle 30 gibt eine Übersicht über die mit den unterschiedlichen Genbanktypen erzielten Ergebnisse. Die Analyse der Sequenzdaten aller erhaltenen Plasmide zeigte zunächst, dass keines der Plasmide mehrfach isoliert worden war. Außerdem konnte eine enorme Diversität in den Genen und abgeleiteten Genprodukten festgestellt werden. Der Vergleich der abgeleiteten Aminosäuresequenzen mit den in den Datenbanken der NCBI gespeicherten Proteinen ergab Ähnlichkeiten zu Genprodukten, die einer ganzen Reihe unterschiedlicher mikrobieller Gattungen zuzuordnen sind. Dazu gehörten u. a. die Gattungen *Yersinia*, *Salmonella*, *Sinorhizobium*, *Thermotoga*, *Ralstonia*, *Agrobacterium*, *Bacillus* und *Methanosarcina*. Dies zeigte, dass die in den Metagenombanken klonierten Genregionen ebenfalls aus einer großen Anzahl unterschiedlicher und bisher unbekannter Mikroorganismen stammten.

Die Kombination aus Anreicherung und direkter DNA-Isolierung, die zur Isolierung der Plasmide pAK101 bis pAK116 führte, hat sich als eine effektive Methode zur Detektion einer großen Anzahl von Genen erwiesen, die den gewünschten Phänotyp vermittelten (s. 3.4.2). Acht der identifizierten Plasmide vermittelten eine NAD⁺-abhängige Alkohol-Dehydrogenase-Aktivität, die mit verschiedenen Substraten im enzymatischen Test in den Rohextrakten der entsprechenden *E. coli*-Klone nachgewiesen werden konnte (s. Tab. 20). Durch die Analyse der Sequenzdaten konnten auf den 16 Plasmiden insgesamt 38 vollständig klonierte und 16 unvollständige Gene vorhergesagt werden. Insgesamt 92 % der Gene und der daraus abgeleiteten Genprodukte wiesen signifikante Ähnlichkeiten zu bereits sequenzierten Genen aus anderen Organismen auf. Die übrigen 8 % zeigten dagegen keinerlei Übereinstimmungen mit den in den Datenbanken gespeicherten Sequenzen. Bei der Zuordnung der Genprodukte war eine deutliche Konzentration auf Proteine enterobakterieller Herkunft zu beobachten. Die Übereinstimmungen von einigen dieser offenen Leserahmen mit Genen der bereits sequenzierten Enterobakterien lagen in einem Bereich von über 90 %. Dazu gehörten z.B. *dacD* (pAK103), *fdhD* (pAK109), *orf14* (pAK110) sowie *glpX* und *glpK* (pAK115). Keines der Gene zeigte jedoch eine 100 %ige Identität und somit konnte auch keines der klonierten DNA-Fragmente einem schon bekannten Organismus zugeordnet werden.

Zwölf der identifizierten Gene (*phsC*, *orf5*, *sucA*, *sucB*, *orf12*, *fdhD*, *orf14*, *dkgA*, *aroD*, *orf21*, *orf22* und *yabF*) zeigten Übereinstimmungen mit bekannten Oxidoreduktase-Genen, die für Proteine mit recht unterschiedlichen Funktionen kodierten (s. Tab. 22 und Abb. 30). Drei davon konnten in die drei Gruppen der NAD(P)⁺-abhängigen Alkohol-Oxidoreduktasen eingeordnet werden. Das *orf14*-Genprodukt, das auf pAK110 als verantwortlich für den gebildeten Phänotyp identifiziert wurde, wurde aufgrund der beobachteten Ähnlichkeiten zu einer Eisen-haltigen Alkohol-Dehydrogenase aus *S. enterica* in die Klasse der Typ III NAD⁺-abhängigen Alkohol-Dehydrogenasen eingestuft. Orf12 war ähnlich zum Typ I und Orf22 zum Typ II der Nikotinamid-abhängigen Enzyme. Hier sind bereits einige Vertreter bekannt, die in der Lage sind mit verschiedenen Polyolen und den korrespondierenden Aldehyden und Ketonen zu reagieren. Abbildung 43 zeigt ein Alignment der abgeleiteten Aminosäuresequenzen mit bekannten und anderen hypothetischen Dehydrogenasen dieser Typen. Die übrigen für Oxidoreduktasen kodierenden Gene konnten in keine der drei beschriebenen Gruppen von Alkohol-Oxidoreduktasen eingeordnet werden. Es konnten jedoch u. a. Ähnlichkeiten zu einer bekannten Thiosulfat-Reduktase (PhsC), einer 2-Oxoglutarat-Dehydrogenase (SucA und SucB) und anderen möglichen Oxidoreduktasen festgestellt werden. Für keines dieser Enzyme ist bisher eine Alkohol-Oxidoreduktase-Aktivität beschrieben worden.

Abbildung 43: Phylogenetische Beziehungen der drei identifizierten NAD(P)⁺-abhängigen Alkohol-Oxidoreduktasen Orf12 (A), Orf14 (B) und Orf22 (C) zu bekannten und anderen hypothetischen Alkohol-Dehydrogenasen der Typen I, II und III

Die Durchmusterung der „natürlichen“ Metagenombanken FN, WN und ZB hatten zur Isolierung der Plasmide pAK201-215 geführt. Sieben dieser Plasmide vermittelten eine NAD⁺-abhängige Alkohol-Dehydrogenase-Aktivität, die mit verschiedenen Substraten im enzymatischen Test in den Rohextrakten der entsprechenden *E. coli*-Klone nachgewiesen werden konnte (s. Tab. 25). Die Sequenzierung der Plasmide zeigte ein weniger eindeutiges Bild. Die Hälfte der identifizierten 40 Protein-kodierenden Gene auf den 15 Plasmiden zeigte keinerlei Ähnlichkeiten zu bekannten in den Datenbanken gespeicherten Sequenzen (s. Tab. 30). Die anderen 50 % wiesen schwache Übereinstimmungen zu bereits sequenzierten Genen mit unterschiedlichen Funktionen auf. Keines dieser Gene oder der abgeleiteten Genprodukte war verwandt mit einer Alkohol-Dehydrogenase aus einem bekannten Mikroorganismus. Fünf der abgeleiteten Genprodukte (Orf8, Orf9, Orf27, Orf30 und MetF) zeigten Übereinstimmungen zwischen 26 und 64 % zu bekannten Oxidoreduktasen. Dazu gehörten eine Kohlenmonoxid-Dehydrogenase aus *H. pseudoflava* bzw. *M. loti*, eine Aldehyd-Dehydrogenase aus *B. melitensis*, eine FeS-bindende Reduktase aus *B. halodurans* und die 5,10-Methylentetrahydrofolat-Reduktase aus *R. solanacearum*. Für keines dieser

Enzyme ist bisher eine Umsetzung der eingesetzten Polyol-Substrate beschrieben worden. Durch Subklonierungsexperimente konnten für die Plasmide pAK204, pAK211 und pAK212 der für den Phänotyp verantwortliche Leserahmen determiniert werden. Die mit Orf6 (pAK204) und Orf25 (pAK212) bezeichneten Genprodukte konnten keinem in der Datenbank gespeicherten Homologen zugeordnet werden. Orf24 (pAK211) wies 54 % Identität mit einem hypothetischen Protein aus *S. meliloti* auf, dessen Funktion nicht bekannt ist. In allen drei Aminosäuresequenzen konnte jedoch das Nikotinamid-Bindemotive GXGXXG (SCRUTTON et al., 1990) oder GXGXXA (WIERENGA et al., 1985) identifiziert werden (s. Abb. 37). Dies und die gemessene NAD^+ -abhängige Enzymaktivität in den Rohextrakten der entsprechenden *E. coli*-Klone (s. Tab. 25) sind Indizien dafür, dass es sich hier um neue Typen von Alkohol-Dehydrogenasen handelt.

Die Ergebnisse der Durchmusterung der verschiedenen Umweltgenbanken aus komplexen Habitaten sind typisch für Verfahren, die auf der Aktivität der heterolog gebildeten Proteine basieren. Der überwiegende Teil der gefundenen Gene und der daraus abgeleiteten Proteine sind völlig neu. Einige weisen Übereinstimmungen zu Genen mit unbekannter oder noch nicht nachgewiesener Funktion auf. Zumeist zeigen sie aber nur schwache oder gar keine Verwandtschaft mit den bekannten Enzymen, die die gesuchte Funktion ausüben. Dies verdeutlicht unter anderem, dass die Vielfalt der Enzyme, die eine bestimmte Reaktion katalysieren sehr groß sein kann und bisher weitgehend unbekannt ist, auch wenn die Anzahl der bekannten und gut charakterisierten Enzyme wie im Fall der Alkohol-Dehydrogenasen schon recht groß ist. Verglichen damit scheint die Dehydratase-Reaktion ein sehr viel stärker konservierter Prozess zu sein, da hier auch im Aktivitäts-basierenden Screening keine völlig neuartigen Protein gefunden wurden. Die große Bandbreite der im Rahmen dieser Arbeit neu-isolierten Alkohol-Oxidoreduktase-Aktivität vermittelnden Gene ist neben der Analyse von 16S rRNA-Genen ein weiterer Nachweis für die enorme phylogenetische und metabolische Diversität der bis heute nicht-kultivierbaren Prokaryonten. Es konnte außerdem gezeigt werden, dass mit einem einfachen Verfahren, das auf der Aktivität der Enzyme im Wirtsorganismus *E. coli* basiert, Gene identifiziert werden können, die nur geringe oder gar keine Verwandtschaft zu bereits bekannten Organismen zeigen. Die RNA-Polymerasen in *E. coli* sind offensichtlich in der Lage eine große Menge unterschiedlicher Promotoren zu erkennen und diese Gene zu transkribieren. Die Durchmusterung von Genbanken zur Identifizierung von

neuartigen 4-Hydroxybutyrat-Dehydrogenasen hatten dieses enorme Potential ebenfalls bestätigt. Die isolierten Gene wiesen Ähnlichkeiten zu Organismen auf, die phylogenetisch weit voneinander entfernt waren. Dazu gehörten *R. eutropha*, *Cl. acetobutylicum* und *Synechocystis* PCC6803 auf (HENNE et al., 1999).

Die biochemische Charakterisierung der zu den identifizierten Alkohol-Oxidoreduktase-Genen korrespondierenden Genprodukte beschränkte sich im Rahmen dieser Arbeit auf die Messung der NAD⁺-abhängigen Alkohol-Oxidoreduktase-Aktivität. Dazu wurden verschiedene kurzkettige Polyole und die korrespondierenden Carbonylverbindungen als Substrate eingesetzt. Etwa die Hälfte der isolierten Plasmide hatten in *E. coli* eine solche Aktivität vermittelt. Dies waren pAK103-104, pAK108-110, pAK112-113, pAK116, pAK204, pAK206, pAK208 und pAK210-213. Die maximalen spezifischen Aktivitäten der Oxidationsreaktionen in den entsprechenden Rohextrakten von *E. coli* lagen zwischen 0,013 bis 0,071 U/mg Protein. Damit waren sie deutlich niedriger als die spezifischen Aktivitäten, die für einige NAD(P)⁺-abhängige Alkohol-Dehydrogenasen mit den gleichen oder ähnlichen Substraten in Rohextrakten bestimmt wurden (0,131 bis 0,45 U/mg) (JOHNSON und LIN, 1987; DANIEL et al., 1995; LUERS et al., 1997). Ein möglicher Grund dafür könnte sein, dass die hier gewählten Anzucht- und Analysebedingungen nicht ideal für die heterologe Genexpression bzw. die Aktivität der untersuchten Enzyme war. Durch die Optimierung von Parametern wie Anzuchtmedium und -temperatur oder der Zusammensetzung und des pH-Wertes des Testpuffers könnten sehr wahrscheinlich höhere, den bekannten Enzymen entsprechende Aktivitäten erhalten werden.

Eine mögliche Abhängigkeit der restlichen heterolog gebildeten Enzyme von anderen Kofaktoren wurde bisher noch nicht überprüft. In Frage kommen hier Coenzyme wie FAD, PQQ oder F₄₂₀ (REID UND FEWSON, 1994). Ebenso können noch keinerlei Aussagen über die Reaktionsmechanismen von Proteinen wie Orf6, Orf24 und Orf25 (kodiert auf pAK204, pAK211 und pAK212) gemacht werden, die zwar eine NAD⁺-vermittelte ADH-Aktivität aufweisen, aber ansonsten keinerlei Ähnlichkeiten zu den bisher bekannten Enzymen dieser Klasse zeigen.

4.6 Ausblick

Die beschriebenen Untersuchungen haben eindrucksvoll gezeigt, dass die mikrobielle Diversität in natürlichen Habitaten ein riesiges Potential als Quelle für neuartige Biokatalysatoren und andere biologisch-aktive Substanzen besitzt. Die vorgestellten Methoden verschafften einen kleinen Einblick in diese bisher weitgehend unerforschte Welt. Weiterhin eröffnen die vielfältigen Ergebnisse interessante Aspekte für weiterführende Arbeiten auf diesem Gebiet. In der Diskussion der Arbeit wurden bereits einige zusätzliche Experimente und Möglichkeiten erwähnt, andere werden nachfolgend kurz dargestellt.

Die neu-isolierten Alkohol-Dehydrogenase-Aktivität vermittelnden Plasmide trugen Gene, die zumeist völlig neuartig waren oder nur geringe Verwandtschaft zu Genen und Genprodukten bekannter Organismen zeigten. Eine wichtige und interessante Aufgabe ist nun die Charakterisierung der darunter vorhandenen neuen Typen von Alkohol-Oxidoreduktasen (z.B. Orf6, Orf24, Orf25). Hier wären zunächst Experimente zur Determinierung der Größe der nativen Enzyme und von einzelnen Untereinheiten denkbar. Von großem Interesse wären anschließend die Ermittlung der unterschiedlichen Bedürfnisse an Kofaktoren, die Substratspektren und die Aufklärung der ablaufenden Reaktionsmechanismen. Erste Experimente dazu wurden bereits begonnen. Ein weiteres Ziel ist die Identifizierung der für den Phänotyp verantwortlichen Gene für alle Plasmide. Durch anschließende Subklonierung, heterologe Expression und Reinigung der heterolog gebildeten Genprodukte könnten die kodierten Proteine eingehend biochemisch charakterisiert werden.

Im Bezug auf die isolierten und ausführlich charakterisierten Glycerin- und Diol-Dehydratasen steht als nächstes die Frage im Vordergrund, ob eine oder auch mehrere für einen Einsatz in dem von Dupont und Genencor entwickelten Produktionsstamm in Frage kommen und ob sie eine Verbesserung darstellen. Dies wäre möglich durch eine direkte Integration der Dehydratase-Gene und der zugehörigen Reaktivierungsfaktoren in den verwendeten rekombinanten *E. coli*-Stamm. Entscheidende Parameter bei der Anzucht und Analyse unter den entwickelten Fermentationsbedingungen ist die Produktausbeute und die Stabilität des resultierenden Stammes.

Ein weiterer vielversprechender Ansatz ist die Weiterentwicklung der Methoden zur Isolierung von mRNA aus Umweltproben. Die Erfassung und Nutzung der genetischen

und physiologischen Vielfalt bisher unentdeckter eukaryotischer Organismen birgt ein enormes Potential besonders im Hinblick auf die Entdeckung neuer biologisch-aktiver Substanzen wie Antibiotika. Die bisher verwendeten Methoden zu Zelllyse in den Umweltproben waren hauptsächlich auf prokaryotische Mikroorganismen ausgerichtet. Zur Verbesserung der Lyseeffizienz in Bezug auf die Eukaryoten wäre z.B. der Einsatz von Glas Beads oder dem Enzym Zymolase vorstellbar, das zum Abbau der Zellwand bei Hefezellen benutzt wird.

Die aus den vier Boden- und Sedimentproben konstruierten Genbanken sollten für weitere interessante Durchmusterungsverfahren genutzt werden. Denkbar wäre hier der Einsatz anderer alkoholischer Substrate zur Detektion von weiteren Oxidoreduktase-Aktivität vermittelnden Genen. Bezogen auf die tatsächlich in den eingesetzten Bodenproben vorhandenen genetischen Information wurde nur ein sehr geringer Anteil kloniert und durchmustert. Eine weitere Erhöhung der Anzahl der rekombinanten Plasmide in den einzelnen Genbanken würde die Identifizierung weiterer Gene und Genprodukte mit den gewünschten Phänotypen ermöglichen.

Des Weiteren könnte durch die Amplifikation und Sequenzierung von 16S und 18S rRNA-Genen ein Einblick in die Diversität des angereicherten mikrobiellen Konsortiums erhalten werden. Das heutige Wissen zur Physiologie und Rolle der verschiedenen Prokaryoten beruht zum überwiegenden Teil auf Laborstudien mit Reinkulturen. Auf die Frage welche Bakterien und Archaea in einem bestimmten Habitat oder einer mikrobiellen Gemeinschaft in welchem Maß zum Stofffluss beitragen, gibt es nur unvollständige Antworten. Eine Möglichkeit diesen Fragestellungen auf den Grund zu gehen, bietet die Kombination aus Fluoreszenz-*in-situ*-Hybridisierung (FISH) mit rRNA gerichteten Oligonukleotidsonden und die Mikroaudiographie, bei der die Aufnahme radioaktiver Substrate wie z.B. Propionat, Acetat, Carbonat oder Phosphat untersucht wird. Neben der radioaktiven Markierung ist auch der Einsatz von stabilen Isotopen wie z.B. ^{13}C möglich (AMANN, 2000).

Über die heterologe Expression in *E. coli* ist es sicherlich nicht möglich die Gesamtheit der physiologischen Diversität der Mikrobengemeinschaft auch nur einer ausgewählten Reaktion darzustellen. Einige Proteine werden nicht in diesem Organismus exprimiert, andere sind nicht aktiv oder sogar toxisch für den wirtseigenen Metabolismus. Darum ist es sinnvoll und notwendig in Zukunft vermehrt andere Wirtsorganismen wie *B. subtilis* oder *Streptomyces sp.* in den Aktivitäts-basierenden Durchmusterungsverfahren einzusetzen.

In Zukunft wird die Metagenomik es uns mehr und mehr gestatten die metabolischen, biochemischen und biotechnologisch relevanten Eigenschaften der Mikroorganismen auf der Basis ihres genetischen Potentials abzuleiten. Die Kombination von Daten aus der Genomanalyse der nicht-kultivierten Bakterien und der Beschreibung metabolischer Funktionsgene gewährt tiefe Einblicke in die Evolution des Metaboloms, die auch die Rekonstruktion ganzer Biosynthesewege zum Ziel hat („pathway reconstruction“). Die Umweltgenomik kann somit als Genomforschung der zweiten Generation betrachtet werden, die der natürlichen Komplexität der Mikrobengemeinschaft Rechnung trägt.

5 ZUSAMMENFASSUNG

1. Zur Herstellung von Metagenombanken wurden Boden- und Sedimentproben von einem Zuckerrübenfeld (Göttingen), dem Fluss Grone (Göttingen), dem Golf von Eilat (Israel) und dem Solar Lake (Ägypten) verwendet. Die Proben wurden nach einer kurzen Anreicherungsphase von Glycerin- und 1,2-Propandiol-fermentierenden Mikroorganismen zur DNA-Isolierung verwendet, die nach der Methode der direkten Lyse durchgeführt wurde. Zur Erstellung der Genbanken erfolgte ein partieller Verdau der gereinigten DNA mit dem Restriktionsenzym *Bsp*143I, die Ligation in den Plasmidvektor pBluescript SK⁺ und die Transformation in *Escherichia coli*. Die daraus resultierenden Genbanken enthielten zwischen 37300 und 71050 verschiedene rekombinante Plasmide mit durchschnittlichen Insertgrößen von 3,3 bis 5,6 kBp. Der Anteil der Insert-tragenden Plasmide lag zwischen 60 und 78 %.

2. Zur Identifizierung von neuartigen Coenzym B₁₂-abhängigen Glycerin- und Diol-Dehydratasen aus den Metagenombanken wurden sowohl Aktivitäts- als auch Sequenz-abhängige Durchmusterungsverfahren verwendet. Als Wirtsstämme wurden *E. coli* ECL707/pAK1 bzw. *E. coli* DH5 α eingesetzt. Insgesamt konnten sieben verschiedene positive *E. coli*-Klone isoliert werden. Die dazu korrespondierenden rekombinanten Plasmide wurden mit pAK2-8 bezeichnet. In den Rohextrakten von *E. coli* DH5 α /pAK2 und *E. coli* DH5 α /pAK6 bis pAK8 konnte eine signifikante Coenzym B₁₂-abhängige Glycerin-Dehydratase-Aktivität nachgewiesen werden. In den Rohextrakten der anderen Klone war keine Dehydratase-Aktivität detektierbar.

3. Die inserierten DNA-Fragmente der Plasmide pAK2-5 und pAK7 wurden vollständig sequenziert. Die auf pAK6 und pAK8 lokalisierten Dehydratase-Gene waren zu 100 % identisch zu denen aus *C. freundii* und wurden nicht weiter analysiert. Die Sequenzanalyse der übrigen fünf Plasmide ergab, dass die dort lokalisierten Dehydratase-Genregionen hohe Verwandtschaft mit den Genen für die Glycerin-Dehydratase aus *C. freundii* (pAK2-3 und pAK7) bzw. der Diol-Dehydratase aus *S. typhimurium* (pAK4-5) aufwiesen. Aufgrund der beobachteten Sequenzähnlichkeiten und der nachfolgend durchgeführten biochemischen Untersuchungen (s. 4.) wurden die auf pAK2-3 und pAK7 kodierten Dehydratasen als Glycerin-Dehydratasen eingeordnet.

Die auf pAK4-5 kodierten Dehydratasen wurden dementsprechend als Diol-Dehydratasen klassifiziert. Die Dehydratase-Gene auf pAK2 und pAK7 lagen vollständig kloniert vor, während den entsprechenden Regionen aus pAK3-5 jeweils unterschiedlich große Abschnitte der α -Untereinheit der Enzyme fehlten. Zur Vervollständigung dieser Gene durch die entsprechenden Genabschnitte aus den jeweils nächsten verwandten Dehydratase-Genen wurden sog. „Megaprime“-PCR-Reaktionen durchgeführt. Die Methode war erfolgreich für die Komplettierung der auf pAK3 und pAK5 kodierten Dehydratasen.

4. Die Dehydratase-Gene aus pAK2, pAK7 und die Hybrid-Fragmente von pAK3 und pAK5 wurden in die Expressionsvektoren pET100/D-TOPO bzw. pET101/D-TOPO subkloniert. Die Expression der Gene wurde in *E. coli* BL21 durch Induktion mit IPTG erreicht. Die auf pAK3.1 lokalisierte Glycerin-Dehydratase zeigte keine Aktivität. Die anderen drei heterolog produzierten Dehydratasen wurden mittels Affinitätschromatographie an Ni^{2+} -NTA-Agarose gereinigt. Alle drei Enzyme waren in der Lage die Substrate Glycerin, 1,2-Propandiol und 1,2-Ethandiol zu den entsprechenden Aldehyden umzusetzen. Die beiden Glycerin-Dehydratasen (pAK2.1 und pAK7.1) zeigten die höchste Aktivität mit Glycerin, während die Hybrid-Diol-Dehydratase (pAK5.1) mit 1,2-Propandiol am aktivsten war. Durch eine Gradienten-PAGE unter nativen Bedingungen und eine anschließende Aktivitätsfärbung konnten Molekularmassen von ca. 190 kDa für die beiden Glycerin-Dehydratasen und 230 kDa für die Diol-Dehydratase ermittelt werden.

5. Alle Dehydratasen wurden in Gegenwart des Substrats Glycerin im Verlauf der Katalyse inaktiviert. Am wenigsten empfindlich erwiesen sich dabei die Hybrid-Diol-Dehydratase (pAK5.1) und die zum Vergleich herangezogene Glycerin-Dehydratase aus *C. freundii*. Der als Reaktivierungsfaktor der Glycerin-Dehydratase aus *C. freundii* identifizierte Proteinkomplex DhaFG war in der Lage, die Glycerin-inaktivierten Enzyme in Gegenwart von ATP und Mg^{2+} zu reaktivieren. Die ermittelten Reaktivierungsraten lagen zwischen 62 und 85 %. Des Weiteren konnte die Hemmung der gereinigten Enzyme in Gegenwart von hohen Konzentrationen von 1,3-Propandiol festgestellt werden. Die ermittelten K_i -Werte betrugen 0,85 bis 0,93 M für die Glycerin-Dehydratasen (pAK2.1, pAK7.1, *C. freundii*) und 1,36 M für die Diol-Dehydratase (pAK5.1).

6. Zur Identifizierung von Genen, die Alkohol-Oxidoreduktase-Aktivität in *E. coli* vermitteln, wurde ein Testsystem verwendet, das auf der Detektion von Carbonylproduktion durch die *E. coli*-Klone auf Indikatoragar beruhte. Als Testsubstrate wurden verschiedene C2-C4-Polyole (Glycerin, 1,2-Propandiol, 1,2-Ethandiol, 2,3-Butandiol) eingesetzt. Der verwendete Wirtsstamm war *E. coli* ECL707. Es wurden die Anreicherungsgenbanken ZRA, SLA, GEA und GIIA sowie die aus natürlichen Standorten erstellten Genbanken FN, WN und ZB auf die Zielgene durchmustert. In den Anreicherungsgenbanken konnten bei der Untersuchung von 900000 Klonen 16 positive Klone identifiziert werden, die mit *E. coli* ECL707/pAK101-116 bezeichnet wurden. Dies entsprach einem Verhältnis von einem positiven Klon je 75000 untersuchter Klone. Acht Plasmide vermittelten eine NAD⁺-abhängige Alkohol-Dehydrogenase-Aktivität. Aus den Umweltgenbanken FN, WN und ZB wurden im Rahmen der Durchmusterung von 3000000 Klonen 15 rekombinante Plasmide isoliert, die den gewünschten Phänotyp vermittelten (Verhältnis 1:200000). Die Plasmide wurden mit pAK201-215 bezeichnet. In den Rohextrakten von sieben der rekombinanten *E. coli*-Stämme konnte eine signifikante NAD(H)-abhängige Alkohol-Dehydrogenase-Aktivität nachgewiesen werden.

7. Die inserierten DNA-Fragmente aller 31 Plasmide wurden sequenziert. Die Sequenzanalyse von pAK101-116 ergab 38 vollständig und 16 unvollständig, potentiell für Proteine kodierende Gene. 51 der abgeleiteten Genprodukte zeigten Übereinstimmungen mit bereits bekannten Proteinen, die zu einer Vielzahl von bakteriellen Gattungen gehörten. Bei neun Plasmiden (pAK101-102, pAK105, pAK107-110, pAK115-116) konnten die für die Carbonylbildung verantwortlichen Gene identifiziert werden und vier dieser Gene zeigten Ähnlichkeiten zu Oxidoreduktase-Genen bekannter Organismen, 3 davon (*orf12*, *orf14* und *orf22*) zu Alkohol-Dehydrogenasen.

Die Sequenzanalyse der Plasmide pAK201-215 ergab insgesamt 40 für Proteine kodierende Gene. 50 % der Gene zeigten keinerlei Übereinstimmungen mit den in den Datenbanken gespeicherten Sequenzen. Die anderen wiesen schwache Ähnlichkeiten zu bereits sequenzierten Genen auf. Fünf der abgeleiteten Proteine zeigten Verwandtschaft zu bekannten Oxidoreduktasen. Durch Subklonierung konnten für die Plasmide pAK204, pAK211 und pAK212 die für den Phänotyp verantwortlichen Gene

identifiziert werden. Die daraus abgeleiteten Proteine besaßen die für die Bindung des Nikotinamid-Kofaktors typische Glycin-reiche Region.

6. LITERATURVERZEICHNIS

AARDEMA, B.W., LORENZ, M.G., KRUMBEIN, W.E. (1983). Protection of sediment-adsorbed transforming DNA against enzymatic inactivation. *Appl. Environ. Microbiol.* **46**: 417-420.

ABBAD-ANDALOUSSI, S., GUEDON, E., SPIESSER, E., PEPTIDEDEMANGE, H. (1996). Glycerol dehydratase activity: the limiting step for 1,3-propnadiol production by *Clostridium butyricum* DSM 5431. *Lett. Appl. Microbiol.* **22**: 311-314.

AMANN, R.I. (2000). Methoden zur Bestimmung der *in situ*-Funktion von Mikroorganismen. *Biospektrum* 4/2002: 274-277.

AMANN, R.I., LUDWIG, W., SCHLEIFER, K.-H. (1995). Phylogenetic identification and in situ detection of individual microbial cells without cultivation. *Microbiol. Rev.* **59**: 143-169.

ANDERSON, L.O., BORG, H., MIKAELSON, M. (1972). Molecular weight estimation of proteins by electrophoresis in polyacrylamide gel of graded porosity. *FEBS Lett.* **20**: 199-202.

AUSUBEL, F.M., BRENT, R., KINGSTON, R.E., MOORE, D.D., SEIDMANN, J.G., SMITH, J.A., STRUHL, K. (1987). *Current protocols in molecular biology*. Green Publishing Associates and Wiley-Interscience. J. Wiley & Sons, New York.

AVERHOFF B. (1988). Optimierung der Succinat- und Trimethylenglycol-Produktion durch Variation von Wachstumsparametern und Zugabe externer H-Donatoren. Dissertation, Göttingen.

BACHOVIN, W.W., MOORE, K.W., RICHARDS, J.H. (1978). Mechanism of action of adenosylcobalamin: hydrogen transfer in the inactivation of diol dehydratase by glycerol. *Biochemistry* **17**: 2218-2224.

BACHOVIN, W.W., EAGAR, R.G. JR., MOORE, K.W., RICHARDS, J.H. (1977). Mechanism of action of adenosylcobalamin: glycerol and other substrate analogues as substrates and inactivators for propandiol dehydratase-kinetics, stereospecificity, and mechanism. *Biochem.* **16**: 1082-1092.

BARIK, GALINSKY (1997). *Biotech.* **10**: 489.

BARNES, S.M., DELWICHE, C.F., PALMER, J.D., PACE, N.R. (1996). Perspectives on archaeal diversity, thermophily and monophily from environmental rRNA sequences. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **93**: 9188-9193.

BATEMAN, A., BIRNEY, E., CERRUTI, L., DURBIN, R., ETWILLER, L., EDDY, S.R., GRIFFITH-JONES, S., HOWE, K.L., MARSHALL, M., SONNHAMMER, E.L.L. (2002). The Pfam protein families database. *Nucleic. Acids Res.* **30**: 276-280.

- BEJA, O., KOONIN, E.V., ARAVIND, L., TAYLOR, L.T., SEITZ, H., STEIN, J.L., BENSEN, D.C., FELDMAN, R.A, SWANSON, R. C., DELONG, E.F.** (2002). Comparatative genomic analysis of archeal genotypic variants in a single population and in two different oceanic provinces. *Appl. Environ. Microbiol.* **68**: 335-345.
- BEJA, O., SUZUKI, M.T., KOONIN, E.V., ARAVIND, L., HADD, A., NGUYEN, L.P., VILLACORTA, R., AMJADI, M., GARRIGUES, C., JOVANOVICH, S.B., FELDMAN, R.A, DELONG, E.F.** (2000). Construction and analysis of bacterial artificial chromosome libraries from a marine microbial assemblage. *Environ. Microbiol.* **2**: 516-529.
- BERTHELET, M., WHYTE, L.G., GREER, C.W.** (1996). Rapid, direct extraction of DNA from soils for PCR analysis using polyvinylpolypyrrolidone spin columns. *FEMS Lett.* **138**: 17-22.
- BIRNBOIM H. C., DOLY J.** (1979). A rapid alkaline extraction procedure for screening recombinant plasmid DNA. *Nucl. Acids Res.* **7**: 1513-1518.
- BOBIK, T.A., XU Y., JETER, R.M., OTTO, K.E., ROTH, J.R.** (1997). Propanediol utilization genes (*pdu*) of *Salmonella typhimurium*: Three genes for the propanediol dehydratase . *J. Bacteriol.* **179**: 6633-6639
- BOENIGK, R.** (1991). Optimierung der 1,3-Propandiol-Bildung mit *Citrobacter freundii* und Isolierung und Charakterisierung der 1,3-Propandiol-Dehydrogenase. Dissertation, Göttingen.
- BOENIGK, R., BOWIEN, S., GOTTSCHALK, G:** (1993). Fermentation of glycerol to 1,3-propanediol in continuous cultures of *Citrobacter freundii*. *Appl. Microbiol. Biotechnol.* **38**: 453-457.
- BORNEMAN, J., SKROCH, P.W., O'SULLIVAN, K.M., PALUS, J.A., RUMJANEK, N.G., JANSEN, J.L., NIENHIUS, J., TRIPLETT, E.W.** (1996). Molecular microbial diversity of an agricultural soil in Wisconsin. *Appl. Environ. Microbiol.* **62**: 1935-1943.
- BORNEMAN, J., TRIPLETT, E.W.** (1997). Molecular microbial diversity in soils from Eastern Amazonia: Evidence for unusual microorganisms and microbial population shifts associated with deforestation. *Appl. Environ. Microbiol.* **63**: 2647-2653
- BRADFORD, M.M.** (1976). A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein dye binding. *Anal. Biochem.* **72**: 248-254.
- BRADY, R.O., CASTANERA, E.G., BARKER, H. A.** (1962). The enzymatic synthesis of cobamide coenzymes. *J. Biol. Chem.* **237**: 2325 –2332.
- BRADY, S.F., CHAO, C.J., HANDELSMAN, J., CLARDY, J.** (2001). Cloning and heterologous expression of a natural product biosynthetic gene cluster from eDNA. *Org. Let.* **3**: 1981-1984.

BRUCE, K.D. (1997). Analysis of *mer* gene subclasses within bacterial communities in soils and sediments resolved by fluorescent-PCR-restriction fragment length polymorphism profiling. *Appl. Environ. Microbiol.* **63**: 4914-4919.

BRUCE, K.D., HORNS, W.D., HOBMAN, J.L., OSBORN, A.M., STRIKE, P., RITCHIE, D.A. (1992). Amplification of DNA from native populations of soil bacteria by using the polymerase chain reaction. *Appl. Environ. Microbiol.* **63**: 2647-2653.

BULL, A.T., GOODFELLOW, M., SLATER, H. (1992). Biodiversity as a source of innovation in biotechnology. *Annu. Rev. Microbiol.* **46**: 219-252.

BULL, A.T., WARD, A.C., GOODFELLOW, M. (2000). Search and discovery strategies for biotechnology: the paradigm shift. *Microbiol. Mol. Biol. Rev.* **64**: 573-606.

CHASSY, B.M., MERCENIER, A., FLICKINGER, J. (1988). Transformation of bacteria by electroporation. *TIBTECH* **6**: 303-309.

CHENAULT, H.K., WHITESIDE, G.M. (1987). Regeneration of nicotinamide cofactors for the use in organic synthesis. *Appl. Biochem. Biotechnol.* **14**: 147-197.

CHOTANI, G., DODGE, T., HSU, A., KUMAR, M., LADUCA, R., TRIMBUR, D., WEYLER, W. SAFORD, K. (2000). The commercial production of chemicals using pathway engineering. *Biochim. Biophys. Acta* **1543**: 434-455.

CIRINO, P.C., ARNOLD, F.H. (2002). Exploring the diversity of heme enzymes through directed evolution. *In*: S. Brakmann and K. Johnson (Ed.), *Direct molecular evolution of proteins..* Wiley-VCH Verlag GmbH, Weinheim, Germany.

CONWAY, T., INGRAM, L.O. (1989). Similarity of *Escherichia coli* propanediol oxidoreductase (fucO product) and an unusual alcohol dehydrogenase from *Zymomonas mobilis* and *Saccharomyces cerevisiae*. *J. Bacteriol.* **171**: 3754-3759.

CONWAY, T., SEWELL, G.W., OSMAN, Y.A., INGRAM, L.O. (1987). Cloning and sequencing of the alcohol dehydrogenase II gene from *Zymomonas mobilis*. *J. Bacteriol.* **169**: 2591-2597.

COSTILOW R. N. (1981). Biophysical factors in growth. *In*: Gerhardt P., Murray G. E., Costilow N., Nester E. W., Wood W. A., Krieg R., Philips G. B. (Hrsg.) *Manual of methods for general bacteriology*, 66-78. American Society for Microbiology, Washington D.C., USA.

COTTRELL, M.T., MOORE, J.A., KIRCHMAN, D.L. (1999). Chitinases from uncultured marine microorganisms. *Appl. Environ. Microbiol.* **65**: 2553-2557.

CRAGG, G.M., NEWMAN, D.J., SNADER, K.M. (1997). Natural products in drug discovery and development. *J. Nat. Prod.* **60**: 52-60.

DANIEL, R. (1994). Glycerinvergärung durch *Citrobacter freundii*: Sequenzierung und Charakterisierung des dha regulons. Dissertation, Göttingen.

DANIEL, R. (2002). Construction of environmental libraries for functional screening of enzyme activity, p. 63-78. In S. Brakmann and K. Johnson (Ed.), Direct molecular evolution of proteins.. Wiley-VCH Verlag GmbH, Weinheim, Germany.

DANIEL, R., BOBIK, T. A., GOTTSCHALK, G. (1998). Biochemistry of coenzyme B₁₂-dependent glycerol and diol dehydratases and organization of the encoding genes. FEMS Microbiol. Rev. **22**: 553-566.

DANIEL, R., BOENIGK, R., GOTTSCHALK, G. (1995 a). Purification of 1,3-propanediol dehydrogenase from *Citrobacter freundii* and cloning, sequencing, and overexpressing of the corresponding genes in *Escherichia coli*. J. Bacteriol. **177**: 2151-2156.

DANIEL, R., GOTTSCHALK, G. (1992). Growth temperature-dependent activity of glycerol-dehydratase in *Escherichia coli* expressing the *Citrobacter freundii* dha regulon. FEMS Microbiol. Lett. **100**: 281-286.

DANIEL, R., GOTTSCHALK, G. (1992). Growth temperature-dependent activity of glycerol dehydratase in *Escherichia coli* expressing the *Citrobacter freundii* dha regulon. FEMS Microbiol. Lett. **100**: 281-286.

DANIEL, R., STUERTZ, K., GOTTSCHALK, G. (1995 b). Biochemical and molecular characterization of the oxidative branch of glycerol utilization by *Citrobacter freundii*. J.Bacteriol. **177**: 4392-4401.

DELONG, E.F. (1992). Archaea in coastal marine environments. Proc. Natl. Acad. Sci. USA **89**: 5685-5689.

DEVEREUX, J., HAEBERLI, P., SMITHIES, O. (1984). A comprehensive set of sequence analysis programs for the VAX. Nuc. Acids Res. **12**: 387-395.

DOWER, W.J., MILLER, J.F., RAGSDALE, C.W. (1988). High efficiency transformation of *E. coli* by high voltage electroporation. Nucl. Acids Res. **16**: 6127-6145.

DUARTE, G.F., ROSADO, A.S., SELDIN, L., KEIJZER-WOLTERS, A.C., VAN ELSAS, J.D. (1998). Extraction of ribosomal RNA and genomic DNA from soil for studying the diversity of the indigenous bacterial community. J. Microbiol. Methods. **32**: 21-29.

DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, Patent-Nr.: PCT/US/06161, 1996.

DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, Patent-Nr.: PCT/US/06163, 1996.

DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, Patent-Nr.: PCT/US/06705, 1996.

FANG, J.-M., LIN, C.-H., BRADSHAW, C.W., WONG, C.H. (1995). Enzymes in organic synthesis. Oxidoreductions. J. Chem. Soc. Perkin Trans. **1**: 967-978.

FELSKE, A., ENGELN, B., NUBEL, U., BACKHAUS, H. (1996). Direct ribosome isolation from soil to extract bacterial rRNA for community analysis. Appl. Environ. Microbiol. **62**: 4162-4167.

FERRIS, M.J., MUYZER, G., WARD, D.M. (1996). Denaturing gradient gel electrophoresis profiles of 16S rRNA-defined populations inhabiting a hot spring microbial mat community. Appl. Environ. Microbiol. **62**: 340-346.

FORAGE, R.G., FOSTER, M.A. (1979). Resolution of the coenzyme B₁₂-dependent dehydratases of *Klebsiella* sp. and *Citrobacter freundii*. Biochim. Biophys. Acta **569**: 249-258.

FREY P.A., BALLINGER, M.D., REED, G.H. (1998). S-Adenosylmethionine: a 'poor man's coenzyme B₁₂' in the reaction of lysine 2,3-aminomutase. Biochem. Soc. Transact. **26**: 304-310.

FREY, P.A. (1993). Lysine 2,3-aminomutase: is adenosylmethionine a poor man's adenosylcobalamin?. FASEB J. **7**: 662-670.

GILLESPIE, D.E., BRADY, S.F., BETTERMANN, A.D., CIANCIOOTTO, N.P., LILES, M.R., RONDON, M.R., CLARDY, J., GOODMAN, R.M., HANDELSMAN, J. (2002). Isolation of antibiotics turbomycin A and B from metagenomic library of soil microbial DNA. Appl. Environ. Microbiol. **68**: 4301-4306.

GIOVANNONI, S.J., BRITSCHGI, T.B., MOYER, C.L., FIELD, K.G. (1990). Genetic diversity in Saragosso Sea bacterioplankton. Nature **345**: 60-63.

GORING, C.A.I., BARTHOLOMEW, W.V. (1952). Adsorption of mononukleotides, nucleic acids, and nucleoproteins by clays. Soil Sci. **74**: 149-164.

GOTTSCHALK, G., KNACKMUSS, H.-J. (1993). Bakterien und der Abbau von Chemikalien: Natürliches und durch Kombination und Konstruktion Erreichbares. Angew. Chem. **105**: 1437-1448.

GREAVES, M.P., WILSON, M.J. (1969). The adsorption of nucleic acids by montmorillonite. Soil Biol. Biochem. **1**: 317-323.

GREENE, R.J., GUARANTE, L. (1987). Subcloning. Methods Enzymol. **152**: 512-522.

GRIFFITH, R.I., WHITELEY, A.S., O'DONNELL, A.G., BAILEY, M.J. (2000). Rapid method for coextraction of DNA and RNA from natural environments for analysis of ribosomal DNA and rRNA-based microbial community composition. Appl. Environ. Microbiol. **66**: 5488-5491.

HANAHAN, D. (183). Studies on transformation of *Escherichia coli* with plasmid. J. Mol. Biol. **166**: 557-580.

HANDELSMANN, J., RONDON, M.R., BRADY, S.F., CLARDY, J., GOODMAN, R.M. (1998). Molecular biological access to the chemistry of unknown soil microbes: a new frontier for natural products. Chem. & Biol. **5**: 245-249.

HARTMANIS, M.G.N., STADTMAN, T.C. (1985). Diol metabolism and diol dehydratase in *Clostridium glycolicum*. Arch. Biochem. Biophys. **245**: 144-152.

HARTMANIS, M.G.N., STADTMAN, T.C. (1986). Solubilization of a membrane-bound diol dehydratase with retention of EPR $g = 2.02$ signal by using 2-(N-cyclohexylamino) ethanesulfonic acid buffer. Pro. Natl. Acad. Sci. **84**: 76-79.

HEALY, F.G., RAY, R.M., ALDICH, A.C., WILKIE, L.O., INGRAM, L.O., SHANMUGAM, K.T. (1995). Direct isolation of functional genes encoding cellulases from the microbial consortia in thermophilic, anaerobic digester maintained on lignocellulose. Appl. Microbiol. Biotechnol. **43**: 667-674.

HENNE, A., DANIEL, R., SCHMITZ, R.A., GOTTSCHALK, G. (1999). Construction of environmental DNA libraries in *Escherichia coli* and screening for the presence of genes conferring utilization of 4-hydroxybutyrate. Appl. Environm. Microbiol. **65**: 3901-3907.

HENNE, A., SCHMITZ, R.A., BÖMEKE, M., GOTTSCHALK, G., DANIEL, R. (2000). Screening of environmental DNA libraries for the presence of genes conferring lipolytic activity on *Escherichia coli*. Appl. Environm. Microbiol. **66**: 3113-3116.

HENTSCHEL, U., ZIEBUHR, W., HACKER, J. (2002). Die Suche nach neuen Wirkstoffen gegen Infektionskrankheiten. Sonderausgabe Biospektrum 2002: 489-491.

HILVERT, D., TAYLOR, S.V., KAST, P. (2002). Using evolutionary strategies to investigate the structure and function of chorismate mutases. In: S. Brakmann and K. Johnson (Ed.), Direct molecular evolution of proteins.. Wiley-VCH Verlag GmbH, Weinheim, Germany.

HOCHULI, E., BANNWARTH, W., DOBELI, H., GENTZ, R., STÜBER, D. (1988). Genetic approach to facilitate purification of recombinant proteins with a novel metal chelate adsorbent. Bio Technology **6**: 1321-1325.

HOLBEN, W.E. (1996). Isolation and purification of bacterial community DNA from environmental samples, p. 431-436. In: Manual of environmental microbiology, C.J. Hurst, G.R. Knudsen, M.J. McInerney, L.D. Stetzenbach, M.V. Walter (Eds.), ASM Press, Washington, USA.

HOLDEMAN, L.V., CATO, E.P., MOORE, W.E.C. (1977). Anaerobe laboratory manual. 4th ed. Anaerobe Laboratory, Virginian Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, Virginia.

HOLMES, D.S., QUIGLEY, M. (1981). A rapid boiling method for the preparation of bacterial plasmids. *Anal. Biochem.* **114**: 193-197.

HUGENHOLTZ, P., GOEBEL, B.M., PACE, N.R. (1998). Impact of culture-independent studies on the emerging phylogenetic view of bacterial diversity. *J. Bacteriol.* **180**: 4765-4774.

HUGES, J.B., HELLMANN, J.J., RICKETTS, T.H., BOHANNAN, B.J.M. (2001). Counting the uncountable: Statistical approaches to estimating microbial diversity. *Appl. Environ. Microbiol.* **67**: 4399-4406.

HUMMEL, W. (1997). New alcohol dehydrogenases for the synthesis of chiral compounds. *Adv. Biochem. Eng. Biotechnol.* **58**: 145-184.

HUMMEL, W. (1999). Large-scale applications of NAD(P)-dependent oxidoreduktases: recent developments. *TIBTECH* **17**: 487-492.

HUNGATE, R.E. (1969). A roll tube for cultivation of strict anaerobes. In: NORRIS, J. R., RIBBONS, D. W. (Hrsg.), *Methods in Microbiology* Vol. 3:177-132. Academic Press, London.

HURT, R.A., QIU, X., WU, L., ROH, Y., PALUMBO, A.V., TIEDJE, J.M., ZHOU, J. (2001). Simultaneous recovery of RNA and DNA from solis and sediments. *Appl. Environ. Microbiol.* **67**: 4495-4503.

INOUE, H., NOJIMA, H., OKAYAMA, H. (1990). High efficiency transformation of *Escherichia coli* with plasmids. *Gene* **96**: 23-28.

JACKSON C.R., HARPER J.P., WILLOUGHBY D., RODEN E.E., CHURCHILL P.F. (1997). A simple, efficient method for the separation of humic substances and DNA from environmental samples. *Appl. Environm. Microbiol.* **63**: 4993-4995.

JACOBSEN, C.S., RASMUSSEN, O.F. (1992). Development and application of a new method to extract bacterial DNA from soil based on separation of bacteria from soil with cation-exchange resin. *Appl. Environ. Microbiol.* **58**: 2458-2462.

JOHNSON, C.L., PECHONIK, E., PARK, S.D., HAVEMANN, G.D., LEAL, N.A., BOBIK, T. (2001). Functional genomic, biochemical, and genetic characterization of the *Salmonella pduO* gene, an ATP:Cob(I)alamin adenosyltransferase gene. *J. Bacteriol.* **183**: 1577-1584.

JOHNSON, E.A., BURKE, S.K., FORAGE, R.G., LIN, E.C.C. (1984). Purification and properties of dihydroxyacetone kinase from *Klebsiella pneumoniae*. *J. Bacteriol.* **160**: 55-60.

JOHNSON, E.A., LIN, E.C.C. (1987). *Klebsiella pneumoniae* 1,3-propanediol: NAD⁺-oxidoreductase. *J. Bacteriol.* **169**: 2050-2054.

KAJIURA, H., MORI, K., TOBIMATSU, T., TORAYA, T. (2001).

Characterization and mechanism of action of a reactivating factor for adenosylcoalamine-dependent glycerol dehydratase. *J. Biol. Chem.* **276**: 36514-36519.

KNIETSCH (1999). Identifizierung neuartiger Glycerin-Dehydratasen. Diplomarbeit, Göttingen.

KOZAK, M. (1983). Comparison of initiation of protein synthesis in procaryotes, eucaryotes and organelles. *Microbiol. Rev.* **47**: 1-45.

LORENZ, M.G., WACKERNAGEL, W. (1987). Adsorption of sand and variable degradation rates of adsorbed DNA. *Appl. Environ. Microbiol.* **53**: 2948-2952.

LUERS, F., SEYFRIED, M., DANIEL, R., GOTTSCHALK, G. (1997). Glycerol conversion to 1,3-propanediol by *Clostridium pasteurianum*: cloning and expression of the gene encoding 1,3-propanediol dehydrogenase. *FEMS Microbiol. Lett.* **154**: 337-345.

MACIS, L., DANIEL, R., GOTTSCHALK, G. (1998). Properties and sequence of the coenzyme B₁₂-dependent glycerol dehydratase of *Clostridium pasteurianum*. *FEMS Microbiol. Lett.* **164**: 21-28.

MACKINTOSH, R.W., FEWSON, C.A. (1988a). Benzyl alcohol dehydrogenase and benzaldehyde dehydrogenase II from *Acinetobacter calcoaceticus*. Purification and preliminary characterization. *Biochem. J.* **250**: 743-751.

MACKINTOSH, R.W., FEWSON, C.A. (1988b). Benzyl alcohol dehydrogenase and benzaldehyde dehydrogenase II from *Acinetobacter calcoaceticus*. Substrate specificities and inhibition studies. *Biochem. J.* **255**: 653-661.

MAJERNIK, A., GOTTSCHALK, G., DANIEL, R. (2001). Screening of environmental DNA libraries for the presence of genes conferring Na⁺(Li⁺)/H⁺ antiporter activity on *Escherichia coli*: characterization of the recovered genes and the corresponding gene products. *J. Bacteriol.* **183**: 6645-6653.

MARCK, C. (1988). „DNA strider“: a „C“ programm for fast analysis of DNA and protein sequences on Apple Macintosh family computers. *Nucl. Acids Res.* **16**: 1829-1836.

MARGOLIS, J., KENRICK, K.G. (1967). Polyacrylamide gel electrophoresis across a molecular sieve gradient. *Nature* **214**: 1334-1336.

MCGREGOR, W.G., PHILIPS, J., SUELTER, C. (1974). Purification and kinetic characterization of a monovalent cation-activated glycerol dehydrogenase from *Aerobacter aerogenes*. *J. Biol. Chem.* **249**: 3132-3139.

MEYNIAL-SALLES, I. (2002). Biological production of 1,3-propanediol using a new B₁₂independent glycerol dehydratase. *In*: The world of microbes. Joint meeting of the three divisions of International Union of Microbiological Societies. Abstracts.

MILLER, J. H. (1972).. Experiments in molecular genetics. Cold Spring Habor Laboratory, Cold Spring Habor, New York.

MISKIN, I.P., FARRIMOND, P., HEAD, I.M. (1999). Identification of novel bacterial lineages as active members of microbial populations in a freshwater sediment using a rapid RNA extraction procedure and RT-PCR. *Microbiology* **145**: 1977-1987.

MOORE, W.E.C., HOLDEMAN, L.V. (1970) in: CATO, E.P., CUMMINS, C.S., HOLDEMAN, L.V., JOHNSON, J.L., MOORE, W.E.C., SMIBERT, R.M., SMITH, L.D.S. (eds.). Outline of clinical methods in anaerobic bacteriology, 2nd revision. Virginia Polytechnic Institute Anaerobe Laboratory, Blacksburg, Virginia.

MORAN, M.A., TORSVIK, V.L., TORSVIK, T., HODSON, R.E. (1983). Direct extraction and purification of rRNA for ecological studies. *Appl. Environm. Microbiol.* **59**: 915-918.

MORI, K., TOBIMATSU, T., HARA, T., TORAYA, T. (1997). Characterization, sequencing, and expression of the genes encoding a reactivating factor for glycerol-inactivated adenosylcobalamin-dependent diol-dehydratase. *J. Biol. Chem.* **272**: 32034-32041.

MÜLLER, H.-J., BRUCHHAUS, I. (1997). Problematik der Isolierung genomischer DNA. *Biospektrum* 1/97: 68/73.

MUNSON, M.A., NEDWELL, D.B., EMBLY, T.M. (1997). Phylogenetic diversity of *Archaea* in sediment samples from coastal salt marsh. *Appl. Environ. Microbiol.* **63**: 4729-4733.

MUYZER, G., DE WAAL, E.C., UITTERLINDEN, A.G. (1992). Profiling of complex microbial populations by denaturing gradient gel electrophoresis analysis of polymerase chain reaction-amplified genes coding for 16S rRNA. *Appl. Environ. Microbiol.* **59**: 695-700.

NISHIZAWA, H., KITA, N. OKIMURA, S., TAKAO, E., ABE, Y. (1988). Determination of molecular weight of native proteins by polyacrylamide gradient gel electrophoresis. *Electrophoresis* **9**: 803-806.

NOZAKI, K., INABA, K., KURODA, T., TSUDA, M., TSUCHIYA, T. (1996). Cloning and sequencing of the gene for Na⁺/H⁺ antiporter of *Vibrio parahaemolyticus*. *Biochem. Biophys. Res. Comm.* **222**: 774-779.

OGRAM, A., SAYLER, G.S., BARKAY, T. (1987). The extraction and purification of microbial DNA from sediments. *J. Microbiol. Meth.* **7**: 57-66.

OGRAM, A., SUN, W., BROCKMANN, F.J., FREDRICKSON, J.K. (1995). Isolation and characterization of RNA from low-biomass deep subsurface sediments. *Appl. Environ. Microbiol.* **61**: 763-768.

OSBURNE, M.S., GROSSMANN, T.H., AUGUST, P.R., MACNEIL, I. (2000). Tapping into microbial diversity for natural products drug discovery. *ASM News* **66**: 411-417.

PACE, N.R. (1997). A molecular view of microbial diversity and the biosphere. *Science* **276**: 734-740

PACE, N.R. (1999). Microbial ecology und diversity. *ASM News* **65**: 328-333.

PACE, N.R., STAHL, D.A., LANE, D.J., OLSEN, G.J. (1986). The analysis of natural microbial populations by ribosomal RNA sequences. *Adv. Microbiol. Ecol.* **9**: 1-55.

PAWELKIEWICZ, J., ZAGALAK, B. (1965). Enzymic conversion of glycerol into β -hydroxypropionaldehyde in a cell-free extract from *Aerobacter aerogenes*. *Acta Biochim. Polon.* **12**: 207-218.

PEARSON, W.R., LIPMANN, D.J. (1988). Improved tools for biological sequence comparison. *Proc. Natl. Acad. Sci.* **85**: 2444-2448.

PFENNIG, N., LIPPERT, K. D. (1966). Über das Vitamin B₁₂-Bedürfnis phototropher Schwefelbakterien. *Arch. Microbiol.* **55**: 245-256

POZNANSKAYA, A.A., TANIZAWA, K., SODA, K., TORAYA, T., FUKUI, S. (1979). Coenzyme B₁₂-dependent diol dehydratase: purification, subunit heterogeneity, and reversible association. *Arch. Biochem. Biophys.* **194**: 379-386.

POZNANSKAYA, A.A., YAKUSHEVA, M.I., YAKOVLEV, V.A. (1977). Study of the mechanism of action of adenosylcobalamin-dependent glycerol dehydratase from *Aerobacter aerogenes*. II. Inactivation kinetics of glycerol dehydratase complexes with adenosylcobalamin and its analogs. *Biochim. Biophys. Acta.* **484**: 236-243.

QUATTARA, A.S., CUZIN, N., TRAORE, A.S., GARCIA, J.-L. (1992). Anaerobic degradation of 1,2-propanediol by a new *Desulfovibrio* strain and *D. alcoholvorans*. *Arch. Microbiol.* **158**: 218-225.

RAMOA, M.J., ARCHER, M., MOURA, I., MOURA, J.J., LEGALL, J., ENGH, R., SCHNEIDER, M., HUBER, R. (1995). Crystal structure of a xanthine oxidase-related aldehyde-oxidoreductase from *Desulfovibrio gigas*. *Science* **270**: 1170-1176.

REANNEY, D.C., GOWLAND, P.C., SLATER, J.H. (1983). Genetic interactions among microbial communities, p. 379-421. In J.H. Slater, R. Whittenbury, and J.W.T. Wimpenny (ed.), *Microbes in their natural environment*. Cambridge University Press, Cambridge.

REID, M.F., FEWSON, C.A. (1994). Molecular characterization of microbial alcohol dehydrogenases. *Crit. Rev. Mikrobiol.* **20**: 13-56.

ROMANOWSKI, G., LORENZ, M.G., WACKERNAGEL, W. (1991). Adsorption of plasmid DNA to mineral surfaces and protection against DNaseI. *Appl. Environ. Microbiol.* **57**: 1057-1061.

RONDON, M.R., AUGUST, P.R., BETTERMANN, A.D., BRADY, S.F., GROSSMAN, T.H., LILES, M.R., LOIACONO, K.A., LYNCH, B.A., MACNEIL, I.A., MINOR, C., TIONG, C.L., GILMAN, M., OSBURNE, M.S., CLARDY, J. HANDELSMAN, J. GOODMAN, R.M. (2000). Cloning the soil metagenome: a strategy for accessing the genetic and functional diversity of uncultured microorganisms. *Appl. Environ. Microbiol.* **66**: 2541-2547.

RONDON, M.R., GOODMAN, R.M., HANDELSMAN, J. (1999). The earth's bounty: assessing and accessing soil microbial diversity. *TIBTECH* **17**: 403-409.

ROSADO, A.S., DUARTE, G.F., SELDIN, L., VAN ELSAS, J.D. (1998). Genetic diversity of *nifH* Gene sequences in *Paenibacillus azotofixans* strains and soil samples analyzed by denaturing gradient gel electrophoresis of PCR-amplified gene fragments. *Appl. Environ. Microbiol.* **64**: 2770-2779.

RÖSKENS, H. (1997). Subklonierung der einzelnen Strukturgene der Coenzym B₁₂-abhängigen Glycerin-Dehydratase aus *Citrobacter freundii* und Identifizierung der Coenzym B₁₂-bindenden Untereinheit. Diplomarbeit, Göttingen.

RUCH, F.E., LENGELER, J., LIN, E.C.C. (1974). Regulation of glycerol catabolism in *Klebsiella aerogenes*. *J. Bacteriol.* **119**: 50-56.

SAMBROOK, J., FRITSCH, E., MANIATIS, T. (1989). Molecular cloning: a laboratory manual (2.Aufl.). Cold Spring Harbor Laboratory, Cold Spring Harbor, New York, USA

SANGER, F., NICKELLEN, S., COULSON, A.R. (1977). DNA sequencing with chain-terminating inhibitors. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **74**: 5463-5467.

SANTOSA, D.A. (2001). Rapid extraction and purification of environmental DNA for molecular cloning applications and molecular diversity studies. *Mol. Biotech.* **17**: 59-64.

SCHAGGER, H., VON JAGOW, G. (1987). Tricine-sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis for the separation of proteins in the range of 1 to 100 kDa. *Anal. Biochem.* **166**: 368-379.

SCHLEPER, C., DELONG, E.F., PRESTON, C.M., FELDMAN, R.A., WU, K.Y., SWANSON, R.V. (1998). Genomic analysis reveals chromosomal variation in natural populations in the uncultured psychrophilic archaeon *Cenarchaeum symbiosum*. *J. Bacteriol.* **180**: 5003-5009.

SCHLEPER, C., ECK, J. (2000). Umweltgenomik: Charakterisierung und Nutzung nicht-kultivierter Mikroorganismen. *Biospektrum* 6/2000: 449-451.

SCHLEPER, C., SWANSON, R.V., MATHUR, E.J., DELONG, E.F. (1997). Characterization of a DNA from the uncultivated psychrophilic archeon *Cenarchaeum symbiosum*. J. Bacteriol. 179: 7803-7811.

SCHNEIDER, Z., LARSEN, E.G., JACOBSON, G., JOHNSON, B.C., PAWELKIEWICZ, J. (1970). Purification and properties of glycerol dehydrase. J. Biol. Chem. 245: 3388-3396.

SCHNEIDER, Z., PAWELKIEWICZ, J. (1966). The properties of glycerol dehydratase isolated from *Aerobacter aerogenes*, and the properties of the apoenzyme subunits. Acta Biochim. Polen. 8: 311-328.

SCHULZ, R., MEURER, G., SCHLEPER, C. (2002). Das Metagenom als Quelle neuartiger rekombinanter Wirkstoffe und Enzyme. Sonderausgabe Biospektrum 2002: 498-501.

SCHULZE, R., MEURER, G., SCHLEPER, C. (2002). Das Metagenom als Quelle neuartiger rekombinanter Wirkstoffe und Enzyme. Biospektrum Sonderausgabe 2002: 498-501.

SCHÜTZ, H., RADLER, F. (1984). Anaerobic reduction of glycerol to 1,3-propanediol by *Lactobacillus brevis* and *Lactobacillus buchneri*. System. App. Microbiol. 5: 169-178.

SCRUTTON, N.S., BERRY, A., PERHAM, A.R. (1990). Redesign of the coenzyme specificity of a dehydrogenase by protein engineering. Nature 343: 38-43.

SEIFERT, C. (2001). Untersuchungen zur Inaktivierung und Reaktivierung der Coenzym B₁₂-abhängigen Glycerin-Dehydratasen aus *Citrobacter freundii* und *Clostridium pasteurianum*. Dissertation, Göttingen.

SEIFERT, C., BOWIEN, S., GOTTSCHALK, G., DANIEL, R. (2001). Identification and Expression of the Genes and Purification and Characterization of the Gene Products Involved in Reactivation of Coenzyme B₁₂-dependent Glycerol Dehydratase of *Citrobacter freundii*. Eur. J. Biochem. 268: 2369-2378.

SEOW, K.-T., MEURER, G., GERLITZ, M., WENDT-PIENKOWSKY, E., HUTCHINSON, C.R., DAVIES, J. (1997). A study of iterative type II polyketide synthases, using bacterial genes cloned from soil DNA: a means to access and use genes from uncultured microorganisms. J. Bacteriol. 179: 7360-7368.

SEYFRIED, M. (1996). Molekularbiologische und biochemische Charakterisierung der Coenzym B₁₂-abhängigen Glycerin-Dehydratase aus *Citrobacter freundii*. Dissertation, Göttingen.

SEYFRIED, M., DANIEL, R., GOTTSCHALK, G. (1996). Cloning, sequencing, and overexpression of the genes encoding Coenzyme B₁₂-dependent glycerol dehydratase of *Citrobacter freundii*. J. Bacteriol. 178: 5793-5796.

SHIBATA, N., MASUDA, J., TOBIMASTU, T., TORAYA, T., SAUTO, K., MORIMOTO, Y., YASUOKA, N. (1999). A new mode of B₁₂ binding and the direct participation of a potassium ion in enzyme catalysis: X-ray structure of diol dehydratase. *Structure* **7**: 997-1008.

SMILEY, K.L., SOBOLOV, M. (1962). A cobamide-requiring glycerol dehydratase from an acrolein- forming *Lactobacillus*. *Arch. Biochem. Biophys.* **97**: 538-543.

SOUTHERN, E.M. (1975). Detection of specific sequences among DNA fragments separated by gel electrophoresis. *J. Mol. Biol.* **98**: 503-517.

SPRENGER, G.A., HAMMER, B.A., JOHNSON, E. A., LIN, E.C.C. (1989). Anaerobic growth of *Escherichia coli* on glycerol by importing genes of the *dha* regulon from *Klebsiella pneumoniae*. *J. Gen. Microbiol.* **135**: 1255-1262.

STEFFAN, R.J., GOKSØYR, J., BEJ, A.K., ATLAS, R. (1988). Recovery of DNA from soil and sediments. *Appl. Environ. Microbiol.* **54**: 2908-2915.

STEIN, J.L., MARSH, T.L., WU, K.Y., SHIZUYA, H., DeLONG, E.F. (1996). Characterization of uncultivated prokaryotes: Isolation and analysis of a 40-Kilobase-Pair genome fragment from a planktonic marine archaeon. *J. Bacteriol.* **178**: 591-599.

STIEB, M., SCHINK, B. (1984). A new 3-hydroxybutyrate fermenting anaerobe, *Ilyobacter polytrophus*, gen. nov. sp. nov., possessing various fermentation pathways. *Arch. Microbiol.* **140**: 139-146.

STOKES, H.W., HOLMES, A.J., NIELD, B.S., HOLLEY, M.P., NEVALAINEN, K.M.H., MABBUTT, B.C., GILLINGS, M.R. (2001). Gene cassette PCR: sequence-independent recovery of entire genes from environmental DNA. *Appl. Environ. Microbiol.* **67**: 5240-5246.

STRICKEBERGER, M.W. (1996). *In: Evolution*. Johnes & Bartlett Publishers, Boston, USA.

STUDIER, F.W., MOFFAT, B.A. (1986). Use of bacteriophage T/ RNA polymerase to selective high-level expression of cloned genes. *J. Mol. Biol.* **189**: 113-130.

SUGIURA, M., OIKAWA, T., HIRANO, K., SHIMIZU, H., HIRATA, F. (1978). Purification and some properties of glycerol dehydrogenase from *Erwinia aroideae*. *Chem. Pharm. Bull.* **26**: 716-721.

TANG, C.-T., RUCH, F.E., LIN, E.C.C. (1979). Purification and properties of a nicotinamide adenine dinukleotid-linked dehydrogenase that serves *Escherichia coli* mutant for glycerol metabolism. *J. Bacteriol.* **140**: 182-187.

TEBBE, C.C. (2002). Marker-Gene in Böden. *Biospektrum* 3/2002: 270-271.

TEBBE, C.C., VAHJEN, W. (1993). Interference of Humic Acids and DNA Extracted Directly from Soil in Detection and Transformation of Recombinant DNA from Bacteria and Yeast. *Appl. Environm. Micorbiol.* **59**: 2657-2665.

TESKE, A., RAMSING, N.B., HABICHT, K., FUKUI, M., KÜVER, J., JORGENSEN, B.B., COHEN, Y. (1998). Sulfate-reducing bacteria and their activities in cyanobacterial mats of Solar Lake (Sinai, Egypt). *Appl. Environ. Microbiol.* **64**: 2943-2951.

TOBIMATSU, T., HARA, T., SAKAGUCHI, M., KISHIMOTO, Y., WADA, Y., ISODA, M., SAKAI, T., TORAYA, T. (1995). Molecular cloning, sequencing, and expression of genes encoding adenosylcobalamin-dependent diol dehydrase of *Klebsiella oxytoca*. *J. Biol. Chem.* **270**: 7142-7148.

TORAYA, T. (2000). Radical catalysis of B₁₂ enzymes: structure, mechanism, inactivation, and reactivation of diol and glycerol dehydratases. *Cell. Mol. Life Sci.* **57**: 106-127.

TORAYA, T., HONDA, S., FUKUI, S. (1979). Fermentation of 1,2-propanediol and 1,2-ethanediol by some genera of *Enterobacteriaceae*, involving coenzyme B₁₂-dependent diol dehydratase. *J. Bacteriol.* **139**: 39-47.

TORAYA, T., SHIRAKASHI, Y., KOSUGA, T., FUKUI, S. (1976). Substrate specificity of coenzyme B₁₂-dependent diol dehydrase: Glycerol as both a good substrate and a potent inactivator. *Biochem. Biophys. Res. Comm.* **69**: 475-480.

TORAYA, T., SUGIMOTO, Y., TAMAO, Y., SHIMIZU, S., FUKUI, S. (1971). Propanediol dehydratase system. Role of monovalent cations in binding of vitamin B₁₂ coenzyme or its analogs to apoenzyme. *Biochemistry* **11**: 2599-2606.

TORAYA, T., KUNO, S., FUKUI, S. (1980). Distribution of coenzyme B₁₂-dependent diol dehydratase and glycerol dehydratase in selected genera of *Enterobacteriaceae* and *Propionibacteriaceae*. *J. Bacteriol.* **141**: 1439-1442.

TORAYA, T., USHIO, K., FUKUI, S., HOGENKAMP, H.P.C. (1977). Studies on the mechanism of adenosylcobalamin-dependent diol-dehydratase reaction by the use of analogs of the coenzyme. *J. Biol.Chem.* **252**: 963-970.

TORAYA, T., MORI, K. (1999). A reactivating factor for coenzyme B₁₂-dependent diol dehydrase. *J. Biol. Chem.* **274**: 3372-3377.

TORAYA, T., SHIRAKASHI, T., KOSUGA, T., FUKUI, S. (1976). Substrate specificity of coenzyme B₁₂-dependent diol dehydratase: Glycerol as both a good substrate and a potent inactivator. *Biochem. Biophys. Res. Comm.* **69**: 475-480.

TORAYA, T., USHIO, K., FUKUI, S., HOGENKAMP, H.P.C. (1977). Immunochemical evidence for the difference between coenzyme-B₁₂-dependent diol dehydratase and glycerol dehydratase. *Eur. J. Biochem.* **76**: 285-289.

TORSVIK, V.L. (1980). Isolation of bacterial DNA from soil. *Soil Biol. Biochem.* **12**: 15-21.

TORSVIK, V.L., GOKSOYR, J. (1978). Determination of bacterial DNA in soil. *Soil Biol. Biochem.* **20**: 7-12.

TORSVIK, V.L., GOKSOYR, J., DAAE, F.L. (1990). High diversity in DNA of soil bacteria. *Appl. Environ. Microbiol.* **56**: 782-787.

TREVORS, J.T. (1996). DNA in soil: adsorption, genetic transformation, molecular evolution and genetic microchip. *A. v. Leeuwenhoek* **70**: 1-10.

TSAI, Y.-L., OLSON, B.H. (1991). Rapid method for direct extraction of DNA from soil and sediments. *Appl. Environ. Microbiol.* **57**: 1070-1074.

TSAI, Y.-L., OLSON, B.H. (1992). Rapid method for separation of bacterial DNA from humic substances in sediments for polymerase chain reaction. *Appl. Environ. Microbiol.* **58**: 2292-2295.

VERGIN, K.L., URBACH, E., STEIN, J.L., DeLONG, E.F., LANOIL, B.D., GIOVANNONI, S.J. (1998). Screening of a fosmid library of marine environmental genomic DNA fragment reveals four clones related to members of the order *Planctomycetales*. *Appl. Environ. Microbiol.* **64**: 3075-3078.

VIEILLE, C., ZEIKUS, G.J. (2001). Hyperthermophilic enzymes: sources, uses and molecular mechanisms for thermostability. *Microbiol. Mol. Biol. Rev.* **65**: 1-43.

VIEIRA, J., MESSING, J. (1982). The pUC plasmids, a M13mp7-derived system for insertion mutagenesis and sequencing with synthetic universal primers. *Gene* **19**: 259-268.

VOGELSTEIN, B., GILLESPIE, D. (1979). Preparation and analytical purification of DNA from agarose. *Proc. Natl. Acad. SCI. USA* **76**: 615-619.

WARD, D.M., WELLER, R., BATESON, M.M. (1990). 16S rRNA sequences reveal numerous uncultured microorganisms in a natural community. *Nature* **345**: 63-65.

WIERENGA, R.K., DEMAAYER, M.C.H., HOL, W.G.J. (1985). Interaction of pyrophosphate moieties with α -helices in dinucleotide binding proteins. *Biochemistry* **24**: 1346-1357.

WILKINSON, D.E., JEANICKE, T., COWAN, D.A. (2002). Efficient molecular cloning of environmental DNA from geothermal sediments. *Bioechn. Let.* **24**: 155-161.

WILLS, C. (1976). Production of yeast alcohol dehydrogenase isoenzymes by selection. *Nature* **261**: 26-29.

WILSON, E.O. (1992). *In*: The diversity of life, pp. 131-162: W.W. Norton & Co. New York, USA.

WINTZINGERODE v., F., GÖBEL, U.B., STACKEBRANDT, E., (1997). Determination of microbial diversity in environmental samples: pitfalls of PCR-based rRNA analysis. *FEMS Microbiol. Let.* **21**: 213-229.

WITT, U., MÜLLER, R.-J., AUGUSTA, J., WIDDECKE, H., DECKWER, W.-D., (1995). Synthesis, properties and biodegradability of polyesters based on 1,3-propanediol. *Macromol. Chem. Phys.* **195**: 793-802.

WOESE, C.R. (1987). Bacterial evolution. *Microbiol. Rev.* **51**: 221-271.

YAMADA, H., NAGAO, A., NISHISE, H., TANI, Y. (1982). Formation of glycerol dehydrogenase by microorganisms. *Agric. Biol. Chem.* **46**: 2325-2331.

YAMANISHI, M., YUNOKI, M., TOBIMATSU, T., SATO, H., MATSUI, J., DOKIYA, A., IUCHI, Y., Oe, K., SUTO, K., SHIBATA, N., MORIMOTO, Y., YASUOKA, N., TORAYA, T. (2002). The crystal structure of coenzyme B₁₂-dependent glycerol dehydratase i complex with cobalmin and propane-1,2-diol. *Eur. J. Biochem.* **269**: 4484-4494.

YANISCH-PERRON, C., VIEIRA, J., MESSING, J. (1985). Improved M13 phage cloning vectors and host strains: nucleotide sequence of the M13mp8 and pUC19 vectors. *Gene* **33**: 103-119.

YIP, T.-T., NAKAGAWA, Y., PORTATH, J. (1989). Evaluation of the interaction of peptides with Cu(II), Ni(II), and Zi(II) by high-performance immobilized metal ion affinity chromatography. *Anal. Biochem.* **183**: 159-171.

YOUNG, P. (1998). Major Microbial Diversity Initiative Recommended. *ASM News* **63**: 417-421.

ZHOU, J., BURNS, M. A., TIEDJE, J.M. (1995). DNA Recovery from soils of diverse composition. *Appl. Environm. Microbiol.* **62**: 316-322.

ZIMMER, R., GIBBINS, A.M.V. (1997). Construction and characterization of a large-fragment chicken bacterial artificial chromosome library. *Genomics* **42**: 217-226.

7 ANHANG

Der Anhang enthält die kompletten Nukleotidsequenzen der Plasmide pAK2 bis 5 und pAK7, sowie von pAK101 bis 116 und pAK200 bis 215.

7.1 Nukleotidsequenz des Inserts von pAK2

```

1  gatcgcccttc  gtgagtggct  gcgataccaa  tgcctttgcc  gcagtcatgc  gggctgccc  cgccgacggt
71  caccgatgata  tcgcactgct  ctttacgaaa  gacttccagg  ccgtccgcga  cgttgggtgc  ttttgggttt
141  ggctcaacac  cgtcaaacac  caccacgtca  ataccggctt  cagcgagatg  tgcgaggggt  ttatctaccg
211  ccgcgtcttt  aattgcccgc  aggcctttat  cagtaaccag  cagcgctttt  ttaccgccca  acagtttgc
281  gcgttcgcca  accacagaaa  tagcattggg  gccaaaaaag  ttcacatttg  gcaccagata  atcaaacata
351  cgatagctca  tattatacct  tottagattt  aaattataat  tcagagaaac  aattcaatgc  gggttcagct
421  aataatctgt  cctgttcgac  ggtgccgcca  ctcacaccga  cagcaccgag  tatttttcca  ttttaataaaa
491  ccggcaggcc  accgccaaaa  ataataatgc  gttgttgatt  ggtagctgt  aaccatata  gcgaagcacc
561  aggttgtacc  gcatcggtaa  tttcatgagt  gccctgacgc  aggcagcagg  cgggtataagc  tttattaaga
631  gaaatatcac  agctgggtac  aaacgcttcg  tccatgcgtt  gcatgagtgc  tgtattcccg  ccgtgggtcca
701  ccacggaaaa  gactactgga  acgttgattt  caagggcttt  aacctcgaca  gcggtcgcca  ttttctttgc
771  ggctgccagc  gtgatgggtg  tgattggttg  ggtctttttc  acagaatctc  ctgtcaattt  tctagggtcg
841  aggtcacgaa  aaatatcgtg  caacagctat  tttttatcat  tgagttttct  ttattctcgc  gctgatcggt
911  attaatgcaa  tactgtgaag  aattctaaat  tggtaaagta  attacctttg  cgtagcgttt  attgataaatg
981  atcatttaac  cccgtcaca  ttcgctgtga  atatttcaga  taactgtttc  aatatgaaa  gttagaaaatt
1051  aatttgctat  caaattggaa  cgaaattaat  ttattttttt  tacaggctcg  ctcatttaaa  ctccggttat
1121  tgctgatgaa  aggcgattgc  cggggattta  ggcttccggt  gatgcggccc  ggcgtcccta  ttatttactt
1191  tttgatgcaa  tgcgctatga  gaagatcaaa  acgattcgaa  gtccttgccc  aacggcctgt  aaatcaggat
1261  gggctgattg  gcgaatggcc  ggaagagggt  ctaatcgcta  tggaaaagccc  ctacgatccg  gcgtcgtcgg
1331  tgaagggtga  aaatggccgt  attgtcgaa  tggacggtaa  agaccgcgca  cagttcgaca  tgatcgaccg
1401  ttttatcgcc  gactacgcaa  ttaacgttgc  ggaaaccgaa  cgggcaatgc  aactcgacgc  gttggagatc
1471  gccagaatgt  tgggtggatat  tcacgttagt  cgggaagaga  ttattgccat  taccactcgc  atcaccgccg
1541  cgaaagcggg  ggaggtgatg  gcgaaaatga  acgtgggtga  aatgatgatg  gcgtgcaaaa  aaatgcgtgc
1611  cagacgcacg  cectctaacc  agtgccacgt  caccacactg  aaagataaac  cggtacaaa  tgccgcgac
1681  gccgccgaag  ccgggatccg  tggtttttct  gaacaagaaa  ctaccgtagg  tatcgcccgc  tatgcgccgt
1751  ttaatgcgct  ggcgctgctg  gtcggttcac  agtgccgcg  ccctgggtg  ctacccaat  gttccgttga
1821  agaagccacc  gaactggaac  tggggatgcg  cggcttaacc  agctacgcg  aaacggtatc  ggtatcggc
1891  accgagtcgg  tgtttaccga  tggcgatgag  agccttggg  ccaaagcgtt  tctcgctcg  gcctatgctt
1961  ctgctggcct  gaagatgcgc  tacacctccg  gcaccggttc  ggaggcgtg  atgggttatt  cagaaagtaa
2031  atcgatgctg  tacctggagt  cgcgctgcat  ttttattacc  aaaggcgcg  gtgtccaggg  gctgcaaaac
2101  ggcgcggctc  gctgtatcgg  gatgactggc  gcagtgcctg  cggggattcg  tgccggtcgt  gcggaaaaac
2171  tgattgcctc  gatgctcgac  cttgaagtgc  catcagcga  tgaccagacc  ttttcacact  cggatattcg
2241  tcgcaccgcg  cgcaccttga  tgcagatgct  gcccgccacc  gactttatct  tctccggcta  tagcgcggta
2311  ccgaactacg  acaacatggt  tgccgggtcg  aatttcgacg  ccgaggactt  cgatgattac  aacattctac
2381  agcgtgacgt  gatggttgat  ggcggctcgc  cgtgttcctg  cgagctgggg  cgtatgctga  agaagtcgac
2451  ggcgccacct  acgctcacgg  cagcaaagat  atgccagcgc  gtaatgtggt  ggaggatctg  gccgccgagg
2521  aagagatgat  gaagcgcaat  attactgggc  tggatatgtg  cgggtgcgtg  aattccagcg  gctttgaga
2591  tattgccagc  aatattctca  acatgctgaa  gcagctgtg  accggcgatt  accgtcaaac  gtcgccatt
2731  ctggatcgcc  aattcgagg  ggtagcgaga  gttacgcaca  tcaatgatta  tcagggaccc  ggcacggct
2801  atcgcatctt  tgccgaacgc  tgggcgga  ttaaaaatat  cgcgggcgtg  gttcagccca  gcgccattga
2871  ataaggcggg  acacgggtga  atgtacaatt  gaacgtaagc  cggttttcat  cttgcaggtg  agcgagggcg
2941  agcgggcaaa  agcgggcgat  cgcgcgagat  agtgggtgat  tggcgtcgg  ccagcctttg  ataaatatca
3011  gcacaaaacc  ctgattgata  tgccgcacaa  agcgatcgta  aaagagctgg  tggccggcat  tgaagaagag
3081  gggctgcatg  cgcgggtggt  cagaattctg  cgcacctcgg  atgtctcttt  tatggcctgg  gatgcggcga
3151  acctcagcgg  ttctggcatt  gggatttgta  ttcagtcgaa  aggaaccacg  gttattcatc  agcgtgattt
3221  gctgccgctg  agtaacctgg  aattgttctc  ccaggcccg  ctgctaaccg  tggaaactta  tcgccagatc
3291  ggtaagaacg  ccgcgcgtta  tgcacgtaaa  gagtcgcat  cgccggtccc  ggtggtcaat  gaccaaattg
3361  tgcgacccaa  atttatggcc  aaggccgcgc  tgtttcatat  caaagaaaac  aaacacgtgg  tgcaggatgc
3431  ccgcgcctgt  acgctgcata  ttgcactcgt  aaaggaatga  ccatgaacga  caacatcatg  accgcgagg
3501  attaccggtt  agcgaccgcg  tgcccggaga  aaatcctcac  tcccaccggg  aagcgttaa  ccgacattac
3571  ccttgagaat  gtgctggctg  gacgcgtggg  gccacaggat  gtgctgatt  ctacgaaac  gctggagtat
3641  caggcgacga  ttgccgagca  gatgcagcgt  cagcccggtg  cgcgcaattt  ccgctgctg  gcggagctga
3711  tcgccatccc  ggatgcccgc  atactggaga  totacaatgc  gctgcgtccg  tttcgctcat  cgcttgacga
3781  gctgctggcc  attgctgatg  aactggaca  gcttggcat  gccacggtga  acgcgggtt  tgtccgcgag
3851  tcggcggaag  tgtaccagca  gagaaacaag  ctgcgttaag  gcagccagta  acgggggtgg  gctatgtcgt
3921  taattgcagg  gattgatatt  ggcaacgcca  ccacggaagt  ggcgctggcg  caggatggcc  ggtttgtcgc
3991  cagcgggatt  gtcgccacca  cgggtatgaa  agccacgcgg  gacaatatgt  ccgggggtgt  cgcctcctg
4061  cagcaggcac  tggataaac  gccgtggctg  tttcaggtat  tggcgaaaac  tttcatcaac  gagggcgcg
4131  cgggtgattg  tgaatgtggc  atggagagac  tcaccgaaac  catcatcaat  gaatcgacaa  tgattgttca
4201  taaccgcgaa  acaccgcgg  gcgttggcgt  ggggatggcg  accacgatcg  ccgtggcgaa  actggcgtcg
4271  ttgcgcgagg  atcagtttgc  tcagggatgg  atccgcgtgg  tgggcgaaga  gatagatttc  ctgaggcg

```

```

4341 tttggcttat caatgaggcg ctggatcgtg gtgtcaacgt ggtggcggct atcctgaaaa aagatgatgg
4411 cgtactggtc aataatcgcc tgcacagaac gatgccggtg atcgatgaag tcacgttgct ggagaagggt
4481 ccggaaggcg tgcaggccgc agtagaagt tgcacgacga gacaggtagt gcgggtattc tcaaatcctt
4551 acggcatcgc caccttcttt gccctgacgc cggaggaaac gcaaacgatac gtgccgatcg ccagagcgct
4621 gatcggcaac cgctccgccc tgggtgctgaa aactccgcag ggtgatgtgc gctcaagggt gatccccggc
4691 ggcaagatct ttatcagtgg agaaaagcgc ggcggtgaag ctgatgtagc acaaggggca caggcgatta
4761 tgcagcgat gaacgcctgt gtgccggtct gcgatattca cggcgaggct ggtactcacg cggcgcgcat
4831 gctggagcgc gtgcgtaagg tgatggcttc gctgagcggg gacgatatga attcgggtgca tattcaggat
4901 ctgctggcgg ttgatacgtt tattccccgc aaagtccatg ccggtatcgc cggggaatat tcaatggaaa
4971 atgctgttgg cattgcggcg atggtgaaat ccgatcgggt acagatgcag gcgatcgcca gtgagttgag
5041 tgtgcgactt aacacgccc gtgaggtggg gggagtgagg gccaatatg cggtggccg ggcatgcag
5111 acgcccgggt gtgcagcgcc gctggcgatc ctgcacttag gtgcaggatc caccgatgcc gcgattatca
5181 atggcgatgg taccgtcaaa gcggtacatc tggctggggc aggggaacatg gtcagcctgc tgatcaaaac
5251 ggagttgggt ctgagcgatt cttttctggc ggaggagata aagaaaatac cgctggcgaa agtggagagt
5321 ctgttcagta ttcgcaatga gaacggtggt cgttgattct ttcgcgaacc cgggtgctcg
5391 ccaagggtgg gtatctgaaa gcggcgagc tgatccccgt agataaccag acctcgctgg aaaaaattcg
5461 tctggtgcgc cgaaaggcaa aagagaaggt ctttgtgacg aactgtctgc gcgcgttgc tcaaggtctca
5531 cccggtggct caattcgcaa tatctctttt gtggtgttgg tggcggttc gtcgctggat ttgaaatcc
5601 cgcgactgat caccgatcg caaccgggct tgccggtgag tgccggttc ggtaaacatc cgggaacaga
5671 aggaccgcgt aatgcggtgg caaccgggct ggttttagcc ggggagacgg aaggatagtg cagaaaacca
5741 ccaccgcaag cgtttgctg cggcataaat caaataaagg taacgttctc tttgatatcc cggctgactt
5811 gggatcatag tataaagggt tttattacgc ggttaatttt aaggataaga gcattaccaac agcaattgag
5881 aaagcatagg attttattgg tggatgaac cagtaccga ttccatggat gaaagtacgg
5951 ccaagggaat tttaaaatat ttgcacgact taggtgtgcc agtgagcgca gcggatgtga cggcacgagg
6021 tgagcaggag ggatggaatc ccgagttcac aaaaaaagt cccggatggg cagaaaaagt tgcctccggt
6091 aaccgtatcc ttatcaagaa ccttgagtag ttttctcct acatgcagga gcagctcaa gaactcgtgt
6161 gagttcagta tcgaataaaa ctctaaccga cgtttccact ttcaagttgg tagctccaa agagtgtcta
6231 tctgcatgtg gggagctgaa cagcgaatt atgggctgcg atgccatact ctttaagatta agccttaatg
6301 ctttgtgaaa ctgcctgcaa aattatcttc tcatgttttt tatttacgag tttattttct caaataatga
6371 gatagtgttg atcattgaaa aaaatgcaac tatttaagtt ttaagtatg ttagtactag cattcagtaa
6441 gttaagtcaa atcggaatat ataactatg ctgtataaat acttggggga atattcttgt tttctgttg
6511 ttgttgattg tttttatcta gtgtctctat ttttctgtg ttattgcacc ttgaacata aaagtatatt
6581 ttgttttggg ttattggcgt actttatgtg ggtgaaact caacccaata tactgtagac ttaagtata
6651 agcgtaaact cgcactctat aatgttgata tcatattata tggaaaatgt accgttgcaa atgatagtt
6721 tatttgatgt ataaataatg agtaataaca ttaacggtt atctgaatga gtgttttca accgtctct
6791 gtaaatatag agcatgatat ggagggtttt aatctttcct acgaacgagt attggttatg gacaatatct
6861 attatagtcg cattggacta tgtgctctta ttgatagctt ggcaggcgt tcaattacgc tgagagtc
6931 aaccctttcc gcattgaaga aaaaactgtc agccagtatt ggggaagcac aacgggtatt agttattacc
7001 gagttaatga gactctgtcg gaaggatcg cattcttaaa gtttgcaaa gacgagtg
7071 cagcagacca atatagcatc attgttttta cccgcttact tgatc

```

7.2 Nukleotidsequenz des Inserts von pAK3

```

1 gatccgtgct gtgctggcgg aaaacctgat tgcctcgatg ctgcacctcg aagtggcgtc ggccaatgac
71 cagaccttct cgcactccga tattcgccgt accgcccga cattgatgca gatgctgccc ggtaccgact
141 ttatcttttc cggctacagc cggttacga actacgacaa catgtttgct ggtgcgaact tcatgacga
211 ggactttgat gattacaaca ttctgcaac tgatctgatg gttgatggcg gtctgcgtcc ggtaacggaa
281 gaggaacta tcgctattcg caatcaggcg gctcgcgtta ttcaggcggg gtttcgcgag ctgggcctgc
351 cgctgattag cgatgaagag gtgcagcccg ccacctatgc tcacggcagc aaagatatgc ccgcgcgtaa
421 ttgtgtagag gatttggccg cgggtggaag cgttatatca cgcaatatca ccgggtgagg tgttgtggc
491 gcgctgagtg ccagcgggtt tgacgatac gccagcaaca ttctcaacat gttgaggcag cgtgtgaccg
561 gcgattatct gcaaacatcc gccattctgg atcgccagtt cgaggtggtc agcgccgtta atgacatcaa
631 tgattatcag ggacccggca cgggtatcgc catctctgcc gaaacgctgg cggaattaa gaatatgctg
701 ggtgtggttc agcctggcag cattgaataa ggcggtatgc ggtggaatgt acaagcgggt gtaagcgggt
771 tttcaccttg cagggttagc aaggcgaggg ggcaaaagcg gacgatcgcg cggatgaagt ggtgatggc
841 gttgggcccg ctttgataa ataccagcat aagaccctga ttgatagcc gcacaaggca atcctgaaag
911 agctgggtgg cggaattgaa gaagagggg tacatgcgcg ggtggtcaga gttttgcgca cctcggatgt
981 ctcttttatg gcctgggatg cagcaaatct gagcggctcc ggcacgcgca ttggtattca gtcgaaaagg
1051 accacggtga ttcatcagc tgatttctg ccgctgagca acctggagct tttttctcag gccccgctgc
1121 tgacgctgga aacctatcg cagattggtg agaacgcgc gcgttacgca cgcaaagagt cgcgctgtt
1191 ggtaccggtc gttaatgacc agatggtgcg accaaaatt atggccaagg ctgcgctgtt ccacattaaa
1261 gaaaccaaac acgtggtgca ggtgcccgc cctgtcacg tgcataattg cttagtaagg cttagtaagg
1331 gaacgaaaac atcatgaccg cgcaggatta tccggttagc actcgtgccc cggagaaaat cctcacgccc
1401 accgaaaagc cgtaactga tattactctt gagaatgtac tggcaggcgg cgagcagatc cagcgtcacg ccgtggcgcg
1471 gtattttctc gcaaacgctg cgtgcgccc aactcattg catccccgat gctcgtatc tggaaatcta aatgcgctg
1541 taattttcgt gttcttcatt tacggagtta caggccattg cagacgtgta cagggattga tatcgccaac gccaacgag
1611 cgcccatctc cgggtttgtc cgcgagtcgg ccgttcgag cagcgtgccc ccagcagaga aacaagctgc gtcgcttcag
1681 cagtgcagcg aggcggtatg ccgttaattg cagggattga cagggattga cagggattga cagggattga cagggattga
1751 ggcgcaggat ggccggtttg ttgccagcg cctgcagcag gcgctggaaa aaacatcgtc gtcgcttcag
1821 attgccgggg tagtgccctc gcgcgggtca ttggtgatgt ggcgatggag acgatcacgg aagtggcgct
1891 aaatctgcat acaatgattg gtcataaccc gcaaacgcca accacgggca tgaaaaggca cggggataac
1961 cactgaatcg agaaaactgg atcggttagc ctcgatcggg ggcgatggag ggcgatggag ggcgatggag
2031 cactgaatcg agaaaactgg atcggttagc ctcgatcggg ggcgatggag ggcgatggag ggcgatggag
2101 atcgccggtg agaaaactgg atcggttagc ctcgatcggg ggcgatggag ggcgatggag ggcgatggag

```

7.3 Nukleotidsequenz des Inserts von pAK4

```

1  gacctcaagg atgcgatcgt caggcaccgc ggtcagttct gcggcacgtt caaagttcat gcgcagcctg
71  tcacgtccgg catcttttgg gatataccgc tgaatgcgca gcgtttctgg tgtgatacgc atatacctgtg
141  cggtgacctt attgctcagc acattttcga gcgtgaagtc atccagcgtt ttattgggtg cgggtttttac
211  ccactcaggg tgtttattgg cgagcgggta atccgtcact ttcgcggtat gcgctgatga accagtcgcg
281  gctggagtga cggctctctc ctgcagactg ttcatctggc tcaacacatc ccgaaccatc gattcaattg
351  cgtcgggtatt catggagtta tcttttatca aagcgcacag cgcagttcct gcgggttttt gcccgtcacg
421  acgtatttgg tctctttaat gtgcagaatg gctgatttcg cctggctactt cggacgcgcc atctgatcat
491  tcaacgtcgg gaccggttgt ggagattcac gcttggcgta acgcgcggcg tctttaccaa tctggcggtg
561  ggtttccagt gtcaggagtg gggcctgagg gaacagctcc aggttagaaa gcggcggtaa cccctgctgg
631  tggataaccg tgggtgcctt ggactggatg ccgattgaaa taccggaacc actcagacgg ttaccttcca
701  cggcgacaaa gcgcacatcg gaggatttaa agcagcggat gacgcgtgct ttaatgcctt cttcttcaat
771  acccgcgatc acttcgcgca aaattattct ttgcggacga cgcagatatg tgacggtctg cgagagccca
841  aacgcgggac caacggcaat aatcacttca tctgctgctt gacctgtttt ggcttcgcca atttcgggtc
911  gaaaactgtc accaggcgcg gtcgccatct gcggtgcggt tgccgcagca gacgagcgga aagaaacagg
981  cttatcgctg gtctgcattt cagacagcac atcttcaatt atctggcgca gcagcttttc attgatttcc
1051  atagtttacc ctttagccaa gctcgttggg cgtcgttggg ccgggagatg atctggcgca cgggggagtg
1121  tcgccttgca ggcgataacc tgttgccgga ccggcataat cgttgacgtc attcaccgcg gaaagcacct
1191  gtccgtcgcc gacgataatg gcggaggtat gcagatagtc tccggttaac ttggctttct ggatgttgag
1261  catatcctga gcaacatcgg taaatccgcc ctgggcccagg gctttcacca cttccagtcg gttgcgggtt
1331  ttgctgatga tctcttgccg aaacttaatt tcttcaacgc tggtacgttc tggcatatct ttcgagccgt
1401  gggcgtaagt cgcggcttca acttcttcat cggttatggg tggcaatccc attccagcaa acactgcctg
1471  cagtgcgcgg gccgctttgt tacgaatggc gatgacgtct cttcacgca ccggacgcaa accccgcctg
1541  actttaaggt cacgctggag aacggttagt tcgtcaaagt cttcggcatt ttcggttaga cctgcaaaaca
1611  tgttgctgta gttcggcacg cggaagagat cgggaagagt cctggcagga attgcatcag
1681  caaacgcgcg gtacggcgca tatccgagtg ggtaaagggt cggtcgttac tggaggcgca ttcgagatcc
1751

```

7.4 Nukleotidsequenz des Inserts von pAK5

```

1  gatcctcgta ctggcgtcct tgttcttccg tccggtcggt tttgattacc gttccaagat tgaagacatg
71  cgctggcgta acatgtggga ctggggcatc ttcattggta gcttcgttcc gccgctggtc attgggtgctg
141  cgcttcggtaa cctgctgcaa cctgctgcaa ggggttccgt tccacatgta cgtttgtact acaccggtaa
211  cttcttccag ttgctgaatc cgtttggctg gctggccggt gttgtgagtg tgggtatgat ctgcaaagct
281  ggaaccggtg gaaatggcgg cctgaacgga ggccacatca ccgatgattt tgatcacctg ccagccagag
351  ccgttggttt ttctgaggcc caccagcgtg atggaggcgg ctttcgccat gacatcccg ccaactgatgg
421  ctaatgccag accactaact tcgagtaatc cagtgatttg cttcacgtg ttgctcttct tgcacgggtt
491  taagcggatt taggtaaaat tgcttcgacg tcgctgtgtg gacgcgggat aacgtggcag gatttcacct
561  caccaacggc gctggcggcg gcgctcccgc catctacagc ggctttaacc gcaccgacat caccacgaac
631  catgacggtg ataaggcccg agccaatttt ttcgtagcca attaatgca cgttagcgga ttaccacatg
701  gcatcagcgg cttcaatagc gccgacaagg cctttgtttt caaccagtcc cagtgcgtta ttcatactgc
771  ttttctcctg tggattatga gtggcattcc ctgaagggga tgcttttaac cagccgcgca gcgttattac
841  caatgctccg acgagcgtgg ctatcttgtt gatacgtcag cgtaaaaagc ggcgctgaag tcggtaagtt
911  tttatagtgc acaaccagtt gttcctgggt gcattccgat ccgacgagca gcgggtgactg acatgctgcc
981  agccatgccg tgtgtagtag gtcggtatcc ttttgatttc tgatcacaaa agggatccct tcttctcaa
1051  taccagcag gacgtcattc cagagtgaag tgcagtctcc cagggtgaag atcacgatag ccggtgcgct
1121  gaggttactt tccatgagcg aacgccttgt accaggagag gattaacccg gttgcgacag catttctgtg
1191  gccttccagt ccgcgaatat tgccgcggcc gcgaaccagt cgatagtgtg ccagcgcact cgtgaccagt
1261  tgcggaactt cgaagtcag ggaagacgaa ccaacaaaac gatgtcgca atattctcgg
1331  ttggactaac ctgacgaagt gctctcagtg cgttgggtgac aaaaacgcgt tctttggcgc tgcggcgaa
1401  ggcgcgaact ttctccagcg ccagatctcc aggtaatggc actagttcat cgggcttaac cacacagact
1471  cgggcaaaaca ccgttggcgg cagaggggag gggaagaact gaacgtgcca atcttctgtg cgaagggtga
1541  acaagctttc aactttcgcc agcgggtatt ttgtgatttc ctgcggcaga tagcggtcgt ccagccctag
1611  ttcacgggca atgatcatcg tgaccatata gccagcgcgc gccagggtgt tggcaataat ttcgccttcc
1681  gggtttatga tggaggcgtc agtggaaccc gcgcgcgagat ccaaaaatgg cagcggacgc gttgtgctgt
1751  gtgtgggttag agcgcgccga attgcggtt cagcttcagc gccgcctacc tgtacatcga tattgagttt
1821  ttgcgtgatt tcttgggcaa tcacgcctat ttgcagcga cctgatttca ccattgaggg aataaccacc
1891  gctgttcca gcgagaattc accggcaagt cccccgtca cgtgacggg aaccgaggtg tcaaccgcaa
1961  gtaaatcctg aatgaagatt tcatgactgg gcttgttggg taattccgcc atggtctggc gtacgtgctc
2031  cagcatgccg ccaatatttg ttcccgttcc gccagtgaac ttatctagcc gtgggcagtc acctaccgct
2101  ttcataatgg cttctgcgcc cgtctgacgc cgcacagaa cggtacgccc cgtcagcgtg agctcagagt
2171  ttccagcggg aatggctcgc gccttcacat caccgcagcg tgttttcacg acgacagcag atcgggtgcc
2241  aatcaggcgg cgcgccatgg ggacaatatt ttttgcctct tccgatttca ggttaaaaac ggtcgcaatt
2311  ccgtaaggat tagagagcgt ttcaatcact tttccgggga cagcgacctc aatggccgct aagattccta
2381  acgggatacg gtcgatatag agcacttcat gcagcaggg caacggcggt gtaagacggt tgctgaccag
2451  tacgccatcg tctgttgtga aaatcacgcc cgttagctga tatccggcgc gaacgggaagc attaatcatg
2521  gtggcgacat cggcaaaatc gaatgctgat gacaccacca ggatgtaagg aatatccgcc ggacgagtta
2591  acaattcttc cggggtgatc gtgacgcaa ccctaaccgc gacccacccc ggcgttttag ggttgtgacc
2661  gatcgtggtt gattcggtga taatggttcc cagctagctc catcaccaat gaccgggtgt
2731  gcttcgttaa ttccgatgag cgaaatatcg ctgacattga tgccgcgcat ttttgcagca agcgtaaagc
2801  cctcctgaat accaaacaca ttacgtaatt tgcccttaat tccggtggtt tctgccagtg cgtggtctt

```

```

2871 aatgctcagc gtgccagcgt catccagggt cgccagtgcg acttctgttg atgagttgcc tatgtcaatg
2941 ccagctatat atcgcatcat ttttccctaa aattaatcgt cacttttgag ttttttacgc tctacgtaca
3011 gcactgccgc ttcacgaacg aaagctgctg aaactcttgc ctgataacga ttttcgagat cgtcgccgat
3081 ggccataagc tcgtcttttg ttgagcgata cgggcgcgag gcgttataga tttcaaggat gcgatcgtca
3151 ggtactgcgg tcagttctgc ggcacggtta aagttcatcg ccagcctgtc acgtccggca tctttggcga
3221 tttcagcctg gagggcgagc gtttcagggg tgatgcgcat atcctgcgcg gtgacctgtg tgctcagcac
3291 attttcgagc gtgaagtcac ccagcgtttt gttagtagcg gtttttaccc actcaggatg tttatttgcg
3361 agcgggtaat ccgtcacttt tgcggtatgt gttgatgaaa cagtcgcgga tggagtgcg gtctctccct
3431 gcaggctgtt catacggctc aacacatccc gaaccatcga ttcaattgca tcgggtattca tggagtattc
3501 ctctatcaaa gcgccacgcg cagttctctg ggggttttgc ccgtcacgac gtatttgggt tctttaatgt
3571 gcagaatggc cgatttccgc tggtacttct gacgcgccat ctgatcttc aacgtaggaa ctggctcgcg
3641 agattcacgc ttggcgtaac gcgcggcggt cttaccgatc tgacggtagg tttcaagcgt cagaagggga
3711 gcctgaggga acagctccag attagaaagc ggcggtaacc cctgctggtg gataaccgtg gtgcctttgg
3781 actggatgcc gattgaaata ccggaaccac tcagacgggt accttctacg gcaacaaacg ccacgtcgga
3851 ggattttaaag cagcggatga cgcgcgcttt aacaccttct ttttcaattc cggcgatcac ttcgcgcaag
3921 atactcttgt gcggaatacc gacgatattg actgtttgtg acagtccaaa cgccggacct acggcaataa
3991 tgacttctgc ctgctgctgg ccttgttttg cttcgccaat ctcggtcaga aagctgtcgc cctgtgccgc
4061 tgcagcctgt ggtgcgcttg ccgctgtaga tgagcggaaat gagacgggtt tgctcgtggt ctgcatttca
4131 gacagtacgt cttcaattat ctggcgagc agcttttcat tgatttccat ttttcacccc ttaaccaagc
4201 tcgttgggat caagtgcgcc agggatgttt ttgatac

```

7.5 Nukleotidsequenz des Inserts von pAK7

```

1 gatcgctggc gagttccgcc ccagtagcga acagcatctt ctgcatagcg tgcaattcct ggcgtagctc
71 ggccctggcg gtgctggcat agcagacgcc aagctgggaa atcagttcat ccaccgtgcc gtaggcctca
141 acgcggtatg cgtctttatc gatacggctg ccgccaaaac gcgcggtcgt gccgttatcg ccggttcggg
211 tatagatgcg gtacatttat tttatctcgc tgaagggaag aactttaacc agttgaccgg cattggcgcc
281 gagcgtgcgg atctgtgctg tcccgccgcg ggtatgcccc cagaccagcg cccgatcttc gggcaactgg
351 gcatgggtta aggcaatatc accggtgctg ttgagaccga gaccacgcg cagcgcggaa cttttggcgc
421 ccagtttgcc gagcgccagc gcgcagtcac gatcgtcgca acagattgcc cggcagggaa cgccttgctc
491 tccagccccc cagcacaaat cgtcaagcgc attagtagcc tgccagctg agtgataaaa caggtgtacg
561 cccggtgatg aaagtaacat tgcccccct gcgttatcag aatgctgac attgctgac ggaagatctc ggcaatttct
631 ttctcgcttc ctttgccgcg gttggagaag gcgttgccgt ccttcagcgc catttccgcc atatacggga
701 aatcggttcc tttgacgccc agatcgcgca gatgctgcgg aataccgatg tcggcggaga ggccggcaat
771 agcatggaat gccagctcgg cggcatccat ggtggtaggt cgtccgtgt tctcgccat aaactctgcg
841 atgtcggcaa atttttccgg gttagcgatc aggttatagc gtgccacgtg cggcagcagt acggcattcg
911 ccacgcccgt cggcatgtcg taaagaccgc caagctgatg cgccatcgcg tgaacgtagc cgaggttggc
981 gttgttgaag gccatacccg cctgacgcaa gttacggcgc attagtagcc agcggcagc tcggttaccg
1051 agcgcacggg cctgacgcaa gttacggcgc attagtagcc agcggcagc tcggttaccg
1121 ggttggcatc tttggaaatg taggcttcca cggcgtgggt cagggcgctc atcccgttgg ccgcagtcag
1191 tggagctggt ttgccgagca tcagcagcgg atcgtttaata gagaccgacg gcaggttgcg ccagctgaca
1261 atcacaaact tcactttggt tttggtattg gtcagcacgc agtggcgggt gacttctcgt gcggtaccgg
1331 cgttggtatt caccgcaacg atcggcggat cggggttggg gcctttaccg caatcatgcg ggctaccgcc gccaacggta
1401 atccccctcg tgagtcgccc cgataccgat tttccgaaag acctccagcg cgtcgcgcac gttggtgtct ttggggtttg
1471 acgatgatgt cgcaatgctc gtcaaaaact acgacgtcaa taccggcttc acgcagatgt gtgagggttt tatctaccgc
1541 gctcaacgcc gtcaaaaact acgacgtcaa taccggcttc acgcagatgt gtgagggttt tatctaccgc
1611 gccgtcttta attgcccga gaccttttat agtggccagc agcgttttt taccgccaa taccgtacag
1681 cgttcgccga ccacggaaat agcattgggg ccaaagaagt tcacatttgg cagaggttaa tcaaacatac
1751 gatagctcat aatatacctt cttagattta aattataatt cagagaaaca attcaatgcg gtttctgcta
1821 ataactgtgc ttgttcgacg gtaccgccac ttacgccaac ggcaccgatg actttgacct ttaatatgac
1891 aggtaaaacc cgcgcaaaac taacaattcg ttgttattg gtgagctgca agccatagat agaggcacct
1961 ggttgtaccg catcggtaat ttcattgggt cctgtcgca ggcagcaggc ggtataagct ttattaagag
2031 agatattaca gctggtgaca aacgcgtcgt ccatacgttg cattagcagc gtgttccgcg cgtgatccac
2101 cccggaaaac accaccgcaa cgttgatttc aagcgcttta gcctcgacgc cctgcgccat tttctttgca
2171 gccgccagcg taattgtggc gatttgttgc ctcttcttca cagtctctcc tgaaaagggt gttagcgtga
2241 ggtcacgaaa atatcgcgca acagctattt ttatcatttg ctttatctta ttttctcgcc ccgcgttatt
2311 aagtcaatag ggtgggaatt tcaaaaatat tacgttcagt ttctgtgtgt ggcggttatt gataatgatc
2381 atttaacctc gtcacaattc acggcgaata ttcttgagcc gcgtttcaat atgaaacgat ggttttttat
2451 tacgtaccaa attggaacga aattaatttt atttttttat tgcctgctc atttagagtt cggctattgc
2521 tgatgaaagg cgaatgccgg gtgttgtgtc cccggcaata cggcccgcg tccttatttt ttatcttttg
2591 agtccataaa ctatgagaag atcaaaacga tttgaagtgc ttgcccagag gcctgtaaat caggatgggc
2661 taattggcga atggcctgaa gaggggctga tcgcaattga aagcccttac gatccggctt cgtcggtgaa
2731 ggtggaatg ggtcgattg ttgagctgga cgcgaagag cgcgcggagt tcgacatgat tgaccggtt
2801 attgccgatt acgcgattaa cgtgcccgag gccgagcgcg ccatgcagct cgacgcgctg gagatcgcca
2871 gaatgctggt ggatatccac gtcagtcggg aagagatcat tgccattacg actgccatca ccccgcgcaa
2941 agcggtgagg gtgatggcgc aaatgaaact ggtggagatg atgatggcgc tgcaaaaaat gcgcgccaga
3011 cgcaccccc ccaatcagtg ccacgtgacc aacctgaaag ataaccgggt acagattgct gccgacgctg
3081 ctgaagcggg gatccgtggc ttttccgaac aggaacaac ggtcgggatc gcccgctatg cgcgcttaa
3151 cgccctggcg ctgctggtgg ggtcccaatg cggtcgcccc ggctgctgta cgcaatgtct cgttgaagag
3221 gccacggagc tggaaactgg aatgcgcggg ctaaccagct acgcccgaac ggtgtcggta tatggcacgg
3291 agtcggtgtt taccgatggc gatgatacgc cgtggtcaaa agcgtttctt gcctcgcgta atgcttctc
3361 tgggtctgaag atgcgctaca cctccggcac cggttcggaa gcgctgatgg gctattccga aagcaaatcg
3431 atgctttatc tggagtcgcg ttgcattttt atcaccaaag gcgcggcggt acaggggtta caaaacggtg
3501 cggtcagctg tatcggcatg accggcgctg tgccgtcggg gattcgcgcg gtgctggcgg aaaacctgat
3571 tgcactgatg ctgcaccttg aagtggcctc cgccaatgac cagacctttt occactcga tattcgtcgt

```



```

3641 actgccccga cectgatgca gatgctgccg ggcaccgact ttatcttctc cggctatagc gcggtaccga
3711 actacgacaa catgtttgcc gggctgaact tcgacgctga agacttcgat gattacaaca ttctgcaacg
3781 cgatctgatg gttgatgggg gectgcgtcc ggctcacggaa gaggagacaa tcgccatccg caataaggcc
3851 gcgcgcgcca ttccaggcgtt gttccgcgaa ctgggctcgc cgctgattag cgatgaagag gtggaagccg
3921 ccacttacgc tcacggcagc aaagatatgc ccgcgcgcaa tgtggtgga gatttgctg ccgtggaaga
3991 gatgatgaaa cgcaatatca ccgggctgga tatcgtcggc gcgttgagtt ccagcggctt cgaagacatc
4061 gccagcaata tctcaacat gctgaggcag cgcgttactg gtgattacct gcaaacgtcg gccattctgg
4131 atcgtcagtt cgacgtcgtc agcgcctgta atgacatcaa cgattatcag ggaccgcgca ccggctatcg
4201 catctctgcc gaacgttggtg cggaaattaa aaatatcgcg ggctggttcc agcccgctc gatcgaataa
4271 ggcggtacac agtggaatgc acaactgaac gtaagccggt ttccaccttg caggtgagcg aaggcgagcg
4341 ggctaaagcg gacgaacgcg tggatgaaat cgtgataggc gtcggcccgg cctttgataa gattacgac
4411 aaaacattga ttgatatgcc gcacaacgcg attttgaaag aactggttgc cggcattgaa gaagagggcc
4481 tgcattgctc ggtggtgagg attctgcgca cctcggatgt ttcatctatg gcatgggatg cggcaaatct
4551 cagcgggttc ggcacgtgga ttggtatcca gtcgaaagga accacggtga ttcatcagcg cgatctgctg
4621 cctctgagta accttgagct gttctctcag gtcgcgtgga tgacgtgga aacctatgc caggttgta
4691 aaaacgccgc gcgctatgca cgtaaagagt cgccttcgcc agtgccagtg gttaatgacc agatggtacg
4761 ccccaaattt atggccaagg ccgcgctgtt tcatatcaaa gaaaccaaac acgtggtgca ggatgctcgc
4831 cctgtcacgc tgcataattg actcgtgaag gaatgacct gaacgacaac atcatgaccg cgcaggatta
4901 tccattgagc acccgctgcc cggagaaaat accggcaaac cgtaaacga gattaccctt
4971 gagaatgtgc tggcgggccc tgtaggtccg caggatgtgc gtatttctca gcaaacgctg gaggaccagg
5041 cgcagattgc cgaacagatg cagcgtcacg ccgtggcgcg taatttccgt cgtgcggcgg agcttatagc
5111 aatcccggtt gcccggtatt ttgaaattta caacgcgctg cggcgttctc gttcttctgt cgccgagctt
5181 cagccatttg ccgatgaact ggaacatacc gtcggtgcca cggtgaaacg cgggtttgtc cgcggtcgg
5251 cagaggtgta tcagcagaga aacaagctgc gtaaaaggcag ccagtgcagg aggttgatg ccgttaattg
5321 cagggattga tatcggaac gccaccacgc aagtggcgtt ggccgagcat ggccggttta tcgccagcgg
5391 gattgtcgcc acgaccggtg tgaaaggtag acgggacaa attgccgggg tgggtggctc cctgcagcag
5461 gcgctgaata acaccccggt gtcacttcag gtcggtgcca aaatctgcgt caacgagctg caccgctgga
5531 ttggcgatgt ggcgatggaa accatcactg aaaccatcat taccgaatca acaatgattg ggcataaccc
5601 gcaaacgccc ggcgcgcttg gcgtgggaat ggggaaccac atcgccctgg agaagctggc ggcgttgagt
5671 gaagatcggt ttaccaggg ctggatcccg ctggtcggtg aggagaggga ttctctcgag gcggtttggt
5741 ttatcaatga ggcgctggtt cgcggcgctc acgtggtgag ggcgatcctg aaaaaagatg atggcggtc
5811 ggtgaacaat cgtctgcgtc gaacaatgcc ggtggtagat gaagtcaccc tgctggagaa ggtgccggaa
5881 ggtgtgctgg cggcggtgga agtgccgccc ccaggacagg tggtgcgagt gctgtcgat ccttacggca
5951 tcgcgacctt ctttaccctg acgcccaggg aaacgcaaac tatcgtcccc atcgccagag cgctaattgg
6021 caaccgttcc gccgtgtgct tgaaaacccc gcagggtgat gtcgctcaa ggggtatccc ggcgggttaag
6091 atctttatcc gcggcgaaaa gcgcggcggt gaagccgacg tagcgcaagg cgcacaggcc attatgcagg
6161 cgatgagcac ctgtgcgccc gtgtgcgata ttctggtgta agcaggtacg catgcaggcg gcatgctgga
6231 gcgggtgctt aaagtgatgg cctcgtcgac cggtcacgat atgaacgcgg tgtatattca ggatc

```

7.6 Nukleotidsequenz des Inserts von pAK101

```

1 gatctatggt gtaaccttta ctccgcaaat gttattcacc aaatttttaa aaaagacctt aatggtggca
71 aggcagcagt ttctaacag cagtatacaa aaattggtgg ttacggtacc gaatttaaca cctaggttaa
141 cagaagagat ttattttagt ttagaggaa ctaggggttaa gaaggacagg gtaactgtga ttagccaggt
211 gcaaagctat atgtattatg tgctctgtca aaagccagag atttggcgga atgaagtggc tcttttcacc
281 tatgatgaga caggcctatt ttattataat ttgaccatga ataagaggat gcaaccgtac gcatgattg
351 tatgtcgaat agatctaagt catgagttaa cgcctcagat gtttcaagg gaaccttag acgtgtgct
421 ttatcgtctg gagaaattat taaatcaagt cttatataag aaattaacca gcgcggtttt tatgacaggg
491 aaaggctttg aaggaaactg ggttagagat gttcttgtaa gactcagcag ttctaggcgt gtctttgtg
561 gacagaatct gtatgcaaaa ggcgcttggt ttgcagcaaa aggtatttgc gatgaaagt ttcgaaacta
631 tgttttttta agtgatgaaa tgataacctc cacaattatg ttacgccttt atgaagatgc aaggaaagta
701 gaatacagca tggtaaaagc tgggacgcca tgggtgaaag cagaacatac agtaacggtg attttggatg
771 agaccaaaga actttgcttt acggtgagca atctcttaaa gagagagccc ctccaggagg tattttcttt
841 agatggaatg gtagaacggg aaaataagac cactcgtctt gcaattaccg ttcatcttgt ggatcgtttt
911 actgcggttg tgacagttag agatactggt ttgtgtgagt tttatgcaac taactataga atttggtaac
981 agacattaac cttatagaca ggaggatggc aatgggaaaa ttaattcttt gtgcaggaaa tacagccaag
1051 gaaccgtatt gttttaagt aacaggtact ccggtctata cgatagaaga actatgttac tacatctatc
1121 ataatttggg atctgtaagt gaagagctag taagtcagga gtttattgta tttgtaagag aacagttggg
1191 ctaaatggat c

```

7.7 Nukleotidsequenz des Inserts von pAK102

```

1 gatctgtctg aagtctttac ccgcatcaaa cgactgcgcg acgacgatat ccgggtggat gaaaaacgcc
71 gctgttgat ggataacgcc gacgccagcg ccattccagc cgacaaactg gtcaccatgg caaaactggt
141 tgtcgttatc agcgaatggg tcatcgctaa tgatattgat acgactgcca tccagtctg gacatcgctg
211 caggaaaatt taggcataaa cgtgtgtcga atcatgagcg tgatgtccgg gcagttaatg cccagtcct
281 gcgaagtgga tgtgatgggc gcgttgctca tgcacgcctt gcgcagcagc aacttaagtc cagcatccat
351 tgcgactgg aacaataatt tcggcgagca tcgtgataaa tgcgttcttt ttactcgcg taatttcgca
421 tcagccagtc tggacagccc gaagatgggg acggcggata tcatcggtac caccgtcggt aaagagaaca
491 cctgcggtgc agttcacggt cgtatgaaaa gcggtgcctt gacctaactc cgctgagta ccgacgattt
561 aaccggcgaa atcaaagcct acgttggtga agggctatcg gttgacgat cgctggacac tgtcggctgc
631 cgacgggtaa tccaggtacc tcactggagc aacctactgg cctggatttg tcgtaatggc tttgacatc
701 acgtggcaat gaaccattcc gccagcgagc aggtactgca tgaagcttcc acccgctatc tcggggtgga
771 taccttttct catcgctaact actcagggaa accgaaggcg tggagaaaac aatgtcagca caaaaagaca

```

```

841 ttattattgc gcttgatgaa ggcaccacca atgccaaagc cgtagcgtg gatggtcagg gaaacgtggt
911 cgcgaagttc tccgcgcgc tggcgatcca cagccccgt gaaggctggg ttgaacagtc aggtgatgca
981 cttctggagc catcactgga tgttggcgca caagccatta cctgcgtcgt cgcacaacgc gtcgcagcgc
1051 tggcgatcag caatcaacgt gaaacggcga taggctggta tcgtgccagc ggctgccttc tcggccctgc
1121 tatcacctgg caatgttcgc gcacggccga tttttgcgt gcattacgtg aacaggggca cgaggcgtac
1191 ataaaaatcca tcaccggatt acccgttgcc ccactctttt ccgcctctaa aatgcgctgg ctgctggagt
1261 cagttcccaa cggtatgacg ctgcacacgc aaggggaaat atgtctcggg accatcgata gctggttact
1331 gtggaactta acgcacggcg aggaatttcg ttgcgacatc tccaacgctt cagcacgcga gttgctcaat
1401 ctcaacagcg gacaatggga tagcgagatg ttggctctat ttggtattcc gcagcaggcg ttgcccgaag
1471 tttgcccctc cagccaccat tttggcgtaa caaaaggctc ggagaggata cctgatggaa tccctattct
1541 ggcgatgatt ggcgactctc atgctgcgct ttttgcccat gggctgggta tggaggctg ttgcaaggcg
1611 acctatggca ccggatcttc cgttatggct cccgtattct cggcgacgac cgaggtagc gcgctggcaa
1681 cgaccattgc ctggcatgac gctgacaccc tggctctacg gctggaaggt aatattccgc ataccggaga
1751 tgccgtcgca tggatggccg atagcacagg tcttagcgaa ttaccggaag agcaactgct tcatgagctc
1821 aatagcctgc ccgccacgt tgactccagc ttggcgctct attttgttcc ggccttacc ggtcggtcgc
1891 cgccctgggt ggatgaagat gcccgggggt tgattcacgg tctcagccgc ggagtgaac gcgcacatct
1961 ggtacgtgcg gcaactggag cgaattaccta tcagattgcc gatgtgttt tagcgatcgc ccagcacaa
2031 ggttttcgac tcagcgcgtt aatggttgat ggcggggcaa caaaaaatga ctggctaag cagtatcaag
2101 ccgattttat ggcgtgtccg gtgatggcga ttttgcccat gcgatgccat tgaactttcc gctatgtct
2171 ggcacgcaag aagctgcaag gtgcatctac cagccagttg cgagattatc tgcccgatca cgtatcgttc
2241 cagccaaaca tggcgcgcca tgggagattg caaaaacgct ggcatgaatg gcaaggagcc gtcgaacgca
2311 cccgttggca aacccgtaa taaatcaacg ctaatgataa atgcgccgc agccataact gactgtgggc
2381 gcactgttaa tcttcaaaa cgcagctgca ctgcaaaaac gcgctgcact ggcgctgctt gctatcaatc
2451 ttcacgcaag ttgtcggcag ccagccagcg ccttgcgca caatcttctg gcgaaaacgt ccttcgaaga
2521 atcgataacc agtcgctgtc gcgattacgc cccttgcgca caatcttctg gcgaaaacgt ccttcgaaga
2591 taaacccaag gcgctccgcc gcccgacggg aagcgtgtt cagagagtca catttccact ccacgcgacg
2661 atagcccaac gcaaacgcct ggcgcagcgt cggcgctgac ctltcgtgtc cgatccagct attttctatg
2731 cgcggtgacc aggttacatg accaatttca accgaaccat gctcccgttc gatcgccata aagcacacca
2801 gtcccaccgc acgaccgga ccctgttcaa tgacagcata gggaaccaga gaggcatccg tggatttgc
2871 ctctaccag caagctgtgg cctcaacgct cgtggggcga gaacttgcaa gccaggcca gtcgcgatcg
2941 tctggcgct gcgcgtaagc atcaaacaga tcggcgctat ggctgtcggc atccaaggga accagtccac
3011 aatattgccc tgcaagttct tccgcggca gcacggcagc accattccag tcaggcacia tatcgccgac
3081 ggtctgtcca taaagattaa tttccggcac gattcaaccc ctgttgcgaa gtaaaaata gttataacac
3151 cggccatttc gccttcaaag catcgcgggg ggatttctga caacgaacag aaaatcagcg gcccttctat
3221 atgcagcttg caagatgacg cgtctatact gattaaaaat caacgctgaa gagaacacta tgtccctacc
3291 cgattttcat gtttctgacc cttttacgtt aggcattgaa ctggaaatgc aggtggtcaa tctccgggc
3361 tacgacctga gccaggactc ttcccagctg attgacgcgc taaagccgct gctcaccgcc ggagaagtaa
3431 agcacgatat cactgaaagt atgctggaga tggcgaccgg ggtttgtcgc aatatcgacc aggcgagtcg
3501 tgaatttacc gccatgcagc agataatctc aggcagcgtc ggcgagcatc accatcgcat ctgtggcggc
3571 ggtacgcac cgtttcaaaa atggcaacgt caggaagtct gcgatgacga acgctatcgg cgtaacctgg
3641 aaaattttgg ctatcttatt cagcaggcga cggatattcg ocaacatgtg catatcgct gtgcaaacgg
3711 cgatgatgct atttacctcc tgcacggcct gtcgcgattc gttcccat ttattgcat ctctgcgcgc
3781 tcaccttata tgcagacgtc gcacacgcgt ttgctgctcg cgcgctgaa tattttctcc cgttttcccg
3851 ataattggccc gatgccgtgg gtgaataact ggcagggaatt cgaggggtta tttcgtcgac tggcttacac
3921 cagcatgatt gatagcatta aagatttaca ctgggatata cgccccagcc cgcactttgg tacggttaga
3991 gttcgcgtca tggacactcc gctaaccctt gaacacgcag tcaatatggc gggacttatt caggctaccg
4061 cccactgggt gctcactaaa cggccattca agcaccagga cgtgtattac cgtctgtata aatttaaccg
4131 ttttcaggcc tgccgctttg gcatggcggg aatcatcacc gacgtcaata ccggcgatgg gcaccgcctg
4201 tcagatgaca cgctacggct actggagaat gtcgcgcgt ctgcggaaca agtaggcgcg accagcgca
4271 ttgaatcctt acgcctgcag gttaaaaatg gtcatgatga agcgcagagc atgcgtgatt tcgtcgccga
4341 cggcgatc

```

7.8

Nukleotidsequenz des Inserts von pAK103

```

1 gatcaccacc agcgtgatca gaggccatgt accttcggga atgtttaaca ggcgtaccaa cagaaaagta
71 aggagaaacg ccagcgcaat gcgaatacca tgcaccacac gataatgacg atacaaacga atttcaaaag
141 gactcagcga tttgtctgca cgcactcatg cactccgtca gggaatagca aagaagcgaa ttgtacctgt
211 ttttagcgtg aaaagatcat cctgatttac accccaaaca gttactctgt ctgcactggc agctacattt
281 caatgtccca gtaaccgtcc tccatgccat tgttcataata aacttcaaa gagggtttag cggctatcgc
351 ataagtcgta tcctgcaaca ggcgctcgaa gaactgatac caaggcgtcg caaaatcgtg attctcaacg
421 cgcgcaacgg cgacagcata gtgcgccacc gccagttcgg tgaggatcac cccttcgctg ttttctggga
491 tttcaaaacc ttcaggcaca gaaaccacgg gaccacagcg cagtttttcc gcaggaacaa cctcagggtt
561 gtcgtaataa acagcaatcc attccaacgg cacaatctgt ttaccgtcga cccacttcat taattgctca
631 aacccctgct tcaccgtttg ttcccacggt ccaaccatat ggaaaccggc aatcatgctg ttttcgacca
701 gctttatctc gtactccata caacctccac tgttacactg tatttatata cagtgtaat tctggctatg
771 tcggccacaa ggaaatagt attattatgt gacgagattc gcactcttgc cagtgcagc catcaggaaa
841 aactaagcct tgtgggtggaa ataatcgctg aggcgcgaga aaacgcgcgc ttcgcgcagc gattccagcg
911 taaccagagg ccaatgcgcc accagcttat ccgcatcgta gagtccaatt tctggcttga tgttagggac tttcgttata
981 agcgatggga gcaaccagct ctttcttata aaggacatat tttgctttga ttttcttctt atcgccatac cagatccgtt
1051 ggcagggcca tccagaaatc ctgctcggtt ctacgcaaaa cctgtactgt atcgaaagtg tgttgcccc attgcagag
1121 cagtgccaac ctgcttaccg ctacgcaaaa gcccttcgc actctccgc cccatcacca ccgcaatcag gcggcgctga
1191 tttacgcgcc tgatcttcgc gcccttcgc cagggttaaat ccggcaccgg acgtatgccc tgtcttcagg ccatctacgt
1261 ccattcgactg cggaagcaat aaaccgttac ggttttgcgt tgtgatgccc ttccaggtaa ggtctttctc
1331 tcatggtttt atcccacaac cgggttctcc gggatgata gcgcgggaca gcacgggaca gtcgtacgcc
1401 actgtacata tggtagaaat

```

```

1471 gagctatgct gacccggcgc atccagacca tgtaccgttt caaaatgggt gtccctgcagg ttcagttttt
1541 ggcgatagtt gttcatcatc gcgacaaact ggggtgccc tccggcgatg taatccgcca gtgccacgca
1611 ggcctcatta ccggaatcaa caattaaccc acggctgagg tcacgtaccg aaacgcgac ccttctttc
1681 aggaacatca aggatgaacc gacaaatacc ggattatctt ttgcccagtc atcgcgccc acggtcacaa
1751 tatctgtcgg actaatagc ttgctgtcaa ttgcgcgatc gacaacatag ccagtcata gtttcgtcag
1821 gctggcagga ttgcgctgct ggtgttcatt accggctgtc aggatttggc ccgtggtgta atccattaac
1891 acccatgccc cggcagtaat cgcaggagct tgtggggcga agctcacggc atcgctcgcc caggcgggcg
1961 aaaaactcat cgtaaatagt gaagcggcaa taaacaaacg gcgtttcaac agcatgtcct caggaaaggg
2031 agaaatagcc gttcttttta cggaaagttc gtcgaacaaa catggataaa ttgcaagaaa atgtgacata
2101 aggcacattt tcttgctatc aggaaaggg ttccagagaca aatctcgccg gaactacct ttacgcggcg
2171 cggctctcgc gtgatgactg cgtggcggt gataaccatc gatcatactg cgaaaaattt gccctggcgt
2241 gtcacccagc gtgcacaggt aaatatgcgc gcagatgaac agtaagccca caatcgctaa cgccatatgc
2311 agcaccagca tcaccggccc cgcccctacc acctgcgggt agagacatag caaccgcgtg atgatac

```

7.9 Nukleotidsequenz des Inserts von pAK104

```

1 gatcccttgc cgtgcccgcc gggcggttga gcacgatttt aaagaaggtg actggggccgt cgctgaaatg
71 cgtcgccacc cgctgaaagg cgatcgacc ttctatgcgc agttaacca atttatcact tttgctgatg
141 accactttgt cccgtgggtg gtcacgctgg cagcccataa tctcgaaaa gaagcgccgg acgggtgtggc
211 aactgagatg ctggatgaag gtctggttcg tcaggactta accgccctca actttgtcac catcgacagc
281 gccagcaccg aagatatgga cgatgcgctt tatgctgaag agctggccga cggcaactg caattaactg
351 tctgcattgc cgaccgtacg ccctggattc caagctggat caagcgcgac aaaacagcaa aattctcgcg
421 gtttactaac tatctgccgg ggttcaacat ccgatgcta ccacgcgaac tgtctgacga tctgtgctct
491 ttacgcgcga acgaagtgcg tccggttctg gcttgctgta tgaccatcac cgcagatggc gcgattgaag
561 acaacatcac cttcttcgca gcgacgattg agtcgaaagc gaagctggtc tacgacaacg tctccgactg
631 gtcggaagat accgcgact ggcagccttc aacgaagcag attgctgaac aaatcggtct atgacaccgt
701 atttgctga gccgcggtga atggcgtcat aaccatgtct tggattttaa agatcgccc gattaccgtt
771 ttgttcttgg tgaaaaaggt gaagtcctgg acatcgctgc tgagccacgc cgcacgcaa accgaatcgt
841 ggaagaatcc atgattgcgg caaacatttg cgccgcccgc gtgcttcgcg acaagctcgg cttcgggtatt
911 tataacgattc atatgggatt cgaccgcttc ctctggcggt ctctgtaaaa accatcggtg atgacaccgt
981 tgcacgttga tgccgaggaa gtctgacgc tgggaaggtt ctgcaactg cgccgcgagc tggatgcgca
1051 gccttctggt ttctctgaca gccgaattcg ccgcttcag tcttacgtg aaatcagtat cgagccagga
1121 ccgcactttg ggctgggtct ggaggttat gccacctgga cctctcctat tcgtaaaaa atggcgatat
1191 gattaaccac cgctgctta aaggccgttc tcaaggtgca aaccatcgcc cccctgggg gctgacaccac
1261 ggtgcaaatg gcggaacgtc gtgcctgaa ccggatggct gagcgtgatg tgggcgactg gttatacgcc
1331 cgtttctcga gtgacaaagc cgggaccgat acccgcttg cggccgagat aattgacgtc agccgcgcg
1401 gtatgcgcgt acgttttagt gataatgggt cagtagcatt tattctgccc ccattctctg acgcccgttcg
1471 ggacgagctg gtatgcagcc aggaagcgcg cagcgtgcaa attaaaggtg aagtggttta caaagtcacg
1541 gatgtgatg acgtaaccat cgccgaagtt cgcattgaaa cccgcagcat tatcgcgct ccagcccgct
1611 aacacgtatc aatccagcga ctttctcat tttgtgaaag gtctgttctt tttcccgccc aaattcccac
1681 caccgcacta cacttctttc attcgggtcaa ttttattttt ttactttttt cagttccgct ggcttgcctt
1751 tttacgattc ctggattaaa cataaatata taaaaaaaac aatacgttca gccataatca ccccgaatga
1821 atcatggcta ccatacttt tgaggctcta tgcgctttaa acgggatagt acacatgatg aaagacgtcc
1891 gggagctggt tacgttgtat agctatgtgg gcactcataa cccctactgg cgtttgtcag aggattgcaa
1961 catcctgcat ttctctatcg acgaagcgtc agaagctgat cagaccatcg aattattacc tgaacaagcc
2031 gtcgacattc gcgagatgac ggtgatcacg tcaagtctgc taatgacgtt gcccttgaa gatgacgaca
2101 ttcccggtga tctggctcgg cgaaaaatca ataagcgcga atgggcccgt agcgcacccg cctgggatga
2171 cacccttcc gtgcgcccg atctggtatg gcgataaaga aaaaatcagc ctcggaaccg agcaggattt
2241 ctggatggcc ctgcctaaag cagaagtcct taacatcaa gcaaaatag tcttgataa gaaagagctg
2311 gttgctccca tcgctgcgca tcaacgttgc ggggaatttg aactctagc tcgggataag cctgggtcgcg
2381 attggcctct gggttacgtg gaatccgtcg gcgaaggcgg cgttttctcg cgctgagcg attatttcca
2451 ccacaaggct tagtttttcc tgatgcgtct gactggcaag agtgcgatc tgctcacata ataactacta
2521 tttccttgtg gccgacatag ccagaaatta cactgtatat aaatacagtg taacagctga ggttgtatgg
2591 agtacagat aaagctggtc gaaaaacgca tgattgcggg tttccatag gttagcagga gggacaacaa
2661 ggtgaagcag gggtttgagc aattaatgaa gtgggtcgac ggtaaacaga ttgtgccgtt ggaatggatt
2731 gctgtttatt acgacaaccc tgatgtgtgt oetgcggaaa aactgcgctg tgataccgtg gtttctgtgc
2801 ctgaagggtt tgaaatccca gaaaacagcg aaggggtgat cctcaccgaa ctggcggggtg gcgactatgc
2871 tgcgcgctt gcgcgcgttg agaatcacga ttttgcgacg ccttggtatc agttcttcga gcgcctgttg
2941 caggatacga cttatgcgat agccgctaaa cctgctttg aagtttatat gaacaatggc atggaggacg
3011 gttactggga cattgaaatg tacgtgccag tgcagacgaa gtaactgtt ggggtgtaaa tcaggatgat
3081 cttttcacgc taaaaacagg tacaattcgc ttctttgcta ttccctgacg gagtgcata gtgcgtgcag
3151 acaaatcgct gagtcctttt gaaattcggt ttatcgtgtg gtgcaggtga ttcgcattgc
3221 gctggcggtt ctccttactt ttctgttggg acgcctgtta aacattcccg aaggtacatg gcctctgatc

```

7.10 Nukleotidsequenz des Inserts von pAK105

```

1 gatctggtga cactggccga cccgaccac cccctgagtt atctcaacta cctgcaccag caggatcggc
71 tttacccttt ctattactac gatcacttcc tgatcccag acgggaatat gaccactact gccgctgggc
141 cgcgcagcag ctaacgagct gtcactttgg cgaagaggtc atcgatgtcc gctatgacga caccagagag
211 aggtttctca tcgacagcac atccgcaacc ggagcgtac agcgcctacg cagccgcgat ctggttatcg
281 gcataggcac caccctggg ttgcccagc gggctgggga atgccaacat cctctcgcta tgcattacgc
351 ccggttcatg catgccagg agcagctctc gcaatgcaag cgggtgaccg tcattggatc gggacagagt
421 gccgcgaat gcgtattggc gctctttagc gccttgacct cggaacaggt ccaggccgga gcctccattc
491 agtggatcac ccgggcggcc ggttttcacc ccatggaata ttccaagctg ggacaggagt gcttcacccc
561 cgcctacatg cactacttcc acactgtgc cagagagcgg cgcagggaga tagtggcgga gcaagggttg

```

631	ctctacaaag	gcatacagctt	ctcgaccatt	ggcgagattt	ttgatctgct	ctatgagaga	tccatcggtg
701	gagagacgcc	aggcctggtg	ctctactcac	attgcaccat	cgaaggagtg	gaagaactgg	atggccaggg
771	cgccctgcgc	atgagctgcc	atcacacca	ctggatcag	cactgcacac	tggagaccga	cgccatcgtc
841	gccgcaaccg	gttatgccca	tgcattggcct	gcgtggtttg	aacgggtcaa	aggcacagtc	ctggccattg
911	atgagcaggg	ggattgcata	gtccagccag	atttcacggc	ccgtcgttgc	gacagaggac	aggggcggtg
981	ctttgttcag	aatgccgaaa	tatttcagca	tgggggtggc	tcaccggatc	tgggcatagg	ccccaaccgc
1051	aatgcacata	tcataaatca	gttgcttggc	cgggagcagt	atcgccctgc	ccgaacctcc	accttcacgc
1121	actacgggct	gccaaacctcc	tagccctggg	ttctgcccc	tgtcggctga	cagggggcag	aacactgttt
1191	atgcctcctt	ttgcagtgcc	agatcttatc	gttacacata	ttaacttggg	ttccctataa	aattacaacg
1261	gggac						

7.11 Nukleotidsequenz des Inserts von pAK106

1	gatctcgcct	atcccgaaca	ggagttccgg	ttccgggact	tcgaggccgg	tttgagcacg	gcgacgctgg
71	caaccatct	cgaactctac	cgcggctatg	tcgcccagac	ccgggagtgt	ttgggcgcg	tggcgagca
141	ctcgctgcgg	cgcgaagcgg	ggggcgtcac	ccgtcctcgc	gaggccgttt	cgcgacggat	gagcttcgag
211	ctcaacggcg	tcaagctcca	tgaatggtac	ttcgaacagc	tcgccggacg	ttccggactg	cggtttccgg
281	attcgtcttc	cgtggcgggc	gagggcatgg	acgtcgcgtt	cggcggtttt	gatggctggc	gcgaggacgt
351	cgaagcgctc	gcgacgacct	gcggcatcgg	ctgggtggtg	gccgcctggg	atgcgacgc	gagacagctc
421	gtgaatctct	gggcccagct	ccatcacctg	ctgctgccc	caggccacgg	catcgtattc	gtgctcgacc
491	tctgggaaca	cgcctactgg	gacgatttgc	ggccgaagg	gcggggcgcc	tacagcaagt	tcatacctga
561	aaacaccgat	tgggaggtcg	tcgaggcccg	cttcgcacgg	gctcggaaag	gcgcctgagg	ggggctcgac
631	ctcgcgggcg	gtgcgagacc	ggccgcgata	cctgcacacg	gttcagggat	acgagatctc	gcggaccacg
701	taagcgccgc	gaccgcgggg	cgtcgtccac	tcacgcgct	gaccgagccg	ggcgccggcc	agtgcgcggc
771	cgagtggcga	aaaccagttc	accaaccccc	tttcaggcgc	ggcttcgttt	tcgccgacga	gctggaagcg
841	actgcgggag	ccgcgatcgt	cctcgacgac	gacctcggcg	ccaaagcgaa	cttcgtctcg	cgccgggctg
911	gcgagccgga	tcacgatcgc	gccctgcaac	accgcgtgca	cctgcgcagc	ttcccgctcg	agcctcgaga
981	gttcgctcgc	ttccggaagg	tcgtcgtcgg	gcgacgccag	caattcgtcc	cgccgctgga	ccagctgctg
1051	gaggcgctcg	cgataacgct	ccgcgcggcg	ggcggtcatg	tagccgcgcg	cggggttccg	cgcgggcgcg
1121	gtcgtcgtct	ccgcagtgcc	gcggcatcgc	cgcaccaggg	cgtcgtcac	gacgcggcct	cgcgctccgg
1191	gcgagcgggg	cgtcccaacc	ctcgtgtcgc	tgtctgcatc	gtccaaactc	gtaggcagtg	gagggacagg
1261	tctgttcag	tgaagagtc	ggggatctgc	ggggcgtcga	accagatgac	cgtcatgccg	tccaacagtc
1331	tccagttcga	gaccgcgggtc	gctgtcagtg	atggacgtcg	aaacccgtag	gcccgcacgc	accttgacac
1401	gctcgggcgg	tgtatccgc	ggctgtaggg	catcgactac	aggaaaagag	ccctgcggcg	ggacagcaac
1471	cgatgcgtcg	cgaccgcaca	cttcgaccca	tcccgcacgc	caccgaacct	tcatacggga	gcgcaagca
1541	tgcacgtcgt	cgaacagccc	aggatcgagt	cgtggagcaa	ggcgccggcc	ggccaggtcg	aagagcagtt
1611	gcgcgagcgg	cggcgcgctg	tctatcgccg	gcgcgagcca	ttggagcgca	tccagtcgcg	gtcgggtgac
1681	ctggagcagc	gcatacgcca	gcttgaagcg	cgcgagaggg	gcctgcgcga	actgctgcag	caaatggacg
1751	gcctgtggcg	cgccaccgaa	cacatcgctc	cagcagggcg	cgaaccacgc	actagcgctg	cgcgcacgcg
1821	agacgctgcc	tgaatgaagc	tggagagcct	ggccagccgc	gtgggtgcgt	ggcagcgcca	acatggccgc
1891	cacgggctgc	cctggcaggg	cacacaagac	ccgtaccgcg	tgtggctgtc	cgaggtgatg	ctgcagcaga
1961	cgcaggtggt	caccgtgatc	gactactacg	ccgggttcct	gcaacgtttt	cccgacgtgc	aggcgctggc
2031	cgcggcgccg	ctggacgacg	tgtcgcgtcg	ctggagcggc	ctgggctact	acagccactg	gcgccactcg
2101	caccgctgtg	cgcaggcggt	gggtgtgcag	catggcgcg	agttcccgcg	cagcagcgag	atgctggcca
2171	cgtgcgccgg	tatcgggcgc	tcacccgcgg	cagccatcgc	cgcttctgc	ttcgccgagc	gggtggccat
2241	cctcgatggc	aacgtcaaac	gggtgttgac	ccgagcactc	ggttttggcg	acgacctctc	cgggcccgca
2311	aacgaacgtg	cgtgtggggc	gcaggccagc	accttttgcg	ccgcgcagcg	catcacagg	tacacagag
2381	gcctgatgga	cctggggcgc	ggcatctgca	ccctgcgcgc	gccgcagtcg	gctgcctgcc	ccttgcaacc
2451	cgtctgcgtg	gcgcagtcgc	agggcccgcc	cgaggcctac	ccggtgaaga	cacgcgcctc	caaacgtggg
2521	cagcgcgcca	acgtggtggt	gtggctggtg	cacggcctgc	aggtctggct	cgtgcgtcgg	cccgagcaag
2591	gtgtctggcg	cggtttgtgg	agccttgctg	aatgcgcggc	cgacgattca	ctcgccacac	tcgcgcgcgc
2661	ctggcccgcc	cacggcgcaat	ggctgcgcgc	gggtgcgcgc	gcgttgacac	acttcgactg	gacgctgcac
2731	ccgtcgcgtc	ggcagttgcc	ggcgcggtg	ccggcgcgcg	ggcgcaagcg	ggctgagcag	gcactgccca
2801	caggccgctg	gttcacgcgg	caagaggcgc	tggccgcgag	cctgcctggc	ccggtgcgca	agctcctggc
2871	agggtgagcg	caggcgcgcg	cgcggcggcg	gcctcagtac	ttgtagggcg	cggagctggt	ccgggtggcg
2941	gcgcgctttt	caccggcgtt	gtcgccaccc	gcggccttga	tgacgtgcca	cacgcgcgcc	gagccgtcgc
3011	cgtggtgtc	gcccaccttg	gcatacccg	caaagtagta	cagcggcatg	ccgccccagg	ccattgctg
3081	gccgcgcccc	ttgcgtgcca	cgagcgtgag	cctgcggcgc	gcctgggcgc	cgtcggcagc	catgaaggcg
3151	ggccacaccc	cagcgcagtt	gtcgaagcag	cggctttcgc	ccgccacgtc	tttgtcgaa	aggtacagcg
3221	tcttgccggc	cttgtcgcgc	agcaggccgc	cgggtgtcgt	ggctgtgca	aatacgcccg	ccgaaccgat
3291	ggccgacagc	gcggcgatgg	cgagggtgaa	gagagtgcgt	ttcatgatga	agctctttat	gcgagggtgg
3361	gttgaaatca	agcgtgcgg	tgtgcctgtg	gcgcaccgcg	acctgcactg	tcggcctggc	cttgtcccgg
3431	tgtcatgggg	ctacgggtcc	gggtgcggcc	tgtttcagat	ttgcgcggcg	tgcagccggt	gtgcgttcag
3501	gcgctggggc	cacagcaatg	ccagcccact	gaagctgccc	caccagagcc	aggccgcggc	ccgcctgggg
3571	ttgaaggccg	cgtgatgcca	ggccgatgca	ccagcaagc	ccagcgacaa	caccagcaac	aggtgcagcg
3641	ccggggtgcg	cacgtagcga	cgcgcgtcgc	gtgcacagat	ccaggccacc	cctgcaaaag	ccaggaatag
3711	cgcgcgctag	gcgcggcgct	gtgcggcgct	catgcgcga	ggccattgca	gtgcgcgcca	gtgcggcgcc
3781	agcagcagca	gcagcgcggt	gatgccggcc	cacaggcgcg	tggcctgcca	ggcgcggtcg	gggtgctcgg
3851	ccggcgccgg	gtcgtcgtca	cccaccagca	gcagggtgga	tgcgcgagca	cccacgcgcg	cggtgagcaa
3921	aagccaggcc	gggcccgtgc	cgggtggcga	ccaccaagcc	gcagaaagcg	tgttcgccac	gccccagggt
3991	ggggtggcgt	cgagcggtat	gcgcgctgcg	gcggggtcgc	gctcgcgcgc	tgcgcgcaac	agcccgcccg
4061	cgagcgcgag	tgcatacgac	ccacgcagcg	tgtgtgcagt	ggcggcagcg	gcgtgggcca	cagcgcagcg
4131	ccggcctcgg	actcacagcc	ggcctgcggg	cgtcgcggcc	agcagcgcca	ggccggtgca	ggactgtacg
4201	gcgccagaca	tcgacgcggt	tttctcgcat	gcagggcctg	cgtactgga	gagggcgccc	cggcgggggc
4271	tcattgcgcg	catagatttg	caagcgcgcg	acgcggcccg	gcaaccagcg	ccgttcggtt	ctttcaaacg
4341	ccccgcagca	gggtgcaatc	tctgtattgg	acagcccgcg	gtagagcgcc	agcgcgacgg	cctgccggtg

```

4411 ctcttgccgc agcgtcccca gccacggcg cagcaccgcc aggcggcgcg gggaggcagc ctgccatcgt
4481 ggccgtcatg ctccgtgtgg cgcgatcgcg ggatcgtctc ggcccagccg tcgtccaggg gcagcatcgt
4551 ctccgcctct gcgcggcgcg cagcagcgcg ctcgatggcg cgggttgccg catgccagca gccaggtcat
4621 cggccttgcg atcgcgagaa gcaggcgccc gagcgtgggt tcttggtcgt cggcccgcg cgtggggcgc
4691 cggccggcga gtgggtgcgg tgccggctcg gttggcactc gcggcgcgcg gcgtggcccg ctccctggtc
4761 gcgcagtggt cctcgctcc cgcggcgctg ccgatcgcg ctcgcgcgtc caccgtggcg ccgctgacgc
4831 tgccggccta cgcgcggct cctacgtcc cgcggcgcg tcccgcccgc cgcgtcggtg cggtagcgca
4901 accggtcgcg ctgccgcgca ccgtcccgtc tcccgctccg cgcggcgaa cggccgctcc cgcgcaggcc
4971 gaggtccgc cggtcgggac cttcgcgctg caggccgtca gcgagcagga cggccagccc gtcgccatcg
5041 tgaacggcca gctggtgcgg gtgggcgacg tcgtggaggg cgcgcgcgtc cttcgcatca cgcggagac
5111 cgtcgagatc gagaaggacg gccgcgcgat cgtctcgga tctgaccgc gcgtcccg cgttggtcgc
5181 cgaggatcgc ccgcaggcg tcgagcgaa tcgcctcgac ggtgcgaccg ttcgcggtga cggtagggc
5251 ccggagaagc gagttgagca cggcctctc ggtcgtctc agcacggcct cgaacaagg ggcgagctc
5321 tcgcccggca ggaacgatc cgggcgcggc aacgtgtccc cgaagcgta gggggcctc gccgagctc
5391 agaagcgat cgcgtagtgc cgccttcgt cgtctgaaga cgaagcggtc ccgagcggc gatcacggc
5461 gcgcggcgcc aggcggcgca gatcgcgcg gtcgaagcgg cgcgtccgtg gcgaccacga tcaggcacga
5531 gccgtcgccc gcaccggcac gcgcgtccga cgcgcgcgc ccggcgcgga gctcgcgccc accggcacgc
5601 cggccatgac cagatcgccg ccgtagtctg actggaccag cacccccacc gtgtacgagc tgccaccgc
5671 cgtcaggatc cgcgacgag cgcgcgcgat tgcgagatc ccgaacgca cgttcacgc tggtagggc
5741 aactgcctt ccgcgaccg accgctgcgc gcggcgcgga tggcgctcac gacctgcgc ggtgtgacgt
5811 gctggccgcg gatgtcgtg aggcggagt cgttggtctc gccaccagc gcgttcacc atcgtgcacg
5881 gcccgctgct gctcgacac gtggcgcgcc gcgccagct gaacggcgag ccgctcgacc tcgcgcgcg
5951 ggttctggcg gtgctggag tgcgtcgtc ggcctcgag aaaatcgt ccaagcagc gatccacg
6021 gcggtcgcca actggggcga ggaactgacg cccaacgca tcgaggtcta tgtctcgcg ctgcgcgcca
6091 agctcgagcc ggcgggctg aagatccga cggtgcgcg cttcggtac atgctggaag agttcaagg
6161 gaaaaaagct ggtcggtagc ctgcgctca ggtcgtcaa ggcgtcgtg ccgcccgtg cggggctgct
6231 ggttctggcg gcggtcgcg cctatttct cctccctcg acgctacga aagcctacga cgtcggttg
6301 gtggacgtcg gcacgcctt cagcgaacgc atccgcagc cgggcgacgc agtcagcctt gacttgccc
6371 gggtagccga gcaggtgctg cgcacggaca agttcgaca gatcaacgga acgaggaacc ccatccatgc
6441 gagagtcagc agggcgacct cgcgcggacc ttgcaactc cgcgcgacgt tgactccgc actccggcg
6511 ccgtgaggtg ctgaatcac gacctcacg acactggca cgagaatcac cgccttagc atccaagg
6581 tcatgatcga tcagcgcgca tcgcgtaatg gccgagacgt gccttggtg ccgatgtccg acttgcctc
6651 catctggacg ttgaccaagc ggtgtgcgccc gaccacgag tcccgaagag cgtcgagacg aatgcgctc
6721 agtctcacga gcacacacg gtggttcagg tagtgttcc tcagatagta cgtggcagg tgcgtctcga
6791 cgttcggctc acggtcgcg aaggccatc tcacgcagc caggttcggt cgagttcgt tctgggacgc
6861 gacgcacacg aacatcttcc cgtgcacctt tagagcgggc tggcccatg cggttgtcac ctccacgtcc
6931 ggaaggcgcg gcccgatagc ctgcactgcc gcgaacgtgt gcccgctcg tttaccacg tccccttcgc
7001 gcgctgatga agtgggtctt ctggcattc gtcgtccctt ggagtctac cgcgatcga gggccagct
7071 ccgcccagct cgtggcctc gaagattac cgaagattac toctagaaaa gtccgacgt gtccggttat
7141 ctaatcgaat tgccgtcggc ccgaaacagc cgagaagatg ctgctccctg gtctgtggc gcttcgattg
7211 actgtgtgga atcggaatcc ccatctttt gcacaaacgc gttggagctg gcgacctaa cgttcgcgag
7281 ttggaaccgg atcgcgccct ggctgcgtca gctagaacgc ctgcctcagc cggttcgcgc gggggcgctt
7351 ccagcgaat ggatttgat tacgcgcaaa agtcagtgcc cggcgcaacg cgccttagc tccgcttag
7421 ccgcaagccg cagctcgtcg tgtgtgaaca ccgcaaaaat gaacggctgt gattcgagaa agtgccccag
7491 atcgcgcaac gtcagatgaa gagccgacc ccggtcctca tcgacgaaca tttggctgtt tcccgggtt
7561 cgaaaggatg taatcagctg cttcgccctc aggatcaaac ttctcggtg aacaggctc cgtcgcactg
7631 ccgcaagctg ccggcggtcc ggcgacaacg gttccgacg catgccatg tcccgggtc ccccgagaa
7701 gatagttggt accaaccttc gcctctagc ctgcagcat ccgcgtcaag tgacggcca tctcgccgag
7771 agtgacgcgg agctcactcg aatccggacc gtacttgtg gacacgaaat ccgcgcctt gtagttcagc
7841 agaatgagat cgtggatggt gttctgcat cccgggcgca gcacgatggt gcctcgacg cctcgccga
7911 cgttgccctg acgcggcgcc tctcgcgcc atttgaacgc cagtggaacg cagtggaac acgcccagc gtttcatcgt
7981 cagcgtctgg tccgcccgca gggtgaaatt cggcagcgcg tggcgcccg gacgcttgg catcaggcgc
8051 ctgcggttgg tcgaggagg ggggcgagcc aggtgtcgt gcgaccggt cccggccgtg ctggcgcaa
8121 tcgcccagcg tcgagacgt gcaggtcca gttggctgac ggtcgtccg gcctgaccg cggctgacct
8191 aggcgtcttc aggcgtcgcc gcgatcgatc cgcacgcggt tggccggcga cctccgatc

```

7.12 Nukleotidsequenz des Inserts von pAK107

```

1 gatctcgccc tactgcttgc gcagcttcat gatgggcgcc atgttgatct cgttgaagggt ggtcagcatg
71 gcgggtggtg tcttggcctc cagcagacgt tcggcgatgc gcttgcgag acgggtcatg ggcacgcgt
141 tctcggtgcg accggccagc ggggctatgg gcgcaacagg tcgggctgcc acggcgcgcg cgggggctgc
211 cggcttgccc aggttcttga tgaaggcatc cactcttcc ttggtgacgc gaccacctt gccggtgccc
281 gtcagcttgg ccacgtcgat gtcgtcgtcg gccacaggc cgcgcacga ggggctcaa ccgtcggcag
351 cgtcatcgcg tgccacttcc accggtcttc ccttggtctc ttcaccggcc acagggcgcc ccttgaggat
421 ggcgatcagc tggcgggaga gcacggtcgc gccttccagt tgcaggatgt cgcacgacac gccggcttcc
491 ggcgcgggga cttccagcac gactttatcg gtttcgatgt caaccagtat ttcgtcagc gcaaccagat
561 caccgggtt cttgtccag gtggcgatgg tggcgctccg cactgattcc ggcaggtcc gtaactgat
631 ctcgatagtc atgtaatcag ttcttgtta cttcttggcc agcaggcttg tccagagac gcgtcttcca ccagggtt
701 ggcttcacgg agccccctcc cttcacaaac tcgtttatc cagggtcagc gaggccgagg cccgacgacc ggcgtaacgc
771 ctgctgcttg gcacggacag acatgtaacc gacggccggt ggggtgctga ggggtgctga ctaggtcgtg
841 agacgggcat acaccagac aaatcgggtc cgtgggcata gtcggccagg gtccggccgc atggctcga cttcctcttc
911 gctcttctcg acaccagac cgtgggcata gtcggccagg atggctcga cgtccttgc acgggcatcg
981 cgggaagggt tagagctgt cgtccgcac cagagccaca tctgctgct ccgcttgcg
1051 agcaggctgt agtagacctt gccggagcag aagaccacc gcttgacgac tttgggatc

```

7.13 Nukleotidsequenz des Inserts von pAK108

```

1 gatctggggt cgtacaacgg cacatttgc tactttgact atccaagga tccaggccat gagttctctg
71 ccgaaattat tgaaattgag gaaaatgacc aggggttaaa agcaggcatg gtggttacct gcaatccgta
141 ttttaactgc ggccgctgct attcctgtga acatggcatg gtgaatgcct gtatggataa ccagaccatg
211 ggctgtcaga gggacggcgc gttctgcgaa tacataacca tgccggctga acggatctat gaaggaaagg
281 ggatcgatcc aaagggtctg gctgcgatcg aaccattctg catcagctat cacggagtca gccatgcaga
351 tgtcaaaaag ggagataagg tcttggtggt gggttccggg accatcgccg ttcttgccgc aatagccgct
421 aaagcaaaaag aggcagaggt ttatatggcg gacatctctc aggggaaact ggatatggcc gcaggattcg
491 gtattgacgg aaccatttta aacacttctg aggaggcatt ccggaaaagt gtggatcaga tcaccgatgg
561 aaacggcttt gatgtagcga ttgaagcagt cggcctcccc tcaacgttcc agaactgcat tgatgccgca
631 tgtttcggag gccgggtgat c

```

7.14 Nukleotidsequenz des Inserts von pAK109

```

1 gatcttgagc attttgcat gggcttttca ctttctgaag gcattattga gtccccgcag gatattctacg
71 gcatggaagt ggtgccttct tgtaacggat tagaagttca ggttgagctg tccagccgtc gttttatggg
141 attgaaagag cgccgtcgag ctttggccgg tcgtaccggt tgtggcgttt gcggcgtgga acagctcaat
211 gacattggca agccggttca gcctttggcg ttaccacga cgtttaacct gcgggacctc gatcgcgct
281 taaagcattt gcatgacttc cagcccgtgg ggcaactgac gggctgtacg cacgcagcgg cctgggtcca
351 gccgtcgggg aatctggcgg gagggcatga agatgtgggg cgtcacgtgg cgctggataa actgctcggg
421 cggcggtcaa ttgaaggcga aacatggcgg cagggagcgg ttttagtctc cgtcgccgc agctatgaga
491 tggtcgaaaa gtccggcgatg tgcggcgctg agattctgct tgctgtctct gccgcgca cactggcgct
561 agaagtagcc gaacgctgta acctgacgct ggtgggtttt tgtaaacccg gcagggcgac gatttatacg
631 catccggaac gtctgggtgc ggagtaacgc caccaggctg ccacaatgct gcctgagaat gccagctcca
701 tcattacagc aacgggcgag ccgacgatgg cattgttcag tagccagcac acaatgtgta
771 tccacgtaat tttccacct gtgtctgaaa cgacgcatag gtcacagca ggcttctctc gagcggcagc
841 agggccca ttccttgcca gagataagca ctacacagca gtgaccatc cataaatccc cacatggccc
911 agcggcggtg cgtcacgatg gctatcgcat aacgacaggg ggcgatgagc attaatctg cggcgggggg
981 ttgatgcaaa agataaaaat gaatatatcc agcacaaaagc gagctggtc acagcactaa cgtcatcgcc
1051 cgacgcccga aatgaaaggc tgaaatatcc agcacaaaagc tgatgcaggc cagcagctga gagagaaaaa
1121 atgcgttcat catgcgcgct atcttgtgaa gagtggcggg acaataatct atgcaaaaag cgaatgcgtt
1191 aacctttgtt aagacgctgg cgaatgcgag acaggctaac gggcgtaatg ccaatgtagt gggcgaggtc
1261 ccgctgagtg agctgcaatt ccaactggg aaagtgtgtc tgaacatact ggtagcgttg ttctggcgta
1331 ttaagcagca gcatttgttc ttttttctct ttgtagatc

```

7.15 Nukleotidsequenz des Inserts von pAK110

```

1 gatcactctc tacaagcacc gctatcccat atcatttttc cgtttttaat tacttgaatc tgataatttt
71 tttgaattac attcttgccc ttaccttcaa gcttccatga aaagcgtgga tttacatcaa ttcctattgg
141 gttgggttcg tattctattg taaaatcctt aatcattctt cttctccttc catttttctt tcttattcaa
211 attctaattc taatccatct ctatgcattg cgaaatcctg tgtattatg taaaatcagt ttattacatg
281 tggcttttat caatcagaga ggaaattcat atgattttag acataaaaac gttctgcgaa aaattttaca
351 attcaacctt tatcccaata gcatgccatc atgtttccac cggtaaatct ctttttttcc ctaaaacgct
421 agatacaaca gccgcttttg gaaacactct agatgggttt atgaatttta ccaagaatcc tgattacttc
491 attgcagatt ccttcagcta ttatggctat gctaatgctg ttaagaccca ctactgcatc attatcggtc
561 ccatattcag cacaccgcct tctgaatcca ccttacatg ttttatgcat gaatgggcta ttcacggtaa
631 tgatcgggag ctgatatcta acttttttag cactactccc cagctctctt tttatcagtt tttacaaacg
701 ctatcttata tgcattttct tctgaatgat caggaagtta atctcactgc acagttcatt caggaagata
771 ccgatattat ttctaaaata tctgccatc actcgaacca actgaatgac tggaaagaaa atcaacgta
841 ccacaacacc tatcattttg aaagagagct tatgcggtat attcagggaag gtgatgttgc taagctgcaa
911 aagttgattt cttcccctgt ttacctgtct gaaggtcaat tagccgacaa tgcccttcgc cagtcaaaaa
981 acattttgat atccactgta tcaactggcca tgagaagtgc cattgccggt ggaatgaata ccgaggaggc
1051 ctattcgctc tccgatgttt atattccgta aggtgaaaag gcacagcaat tatcccaggt tgcggtatct
1121 aatgaatcga tgctgataga ttatgcaaaa cgagttgcca aggc aaagat tccccagggc atgtccaaag
1191 aaatatttga ctgcatacaa tttattacga gccatattaa tgagcccatt catgtcgatg atgtcggtgc
1261 aaacattggc agaagccgta cttatctgac caaaagggtt aaagatgaat taggatttga cattagtaat
1331 ttcattatga gatgcagatt agaggaggcc aaaagtttat tgaccttttc agacaaaagc ctgagcga
1401 tcagcaatta tctttgcttc tccactcagg catatttttca aaatgtatc aagaaaaaat atggcggttac
1471 tccgaaccaa taccgtaagg acacaaagta tattcagtg tggtagctct acacaaactg catactgaaa
1541 tggcatctgt atgtcgatca ggtgatgacc ttcttgatga tcttgctctc cgccctgcta accgcaggcc
1611 tgttaggcac attgttcgtg gtgattaaaa aaaaatgctg tagcgcctga gcagtaaccg taggcgggt
1681 aaaactaccc ggcattttct cctgatggcg cttcgctaag tatacctgtg aaaaattagc tcccctgcat
1751 cgtgcgaatt cttgccgcat cttcccctgg tgtcacaccg aagtaccgtt tgaactcccg actaaactgc
1821 gaagcgcttt catagccaac ccgcattgcc gctacgtggg ccttcatgcc gtcgtggata atcatcatcc
1891 gcgccttatg caggcgataa cctctcaggt actgtagcgg cgaggtgctg gtcaccgatt tgaattatg
1961 atgaaacgcc gacacgctca tattggcctc tgctgccagt tgttcgacgt tgaggtcttc ggtgtactta
2031 ttttcgattc gcttcagcac gcgactgatc aaactgaaat gcgtctggcg actgaccagc gcgagcaatg
2101 cgccaccccg tggaccagtc agcacatggt agaggatctc acggatgatc tgtttgcccc gaattcgccg
2171 gtccagcggg cgctccagta catccagtaa acgctcagcc gcgcaaaaga tctcgtcaga aagcgtggca
2241 gagttaatcc cgctcgccgc cattgagggc tggaaacagtt catcttcgcc aatatccatc agtagctcct
2311 gcaattgcag gatatcgaca ttcaggcgca taccggccag tggaaatttc ggtgtcgcat acgtttcaca
2381 ttcaaagggt aaaggtagcg tgagcagcag atattcgttg gcgtcataac gaaatatgcg ctcattgata

```

```

2451 taaccaatttt tatgaccgca gaagagcaat atgatgccgg gctgatacat caccggcgtg cgtagccccg
2521 gttccgtgcc atacagtaaa cgcacatccg gcagcaactc actgagttta ttttcattgt ttttcagctg
2591 ctttaatttta tctgtcagca gaaggcagat cttatcacgg tccatagAAC accatttctg catcggattg
2661 caacaccaac agtgtgcgca tttttatcct ttttctccag cagcctgtag aaataggcaa gacattggca
2731 gaaatgagca ttgagaggaa cgtgtctgac gaccacaatg ttcaccatca ggcagacact cgcctgcctc
2801 cttttttacc cacataaggg aacgagcaat gaacaacttt aatctccata ccccgaccgg cattctgttt
2871 ggtaaaaggcg ctatcgctga actgcggcga caaatccctc aggatgctcg cgtgctgatt acctacggcg
2941 gtggcagcgt gaaaaaaacc gggttcttgg cacagggttca ggatgcgctg aaaggcctgg acgtgctgga
3011 gtttgcgcggt attgaaccga acccggttta tgaaacgcta atgaacgcag taaaaatcgt gcgtgatgag
3081 aaagtgcagt tctgtctggc ggtcggcggt gggttctgtt tcgacggcac caaattcatt gccgctgcgg
3151 cacaagacgc tgacggcatc gatccatggc ctgattctgga aaccacggcg aatgacgtaa aaagcccat
3221 cccgatgggt tccgtattaa cctgccagc aaccggctct gaattcact cccggcgagt aatttcgcgt
3291 aaaaccaccg gcgataagct ggcttttatg acccggtttg tgcagccggt ttttgccgtg ctggatccgg
3361 tttacaccta caccctcccg ccgctcagg tggcaaacgg tgtggtggac gcgttcgttc atactgttga
3431 aagctatttg acttatccgg ttgacggtaa aattcaggat cgttttgctg aaggcattct accgctgtt
3501 atcgaagaag gtccgaaagc attacaggag ccggaaaact acaacgtgctg tgcgaacgtc atgtggcgcg
3571 caaccacggc actgaacggt ttgattggcg cgggcgtacc gcaggattgg gccaccata tgctgggcca
3641 cgaactgacc gcgatgcatg gtctcgatca tgcccaaacg ttggccatcg ttctgcttgc gttgtggaat
3711 caaaaacgcg ataccaaacg tgccaatttg ctgtaattga cagaacgtta ctggaactat cgtgacgaa
3781 gtgatgacca gcgtatcgac gccgccattg ccgctaccgg cgttttcttc gaacaaatgg gcgtaccac
3851 tctgtctgtc gactatggcc tggacggtag ctccatcccg gcgctgctgg agaaactgga agcacacggt
3921 ggtacgaaac tgggcgaaca tcaggacatt acgctcgacg tcagcccgcg tatttacgaa gccggcgct
3991 aacgtttttt cacctcagac tttcgttttt gccagactta gccacactt agttacactt ggtcacggcg
4061 agcgcgctcc ggtgacaata atccaggggg gaattatgaa ctaatccaac cgttatcaaa ctacaggatg
4131 gtaacgtgat gccacaactg ggcttgggg tctggaagcg aagtaatgag gaagtaatct ccgcaatcca
4201 taaagcgctg gaagtgggtt atcgctctat cgataccgct gccgcgtaca aaaatgaaga aggtgtcgg
4271 aaagctttac gcgattcggg gcttcccgat gaagccttat tcatcaccac taaactgtgc taactcagatc
4341 agaaacgtcc ccgcgaagcg ttgctcgaaa gcatggagaa actccagctc gattacctcg atctttatct
4411 catgcactgg cctgtaccgg cgatcgacca ttatgttgaa gcatgggaaa acatgatcga cctgcaaaaa
4481 caggggctca tcaaaagcat cggcggtgtgc aacttcacga tc

```

7.16 Nukleotidsequenz des Inserts von pAK111

```

1 gatctgggag cagatatccc aaaaattgcg ctgatgccgc aaaaataaac ggatgtcctg acgctgctta
71 gtgcaacgct tcaaatgcag gagcactacg ctgaccgccc aattatcacc atgtcgatgg ccaaaacagg
141 cgtaatttct cgactggcgg gcgaagtctt tggctctgcg gcaacctttg gcgcagtga aaaagcctcg
211 gcacccggac aaatttcggt ttccgacctg cgtaccgttc tgacaatatt gcatcaagct taataacata
281 atatttcagc actgttttaa ataateccct gctgttatt cgtgtcatga cgaatatcgg gcagatggct
351 taatactttc gcaatacgca tttattttta tgaataaaa cgataggcga ccatcgctt gcattcgga
421 gtctatatga agcttaacag acctgaacgt attgacggtc ggggtgcccg attatcgga gccgacgcaa
491 tttattatat ccctgatgaa gccacactct gcgtattagg tgccgggtggc ggtattttgg aagccaccac
561 gttaattagc gcactagctg ataaatataa aaataatcaa tcaccacgca atttatcact tattagccca
631 acaggactgg gggaccggcg cgaccgggga attagccgta tggcacagga ggttttagta aattggcgcg
701 tgtgcggaac ctgggggaca tcaccacgga tcacacgctg tgtgtgccgt tgattgtctc aggtgaggct
771 atcggcctgc tctcatttca gaatctcagc gatgataccg cgccttcccg cgcgtatctg gaactgatgg
841 cagaagcgct cgggtctggca ttagccaatc agcgtctgcg cgatgcgtta ctggaaaaag cactctacga
911 cccgctgacc ggtctgcgca atcgccatca actttgcgca actttgcgca cccagatggg ccaggcgata
981 cataatcaga caccatcag ttgctgatg attgatattg atcacttcaa agatgtcaac gaccggttcg
1051 gccacgagcg gggcgatggc gttatcaagg gcgttgccgc gattattcag cgcgccatag gcgacagtgg
1121 gctggcgctt cgctacggtg gtgaagagtt ttggctctga ctcagcgcca tgggtgaaga agaggctaac
1191 cgcattggcg cgacatctca caacggtgtg catgcgtcta cgcgtcgtct tggcagctcg gacatcagcc
1261 atatcgacgt gtctattggc gttgccagct acccacagca cgcccaaagc gacaacctgc tgcgcgccgc
1331 tgacgtggcc ctgtatcgcg ccaaagagtt gggccggtca cgaatttgta gactataaac caatacgaaa ttgcagttg
1401 agctaaacgc gggcatatcg cgatatgtta ttgctgcaa gagcataaac gaggaactaa cgatgaagca cttgattttt
1471 tcatagcatg gttagacgtg gtagaccggy agaacaacaa gaggactata agtgccggcg agtgtgtctg tgaatccctc
1541 tacatgatag atgcctttac cgacaccact tttggtggca atgcccggcg atgatcaaat ggtttcgcca
1611 aatgattttt atcaaaatca ttaagttaag gtagatacac atcttgtcat tttacacgca tctctttacc aattctgccc
1681 aaaatcaata atcagacaac aaaatgtgcy aactcgatat tgcacgctt tgccacgctt tacttgactg taaaactctc
1751 cgaattacac ttaaaacgac tcaacagctt aacgttggcg accaaagcga gaacaaaaca taacatcaaa cgaatcgacc
1821 actcttaccg aacttggcgg taacctgcca accaaagcga tgtataccgt tggcatgcta gctttatctg
1891 gattgttagg taatcgctac ctccacaaag agcgactcgt tgatccctgt gatatccgtg agcaaaaacg gcttatggta
1961 ttccgggaat acgatgccca ttgtacttgt cagtgcgact tctgttactc tttatgagaa agcgttcccg ctttcagagc
2031 cagtcgactt gaaagctcat gaccaatttc tagccgacct tgcgagcatt ctaccgagta acaccacacc
2101 aatgttcaaa agtgatgctg gctttaaagt gccatggtat aaatccgttg agaagctggg ttggtactgg
2171 gctcattgtc taagaggaaa agtacaatat gcagacgtag gagcggaaaa ctggaaacct atcgaact
2241 ttaagtctag gtcacatagt cactcaaaga ctattaggta taagaggctg actaaaagca atccaactctc
2311 tacatgatat ctattgtata aatctcgctc taaaggccga aaaaatcagc gctcgacacg gactcattgt
2381 atgccaaatt cacctaaaat ctactcagcg tccgcaaaag agccatggat tctagcaact aacttacctg
2451 caccacccgt ttgaaattcg aacacccaaa caacttgta atacttattc gaagcgaatg cagattgaag aaaccttccg
2521 agacttgaaa agtcctgcct acggactgga octacgcgat gaagcgaacg gcagctcaga gcgtttgat
2591 atcatgctgc taatcgccct gatgcttcaa ctaacatggt ggcttgccgg cgttcatgct cagaaacaag
2661 gttgggacaa gcacttccag gctaacacag tcagaaatcg aaacgtactc tcaacagttc gcttaggcat
2731 ggaagttttg cggcattctg gctacacaa aacaagggaa gacttactcg tggctgcaac cctactagct
2801 caaaatttat ttacgctttg gggaaattat gaggggactc cgtcgcgagc tggtctctc
2871 tacagaatgg ttgcccgatg agatattatt aaaaatgtct cagcaacata accagtcaga aaccgccttc

```

```

3011 tttgtcacca cccatagcgg ctttgagcta cgttggttta ccactcaggg tgaatcaat ttatgcgggc
3081 atgccacact ggctgctgca cagctcatct ttgaacatct tgactaccgg gacaccacaa ttcacttcga
3151 aaccgattt gttggccggc tgaccgtgac ccgcagtgga gaatggctga cgttgattt cccgcctgg
3221 aataccgaat cgggtatacc gccgccttta ctattggaaa cgttggttat caggaatac aaagaagtcc
3291 gcgtggcacg tgattacatg gtcgttatgg agaatacaga gcagattgca gcagtacgcc cggatattca
3361 cgccatgctt ccgctgggaa aaatggtctg cattacggcg ccaggcgatg gggaatacga ttttgtcagt
3431 cgattcttct gccagggcga ggccgttgcg gaagacctg tcacaggttc ggcacatagc atgctcattc
3501 catactgggc tgagaaactg aacaaaacac agatgctggc acgccaggtg tccgagcgcg gcggggattt
3571 acgctgcaag ttagtgggcg atc

```

7.17 Nukleotidsequenz des Inserts von pAK112

```

1 gatcatgctc atcgggtgaac cctattggcg tcagctcccc gcaacggacg agatagccaa ggcctgtggc
71 gtcagctcga cgaccgattt tctgacgcta ccagggcttg tgagtgcctt cgatgaactc ggctacgacg
141 tgggtgaaat ggtacttgca gaccaggaag gctgggaccc gtatgaagcc gcgaaatggc tgaccatgcg
211 ccgctggctg gggccaatc ctgacgacga cttcgccgcc gaagtcaggg ccaggttaaa catcgcgca
281 aaacgccacg taacttacgc gcgggaatac tttggctggg gcgtgttcgc gctcatcgcc aggttaacaac
351 aggttccccg tatttctgac cggagatacc gggggcttcg cctttgcttt gatctgatgc atcacctgca
421 caatacatat tctgtatatt tatcaatcag gacatcacca taaggagcat catatgtcac aacatgaaca
491 gtctctgtag gcttgccgaa tgccgatgct cgcacacagtg gcacacagtg ccagttaaca agattgcgcg
561 tactgcagcg acagcaacgg caatcttaaa ccttggaag aggcggatc aggcctggcc agcttccctg
631 attcctggca aaaagtcggc ccggaagaag cacagaagcg agcaaaacgt tacctgacgg caatgccacg
701 ctgggctcat aaagcagatg aatgaaaaac aaagcctgag tgatttaggc tggctaataa ccctatcgtc
771 tgaccccaaa ggcaggtgca gttctcgcat atgttatctc gtaccccgga gtaccgccga ggttccaga
841 acattttcct gcgtcgcggg ttctcaactt atcttgctga tcagccgcgt cggggcagcg ccggacgcac
911 tactgtagaa ggtactgtta cgcctaagcc ggatgaacag atgtggttca atcagttccg cgttggcggtg
981 tggccagagt attttaaggg cgttcagttc tctcacgaca aagaagcact gaatcagat ttccgctaga
1051 aatccccgatt taccgggccc tttgatatac ataccggaaa tgatgcgatg tccgctcgcg tggataaatc
1121 cggcccgcca atcctcttca cccactctca ggggtggcga ccaggctggg atacggcgat gaaaaatgac
1191 aaggtcaaag ccacgtctgc cttcgagcct ggcagcagct ttgtcttccc ggaaaaagaa ctcccagccc
1261 ctatgccaa ggcgttcgac acgctgaagg gtgaaccagt gccgatggag cagtttatgg ctctgaccaa
1331 aatccccgatt ctgattattt acggcgataa caccgggaaa aaacctgtcg catgaccgcg gcaggacgac
1401 gggcgcgtag gccttgcaat ggctcgcgaa tggcgtagtg tgggtgaacaa gcatggcggg gatgtcacgg
1471 tgacgcacat gcctgaagtg ggaatcaaag ggaataccca cttcccgttc tctgatctca ataattgca
1541 gattgtgtag ctgggtgagtc agtttttgaa agagaaaaat ctgcagtagc cgttttagaa aatcacctaa
1611 atcattttaa agagcgccca acacatagtg ggcgtcatc gccttggtga atctattcaa gtaccggcaa
1681 aatataacct ttacgcgcac ttgcccagtc aagaacagcg aggcccaacg caatgaagga cagaattgcg
1751 cccgcccagt tcggagaagc cagtcacaaa cccgcagcaa tggttacccc accggcccat gcccccagcg
1821 cttttcccag attaaacatg ccgatattga ccgagggcgc cattgtcggg gctcccgcag ggttggcgcg
1891 cttcataacc agtttgtaga tcggtgtaga cgtcgcgaa cgaaggcgaa ccacagagaa gactgagatg
1961 ccggcaaccc actggctttc aacaccggcc cagaagacca gcagcaccaa cccctgagcc gcgagggtaa
2031 cgaacagcgt gccaaacaga gagcggctcag cgaagcgtcc accaatccag ttaccgacag caagtcccag
2101 accaaacagc accattaacc ctgccacgcc gctgaggag aaaccggcct cctgcaccat cattggcgca
2171 atatagtgaa tcgaggtgaa aaaggcgccc tcgtgatccc catgaccagc agcactgcgg
2241 gtcaacaaag gctctcagtt cgttgcgtaa agcaatcgct ttgcctttcg caatatgcgg aaccagcacg
2311 gctatgcttg ccacgtctag caccgccgata ccagcaatga tcttgaaaaa aatgttaaga gaagtactat
2381 attaggtatg ttaattagta ctgttttata tatattaata agtgttgtag ctatgggagc tatgagctaa
2451 agtggaattag cttcaagtag tgctcctatt tctgataata tagttaaagt tttaaattta aagagcttaa
2521 atttctttaa tatagctata gctattagta ttttaggaac agctatggga tggctattat caactgctag
2591 agtaggatat gctgctggag aggatggaat tttccctagt gtatttgcta aggtacatcc taagtataat
2661 acgccacatg tagccttaat aataggtagt atatttata atattatatt cttaatgaac tttactaagg
2731 gtttagcagg gccatatagt tttatagtag tattagctac ttttaagttc ctaccaatat atgcaatttc
2801 aactattgca gaaataatac ttatggttaa agaggataaa aaacctacat ttaaaaaaca tttaggttta
2871 ataataagat gtttaataag ttttgctttt gcaatttggg caatatatgc ttcaggagct gaaatagtaa
2941 tgtatggatt tatttttaata ttactaggag tttccgattta tggatataatg agcataaaaa aacacttccg
3011 taataattgaa ttttgatatt taacaaattt gttatgtaat gttgattaat ttattatata ataaatataa
3081 gttttgaaat tgggggtata ttatttatgg tacagaaatt tgctggtggg gtgtattggg atggcaaaaag
3151 tagaagcttt agaagaggaa ttagttgaat taaaacttaa aaaaagaaat ttcattttag ccaataaaga
3221 tacaaaagag attgataatc ttataaaaaa tttagaagaa gaaattatga gaattaaatc aaataattga
3291 tattcagtag ctatgaaaga gaaattactc tttcatagct tttttgtttt aataaaaaag aaagtgttct
3361 caaataaact tttaaagtga gagtagtcaa atatgccatc ataaagctta agaagaatgg atc

```

7.18 Nukleotidsequenz des Inserts von pAK113

```

1 gatctggccc cgctggcgca tatgtccctg acgttgctgg ggaaggggaa ggcgcgctgg cagggggaat
71 ggctcccgcc gaccgaagcg atgaaaaagg ccgggctgga gccgattacg ctggaggcga aagaggggct
141 ggcgttgctg aacgggactc aggcgtccac cgtcttttgc ctgcgcgggt taatcgaagc ccaggagctg
211 tttgcgtctg cgacgggtgt cggggcgctc ccactgaag ctgtgctgct ctctcgctgt cgttttgacg
281 cccgcattca cgctgcgcga ggacaacgtg ggcagattga cgccgcaacg ctgtaccgcc atgtgttgac
351 cgactccagc gcgcttttgc aatctcacca caactgtgaa aaagtgcagg atccgtattc tctgcgctgt
421 cagccacagg tgatggcgcg gtgtctgacg caaatacgcc aggtgatgga cgtgctgttg gtcgaagcca
491 acgcgctgtc ggataaccgg ctgggtgttg ccgaagaggg cगतgtgatt tccggcgcca acttccatgc

```



```

561 ggaaccggta gcgatggcgg cggataatct ggcgctggcg attgcggaaa tggggggcgt atcagagcgg
631 cgtatcgcg tgatgatgga taacacatct tcgcagttac cgcctttcct ggtcaaaaat ggccggcgtta
701 actccggctt tatgattgct caggtaaccg tcgcgcgcgc ggcgagcgaa aataaagcgc tggcacaccc
771 gcacagcgta gacagtctgc caacgtccgc caaccaggaa gatcatgtgt ctatggcacc ggccggcgggt
841 cgcagattgt gggagatggc ggcgaatacg cgcggcgctga ttgctgtaga gtggctggcg gcctgtcagg
911 ggatcgattt gcgcgaagga ctgacctcaa gcccgcgtct ggagcaggcg cgtcaggctt tgcgtgaaca
981 ggtttcgcac tatacccgag accgcttttt tgcccagatg atcgagtgtg cgaccgaact gttagcgtag
1051 ggaaccttgc tgaagctggt gcccgagttt atgtaacaca atgccggatg gcgctatcgc cgtccggcag
1121 tttttttcaa tacaccagct taatttgctg tgcttttcga taatcaacaa attcatcgtc aggacgggaa
1191 tcgctgatga tgctatcaaa gcgtttcagg tcacccatcc gcgcgggacg caccttgcca aacttgcgtg
1261 gatccaccac caatacgtga tattgcgcca ttgacatcgc ccagtgcttc accgtaattt cttccaggtt
1331 aaaacaggtc gcgcccttgt caatgtgtat gccggccgca gaataaaacg cgatatccgg acacagatta
1401 ttcagcgctt cttgaaaatc gagcgggttg aaaatagcgt tgctggcatg gaattcaccg ccacacaaga
1471 tgacgcgaca cagtggcttt tcctgcagag ccagaaggtt attcagcgag tagcagatgg cggtgaaaagg
1541 ggttcgacata tcgatagctt caatgatcca ttgagctgtg gtgcccagtc caaaaaagat cgtctagtgc
1611 gcctgaacga ggctcgcagc ctgctgcgca gcacgacgtt tctcatccac cagtcgggac ttttggtcgc
1681 tgattaggtg gtggctggcg ctacggggtt ccagaacaat atagcctccc agcaacacaa ctggggcatt
1751 gttattattc aggtcgcgac ggatggctcat ctcagatacg cccagcagcg tcgcggcttc ttttaagggtg
1821 aatttatcac tgcgtttcag cgcctgcagc aattgaccaaa tacgctcgtt cgcgtcgtgt tccatagtct
1891 ccttggtgag tagagtaagc gcttcataat gcgtgcttaa tactactctt tttaccgtgg attagtacg
1961 caccagcct ttacggatc

```

7.19 Nukleotidsequenz des Inserts von pAK114

```

1 gatctgggag cagatatccc aaaaattgctg ctgatgccgc aaaataaaac ggatgtcctg acgctgctta
71 gtgcaacgct tcaaatgcag gagcactacg ctgaccgccc aattatcacc atgtcgatgg ccaaaacagg
141 cgtaatctct cgactggcgg gcgaagtctt tggctctgcy gcgcagtga aagacgtcg
211 gcacccggac aaatttcggt ttccgacctg cgtaccgttc tgacaatatt gcatcaagct taataacata
281 atatttcagc actgttttaa ataatccctt gcctgttatt cgtgtcatga cgaatatcgg gcagatggct
351 taatactttc gcaatacgca tttattttta tcgaataaaa cgataggcag gcactcgcct gtcacttgga
421 gtctatatga agcttaacag acctgaacct attgacgttc gggtgccctg attatgcgca
491 tttattatat cctgatgaa gccacactct gcgtattagg tgccgggtggc ggtatttttg aagccaccac
561 gttaattagc gcactagctg ataaatataa aaataatcaa tcaccacgca atttatcact tattagcca
631 acaggactgg gggaccgcgc cgaccgggga attagccctg tggcacagga gggtttagta aaatgggcgc
701 tgttcgacac ctggggacaa tcaccacgga tcacacgctg tggtgtccgt tgattgtcca aggtgagct
771 atcggcctgc tctcatttca gaatctcagc gatgataccg cgccttcccg cgcgtatctg gaactgatgg
841 cagaagcgct cggctcggca ttagccaatc agcgtctcgc cgatgcgtta ctggaaaaag cactctacga
911 cccgctgacc ggtctgcgca atcgccatca tctggaagac actttgcgca ccagatggg ccaggcgata
981 cataatcaga ccccatcaga ttgcctgatg attgatttg atcacttcaa agatgtcaac gaccggttcg
1051 gccacgaggg gggcgatggc gttatcaagg gcgttgccgc gattattcag cgcgccatac gcgacagtgg
1121 gatggcgctt cgctacggtg gtgaagagtt tttggtcctg ctcagcggca tgggtgaaga agaggctaac
1191 cgcattggcg cggacatcta caacgggtgt catgcgctta cgctgcgctt tgggacgtcg gacatcagcc
1261 atatcgagct gtctattggc gttgccagct acccaagca cgcccaagc gcaaacctgc tgcgcgcgc
1331 tgacgtggcc ctgtatcgcg ccaaagagtt gggccgggtc cgaatttgta gcttcggtat gctgcaagcg
1401 agctaaacgc gggcatatcg cgatatgtta ttgcctgcaa gaggcataaac caatacga aa ttgcacgttg
1471 tcatagcatg gtagagcgtg ggatgaccgg agaacaacaa gaggactata cgatgaagca cattgatttt
1541 tcaatgatag atgcctttac cgacaccact ttggttgcca atgcccgcgc agtgtgtcct cttacagta
1611 ggttgcccga tgagatatta ttaaaaatgt ctcagcaaca taaccagtca gaaaccgcct tctttgtcac
1681 caccgatagc ggctttgagc tacgttggtt taccactcag ggtgaaatca atttatcgg gcacgccaca
1751 ctggctgctg cacacgtcat ctttgaacat cttgactacc cggacaccac aattcacttc gaaaccgat
1821 ttgttgccc gctgaccgtg acccgcatgt gcgaatggct gacgcttgat ttcccgcctt ggaataccga
1891 atcgggtata ccgcccgtt tactattgga aacgctgggt atcacggaat acaaagaagt ccgctggca
1961 cgtgattaca tggctgctat ggagaatcag cagcagattg cagcagtagc cccgcatatt cagccatgc
2031 ttccgctggg aaaaatggtc tgcattacg cgcacagcga tggggaatac gattttgtca gtcgattctt
2101 ctgccaggc gaggccgtt gcgaagacc cgcacacata tgctacatgc gcatgctatg tccatagtgg
2171 gctgagaaac tgaacaaaac acagatgctg gcacgccagg tgtccgagcg cggcggggat ttacgtgca
2241 agttagtggc cgatc

```

7.20 Nukleotidsequenz des Inserts von pAK115

```

1 gatcagcagc gtctcggtag tggcgatatt gcctttacgg ctaatcccat ccagaagatc gcctttggtg
71 ataccggctc cggagaagat aacgttatcg ctgcgtgcca tttcgtccag acgcagcgtt ttaccggctt
141 cgatacccat gacctggcag cgagccagtt cctgttcacc aatacggcgc ttctcttcgc tgcaccttt
211 gacatcatga cgtgccgca gcagacctg catgtcgcca tccagcgcgc ggataacggc ggcagaaacc
281 acaccttcgc gcgcgcgcgc aatgccgtac agcacgtcaa cttcgtctgc tggcatacaa gtcagaatgg
351 atgcgcgaac gtcaccgtcg ggaatggcaa acacgcgcac gccagcttc gccatctcgg cgataacatc
421 atcgtggcga ggcttgccca gaatcgtcac ggtcagttcg ctaagcggct tgttgagtgc ggcggcgatg
491 ttacgcaggt tagtttcag cggcaggttc aggtcgatag ccccttttgc accctggccg accatcagct
561 tctccatgta catatccggc gcgttgagga agcagccttt gtcaccgacc gcgaggaccg ccagcgcatt
631 cgcctgacct attgctgtca tgcgcgtacc ttcgataggg tcgactgcaa tatctaccgc gtcgcccaga
701 ccggtaccga ctttctcacc gataaacagc atcggcgctt catcaatttc accctgcgca atcacgatgg
771 tgcgctcaat attgacctg ttgagcataa tacgcagggc gttcaccgca gcgcgctag cggattttt
841 atcgcgcgca cccagccatt tatagccagc cagcgcgcgc gcttcggtga cgcgtgaaaa ttcaatggca
911 agttctcgtc tcattgcaaa ctcgtagcag aaaggaatgg cgcgaagtgt agcacagggg agggaggggg

```

```

981 attattgatg tgtgcggggt tgcccccgca cttgtgttac ctttaattact cttcgtggtc tccccacgcc
1051 agggcgcggt taaccgcttt tttccagccg ctgtaacgga agttacgttc ggttggttcg atccccaggcg
1121 ggaatttcgcg ctcgatggcc gctttttctc gcagttctatc caggtttctg cagaaacgcg cggcaagtcc
1191 cgccagatac gcggcaccga gcgcggtgac ttgcggaact tccgggcggt caacgcgggt gccgaggatg
1261 tcggactgga actgcatcag gaagttgttg gcgaccgcgc cgccatcgac acgcagcgcg tgccaacgaa
1331 taccggagtc ggcttgcacg gcttccagta cgtcgcgggg ctggtaagcg atagactcaa gcgttgacgc
1401 gatgatgtgg ttggagttta cgccacgggt caggccgaag atggcgccac gtgcatacgg gtcccaatac
1471 ggcgacacca gaccggtgaa ggccggaacc acgtacacac cgttggtatc cttcactttg gtggcgaaat
1541 attcggagtc gaacgcacgc ctgatgagtt tcattttcatc acgcagccac tggatggatg cgccagccat
1611 aaacacggcc ccttccagcg cgtagtctac ttcccccggtc gggccgcagg cgatgggtgg cagcagcccg
1681 ttttcagact taacggcttt ctccaccgta ttcatcgaca tgaagcagcc ggtaccgtaa ggtgttttcg
1751 ccatcccttc cttcacgcac agctggccaa acagcgctgc ctgctgggtc ccggcgatac cggagatagg
1821 aatacgtgtg ccgcctttac cgccaatggt ggtctgaccg tagacttcag aagaacgacg cacttccggc
1891 agcatggcac gcggaacgtc cagcgcgctc agcattttgt cgtcccagtc cagagtatgg atgttgaaac
1961 gcatagttcg tgaggctgtg gtgtaatcgc tccatgttac aatggttac gcgccccgg gtcatgttcc agataagcca
2031 ggtgtctacg gtaccgaaca gcagttcgcc gcgacgagcg cgctcacgcg agccttctac gtggctgagg
2101 atccacttca ctttgggtgc agagaagtac ggggtcaatga ccagtcgggt gttgttgcg acgtattctt
2171 ccatgccgtc gcgcttgagc ttctcgcaaa tatccgcagt acgacggcac tgccatacaa tggcggtata
2241 gatagctttg cgggtctgcg gttcccagc aatggttac ttcatcgaca tccagctggg gctttgggtc gcccaattt
2311 atttcatcgg aactgatac ggctttcgcc agcacttcta ccagcgtgga gctttgggtc gcccaattt
2381 ccattgggtc gtgttctacc caacctgct tcggatagat ttgctcgaat tcgcgttcg aaacgctaac
2451 gatgttcgca tcgtgggtcca ttacgaccgc gcgggagctg gtgggtgcct ggtcgagcgc aacgatatat
2521 ttttctcag tcattgattt ttgttcggc cagcgaagct cagcgaagct ttttggcgc ttttggcgc
2591 agcgtctttc ttttcaatcg cgcagacatc gcacggtaaa tgacgaccaa tcagtttgcg atatgcccat
2661 gcgccccaaa tcgcgcgggt aatcgggcca aacactggta ccaggaagta agggatatcg cgaccaccgc
2731 tgaaggcaat ctcccccaa ccagccatcc aggcgaagag ttccggtcca aagtcacgtg ccggattcat
2801 cgaaaacgcg gtcagtggcg ccataaatac gcatgtaacg accgatcag agccgatg ccggtgtcc
2871 agcggaccac gaggtacacc gttaccatcg tcggtcagcg ccaaaatcag cccattaga atagcggtaa
2941 tgaccatttc aaccgcgaag gcctgcacaa aattgatatg cgggttcgga taggtggaga aagtgccacg
3011 cagaccagg ctctctgtac tgccgcgcac gatatgggtg gtttgttcaa agtcgatgaa aagattgtaa
3081 taaagccgt aaaccaatgc cgctgcgcaa aaggcgccg caatttgcga aataataaaa ggaacaactt
3151 tgcgtttatc aaaacaggcg aacagccata gtgcgatggt taccgctgga ttacgggtg caccagaaac
3221 acctgccgtc agatagatag ccactctgag tgcagcgaca catcccacac cagatgatac cgaagaaaa
3291 gtagcccccag ccactttgag tgcagcgaca cttcaagtgt ttctttgact ctaggcacac tggttaattt
3361 attcagcaat gcactggcct ttcaagtgtt ctaggcacac atcaacaaaa tgagcgtttt
3431 ttatttgtgt cgagaaggtc actgacatcc gctgaatcat ttaattaacc aatatgttaa cactttggag
3501 gcaaaaacga gaaatatcga aattaaaaatg gctgaatcat ttaattaacc aatatgttaa cactttggag
3571 cgaggtattt gttatacata attagtgtga ggacaaagat taaagtgtt gcaaacgcga atctacgcg
3641 ctataagggt gcgcggtctc atacaatcgg agctaagtag agaacgcgcg tttttattaa ggcgtcaccg
3711 gacagcgatg gcgcggtctc atacaatcgg agctaagtag agaacgcgcg tttttattaa ggcgtcaccg
3781 gttatcggtg cgaggatttt tatccatcaa cgcttgcaa ttccaggag ataccatcac gctgttgca
3851 gtgtttgaga aactggaagc aaaagtacag caggcgattg ataccatcac gctgttgca
3921 aagagctgaa agaaaagaac aactcactgt cgcaggaaat tcagtctgca cagcagcagc
3991 ggagcgtgag aacaacaacc tgaaagaaca gcagagcggc tggcaggatc gtctgcagtc
4061 cgtatggaag aagtctaata ctcgctcatat ttacggttat ggctgcgtgc attcacccca
4131 ttcttatggt cctggggatt cattttcttg ccgccttgcc ctgacgcgaa atctatagag
4201 ccagcatgta ggccggataa ggccgaagcc aatatcatag aatattcagc atttacgcg
4271 agtttcaggc attcaaacc cctgtctacgt ccagaccagt gccggaatc tgcccagccg
4341 tagaaacgct actgcccgtg caacatcctc cgggtgtacc taatgcctcg tgcgaataag
4411 gagtctgcct gttcgccatc tgctgggttc atactcactg gcccacgggt cggttgggcc
4481 taataccccc ggcccgagag tgcacgagcc gttggcaagg caactgcaa tattgataat
4551 gtagacagca atccccggtc gggcgacacg gttggcaagg caactgcaa tattgataat
4621 tcaggagat gcggcaacgc ggcctgtatg gcaaccacca cgccacggt attcacgtta
4691 cgatgtcttc cagtgcaga gactccagcg ggcgcgcgcg tgcgatccct gcgttgttga
4761 taactctcct agtgactgta tcgtgtgatt tacgcgattc tgaatagcct gagcgtttgc
4831 tgaatagcct cgccatagcg gccagtgct gtaatttcat tggcaacggc ctgggctttc
4901 tttcataggt tataacaaca tcagcaccgg ctttttacc ctgacagtg atagcgcgc
4971 actggctccg gtgaccagcg ctttttacc ctgacagtg atagcgcgc
5041 tgagattcat cattaggtat agagagagtt ttttcttcgt caatgcgctg aatgggggaa
5111 gaagtggcaa aaaaggagat c

```

7.21

Nukleotidsequenz des Inserts von pAK116

```

1 gatcatgtcg ttaagccggg taggaacat tgtttctacc tgggcaactc cgtgttttat cagcaataac
71 gggatcagtc atgtgatgct aatgggcgcc gggatatcac tgatcggcct gttgggttcc attgccttgc
141 cgccagaaac gcggggggtg actctggcac aaaccagtca aatgacgatt cgcagcaagc ctgtatccag
211 agtgatttat taggagtgtt ctgtatttcc cctgttactc agtcagttag cctaagctta attggtattt
281 cactgaaaat gactgaaaag caggagagaa accatgcaaa aacataattc gatcacctcc atttttaccg
351 cagcagcact gttcaccggt gccggttgtt cttcaaacca ggcggttaaa accaccgatg gtaaaacca
421 tgttaccgat ggcaagccgc aggtggatga cgataccggt ctgggtgctg ataagaatgc ggaacccggt
491 aaaacggaac agattaaccg cgatcaggtt aaggacatga gtgagctgga caactaactc caatttttcc
561 attcatctac tcaataatat tgacttttag cctgctgatt aactgactaa actcactggt attacaataa
631 tgcagtaata gcaggctaata catgattctc atcattttat cacatcccta tccgcagcac tcgcatgcga
701 ataagcggat gcttgagcag gcaaggacgc tggaggcgct agaagttcgt tcgctgtatg aactctatcc
771 cgacttcaat atcgatatcg ccgctgaacc ggtatggcgt gcgcgcgca atcttatctg ctggcaaac
841 cctatacagt ggtacagcac accgcctctc ctcaaactgt ggtatggcaa agttctctct caccgctggg

```

911	cgtatggtca	tgggtggcacc	gcgctgcacg	gtaaacaatct	gttggtggcg	gtcactaccg	gcggcggtga
981	aaatcatttt	gatatcggt	cccatccagg	ttttgatgtg	ctttcccaac	ctttgcaagc	cacggcatta
1051	tattgtggtt	tcaaatggct	gcgcccattt	gcgatgcact	gtacgtttat	gtgaaatgac	gaaacgctgc
1121	aggcgagggc	acgtcattac	aagcagcggt	taatggaatg	gcaggaggca	caccatggat	agccatacgc
1191	tgatacaggg	gctgatttat	ctcggttcag	cggcgctgat	tgtgcccatt	gcggtacggc	tgggggttaag
1261	gtcgggtgctg	ggatatctca	ttgcccgggtg	catcatcggt	ccgtggggct	taagactggg	gacggatgcc
1331	gaatctatcc	tgcattttgc	cgagatcagc	gccacgatca	gcgccatcgc	accggtttgt	gccagatcgg
1401	caccgacgct	aggcccaacg	aattcgatac	gcttcacagc	cgcatgctgg	ttgggtggctt	cgtaaatgac
1471	gcttagcacc	ttgctaccca	gcacctgccc	accgttttca	ccttcggttg	gcggcatacgc	taccataatg
1541	tcatggctgc	taccgaagtt	ctgcaaaaagc	ggctctacga	agcccgcctt	ttccagcgca	tgcgcatca
1611	cgtccatttc	cgccggtttt	tcacgcgtga	tttcaatgac	cgtaccaccg	gtgaaatcga	gaccacagtt
1681	aaatccacgt	acgcccatta	cgacaatagc	cgcaatcagc	aggaaaccag	agatgccgaa	agcccagtag
1751	tcccagcgca	taaagtcgat	gacttttacgg	ccgtgggttca	attgttcaac	agtatatcc	tgtgccactt
1821	cgcactcctc	agattgacag	ctttttgacg	cgcttgccgc	catacaacag	gtttacgatg	gcacgtgtcc
1891	cgacgatcgc	ggtaaacatc	gacgtcgcca	cacctatacc	ggtagtaatc	gcgaaccctt	taattgcccc
1961	ggtaccgact	gcatacagga	tc				

7.22 Nukleotidsequenz des Inserts von pAK201

1	gatccagagg	tccgacgacg	ccgttttcgag	gcggcggtcg	agaccctgcg	cgcaggggaat	cgcacgtggc
71	acatccagat	caacacgcag	ctatccatga	tcgacgcgat	gcggaaggag	ctcgccgcgt	cgctgtgcc
141	ggttgtgttc	gatcacctcg	gtggtgccc	ggcgcgctt	ggtctcgaa	agcgaggatt	cgacgtgtt
211	ctggacctcg	ttcgaaccgg	acgcgtctac	gtcaaactct	ccgcggcata	cctcggtcgc	aaggctgcgc
281	cagattacgc	ggacctcgca	ccactcgccg	tcgtgccaac	gtgcaccgag	tgccagcggt	tcctgtgggg
351	aactgactgg	cctcaccgca	gcacgtcgca	agccgcaggc	cggacgccc	ccgacatttc	accactgcgc
421	cagatcgacg	atggacgcgt	gttcaatcag	ttcgcgctgt	ggcgccggga	tgccgcgat	cgaaagacga
491	ttctggtgga	caatccgggc	atgctttacg	gattttccacg	cttatgatgg	ccgcggaacg	atcagtgcga
561	acgatccgcg	ctgcacatgc	tgtctggagc	agggcgagc	cgtcaaccgc	cgtgagcgtg	tggcagctgc
631	tcaagcgggc	tcggttgccg	gacgagctca	cgattcatgt	gccagcgcca	gatgatgacg	aaggattcag
701	ccgaattcgg	tgcccgcctc	gtgagtgccg	gccgacgccc	tcgagccgtt	ggtgctgtga	cggcaccgaa
771	tcgcccggagc	tattgttcca	aggggtgtgg	accgcttgg	acacggtttc	caccggaggg	cggtgtcctg
841	ggtgcagcca	ccaatggggc	tggacctcat	gccttcattg	cgagggtgg	tccttgcaag	aagattgta
911	cgagcacgat	cactagtccg	tgagggtgcg	gcgggggtgga	gcgcgtatgc	agtttgccgc	ccgcaagccc
981	tcttgcgcca	acgagcagag	ggctcagcag	cggaccact	ggactcgaca	gcgtattgac	cgcgacggtt
1051	gcgcgcgcca	cgaagccgag	ggcgcccccc	aacgcctg	tcttcacagc	ggctgattcg	atccagccga
1121	gacggggcag	cagaagagcg	gcgcgcgccc	tcgcgagaag	accaccgcgc	aaaccgcgcg	cgcgacgagc
1191	cgtgcgacgc	aaggccgcgc	cgccgatgga	ccctgcaagg	ccgcggcac	cgcttgcgaa	gacgaggagc
1261	agaaacagtc	gcattgcgggt	tgaggatcaa	agggccggtg	atatcatcgc	catcgacacc	gcgcccagag
1331	gccatcgaca	agaccgcctc	ggccacaata	tgtctacaga	ctttgtatca	caaagttagt	gccgcgctcc
1401	aacctcagc	aggtaggacg	gtgatcgagt	gcccgaaagt	cgcggcgctg	cgcggcgacg	ctcgcccgga
1471	gtgcccgcgc	tgccgggatcg	tggttgcgaa	gctcgcgcag	cgtgtggctg	cggacggccc	ggatatcggt
1541	ccaccgatcg	ccgagacgcc	gggtcaggtc	gcccgcgatc	cccgctcgca	cgtggctcgg	ctcgcgcgag
1611	ggcgctgctc	cctcgccctg	gttgtgtgga	cctggcaatc	cgcgcgcgtg	cccatgggtg	ttgctgtgaa
1681	ggatcaggtg	cttcacctgc	ccaaacctgt	ctttcacgaa	gcgggacacg	tgtgtgtcgc	cctcttcggg
1751	cgggttcatga	ccgtcctcgc	cggcagcctc	ttccaattcg	gtctcccgc	cgcgctcgcg	ggcgcccttc
1821	tgaacacagc	agatcagttc	gggtgccgcg	tgtgcacttg	gtgggcggga	cagaacctgc	tggacgttgc
1891	cccctacatc	gcagatgctc	gagcgttgca	gctcgtcctc	ctcgccggga	agacgggcgc	ggaggtcgag
1961	ggacacgact	gggaatacct	gctgacgacg	atgggctggc	tgcgcttcga	ccgcgctcga	gggcttgga
2031	cgcaccggat	gggtttgatg	atgatgaccg	gcgcgctgat	ttggggcgca	atctatcttg	cgaacaccgc
2101	cgaagagccc	cgggatc					

7.23 Nukleotidsequenz des Inserts von pAK202

1	gatccggtcc	tgagcctgta	tcgcgggagc	accgagatcg	cgcgcaacga	tgactgggaa	ataagccgca
71	gcagcgccgc	gatcgccgcg	acggcccagc	gggtcggcgc	ctttgcgctc	aaaccggcaa	gtctggacgc
141	cgccctgctc	gtcacgctcg	aaccgcggcg	ctataccgca	atgatcagc	gcgtcgagc	cgccagccgc
211	atcgcggtga	tcgaggtgta	cgatgcggat	tgaggttggc	cctcaactct	gtggccttcg	tagcagccga
281	ggtaacgagg	ctggccggag	ccgaggtctg	aaaaccacgc	cccgccgat	ctccggcgcc	gtcgaagaag
351	gcggggccagc	ctcgttacgt	cggctgctac	acgcgttgaa	aggaaggttc	tgctcgacgg	tgtgcccag
421	aatctcgaac	catagccggt	cgacatcggt	ttcctcctc	cgattttcgc	tctcgccgag	gcccgccttg
491	ccgcgctgcc	gcccagagtc	gatgcgcct	tgaagacgtt	tcgatccgat	ccgcgcggcg	ggtggtcttt
561	cacgcagacg	accaccgcgg	agggaaaaatc	gaccgtcgaa	cgtgcgacg	ccgcgcgccc	ggatttctct
631	cgctggaaac	tgctgcaaaa	agacggccgc	gcgcccagca	cggatgaact	gcgtgaatac	ggcgagggtc
701	gttcacgcgc	ctcccggatg	ggaaccgcgc	cgaacctcgc	cgaccaactc	gaccttcgca	ccgttgaaac
771	catcgagcag	accgcggagc	gcgcgaccta	ccggtgccga	ttgcgtccgg	gtgagacgcg	ggacaagacc
841	gcacccacc	ttcgcgccac	cattgtgctg	caccgaccga	cccgacgat	cgagtcggtc	gaactcgcca
911	gcgtggcgga	attcagcccc	acgctggggc	taagaatcgc	cgcgctcaaa	acgtgcata	actactgcct
981	ccccctggc	gaatcgccca	cctgcgccca	atcgctcagc	acccacgttc	gcggccgctc	gttctgttct
1051	aagtcactgg	atgcggatat	ggctcgtgacg	ttttcggatt	atgtgaacgt	gcggaaaaag	tagtgccgcg
1121	tgaactgaag	ttacttcggg	cgcggtgcaa	cgaacgatct	cacgtcttct	gttacgtcga	gcacacaccc
1191	ggcgctgctg	cgtccgcccc	tcttgctaga	ggggagtttg	attgctgcgt	cgaatcacia	gggttcgttc
1261	ttgaaaatcc	cctctagcaa	gaggggtgcc	catgctcctc	ccatattcga	gcgactcat	tcgaaagccc
1331	gcaaatgggc	ggggtgtgtg	ctcgttcgaa	ttgctcgtgc	tacgaacctc	cactcgccgc	cgctccattt
1401	gaacacgcac	gcactgagcg	gtggcagcgt	caccacgatc	gactggctga	accgcgcgcg	ctcgagatcc

1471	tccggtgctgc	ggccgcccac	gttgcccagg	ccgctgccc	catagaattc	gctggttggtg	ttcaggactt
1541	cgcgccagaa	accgcgtcgc	ggcacgccaa	tccgataatc	gcgctgggcg	ccgccgaaat	ggcacaccac
1611	cgcgaagagc	gtctgctccg	tgtgatcgct	ccgcagatac	gcgatgagat	tggcatccgc	atcatggcac
1681	gtcagccagc	ggaagccctg	cgcgttgaaa	tcatTTTTggc	tacgaccg	ctcggctgtg	tacagcttgt
1751	tcagatcacg	caccagcaac	cggacgccct	cgtgatccat	gtactgggaa	agatgccagt	cgaggctgcg
1821	atcgtgcgcc	cactcgttcg	actgcgcgaa	ctcgccgccc	atgaagagca	gctTTTTgcc	cggccacatc
1891	caggtgtgcg	cataaagtgc	gcgcaggttc	gcggctttct	cggcgatatg	ccatgcgccc	atcttgaaga
1961	gcacgcagcg	tttgccgtgc	acgacttcgt	cgtgggagaa	caccgtgatg	aaattctcgg	cgtactggta
2031	aagcatgccg	aacgtgagat	cgttctggtg	gtgacggcgg	acgatcggct	ccttcgtgaa	atagcgcagc
2101	gtgtcgttca	tccagcccat	gttccacttg	tagtcgaacc	cgcgcgccc	gtccttcgtc	ggtttgctca
2171	cgcggcaaaa	cgaagtgcct	tctcggcgca	tcacgcgcac	gccggggtaa	taatgggtgga	cgaggctcgtt
2241	gacgcgccgg	atgaagtcca	tgcctcagag	attttcgcgg	ccgccaaact	tggtcgggat	c

7.24 Nukleotidsequenz des Inserts von pAK203

1	gatcccaatc	atttgatctg	gatcgacatg	gagatgagcg	gcctgtacc	ggacaccgac	cgcgtgctgg
71	agatcgcgat	cgtcgtcacc	gactcgcaac	tcgctactgt	ggccgaagcg	ccggtgaaga	tcgctgcatca
141	gccggagcgc	gtgctcgacc	gcatggattc	atggaaacaaa	tccacgcaca	ggaaatccgg	attgatcgac
211	aagggtcaagg	cggcgaagca	gagcgaggtc	gaagtggagg	ccgaattaat	cgccttctct	ctgcagtacc
281	tgcccagaaa	tacctctccg	atgtgcggca	actctatctg	ccaggaccgc	cgttctctcg	cgcggtacat
351	gccgaagctc	gaagccttct	tccactatcg	caacctggat	gtttccacgc	tcaaggaaact	ggcgaggcgc
421	tggaaagccg	ggatcatggt	gggcctgacc	aagcacggca	agcacgaagc	gctggccgac	gtctacgagt
491	ccatcgatga	gttgaagtat	taccgcgaga	attttctcaa	ccttcaataa	ccgtgattcg	tgccacgtga
561	tacgtgtcac	gtaccaccgc	tttccctact	ccagcgttat	ctccccgtcg	aaatcgacat	tcagcccgat
631	tgccggaaaca	ctgagcttca	ttttgaccgg	cagtagctcg	ctgcccctca	gttttcccca	ggccagcgcc
701	ttcgacaccg	cctgctcgat	ctcgctgctg	ctccagcgcg	cggccatttt	cagaaacttg	cggatgctca
771	tggtgaaatt	ctcgtcgttc	atttgctctc	cttggttccg	agtacgtatt	cgatcagccg	cgcggtagag
841	gcacgtggcg	cgtgcggg	cttccccgct	ttcaggctct	cgagcacgcc	gctggcgagt	tgcttgccca
911	gttccacgcc	ccactgatcg	aaggaattga	tgtcccatat	cgcgccttgc	acgaacacct	tggtgtcgta
981	gagcgcaatc	agcgcgccca	gcgagcgcgt	gtccagatcg	cgcacacccg	tggtattgct	gggacgattg
1051	ccgggaaaag	tgcatgagcg	aatcaggcgt	tccgcttcgt	cgcgcagcat	gcgcgcgcgc	ttgagttcgg
1121	cgcggacctc	gtcggcattt	ttcccccgca	gcagcgcctc	gctttggcg	atgcaattgg	cgagcaggat
1191	ttcctggtgt	tccggcagcc	ggtcgcgcgc	gtttgcgcgc	acgatgaaat	cggccggcgt	gacttgctg
1261	cctggtgca	ggtgctgaaa	aaacgcgtgt	tgcccgctgt	tgcccggtcg	gccccagatc	accgggccc
1331	tgccgtattc	gacctccgct	cccgagcggg	cgacgcgttt	gcggttgctc	tccatatcga	gctgctgcag
1401	gaacgcgcga	aagtgagcga	ggtcctgcgc	atagggcagg	actgcttggg	atcggtggcc	cagaaagtgg
1471	atattccaga	ttcccgtgag	cgcggcgatc	accggcatgc	tgctttccag	gggtgcccga	cggaaagtgt
1541	gtatgcgcgc	gtatgcgcgc	gcgagcgcgt	cgtccagatgc	gttgaagcgc	atccccagg	cgttcgcag
1611	gccgatggcc	gaccacaggg	aatagcggcc	ccctacccaa	tcccagaacc	cgaacacacg	gtccggagcg
1681	atgccgaatt	tccaggtcgc	ttccaggttg	ctggagaccg	cggcgaaatg	ctggttgact	gccacctccg
1751	tggcccccga	agggcgagc	aatgtaagca	gccactcacg	cgccgagcgt	gcgttggtaa	gggtctcctg
1821	cctggtgaa	gtcttcgatg	agaccacgaa	cagggtcgtt	tcggggttca	ggccgcagag	cgttgccgc
1891	agatgggcgc	catcgatgtt	cgaacgaaa	tgcaccaaca	ggctcgtgag	accatatggg	cgcaacgcgc
1961	agcaaaccat	cagcgggccc	agatccgagc	cgccgatgcc	gatattgacc	acgtcgttga	acggcaggcc
2031	gctgtagccc	cgggcgatgc	cgcctccgac	ccgctccgaa	aaatcccga	cgcgcgacaa	caccgcgcga
2101	acctcgggca	tcacgtcctt	gcgcgtcgac	agcagcagcg	ggccggagcg	gttgccgaat	ccgctgtgca
2171	gcaccgcgcg	tttctcgggtg	acgttgatgc	gtttgccttc	gaacatcgcc	acaatctcgc	ccggcaggct
2241	ggcctcctcg	gccagcgtca	tcagcaggcg	gcgtgtctgc	cgcgacagcg	ggttcttgga	gtagtcgagc
2311	agcagaccgc	aggctgcaac	cgagaactcc	tgccgcgcgc	cgggatcatt	cgtgaacagg	tcggctatcc
2381	gcgcctcgcg	catctcgaa	gcattggcct	cgagcgcctt	ccaggcggga	cgttccctaa	ggcggagcat
2451	tctagaagcc	gtgacgcgtg	acacgtgatg	cgtgacgcgc	aaggctcgaa	accatgggca	tacctggatt
2521	ctataggacg	gccatgggat	tccgaaccgc	aaaaaaaaaga	aaggggccc	ggatcgctcc	cggggccctt
2591	caagggaatc	tggtctagct	taagcggctt	ttttcttggt	cgcggcggtg	tggcccggtg	

7.25 Nukleotidsequenz des Inserts von pAK204

1	gatccgcggg	atcacgacga	cacgcgcggc	tggagtcctg	acggcaagtg	gatcgcgttc	actcgcggtt
71	ccgtcatcga	tggaaaggac	gccggcatct	gggcgatcgc	gccggaggct	gggtcggtag	tgccgcccgc
141	attcctaagt	gcagtgcacg	cggtcggcgc	acgctctctt	gtgtacggat	gttcgcccga	cggcgtgtgg
211	ctggcgatgt	cacgcggcag	tgaccactac	gaattcttca	acgtgccgct	cgagatctgc	ccgatccccg
281	gccccgcagg	ctgcggcgcc	ggaaaccttg	ccgacatgat	cggagatgtg	tatgggggtc	gagagatcgc
351	cgactggcga	cgaccagcac	cgcagttcgt	cggcgctttc	gtcgagaacc	cgcgtggcgg	cgttcagtcg
421	atccaggctc	cggaggctcc	gacggtgcaa	cggcgctcgc	tcgtgcgggg	cgcgaacgag	aatgtgctgc
491	tccagcggcc	gcgatggcgc	ccgcgcctcg	acgagttcct	ctatctggag	acacagatcg	cgactgggcc
561	acggacgacc	cgcctgaaga	tcgcagacgc	ccgtacgggc	gcgcagcgtg	aggcgttcgc	ccgccagggt
631	ccggtgtggg	ccgagtgagc	acccgcgggc	gcgagatcg	cctgggtcga	aaccaatggc	gtcgcggctg
701	ccgtgcggct	cgtgcgcctt	gacgggagcg	gagagcgttc	gatctacggc	acggcggag	taccgcaggc
771	tcagggtgatc	acgggtgatt	tcggtagcgt	ccgtttctga	tgacgacggt	agacgtgcgt	tacatggctg

841	acgacgtcga	cgcgcgcgtc	gcgtttctaca	cgacccacct	cggtttcacg	ctcaactcga	gcgcgcgtcc
911	ggcgttcgcc	gacgtgaccc	gcggcgatct	ggcgtctgtc	ctgagcggcg	cgctcgagtc	ggcgggtcgc
981	ccgatgcgg	atgggcgcgg	accggcgctc	ggcgttgatga	atcggttcca	gatcatcgtc	gacgacatcg
1051	cgagcgaggt	cgctcgctg	cgggacgcgg	ggcgtgacgtt	ccgcaacgac	atcatcaaag	gtccgggtgg
1121	ctcgcagatc	cttgtggaag	atccgtcggg	caacgtcgctc	gagctctttc	aaccgcgcta	gcccgcctcg
1191	cagaaattcg	ccaccgtcgc	ggcgacatcg	tcgcgcggca	cgcggtgcag	gcgcgcacgc	ggtagcgacg
1261	cgagcatgcg	cgcgcgtac	tcgcgcgtga	tcgcgcggcg	atcgagaagg	accaccgcgc	cgcgatcggt
1331	gcgcgtgcgg	atgagccggc	cgaagccctg	acgcaggcgc	agggccgcct	gcggcacctg	gaactccgcg
1401	aatggatc						

7.26 Nukleotidsequenz des Inserts von pAK205

1	gatccggcaa	aggctcgagtt	cgtcgccgcg	tttcccggct	tctcgctgcc	gctcgacatc	atcgtaaacg
71	acgacagcct	gtggatcacc	gacctcaagc	cgctgcgctt	cgtgaagttg	gacttcgagg	gcaatcgacg
141	ctacacctgg	ctcgtgcccc	cggacctgcc	tgatggctac	ctcgaggtgc	acgcgtttctc	gggtgattcg
211	gccggcaacc	tgtatggcgg	cgacaaccag	tacggccgga	cgcagaagtt	cgtagccgaag	ccggggcgca
281	atcccgcgca	cctgattcgc	gcgcctgtgg	tggcgcgctg	acgcggtacg	ttgtagacga	acgcggtcga
351	tacgaatagg	atgacggggc	tatgacggcc	gtctccatta	ccgtcaacgg	caaggtgcgc	aaggccccacg
421	tcgtcgacgt	cacgtctctc	gtgcatttcc	tcgcggaaca	cctcaatctc	accggcacgc	acgttggtcg
491	cgacaccagc	caatgcggcg	cgtgcacggt	gctcgtcgac	ggccgcagcg	cgaagtctcg	cacgatattt
561	gccgtgcagg	ccgacggctc	gtcgggtcag	accatcgaa	ggctcgcgcc	ggaaggcgag	ctccatccgc
631	tccagaaagg	tttctgggaa	gagcacggcc	tgagtgccg	ctactgcacg	ccgggcatga	tcatgtcggc
701	gggtgaacttg	ttgcaggaca	acgcgtcgcc	gagcagtgga	gagatccgcg	agggcatctc	cggcaacttc
771	tgccgctgca	ccggctacca	gcacatcgtc	aacgccatcc	agcacgccgc	caaaaacggc	ggcgcgaaagg
841	cgaggtaagc	catggcatcc	cccgtgctgc	ccaagctcgt	tggcgagcgc	gtcaagcgcc	gcgaggacc
911	gcgcctgac	cagggacgcg	gcacttacgt	cgatgacctg	aagatcaccg	gcatgcgcca	catggcgctt
981	aagcgcagcg	acattgcca	cggcaccatc	acgaagatcg	acaccagcgc	cggcgagcgc	atggcgcgcg
1051	tcgaagccgt	cttcaccggc	gccgacattg	ccaagatcct	cgcgcgcgatg	cccattggca	cgcgcgttccc
1121	gtcgccgcgg	catttcgcgg	tggcggtcga	tacggttcgc	tacgcccggg	agccggtcgc	ggtcgtgatc
1191	gccgcgcgac	gttatgtggc	gcgggacgcc	gccgacgcga	tcgtcgtcac	ctacaatccg	ctgcccgcgg
1261	tcgtcgacgt	cgaagcggcg	atgaccggca	agccgacggt	gattcacaa	gatttcccga	acaactcgc
1331	ggtcgcgctc	gtgcccagcg	gcaccggcgt	ggccccggac	ttctcgggtg	tcgacaacac	ggcggtcgac
1401	aaggcattcg	ccgacgccga	agtgcagatc	agccagcgca	tggtcaacca	gcgcctcggt	cccaacgcga
1471	tggagccgcg	cggcgtgctc	gcgcattggg	agcccgccaa	ggacacgatg	accatctggg	cgtcgacgca
1541	tgacccccac	atcctcaaga	cgatgatcgc	ggcgatgaac	ggcctgggcc	agcaccaggt	gcgcgccatc
1611	gtccccgaag	tcggcggcgg	cttcggcgcc	aagatcaaca	tctacgccga	ggagtagctc	gcgtcggtcg
1681	tgctgaagaa	gctgggcatg	ccgatcaagt	ggatcgagga	tcgatcgga	gcgtttgtcg	cgacgacgca
1751	cgggcgcgac	atccttgggt	acatcgatct	cgcagcgaag	cgcgacggca	cgggtgctcg	cctcaagatg
1821	cggctgattcg	ccgacatcgg	cgcctacaac	atgctgtgga	ccgcgcgcga	ccgctcgctg	acgatgtcga
1891	tggcgaaagg	cacctacaag	atcccggcga	ttcgccaccac	gctgaccgag	gtcttcacca	acaagacgcc
1961	gaccgacgcg	tatcgcgcg	ccggccggcc	ggaggccacc	tacttcgtcg	agcgtgccat	ggacatgctc
2031	gcggccgagc	tgaagatgga	tc				

7.27 Nukleotidsequenz des Inserts von pAK206

1	gactctgcct	cgggtgcctt	ggcggggcgtg	ggcttgctgc	cggacggcctt	gccttgccgc	gtgccctgcg
71	ggcggggcgc	gcccggatcg	tcgatgtgca	tgccgcgggg	cggcacgttg	atctcgagtc	cctggagctg
141	cacgcggcgg	agccgaagcg	gccggaagat	cagcccgaag	acgctggcct	cggccgagaa	ggacgcgacc
211	ttcacgagcg	gcgggacgtc	ggtgcggtgc	ttgtggcgaa	ggacgagtc	cgtgcccgtc	agcctcgcg
281	gcagcaccga	cactgacagc	gtggcgacat	cgacctggct	ctcgaaccgc	tcccgcaccg	cgtcgagcag
351	gcgtggtttg	accgcggcgg	cgagcgcgat	cggcagcgac	aggatgcaga	tgaggatcgc	gcggcgacgc
421	agcgcggcct	gcgtcacccg	gcgtcgattg	aagggcacgc	ccccctccca	cgcaacttcc	ttgccgtggc
491	tcggaggccc	gcagccggct	cacctcgcca	cctggtcacc	cacagtgagc	gttcgcgctt	acatcgccgc
561	gagccgctcg	gggcggggcag	gactgaggcg	gcacgagcgg	ccgacttccg	ccgtccttca	aagggagggg
631	ccggcttcag	cggcccccag	aagggcgggc	tcaagcccg	ccctccctca	aaagttcagc	cagaacgtgg
701	ccgcgcgcgc	gtggacgacg	gcgagcagga	tcaggagcag	caggcgctta	cctccggcag	gcgtattgat
771	cagcaaccag	gcgtacagcg	ggaactgcgc	ggtgatcaag	agcaggccag	ccgtttcccg	ctcgccgctc
841	atgctcacgg	ccgtgccgta	cggaaagaac	agggctcattg	gcgtcatgca	gcggcacgcg	ccgcggccca
911	tcccgcgaat	cacgaacagc	acgattgtca	ggccgaatcc	gatcgcgatg	gcggcgagcg	tccggcgcat
981	gccctacgac	gtctgtgcgg	ccgtctcgcc	gcgcgcgagc	agcagcgcgc	gttcgcgcgc	gttcggggtg
1051	agtgaggtcg	cccgtcgaa	ctcggttcgc	gcctcggcgt	gacggccgag	cttcgcgagc	aggtcgcccc
1121	gcaccgacgg	cagcaggtga	tactccgcca	gcgcggcctc	cagtcgcagg	gcgtccacga	gcacgaggcc
1191	ggcggccgga	ccctcgccaa	acgcgacgca	cacggcgcg	tgagatgcga	cgaccgagca	gcgcgtcagg
1261	tgcaagagct	cggatatagag	cgccacgatg	cgcgcgccagt	cgggtgcgccc	cggttcgagc	gcgcgcgcgt
1331	gacacgcggc	gatcgccgcc	tcagcgtgtg	aggggtccgcg	cgcgcgcgcg	agcgttccg	cgcgctggag
1401	cgcgcgccag	ccgcggccaa	tcaggaggcg	atcccaaaag	gcgcgattct	ggtcgaggag	aaccaccggc
1471	tcgcccgctg	gccccacagc	cgcgcgctc	cgccagcct	ggatctccat	cagcgcagcg	agggcatgca
1541	cttcgggctc	gtccggggcg	aggcctgcga	gcacccggcc	caggcgagc	gcattcctcg	agagcgacgg
1611	gcggatcaga	tcgtccccgg	cggtcgcggt	gtaccctcgc	ttgaagatga	gatagatgac	ctcgagcacc
1681	gacgccaggg	gttccaccgc	ttcggaaccg	cgcggcactt	cgaacggcac	gcgttctcgc	gccaacgtcc
1751	gcttggcgcg	cacgatccgc	tcgcgcgatc	tcggctcgcc	gacgaggaa	gcacgcgcga	tctcctcggt
1821	cgtgagcccg	ccgagcagcc	ggagcgtgag	cgcgagccgc	gcttcggctg	agagcacggg	atggcacgcc
1891	gtgaagatga	gacgcagcag	atcgctcgca	acgtcgtcgt	ccatagccgc	gtccagatcg	ggggcttcgc
1961	gttcctgccc	ggtttctgatg	gcgtagccga	gtcctcgtg	cttcgggctg	aggagcttgc	tgccggcgaa

2031	gtgatcgatc	gcgcggcgct	tggcggccgc	cgtcagccag	gcgcggggat	tgcgcggaat	gccggacgcg
2101	ggccattgct	ccagcgcgcc	gacgagcgcg	tccctgggcca	gatcttcagc	gagcccgacg	tgcgcacca
2171	ttcgcgcgac	ggtcgcgatg	acgcggggcg	actcgatccg	ccagaccgcc	tcgatattcg	gatgaggatc
2241	ggcagctgtc	acagctgccg	atcacatcat	cgcgaggttc	cggcgcgcaa	cctccggccg	ggtcaggact
2311	tccctggtag	ctcgtccgcg	gagccgtgcg	tgctgttcga	ccgcgggct	ctgcccgaag	ttttcgagct
2381	cgaagacctg	gcggatctcc	gcatctcgcc	ctcttcgaag	ggcaccgcgt	tcgcccactc	gatcgccctg
2451	gccttgcgac	ttcacttgaa	agagacccaa	gccgccaccg	aggaatttgg	cctcagcaga	acggaccgtc
2521	actgacggcg	gggcggacct	tggagaaccg	gacgcgcgcg	cccttcgagc	tcgcctgcag	tccttcccca
2591	gccagcatca	cgccggcctt	caccatttct	tcgttgtact	tgcccattgtc	ggccagcatt	ttctacgtcg
2661	ggcagaatac	cggtctcgga	cttcttgcg	gacttgacga	tcattcatgaa	tcgcacgtca	tgccctcttc
2731	gggtgttggg	ctggggccgg	aagcgaccg	ggtgaccgcg	tctctactga	agcgtcgaat	ggggggcgcg
2801	gggatcgaca	aggctctgaa	cccgaacctc	gtgagcccg	atattaggat	c	

7.28 Nukleotidsequenz des Inserts von pAK207

1	gatccgatcg	agggctggga	gtacatcgac	gacctgctg	ccacagagta	ttcgaccggc	aaggtgggtca
71	ggctcccccg	gcacatctcg	aactatgaca	tcgaaacgtc	ggacttcacg	gtcacgtaca	ggattccgta
141	ccgggtggctg	aactttctcgt	atgtgacccc	ggttgacccc	gccgaagact	cgacgatgtg	gatgccggaa
211	ggggcagagg	atctaccccc	cgccatgca	ctgcctggc	tgttgtcgcc	cagggaattt	tcctgtgggg
281	agatcgaccg	ggttaccgaa	tggcaggtca	gtgaaccac	gagggggcg	atctctcagg	ggctgggtccg
351	tgccaagtgg	caggagttct	accgggcttt	ggacgaggtg	cgcaggggtg	acccgcccc	tgctcgtagg
421	cagtacctgc	gtaaaccgtg	gcgaggttc	cattccgccc	gccgttgggg	gtagggagct	atgagtttcc
491	accctcgctt	ctaccagtct	ctcactgcg	ccaggttggc	tgctcagaac	cctgtggttc	ctgcgtgtga
561	gatcttcatc	gctcgggata	ccgggtgtgc	caagcgtggg	catggcaact	ggaacacct	gatgccgtgg
631	tcttccggcc	agaccaacta	cctgcacacc	ctggctgacc	agtctgtctc	ggacggcagc	aacctggcca
701	acgtcgaagg	gttgacgttc	cccatcatcg	ctgcggcgct	ctatgtcgca	gagttcaccc	tgttccacct
771	ggctgcagcc	acgactacac	ggctgggtct	gtcgttcaac	gggcccagca	acctcgacct	ctcgaagatg
841	acggcgattc	tgccgcagac	agccacaacg	gttgcccttcg	ctacgaccga	aacctacgag	acgggtgggtga
911	cttctgcagc	caccatctcg	acgactgtcc	cccaggtctc	tctcgttcag	gcttacgtgg	tgaacggtac
981	gacggctggc	acctttgtct	tccgggtccg	cacggaggtc	aacgcttcgg	ctgtgacagt	tcagcggggc
1051	tcgtgggtga	aggtcgtcag	ggctgggtga	ctaccagaac	ctaccagaac	ctccaggtg	ggctgggtga
1121	agacgcaccg	ttgacaaacg	tggctgtcgt	cttgacgtca	gccgctctgg	ccgatctggc	tgctgttgtc
1191	gcccccgatt	tcaaacggct	gggtgctcgac	cctgatgga	tcgacgggga	cccggagatc	gtccacgtca
1261	cagccacccc	ggctctgggc	acgacggcca	cggtgtctcg	tgggcaggag	ggcacgtcgg	cacgacagca
1331	cccttggtg	acccttgga	ttcatggcgc	tacgaagct	gatctggagc	acctcgacct	tgctggtatg
1401	acgactacag	gcgacacgat	gtatgcgtcg	gctgctggca	cgacagcccg	tctgctgtgc	ggctctgccg
1471	atcaggtgat	gacggttgcc	tctggtattc	ctgcctggca	gacgttgggg	aacgttgcga	atgtcacacc
1541	gaaggggtgac	atgctggctg	cgatcagctc	cggaacactg	tctcgggtg	ctgtcggcac	agacggccaa
1611	agcttgggtg	catcttcggc	tgcttcaacc	ggggtagcat	ggggtagcat	cggtgagctc	ggagacatca
1681	agtcgggcat	ctgggctgct	gcccctaccg	gctgggtgct	gttcggccag	acgtacctca	gcccgaatc
1751	cacctatccg	gccctgtggg	ccgttctcgt	ggcttcgggg	ctgacgtcct	ggatgtctgg	cacaagcata
1821	gtcctgctcg	atctgggtga	ccgtgtgctg	atggacggcg	gcactcttgg	tgccaccggg	ggggccaacg
1891	cagtcagctc	atccacggcg	aacctgcggg	cccagaccga	cagcatcgac	cacaaccagg	ggtagtcgac
1961	gtctgccggc	aactcgggtc	accacactca	cacgttctcg	gacacgacgg	gtggcaccgg	cgagcacaa
2031	cacaacgctt	ggttcgtgga	tgtgactggc	gggtgggctg	ctagccgtgc	ggctcctgcg	tcgaccggtt
2101	cgggaaccaa	cgctcagatc	acgattgtcg	gcggcgggga	ccacaccac	acgggtgtcgg	gcacaaccgg
2171	tggggattcg	gtggctcaca	cccacgtgtc	ggaggtgcat	aactttgtg	gtacgtcagg	gtcggtcggt
2241	tccggcacgg	ccgtcaccac	acaccccgcc	tcacctcaga	atcaactacg	caatcaagta	ctaagtcaga
2311	gcgttgatcc	tggctgccag	cagggcagac	cctgcggtag	acaggtgtaa	gccatctgag	ctgagcagcg
2381	cagggttctt	gtcacctcgt	tagaacatgt	tgatcggaga	gtaccgctga	tgccgggacg	aagcgaatac
2451	ctgtgcagtg	atgactgcac	gtcgtatgct	ctgagcgtg	gctgcaggaa	actgtctcga	agcattgtga
2521	accagatga	tggtagcgtc	gtctggcacc	atggagacga	tctgttgggt	gaagatcttc	caactgagcgt
2591	ctgaggtttc	caccccgctt	ctgtctgcga	ccccaccgtc	ttgcactagg	acgaaccttc	cgggtgctga
2661	cacggtagcg	atccatctga	tttcgggtgac	gggtggaggt	cggaggtcgc	agccgggtgt	gaacggcgca
2731	cggcagcgct	cggcaacgat	gaacctgtgc	aggtgtcgtg	tcagggtgag	gcctgtcagt	aggatggatg
2801	ctccggagcc	tacgagtcgg	aacggggctg	tgcccttcag	gctcttccac	agttcggggg	attcaggtgc
2871	cgggtccagg	ttgttgacgg	ccagggtgaa	cccgctgagc	cagaggaaac	tgagcaggct	ggctgcaagg
2941	aaagtgtaga	actttctcat	actgggtactg	taccactccc	tgtcaagggg	gttacggcgt	ggcctatccc
3011	cccaagccgg	cgatgtttct	ccctcaggaa	ccaccaccgc	gagtcgagaa	gagactgac	tcgttctggc
3081	aggaccggcc	ccggattact	ccccggctgc	agcttatcca	caccaacggt	gcctccaggg	aatccaacgt
3151	ggattcctcc	tacaactggg	ctaaccagcc	tggctccaac	catacgatcc	cccacatcca	gttcgaccgg
3221	gacggtcgag	cgatgatgat	gctgccttcc	gacgcgaagg	ggatagccaa	ctaccgggct	gccgacttct
3291	ctctcgggtt	cgagacggca	gacaccggct	acctcgctga	ccccaccatc	tccgagtcca	cgcaggtcca
3361	gatggagaag	atcgctacag	cctgtaccta	ctactcgtgg	ggttacgggt	tcccgtctga	atacccaacc
3431	gaatgggatg	ggtcggggac	tgccctgccac	acggaaccgt	tcgcctaccc	ctattggagc	agttcgggtc
3501	ggaagatctg	ccccggcttg	aagaagaagg	ctcaagtcaa	gagctggatc		

7.29 Nukleotidsequenz des Inserts von pAK208

1	gatccggagg	acgggtgagga	ccgtgttgta	ggcgagctgg	ataccctggt	tcgccagggt	cgcttgaaac
71	tcagcccgcg	ttgacgggcc	ggagtcaccg	agcacggcca	ttaggtcgag	ttcccgatca	gtaaaggcca
141	aaactcactt	tcctcaacta	agagattagt	tgacaatacg	ccccgggaat	cggtctgtca	actaatgctt
211	taggtgaaaa	aggggtcaatc	agcgggattt	gggcgcagaa	ttgaagctct	tggcgatgat	caccacagcg
281	ccattctctt	tgagcagcgt	catgtagtcc	accaggaacg	ccgacgggta	gtcgagctcg	atccgcccta

351 tggccgctcgt accggttatt tgagtattgg tgatagtttg cggagggcgt cgtgagcagc cggcttgccg
 421 ggtgcccttg cgtatgactt cgctgatcgg ggtgatcacg atcttcccgt cccggacagag ttgacctctg
 491 cagtgtttgg gagctaagga gaattctacta agcggggatg gggggcctgt tgacaagaaa agagggtcgg
 561 tatatactga accatatggt tcagtattca ccgaagctcg actctgcctt tggcgccctc gccgacccca
 631 cacgccgggg tatttctcgaa cgcctcggca gatccgacgc cggcataaagt gagctcgcgc aggtcttcga
 701 tatcacctcg acgggcatca agaagcacgt cggagtaact gaagcagcgg gcttggtgac taccgagaaa
 771 gtcgggacgg tacgcccgtg caggctgggc ccgcgccgac tggatgacga gaccgcatgg atcgcaactg
 841 atcggcggtg gctcgacggc cgctcaacc ggctcgggga attcctcgag cgtaccaggg agacacaatg
 911 acgaccacta cggagcatga acccactgtg aaagcaacaa ttacgacgcc gacggatcga gagatccaca
 981 tcgagcgcac cttcaatgcg ccgcgcgacc aggtctggaa agcgatgacc gatccacgc tcatcgccca
 1051 gtggtggggc cggggcaaca agctcgtgat cgagaagttc gagctcgagc cgggtggtca ctggagattc
 1121 gtcgagcacg gtccggaggg cgtacacggc ttcgagggac gctttcgcga ggtcacgcgc cgggagcggg
 1191 tggttcaaac gttcgaatgg gacggaatgc ccggttatgt gataattgaa accggagtgc tcgaggacct
 1261 tggcgacggg cgcacgaaat tcgtcaacac atcgctattc cacaccaccg acgagcggga cggattcctt
 1331 caatcgggga tggagggcgg gctcaacag agctacgtcg cactggatgc tctgtcgc atgttcgggt
 1401 agcttcgacg cgctggatca gttgcattgc tggacgtacc cggggccaca tgggcccggg gtacgcccga
 1471 ctgcgctaga ctacaggatt ccccgctgc gcacgcgga gtcgacgttg tccgagatcc acttccagag
 1541 ctcggtctga tcttcgggtg cctcacccgg cgcgatagtg ttgcgccagg tggccatgac ctgctcgtcg
 1611 acagaaatcc aatcgtgggt ttcttcgaga ggtactcgag accgctgacg ttgatcttct tgtacttgct
 1681 caggctgtcg ttcttctccg acggcgtgtc cggcagcccg tccgtgagca tcacgatgtt gagcggagac
 1751 agtaccagat tctgcccgtt gacgagcgta ccgacgcgtg ccgacgcgtg gttgaagtgc gtgagcccg
 1821 cactcgggga atactccttc ctcaagaaac cgggacgtcg cgggacgtg atgttctgga ttggtggat
 1891 cggctggaac gacttcgtct ctcccggctt ctctccaccg aaggagccga cgaatacggc ggtcggctgc
 2031 ttcagtcacc caagtccgtg aaggtggcgg tataggtagt tcccgtagaa gtcgatcgcg ctctcatagc
 2101 ggcccttgcc ctgaaacgat ccaactgacgt cgataccgat gaccagcgtc gatctggcga cccgcgcgcc
 2171 atcccggggt ggcgcgcacg cgacgaccac agtgcgcga agtgccgcga gcgcgtccc agccatgact
 2241 ctgcgagggg tctcatttat gctaccctcg ttctgggacg gtgcgggggt agctttctcg cgcggagtc
 2311 caacgacggg cgggcatcgc ccaatggcgt cgcagcgaga atttccctga gcgactgaa cggcagtgag
 2381 aacattgggt gtgacttgat ggtgacgact gcgaagtga tcgcggcccg cggagagctg gagcacggg
 2451 gagcgaaagc agctcgaaac tgcgctttgc ttctcgttgg aaccacgag ttcccgctt gaggcattg
 2521 accggttcgc gccagagtcc tggctcgatc gctctctcga tgggcccagc cgcacctca tgcgtggacg
 2591 cttgacgcga cagaaccgcc aataacgtg gagttccgaa acgtccgaac aggaaccacg acattccgcg
 2661 tacgcccagc catccaaacg atgccagagc gagggtagca ccaattccga ggtgactga gccgcccagc
 2731 tgctcgccga tccacggtgt gatggcgtcg atcagctcgc atcagctcgc ttcttttcc ttgatcgctt ctgtaacgac
 2801 ccgcgcttcc gacgacgagc atctgtacga tctgcccagc cttcttttcc aacatccaca ggagcggggt catcacacgc
 2871 ctgtacgcag gcaaagcttc cggccaccag catgaacagg aacattccat tgagtgtagg ctgcagcgtg aaggtgaaga
 2941 ggggttcggat gacgcgcac gatcgccac cagacccgat tgcagccag ggcacaccgg gtcacactga aagaacatca
 3011 ctgtcgccct cgaaccgggt gaccagtga gcagcgtgaa tggcgagcgc aggatgcaa ggagaatgtt cttgaccatc
 3081 acgttgccat agcgcaccga accgattacc cagccgacga gcgcgacgcc ggcgacgcc gacgcgtagc attcccgtcc
 3151 agaagagcca aatgcagcgg ccggcatccc accatgccat gagcatcgat gtgatgaagg cgcgcagcgc cgcgcgtcc
 3221 ggaagcgtgt atatgcccag cagcgcgcga gacgctgca cccatgcggg cccgctatg cgcgcgtcc
 3291 atcagcagtg tgacccatgc cgcattggcg ccggtggagc gggcgaggc ttccgctgt cgcgcgtatg ctgatcgtcg
 3361 actgccaagc cgccagccag cgcattggcg ccggtgggac gggcgaggc atgtgtagc ttccgcttgg gggcgcccga
 3501 ataagagcgc aaatgattcg aacatgatca tgcacctcgg agttgtccg agtttgatga acaacgcgtg
 3571 tggttcgaga ttgctggcg cccggtttgc gcccgggac cccaacagc ggcgaattaa ccttcccga
 3641 agctgggata cgcgcttcc cccggtttgc gggagtgatt ggcgtggtat acgcatgta ccaggcgtgg
 3711 ccgcccagag cggttgatgg cttccgccat gggagtggtg cgggaagggc ggcgttgaca cttcacggga
 3781 caacttgatc attggccaat aagaagtttc cgcactcgg ccagacagc catggcgag gctcccaga aagcagcgc
 3851 actgggttcc gaagagcgt cgcacccgcc tactcgcgcc gcgaccgcac ccagcacagt caacagaacc
 3921 cacggcgccc cgtccgatgg cgcacccgcc cagcccgctg gcgcaatgc cgccactgct acgggtagcg
 3991 agcgcgctgg cggtagcagc gcggccgagc caggtgcgcg ttggatcgga cgcgcagacg cgtgatcggg gacctgtcgg
 4061 tcgcgccaac tgcgaaggcg cgggcccagc agagtgcgcg cgtccatga cgtgatcggg gacctgtcgg
 4131 aaggctcgag tcatcgcgcg aatgtgcgc cgggtcaatg tagatgccga ccaattcatc tttctcggcg
 4201 gcgagagcgg gcgtgagccc cgggtcaatg cgcgcgactc cgtatccgcc cgtatccgcc cgtatccgcc
 4271 ttgcaagctc gtggcgctca tgcgcctgc gactagccgc ggcagggcgg cgtatccgcc cgtatccgcc
 4341 ttcgcccgcc gccatcgaca tgcgcctgc gactagccgc ggcagggcgg cgtatccgcc cgtatccgcc
 4411 ccagtcggcg aagccagccg atatgcgcgg tgcgatgtct ttcgaaatgg cgcacctaa gacagtaga
 4481 cggcgggcgc aagccagccg atatgcgcgg tgcgatgtct ttcgaaatgg cgcacctaa gacagtaga
 4551 acgggtcgac tttctagatc gtgccccta gcttgtctgc tgcaacgttc gttagatggc cggcgggagc gaattgcga
 4621 cgaagccgca tccgaatagt gcttgcagat attgcagat acattcgggc atgttgcctt tttgcccaga
 4691 ccgctcggag catgtcaagt cgtaccagcc aaactgagaa tgggtggcgc cttcgatccg tttcgatccg
 4761 gtgatcgctt ggctggaatc cgggttggtt cccgacttcc gttcagacgc gataccgtcg tttcgatccg
 4831 gtcgcctggg ggagcagtcg tcggttggtt caaggtcaac gtcccgtgga tgggtggtgc cgaataaagc
 4901 tgatcttagt gaccgcacc agtgcccgcg gatacgtcgc cgcgaagtcc gtcgagcgc cgcgagcgc
 4971 gagaccagcc atcgagcggc agctccaggg gcaactgac gatcgtgact ggaagccag ggaagccag
 5041 gctacgaccc accgaacgcg aatggcgcgt atggcgcgt gggagaaaac gttcagacgc cttcatggcg
 5111 cattcgcccc cgcccgcgt aatggcgcgt atggcgcgt gggagaaaac gttcagacgc cttcatggcg
 5181 ggcacctgaa cggcagcggc cgcgaagtgt gctcagcat ttgcgcgata ggcgaacagt gaccagctga
 5251 cctgatcgtt attcccgtcg tgatccagat tgcgctgatt agcaccatg tccggtgacc
 5321 gggttaaggc ttcacgggac atctaaccgc atagttcagc tgcaagcaca ctatcaccat
 5391 gacacgttgg ttcacgggac atctaaccgc atagttcagc tgcaagcaca ctatcaccat
 5461 cgcacgttgg ttcacgggac atctaaccgc atagttcagc tgcaagcaca ctatcaccat
 5531 ccgcatccga aaagtgcctg ggatc

7.30 Nukleotidsequenz des Inserts von pAK209

```

1 gatcgctggg taggtcgagg cgcacgtcac gaacgcaacc gacgagcgcg tactgggacg gcgggttcag
71 cgttctgaac ttcttcggct acatggaagg ctactacaat ccgccgcgcc gctactggct gacgctgcgt
141 taccgatccg actgaacatg ggtgcgaatc gtgcgcgcc ccagcttttg cgggcccggg gcttgccctcg
211 cgcccccgcc gcttgattaa gtaccccggt ctttcacagc cgcggggggc ctgagcccc gcgacgtcgt
281 ttatgtcgac acggagactt gtgcggtcca tggaccgcgt gcccaaggcc ctgcccaacc gcgccgtcgc
351 gctcactcac ctcgagcggc tcgaggcgga gagcatccag gtcatgcgcg aggtcgtcgc cgagtgtgaa
421 cggcccgctc tgctctactc gatcggcaag gacagcgcgg tgatgctcga catcgcgctc aaggccttct
491 acccggcgaa gccacccttc ccgctattgc acgtcgacac gaagtggaaa ttccgcgcga tgatcgagtt
561 ccgcgaccgt atggcgcaaa agctcgggtc cgatctgctg gtctacagca accccgatgg gctctcgag
631 ggcacgcggc cgttcacgca cggctccgcg atccacaccg acgtcatgaa gacgcaggcc ttgaagcagg
701 cgctcgacaa gtacggcttc gacgccgcgt tcggcgccgc acgccgcgac gaggaaaaga gccgcgcgaa
771 ggagcgatgc aacggcgctc gctcggcggt ccacgcgcgt gatccgaaag accagcgccc cgagctctgg
841 cggctctaca acgcgcgcaa gcacaagggc gagagcatcc gtgttttccc gatgtccaac tggaccgagc
911 tcgacatctg gcagtacatc tatctgcacg acgtgcccac cgtgccgctg tatttctccg ccgtgcgcc
981 ggtcgtcgcg cgcgacggca cgctgatcat ggtcgatgac gagcggatgc cgctcgcgcc cggcgagagg
1051 ctgctgatga aaaagggtcg tttcgcgctg acctgcgtgc acccgctcaa gggcgctgag gagagcagc
1121 cggacacact gcctgccatc atccaggaga tgctgctcac caccagctcc gagcgacagg ggcgggtgat
1191 cgaccacgac caggcggcat cgatggagaa gaagaagcag gagggtact tctgatggcg cacgtctcgg
1261 agctgatcgg cactgacatc gaggcctatc tcgaggcgca cgagcacaag agcctgctca ggttcatcac
1331 acgcggcgatc gtggacgacg gcaagtcgca acctgcgtgc cggctgctc acgagctgaa acgtactctc
1401 gaggaccagc ttgctgcgct cgaggcgacg tccaagaagg tcggtacgca gggcggggca ctgcacttcg
1471 cgctgctggt agacggactc gcggctgagc gcgagcaggc catcacgacg gacgtggcgt accggttctt
1541 ctcgaccgac aagcgcaagt tcatcgtcgc ggacacgccc ggccacgagc agtacacacg caacatggtc
1611 acgcggcgct cgaccgcgca cctcgcgctg atcctgcgca cgcgcgcgca cgttgctgctg gccgtcaaca agatggatct
1681 gccggcacag ctacatcgtc tcaactgctc gcatccggca cgttcgctgc gagtacctg acttcgctcg gcagatcaag
1751 cgctcgactgc tcgcgcgaga tcttcgacac catcgtcgcc gagtacctg gcgacaacat caaggaccgc agcaccgcga
1821 cttccggagg tcgtcgcgat ccccggtcgc gggctgcgcg gcgacaacat caaggaccgc acgtgaccgc
1891 tgccgtggtg taacggcgcg acgctgatgg ggcacatcga gtcggttcg atcgaggacc acgtgaccgc
1961 cgcgcgcttc cggcttcggg tgcaatgggt caaccgctcc aacctggact tccgggggtt tgccgggacg
2031 atcgtgagcg gggccgtgag tcccgcgac aaggtgcgtg tgctgcgctc ggcgcgcgag agccgcgtcg
2101 cgcgcgctgg ggccatgggc ggggacctga agcgcgcggt ggccggtcag tcggtcacga tcacgctcgc
2171 ggacgagatc gatgccagc gcggcgcggt gttcgcggg gtcgactcgc tgcccggggt cggcgaccag
2241 ttcgagacca cgatcatctg gatgagcgac gagccaatgc ttcccgccg accgtactgg atcaagatcg
2311 gcacgcgcca ggcgaccgcg accatcacgg agcccaaata caaggtgaa gtcaacacgc tggagcact
2381 ggccgcgaa acgctggctt tgaacgagat cggcgtctgc aacctgtcgc tcgaccagat gatcgcgttc
2451 gaccctacg aagagaatcg cgacaccgcg gcgttcatcc tgatcgaccg gttgagcaac gcgacgatc

```

7.31 Nukleotidsequenz des Inserts von pAK210

```

1 gatactccgc gagtgtgctg agctcctgac gcgcgcgctc cggcacctcc ggggcgaccg ctccaaggtt
71 ctccacgcgt ggcaaagcag gaccagcgcc gcggagcagg aaaaaccacg caagcgcgcc gagcacgagc
141 gctccagatg cgatcgctga tatcgatcga gtggcgctgc ggcgggatcg ggacacaagc ggacagggac
211 tagggagtcg ggggactggg ggactggggg actgggggac tggggggact ggggggactg gggaacagag
281 gacttggaag actcggaagt ccccatgtcc ccgagtcctc cctagtcctc cagtccttac aaagttaaca
351 ccatgtcccc cagtcctcga gtccccaggt ccccgagtcg cggcgcgacg atcgtcaccg gcagcaggaa cgtcgagccc
421 atcgaacttc atcccagcgc gcccgagccg cggcgcgacg gcgttcgtga gattgtatcc gtccgcgaac agcgagaccg
491 gaactccacg tgatgttcga agccgggttg gcgttcgtga cgacacgcgc gtccgcgagg atgatgttgt cctgccggcg
561 actgaccttc cgctaccttg aacaccttct agatgcgttg cgagccgtaa ttgatccgt tgacggccgc cgcagaaatc
631 agagctgacg ggctcggtca agctgcgttc cgtatcgccg gcgtgatctc tatgttccac ggcgtcgat
701 gtgcggccgt acggctgacc cgctgcgatg cgtatcgccg tgaaattgta gcggccgttg tctgtgtgta ttgtgtcgtt
771 aggtgccgtg caccttcgct ccccaaccgg tgaaattgta gtcgtgaccg aagtagccgt tcgcgtgtgc gcggttccag
841 cgggttcgcc acatcctgcc gcacgcgcag cagcgaccac gtccggtgct agcgttgatc tcgaacgtgt cgaacgtgt
911 cggtaaccga gaccaccgcg gtattgtgca agcgttgtag aacaggcagt gtgagattcg ccggattcag
981 agaaatcgct gttgcctgcc gttattgtgca agcgttgtag aacaggcagt gtgagattcg ccggattcag
1051 attgaacccc ggaatcgatg cgcgctcgtc ggcgttgccg aggcgcccac cgggcccggg atc

```

7.32 Nukleotidsequenz des Inserts von pAK211

```

1 gatctgggcg tgacctatcc cgttgcgctg gacaatgact tcaaggtctg gcgcgccttc aacaaccagt
71 attggccggc gcattacttc atcgatgccc agggccgcat ccgccatcac catttcggcg aaggcgaata
141 tgaccgctcc gaacgcgtga tccagcaatt gctggcgga gccgggcggc gcgactgccc gcgcgcgac gcgcgcgac
211 gtcgatccga aggcgcaggc agcgcaagcc ccgcgcaacc ttggcgcggt gcgctcgccc gagacctata
281 ccggctatag ccgcggcgcc aatttcgccc ccacgcccct tccggtgaaa tttgaccagc cggcggatta
351 ccggacagcg acaacattgg cgctcaacca atggggattg aacggccgct ggaccgtcgg tccggagaaa
421 tccagctgg agcgcgccgg cggcggtatc gtctctcgct tccatgccc gcacctgcac cttggtctgg
491 cgcgggggccc cggcggaagc cgggtgcgtc tcgggttaac attggagcgc cggccggccc gcccgacca
561 tggcatggac gccgacgtga atggcctggg caccgtcacc accgaacgcc tctaccagct ggtccgccag
631 aaagggggcg tggccgaccg gagcttcgag atcgaaattc tcgaccggg cgcccaagag tttgccttca
701 ccttcggctg agccggaccg gtccatccgg tggcgatcaca ggccatctcc tcgcagttcc cagcttggga
771 ggagtgggcg ccttgccgcg cggggcacga aacccaatat tgcgagttaa cacatttgtg atgccccca
841 gtgcgtaacc taaggcgcta accgtatttt tattgtaatt cagctatttc tggaccatg aaaaagcgcc

```



```

911 tccctctgat tgcgcgccctt gccgccagcc ttgcgcgcgc cggtctgcacc accaccgata cccagtcgct
981 ggcccagaac gaccggttcg agccgtccaa ccgggcgatt ttcaacttca gtatcgcggt cgacaaagcg
1051 gtgcgcgagc cggccgcgcg cttctatcgc gccgcctgtc ccgagcccggt ggcacagggg gttcacacag
1121 cgctggaaaa tctgaatcgc cccgtggtgc tggatgaatga cgtgctgcag gggaagcggt aaaagggcgt
1191 caataccttt ggccgcttca tggatcaattc caccgtcgcg ctggccgcgc tgatcgacgt cgccaccgag
1261 ttccggcattc ccggccatgc caatgatttc ggcatcacgc tgggcaaggg cggggtgcat gaaggctcct
1331 accgtgtgtt gccctttatc ggtcccaatg ccgcgcgcga ccttctgggc aatacggtcg atatcgctt
1401 cgaccccttc acctatatca cctggaacaa ctccaccctt tacatgatgg tccgcggtgg cctgaccgtg
1471 ctggacaagc gcgaagccac gctggaaacc gtggactcca tcgagcgcac ctcgatcgac ttctacgcca
1541 ccacccgcag cctctatcgc cagaaccgca atgcccagat tcgcggcgaa ggcgcaaatg aggatcttcc
1611 aaacttctga acgagccacg ctggaaaaga aaagggcgcg tcaccggcg cctttttgtt ttgtcttggc
1681 ggctgaggct attccgcgcg agcggcggtt ggctcatggc cgaaagcgcc gccatagaaa cgggtgccaga
1751 tgcggccgca ccagctgcgc ccacgatcga gacaccagc ggctggcgca gctcatagcc ctgcgccacc
1821 ctggctcacc accaggccgc cccagcatg gccccatgc tcgtcatgat gatgggagc aagcgatcga
1891 ccgatgtgca atagaccgcc tcgcgcgcgc cgaggttttc cgcccgctgc agctggatgg cgaaatcgat
1961 ggcaggcgcg catgatgatg gcgtttttct tgaccacgcc gatcagcaac atcaccgcga taaaggcgat catgctgaac
2031 tgatgcgga agagcagcag cgccagcag gccccacgc ccgcgacgg cagggttgag aggatgggtg
2101 gcggttgat gtagctctca tagagcatg ccagcacgat atagatgat atagatgat agcccgcatg gaccgagatc
2171 ccagggcagt gacgccatgg actgctgggc cagcccgcc gtgcccataa agcccgcatg gaccgagatc
2241 gggacattga tctctgccat gacgcggtt atcgccgcgc tcgactgacc gagcgtgacg ccttccgcca
2311 cgctgttaga gaaggtggtg gagacgaacc cgtcctgatg ggcatcgac agcggcgcaa tgcggcgccc
2381 catgtgacg aaggccgaca gcggcaccat cttctcgacg cgggtggaga cagcgcgct cgtggagcgc
2451 ccgcgcgcgc gcgcggtcag cgaattctgc tgctggttgc gcaccgcttc cgccgcgcgc tgcgagcgcg
2521 aaagatc
2591

```

7.33 Nukleotidsequenz des Inserts von pAK212

```

1 gatcccgata ccggacgtat cttctgggtc aagttcaacc aggggttcggc gccgcgcgcg aaccgggaag
71 tggccttctc ggacgatggt ggatcgacct ggactgtcgc gtcagcgtgt tgcctcgaag cggaaaaactc
141 acggttgatt accgcgcgtc cgacacctgg gggaccgcaa ccggtcggtt atcccaagc ggtctatctt
211 tgctctaaca cgtcgtctgt cgggtggcgtc ggggttcccc gggtcggtgt agtgtgtctc cgatcactcg
281 acggcgggat cacgtacacg atcgtaagcc tgctgtttct gaagccgata cccaagtacg aggagtgcct
351 gccctacggg gaatatattt gagccagcga gggcgcgat cccgaagccg ggcccaacgg atcgttgtac
421 gtcacgtgtc actgcggcat cggccatct accctgcgcg cagcgacgac gaaggcgtga
491 cctggccgat tctgaggag attccgttcg gacaggagtt gcgcgtggat tccgacggga acctgtacat
561 ggctcgcacg aaccgcgtga acgatgcgcc cttgctgcaa atttctcgcg atgaaggccg cacttggaac
631 cactccgttg agatcacgcc gcccgcggtt gaagctcact cgcaccatcc cgagaacaac gcgttcgaga
701 ccacagtcgc tgccgcctat tggcccgacg atttcacctc gtatcagtg tacatgcagg tgttcgccc
771 gggcgtgatc gcgttcaact tctacggacg acaagccctc cgctcggagt gggatgggtg gatcagcatg
841 agtcgcgatg cgctcgcac cgagcccggt tgggtggcg catcaacaaa cccgcgcgtc ctctctctta
911 ccaacggggc attcgccggc gagtacagct accgaaacga gcacgtcggg ctcggtttcg ggtcagacgg
981 aagcccggtg gggagcttca ctgatggtgc aaccggtac gctgcgcgc gcccgacgct tgctgtgcc
1051 tggactgatt catcatcgag cggcaaacgg ccgcgattcc atccagcatg agcacgatgc cctccagacg
1121 aggacggcgt cctgcgtcgg accgtaactg ccaccaatcg tcggtcccag gtccgaggtc agcggcgatt
1191 cgatgacaag tgaacgaagc gccgtgccga aagccatccc gtgctcgggt gctctcgttg ccgtcaagac
1261 gatcagcgca tgcgtgacac agatgaacac agttcacctc tctgagttg tgagcgttcg cgttcgaaacg
1331 gccgcggctt cccatgtcgt ccggcacgtg ctctggacga aggtctctgc atgcgaacgc atgtaccagg
1401 gaacccgaag cgatgtgtga gccagtgttc cgtcgaagcg ggcgcgatac gtttcgttcc tgacggcgtc
1471 gtgcgcacat gagacgacgt acgtgaacgg ccggccgaga acggacgctt gtgcgacca gctcgtctgc
1541 gtgtccattg gtgcggcgaa cagaacaaca tcaagcccca acgagcgaa atcgcgcgac ggtcgggtga
1611 cctccgctcg tgaggagccg tcgagatagg ccgcacgtag caggttgatt cccatcgatc gcatacgcg
1681 gactgcggcg tcggtggcaa atgccgatga gcggacgcgc atgacgccga ccttgccggc gagcgttccg
1751 ctgtttttgc cccaccggcc gaggtcgtcg aggtctctct cgagtcgcgc ccggctggaa agcacttgcc
1821 cgcctccgcc caccggcgga gcatcgccat cggcgctcaaa ggcgatc

```

7.34 Nukleotidsequenz des Inserts von pAK213

```

1 gatccagtcg gacgatagga cctggacgga caccaacaga gacaacatcg cgcaggaaac cgagatcggg
71 ccgagcaaca acgcggcatt cgggctgcgc ttctatcgc gccggcctga tcttgacgga ctggatcgcg
141 aatacgacat cgagaccagc ctgcgtattc agcacgagct gatgcgtggc ctctcagtat ctggttcattg
211 gttccggcgc tcgaggctca acgagctgag caccgacaac cagttgatca gtttcgccga ctacttccca
281 gtgaacgtgt acagcccgat cgatggtagc gagataacgg gatatcaagc gaactgaagc aagcgtgccc
351 gcttctccag atcgacacca actccacaga cggcgacaag cgttccagga tctacaacgg gctcagattc
421 gggatgacgg gtgcctcca tggcgctcg ttcttcggcg gctggaccgt cgataacttg atcaatgtgg
491 actgcgacac ggtcgacaat ccgaacaacc tgaggttctg cgaccagcgc aactacgata tgcccctgcg
561 gcacgagttc aagctgtcgg ggtcgtacac ggtcgtacac gacattcaag tgaacggcgc tctccagagc
631 tatgcgggtc cggttcgtgg aacgacctgg agcatcgcca cgacgacgcg ctacgctcgc gattgcctcg
701 gcgcgtgcac ccccggcgcg ttcgtgattc cgaacctgct acccgccccg ggtggcgga cgacactcag
771 tgtggccttg gccgagccgg gatc

```

7.35 Nukleotidsequenz des Inserts von pAK214

```

1  aaaaaaactact tacttccatc ggataatata ccaaatcctg tacaatgtac tcccatggca ttgtcgtatg
71  ataatgttta aaggctgcag catcatctat ttttcttaat aaaatccctt gtccgcccac ttccggcttt
141 acaatgaaag ggtaatttat tttatgttgc agtaactttt gctctagaat gaaaaaatcc tcctttggaa
211 gtacataaaa tgtaggtgga taaaagccat gaggtaataa cgcatacatt tccttttttag gttcaccttc
281 cattccccca aagggttaatt ttggattact ggatgtaaaa aaccaaaccg caccggattt tccggtatac
351 cataaccaaa aaaccgacaa cggagtgtaa atcaatttaa atggccaggc ttcccaatta gtaattttat
421 taattattct atttgctata ttcat ttgaa ccgcaaaaaa aacatgaaaa aagtaacaat aaacactccc
491 cctaaaacat caaacaatta gttacatttg cttactgaa acataaatgt tatgacgta ccaacaatgg
561 cggaaatgat gggaaggc gaaagtctg atgtttttatt ttgggtagg tgtgcaggaa gttatgacca
631 gcgggctcaa aaaataacaa aggcatttgc aacaatcctt aataaagtag gcattaattt tgcaattttg
701 ggtaacgagg aagcttgca cggagatccg gcaagacgcg ctggtaacga atttatgttt caaatgatgg
771 catatcagaa tattcaata ttgaatggct acggcatcaa aaaaatcggt acagcgtgcc caccattgtc
841 taatacatta aaaaatgaat accccgaatt aggggggaaat tatgaagtaa tacaccatgc tactttttta
911 caacaattga tagacgaggg taaaataatc atgaaggaa ggggcacttt taagggggag aaaattacgt
981 atcatgatag ttgttactta gggagggcca acaatat tta tgatgcccc cgtaaagat tgagggcatt
1051 gaacctagaa ttggttgaaa tgaaacgttg caggtttcac ggtttatgtg aggtgcacaa
1121 atgttttaaag aagaggaaaa aggagtcacc cgtattaact ttgaaagaag caatgaagca atagccaccg
1191 gcgctggcat cattgcggca gcctgtcctt tttgtaatac catgctgtta gacggagtta aaaacagcaa
1261 taaagaagaa gccgtacagg tacttgatag agctgaatta atagcagtaa ccatttataa tatttattat
1331 gaacctagaa ttccagcaac agctaccagc cagctttcac gattcatcaa ggtgtgctgg caccagagc
1401 agccgtttat tctttataag cgaggcttta caaattgaag aaatacttga aaattttgtt ggagaatgga
1471 agagccatgg tgctgctgta aagggtctatg ccaatatcct ttttgacag tttattgttt tgatggcaga
1541 cgaaacctcg ataggtgtgg gaggtgttag tacagacagt tctgtacggg tgatcaggga aatagaaaag
1611 ttaatgaacg tacaactttt tgaaaggcaa aacctggcat tttttgtaa agaaaaata cagttattac
1681 cgctgtctca atttacttac gctgtggaat ataaatttat tgacgaggat accttgtatt tcaataatac
1751 agtcttaaca aaaaaagagt tgctccaaaa ctggatc

```

7.36 Nukleotidsequenz des Inserts von pAK215

```

1  gatcctgaat tcttttcagt cacctttggt gcgggcgggt ctaccactga ccgtacccaa gaaaccgtat
71  ttgaaattca ggcagagggt tatcatgctg cgccgcata tctttgtatc tcttctagca aggaagaaat
141 tcgtgaattg ctggcggcat atcaagccaa aggcattaag cgcctcgtca ccttgctgg tgatgtgccc
211 tcaggcgagg tgagtgcggg tgatttttaag tatgccaatg agttggtgag ctttatccgc caagagacag
281 gtgattgggt tcacctggaa gtggcggtt atccagagtt tcaccggag gcgctatccg cagctaaaaga
351 tatggccaat tttaagcgt aagggtgaagc tggagctaat tcggcgatta cacagtactt ttacaactct
421 gatgcgtatt ttaggtttgt ggatagttgt gtggcggtat gcattagtgt gccaatgtg cctgggtatta
491 tgcctattta taactacact caattagcac gtttctcagg cgtgtgtggt gctgaaattc cgcgttgggt
561 gcgtctgcgc ttagaggctt atgcagacga catgccttcg ttacgtgcgc ttggcattga tgtggtgagt
631 gaattatgag aagttttatt ggcagggggc gtgcccagtt tgcattttta caccttaaac caagctggca
701 ttattagcac gattatcaat aatgttgggt tgggaagacgc cagcactcag aaacgtaatt aaagccaaag
771 gcttagttta acctgcatga cagaaaaatt agtgaatggg gagggcacgc ggggttaata tggcgctctc
841 taaaaataaa taatcttttt cgcgacctgc attccatagt gcaatcatgg taatccaaag catttcttca
911 atctggatat gctcttgctt gagcgccatc gcgcgggtcaa taattaaatc gcgttcaaca tcgttaatga
981 ctttggcttg ttgtagaaat aaaataaagc tgatgctttc agtattgatt tttttaagtt caatgtcagc
1051 gaacatacgc gttgctgtat cttgatgtgc ataaaccgta gcgggttgat gcagcatgg tttcatctca
1121 tcaaacacgc tcaccgcccc ataaatatca gattgtgcaa atcctgctgc ggacagtcca atggtcaata
1191 cttcgctgtc aggtgtgtgc tgatttgcaa agtaattttc aaacatgaac actaaaactt caaacatagt
1261 caccctata atttaagatg gaatctattt ttattactta gtattctcgc gactgaaatt taaatcaggc
1331 gctgatattg gttgcctgca acggttgcca ctttaccttc caattccaac atcataagca tggctgaaag
1401 tgtttcagtc gtcaatgctg tgcgatc

```

Danke !

Mein besonderer Dank gilt Herrn Prof. Dr. G. Gottschalk für die Überlassung des Themas, das Ermöglichen eines selbstständigen wissenschaftlichen Arbeitens, sein großes Interesse am Fortgang der Arbeit und die mir stets gewährte Unterstützung.

Herrn Dr. Rolf Daniel danke ich für die freundschaftliche Betreuung während der Promotion, viele interessante Gespräche, die gewissenhafte und engagierte Durchsicht des Manuskripts dieser Arbeit ...und natürlich die erstklassige ärztliche Versorgung bei Notfällen.

Bei allen jetzigen und ehemaligen Mitgliedern des Labors 201 Susanne, Corinna, Anke, Caro, Luciana, Tanja W., Claudia, Jessica, Frank, Falk, Baris, Tanja L., Maike, Elke, Alan, Sebastian, Söhnke und Jörg möchte ich mich für die nette Arbeitsatmosphäre und auch den für Spaß bei gemeinsamen Aktionen außerhalb des Laboralltages bedanken.

Ein besonders herzliches Dankeschön geht dabei an Susanne, die mir in der zweiten Hälfte der Promotion mit Rat und Tat zur Seite stand. Danke auch für die vielen schönen Gespräche. Liebe Susanne, ohne dich hätte ich das niemals geschafft !

Auch bei Tanja möchte ich mich noch einmal fürs unermüdliche Platten gießen, Elektroporieren und Platten auswerten bei der Suche und Auffindung der ADHS bedanken. Danke für die große Unterstützung !

Furthermore, I would like to thank Mr. Gregg Whited and his collaborators for the nice time at Genencor in Summer 2001. Thank you Gregg for the fast (sometimes very fast) introduction into the secrets of protein purification without His₆-tag and for showing San Francisco to me !

Allen Mitgliedern der G2L, die an der manchmal doch sehr mühseligen Sequenzierung all meiner Plasmide beteiligt waren, danke ich für ihre Hilfsbereitschaft. Ein besonderer Dank geht dabei an Anke für die Beschaffung diverser „Extra-Gele“.

Noch ein Dank an Tanja und an Anke, die beim Lesen des Manuskripts dieser Arbeit dem Fehlerteufel immer dicht auf den Fersen waren.

Ein Dank geht außerdem an die jetzigen und die ehemaligen Mitglieder des Werkstatt-Teams mit Olaf Waase, Gerd Birke Charly Bertram und Jürgen Steckel für die vielen kleinen und großen Hilfen in den vergangenen Jahren.

Weiterhin möchte mich bei allen Mitarbeitern des Instituts bedanken, die mir mit Rat und Tat zur Seite standen.

Mein ganz besonderer Dank geht an meine Eltern und meine große Schwester Beate für ihre liebevolle Unterstützung aus nah und fern !

Meinem liebsten Michael danke ich für seine Liebe und sein Verständnis. Danke, dass es dich in meinem Leben gibt !

Lebenslauf

12.02.1973	geboren in Salzgitter
1979 – 1983	Besuch der Grundschule in Salzgitter-Gebhardshagen
1983 – 1985	Besuch der Orientierungsstufe in Salzgitter-Gebhardshagen
1985 – 1992	Besuch des Gymnasiums am Fredenberg in Salzgitter
Oktober 1992	Immatrikulation an der Georg-August-Universität zu Göttingen für das Studienfach Biologie
Oktober 1994	Diplomvorprüfung in den Fächern Mikrobiologie, Zoologie, Anorganische Chemie und Physikalische Chemie
Februar 1998	Diplomprüfung in den Fächern Mikrobiologie (Hauptfach), Immunologie und Organische Chemie
März 1998 – Mai 1999	Anfertigung der experimentellen Diplomarbeit am Institut für Mikrobiologie und Genetik unter Anleitung von Prof. Dr. G. Gottschalk und Dr. Rolf Daniel mit dem Titel „Identifizierung neuartiger Glycerin-Dehydratasen“
Juni 1999	Beginn der experimentellen Arbeiten zur vorliegenden Dissertation