Aus der Abteilung Molekulare Neurobiologie
(Leiter: PD Dr. rer. nat. N. Brose)
des Max-Planck-Instituts für Experimentelle Medizin
in Göttingen

**α -Synuclein: Synaptische Funktion und Rolle bei der
Pathogenese der Parkinson-Syndrome**

INAUGURAL - DISSERTATION

zur Erlangung des Doktorgrades

der Medizinischen Fakultät
der Georg-August-Universität zu Göttingen

vorgelegt von

Dr. rer. nat. Oliver M. Schlüter

aus

Göttingen

Göttingen 2001

Dekan: Prof. Dr. med. M. Droese

I. Berichterstatter: PD Dr. N. Brose

II. Berichterstatter/in: Prof. Dr. med. W. Paulus

Tag der mündlichen Prüfung: 14. Juni 2002

1	Einleitung	1
1.1	Anatomische und funktionelle Grundlagen.....	1
1.2	Dopaminerge Systeme.....	2
1.3	Parkinson-Syndrome	2
1.4	α -Synuclein	4
2	Zielsetzung	6
3	Material und Methoden	7
3.1	Geräte	7
3.2	Computerprogramme und Internetzugänge	8
3.3	Verbrauchsmaterialien.....	8
3.4	Chemikalien.....	9
3.5	Chemikalien für die Zellkultur	11
3.6	Kits	12
3.7	Antikörper	12
3.8	Plasmidvektoren	14
3.9	Genbibliotheken	15
3.10	Synthetische Oligonukleotide.....	15
3.11	Bakterienstämme	17
3.12	Zelllinien.....	17
3.13	Zuchttiere.....	17
3.14	Medien und Lösungen	17
3.15	Methoden.....	18
3.15.1	DNA-Amplifikation über die Polymerasekettenreaktion.....	18
3.15.2	Polymerasekettenreaktion für die Genotypisierung.....	19
3.15.3	Subklonierung von Plasmid-DNA.....	19
3.15.3.1	Herstellung elektrokompenter Bakterien.....	19
3.15.3.2	Transformation von Bakterien.....	19
3.15.3.3	Blau-weiß-Selektionstest.....	19
3.15.3.4	Testung auf gewünschte Klone über radioaktive Sonden	20
3.15.3.5	Testung auf gewünschte Klone über PCR.....	20
3.15.4	Präparation von DNA.....	20
3.15.4.1	Phenol/Chloroform-Extraktion	20
3.15.4.2	DNA-Präzipitation	20

3.15.4.3	Isolierung von DNA-Fragmenten aus Agarosegelen.....	20
3.15.4.4	Plasmidschnellpräparation	21
3.15.4.5	Plasmidpräparation hoher Reinheit	21
3.15.4.6	Präparation genomischer DNA aus Gewebeproben	21
3.15.5	Kurzlyseprotokoll für genomische DNA von Gewebeproben	21
3.15.6	DNA-Analyse	22
3.15.6.1	Konzentrationsbestimmung.....	22
3.15.6.2	Restriktionsverdau von DNA.....	22
3.15.6.3	DNA-Sequenzierung	22
3.15.7	Modifikation von DNA	22
3.15.7.1	Dephosphorylierung der 5'-Enden von DNA	22
3.15.7.2	Ligation von DNA.....	22
3.15.7.3	Zielgerichtete Mutationen, eingefügt über die Polymerase-Kettenreaktion.....	23
3.15.7.4	Auffüllen und Verdau von überstehenden Enden nach Restriktionsverdau.....	23
3.15.7.5	Radioaktive Markierung von DNA	24
3.15.8	DNA-Gelelektrophorese.....	24
3.15.9	DNA-Transfer auf Nylonmembranen nach Southern.....	24
3.15.10	Hybridisierung	24
3.15.11	Klonierung aus Phagen-Genbibliotheken.....	25
3.15.11.1	Screening einer Phagen-Genbibliothek	25
3.15.11.2	Phagenamplifikation.....	25
3.15.11.3	Präparation von λ -Phagen-DNA	25
3.15.11.4	Subklonierung der genomischen Klone	26
3.15.12	Sequenzanalyse und Datenbanksuche	26
3.15.13	Gewinnung von Gewebehomogenaten.....	26
3.15.14	Subzelluläre Fraktionierung	26
3.15.15	Proteinpräzipitation	27
3.15.16	Präparation von GST-Fusionsproteinen	27
3.15.16.1	Überexpression von Fusionsproteinen in E. coli.....	27
3.15.16.2	Reinigung von Fusionsproteinen.....	27
3.15.16.3	Proteolytische Spaltung von Fusionsproteinen	27
3.15.16.3.1	Thrombin	27
3.15.16.3.2	TEV-Protease	28

3.15.16.4 Gelfiltrationschromatographie.....	28
3.15.17 Immunisierung von Kaninchen	28
3.15.18 Messung der Neurotransmitteraufnahme	28
3.15.18.1 Synaptosomaler Transport.....	28
3.15.18.2 Vesikulärer Transport.....	29
3.15.19 Nitrosylierung von Tyrosinresten in Gewebehomogenaten	29
3.15.20 Methoden zur Proteinanalyse	29
3.15.20.1 Konzentrationsbestimmung von Proteinen	29
3.15.20.2 SDS-Polyacrylamidgelelektrophorese.....	30
3.15.20.3 Proteingelfärbung mit Coomassie Brilliant blue.....	30
3.15.20.4 Immunoblotanalyse	30
3.15.20.4.1 Protein-Transfer nach Western.....	30
3.15.20.4.2 Immunodetektion von Proteinbanden.....	31
3.15.20.4.3 Quantifizierung von Proteinbanden.....	31
3.15.21 Methoden für die Immunzytochemie	31
3.15.21.1 Fixierung von Mausgewebe	31
3.15.21.2 Fixierung von neuronalen Primärkulturen	32
3.15.21.3 Bereitstellung von Gewebeschnitten	32
3.15.21.4 Gelatinebeschichtung von Objektträgern	32
3.15.21.5 Immunofärbung von Gewebeschnitten und Primärkulturen	32
3.15.22 Heterologe Expression in 293-Zellen.....	33
3.15.22.1 Einfrieren und Auftauen von eukaryontischen Zellen.....	33
3.15.22.2 Passagierung von eukaryontischen Zellen.....	33
3.15.22.3 Kultivierung von 293-Zellen.....	33
3.15.22.4 Transfektion über Calciumphosphat-Kopräzipitate	33
3.15.22.5 Gewinnung von Zellhomogenaten	34
3.15.23 Erstellung hippokampaler Primärkulturen	34
3.15.23.1 Vorbereitung der Deckgläschen für die Kultur	34
3.15.23.2 Hippokampuspräparation	34
3.15.23.3 Neuronenkultur.....	34
3.15.23.4 Astrozytenkultur.....	35
3.15.24 Herstellung rekombinanter embryonaler Mausstammzellen.....	35
3.15.24.1 Kultivierung von E14.1-Zellen.....	35

3.15.24.2	Kultivierung von embryonalen Mausfibroblasten.....	35
3.15.24.3	Transfektion von E14.1-Zellen.....	36
3.15.24.3.1	Vorbereitung des Rekombinationsvektors	36
3.15.24.4	Selektion von homolog rekombinierten E14.1-Zellen	36
3.15.24.5	Isolierung der resistenten Klone.....	36
3.15.24.6	Vorbereitung für die Blastozysten-Injektion	36
3.15.24.7	DNA-Isolierung aus in 96-Lochplatten kultivierten E14.1-Zellen.....	36
3.15.25	Pharmakologische Behandlung von Mäusen.....	37
3.15.25.1	Quantifizierung der Neurotransmitter	37
3.15.25.1.1	Catecholamine	37
3.15.25.1.2	Aminosäuren.....	37
3.15.25.1.3	Proteinbestimmung nach Lowry.....	38
4	Ergebnisse	39
4.1	Klonierung und Charakterisierung von Synuclein-Isoformen aus Mensch und Ratte ...	39
4.2	Klonierung eukaryontischer Expressionskonstrukte	41
4.3	Einfügung der Missense-Mutationen der familiären Parkinson-Syndrome	41
4.4	Erstellung bakterieller Expressionsvektoren	41
4.5	Klonierung von Vektoren zur Herstellung transgener Mäuse	42
4.6	Klonierung und Charakterisierung des Maus- α -Synuclein-Gens.....	43
4.7	Klonierung eines Rekombinationsvektors für das α -Synuclein-Gen	43
4.8	Antikörperherstellung und -charakterisierung.....	44
4.9	Verteilung von α - und β -Synuclein im Mausgehirn	46
4.10	Subzelluläre Verteilung von α - und β -Synuclein.....	49
4.11	Erzeugung von Maus- α -Synuclein-Nullmutanten.....	51
4.12	Charakterisierung der Maus- α -Synuclein-Nullmutanten	51
4.13	Pharmakologisches Tiermodell eines Parkinson-Syndroms.....	57
4.14	Untersuchung der C57Bl6/J/ola/hsd-Mauslinie	60
4.15	Untersuchung der Modulation des synaptischen Dopamintransports durch α -Synuclein	61
4.16	Herstellung und Analyse transgener, α -Synuclein überexprimierender Mäuse	63
4.17	Untersuchung neurologischer Ausfälle durch Mutationen der familiären Parkinson-Syndrome	67
4.18	Symptomverstärkung in doppelt-transgenen Mäusen	67

4.19	Symptomatik bei Imitierung eines konstitutiv phosphorylierten Serin-87	68
4.20	Vergleich der Expressionsstärke mit der Schwere der neurologischen Ausfälle	69
4.21	Einfluß der α -Synuclein-Mutanten auf das dopaminerge System.....	69
4.22	<i>In-vitro</i> -Nitrosylierung von α -Synuclein.....	73
5	Diskussion	74
5.1	Physiologische Funktion von α -Synuclein.....	74
5.2	Pharmakologisch induziertes Parkinson-Syndrom.....	76
5.3	Rolle von α -Synuclein in der Pathogenese der Parkinson-Syndrome.....	78
6	Zusammenfassung.....	82
7	Summary	83
8	Literaturverzeichnis.....	84

Abkürzungen und Anglizismen

Viele wissenschaftliche Begriffe entstammen dem englischen Wortschatz und können nur schwer ins Deutsche übersetzt werden. Die hieraus verwendeten Begriffe und Abkürzungen sind im folgenden erläutert:

3' oder 5'	Bezeichnung des DNA-Strangendes, das die 3'- bzw. 5'-Hydroxylgruppe des Zuckers des DNA-Rückgrats trägt.
AMBA	Acrylamid-/Bisacrylamid-Lösung
APS	Ammoniumperoxodisulfat
AS	Aminosäure
ATP	Adenosintriphosphat
BSA	Rinderserumalbumin
cAMP	zyklisches Adenosin-3', 5'-Monophosphat
cDNA	komplementäre DNA, die durch revers transkribierte mRNA erhalten wird
cfu	<i>colony forming units</i>
CTAB	Cetyl-Trimethylammoniumbromid
C-terminal	am Carboxylende eines Proteins gelegen
dCTP	desoxy-Cytidintriphosphat
DMEM	Dulbecco's <i>modified eagle medium</i>
DMF	Dimethylformamid
DNA	Desoxyribonukleinsäure
dNTP	äquimolare Desoxyribonukleotidtriphosphatmischung
D-PBS	Dulbecco's PBS
DTT	Dithiothreitol
ECL	<i>enhanced chemoluminescence</i>
EDTA	Ethylendiamintetraessigsäure
EST	<i>expressed sequence tag</i>
g	Erdbeschleunigung
GAPDH	Glycerinaldehyd-3-Phosphatdehydrogenase
GDI	GDP <i>dissociation inhibitor</i>
GDP	Guanosin-5'-Diphosphat
GST	Glutathion-S-Transferase
GTP	Guanosin-5'-Triphosphat
HEPES	N-2-Hydroxyethylpiperazin-N-2-Ethansulfonsäure
HRP	Meerrettich-Peroxidase
IgG	Immunglobulin G
<i>insert</i>	in einen Vektor klonierte DNA-Sequenz
IP-3	Inositol-3-Phosphat

IPTG	Isopropyl- β -thiogalactopyranosid
kb	1000 Basenpaare
K _D	Dissoziationskonstante
kD	Kilodalton
KO	<i>knockout</i> = Nullmutante
<i>lift</i>	durch Auflegen einer Nylonmembran auf Agar adsorbieren z.B. Phagen an dieser
mRNA	<i>messenger-</i> oder Boten-RNA
Munc	<i>mammalian unc (uncoordinated movements) homolog</i>
NACP	<i>non-Aβ component of AD amyloid protein</i>
NEB	New England Biolabs GmbH
NMDA	N-Methyl-D-Aspartat
<i>Northernblot</i>	über Kapillarkwirkung erzielter RNA-Transfer vom Gel auf Membranen
NSF	<i>N-ethylmaleimide-sensitive factor</i>
N-terminal	am Aminoende eines Proteins gelegen
OD	optische Dichte
PAGE	Polyacrylamidgelelektrophorese
PBS	phosphatgepufferte physiologische Kochsalzlösung
PCR	Polymerasekettenreaktion
PET	Positronen-Emissions-Tomographie
pfu	<i>plaque forming units</i>
Pfu	<i>Pyrococcus furiosus</i> , thermophiler Bakterienstamm
pH	negativer dekadischer Logarithmus der Protonenkonzentration
PMSF	Phenyl-Methylsulfonyl-Fluorid
PNS	<i>post nuclear supernatant</i>
<i>post nuclear supernatant</i>	Überstand einer Zentrifugation bei 1000x g eines Gewebehomogenates, durch die Zellkerne und Kern-haltige Zellen sedimentiert werden
Primer	synthetisch hergestellte einzelsträngige DNA, die z.B. als Starter-moleküle für PCR-Reaktionen verwendet werden
Rim	<i>Rab3 interacting molecule</i>
RNA	Ribonukleinsäure
rpm	<i>revolutions per minute</i> (Umdrehungen pro Minute)
SCAMP	<i>secretory carrier membrane protein</i>
SDS	Sodiumdodecylsulfat
SDS-PAGE	SDS-Polyacrylamidgelelektrophorese
SNAP	<i>soluble NSF-attachement protein</i>
SNAP-25	<i>synaptosome-associated protein of 25 kD</i>
SNARE	SNAP-Rezeptor
<i>Southernblot</i>	über Kapillarkwirkung erzielter DNA-Transfer vom Gel auf Membranen

<i>tag</i>	In dieser Arbeit als Bezeichnung für kurze an ein Protein angefügte Aminosäuresequenzen, über die dieses affinitätschromatographisch gereinigt werden kann oder die als Antigen für die Immunodetektion dienen
Taq	<i>Thermus aquaticus</i> , thermophiler Bakterienstamm
TCA	Trichloressigsäure
TEMED	N, N, N', N'-Tetramethylethyldiamin
TEV	<i>tobacco envelope virus</i>
U	<i>Unit</i>
UCHL	Ubiquitin-Carboxylterminale-Hydrolase
UTR	5' oder 3' gelegener nicht translatierter Sequenzabschnitt der mRNA
<i>Westernblot</i>	durch ein elektrisches Feld erzielter Protein-Transfer vom Gel auf Membranen
wt	Wildtyp
X-Gal	5-Brom-4-Chlor-3-Indolyl- β -Galactosid
ZNS	Zentralnervensystem

1 Einleitung

1.1 Anatomische und funktionelle Grundlagen

Das Zentralnervensystem besteht aus schätzungsweise 10^{11} Neuronen, die miteinander über Neurotransmitter kommunizieren. Als Neurotransmitter dienen die Aminosäuren Glutamat und Glycin, GABA sowie Monoamine, insbesondere Dopamin, Serotonin und Histamin. Glutamat wirkt über seine Rezeptoren erregend auf die nachgeschalteten Nervenzellen, während GABA und Glycin inhibierend wirken.

Systematisch unterteilt man das Gehirn von kaudal nach rostral in Rautenhirn, Mittelhirn, Zwischenhirn und Endhirn. Das Endhirn enthält als oberstes Integrationszentrum zentralnervöser Prozesse die Großhirnrinde und als akzessorisches Zentrum sowohl motorischer als auch mentaler Aktionen Anteile der Basalganglien. Die Basalganglien bestehen aus Nucleus caudatus, Putamen, dem dem Zwischenhirn angehörenden Globus pallidus und dem dem Mittelhirn angehörenden Nucleus subthalamicus sowie der Substantia nigra. Funktionell und zytologisch werden der Nucleus caudatus und das Putamen als Striatum zusammengefaßt. Die Substantia nigra besteht aus der Zona compacta, die große Neuromelanin-haltige Neurone des dopaminergen Systems enthält, und der Zona reticulata, die zytologisch dem Globus pallidus gleicht.

Abb. 1: Schematische Darstellung der neuronalen Verschaltung in den Basalganglien. Glutamaterge Neurone des Cortex innervieren zwei Haupttypen von inhibitorischen Neuronen im Striatum. Der eine Typ koexprimiert die Neuropeptide Dynorphin und Substanz P und projiziert direkt auf den Globus pallidus internus (GPi) und die Substantia nigra pars reticulata (SNr) (direkter Weg). Die andere Gruppe der GABAergen Neurone exprimiert Enkephalin und projiziert über den indirekten Weg über den Globus pallidus externus und den Nucleus subthalamicus auf den Globus pallidus internus bzw. die Substantia nigra pars reticulata. Von diesen wird der Thalamus gehemmt, von dem glutamaterge Neurone zurück in den Cortex projizieren. Die GABAergen Neurone im Striatum werden weiterhin von lokalen cholinergen Neuronen (ACh) stimuliert bzw. von dopaminergen Neuronen aus der Substantia nigra pars compacta inhibiert. GABAerge Wege sind durch gestrichelte Pfeile, glutamaterge durch durchgezogene Pfeile, dopaminerge durch graue Pfeile und cholinerge durch Pfeile mit offener Spitze dargestellt.

Als akzessorisches motorisches Zentrum unterstützen die Basalganglien die Willkürmotorik über Steuerung des Muskeltonus von Agonisten und Antagonisten (Abb. 1). So führen Erkrankungen der Basalganglien zu hypo- oder hyperkinetischen Syndromen, wie etwa den Parkinson-Syndromen, der Chorea Huntington, dem Hemiballismus und anderen. Die Eingangsstruktur bildet das Striatum, dessen Haupt-Innervation glutamaterg aus dem prämotorischen Cortex auf das Putamen erfolgt. Die Ausgangsstruktur bilden der Globus pallidus internus und die Substantia nigra pars reticulata, von denen GABAerge Bahnen zum Hirnstamm und dem Thalamus ziehen. Vom Putamen ziehen zwei Bahnen über verschiedene Stationen zum Thalamus. Der direkte Weg führt GABAerg zum Globus pallidus internus und über ihn zur Anregung des Thalamus, während der indirekte Weg GABAerg zum Globus pallidus externus und Nucleus subthalamicus und glutamaterg zum Globus pallidus internus zieht und dadurch zur Inhibition des Thalamus führt. Der direkte und indirekte Weg steuert Agonisten und Antagonisten der Muskeln und wirkt daher synergistisch. Der direkte und der indirekte Weg werden über dopaminerge Fasern aus der Substantia nigra moduliert, die je nach Dopaminrezeptorsubtyp inhibierend oder stimulierend wirken.

1.2 Dopaminerge Systeme

Das dopaminerge System wird in vier Bahnen unterteilt. Der nigrostriatale Trakt zieht von Neuromelanin-haltigen Neuronen der Substantia nigra pars compacta zum Striatum. Wie oben erwähnt, wirkt er modulatorisch auf die akzessorische motorische Funktion der Basalganglien. Reduktion der dopaminergen Zellen und Dopaminantagonisten führen zu Hypokinese, Rigor und Tremor.

Der mesokortikale Trakt entstammt dem ventralen mesenzephalen Tegmentum und innerviert den anteromedialen Frontalkortex. Erkrankungen dieses Systems führen möglicherweise zu kognitiven Störungen bei Parkinson-Syndromen.

Der mesolimbische Trakt zieht vom ventralen mesenzephalen Tegmentum zum limbischen System. Er reguliert Stimmung, Affekt und Antrieb, und indirekte Dopaminagonisten wie Kocain führen hier zu Halluzinationen. Die Wirksamkeit von Neuroleptika bei der Behandlung von Psychosen wird durch einen Effekt auf dieses System erklärt.

Tuberoinfundibuläre Bahnen innervieren die Hypophyse aus dem Hypothalamus. Sie führen zur Hemmung der Prolaktin-Freisetzung. Daher können Dopaminantagonisten wie Bromocriptin zum Abstillen verwendet werden. Neuroleptika wirken ebenfalls auf diese Bahnen und können als unerwünschte Wirkung zu Laktation führen.

1.3 Parkinson-Syndrome

In Parkinson-Syndromen kommt es zu einer Degeneration dopaminerger Neurone in der Zona compacta der Substantia nigra (SNc). Beim idiopathischen Parkinson-Syndrom, dem Morbus Parkinson, sind die ventrolateralen Anteile, die zum Putamen ziehen, besonders stark betroffen. Charakteristisch für Parkinson-Syndrome sind eosinophile intrazytoplasmatische Einschlusskörperchen, die Lewy-Körper, die in dopaminergen Neuronen der Substantia nigra, aber auch in anderen Neuronen vorkommen. Lewy-Körper kommen aber auch bei anderen neurodegenerativen Erkrankungen, insbesondere einer Unterform des Morbus Alzheimer vor (Lang und

Lozano 1998; Lowe et al. 1990). Eine infektiöse Form der Parkinson-Syndrome, die Encephalitis lethargica, und eine familiäre Form, das juvenile autosomal rezessive Parkinson-Syndrom, zeigen keine Einschlusskörperchen. Allen Formen gemeinsam ist eine Reduktion der Neurone in der Substantia nigra, die zu einer dopaminergen Minderinnervation des Striatums führt. Ab einem Verlust von ca. 60 % der Neuromelanin-haltigen Neurone oder einer Dopaminreduktion von ca. 80 % im Striatum kommt es zu den charakteristischen Symptomen, wie Tremor, Rigor und Bradykinese (Bernheimer et al. 1973; Fearnley und Lees 1991; McGeer et al. 1988). Die idiopathische Form ist mit 80 % der Fälle auch die häufigste. Sie beginnt im allgemeinen zwischen dem 50- und 60sten Lebensjahr. Die jährliche Inzidenz liegt bei 20 pro 100.000 Einwohnern mit einer Prävalenz von 100 bis 200 pro 100.000. Damit ist der Morbus Parkinson die zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung nach dem Morbus Alzheimer. Früher war die Mortalität von Parkinson-Patienten dreifach gegenüber gleichaltrigen Personen erhöht. Nach Einführung der Dopaminsubstitutionstherapie war sie nicht mehr signifikant erhöht. Problematisch bleibt insbesondere nach mehrjähriger Therapiedauer die hohe Rate der Pflegebedürftigkeit.

Neben der Substantia nigra sind auch andere pigmentierte Hirnareale betroffen. Hierunter fallen der noradrenerge Locus coeruleus, der serotonerge Nucleus raphe dorsalis und der dorsale motorische Vagus Kern. Bei Parkinson-Patienten mit kognitiven Störungen findet man im Nucleus basalis Meynert einen über 70 %igen Verlust cholinergischer Neurone. Dieser Kern ist insbesondere beim Morbus Alzheimer betroffen.

Obwohl die Parkinson-Erkrankung schon 1817 erstmals von James Parkinson beschrieben wurde, ist erst in den letzten Jahren über die Ätiologie etwas bekannt geworden. Eine toxische Genese wurde vermutet, nachdem Drogenabhängige durch die Injektion von mit 1-Methyl-4-Phenyl-1,2,3,6-Tetrahydro-Pyridin (MPTP) verunreinigten Meperidin-Analoga ein Parkinson-Syndrom entwickelten (Langston et al. 1983). MPTP wird in Gliazellen über die Monoaminoxidase B in das L-Methyl-Phenyl-Pyridinium-Ion (MPP⁺) oxidiert und über den Dopamin-transporter selektiv in dopaminerge Neuronen aufgenommen (Javitch et al. 1985; Markey et al. 1984). MPP⁺ inhibiert effektiv den Komplex I der mitochondrialen Atmungskette (Nicklas et al. 1985; Ramsay et al. 1986). So wurde in Parkinson-Patienten eine verminderte Aktivität der mitochondrialen NADH-Dehydrogenase in der SNC nachgewiesen. Neben der verminderten ATP-Synthese deuten erhöhte Eisen- und reduzierte Glutathion- und Ferritin-Spiegel auf eine erhöhte Anfälligkeit gegenüber oxidativen Entgleisungen hin (Dexter et al. 1990; Jellinger et al. 1993; Sian et al. 1994).

Eine genetische Ursache des Morbus Parkinson konnte bisher zwar nicht bewiesen werden, doch fand sich bei PET-Zwillingsstudien eine hohe Konkordanz für verminderte striatale Dopaminlevel im präklinischen Stadium (Piccini et al. 1999).

Die sehr viel selteneren familiären Formen der Parkinson-Syndrome können in zwei Gruppen aufgeteilt werden. Die erste wird autosomal-dominant vererbt und durch Mutationen im α -Synuclein- oder dem UCHL 1-Gen charakterisiert. Beide bisher im α -Synuclein-Gen identifizierten Mutationen führen zu einem einzelnen Aminosäureaustausch, Alanin-30 zu Prolin (A30P) bzw. Alanin-53 zu Threonin (A53T) (Krüger et al. 1998; Polymeropoulos et al. 1997). Der Erkrankungsbeginn (im Mittel 45 Jahre) liegt wesentlich früher als beim Morbus Parkinson. Der Aminosäureaustausch von Isoleucin-93 zu Methionin im UCHL 1-Gen reduziert die enzymatische Aktivität dieses Proteins und führt ebenfalls zu einem L-DOPA-sensitiven Parkinson-Syndrom (Leroy et al. 1998). Der Erkrankungsbeginn der beiden betroffenen

Geschwister lag bei 50 Jahren. Die Penetranz dieser Erkrankung ist jedoch nicht vollständig, wie der Erbgang über den nicht erkrankten Vater zeigt. UCHL 1 kann wie auch α -Synuclein in Lewy-Körpern nachgewiesen werden (Lowe et al. 1990). Das Protein selber ist eines der häufigsten neuronalen Proteine und macht ca. 2 % des Proteingewichtes des menschlichen Gehirns aus (Wilkinson et al. 1992; Wilkinson et al. 1989). Zwei weitere autosomal dominant vererbte Loci an den chromosomalen Positionen 2p13 und 4p15 wurden bisher identifiziert, wobei die betroffenen Gene noch nicht bekannt sind (Farrer et al. 1999; Gasser et al. 1998).

Der Erbgang der zweiten Gruppe erfolgt autosomal rezessiv. Diese Erkrankung ist durch einen frühen Beginn, eine langsame Progredienz, Empfindlichkeit gegenüber L-DOPA und die Abwesenheit von Lewy-Körpern charakterisiert (Matsumine et al. 1998). Das identifizierte Gen liegt an der chromosomalen Position 6q27 und kodiert für das Protein Parkin (Kitada et al. 1998). Bei den betroffenen Patienten waren unterschiedliche Exone deletiert.

1.4 α -Synuclein

Die Synuclein-Proteinfamilie wird im Menschen von vier verschiedenen Genen an den chromosomalen Positionen 4q21.3 für α -, 5q35 für β - und 10q23.2 für γ -Synuclein kodiert (Jakes et al. 1994; Lavedan et al. 1998; Polymeropoulos et al. 1997). Zusätzlich gibt es noch das Retina-spezifische Paralog Synoretin (Surguchov et al. 1999). Die drei Paraloge α -, β - und γ -Synuclein sind zwischen 127 und 140 Aminosäuren lang und zu 55-62 % identisch. N-terminal sind sie durch eine unvollendete Aminosäurenwiederholung (fünf bis sieben Wiederholungen) charakterisiert (Goedert 2001). Der C-Terminus des löslichen Proteins ist negativ geladen. Die Klonierung der Proteine erfolgte unabhängig in verschiedenen biologischen Zusammenhängen. γ -Synuclein wurde 1988 zunächst aus dem elektrischen Organ des Zitterrochens isoliert und später aus der Ratte kloniert (Maroteaux und Scheller 1991; Maroteaux et al. 1988). Die damals identifizierte synaptische und nukleäre Lokalisation gaben dem Protein seinen Namen Synuclein. Das β -Ortholog wurde bei der Suche nach Phosphoproteinen im Rinderhirn als Phospho-Neuroprotein 14 (PNP-14) entdeckt (Nakajo et al. 1993; Nakajo et al. 1990). Bei der Charakterisierung von Alzheimer-Plaques wurde in diesen später das humane α -Ortholog als weitere Komponente neben $A\beta$ identifiziert und als NACP bezeichnet (Ueda et al. 1993). Das α -Synuclein-Ortholog Synelfin der Zebrafinken wurde im Zusammenhang von veränderten Protein-Expressionsmustern während der kritischen Phase des Lernens von Balzliedern durch männliche Vögel gefunden (George et al. 1995). Dieses regulierte Expressionsmuster veranlaßte die Autoren, Synuclein eine Funktion in der synaptischen Plastizität zuzuschreiben.

α -Synuclein ist ein sehr häufiges präsynaptisches Protein, das ca. 1 % des gesamten löslichen Gehirnsproteins ausmacht (Iwai et al. 1995). Während α -Synuclein bevorzugt im Endhirn exprimiert wird, ist die Verteilung von β -Synuclein homogener (Irizarry et al. 1996; Iwai et al. 1995; Nakajo et al. 1994). γ -Synuclein wurde durch subtraktive Hybridisierung aus Spinalganglien kloniert und wird bevorzugt in diesen und dem Rückenmark exprimiert (Akopian und Wood 1995; Buchman et al. 1998a; Buchman et al. 1998b). In der Präsynapse liegen α - und β -Synuclein hauptsächlich zytosolisch vor, wie durch subzelluläre Fraktionierungen und Immunogold-Färbungen gezeigt werden konnte (Clayton und George 1999; Iwai et al. 1995; Kahle et al. 2000; Nakajo et al. 1994; Shibayama-Imazu et al. 1993). *In vitro* bindet α -Synuclein an Vesikel, die einen hohen Anteil saurer Phospholipide enthalten (Davidson et al. 1998). Durch

die Bindung verändert das Protein seine Struktur von ungefaltet in α -helikal, wobei insbesondere der N-terminus beteiligt ist (Clayton und George 1998; Davidson et al. 1998; Weinreb et al. 1996). Interessanterweise nimmt α -Synuclein in Lewy-Körper-Filamenten eine für Amyloid typische gekreuzte β -Faltblatt-Struktur an, die für die Aggregation notwendig ist (Conway et al. 2000; Serpell et al. 2000).

Über die physiologische Funktion von Synuclein ist trotz intensiver Forschung noch wenig bekannt. Neben dem indirekten Hinweis auf eine Beteiligung bei der synaptischen Plastizität wurde eine Funktion in der Signaltransduktion vermutet. In diesem Zusammenhang wurden α - und β -Synuclein als potente Inhibitoren der Phospholipase D2 isoliert (Jenco et al. 1998). Phospholipase D2 ist nahe der Plasmamembran lokalisiert und hydrolysiert Phosphatidylcholin in Cholin und Phosphatidylsäure, die als sekundäre Botenmoleküle wirken (Colley et al. 1997; Exton 1997). Eine Phosphorylierung von α -Synuclein durch G-Protein-gekoppelte Rezeptorkinasen (GRKn) am Serin-129 und durch Mitglieder der Src-Tyrosinkinase-Familie am Tyrosin-125 deutet in die gleiche Richtung (Ellis et al. 2001; Pronin et al. 2000). Eine physiologische Bedeutung konnte jedoch bisher für keinen dieser Prozesse nachgewiesen werden.

2 Zielsetzung

Das erste Synuclein-Ortholog wurde zwar bereits 1988 kloniert, doch fand das Molekül bis 1997 wenig Aufmerksamkeit. Erst mit der Identifikation seiner Rolle bei Parkinson-Syndromen wurde die Forschung über dieses Protein intensiviert.

Vier Paraloge wurden bisher in der Synuclein-Familie identifiziert. Über die physiologische Funktion dieser Proteinfamilie ist jedoch noch wenig bekannt. Ziel dieser Arbeit war es, anhand der Charakterisierung von α -Synuclein Hinweise auf die physiologische Funktion zu erhalten und die Rolle in der Pathogenese tierexperimenteller Parkinson-Modelle zu untersuchen.

Hierzu wurden Antikörper zur spezifischen Detektion der einzelnen Paraloge benötigt, die über rekombinante Proteine hergestellt werden sollten. Die Untersuchung der Gewebeverteilung und subzellulären Verteilung der beiden hirnspezifischen Paraloge α - und β -Synuclein sollte vergleichend in Mäusen erfolgen. Da nur in Mäusen bisher eine gezielte Mutagenese möglich ist, war beabsichtigt, dieses Tiermodell für die funktionelle Charakterisierung zu verwenden. Über homologe Rekombination sollte die α -Synuclein-Expression ausgeschaltet und der Effekt dieser Mutation auf die synaptische Funktion untersucht werden. Hierzu war in erster Linie eine Analyse mit biochemischen und morphologischen Methoden beabsichtigt, die je nach Phänotyp durch elektrophysiologische Studien ergänzt würden.

Für die Untersuchungen der Rolle von α -Synuclein in der Pathogenese von Parkinson-Syndromen war die Analyse von zwei tierexperimentellen Modellen geplant. Einerseits war beabsichtigt, ein pharmakologisches Modell zu verwenden, in dem der Einfluß von α -Synuclein auf die MPTP-Toxizität analysiert werden sollte, andererseits sollten die α -Synuclein-Mutationen der familiären Formen der Parkinson-Syndrome in Mäusen transgen exprimiert werden.

Hierbei stand die Frage im Vordergrund, inwieweit neurochemische Veränderungen wie der striatale Dopaminverlust und Einschlußkörperchen der Parkinson-Syndrome in Mäusen induziert werden können.

3 Material und Methoden

3.1 Geräte

Agarosegelsysteme	Life-Technologies Gibco-BRL GmbH, Eggenstein-Leopoldshafen und Konstruktionen der Institutswerkstatt
Cryostat, Jung CM 3000	Leica, Bensheim
DNA-Sequencer 373 Stretch	Applied Biosystems, Weiterstadt
E. coli Pulser	Bio-Rad Laboratories GmbH, München
Epifluoreszenzmikroskop, Axiophot	Zeiss GmbH, Jena
Fastproteinliquidchromatographie (FPLC) Anlage	Pharmacia Biotech GmbH, Freiburg
Filmentwickler Curix 60	Agfa-Gevaert GmbH, Martsel, Belgien
Fluo-Link	Biometra, Göttingen
Flüssigkulturenschüttler Innova 4000	New Brunswick Science GmbH, Nürtingen
Fujix BAS 5000	Raytest Isotopenmeßgeräte GmbH, Straubenhardt
Gefriermikrotom CM 1325	Leica, Bensheim
Gen-Pulser Elektroporationssystem II	Bio-Rad Laboratories GmbH, München
Hi Load 16/60 Superdex 75-Chromatographiesäule	Pharmacia Biotech GmbH, Freiburg
Konfokales Mikroskop MRC 1024	Bio-Rad Laboratories GmbH, München
Mehrkanalpipette, 12-Pette, 10 – 200 µl	Costar GmbH, Bodenheim
Mehrkanalpipette, zwölfach, 1 – 10 µl	Südlaborbedarf GmbH, Gauting
Mikroplattenreplikator	Merk eurolab GmbH, Hannover und Konstruktionen der Institutswerkstatt
Mikrotiterplattenlesegerät Thermomax	Molecular Devices, MWG-Biotech AG, Ebersberg
PCR-Maschine DNA Engine Tetrad	MJ Research, Waltham, USA
PCR-Maschine Uno II	Biometra, Göttingen
pH-Meter	Knick, Schütt GmbH, Göttingen
Potter Elvehjem, 15 ml	Wheaton, Schütt, Göttingen
Potter Elvehjem, 2 ml	Glas-Col, Schütt, Göttingen
Potter Elvehjem, 30 und 60 ml	B. Braun Biotech International GmbH, Melsungen
Präparierbesteck	martin, Karl Grosse GmbH, Braunschweig
Proteingelsysteme, Mini-PROTEAN II	Bio-Rad Laboratories GmbH, München
Spektralphotometer	Beckmann Instruments GmbH, München und Pharmacia Biotech GmbH, Freiburg
Sterilwerkbänke	Haereus GmbH, Hanau
Thermomixer 5436	Eppendorf, Hamburg

Tischzentrifuge, Biofuge 13	Haereus GmbH, Hanau
Ultra Turrax, T8	IKA, Schütt GmbH, Göttingen
Ultrafine Juwelier Pinzette 11 cm	Medicon Instrumente, Tuttlingen
Ultraschallbad	Branson, Schütt GmbH, Göttingen
Ultraschall-Homogenisator Labsonic U	B. Braun Biotech International GmbH, Melsungen
Videogeldokumentationsanlage	Intas GmbH, Göttingen
Zentrifuge, 5403	Eppendorf, Hamburg
Zentrifuge, Megafuge 3.0R	Haereus GmbH, Hanau
Zentrifuge, Optima TLX und Optima L60	Beckmann Instruments GmbH, München
Zentrifuge, RC-5B Plus	Sorvall GmbH, Bad Homburg

3.2 Computerprogramme und Internetzugänge

Excel	Microsoft, Seattle, USA
LaserGene Navigator	DNA-Star Inc., Madison, USA
MacBas Version 2.3	Raytest Isotopenmeßgeräte GmbH, Straubenhardt
National Center for Biotechnology Information (NCBI)	http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
OligoOrder Vers. 1.0.1	Applied Biosystems, Weiterstadt
Swiss Institute for Experimental Cancer Research (ISREC)	http://www.isrec.isb-sib.ch/
Research Collaboratory for Structural Bioinformatics (RCSB)	http://www.rcsb.org/pdb
WebLab Viewer Lite Vers. 3.2	Molecular Simulations Inc., San Diego, USA

3.3 Verbrauchsmaterialien

Bio Spin P30, Chromatographiesäule	Bio-Rad Laboratories GmbH, München
Biomax-5K, Ultrafiltrationseinheit	Millipore GmbH, Eschborn
Column PD-10, Sephadex G-25 M	Pharmacia Biotech GmbH, Freiburg
ECL-Röntgenfilme	Amersham-Buchler GmbH & Co., Braunschweig
Elektroporationsküvetten 1 mm oder 4 mm Elektrodenabstand	Bio-Rad Laboratories GmbH, München
Fettmarkerstift für die Immunzytochemie	DAKO Diagnostika GmbH, Hamburg
Hybond-N ⁺ Nylon-Membranen	Amersham-Buchler GmbH & Co., Braunschweig
Kunststoffgefäße	Brandt, Costar, Falcon, Greiner, Sarstedt
Nitrocellulose Transfermembran, Protran 0,2 µm	Schleicher & Schuell, Dassel
Nitrocellulose-Filter (Durchmesser 137 mm) Typ HA, 0,45 µm	Millipore GmbH, Eschborn

Phase Lock Gel I heavy	5 Prime - 3 Prime, Boulder, Colorado, USA
Reaktionsgefäße	Eppendorf, Hamburg
Röntgenfilme	Kodak, Integra Biosciences GmbH, Fernwald
SuperFrost Plus Objektträger	Menzel-Gläser, Braunschweig
Verstärkerfolie für Autoradiographie-	Du Pont de Nemours GmbH, Bad Homburg
kassetten	
Whatman 3MM Chr	Whatman International Ltd, Maidstone, England
GF/B-Filter, 25 mm Durchmesser	Whatman International Ltd, Maidstone, England
Nitrocellulosefilter Hybond ECL, 0,45 µm	Amersham Pharmacia Biotech, Bucking-
	hamshire, England
Sterilfiltrationsaufsätze Millex (0,2 µm	Millipore GmbH, Eschborn
Porengröße)	

3.4 Chemikalien

[α- ³² P]dCTP	Amersham-Buchler GmbH & Co., Braunschweig
[³ H]-Dopamin	Amersham-Buchler GmbH & Co., Braunschweig
2,2,2-Tribromethanol	Sigma-Aldrich GmbH, Deisenhofen
Agarose	Life-Technologies Gibco-BRL GmbH, Eggenstein-Leopoldshafen
Alkalische Phosphatase	Boehringer Mannheim GmbH
AMBA	Bio-Rad Laboratories GmbH, München
Ammoniumperoxodisulfat	Bio-Rad Laboratories GmbH, München
Ampicillin	BioMol Feinchemikalien GmbH, Hamburg
Bacto-Agar	Difco Laboratories GmbH, Augsburg
Bacto-Hefeextrakt	Difco Laboratories GmbH, Augsburg
Bacto-Trypton	Difco Laboratories GmbH, Augsburg
Coomassie Blue R250	BioMol Feinchemikalien GmbH, Hamburg
DNA-Längenstandard λ BstE II	New England Biolabs, Schwalbach
dNTP	Pharmacia Biotech GmbH, Freiburg
DTT	Sigma-Aldrich GmbH, Deisenhofen
ECL-Reagenzien	Amersham-Buchler GmbH & Co., Braunschweig
Einbettmedium	Jung, Leica, Nussloch
Ethidiumbromid	Sigma-Aldrich GmbH, Deisenhofen
Extran	Merck, Darmstadt
Ficoll 400	Pharmacia Biotech GmbH, Freiburg
Folin & Ciocalteu's Phenol Reagenz	Sigma-Aldrich GmbH, Deisenhofen
Freund'sches Adjuvans	Sigma-Aldrich GmbH, Deisenhofen
GBR12909	Sigma-Aldrich GmbH, Deisenhofen
Gelatine	DIFCO Laboratories GmbH, Augsburg

Glutathion-Agarose-Matrix	Sigma-Aldrich GmbH, Deisenhofen
IPTG	BioMol Feinchemikalien GmbH, Hamburg
Klenow-DNA-Polymerase	New England Biolabs, Schwalbach
Lachsspermien-DNA	Sigma-Aldrich GmbH, Deisenhofen
Lysozym	Sigma-Aldrich GmbH, Deisenhofen
Methamphetamin	Sigma-Aldrich GmbH, Deisenhofen
Molekulargewichtsstandard für SDS-PAGE "low" und "high"	Bio-Rad Laboratories GmbH, München
MPTP	Sigma-Aldrich GmbH, Deisenhofen
Mung-Bean-DNA-Polymerase	New England Biolabs, Schwalbach
Natriumperoxynitrit	Cayman Chemical, Ann Arbor, USA
Ni ²⁺ -NTA-Agarose-Matrix	Qiagen, Hilden
N-Lauroylsarkosin	Sigma-Aldrich-GmbH, Deisenhofen
N-Propylgallat	Sigma, Deisenhofen
PBS-Puffertabletten	Sigma-Aldrich GmbH, Deisenhofen
PEG 8000	Sigma-Aldrich GmbH, Deisenhofen
<i>Pfu</i> -Polymerase	Stratagene GmbH, Heidelberg
Phenol, puffergesättigtes Phenol	Life-Technologies Gibco-BRL GmbH, Eggenstein-Leopoldshafen
Polyvinylpyrrolidon	Sigma-Aldrich GmbH, Deisenhofen
Ponceau S	Sigma-Aldrich GmbH, Deisenhofen
PowerScript DNA Polymerase Mix	PAN Systems GmbH, Aidenbach
Proteaseinhibitor-Cocktail-Tabletten	Boehringer Mannheim GmbH
Proteaseinhibitoren: Aprotinin, Leupeptin, Pepstatin A, PMSF	Boehringer Mannheim GmbH
Proteinase K	Boehringer Mannheim GmbH
Quick clone cDNA aus Menschengehirn	Clontech, Palo Alto, USA
Quick clone cDNA aus Rattengehirn	Clontech, Palo Alto, USA
Reserpin	Sigma-Aldrich GmbH, Deisenhofen
Restriktionsendonukleasen	Boehringer Mannheim GmbH oder New England Biolabs, Schwalbach
RNase DNase free	Boehringer Mannheim GmbH
SDS	Boehringer Mannheim GmbH
Szintillationsflüssigkeit: Rotiszint eco plus	Roth, Karlsruhe
T4 DNA Polymerase, 3'-5' ssDNA Exonuklease-, keine 5'-3' Exonuklease-aktivität	Boehringer Mannheim GmbH
T4 DNA-Ligase	Boehringer Mannheim GmbH
<i>Taq</i> -Polymerase	Sigma-Aldrich GmbH, Deisenhofen
TEMED	Bio-Rad Laboratories GmbH, München

TEV-Protease (spez. Aktivität: 10-50 U/μg)	Life-Technologies Gibco-BRL GmbH, Eggenstein-Leopoldshafen
Tris (Tris-Hydroxymethyl-Aminomethan)	Sigma-Aldrich GmbH, Deisenhofen
Triton X-100	Boehringer Mannheim GmbH
Trockenmilchpulver	Glücksklee Magermilchpulver, Nestle Deutschland AG, Frankfurt/Main
Tween 20	Sigma-Aldrich GmbH, Deisenhofen
X-Gal	BioMol Feinchemikalien GmbH, Hamburg
Ziegenserum	Life-Technologies Gibco-BRL GmbH, Eggenstein-Leopoldshafen
β-Mercaptoethanol	Sigma-Aldrich GmbH, Deisenhofen

Alle nicht aufgeführten Chemikalien wurden von der Firma Merck GmbH (Darmstadt) in p.A. Qualität bezogen.

3.5 Chemikalien für die Zellkultur

2-Mercaptoethanol "cell culture tested"	Sigma-Aldrich GmbH, Deisenhofen
Albumin, Rind	Sigma-Aldrich GmbH, Deisenhofen
B27-Supplement	Life-Technologies Gibco-BRL GmbH, Eggenstein-Leopoldshafen
Cystein	Sigma-Aldrich GmbH, Deisenhofen
DMEM mit 4,5 g/l D-Glucose	Life-Technologies Gibco-BRL GmbH, Eggenstein-Leopoldshafen
DMEM/25mM HEPES	Life-Technologies Gibco-BRL GmbH, Eggenstein-Leopoldshafen
DMEM-Pulvermedium mit L-Glutamin, 4,5 g/l D-Glucose, ohne Natriumpyruvat	Life-Technologies Gibco-BRL GmbH, Eggenstein-Leopoldshafen
D-PBS	Life-Technologies Gibco-BRL GmbH, Eggenstein-Leopoldshafen
ESGRO-LIF	Life-Technologies Gibco-BRL GmbH, Eggenstein-Leopoldshafen
Fötale Rinderserum (embryonale Stammzellkultur)	HyClone, Erembodegen-Aalst, Belgien
Fötale Rinderserum (FBS) für die Neuronenkultur, Hitze-inaktiviert für 30 min bei 56°C	Seromed, Berlin
Fötale Rinderserum, hitzeinaktiviert	Life-Technologies Gibco-BRL GmbH, Eggenstein-Leopoldshafen
Gangciclovir	Roche AG, Basel, Schweiz
Glutamax-Stammlösung	Life-Technologies Gibco-BRL GmbH, Eggenstein-Leopoldshafen

HBSS (Hanks Balanced Salt Solution)	Life-Technologies Gibco-BRL GmbH, Eggenstein-Leopoldshafen
Kollagen	Collaborative Biomedical Products; Becton Dickinson Labware, Bedford, USA
L-Glutamin, 100x	Life-Technologies Gibco-BRL GmbH, Eggenstein-Leopoldshafen
MEM nichtessentielle Aminosäuren, 100x	Life-Technologies Gibco-BRL GmbH, Eggenstein-Leopoldshafen
Mineralöl	Sigma-Aldrich GmbH, Deisenhofen
MITO	Collaborative Biomedical Products; Becton Dickinson Labware, Bedford, USA
Mitomycin C	Sigma-Aldrich GmbH, Deisenhofen
Neomycin (G418-Sulfat)	Life-Technologies Gibco-BRL GmbH, Eggenstein-Leopoldshafen
Neurobasal	Life-Technologies Gibco-BRL GmbH, Eggenstein-Leopoldshafen
Papain	Worthington Biomedical Corporation, Lakewood, USA
Penicillin/Streptomycin, 500x: 50000 IU/ml Penicillin, 50 mg/ml Streptomycin	Boehringer Mannheim GmbH
Trypsin Inhibitor	Sigma-Aldrich GmbH, Deisenhofen
Trypsin-EDTA, 1x	Life-Technologies Gibco-BRL GmbH, Eggenstein-Leopoldshafen

3.6 Kits

BCA Protein Assay-Kit	Pierce, Rockford, Illinois, USA
Plasmid Mini, Midi und Maxi-Kits	Qiagen AG, Hilden
Prime-It II - Random Primer Labeling-Kit	Stratagene GmbH, Heidelberg
Qiaex II-Kit	Qiagen AG, Hilden
QIAquick PCR Purification-Kit	Qiagen AG, Hilden
TOPO-Quick Ligation Kit	Invitrogen, Karlsruhe

3.7 Antikörper

Es wurden zusätzlich zu den neu erstellten die unten angegebenen primären Antikörper verwendet. Die Bezugs- oder Literaturquelle ist angegeben.

Aktin	AC-40	Sigma-Aldrich GmbH, Deisenhofen
Amphiphysin	P924	Synaptic Systems, Göttingen
APP	U955	Prof. T. C. Südhof, Dallas, USA
Complexin 1 und 2	P942	Synaptic Systems, Göttingen

CSP	α CSP	Dr. B. Stahl, Göttingen
Doc2A	Maus anti Doc2A	Transduction Laboratories, Lexington, USA
Dopamintransporter	M369	Transduction Laboratories, Lexington, USA
Dynamin	E765	(Robinson et al. 1993)
GAPDH	6G5	Biotrend GmbH, Köln
GDI	Cl81.3	(Chou und Jahn 2000)
Hexahistidin	Maus anti Peptide „RGSHHHH“	Qiagen AG, Hilden
Mint	P932	Prof. T.C. Südhof, Dallas, USA
mSEC7	SA3613	H. Koch, Göttingen
Munc13-1	3H5	(Betz et al. 1998)
Munc18	I370	Prof. T.C. Südhof, Dallas, USA
Neurologin I	4C12	(Song et al. 1999)
NMDA-R1	Cl54.1	(Brose et al. 1994)
NSF	I372	(McMahon und Südhof 1995)
p116 der vesikulären ATPase	587	Synaptic Systems, Göttingen
Presenilin I Schleife	α PSI	Prof. T. C. Südhof, Dallas, USA
Rab3A	583	Synaptic Systems, Göttingen
Rab3A	Cl42.2	(Matteoli et al. 1991)
Rab3B	U954	(Schlüter 2000)
Rab3C	P180	(Castillo et al. 1997)
Rabaptin	R321	Dr. Y. Wang, Dallas, USA
Rabphilin	I734	(Li et al. 1994)
Rim	Maus anti Rim	Transduction Laboratories, Lexington, USA
SCAMP	P936	Synaptic Systems, Göttingen
α SNAP	I373	Prof. T. C. Südhof, Dallas, USA
SNAP-23	P914	Synaptic Systems, Göttingen
SNAP-25	Cl72.2	Prof. R. Jahn, Göttingen
Synapsin I und II	E028	(Rosahl et al. 1995)
Synaptobrevin 1	P938	Synaptic Systems, Göttingen
Synaptobrevin 2	Cl69.1	(Edelmann et al. 1995)
Synaptogyrin	P925	Synaptic Systems, Göttingen
Synaptojanin	P923	Synaptic Systems, Göttingen
Synaptophysin I	Cl7.2	Prof. Dr. R. Jahn
Synaptophysin II	α p37	(Fykse et al. 1993)
Synaptotagmin I	V216	(Perin et al. 1990)
Synaptotagmin II	I735	(Rosahl et al. 1995)
Syntaxin 1	Cl78.2	Prof. R. Jahn, Göttingen

Syntaxin 1b	P941	Synaptic Systems, Göttingen
Tyrosin Hydroxylase	Maus anti TH	Boehringer Mannheim GmbH
Vesikuläre Monoamin-transporter 2	α VMAT-2	Prof. E. Weihe, Marburg
α -, β -Synuclein	Q698	Dr. R. Janz, Houston, Texas, USA
α SNAP	I373	(McMahon und Südhof 1995)
α -Synuclein	α Syf	Transduction Laboratories, Lexington, USA
α -Tubulin	DM1 α	Sigma-Aldrich GmbH, Deisenhofen
β -Tubulin	TUB2.1	Sigma-Aldrich GmbH, Deisenhofen
Tyrosinhydroxylase (TH)	α TH	Boehringer Mannheim GmbH

Zur Detektion wurden folgende sekundäre Antikörper verwendet:

Affinitätsgereinigter Kaninchen-anti-Maus-IgG (H+L) Antikörper	Jackson ImmunoResearch Lab., West Grove, USA
Affinitätsgereinigter Ziege-anti-Kaninchen-IgG (H&L) konjugiert mit Cy2, $\lambda_{\max}$: 489 nm, $\epsilon_{\max}$: 505 nm	Rockland, Gilbertsville, USA
Affinitätsgereinigter Ziege-anti-Maus-IgG (H&L) konjugiert mit Cy3.29, $\lambda_{\max}$: 552 nm, $\epsilon_{\max}$: 565 nm	Rockland, Gilbertsville, USA
Affinitätsgereinigter Ziege-anti-Maus-IgG (H&L) konjugiert mit Cy2	Rockland, Gilbertsville, USA
Affinitätsgereinigter Ziege-anti-Kaninchen-IgG (H&L) konjugiert mit Cy3.29	Rockland, Gilbertsville, USA
Affinitätsgereinigter Ziege-anti-Maus-IgG (H&L) konjugiert mit Cy5.29, $\lambda_{\max}$: 650 nm, $\epsilon_{\max}$: 667 nm	Rockland, Gilbertsville, USA
Affinitätsgereinigter Ziege-anti-Maus (H&L) konjugiert mit HRP	Bio-Rad Laboratories GmbH, München
Affinitätsgereinigter Ziege-anti-Kaninchen (H&L) konjugiert mit HRP	Bio-Rad Laboratories GmbH, München
Affinitätsgereinigter Ziege-anti-Ratte-IgG (H&L) konjugiert mit Cy2	Rockland, Gilbertsville, USA

3.8 Plasmidvektoren

pcDNA3: 5,4 kb (Invitrogen, Groningen, Niederlande). Eukaryontischer Expressionsvektor mit Ampicillin-Resistenz-Gen, einem CMV „promotor/enhancer“ Element, einer BGH Polyadenylierungskassette, einem SV40 Replikationsstartelement und einer Neomycinresistenz-Expressions-kassette (Neo^R) zur Selektion von stabilen Transfektanten.

pBluescript II SK+: 2,9 kb (Stratagene GmbH, Heidelberg). Klonierungsvektor mit Ampicillin-Resistenz-Gen mit hoher Kopienzahl und der Möglichkeit zur Testung von rekombinanten Klonen über β -Galaktosidase-Expressionstest.

pTK-Neo 3a: ca. 8 kb (Rosahl et al. 1993). Klonierungsvektor zur Klonierung von Rekombinationsvektoren für die homologe Rekombination. In den Mehrfachklonierungsbereich von

pBluescript II wurden zwei Thymidinkinase-(TK) und eine Neomycinresistenz-Expressionskassette (Neo^R) mit RNA-Polymerase II-Promotor kloniert. Als singuläre Restriktionsschnittstellen sind zwischen TK und Neo^R *Sall* und *Clal* und 3' von der Neo^R *BamHI*, *SpeI*, *NotI* und *SacII* vorhanden.

pGEX-KG: 5,0 kb (Guan und Dixon 1991). Bakterieller Expressionsvektor mit Ampicillin-Resistenz-Gen zu Expression von N-terminalen Glutathion-S-Transferase-Fusionsproteinen (GST).

NHispBSK.1: 2,9 kb (Schlüter 2000). In Vektor pBlueScript SK+ (Stratagene GmbH, Heidelberg) wurde über die Restriktionsenzyme *HindIII* und *BamHI* eine Oligonukleotidpaar kloniert, das die Kozak-Nukleotidsequenz „CCACC“, gefolgt vom Startcodon „ATG“ und die Codons für die Aminosäuresequenz „RGSHHHHHH“ kodierte.

pCR-Script II: 2,9 kb (Schlüter 2000). Im Vektor pCR-Script (Stratagene GmbH, Heidelberg) wurde die zusätzliche *SmaI*-Restriktionsschnittstelle durch *SpeI* ersetzt. Bei der Klonierung von PCR-Fragmenten mit glatten Enden konnte die *SrfI*-Restriktionsschnittstelle sowohl mit *SmaI* als auch mit *SrfI* während der Ligation geschnitten werden.

pTSC21: 9,1 kb (Dr. M. Goedert, MRC Laboratory of Molecular Biology, Cambridge, England). pUC18-Vektor, der das Maus-Thy1-Gen enthält. Die kodierenden Bereiche der Exone zwei bis vier wurden ausgeschnitten und eine einzige Klonierungsstelle für das Restriktionsenzym *XhoI* eingefügt. Das Gen kann über die Restriktionsenzyme *EcoRI* oder *NotI* und *PvuI* aus dem Vektor herausgeschnitten werden.

3.9 Genbibliotheken

pVP16-3 cDNA-Bibliothek aus Ratte (E18)

Dr. Massaya Okamoto, Southwestern Medical Center, Dallas, USA

Lambda FIX II genomische Phagenbibliothek aus der Mauslinie 129SvJ

Stratagene GmbH, Heidelberg

3.10 Synthetische Oligonukleotide

Oligonukleotide wurden vom institutseigenen Oligosyntheselabor hergestellt und sind anhand der Synthesenummer bezeichnet.

288: CCTGTCCGGTGCCCTGAATGAA
428: GAGCGCGCGCGGCGGAGTTGTTGAC
439: CGCGAATTCATTGGGGAAAACAGGAGG
440: CGCGAATTCCTACTGTTGTCACTCCATG
670: CGCATCGATAGATCTCGTGGCTGAACTTGAGC
672: CGCATCGATTCCAGGAAGAAATATCAGATATC
739: GCTGAGGGAAGGAAAAGGCTGAAGCC
741: CCCCTCGAGTTCAGAGGGCCCTCAG
786: CGAATTCTAATGGATGTGTTTCATGAAAGGACTTTCAAAGGC

787: CGCAAGCTTTTAGGCTTCAGGCTCATAGTCTTGGTAGC
 801: CGCAAGCTTTTAGGCTTCAGGTTCGTAGTCTTGATACC
 817: CGCAAGCTTCCACCATGGATGTGTTTCATGAAAGGACTTTC
 818: CGCCTCGAGAATCCGAAGTCCGAGTATCAGAACC
 832: CGCCTCGAGTTAGGCTTCAGGCTCATAGTCTTGG
 887: GCCGATCCCCTCAGAAGAAC
 946: CCACCATGGACGTCTTCAAGAAAGGC
 947: CCTTCTAGTCACCTCCACTCTTGGCC
 948: GGAGGGAGTGGTCCATGGTGTGACAACAGTGGCTGAGAAGACC
 949: GGTCTTCTCAGCCACTGTTGTACACCATGGACCACTCCCTCC
 1103: TCTCTGGTGTGGCATCTGGGCTCGT
 1106: GTTGGTTGGAGGTGCGGTGCGTGAGG
 1120: CGAATTCGCGATCGCTTAGGCTTCAGGTTCGTAGTCTTGATACC
 1121: GGGTGTGGCAGAAGCCCCGGGAAAGAC
 1122: GTCTTTCCCGGGGCTTCTGCCACACCC
 1123: GGCGCGCCACCATGGATGTATTCATGAAAGGACTTTC
 1241: GCGGATCCGATGTGTTTCATGAAAGGACTTTCAAAGG
 1242: GCGGATCCGACGTGTTTCATGAAGGGCCTGTCC
 1243: ATCATGGACCCTTCGCCTCTGGTTCGTATTCCTG
 1244: GGAAGATCTGACGTCTTCAAGAAAGGCTTCTCC
 1333: GGCACCTAGAGGATCTCGACTAGTGG
 1334: GGACCTCGACGCTTAGGCTTCAGG
 1383: TGGAGCCTACATAGAGAACACCCCTC
 1643: CGCAAGCTTAGGCTTCAGGTTCGTAGTCTTGA
 1646: GCTCTAGAAAACCTGTATTTTCAGGGCATGGATGTATTCATGAAAGGACTTT
 CA
 2033: GATCCTGACAATGAGGCCTATGAAATGCCTGATGAGGAAGGGTATCAAGAC
 TACGAACCTGAAGCCTA
 2034: AGCTTAGGCTTCAGGTTCGTAGTCTTGATACCCTTCCTCATCAGGCATTTTCAT
 AGGCCTCATTGTCAG
 2035: GAGGGAGCAGGGGACATTGCAGCTGCCACTGGC
 2036: GCCAGTGGCAGCTGCAATGTCCCCTGCTCCCTC
 2199: GTGGATCTCAAGCCCTCAAGG (Thy1 fwd. sequencing primer)
 2200: TGAGATATTTGAAGGACTTGG (Thy1 rev. sequencing primer)
 T1818 CGGAATTCGGATCCTTACGCCTCTGGCTCGTATTCC
 T1819 GCATATGGACGTGTTTCATGAAGGGCC

3.11 Bakterienstämme

Klonierungen und Überexpressionen wurden mit den folgenden *Escherichia-coli*-Bakterienstämmen (*E. coli*) durchgeführt:

XL1-Blue	Stratagene GmbH, Heidelberg
BL21(DE3)pLysS	Novagen, Madison, USA
XL1-Blue MRA(P2)	Stratagene GmbH, Heidelberg

3.12 Zelllinien

293 Zellen: Diese Zelllinie wurde durch Transfektion von menschlichem embryonalen Nierengewebe mit Adenovirus Typ 5 DNA-Fragmenten immortalisiert (Graham et al. 1977).

MEF: Embryonale Primärkulturen aus Mausfibroblasten (GenomeSystems, St. Louis, USA).

E14.1: Omnipotente embryonale Mausstammzelllinie aus der Mauslinie 129SV (Hooper et al. 1987). Freundlicherweise von Prof. Dr. K. Rajewsky, Köln, zur Verfügung gestellt.

3.13 Zuchttiere

Die Mauslinie C57Bl6/J wurden vom Tierzuchtbetrieb Elevage Janvier, Le Genest St Isle, Frankreich, und die Mauslinie C57Bl6/J/ola/hsd von Harlan Winkelmann, Borcheln, bezogen und im institutseigenen Tierhaus gezüchtet. Erstere wurde für die Blastozystengewinnung und Verpaarungen der chimären Mäuse und Rückkreuzungen verwendet. Die Mauslinie FVB wurde im institutseigenen Tierhaus gezüchtet und für die Gewinnung befruchteter Eizellen für die Erstellung transgener Mäuse verwendet.

Wistar-Ratten für die Gewinnung von Gewebeproben, Chinchilla-Kaninchen für die Immunisierung und NMRI-Mäuse als Ammen für Embryotransfers wurden ebenfalls aus den institutseigenen Tierställen bezogen.

3.14 Medien und Lösungen

Falls nicht anders angegeben, beziehen sich die Konzentrationsangaben auf wässrige Lösungen, die mit Hilfe von vollentsalztem Wasser (H₂O) hergestellt wurden.

Ampicillin-Stammlösung, 200x:	20 mg/ml
Denaturierungslösung:	1,5 M NaCl; 0,5 M NaOH.
Denhardt's Lösung, 50x:	1 % Rinderserumalbumin; 1 % Ficoll 400; 1 % Polyvinylpyrrolidon
Homogenisationspuffer	320 mM Saccharose; 10 mM HEPES/NaOH, pH 7,4; 0,1 mM EDTA

Hybridisierungslösung:	Prähybridisierungslösung mit radioaktiv markierter DNA-Sonde
IPTG-Stammlösung, 1000x:	30 mg/ml
LB-Kulturschalen:	15 g/l Bacto-Agar in LB-Medium, autoklaviert. Bei Selektionsmedien erfolgte die Zugabe der Antibiotika nach Abkühlung auf 50°C.
LB-Medium:	10 g/l NaCl; 10 g/l Bacto-Trypton; 5 g/l Hefeextrakt; autoklaviert.
LB-Selektionsmedium:	LB-Medium mit Antibiotikazugabe direkt vor Gebrauch.
LB-Top-Agar:	LB-Medium mit 0,7 % Agarose
Neutralisierungslösung:	1,5 M NaCl; 1 M Tris/HCl, pH 7,4; 1 mM EDTA
PBS:	8 g/l NaCl, 0,2 g/l KCl, 1,44 g/l Na ₂ HPO ₄ *7 H ₂ O, 0,24 g/l KH ₂ PO ₄ *H ₂ O, pH 7,4
Prähybridisierungslösung:	50 % Formamid; 5x Denhardt's; 1,5 % SDS; 5x SSC; 0,1 mg/ml denaturierte Lachsspermien-DNA (Denaturierung durch fünfminütiges Kochen direkt vor Gebrauch der Lösung).
SDS-Probenpuffer	50 mM Tris/HCl, pH 6,8; 3,3 % SDS; 30 % Glycerin; 0,03 % Bromphenolblau; 50 mM DTT
SM-Puffer	5,8 g/l NaCl; 2 g/l MgSO ₄ *H ₂ O; 50 ml/l 1 M Tris/HCl, pH 7,5; 5 ml/l 2 % Gelatine, autoklaviert
SSC, 20x:	3 M NaCl; 0,3 M Na ₃ -Citrat
TAE, 50x:	242 g Tris; 57,1 ml Eisessig; 100 ml 0,5 M EDTA pH 8,0
TBS, 10x:	0,2 M Tris/HCl, pH 7,4; 1,4 M NaCl
TE-Puffer:	10 mM Tris/HCl, pH 8; 1 mM EDTA.
X-Gal-Stammlösung, 1000x:	50 mg/ml in DMF

3.15 Methoden

3.15.1 DNA-Amplifikation über die Polymerasekettenreaktion

(Saiki et al. 1988)

Für die Amplifikation von DNA wurden verschiedene Matrizen verwendet: 1 µl cDNA aus Ratten- oder Menschengehirn, 1 µl genomische Maus-DNA oder 1 pg Plasmid-DNA. Für die Gen-Klonierung wurden die *Pfu*-Polymerase oder die Polymerasenmischung *PowerScript* verwendet, wobei sich erste durch eine geringere Fehlerrate und zweite durch erhöhte Produktmenge auszeichneten. Die verwendeten Primer wurden auf eine optische Dichte bei 260 nm von 5 eingestellt. Ein typischer PCR-Ansatz hatte folgende Komponenten:

1 µl	Matrizen-DNA
5 µl	10x Reaktionspuffer
10 µl	5x Enhancer (nur <i>PowerScript</i>)
1 µl	50 mM MgCl ₂ (nur <i>PowerScript</i>)

1,4 µl	Primer 1
1,4 µl	Primer 2
1 µl	40 mM dNTP
0,5 µl	<i>Pfu</i> (5 U/µl) bzw. 1 µl <i>PowerScript</i> (2,5 U/µl)
ad 50 µl	H ₂ O.

Initial erfolgte eine Denaturierung für 5 min bei 94°C. Die Zyklenzahl betrug 30 bis 45 Zyklen, wobei die Synthesezeit der letzten 20 Zyklen um je 10 s verlängert wurde. Die Schmelzzeit betrug 30 s, -temperatur 94°C, die Hybridisierungszeit 30 s und die Synthesetemperatur 72°C. Die Synthesezeit betrug zu Beginn 2 min pro 1000 bp. Die Hybridisierungstemperatur wurde 2 bis 10°C unterhalb der mit dem Programm *OligoOrder* bestimmten Schmelztemperatur gewählt.

3.15.2 Polymerasekettenreaktion für die Genotypisierung

Der Reaktionsansatz enthielt in 10 µl TNK-Puffer (Blanchard et al. 1993) 0,5 µl 100 mM dNTP und 0,2 U *Taq*-Polymerase verschiedener Hersteller. Die Primer wurden mit Hilfe des *OligoOrder*-Programms gewählt, so daß der GC-Gehalt ca. 50-60 %, die Länge 17-26 Basen und die Schmelztemperatur 59-64°C betrug. Die Endkonzentration betrug 0,25 pMol. Die Zyklenparameter wurden wie oben angegeben eingestellt.

TNK-Puffer, 10x: 100 mM Tris/HCl pH8,5; 15 mM MgCl₂; 500 mM KCl; 50 mM NH₄Cl

3.15.3 Subklonierung von Plasmid-DNA

3.15.3.1 Herstellung elektrokompetenter Bakterien

Ein Liter LB-Medium wurden 1:100 mit einer Übernachtskultur angeimpft und bei 37°C im Schüttelinkubator bei 300 rpm kultiviert. Nach Erreichen der exponentiellen Wachstumsphase bei einer optischen Dichte (OD₆₀₀) von 0,5 bis 0,7 wurden die Bakterien durch Zentrifugation (15 min, 4000x g, 4°C) geerntet. Die Bakterien wurden nachfolgend mit einem Liter, 0,5 l und 0,25 l eiskalter, steriler 10 %iger Glycerinlösung gewaschen. Nach der letzten Zentrifugation wurde das Bakterienpellet in 4 ml 10 %iger Glycerinlösung resuspendiert und in Aliquots auf in einem Trockeneis/Isopropanol-Bad vorgekühlte Reaktionsgefäße verteilt. Über mehrere Monate behielten die Bakterien eine Transformationseffizienz von bis zu 10⁹ cfu/µg pBluescript II SK bei Lagerung bei -80°C.

3.15.3.2 Transformation von Bakterien

Ein Aliquot der elektrokompetenten Zellen wurde auf Eis aufgetaut. 20 bis 40 µl Bakterien-suspension wurden mit bis zu 5 µl Plasmidlösung in H₂O in eine Elektroporationsküvette mit 0,1 cm Elektrodenabstand gefüllt. Die Elektroporation erfolgte bei 1,8 kV im E.-coli-Pulser. Unmittelbar anschließend wurden die Zellen in 300 µl LB-Medium aufgenommen und auf LB-Selektionsplatten ausgestrichen und über Nacht bei 37°C inkubiert.

3.15.3.3 Blau-weiß-Selektionstest

Die Mehrfachklonierungsstelle in den Vektoren pBluescript II SK und pCR-Script war im lacZ-Gen enthalten. Bakterienkolonien, die Vektoren mit in die Mehrfachklonierungsstelle eingefügter DNA enthielten, ließen sich durch β-Galaktosidase-Expressionstests als weiße Kolonien identi-

fizieren. Vor Ausstreichen der transformierten Bakterien wurden die LB-Selektionsplatten mit 30 µl IPTG-Stammlösung und 30 µl X-Gal-Stammlösung ausgestrichen.

3.15.3.4 Testung auf gewünschte Klone über radioaktive Sonden

Die transformierten Bakterien wurden auf Nylonfiltern auf Selektionsplatten ausplattiert und über Nacht bei 37°C inkubiert. Der Filter wurde auf ein Filterpapier gelegt und eine Kopie durch Auflegen eines zweiten Nylonfilters erhalten (*replica*). Nach Markierung der Orientierung wurde die Kopie auf die Selektionsplatte gelegt und für weitere 4 h bei 37°C inkubiert. Zur Lysierung der Bakterien wurde der Originalfilter 5 min auf ein mit 10 %iger SDS-Lösung getränktes Filterpapier gelegt. Die Denaturierung der DNA erfolgte nach Transfer für 5 min auf ein mit Denaturierungspuffer getränktes Filterpapier. Anschließend wurde der Filter 5 min auf einem mit Neutralisierungspuffer getränktem Filterpapier inkubiert und die DNA auf dem noch feuchten Filter bei 1 J/cm² im Fluo-Link vernetzt. Bakterienreste wurden mit 2x SSC abgewaschen. Die Hybridisierung der *Bakterienlifts* erfolgte wie weiter unten beschrieben.

3.15.3.5 Testung auf gewünschte Klone über PCR

Einzelkolonien der LB-Selektionsplatten wurden in 100 µl LB-Selektionsmedium in 96-Lochplatten für mehrere Stunden bei 37°C inkubiert. Der PCR-Reaktionsansatz wurde in 96-Loch-PCR-Reaktionsplatten vorgelegt und die Reaktion nach Zugabe von ca. 1 µl Bakterienlösung über einen Miktroplattenreplikator gestartet. Der PCR-Reaktionsansatz enthielt einen Vektor-spezifischen und einen *insert*-spezifischen Primer.

3.15.4 Präparation von DNA

3.15.4.1 Phenol/Chloroform-Extraktion

Zur Denaturierung von Proteinen wurde die DNA-Lösung mit gleichem Volumen Phenol/Chloroform-Mischung versetzt. Zur Phasentrennung wurde der Ansatz 5 min bei 15000 rpm in der Tischzentrifuge zentrifugiert. Die obere wäßrige Phase wurde mit gleichem Volumen Chloroform extrahiert und nach Trennung die Phasen durch erneute Zentrifugation getrennt. Die DNA aus der oberen wäßrigen Phase wurde gefällt.

Phenol/Chloroform-Mischung: Puffergesättigtes Phenol / Chloroform im Volumenverhältnis von 1:1

3.15.4.2 DNA-Präzipitation

Die DNA-Lösung wurde auf eine NaCl-Konzentration von 200 mM eingestellt und mit zwei Volumina Ethanol gefällt. Die DNA wurde 10 min bei 15000 rpm in der Tischzentrifuge abzentrifugiert, der Überstand verworfen und das Pellet in H₂O gelöst, so daß eine DNA-Konzentration von 0,5 bis 1,5 µg/µl resultierte.

3.15.4.3 Isolierung von DNA-Fragmenten aus Agarosegelen

Die Gelbanden wurden unter der UV-Handlampe (312 nm) ausgeschnitten und mit Hilfe des Qiaex II Kits nach Herstellerangaben isoliert. Transgene Vektoren wurden anschließend noch mit Phenol/ChCl₃ extrahiert, die DNA in 5 mM Tris/HCl (pH7,5) aufgenommen und steril filtriert.

Gelstücke mit DNA-Fragmenten größer als 20 kb wurden mit zwei Volumen puffergesättigtem Phenol versetzt und eingefroren. Die Proben tauten während der zehnminütigen Zentrifugation in

der Tischzentrifuge bei 15000 rpm zur Phasentrennung auf. Die DNA aus der oberen wäßrigen Phase wurde mit Chloroform extrahiert und gefällt und anschließend in 30 µl H₂O gelöst.

3.15.4.4 Plasmidschnellpräparation

(Del Sal et al. 1988)

Zur Testung auf den gewünschten Klon nach Ligation wurden 1 ml für Plasmide mit hoher Kopienzahl oder 5 ml LB-Selektionsmedium für Plasmide mit niedriger Kopienzahl in Reaktionsgefäßen bzw. 15 ml Röhrchen mit Einzelkolonien angeimpft und über Nacht bei 37°C inkubiert. Die Bakterien wurden 1 min in Reaktionsgefäßen in der Tischzentrifuge bei 10000 rpm bzw. 10 min bei 3500 rpm in der Schwingrotorzentrifuge geerntet. Das Pellet wurde in 200 µl STET aufgenommen und nach Zugabe von 4 µl Lysozymlösung 5 min unter Schütteln bei Raumtemperatur inkubiert. Die Proben wurden anschließend für 1 min bei 100°C behandelt. Zelltrümmer und denaturierte Proteine wurden 5 min bei 15000 rpm in der Tischzentrifuge abzentrifugiert und mit einem Zahnstocher entfernt. Die DNA wurde durch Zugabe von 8 µl 5 %ige CTAB-Lösung präzipitiert und 10 min bei 15000 rpm in der Tischzentrifuge abzentrifugiert. Nach Abnahme des Überstandes wurde die DNA in 300 µl 1,2 M NaCl-Lösung unter kräftigem Schütteln gelöst und nach Zugabe von 750 µl Ethanol gefällt. Die DNA wurde wie oben erwähnt abzentrifugiert, der Überstand verworfen und nach Trocknung bei Raumtemperatur in 20 bis 30 µl H₂O gelöst. 3 bis 5 µl der Präparation wurden einem analytischen Restriktionsverdau unter Zugabe von 1 µl RNase pro Ansatz unterzogen, um den gewünschten Klon zu identifizieren.

STET: 8 % Sucrose; 0,1 % Triton X-100; 50 mM EDTA; 50 mM Tris/HCl, pH 8

Lysozymlösung: 50 mg/ml Lysozym

3.15.4.5 Plasmidpräparation hoher Reinheit

Für die DNA-Sequenzierung und Transfektion bzw. Mikroinjektion eukaryontischer Zellen wurde Plasmid-DNA hoher Reinheit benötigt. Hierfür wurden die Mini- und Midi-Kits von der Firma Qiagen verwendet und nach Herstellerangaben vorgegangen.

3.15.4.6 Präparation genomischer DNA aus Gewebeproben

5 mm Schwanzspitze von Mäusen wurden in 200 µl SNET mit Proteinase K über Nacht bei 55°C lysiert. Die DNA wurde mit 400 µl Phenol/Chloroform-Gemisch extrahiert. Der Ansatz wurde in ein Phase Lock Gel I heavy-Gefäß überführt und die Phasentrennung nach 10minütiger Zentrifugation bei 15000 rpm in der Tischzentrifuge erreicht. Die wäßrige Phase wurde mit 400 µl Chloroform extrahiert und die Phasen durch kurze Zentrifugation getrennt. Die DNA wurde gefällt und in 50 µl H₂O über Nacht gelöst.

SNET: 20 mM Tris/HCl pH 8,0; 5 mM EDTA; 1 % SDS; 400 mM NaCl

Proteinase K: 100 µg/ml frisch eingewogen

3.15.5 Kurzlyseprotokoll für genomische DNA von Gewebeproben

Jackson Laboratory, Main Harbor, USA

2 mm Schwanzspitzen von Mäusen wurden in 1,2 ml fassende collection tubes überführt und in 200 µl PBNB mit 5 µl 10 %iger Proteinase K-Lösung über Nacht bei 55°C lysiert. Der Ansatz

wurde 10 min im kochenden Wasserbad inkubiert. Ca. 1 µl der Lösung wurde für PCR-Reaktionen verwendet.

PBND: 10 mM Tris/HCl, pH 8,3; 50 mM KCl; 2,5 mM MgCl₂; 0,1 mg/ml Gelatine; 0,45 % (v/v) Nonidet P40; 0,45 % (v/v) Tween 20; autoklaviert.

3.15.6 DNA-Analyse

3.15.6.1 Konzentrationsbestimmung

Die Konzentration von Plasmid-DNA nach Isolierung über das Plasmid Mini- oder Midi-Kit wurde über die Absorption bei 260 nm im Photometer bestimmt. Dabei entspricht eine DNA-Konzentration von 50 µg/ml einer optischen Dichte von eins. Ansonsten wurde die DNA-Konzentration nach Agarosegelelektrophorese im Vergleich zu der Intensität der Ethidiumbromid gefärbten Banden des Längenstandards λ BstE II ermittelt.

3.15.6.2 Restriktionsverdau von DNA

Für analytische Zwecke wurden 0,5 bis 2 µg Plasmid-DNA in 25 µl Gesamtvolumen über eine Stunde mit 1 bis 5 U eines oder mehrerer Restriktionsendonukleasen verdaut. Der Inkubationspuffer und die Inkubationstemperatur wurden nach Empfehlung des Enzymherstellers gewählt. Die Fragmente wurden durch Agarosegelelektrophorese aufgetrennt und das Restriktionsmuster mit Hilfe der Videogeldokumentationsanlage dokumentiert.

Für präparative Zwecke wurden bis zu 10 µg Plasmid-DNA in 50 bis 100 µl Gesamtvolumen verdaut. Die Isolation des Vektors (Fragment, das die Anteile des Plasmides enthält, die für die Propagation in Bakterien notwendig sind) erfolgte nach Auftrennung durch Agarosegelelektrophorese mit Hilfe des Qiaex II-Kits oder, falls nur Fragmente kleiner 20 bp abgetrennt wurden, durch Fällung. Die übrigen Fragmente wurden mit Hilfe des Qiaex II-Kits gereinigt.

3.15.6.3 DNA-Sequenzierung

DNA-Sequenzierungen wurden nach einer modifizierten Didesoxy-Methode durchgeführt (Sanger et al. 1977). Die Sequenz aller subklonierten PCR-Produkte, von Teilen aller Rekombinationsvektoren und aller Expressionskonstrukte wurde über die DNA-Sequenzierung überprüft. Plasmid-DNA wurde auf eine Konzentration von 100 ng/µl und PCR-Produkte auf 10-30 ng/µl eingestellt. Die Sequenzierung erfolgte über das institutseigene Sequenzierlabor.

3.15.7 Modifikation von DNA

3.15.7.1 Dephosphorylierung der 5'-Enden von DNA

Nach Restriktionsverdau der Plasmid-DNA wurde der Ansatz vierfach mit H₂O verdünnt. Nach Zugabe des 10fach konzentrierten Inkubationspuffers des Herstellers und 1 U pro µg DNA alkalischer Phosphatase wurde der Ansatz 2-4 h bei 37°C inkubiert. Die Proteine wurden über Phenol/Chloroform-Extraktion entfernt und die DNA anschließend in H₂O aufgenommen.

3.15.7.2 Ligation von DNA

20 bis 100 ng Vektor-DNA wurden mit ca. der dreifachen molaren Menge der einzufügenden DNA (*insert*) in einem Endvolumen von 30 µl vermischt. Die Reaktion erfolgte im mitgelieferten Puffer mit 1 U T4-DNA-Ligase über Nacht bei 16°C.

Bei der Ligation von nicht kohesiven Enden (*blunt end*) wurde die Reaktion für 2-4 h bei Raumtemperatur durchgeführt. Ein Teil des Ansatzes wurde in Bakterien transformiert.

Die Ligation von PCR-Produkten mit nicht kohesiven Enden erfolgte in den Vektor pCR-Script II. 25 ng Vektor-DNA verdaut mit *SmaI* wurden mit ca. der fünffachen molaren Menge über das Qiaex II- oder QIAquick PCR Purification-Kit-gereinigte PCR-Produkt in einem Endvolumen von 10 µl vermischt. Nach Zugabe von NEB-Puffer A, 0,5 µl 10 mM ATP, 2 U *SmaI* oder *SrfI* und 1 µl T4 DNA-Ligase wurde die Ligation für 2 h bei Raumtemperatur durchgeführt und ein Aliquot transformiert.

Die Ligation von PCR-Produkten nach Amplifikation mit der *Power-Script-Polymerase*-Mischung erfolgte nach Herstellerangaben mit dem TOPO-Ligations-Kit. 1 µl des 8 µl-Ansatzes wurden in elektrokompente Bakterien transformiert.

3.15.7.3 Zielgerichtete Mutationen, eingefügt über die Polymerase-Kettenreaktion

(Higuchi 1990)

Zwei Primerpaare, die den gewünschten Genabschnitt flankieren, wurden erstellt. Im Bereich der einzufügenden Mutation wurden zwei gegenläufige Primerpaare generiert, die die Mutation und eine stille Mutation zur Einfügung einer neuen Markierungs-Restriktionsschnittstelle enthielten. Anschließend wurden zwei Polymerase-Kettenreaktionen mit je einem Mutationsprimer und einem flankierenden Primer durchgeführt. Die Sequenz dieser Produkte überlappt sich um ca. 30 bp. Die Produkte wurden 1:100 verdünnt, in einer neuen Reaktion ohne Primer eingesetzt und über 5-10 Zyklen verschmolzen. Anschließend wurden die flankierenden Primer zugefügt und das gewünschte mutierte Produkt amplifiziert, isoliert und in den gewünschten Vektor kloniert. Der Erfolg konnte über die eingefügte Markierungsschnittstelle überprüft werden.

3.15.7.4 Auffüllen und Verdau von überstehenden Enden nach Restriktionsverdau

Restriktionsenzyme wie z.B. *KpnI* produzieren 3'-überhängende Enden. Für die Ligation mit nicht kohesiven DNA-Fragmenten wurde die DNA nach Restriktionsverdau gefällt und in 50 µl Endvolumen im mitgelieferten Inkubationspuffer mit 2 U T4-DNA-Polymerase und 0,1 mM dNTP für 1 h bei 37°C inkubiert.

Restriktionsenzyme wie z.B. *EcoRI* produzieren 5'-überhängende Enden. Diese wurden mit 2 U *Klenow*-DNA-Polymerase und 1 mM dNTP innerhalb von 1 h bei 37°C aufgefüllt.

Die Entfernung von 5'-überhängenden Enden erfolgte mit der Mung-Bean-Exonuklease nach Herstellerangaben.

Für die partielle Auffüllung von 5'-überhängenden Enden wurden nur die entsprechenden Nukleotide in den Reaktionsansatz gegeben. Das verbleibende 5'-überhängende Ende wurde dann mit Hilfe der Mung-Bean-Exonuklease entfernt.

Falls die DNA nach Modifizierung noch einem weiteren Restriktionsverdau unterzogen wurde, wurde die DNA vorher mit Phenol/Chloroform extrahiert und in dem entsprechenden Puffer wieder gelöst.

Die erhaltenen Fragmente wurden über Agarosegelelektrophorese aufgetrennt.

3.15.7.5 Radioaktive Markierung von DNA

(Feinberg und Vogelstein 1983)

Die Markierung wurde nach Vorschrift des Prime-IT II Random Primer labeling-Kits durchgeführt und nicht inkorporierte Nukleotide über Bio Spin P30-Säulen abgetrennt.

3.15.8 DNA-Gelelektrophorese

Standardmäßig wurden für Plasmid-DNA 1 %ige Gele und für die Analyse von PCR-Produkten bei der Genotypisierung 1,5 %ige Gele verwendet. Die Analyse von DNA-Fragmenten kleiner als 500 bp wurde mit Hilfe einer Agarosekonzentration von 2 % durchgeführt. Die Agarose wurde unter Kochen in 1x TAE gelöst. Nach Abkühlung auf ca. 50°C wurde Ethidiumbromid in einer Endkonzentration von 0,5 µg/ml zugefügt, das Gel in den Gelträger der Elektrophoresekammer gegossen und der Probenkamm eingesetzt. Die DNA-Proben wurden mit ca. 0,2 Volumen des Probenpuffers versetzt, bei 150 bis 250 V im Gel aufgetrennt und die Fragmente auf dem UV-Leuchttisch (254 nm) sichtbar gemacht.

6x Probenpuffer: 0,25 % Bromphenolblau, 40 % Saccharose.

3.15.9 DNA-Transfer auf Nylonmembranen nach Southern

(Southern 1975)

Für Hybridisierungen wurde die DNA auf einen Nylonträger transferiert. Nach Agarosegelelektrophorese wurde das Gel 20 min im Denaturierungspuffer inkubiert. Das Gel wurde auf zwei Lagen in Denaturierungspuffer getränktem Whatman 3MM-Filterpapier aufgelegt, deren Enden in Tanks mit reichlich Denaturierungspuffer eintauchten. Auf das Gel wurde eine feuchte Nylonmembran, gefolgt von zwei Lagen feuchtem Filterpapier und einem Stapel trockener Papierhandtücher, gelegt. Der Aufbau wurde mit einem Gewicht von ca. 200 bis 500 g beschwert, um eine bessere Kapillarwirkung der Handtücher zu bewirken. Nach zwölfstündigem Transfer wurde die Nylonmembran 5 min im Neutralisierungspuffer und 5 min in 2x SSC inkubiert. Die DNA wurde durch UV-Licht (1 J/cm²) im Fluo-Link kovalent an die Membran gebunden.

Für den zweistündigen Transfer von Plasmid-DNA wurde das Gel auf einen Streifen Frischhaltefolie ohne Denaturierungspuffer-Reservoir gelegt.

3.15.10 Hybridisierung

Nylonmembranen nach *Southernblot*, *Bakterienlifts* oder *Phagenlifts* wurden 2 bis 4 h bei 42°C im Prähybridisierungspuffer inkubiert. Die Lösung wurde durch Hybridisierungspuffer ersetzt und über Nacht bei 42°C unter Schwenken inkubiert. Die Membran wurde zweimal 20 min bei 60°C in reichlich Waschlösung I und 20 min bei 60°C in reichlich Waschlösung II gewaschen. Die luftgetrocknete Membran wurde anschließend auf einem Röntgenfilm bei -70°C oder einer Expositionsplatte des FujiBas 5000 exponiert.

Waschlösung I: 2x SSC; 0,1 % SDS

Waschlösung II: 0,1x SSC; 0,1 % SDS

3.15.11 Klonierung aus Phagen-Genbibliotheken

3.15.11.1 Screening einer Phagen-Genbibliothek

Mit Hilfe von DNA-Sonden können über Hybridisierung einzelne Klone einer Genbank identifiziert werden. Überlappende Klone umspannen das gesamte Gen bzw. die cDNA.

50 ml LB-Medium mit 0,2 % Maltose und 10 mM MgSO_4 wurden mit einer Kolonie Bakterien (XL1-Blue MRA(P2)) über Nacht bei 37°C inkubiert. Die Bakterien wurden pelletiert und nach einmaligen Waschen in SM-Puffer aufgenommen, so daß die Suspension eine optische Dichte bei 600 nm von eins hatte. Zur Titerbestimmung wurde eine Verdünnungsreihe der Bibliothek von 10^{-3} bis 10^{-6} hergestellt. 40 µl Phagenverdünnung wurden mit 400 µl Bakterien 20 min bei 37°C inkubiert mit 8 ml 50°C warmem Top-Agar vermischt und auf vorgewärmte LB-Kulturschalen (15 cm Durchmesser) ausgegossen. Nach Erhärten des Agars wurden die Kulturschalen ca. 10 h bei 37°C inkubiert, bis die Lysehöfe konfluent wurden.

Die Genbibliothek wurde mit einem Titer von 50.000 pfu pro Platte auf ca. 20 Platten ausplattiert. Von den erkalteten Platten wurden doppelte Filter-Replikate (*Phagenlifts*) erstellt. Die Phagen auf den Nylonmembranen wurden denaturiert (5 min Denaturierungslösung) und nach Neutralisation (5 min Neutralisierungslösung) und Waschen der Filter (zweimal 5 min 2x SSC) wurde die DNA 2 h im Vakuumofen an der Membran fixiert. Die gesuchten Plaques wurden durch Hybridisierung mit einer radioaktiven Sonde identifiziert und herausgestanzt. Es wurden nur die Signale als positiv bewertet, die auf beiden Duplikaten vorkamen. Die Phagen wurden aus dem Agarblöckchen in SM-Puffer ausgeschwemmt und Einzelplaques durch erneutes Ausplattieren isoliert.

3.15.11.2 Phagenamplifikation

Die Einzelplaques wurden durch Ausplattieren mit 50000 pfu amplifiziert und mit 4 ml SM-Puffer über 5 h heruntergewaschen. Nach Zugabe von 50 µl Chloroform konnte die Lösung für einige Wochen bei 4°C gelagert werden.

3.15.11.3 Präparation von λ -Phagen-DNA

Für die Isolation von λ -Phagen-DNA wurden 20 bis 100 µl des Amplifikates mit 400 µl Bakterien versetzt und dieser Ansatz in 50 ml LB mit 0,2 % Maltose und 10 mM Mg_2SO_4 über Nacht bei 37°C inkubiert. Je nach Phagen/Bakterien-Verhältnis fand eine vollständige Lyse statt. Diese wurden nach Zugabe von 750 µl Chloroform und Inkubation für 30 min bei 37°C bei 3500 rpm in der Megafuge für 10 min abzentrifugiert. Die Isolation der DNA erfolgte nach einem Protokoll der Firma Qiagen, Hilden: Nach Zugabe von 100 µl Puffer L1 wurde 30 min 37°C und nach weiteren 10 ml Puffer L2 60 min bei 0°C inkubiert. Nach Zentrifugation für 10 min bei 10000x g wurde das Sediment in 3 ml L3 aufgenommen, 3 ml L4 hinzugefügt und 20 min auf Eis inkubiert. Nach Zugabe von 3 ml Puffer L5 wurde der Ansatz 30 min bei 15000x g zentrifugiert. Die Zentrifugation wurde mit dem Überstand wiederholt und die DNA aus diesem über das Qiagen Midi-Kit nach Herstellerangabe isoliert.

Puffer L1: 300 mM NaCl; 100 mM Tris/HCl, pH 7,5; 10 mM EDTA; 0,2 mg/ml BSA; 20 mg/ml RNase A; 6 mg/ml DNase I

Puffer L2: 30 % Polyethylenglykol (PEG 6000); 3 M NaCl

Puffer L3: 100 mM NaCl; 100 mM Tris/HCl, pH 7,5; 25 mM EDTA

Puffer L4: 4 % SDS

Puffer L5: 3 M Natriumacetat, pH 5,5

3.15.11.4 Subklonierung der genomischen Klone

Mit Hilfe der Restriktionsendonuklease *NotI* und Trennung durch Agarosegelelektrophorese wurde die klonierte genomische DNA isoliert und in das Plasmid pBluescript II kloniert.

3.15.12 Sequenzanalyse und Datenbanksuche

Die computergestützte Sequenzanalyse erfolgte mit dem Programmpaket Lasergene. Proteinstrukturanalyse, Suche nach verwandten Proteinen und Literaturdatenbanksuche erfolgte über die Internetzugänge bei NCBI und ISREC.

3.15.13 Gewinnung von Gewebehomogenaten

Ratten oder Mäuse wurden durch Genickbruch getötet, die Gewebe entnommen und im Homogenisationspuffer auf Eis gelagert. Gehirnregionen wurden unter dem Binocular auf einem eiskalten mit Homogenisationspuffer getränktem Filterpapier präpariert. Die Hippokampusregionen wurden analog der Vorschrift von Hörtnagl, gewonnen (Hörtnagl et al. 1991).

Homogenisationspuffer: 0,32 M Saccharose; 20 mM HEPES/NaOH, pH 7,4; 0,1 mM EDTA; 1x Proteaseinhibitor-Mix.

Proteaseinhibitor-Mix (1000x): 1 mg/ml Aprotinin in H₂O; 1 mg/ml Leupeptin in H₂O; 1 mg/ml Pepstatin in Ethanol; 200 mM PMSF in Ethanol.

3.15.14 Subzelluläre Fraktionierung

(Huttner et al. 1983; Jones und Matus 1974)

30 Cortices von Mäusen (6-8 Wochen alt) wurden in eiskaltem Homogenisationspuffer gesammelt. Das Gewebe wurde in 80 ml Homogenisationspuffer mit 12 Hüben bei 900 rpm im Potter-Elvehjem homogenisiert. Die Kerne und Zelltrümmer wurden bei 800x g für 10 min abzentrifugiert (P1). Aus dem Überstand (S1) wurden Synaptosomen durch 15minütige Zentrifugation bei 9200x g angereichert (P2). Der Überstand wurde 1 h bei 100.000x g zentrifugiert. Dieses Pellet (P3) enthielt hauptsächlich Mikrosomen, Lysosomen und auch synaptische Vesikel. Der Überstand (S3) war angereichert mit löslichen Proteinen aus dem Zytosol. Das Pellet P2 wurde mit Homogenisationspuffer gewaschen und erneut abzentrifugiert (P2'). Dieses Pellet enthielt die unreine Synaptosomenfraktion und wurde in 13 ml Homogenisationspuffer resuspendiert. Die Synaptosomen wurden durch Zugabe von neun Volumina H₂O und Homogenisation mit fünf Hüben bei 1500 rpm im Potter-Elvehjem lysiert. Der Ansatz wurde 20 min bei 25000x g zentrifugiert, wobei das Pellet (LP1) mit Plasmamembranen aus aufgebrochenen Nervenendigungen angereichert war. Aus dem Überstand wurde durch Zentrifugation für 1 h bei 100.000x g die unreine synaptische Vesikelfraktion (LP2) gewonnen. Der Überstand (LS2), der mit synaptischen zytosolischen Proteinen angereichert war, wurde im Biomax-5K ultrafiltriert oder durch TCA gefällt. Das Pellet LP1 wurde in 45 ml 1,2 M Sucroslösung aufgenommen und aufgeteilt in drei Zentrifugenröhrchen mit 15 ml 0,8 M Sucrose und 0,3 M Sucrose überschichtet. Die Fraktion der synaptischen Plasmamembranen wurde nach Zentri-

fugation für 150 min bei 19000 rpm im SW28-Rotor (Beckmann Instruments, München) als Bande zwischen den untersten Schichten isoliert mit zwei Volumen H₂O verdünnt und 20 min bei 37000x g abzentrifugiert (SPM).

1,2 M Sucroslösung: 1,2 M Sucrose, 5 mM HEPES/NaOH; pH 7,4

3.15.15 Proteinpräzipitation

Proteine wurden durch die Zugabe von 0,25 Volumenanteilen 50 % TCA ausgefällt und 10 min bei maximaler Umdrehung in der Tischzentrifuge oder 30 min bei 20.000x g in der Sorvall-Zentrifuge abzentrifugiert. Um überschüssige TCA zu entfernen, wurde das Pellet mit Diethylether gewaschen und erneut abzentrifugiert. Nach TCA-Fällung wurde die Probe in der Regel in SDS-Probenpuffer aufgenommen.

3.15.16 Präparation von GST-Fusionsproteinen

3.15.16.1 Überexpression von Fusionsproteinen in E. coli

LB-Medium wurde 1:100 mit einer Übernachtskultur des gewünschten pGEX-KG-Konstruktes in BL21(DE3)pLysS angeimpft und unter starkem Schütteln bei 37°C inkubiert. Nach Erreichen der exponentiellen Wachstumsphase ($OD_{600} = 0,5-0,8$) wurde die Expression durch Zugabe von IPTG induziert. Die Expressionszeit, IPTG-Menge und Inkubationstemperatur wurden in Vorversuchen für jedes Konstrukt optimiert. Die Bakterien wurden geerntet und eingefroren.

3.15.16.2 Reinigung von Fusionsproteinen

Eingefrorene Bakterienpellets wurden in 10 ml Lysepuffer pro Liter Kultur resuspendiert. Nach Zugabe von 70 µg/ml Lysozym und 1 mM PMSF wurde der Ansatz 30 min auf Eis inkubiert und die Bakterien durch vier Ultraschallpulse über 30 s (*output level 6, duty 50%*) aufgeschlossen. Nach Zugabe der gleichen Menge PMSF und einer Spatelspitze DNase wurde der Ansatz 20 min auf Eis inkubiert und anschließend 20 min bei 16.500 rpm im SS34-Rotor zentrifugiert. Der Überstand wurde mit 1 ml Glutathion-Agarose pro Liter Kultur 1 h bei 4°C unter Schwenken inkubiert. Das Säulenmaterial wurde 5 min bei 3500 rpm in der Megafuge abzentrifugiert und mindestens dreimal mit 50 ml Lysepuffer gewaschen. Die Elution erfolgte durch proteolytische Abspaltung des Tags. Die Protease Thrombin wurde über Gelfiltrationschromatographie von und die TEV-Protease über Ni²⁺-NTA-Agarose abgetrennt. Die Fraktionen wurden durch SDS-PAGE analysiert und bei Bedarf gegen H₂O über Nacht bei 4°C dialysiert.

Lysepuffer: 50 mM Tris/HCl pH 7,5, 300 mM NaCl

3.15.16.3 Proteolytische Spaltung von Fusionsproteinen

3.15.16.3.1 Thrombin

Die Glutathion-Agarose wurde dreimal mit 10fachem Volumen Thrombinpuffer gewaschen. Der Thrombinverdau erfolgte in zweifachen Bettvolumen mit 0,1 U Thrombin pro Liter Kultur für 30 min bei Raumtemperatur. Die Glutathion-Agarose wurde 1 min bei 1000 x g sedimentiert und der Überstand abgenommen und EGTA zu einer Endkonzentration von 5 mM zugegeben. Der Verdau wurde noch zweimal wiederholt und die gesammelten Überstände auf Eis gelagert. Die

Überstände wurden in Biomax-5K-Ultrafiltrationseinheiten durch Zentrifugation auf 0,5 ml pro Liter Kultur konzentriert.

Thrombinpuffer: 50 mM Tris/HCl, pH 7,5; 150 mM NaCl; 2,5 mM CaCl₂.

3.15.16.3.2 TEV-Protease

Die Glutathion-Agarose wurde dreimal mit 10fachem Volumen TEV-Puffer gewaschen. Die Spaltung mit TEV-Protease erfolgte in zweifachem Bettvolumen mit 10 U pro Liter Kultur für eine Stunde bei 30°C. Der Verdau wurde analog zum Thrombinverdau zweimal wiederholt und die Überstände auf Eis gesammelt. Die Protease wurde durch Zugabe von 50 µl Ni²⁺-NTA-Agarose und Inkubation für eine Stunde bei 4 °C gebunden. Der Überstand wurde analog dem Thrombinverdau konzentriert.

TEV-Puffer: 50 mM Tris/HCl, pH 8,0; 0,5 mM EDTA.

3.15.16.4 Gelfiltrationschromatographie

Die Gelfiltrationschromatographie wurde an einer FPLC-Anlage auf einer Hi Load 16/60 Superdex 75-Säule durchgeführt. Die Proben wurden in einem Volumen von bis zu 1 ml über eine Schleife aufgetragen und bei einer Flußgeschwindigkeit vom Laufpuffer von 1 ml/min aufgetrennt. Die Säulenelution wurde über einen UV-Detektor registriert und der erste Gipfel gesammelt. Eine Kontrolle der Fraktionen erfolgte über SDS-PAGE.

Laufpuffer: 20 mM Tris/HCl, pH 7,4; 100 mM NaCl; 30 min unter Vakuum entgast.

3.15.17 Immunisierung von Kaninchen

Die Immunisierung von Kaninchen wurde durch die Applikation von Immunogen mit Adjuvantien an mehreren Stellen subkutan durchgeführt. Vor der Immunisierung wurden 5 ml Präimmunserum abgenommen. 300 µg rekombinantes Protein in 500 µl PBS wurde mit gleichem Volumen kompletten Freund'schen Adjuvans' versetzt. Die Emulsion wurde durch mehrmalige Passage durch eine Kanüle (20 G) homogenisiert. Die folgenden drei Immunisierungen mit inkomplettem Freund'schem Adjuvans erfolgten im Wochenabstand. Einen Tag nach der letzten Immunisierung wurde 10 ml Blut gewonnen. Nach der Gerinnung wurde der Blutkuchen abzentrifugiert und das Serum getestet. In Wochenabständen wurden weitere Seren gewonnen und getestet. Mögliche Boosterimmunisierungen konnten den Titer erhöhen. Bei gutem Titer wurden die Kaninchen ausgeblutet und die Seren in Aliquots eingefroren gelagert.

3.15.18 Messung der Neurotransmitteraufnahme

3.15.18.1 Synaptosomaler Transport

(Teng et al. 1997)

Es wurde die rohe Synaptosomenfraktion P2 der subzellulären Fraktionierung von Maus-Striatum verwendet. 300 bis 350 µg Gesamtprotein in 120 µl Reaktionsvolumen wurden 10 min bei 32°C in KRH-Puffer mit oder ohne Modulatoren vorinkubiert. Für die Leerwertbestimmung enthielt die Lösung 0,1 mM des Dopamintransporterblockers GBR12909. Die synaptosomale Aufnahme wurde durch die Zugabe von 0,05 µCi [³H]-Dopamin mit einer finalen Dopaminkonzentration von 0,27 µM gestartet. Nach 10-minütiger Inkubation bei 32°C wurde die

Reaktion durch Zugabe von 3 ml eiskaltem KRH-Puffer gestoppt und die Proben durch mit 0,05 %-igem Polyethylenimid vorbehandelte Whatman GF/B-Filter filtriert. Die Filter wurden dreimal mit 3 ml KRH-Puffer gewaschen und die gebundene Radioaktivität im Szintillationszähler bestimmt. Leerwerte wurden subtrahiert und die Aufnahme bezogen auf die eingesetzte Proteinmenge und Zeiteinheit berechnet.

3.15.18.2 Vesikulärer Transport

(Hell et al. 1988; Teng et al. 1997)

Es wurde die rohe synaptische Vesikelfraktion LP2 der subzellulären Fraktionierung von Maus-Vorderhirnen verwendet. 25 bis 50 µg Gesamtprotein wurden 5 min bei 32°C in KHE-Puffer mit oder ohne Modulatoren vorinkubiert. Als Modulatoren wurden 20 µg rekombinante α -Synuclein-Konstrukte verwendet. Die Reaktion wurde durch Zugabe von 1 µCi [3 H]-Dopamin (0,2 µM finale Dopaminkonzentration) und 1,8 mM ATP gestartet. Leerwerte wurden in Anwesenheit von 50 µM Reserpin bestimmt. Alle Ansätze enthielten 1 % (v/v) Ethanol in einem Ansatzvolumen von 170 µl. Nach 5 min wurde die Reaktion durch Zugabe von 3 ml eiskaltem Puffer gestoppt und die Proben durch Nitrocellulosefilter (0,45 µm Porengröße) filtriert. Die Filter wurden dreimal mit 3 ml Puffer gewaschen und die gebundene Radioaktivität im Szintillationszähler bestimmt. Leerwerte wurden subtrahiert und die Aufnahme bezogen auf die eingesetzte Proteinmenge und Zeiteinheit berechnet.

KRH-Puffer: 125 mM NaCl, 5 mM KCl, 1,5 mM MgSO₄, 1,25 mM CaCl₂, 1,5 mM KH₂PO₄, 10 mM D-Glucose, 0,1 mM EDTA, 0,1 mM Pargyline, 0,1 mM Ascorbinsäure, 25 mM HEPES-NaOH pH7,4; vor Gebrauch mit O₂ gesättigt.

KHE-Puffer: 100 mM Kaliumtartrat, 25 mM HEPES-KOH pH7,4, 50 µM EGTA, 100 µM EDTA, 2 mM MgSO₄, 1,7 mM Ascorbinsäure.

3.15.19 Nitrosylierung von Tyrosinresten in Gewebehomogenaten

Postnukleäre Überstände von Gehirnkortex zusammen mit Zwischenhirn wurden gewonnen. Die Zugabe von 18,9 µl Peroxynitritlösung erfolgte unter kräftigem Schütteln zu 300 µl PNS mit einer Proteinkonzentration von 4 mg/ml. Die Reaktion wurde fünf Minuten bei Raumtemperatur inkubiert. Der Leerprobe wurde die gleiche Menge 0,3 M NaOH zugegeben. Anschließend wurden die Proben mit Probenpuffer versetzt und über Immunoblotanalyse analysiert.

Peroxynitritlösung: 33 mM Peroxynitrit in 0,3 M NaOH. Lagerung in Aliquots bei -70°C. Konzentrationsbestimmung über den Extinktionskoeffizienten $\epsilon_{302} = 1,670 \text{ M}^{-1} \text{ cm}^{-1}$.

3.15.20 Methoden zur Proteinanalyse

3.15.20.1 Konzentrationsbestimmung von Proteinen

Proteinkonzentrationen wurden über das BCA-Kit der Firma Pierce bestimmt. 1 bis 5 µl Probe wurden in 50 µl H₂O aufgenommen. 10 µl wurden mit 200 µl BCA-Reagenz 30 min bei 60°C in einer 96-Lochplatte inkubiert. Nach 10minütigem Abkühlen der Platte wurde die Absorption bei 570 nm im Thermomax microplate reader gemessen. Die Konzentration wurde anhand einer Eichgeraden ermittelt, die über Standardproteinkonzentrationen mit BSA ermittelt wurden.

3.15.20.2 SDS-Polyacrylamidgelelektrophorese

(Laemmli 1970)

Proteine wurden in diskontinuierlichen 1 mm dicken SDS-Polyacrylamidgelen nach der Proteingröße aufgetrennt. Das Sammel- und Trenngel wurden über Nacht polymerisiert. Bis zu 80 µg Gesamtprotein in SDS-Probenpuffer wurden 10 min auf 50 bis 60°C erhitzt und in die Probentaschen gefüllt. Die Elektrophorese wurde in Mini-PROTEAN II-Gelkammern bei 15 mA pro Gel im Laufpuffer durchgeführt, bis die Bromphenolblau-Bande das Ende des Gels erreicht hatte. Anschließend wurden die Gele gefärbt oder die Proteine auf Nitrocellulose transferiert.

Laufpuffer: 3 g/l Tris; 14,4 g/l Glycin; 2g/l SDS

Sammelgelpuffer: 0,5 M Tris/HCl, pH 6,8; 0,4 % SDS

Trenngelpuffer: 1,5 M Tris/HCl, pH 8,8; 0,4 % SDS

AMBA: 30 %ige Acrylamid/N,N'-Methylen-bis-Acrylamid-Lösung im Mischungsverhältnis 37,5 zu 1

Sammelgel: für ca. 6 Gele: 5 ml H₂O; 1 ml AMBA; 2 ml Sammelgelpuffer; 20 µl TEMED; 48 µl 10 % APS

Trenngel (5-15 %): für 4 Gele: 10–5 ml H₂O; 5-10 ml AMBA; 5 ml Trenngelpuffer; 25 µl TEMED; 60 µl 10 % APS

3.15.20.3 Proteingelfärbung mit Coomassie Brilliant blue

SDS-Polyacrylamidgele wurden 15 min in 50°C warmer Färbelösung inkubiert. Anschließend wurden sie in reichlich H₂O 10 min bei voller Intensität in der Mikrowelle gekocht. Anschließend wurde das Wasser mehrmals gewechselt, bis der Hintergrund entfärbt wurde. Zur Beschleunigung der Entfärbung wurde Entfärbelösung verwendet.

Färbelösung: 0,15 % Coomassie Brilliant Blue R250; 10 % Eisessig; 25 % Isopropanol

Entfärbelösung: 30 % Methanol; 10 % Eisessig

3.15.20.4 Immunoblotanalyse

(Towbin et al. 1979)

3.15.20.4.1 Protein-Transfer nach Western

Proteine wurden aus SDS-Polyacrylamidgelen auf Nitrocellulosemembranen über ein elektrisches Feld transferiert. Dabei wurde die Nitrocellulosemembran auf das Gel gelegt und mit Filterpapieren und Schwämmen in einem Rahmen fixiert. Der Transfer erfolgte in einer Tankblotkammer, gefüllt mit Transferpuffer, über Nacht bei 40 mA.

Die Proteinbanden auf den Nitrocellulosemembranen wurden durch Inkubation mit PonceauS-Lösung sichtbar gemacht. Die Hintergrundfärbung wurde mit H₂O abgewaschen.

Transferpuffer: 3 g/l Tris; 14,4 g/l Glycin; 20 % Methanol

Ponceau S-Lösung: 0,1 % Ponceau S; 5 % Eisessig

3.15.20.4.2 Immunodetektion von Proteinbanden

Proteine auf Nitrocellulosemembranen wurden mit spezifischen Antikörpern markiert und mit sekundären Antikörpern detektiert. Nitrocellulosemembranstreifen wurden in 5 % Trockenmilchpulver in TBS-T 30 min unter Schütteln inkubiert. Nach kurzem Waschen mit TBS-T wurden sie mit der Antikörperlösung für 1 h inkubiert. Überschüssige Antikörper wurden durch zweimaliges Waschen für jeweils 10 min entfernt. Anschließend erfolgte die Inkubation mit der Detektionsantikörperlösung für ebenfalls 1 h. Nach gründlichem Waschen (dreimal für mehr als jeweils 10 min) wurden die Signale detektiert. Signale von HRP-konjugierten Sekundärantikörpern wurden nach Herstellerangaben über das ECL-Kit, und von jodinierten, radioaktiven Sekundärantikörpern über Exposition auf Detektionsplatten des FujiBas 5000 visualisiert. Bei der Verwendung von murinen Primärantikörpern wurde vor der Inkubation mit den radioaktiven Sekundärantikörpern analog mit einer Brückenantikörperlösung inkubiert.

TBS-T: TBS; 0,1 % Tween 20

Antikörperverdünnungslösung: 1 % Ziegsenrum in TBS-T

Antikörperlösung: Primärantikörper wurden 1:1000 bis 1:10000 in Antikörperverdünnungslösung verdünnt.

Brückenantikörperlösung: Kaninchen-anti-Maus-IgG 1:3000 in Antikörperverdünnungslösung verdünnt.

Detektionsantikörperlösung: HRP konjugierte Sekundärantikörper 1:5000 in Antikörperverdünnungslösung verdünnt bzw. 9 µl jodinierte, radioaktive Sekundärantikörper pro 10 ml Antikörperverdünnungslösung.

3.15.20.4.3 Quantifizierung von Proteinbanden

Signale auf Detektionsplatten des FujiBas 5000 wurden mit der „Profile-Option“ des Programmes MacBas ausgewertet. Dazu wurde ein Rahmen um die Gelspur der zu detektierenden Bande gezogen, die Nulllinie bestimmt und die Fläche unter dem Bandengipfel gemessen. Die Mittelwerte und Standardabweichung von Bandenintensitäten von drei verschiedenen Mäusen jeder Analysegruppe wurden berechnet und signifikante Unterschiede über Student's T-test mit dem Programm Excel bestimmt.

3.15.21 Methoden für die Immunzytochemie

3.15.21.1 Fixierung von Mausgewebe

Mäuse wurden über intraperitoneale Applikation von 0,6 ml Avertin pro mouse (Körpergewicht 30 g) narkotisiert. Nach negativem Zwischenzehenreflex wurde die Maus auf der Unterlage fixiert, der Thorax beidseits parasternal eröffnet und der linke Ventrikel des Herzens punktiert. Nach Fixierung der Punktionskanüle und kleiner Inzision im rechten Herzohr wurde das Tier mit 20 ml PBS gefolgt von 20 ml Fixierlösung perfundiert. Das Gehirn wurde präpariert und 30 min in Fixierlösung inkubiert. Anschließend wurde das Gewebe dreimal mit reichlich eiskaltem PBS gewaschen und in 10 ml eiskalte Gefrierschutzlösung überführt. Nach Absinken der Gewebe (ca. 24 bis 36 h) wurden diese in Einbettmedium auf Trockeneis eingefroren und bei -20°C gelagert.

Avertin: 1 g 2,2,2-Tribrom-Ethanol; 180 µl Amylalkohol; 71,5 ml H₂O; bei 42°C lichtgeschützt gelöst.

Fixierlösung: 4 % Paraformaldehyd in PBS. Das Paraformaldehyd wurde in H₂O unter Erwärmen und der Zugabe von 20 µl 5 M NaOH pro 100 ml gelöst. Nach Zugabe der PBS-Tabletten wurde die Lösung filtriert und innerhalb von zwei Tagen verbraucht.

Gefrierschutzlösung: 30 % Sucrose in PBS.

3.15.21.2 Fixierung von neuronalen Primärkulturen

Die Deckgläschen wurden einmal mit 500 µl PBS gewaschen und 20 min mit 500 µl Fixierlösung fixiert. Nach zweimaligem Waschen mit je 500 µl PBS wurden die Deckgläschen in PBS bei 4°C bis zur weiteren Bearbeitung aufbewahrt.

3.15.21.3 Bereitstellung von Gewebeschnitten

5 bis 15 µm dicke Gewebeschnitte wurden bei -20 bis -25°C Kammer- und Objekttemperatur im Kryostaten angefertigt. Die Schnitte wurden vom Messer auf SuperFrost Plus-Objektträger gezogen und über Nacht getrocknet. Die Objektträger wurden bei -20°C gelagert und vor der Weiterbearbeitung von überschüssigem Einbettmedium befreit.

20 bis 30 µm dicke Gewebeschnitte wurden bei -25°C Objekttemperatur im Gefriermikrotom angefertigt. Die Schnitte wurden bei -20°C in Kryoschutzlösung aufbewahrt. Vor der Immunofärbung wurden die Schnitte mit reichlich PBS gewaschen.

Kryoschutzlösung: 50 % 50 mM Natriumphosphatpuffer, pH 7,3; 30 % Ethylenglycol; 20 % Glycerin

3.15.21.4 Gelatinebeschichtung von Objektträgern

Die Objektträger wurden 20 min bei 50°C im Ultraschallbad bei voller Intensität mit ca. 2 % Extran-Lösung in Leitungswasser gewaschen. Anschließend wurden sie gründlich unter fließendem Leitungswasser und anschließend deionisiertem Wasser gespült. Die Beschichtung wurde für 2 min in frischer ca. 40°C warmer Eintauchlösung durchgeführt. Anschließend wurden die Objektträger 30 min bei 40°C im Vakuumofen getrocknet und konnten über Monate verwendet werden.

Eintauchlösung: 1 % Gelatine; 0,1 % Chromkaliumsulfat. Die Gelatine wurde bei 50°C gelöst und anschließend Chromkaliumsulfat zugefügt. Nach Filtration war die Lösung warm gebrauchsfertig.

3.15.21.5 Immunofärbung von Gewebeschnitten und Primärkulturen

(Mandell et al. 1990)

Schnitte auf Objektträgern wurden mit einem Fettmarkerstift umfahren und die Inkubation der Lösungen erfolgte in einer feuchten Kammer auf dem Objektträger. Die Gewebeschnitte wurden 30 min mit GSDB inkubiert. Der primäre Antikörper wurde in GSDB verdünnt und die Schnitte über Nacht bei 4°C darin inkubiert. Nach zweimaligem Waschen mit Waschlösung wurden die Schnitte in GSDB mit dem Fluoreszenzfarbstoff-markierten Detektionsantikörper für mindestens 5 h bei Raumtemperatur oder über Nacht bei 4°C inkubiert. Nach dreimaligem Waschen mit

Waschlösung und PBS für mindestens je 10 min wurden die Schnitte im leicht angetrockneten Zustand mit Antibleichmittel eingedeckelt.

Gewebeschnitte vom Kryomikrotom wurden in 24-Lochplatten analog inkubiert und anschließend auf mit Eintauchlösung vorbehandelte Objektträger gezogen. Die Eindeckelung erfolgte wie oben beschrieben.

Deckgläschen mit neuronalen Primärkulturen wurden in 12-Lochplatten inkubiert und mit Antibleichmittel auf Objektträger überführt.

GSDB: 450 mM NaCl; 17 % Ziegen Serum; 0,3 % Triton X-100; 20 mM Natriumphosphatpuffer, pH 7,4

Waschlösung: 450 mM NaCl; 0,3 % Triton X-100; 20 mM Natriumphosphatpuffer, pH 7,4

Antibleichmittel: 1,5 % N-Propylgallat; 60 % Glycerin; in PBS

3.15.22 Heterologe Expression in 293-Zellen

3.15.22.1 Einfrieren und Auftauen von eukaryontischen Zellen

Zellen einer konfluent bewachsenen 6-Lochplatte wurden in 5 Aliquots eingefroren. Dazu wurden die Zellen mit D-PBS gewaschen und 5 min mit 1x Trypsin-EDTA bedeckt. Nach Zugabe von 2,5 ml Medium wurden die Zellen vereinzelt, mit 2,5 ml 2x Einfriermedium vermischt und in einer Styroporbox bei -80°C eingefroren. Langzeitlagerung erfolgte in flüssigem Stickstoff.

Die Zellen wurden rasch bei 37°C aufgetaut und mit 10 ml Medium verdünnt. Sie wurden anschließend abzentrifugiert (5 min 800x g) und in frischem Medium auf eine Zellkulturschale mit 25 cm² Fläche ausgesät.

Einfriermedium, 2x: 20 % DMSO; 20 % fötales Kälberserum; 60 % Medium

3.15.22.2 Passagierung von eukaryontischen Zellen

Konfluente Zellrasen wurden mit D-PBS gewaschen und 5 min bei 37°C mit 1x Trypsin-EDTA inkubiert. Nach Zugabe von 4- bis 10fachem Volumen Medium wurden die Zellen durch Auf- und Abpipettieren vereinzelt. Die Zellen wurden auf die drei- (E14.1-, Glia- und MEF-Zellen) bis 10fache (293-Zellen) Kulturfläche ausgesät.

3.15.22.3 Kultivierung von 293-Zellen

293-Zellen wurden in 10 cm-Rundschalen mit 10 ml 293-Medium bei 37°C, 5 % CO₂ und Wasserdampf-gesättigter Atmosphäre in Begasungsbrutschränken inkubiert. Sie wurden passagiert, sobald die Schale konfluent bewachsen war.

293-Medium: DMEM-Medium mit 4,5 g/l D-Glucose; 10 % hitzeinaktiviertes fötales Rinderserum; 2 mM L-Glutamin

3.15.22.4 Transfektion über Calciumphosphat-Kopräzipitate

(Chen und Okayama 1987)

Das Medium einer semikonfluenten 10 cm-Rundschale wurde 12 h vor Transfektion gewechselt. Zu 20 µg Plasmid-DNA in 50 µl H₂O wurden 500 µl HBS-Puffer gegeben. Der Ansatz wurde

mit 32 µl 2 M CaCl₂ versetzt, sorgfältig geschüttelt und tropfenweise auf die Zellen pipettiert. Einen halben Tag später wurden die Zellen mit D-PBS gewaschen und in frischem Medium weiter kultiviert.

HBS-Puffer: 10 mM HEPES/NaOH, pH 7,15; 137 mM NaCl; 5 mM KCl; 1 mM MgCl₂; 0,7 mM Na₂HPO₄; durch Filter mit 0,22 µm Porengröße filtriert. Der pH-Wert wurde in engen Grenzen variiert und der Puffer mit der höchsten Transfektionseffizienz verwendet.

3.15.22.5 Gewinnung von Zellhomogenaten

Fünf Tage nach Transfektion wurden die Zellen mit Homogenisationspuffer gewaschen und in 2x 1 ml Homogenisationspuffer von der 10 cm-Rundschale geschabt. Nach Homogenisation (zehn Hübe) wurden der PNS gewonnen.

3.15.23 Erstellung hippokampaler Primärkulturen

3.15.23.1 Vorbereitung der Deckgläschen für die Kultur

Glas-Deckgläschen wurden über Nacht in 1 N Salzsäure gewaschen. Die Salzsäure wurde mit reichlich Wasser ausgewaschen und die Deckgläschen nach mehrmaligem Schwenken in 70 %-igem Ethanol in 95 %-igem Ethanol gelagert. Die feuchten Deckgläschen wurden in die 12-Lochkulturschalen überführt, getrocknet, mit Kollagen/Poly-D-Lysin-Lösung bestrichen und unter einer UV-Lampe sterilisiert.

Kollagen/Poly-D-Lysin-Lösung: 0,1 mg/ml Poly-D-Lysin, 0,2 mg/ml Kollagen, 0,1 mM Essigsäure.

3.15.23.2 Hippokampuspräparation

Am Embryonaltag 19 (E19) wurde die Muttermaus durch Genickbruch getötet und der Uterus mit der Feten entnommen. Die Feten wurden bis zur Präparation in eiskaltem PBS gelagert. Für die Präparation wurde der Fetus aus dem Uterus entnommen und durch Dekapitation getötet. Die Haut wurde mit einer Pinzette abgezogen und der Schädelknorpel nach zwei lateralen Inzisionen am Foramen magnum bei den Augenbulbi beginnend abgezogen. Das Gehirn wurde mit einem Spatel entnommen und in eiskaltem HBSS präpariert. Die Großhirnhemisphären wurden vom Zwischenhirn getrennt. Die Hirnhäute wurden vom Bulbus olfactorius beginnend an einem Stück abgezogen. Der Hippokampus wurde herausgeklappt und zwischen CA1-Region und entorhinalen Cortex abgetrennt. Die Fimbrien wurden entfernt und der Hippokampus in 1 ml Enzymlösung überführt.

Enzymlösung: 0,2 mg/ml Cystein, 1 mM CaCl₂, 0,5 mM EDTA, 25 U/ml Papain in DMEM, 20 min mit Carbogen begast.

3.15.23.3 Neuronenkultur

Der Hippokampus wurde eine Stunde bei 37°C in Enzymlösung inkubiert. Die Lösung wurde abgenommen und durch 1 ml Inhibitionslösung ersetzt. Nach 5-minütiger Inkubation bei 37°C wurde die Lösung abgenommen und der Hippokampus in 200 µl 10 % FBS mit einer gelben Spitze der Pipettierhilfe trituriert. Nach einminütigem Absetzen der Zellen wurde der Überstand in ein neues Gefäß überführt und die sedimentierten Zellen erneut mit 200 µl 10 % FBS mit vier

Hüben trituriert. Der Vorgang wurde noch einmal wiederholt und die gesammelten Zellen in 600 µl der Überstände in der Neubauer-Zählkammer gezählt. 20000 Zellen wurden auf Deckgläschen mit konfluenten Astrozytenrasen in einer 12-Lochschale in 1,5 ml NBA kultiviert.

10 % FBS: 10 % FBS, 1x MITO, 100 U/ml Penicillin, 100 µg/ml Streptomycin in DMEM.

Inhibitionslösung: 2,5 mg/ml Albumin, 2,5 mg/ml Trypsin-Inhibitor in 10 % FBS.

NBA: 1x B27 Supplement, 1x Glutamax-Supplement, 100 U/ml Penicillin, 100 µg/ml Streptomycin in Neurobasal A.

3.15.23.4 Astrozytenkultur

Die nach Hippokampuspräparation übrig gebliebene Großhirnhemisphäre wurde in 1 ml Emzymlösung analog inkubiert, mit Inhibitionslösung versetzt und in insgesamt 1 ml 10 % FBS trituriert. Die Zellen aus dem Überstand wurden in 10 ml 10 % FBS in einer 75 cm² Gewebekulturflasche kultiviert. Nach Erreichen eines konfluenten Zellrasens wurde die Kulturflasche auf einem Laborschüttler über Nacht inkubiert. Nach zweimaligem Waschen mit 10 % FBS und erneutem Schütteln wurden die Astrozyten trypsiniert, trituriert und ausgezählt. 5000 bis 10000 Zellen wurden pro Deckgläschen in einer 12-Lochkulturschale ausgesät und in 1,5 ml 10 % FBS kultiviert. Nach Erreichen eines konfluenten Zellrasens wurde die Zellteilung durch Zugabe von 20 µl FUDR gestoppt.

FUDR: 8,1 mM 5-Fluoro-2'-Deoxyuridin, 20,4 mM Uridin in DMEM.

3.15.24 Herstellung rekombinanter embryonaler Mausstammzellen

(Hooper et al. 1987)

3.15.24.1 Kultivierung von E14.1-Zellen

Die E14.1-Zellen wurden auf Mitose-gehemmten embryonalen Mausfibroblasten (MEF) kultiviert. Das Medium wurde jeweils gewechselt, wenn es sich deutlich gelb färbte. Die übrigen Arbeitsschritte und Kultivierungsbedingungen erfolgten analog der Kultivierung von 293-Zellen.

Medium: DMEM-Pulvermedium und 2,3 g NaHCO₃ in 1 l H₂O gelöst und durch Sterilfiltereinheiten filtriert. Pro 500 ml wurden 6 ml Amino Acids, 6 ml frischer Mercaptoethanol-Lösung, 1,2 ml 500x Penicillin/Streptomycin, 50 ml fötales Rinderserum (HyClone) und 60 µl ESGRO-LIF zugefügt.

Mercaptoethanol-Lösung: 14 µl 2-Mercaptoethanol auf 20 ml D-PBS.

3.15.24.2 Kultivierung von embryonalen Mausfibroblasten

MEF-Zellen wurden in dem selben Medium wie E14.1-Zellen über ca. 10 Passagen kultiviert. Die übrigen Bedingungen waren analog der Kultivierung von 293-Zellen.

Zur Vorbereitung der MEF für die Kokultur mit E14.1-Zellen wurde nach Erreichen einer 70 %-igen Konfluenz die Zellteilung durch Mitomycin gestoppt. Die Zellen wurden dafür auf mit Gelatine beschichteten Kulturschalen kultiviert (Schalen 1 h mit Gelatine-Lösung behandelt). Die MEF wurden 2 h mit 10 mg/ml Mitomycin im Medium kultiviert und anschließend viermal

mit 10 ml D-PBS gewaschen und entweder in der Schale weiterkultiviert oder auf Mehrlochkulturschalen ausgesät.

Gelatine-Lösung: 0,1 % Gelatine in D-PBS.

Mitomycin-Stammlösung, 50 x: 2 g Mitomycin C in 4 ml D-PBS.

3.15.24.3 Transfektion von E14.1-Zellen

Die ES-Zellen wurden in einer 25 cm²-Kulturflasche angezogen, bis eine Konfluenz von 80 % erreicht wurde. Sie wurden vereinzelt, sorgfältig mit D-PBS gewaschen und in 0,8 ml D-PBS resuspendiert. Nach Zugabe des Rekombinationsvektors wurden die Zellen verteilt auf zwei Elektroporationsküvetten (0,4 cm Elektrodenabstand) mit 500 mF und 23 V elektroporiert. Anschließend wurden sie verteilt auf fünf 5 cm-Rundschalen kultiviert.

3.15.24.3.1 Vorbereitung des Rekombinationsvektors

400 µg des Rekombinationsvektors wurden zur Linearisierung mit *NotI* verdaut. Die Proteine wurden zweimal mit Phenol/Chloroform und Chloroform extrahiert. Die gefällte DNA wurde mit eiskaltem 70 % Ethanol gewaschen, unter der Sterilwerkbank getrocknet und in 1 ml D-PBS gelöst.

3.15.24.4 Selektion von homolog rekombinierten E14.1-Zellen

Am Tag 1 nach Transfektion wurde das Medium morgens gewechselt. Am Abend wurde die Selektion mit Medium, dem 190 µg/ml Neomycin zugesetzt wurden, über acht Tage begonnen. Die Selektion mit 2 mM Ganciclovir erfolgte zusätzlich von Tag 3 bis Tag 5. Während der Selektion wurde das Medium zweimal täglich gewechselt. Am Tag 9 und 10 wurden resistente Einzelklone isoliert und in 96-Lochkulturschalen kultiviert. Nach ca. drei Tagen wurden die Stammzellen auf zwei 96-Lochkulturschalen passagiert. Nach Erreichen der Konfluenz wurde eine Platte für die DNA-Analyse verwendet und die zweite eingefroren.

3.15.24.5 Isolierung der resistenten Klone

Am 9. und 10. Tag der Selektion wurden die resistenten Klone isoliert. Die Zellen wurden mit D-PBS gewaschen und mit DMEM/25 mM HEPES bedeckt. Die Klone wurden unter dem Mikroskop mit einer ausgezogenen Pasteurpipette angesaugt und in 50 µl 1x Trypsin-EDTA in einer 96-Lochplatte ("U"-förmige Mulden) überführt. Alternativ konnte auch eine 100 µl-Pipettierhilfe verwendet werden. Nachdem über ca. 20 min Kolonien isoliert wurden, wurden diese 5 min bei 37°C inkubiert und nach Zugabe von 100 µl Medium vereinzelt und auf mit 100 µl Medium bedeckten MEF in 96-Lochplatten ausgesät.

3.15.24.6 Vorbereitung für die Blastozysten-Injektion

Rekombinante Klone wurden über 24-, 12- und 6-Lochplatten expandiert und in fünfmal 1 ml Volumen eingefroren. Für die Blastozysteninjektion wurden sie in 12-Lochplatten kultiviert. Am Tag der Injektion wurden die Zellen vereinzelt und als Suspension dem institutseigenen Mikroinjektionslabor bereitgestellt.

3.15.24.7 DNA-Isolierung aus in 96-Lochplatten kultivierten E14.1-Zellen

Die konfluent gewachsenen Zellklone wurden zweimal mit D-PBS gewaschen und in jeweils 50 µl Lysispuffer über Nacht bei 60°C lysiert. Die DNA wurde durch Zugabe von 100 µl

eiskalter Fällungslösung und Inkubation für 30 min bei Raumtemperatur gefällt. Der Überstand wurde dekantiert und die DNA dreimal mit eiskaltem 70 % Ethanol gewaschen. Nach Trocknen der DNA wurde sie über Nacht in 50 µl H₂O gelöst.

Die Analyse der rekombinanten Klone erfolgte über PCR oder über Restriktionsanalyse und radioaktiver Hybridisierung nach Transfer über *Southernblot*.

3.15.25 Pharmakologische Behandlung von Mäusen

Die verwendeten α -Synuclein-Maus-Nullmutanten und Wildtyp-Kontrolltiere waren Geschwistertiere aus Verpaarungen heterozygoter Elterntiere. Die Toxinbehandlung wurde an männlichen Tieren im Alter von acht bis 15 Wochen durchgeführt. Als Kontrollen dienten die weiblichen Geschwistertiere, denen die gleichen Mengen der Trägersubstanz physiologischer Kochsalzlösung injiziert wurden. Die Tiere wurden einzeln in Käfigen mit freiem Zugang zu Wasser und Futter für die Zeitdauer zwei Tage vor Behandlung und bis zur Analyse gehalten.

Die Injektionen von 200 bis 300 µl Volumen erfolgten mit den in physiologischer Kochsalzlösung gelösten Methamphetaminhydrochlorid oder MPTP-Hydrochlorid intraperitoneal. 20 oder 30 mg/kg Körpergewicht MPTP bzw. 5 mg/kg Körpergewicht Methamphetamin wurden pro Injektion verabreicht. Bei Mehrfach-Injektionen erfolgten diese im Abstand von jeweils zwei Stunden. Für die Analyse wurden die Tiere fünf bzw. zehn Tage nach der letzten Injektion getötet und das Striatum der Mäuse präpariert. Aus je einem Striatum wurde der postnukleäre Überstand für die Proteinquantifizierung isoliert und ein Striatum bzw. ein Stück des Gehirnkortex für die Bestimmung der Neurotransmitter verwendet.

3.15.25.1 Quantifizierung der Neurotransmitter

Die Neurotransmitteranalytik wurde von Dr. Francesco Fornai und Mitarbeitern (Universität Pisa) durchgeführt.

Ein Striatum bzw. ein Stück Cortex wurden in 0,6 ml eiskaltem P-Puffer im Sonicator homogenisiert. 50 µl des Homogenats wurden für die Proteinbestimmung nach Lowry entnommen. Das restliche Homogenat wurde 10 min bei 8000 x g abzentrifugiert und der Überstand abgenommen.

P-Puffer: 0,1 M Perchlorsäure, 10 ng/ml Dihydroxybenzylamin

3.15.25.1.1 Catecholamine

20 µl des klaren Überstandes wurden auf eine HPLC-Säule injiziert. Die Trennung erfolgte bei einer Flußgeschwindigkeit von 1 ml/min auf einer C18-Säule mit einem Citrat-Phosphat-Puffer als mobile Phase. Die Detektion erfolgte mit Hilfe zweier elektrochemischer Detektoren. Die Quantifizierung erfolgte über eine Standardkurve erstellt mit geeichten Komponenten.

Citrat-Phosphat-Puffer: 0,04 M Citronensäure, 0,06 M Na₂HPO₄, 0,1 mM EDTA, 0,6 mM Natriumheptansulfonat, 10 % Methanol.

3.15.25.1.2 Aminosäuren

Der klare Überstand wurde mit gleichem Volumen Li-S-Puffer (Beckman, München) verdünnt und 50 µl in das Analysegerät (Beckman System 6300) injiziert. Die Analyse erfolgt voll

automatisch an einer Lithium-Ionenaustauschersäule. Das Eluat wurde mit Ninhydrin gemischt und die Absorption bei 570 nm bestimmt. Die Quantifizierung erfolgte über die mitgelieferten Standardsubstanzen.

3.15.25.1.3 Proteinbestimmung nach Lowry

(Lowry et al. 1951)

Die Proteinbestimmung wurde mit einer nach dem Protokoll von Lowry et al. (1951) abgewandelten Methode durchgeführt. 50 µl des Homogenates für die Neurotransmitterbestimmung wurden mit 200 µl 1 N NaOH vermischt. 10 µl dieses Gemisches wurden für die Proteinbestimmung in einer Mikrotiterplatte verwendet. Nach Zugabe von 200 µl Lösung A wurde der Ansatz 10 min bei Raumtemperatur inkubiert. Die Farbreaktion entstand dann nach Zugabe von 20 µl Lösung B und wurde in einem Mikrotiterplattenlesegerät vermessen. Die Proteinkonzentration wurde anhand einer Eichgeraden mit Standardproteinkonzentrationen verdünnt in 1 N NaOH bestimmt.

Lösung A: 20 g/l Na_2CO_3 ; 100 mg/l CuSO_4 ; 100 mg/l NaKTartrat; 0,1 N NaOH.

Lösung B: 1x Folin & Ciocalteu's Phenol Reagenz

4 Ergebnisse

Der erste Teil der Ergebnisse beschreibt die Klonierung der verwendeten DNA-Konstrukte und die Generierung und Charakterisierung von Antikörpern gegen die Synuclein-Paraloge. Mit den Antikörpern wurde die Verteilung von α - und β -Synuclein im Gehirn und in subzellulären Kompartimenten untersucht. Diese Ergebnisse bildeten die Grundlage für die Erstellung und Analyse der α -Synuclein-defizienten Mäuse.

In einem weiteren Schritt wurden die Mausnullmutanten in einem pharmakologischen Modell der Parkinson-Syndrome untersucht. Über die Generierung und Analyse transgener Mäuse, die die Mutanten der Parkinson-Syndrome auslösenden Formen des humanen α -Synuclein exprimieren, wurde deren Einfluß auf die Pathogenese charakterisiert.

4.1 Klonierung und Charakterisierung von Synuclein-Isoformen aus Mensch und Ratte

Die für die Klonierung der gewünschten Expressionskonstrukte benötigten cDNA-Sequenzen wurden über PCR gewonnen. Primer wurden anhand der veröffentlichten Sequenzen in GenBank (human α -Synuclein: L36675; Ratte α -Synuclein: AF007758; Ratte β -Synuclein: Q63754; Ratte γ -Synuclein: NM 031688) entworfen.

Abb. 2: Die cDNAs von α -Synuclein aus Ratte (rt) und Mensch (hm) und die Ratten-Paraloge β - und γ -Synuclein wurden über PCR aus cDNA-Bibliotheken amplifiziert und sequenziert. Die daraus übersetzten Aminosäuresequenzen wurden verglichen. Mit der humanen α -Synuclein-Sequenz identische Aminosäuren sind schwarz unterlegt. In hellgrau sind die charakteristischen Wiederholungen von sechs Aminosäuren mit der consensus-Sequenz „KTEGKV“ dargestellt (Maroteaux et al., 1988). Der Bereich der aus Alzheimer-Plaques isolierten Peptide NAC-X und Y ist in dunkel grau eingezeichnet (Ueda et al. 1993). Die Positionen für die Aminosäureaustausche, die zu familiären Parkinson-Syndromen (A30P, A53T) oder zur Imitierung konstitutiv phosphorylierter Serine (S87D, S129D) führen, sind hervorgehoben. pI (hm α -Synuclein) = 4,58; pI (rt α -Synuclein) = 4,66; pI (β -Synuclein) = 4,34; pI (γ -Synuclein) = 4,63.

Die Menschen- und Ratten-cDNA für α -Synuclein wurde mit Hilfe der Primer 786 und 801 bzw. 786 und 787 aus den entsprechenden Gesamthirn-cDNAs amplifiziert und über die Restriktionsschnittstellen *EcoRI* und *HindIII* in den Vektor pGEX-KG kloniert (phSyf.1: OliverS240997-B 05, -B 06; LrSyf.15: OliverS170997-B 25, -B 28). Die β - und γ -Isoformen aus Ratte wurden mit Hilfe der Primer T1818 und T1819 bzw. 946 und 947 aus einer embryonalen cDNA-Bibliothek bzw. der entsprechenden Gesamthirn-cDNA amplifiziert. Die Klonierung des mit *EcoRI* verdauten PCR-Produktes von β -Synuclein erfolgte in den mit *SmaI* und *EcoRI* geschnittenen Vektor pGEX-KG (LbSyn.5: !3403239.SEQ). Das PCR-Produkt von γ -Synuclein wurde in den Vektor pCR-Script II kloniert (g-Synu.22: OliverS011098-B 02).

α -Synuclein war 140 Aminosäuren lang und die Sequenzen aus Ratte und Mensch zu 95% identisch (Abb. 2). Der auffälligste Unterschied in der Rattensequenz war das Threonin an der Position 53, da diese Aminosäure in der humanen Sequenz zu einer familiären Form der Parkinson-Erkrankung führt. Wie der Vergleich mit der genomischen Sequenz der Maus und den Datenbankeinträgen ergab, enthielt die Maussequenz an der Position 53 ebenfalls ein Threonin und unterschied sich von der Rattensequenz durch einen anderen Aminosäureaustausch (D121G; AF044672). Die β - (134 Aminosäuren) und γ -Paralogue (123 Aminosäuren) waren zu 61,2 bzw. 55,3% identisch mit dem Ratten- α -Synuclein. Alle drei Isoformen enthielten, die für Synucleine charakteristische Wiederholung von sechs Aminosäuren mit der Konsensus-Sequenz „KTKEGV“ (Abb. 2; Maroteaux et al. 1988). Die größte Sequenzübereinstimmung war im Bereich der N-terminalen Hexa-Wiederholungs-Regionen, wobei die sechste Wiederholung im β -Synuclein fehlte.

Die Wiederholung dieses Sequenzmotivs ist einmalig, wie ein Vergleich mit den bisher veröffentlichten Proteinsequenzen zeigte. Mit Hilfe der Prosite-Datenbank wurde getestet, welche Proteine ein ähnliches Sequenzmotiv K-T-[KR]-[EQ]-[GQ]-V enthielten. Der Vergleich ergab insgesamt sieben Proteine aus Säugetieren. RhoB und C gehören zur Familie kleiner GTP-bindender Proteine, p21/H-Ras-1, p21B/K-Ras-2b und N-Ras sind an der Signaltransduktion zum Zellzyklus beteiligt, Hsp-27 ist ein Chaperon und IP-3-Kinase ein Inositolphosphat phosphorylierendes Enzym. Eine Röntgenstruktur ist nur von RhoA und p21/H-Ras bekannt (Franken et al. 1993; Wei et al. 1997). In beiden liegt das entsprechende Sequenzmotiv in einer Schleife an der Außenseite des Proteins. Das Valin gehört jeweils zur der dem Loop folgenden α -Helix.

Die C-Termini aller Synucleine enthielten eine Vielzahl negativ geladener Aminosäuren. Das Ratten- α -Synuclein enthielt in diesem Abschnitt insgesamt 14 Aspartat- oder Glutamatreste, denen nur drei positiv geladene Lysine entgegenstanden. Der isoelektrische Punkt des gesamten Proteins lag mit 4,66 relativ niedrig. Das Serin-121 in der α -Synuclein-Sequenz aus Ratte war in der humanen Sequenz noch durch ein zusätzliches Aspartat ersetzt, so daß der isoelektrische Punkt mit 4,58 noch niedriger war. Die negative Ladung des C-Terminus von β -Synuclein war noch ausgeprägter. Insgesamt 19 sauren Aminosäuren standen nur drei Lysine gegenüber. Der isoelektrische Punkt lag dadurch bei 4,34. γ -Synuclein hatte einen isoelektrischen Punkt vergleichbar mit dem vom α -Synuclein.

4.2 Klonierung eukaryontischer Expressionskonstrukte

Eukaryontische Expressionskonstrukte wurden für die Charakterisierung der Synuclein-Antikörper benötigt. Die Klonierung der α -Synuclein-cDNAs aus Mensch und Ratte erfolgte nach Amplifikation mit den Primerpaaren 817/818 und 817/832 über die Restriktionsschnittstellen *XhoI* und *HinDIII* in den Vektor pcDNA3 (Lhsyfpc3.1: OliverS061197-A 01; LrSyfpc3.2: OliverS211197-A 05).

Zur Charakterisierung der Isoformenspezifität der Antikörper wurde N-terminal die Markersequenz „MRGSHHHHHH“ angefügt, die durch einen spezifischen Antikörper (α His) detektiert werden konnte und zur Kalibrierung diente. Die Amplifikation der α -Synuclein-Konstrukte aus Ratte erfolgte mit dem Primerpaar 1241/787, die von β -Synuclein mit dem Primerpaar 1242/1243 und die von γ -Synuclein mit dem Primerpaar 1244/947. Die PCR-Produkte für α - und β -Synuclein wurden mit *BamHI* und die für γ -Synuclein mit *BglIII* verdaut und in den mit *BamHI/EcoRV* geschnittenen Vektor NHispBSK.1, der die erwähnte Markersequenz enthielt, kloniert (Schlüter 2000). Die vollständigen Konstrukte wurden über die Restriktionsschnittstelle *HinDIII* in den entsprechend vorbereiteten eukaryontischen Expressionsvektor pcDNA3 subkloniert (pcDNA3His α Syf.6: OliverS171198-B 09; pcDNA3His β Syf.2: OliverS271098-B 05; pcDNA3His γ Syf.8: OliverS051198-B 16).

4.3 Einfügung der Missense-Mutationen der familiären Parkinson-Syndrome

Über die Primerpaare 1123/1122 und 1121/1120 wurden zwei überlappende PCR-Produkte aus dem Plasmid LhSyfpc3.1 amplifiziert, die für den Aminosäurenaustausch A30P kodierten. Zur Markierung wurde zusätzlich die Restriktionsschnittstelle *SmaI* eingefügt. Die Amplifikation der hybridisierten überlappenden PCR-Produkte über das Primerpaar 1123/1120 und Klonierung in den Vektor pCR-Script II ergab die gewünschte mutierte humane α -Synuclein cDNA (L1123.21: OliverS090698-A 33).

Die Sequenz für den Aminosäurenaustausch A53T und die zusätzlichen Restriktionsschnittstelle für *NcoI* wurde analog über die Primerpaare 817/949 und 948/818 eingefügt. Die mit den Primern 817/818 amplifizierte mutierte humane cDNA wurde ebenfalls in den Vektor pCR-Script II kloniert (LA53T.13: OliverS030398-A 13).

4.4 Erstellung bakterieller Expressionsvektoren

Über Bakterien erfolgte die Überexpression von Synuclein-Konstrukten, die gereinigt für die Immunisierung von Kaninchen und Studien der vesikulären Neurotransmitteraufnahme benötigt wurden. Zusätzlich zu den oben beschriebenen Konstrukten im bakteriellen Expressionsvektor pGEX-KG wurden Konstrukte erstellt, die die humane Sequenz mit dem Aminosäurenaustausch A53T bzw. N-Terminal die Erkennungssequenz für die TEV-Protease enthielten (Dougherty et al. 1988). Alle bakteriellen Expressionskonstrukte waren N-terminal an GST fusioniert.

Durch die Amplifikation des humanen α -Synuclein A53T mit dem Primerpaar 786/801 und Subklonierung über die Restriktionsschnittstellen *EcoRI* und *HinDIII* in den Vektor pGEX-KG

entstand das entsprechende bakterielle Expressionskonstrukt (L786.19: OliverS030398-A 25, !0202259.SEQ).

Wie unten gezeigt, enthielt α -Synuclein eine interne Thrombin-Erkennungssequenz. Um nach Abspaltung des GST α -Synuclein in voller Länge zu erhalten, wurde vor die kodierende Sequenz eine TEV-Protease-Erkennungssequenz eingefügt. Nach Abspaltung des GST verblieb somit nur ein zusätzliches Glycin N-terminal. Die Einfügung der Erkennungsstelle in das humane α -Synuclein erfolgte über den Primer 1646. Die Amplifikation zusammen mit dem Primer 1643 und Subklonierung über die Restriktionsschnittstellen *XbaI* und *HinDIII* in pGEX-KG ergab die TEV-Expressionskonstrukte für α -Synuclein, α -Synuclein A30P und α -Synuclein A53T (TEV haSyf.1: OliverS221299-B 08, -01; TEV Syf A30P.2: OliverS221299-B 09; TEV Syf A53T.1: OliverS221299-B 10).

Mehrere Studien haben eine Phosphorylierung von α -Synuclein an zwei Serinen und Tyrosin-125 gezeigt (Ellis et al. 2001; Okochi et al. 2000; Pronin et al. 2000). Über eine physiologische Bedeutung dieser Phosphorylierung ist bisher nichts bekannt. Durch den Austausch von Serin gegen Aspartat kann eine konstitutiv aktive Phosphorylierung imitiert werden. Um die Funktion des phosphorylierten α -Synuclein zu untersuchen, wurden Konstrukte erstellt, deren Serin an der dominanten Phosphorylierungsstelle durch Aspartat ersetzt wurde (Okochi et al. 2000).

Das hybridisierte Primerpaar 2033/2034 kodierte für den C-Terminus von α -Synuclein mit dem Aminosäurenaustausch S129D und wurde über die Restriktionsschnittstellen *XbaI* und *HinDIII* in die entsprechenden bakteriellen Expressionskonstrukte TEV haSyf.1, TEV Syf A30P.2 und TEV Syf A53T.1 eingefügt (TEV hSyf S129D.1: OliverS14062000-B 02; TEV A30P S129D.1: OliverS14062000-B 03; TEV A53T S129D.1: OliverS14062000-B 04).

4.5 Klonierung von Vektoren zur Herstellung transgener Mäuse

Mit Hilfe der transgenen Technologie können Proteine heterolog exprimiert werden und so deren Einfluß auf den Organismus in Abhängigkeit von eingefügten Mutationen, vom Expressionsmuster und der Expressionsstärke untersucht werden. Das Thy1-Gen steuert eine breite neuronale Expression und je nach Kopienzahl des transgenen Konstruktes ist eine Überexpression möglich.

Es wurden Mäuse generiert, die entweder das humane α -Synuclein, die Mutante α -Synuclein A30P oder die Mutante α -Synuclein A53T transgen exprimierten (Abb. 16). Um zusätzlich den Einfluß eines konstitutiv phosphorylierten Serin-87 zu untersuchen, wurde die Mutante α -Synuclein A30P S87D transgen exprimiert.

Die Klonierung des aus dem Plasmid LhSyfpc3.1 über *XbaI* und *HinDIII* ausgeschnittenen humanen α -Synuclein-Konstruktes erfolgte nach Auffüllung der überstehenden Enden in die *XhoI*-Restriktionsschnittstelle des transgenen Vektors (pTSC21-hSyf.1: OliverS1311000-B07, OliverS31052001-A 01).

Die cDNA für α -Synuclein A30P wurde über die Restriktionsschnittstellen *SpeI* und *PvuI* aus dem Plasmid L1123.21 ausgeschnitten und analog in den transgenen Vektor kloniert (LpTA30P2.2: OliverS121198-B 29, OliverS171198-B 10).

Um mögliche Einflüsse von nicht kodierenden Bereichen der cDNA-Konstrukte zu minimieren, wurden die flankierenden Bereiche des Plasmids LA53T.13 entsprechend verändert. Hierzu wurde das die A53T kodierende *BspHI/BamHI*-Fragment zusammen mit dem die N-terminalen

Aminosäuren kodierenden *XhoI/BspHI*-Fragment aus dem Plasmid L1123.21 in das mit *XhoI* und *BamHI* geschnittene Vektorrückgrat des Plasmids L1123.21 kloniert. Die Klonierung in den transgenen Vektor erfolgte wie oben beschrieben (L533.7: OliverS041298-B 01, -03).

Die Erstellung der Mutation S87D erfolgte über PCR mit den Primerpaaren 1123/2036 und 2035/1120 aus dem Plasmid L1123.21. Die Amplifikation der hybridisierten Fragmente ergab die cDNA für α -Synuclein A30P S87D, die in den Vektor pCR-Script II kloniert wurde. Die Klonierung des Klon mit der analogen Orientierung wie L1123.21 erfolgte wie beschrieben in den transgenen Vektor (hSyf A30P S87D.32: OliverS110700-B 24, -29).

4.6 Klonierung und Charakterisierung des Maus- α -Synuclein-Gens

Über homologe Rekombination lassen sich zielgerichtet Mutationen ins Maus-Genom einfügen. Genetisch veränderte omnipotente Stammzellen überführen diese Mutationen in Mäuse (Capecchi 1989). Um eine Deletion ins Maus-Synuclein-Gen einzufügen, wurden genomische Sequenzabschnitte des Maus- α -Synuclein-Gens benötigt. Mit Hilfe einer das 5'-Ende der Ratten- α -Synuclein-cDNA repräsentierenden Sonde (amplifiziert über die Primer 439 und 440) wurden genomische Klone aus einer genomischen Bank isoliert, die das 5'-Ende des Maus- α -Synuclein-Gens enthielten. Die Charakterisierung der Klone erfolgte über Restriktionskartierung und Sequenzierung. Die etwa 21 kb großen genomischen Inserts enthielten die ersten beiden kodierenden Exone (Aminosäuren 1-40 und 41-54) und 5'-nicht-kodierende Exone (Abb.2; GenBank acc.#AF277451).

Der Sequenzvergleich mit der EST-Datenbank ergab zwei Gruppen von EST-Klonen, die über den 5'-Bereich des ersten kodierenden Exons hinausreichten aber die gleichen kodierenden Abschnitte enthielten. Die beiden Gruppen von EST-Klonen ergaben sich somit aus zwei mRNA-Transkripten mit alternativem ersten Exon (im folgenden Exon 1a und 1b bezeichnet). Drei EST-Klone stammten von Exon 1a ab (AI893265, W39982, W75614), wohingegen die anderen neun EST-Klone dem Exon 1b entstammten (W41663, W98185, AI322484, AI304140, AA238977, AA014832, AA013645, AA013580, AA003289). Die Exone lagen ca. 900 bp auseinander, wobei Exon 1b vom Exon 2 1100 bp entfernt lag. Der Abstand von 900 Basenpaaren ließ vermuten, daß in der Maus zwei alternative Transkriptionsstarts enthalten waren, oder noch ein weiteres nicht-kodierendes Exon weiter 5' liegen könnte. Die alternativen Transkripte deuten auf Regulationsmechanismen der α -Synucleinexpression auf Ebene der mRNA-Stabilität, -Lokalisation oder -Translation hin.

4.7 Klonierung eines Rekombinationsvektors für das α -Synuclein-Gen

Unter Verwendung der genomischen Klone wurde ein homologer Rekombinationsvektor konstruiert, in dem das Exon 2 (Aminosäuren 1-40) durch einen Selektionsmarker (Neomycin-Resistenz-Expressionskassette) ersetzt war (Abb. 3). Hierzu wurde das 8 kb-Fragment des genomischen Klones #2 über die Restriktionsschnittstellen *PstI* und *NotI* in den mit *SpeI* und *NotI* vorbereiteten Vektor pTKNeo3A (Rosahl et al. 1995) kloniert. Über die Primer 670 und 672 wurde der 1,5 kb große zweite Rekombinationsarm aus dem genomischen Klon #2 amplifiziert

und über die Restriktionsschnittstelle *ClaI* in den Vektor eingefügt. Für die Analyse rekombinanter Klone wurde über den Primer 670 eine *BglII*-Restriktionsschnittstelle eingefügt.

Abb. 3: Darstellung der Struktur eines Anteils des murinen α -Synuclein-Gens, die sich aus der Analyse der genomischen Klone ergab, und der Rekombinationsstrategie für die Erzeugung von α -Synuclein-Mausnullmutanten. Es sind die Erkennungsstellen für die Restriktionsenzyme *BglII* (B), *ClaI* (C), *EcoRI* (I), *EcoRV* (V), *SpeI* (S), *PstI* (P) und *XhoI* (X), die Position der nichtkodierenden (gestreifter Kasten) und kodierenden (gefüllter Kasten) Exone und die Genotypisierungsprimer eingezeichnet. Im Rekombinationsvektor sind die eingefügten genomischen Sequenzen als gestreifte Kästchen (LA und SA) und die Selektionsmarker (neo: Neomycinresistenz-Expressions-kassette, TK: Thymidin-Kinase) als offene Kästchen dargestellt. Durch die homologe Rekombination wurde das Exon 2, das für die Aminosäuren 1-40 kodiert, und flankierende Bereiche durch ein Neomycinresistenzgen ersetzt.

4.8 Antikörperherstellung und -charakterisierung

Für die Herstellung von Antikörpern gegen α -Synuclein wurden die bakteriellen Expressionskonstrukte phSyf.1 (humanes α -Synuclein) und L786.19 (humanes α -Synuclein A53T) und gegen β -Synuclein das Expressionskonstrukt LbSyn.5 verwendet. Die Proteine wurden im Bakterienstamm BL21DE3 überexprimiert und aus dem Überstand der aufgeschlossenen Zellen über Glutathion-Agarose-Säulenchromatographie gereinigt. Die Abspaltung des Synucleins von der Säule erfolgte über Thrombin-Verdau. Nach Ultrafiltration des Eluats wurde das Thrombin über Gelfiltration abgetrennt und die beiden erhaltenen Proteine der Größe 18 und 19 kDa nach SDS-PAGE und Westernblot mikrosequenziert. Die N-terminale Mikrosequenzierung ergab für die 19 kDa-Bande die Sequenz „GSPGISGGGGGGILM...“, die der Brückensequenz des Vektors pGEX-KG nach Thrombinverdau entsprach und für die 18 kDa-Bande die Sequenz „GLSKAKEGVVAAA....“, die nach dem ersten Lysin in der α -Synuclein-Sequenz folgte. Der N-Terminus des 18 kDa-Proteins war durch Thrombin-Spaltung innerhalb der Synuclein-Sequenz entstanden. Die Effizienz der internen Spaltung war geringer als die in der Brückensequenz. Es entstand jedoch immer ein signifikanter Anteil des verkürzten α -Synuclein, der bei der Immunisierung nicht störte. Die Proteine wurden mit Freund'schem Adjuvans gemischt Hasen subkutan injiziert. Für α -Synuclein wurden das Serum U1126, für β -Synuclein die Seren U1127 und U1128 und für α -Synuclein A53T das Serum S053 erhalten.

Für die Charakterisierung der Antikörper wurden die cDNA-Sequenzen der drei klonierten Rattenisoformen in 293-Zellen exprimiert. Durch die enthaltenen N-terminalen Markersequenzen konnten die Konzentrationen der heterolog exprimierten Proteine in den Zelllysaten so eingestellt werden, daß jeweils die gleiche Menge der drei Isoformen auf einer Gelspur aufgetragen wurden. Die Quantifizierung erfolgte über Immunoblotanalyse mit α His6 Antikörpern und iodinierten sekundären Antikörpern. Um gleiche Gesamtproteinmengen pro Spur zu erhalten, wurden die

Lysate mit den höchsten Expressionsraten entsprechend mit Lysaten untransfizierter Zellen verdünnt.

Abb. 4: Die drei Ratten-Synuclein-Paraloge wurden mit N-terminalem Polyhistidin-Tag in 293-Zellen transient exprimiert. Fünf Tage nach Transfektion wurden postnukleäre Überstände gewonnen und mit untransfizierten Zellen auf gleiche Synuclein-Konzentration verdünnt. 20 µg Gesamtprotein wurden gelelektrophoretisch (12 % SDS-PAGE) aufgetrennt und über Immunoblotanalyse und ECL-Detektion mit monoklonalen (αSyf) und polyklonalen Antikörpern (S053, U1126, Q698, U1127 und U1128) gerichtet gegen die Synuclein-Paraloge analysiert.

Der kommerzielle monoklonale Antikörper αSyf wie auch das Antiserum S053 waren spezifisch für α-Synuclein (Abb. 4). Insbesondere S053 detektierte auch höhermolekulare Banden, die von Proteinen der 293-Zellen stammten. Die relativen Affinitäten der Antikörper wurden über Quantifizierung der Signalstärken mit iodinierten Sekundärantikörpern bestimmt. Hierbei zeigten

die Antikörper α Syf und S053 eine 20- bis 40fach höhere Affinität zu α -Synuclein im Vergleich zu β -Synuclein. Die Affinität des Antiserums U1126 war 5- bis 10fach geringer und auch die Spezifität der Detektion von α -Synuclein gegenüber β -Synuclein war nur 15fach höher. Eine vergleichbare Affinität gegenüber α -Synuclein hatte das Serum Q698, das α - und β -Synuclein nahezu gleich gut detektierte. γ -Synuclein wurde von keinem der verwendeten Antikörper detektiert. Die beiden Antiseren U1127 und U1128 detektierten β -Synuclein mit einer vergleichbaren Affinität wie S053 α -Synuclein. Die Spezifität war jedoch geringer, da beide β -Synuclein nur 10- bis 15fach stärker banden als α -Synuclein. Da sich die Migrationsstrecken in der SDS-PAGE von α - und β -Synuclein unterschieden, war in der Immunoblotanalyse eine eindeutige Unterscheidung dieser beiden Isoformen möglich.

Die Antikörper wurden zur Charakterisierung von Maus-Modellen der Parkinson-Syndrome verwendet. Zunächst wurde getestet, ob sie die charakteristischen Einschlusskörperchen, die Lewy-Körper, detektieren würden. Der Antikörper Q698 markiert pathomorphologische Veränderungen, die α -Synuclein enthalten (Abb. 6). Lewy-Körper und Lewy-Neuriten konnten mit diesem Antikörper in Paraffinschnitten aus dem Gehirn von Patienten mit einer Lewy-Körper-Variante des Morbus Alzheimer angefärbt werden. Im Gegensatz zu Färbungen mit Antikörpern gegen Ubiquitin, waren die gefärbten Einschlusskörperchen schon bei geringer Vergrößerung deutlich sichtbar.

Abb. 5: Immunoblotanalyse mit ECL-Detektion der Verteilung der angegebenen Proteine in verschiedenen Hirnregionen. 30 μ g Gesamtprotein von postnukleären Überständen pro Gelspur (12 % SDS-PAGE) wurden aufgetrennt und auf Nitrocellulosemembranen transferiert. Verwendete Antikörper: Q698 (α - und β -Synuclein), Cl7.2 (Synaptophysin I), α p37 (Synaptophysin II).

4.9 Verteilung von α - und β -Synuclein im Mausgehirn

α - und β -Synuclein werden hauptsächlich im ZNS exprimiert, wohingegen γ -Synuclein im peripheren Nervensystem überwiegt. Um die Verteilung von α - und β -Synuclein im Mausgehirn zu untersuchen und die relativen Mengen zu bestimmen, wurden verschiedene Hirnregionen präpariert und die postnukleären Überstände gewonnen. Die Proben wurden durch SDS-PAGE aufgetrennt und die Verteilung durch Immunoblotanalyse untersucht (Abb. 5). Die Detektion erfolgte durch das Antiserum Q698, welches beide Isoformen in vergleichbarer Affinität band. Zum Vergleich wurden die beiden Synaptophysin-Isoformen I und II untersucht, von denen die erste in ungefähr gleichen Konzentrationen im gesamten Gehirn vorkam und die zweite insbesondere im Hippokampus, der Retina und dem Bulbus olfactorius angereichert war (Fykse et al. 1993). Die Gesamtmengen im Gehirn von α - und β -Synuclein waren ähnlich hoch. β -Synuclein war homogener als α -Synuclein verteilt und geringfügig im Hirnkortex und im Bulbus olfactorius angereichert. α -Synuclein zeigte eine heterogene Verteilung, wobei die rostralen Hirnabschnitte höhere Mengen aufwiesen, während etwa im Cerebellum und Hirnstamm nur geringe Mengen nachweisbar waren. Im Cortex und Striatum waren die Mengen von

α - und β -Synuclein ähnlich hoch. Auffällig war, daß die α -Synuclein-Mengen im Striatum deutlich geringer waren als z.B. im Hippokampus. Die höchsten Konzentrationen von α -Synuclein waren in der CA3-Region des Hippokampus nachweisbar. Dies zeigte sich auch in der Immunfluoreszenzanalyse, in der die Moosfaserterminalen dieser Region besonders stark angefärbt waren (Abb. 10). In der Retina war α -Synuclein nicht nachweisbar.

Abb. 6: A: Immunfluoreszenzanalyse aus dem Mittelhirn der Maus. 20 μ m dicke Gefrierschnitte wurden mit den Antikörpern gegen α -Synuclein (α Syf), β -Synuclein (U1128) und DAT (M369) inkubiert. Fluoreszenzsignale der sekundären Antikörper GaM-Cy3, GaR-Cy2 und GaRt-Cy2 wurden im Fluoreszenzmikroskop mit einer 100-fachen Vergrößerung detektiert. B: Immunhistochemische Färbung von Paraffin-Schnitten aus dem Mittelhirn von Patienten mit einer Lewy-Körper-Variante des Morbus-Alzheimer. Anfärbung von Lewy-Körpern und Lewy-Neuriten in rot über den Synuclein-Antikörper Q698 (Färbungen freundlicherweise von Dr. M. Neumann (Göttingen) zur Verfügung gestellt).

Die homogenere Verteilung von β -Synuclein bestätigte sich auch in der Immunfluoreszenzanalyse, die eine viel höhere räumliche Auflösung erreicht als sie mit der quantitativen Bestimmung der Proteine in Westernblots möglich ist (Abb. 6, 10). α - und β -Synuclein schienen

in den meisten Synapsen koexprimiert zu werden, wobei sich jedoch die relativen Mengen drastisch unterschieden. β -Synuclein war im Hippokampus in den synaptischen Strata moleculare, lacunosum moleculare und lucidum angereichert. Im Cortex und Mittelhirn war seine Verteilung homogen. Die Mengen von α -Synuclein waren in den Strata moleculare und lacunosum moleculare am geringsten. Hier waren nur die Synapsen des Tractus perforans angefärbt. Im Cortex war die IV. Schicht prominent gefärbt und hob sich von den anderen Schichten ab. Im Mittelhirn war nur die Region der Substantia nigra reticulata angefärbt. Die Verteilung von α - und β -Synuclein im Striatum war homogen.

Abb. 7: Immunfluoreszenzanalyse hippocampaler Primärkulturen aus Mäusen. Neuronen wurden nach 12 Tagen in Kultur fixiert und mit Antikörpern gegen α -Synuclein (α Syf), β -Synuclein (U1128) und Rab3A (583) markiert. Fluoreszenzsignale der sekundären Antikörper GaM-Cy3 und GaR-Cy2 wurden im konfokalen Mikroskop mit 400facher Vergrößerung detektiert. Kolokalisationen sind in der Überlagerung der Einzelsignale in der mittleren Spalte in gelb dargestellt. 800fach vergrößerte Detailaufnahmen sind jeweils in der rechten oberen Ecke lokalisiert.

In neuronalen Primärkulturen aus dem Maus-Hippokampus zeigten die Antiseren gegen α - und β -Synuclein eine typische punktförmige synaptische Färbung (Abb. 7). α - und β -Synuclein waren in den meisten Synapsen kolokalisiert. Eine signifikante Anzahl von Synapsen enthielt nur β -Synuclein. Bei dem Vergleich der α -Synuclein-Verteilung mit Rab3A, einem ubiquitär im Gehirn exprimierten synaptischen Protein, waren in den meisten Synapsen beide Proteine vorhanden. Die α -Synuclein-Antiseren färbten in den meisten Neuronen zusätzlich Zellkerne an. Lediglich einige große Neurone enthielten kein nukleäres α -Synuclein. Die auffällige nukleäre Färbung war in den gefärbten Hirnpräparaten nicht vorhanden.

4.10 Subzelluläre Verteilung von α - und β -Synuclein

Mit Hilfe der subzellulären Fraktionierung wurde die Verteilung von Proteinen innerhalb von Zellkompartimenten untersucht. Hierzu wurden Mäusegehirne homogenisiert (Fraktion H) und durch differentielle Zentrifugationsschritte die Zellkerne und -trümmer (Fraktion P1) abgetrennt und eine relativ unreine Synaptosomenfraktion (P2) gewonnen. Der Überstand wurde durch Ultrazentrifugation in die zytosolische Fraktion (S3) und die Mikrosomenfraktion (P3) aufgetrennt. Die synaptischen Vesikel wurden aus den Synaptosomen durch hypotonen Schock entlassen. Die leeren Synaptosomen wurden abzentrifugiert (Fraktion LP1) und aus ihnen die synaptischen Plasmamembranen durch Dichtegradientenzentrifugation angereichert (SPM). Im Pellet nach Ultrazentrifugation des Überstandes der leeren Synaptosomen reichern sich die synaptischen Vesikel an (Fraktion LP2). Der letzte Überstand enthielt das stark verdünnte synaptische Zytosol, das durch Ultrafiltration oder Fällung konzentriert wurde (LS2).

Abb. 7: Immunoblotanalyse mit ECL-Detektion von subzellulären Fraktionierungen aus Mausgehirngewebe. Gehirnkortices wurden homogenisiert (H) und in Zellkernsediment (P1), rohe Synaptosomenfraktion (P2), Mikrosomenfraktion (P3) und Zytosol (S3) fraktioniert. Aus den Synaptosomen wurden eine rohe synaptische Plasmamembranfraktion (LP1), eine rohe synaptische Vesikelfraktion (LP2), synaptische Zytosolfraktion (LS2) und eine synaptische Plasmamembranfraktion mit angereicherten aktiven Zonen und postsynaptischen Verdichtungen (SPM) erhalten. Die Fraktionen wurden über SDS-PAGE und Transfer auf Nitrocellulosemembranen aufgetrennt und mit den folgenden Antikörpern analysiert: C154.1 (NR1), α p37 (Synaptophysin II), C142.1 (Rab3A und C), C181.1 (GDI) und Q698 (α - und β -Synuclein).

Die Anreicherung der einzelnen Kompartimente in den Fraktionen wurde durch Markerproteine analysiert. Das synaptische Vesikelprotein Synaptophysin II war in der Fraktion LP2 angereichert (Abb. 8). Die NMDA-Rezeptor-Untereinheit 1 (NR1) ist sowohl in synaptischen Plasmamembranen als auch intrazellulären postsynaptischen Vesikeln vorhanden. Dies spiegelte sich in der Anreicherung in den Fraktionen SPM und P3 wider. GDI ist ein zytosolisches Protein, welches in den löslichen Fraktionen S3 und LS2 vorkam. Die Abwesenheit in den Membranfraktionen P3 und LP2 zeigte eine quantitative Abtrennung an. Ebenfalls waren die Transmembranproteine Synaptophysin II und NR1 nicht in den löslichen Fraktionen nachweisbar. Rab3A und C sind synaptische Proteine, die sowohl an synaptische Vesikel binden als auch gelöst im synaptischen Zytosol vorkommen.

α - und β -Synuclein waren stark in der synaptischen Zytosolfraktion LS2 angereichert. Durch die starke Anreicherung konnten sie als Markerproteine dieser Fraktion verwendet werden. Die synaptischen Membranfraktionen enthielten kein Synuclein. *In vitro* wurde eine Bindung von α -Synuclein an Membranen mit sauren Phospholipiden gezeigt (Davidson et al. 1998). Es ist

somit möglich, daß unter bestimmten physiologischen Bedingungen dieses Protein vom zytosolischen Kompartiment an Membranen wechselt, der Großteil liegt jedoch gelöst vor.

Abb. 9: Southern- und Immunoblotanalyse der α -Synuclein-Mausnullmutanten und der Mauslinie C57Bl6/J/ola/hsd. A: Southernblot-Analyse heterozygot mutierter (+/-), Wildtyp-Mäuse (+/+), der C57Bl6/J/ola/hsd-Linie (HW) und homozygoter Nullmutanten (-/-). Genomische DNA wurde mit *BglIII* verdaut und auf Nylonmembranen transferiert. Diese wurden mit einer Sonde für den Neomycinselektionsmarker (Neo) hybridisiert, die die spezifische Bande bei ~5 kb und eine kreuzhybridisierende Bande bei ~10 kb detektiert. Die Signalstärken der kreuzhybridisierenden Banden zeigen gleiche DNA-Mengen pro Spur an. Die Hybridisierung mit einer Sonde, die aus einem genomischen Abschnitt benachbart aber außerhalb des rekombinierten Bereichs erstellt wurde, markierte das Wildtyp-Allel bei ~10 und das rekombinierte Allel bei ~5 kb. Das Fehlen eines Signals in der C57Bl6/J/ola/hsd-Linie deutete auf eine Deletion des α -Synuclein-Gens hin. B, C: Repräsentative Immunoblotanalyse mit ECL-Detektion von heterozygoten und homozygoten α -Synuclein-Nullmutanten, Wildtyp-Geschwisterlinien und der C57Bl6/J/ola/hsd-Linie. 30 μ g Gesamthirnhomogenate wurden über SDS-PAGE (12 %) aufgetrennt und nach Transfer auf Nitrocellulosemembranen mit zwei α -Synuclein-spezifischen Antisera (S053 in Abschnitt B und α Syf in Abschnitt C oben), einem Antikörper, der beide Paraloge detektiert (U1126 Abschnitt C Mitte) und einem β -Synuclein-spezifischen Antiserum (U1128 Abschnitt C unten) analysiert. Die höhermolekularen Banden in Abschnitt B waren in allen Spuren gleich stark.

4.11 Erzeugung von Maus- α -Synuclein-Nullmutanten

Der Rekombinationsvektor wurde in omnipotente Mausstammzellen transfiziert, welche dann auf homolog rekombinierte Klone selektioniert wurden (Abb. 3). Die PCR-Analyse mit dem Primerpaar 739/428 der doppelt resistenten Klone ergab in 15,6 % von insgesamt 384 analysierten Klonen ein PCR-Produkt der erwarteten Größe von 1,5 kb. Die Restriktionsanalyse des PCR-Produktes zeigte, daß die Rekombination an der richtigen Stelle stattgefunden hatte. Zwei der Klone (#42 und #116) wurden expandiert, und in C57Bl6/J-Blastozysten injiziert. Chimäre Männchen wurden mit C57Bl6/J-Weibchen verpaart. Die Verpaarung der heterozygoten agoutifarbenen Nachkommen ergab homozygote und heterozygote Nullmutanten sowie Wildtyp-Mäuse, deren Anzahl nach der Mendel'schen Regel verteilt war. Die Genotypisierung erfolgte über Southernblot- und PCR-Analyse (Abb. 9). Mit den Primerpaaren 739 und 741 wurde ein 1,5 kb großes und mit den Primerpaaren 1103 und 1106 ein 0,2 kb großes Fragment aus dem wt-Allel amplifiziert. Das über das Primerpaar 739 und 428 amplifizierte 1,5 kb große Fragment war spezifisch für das homolog rekombinierte Allel, da der Primer 739 außerhalb des rekombinierten Bereichs band. Im weiteren erfolgte die Genotypisierung jedoch mit dem Primerpaar 288/887, mit dem ein 0,7 kb großes Fragment aus dem Selektionsmarkerbereich amplifiziert wurde.

Die erfolgreiche Deletion des Synuclein-Gens wurde über Immunoblot-Analyse mit verschiedenen Antikörper gegen α -Synuclein bestätigt (Abb. 9). Die homozygoten α -Synuclein-Nullmutanten waren überlebensfähig und ohne offensichtliche Verhaltensveränderungen. Sie konnten als homozygote Linie gehalten werden.

Um den genetischen Hintergrund so einheitlich wie möglich zu halten, wurde die F1-Generation sechsmal in die C57Bl6/J-Mauslinie zurückgekreuzt. Während dieser Prozedur fiel auf, das in Mäusen vom Lieferanten Harlan-Winkelmann (Mauslinie C57Bl6/J/ola/hsd) α -Synuclein fehlte (Abb. 9). Das Fehlen eines Hybridisierungssignals bei der Southernblot-Analyse mit einer α -Synuclein-spezifischen Sonde deutete auf eine Deletion im α -Synuclein-Gen hin. Die Größe der Deletion blieb unbekannt. Durch die Deletion waren die β -Synuclein-Mengen nicht beeinflusst.

4.12 Charakterisierung der Maus- α -Synuclein-Nullmutanten

Die Maus- α -Synuclein-Nullmutanten wurden detailliert morphologisch und biochemisch untersucht. In diesen Experimenten wurden die Nullmutanten im Vergleich zu Geschwistertierkontrollen analysiert, um mögliche genetische Hintergrundeffekte weitestgehend auszuschließen. Die Charakterisierung der Gehirnarchitektur erfolgte anhand von Gefrierschnitten, die mit Antikörpern gegen verschiedene synaptische und Struktur-Proteine gefärbt wurden. Es ergaben sich dabei keine Unterschiede zu den wt-Kontrolltieren. Insbesondere die Verteilung von β -Synuclein, Tyrosinhydroxylase (TH) und Dopamintransporter (DAT) waren im Hippokampus, der Region höchster α -Synuclein-Mengen, und dem Striatum unverändert (Abb. 10, 12).

Abb. 10: Vergleichende Immunfluoreszenzanalyse des Hippokampus und Striatum von α -Synuclein-Nullmutanten und Wildtyp-Mäusen. A: 20 μ m dicke Gefrierschnitte des Hippokampus wurden mit Antikörpern gegen α - (α Syf) und β -Synuclein (U1128) doppelt gefärbt. Die Sekundärantikörper wurden im Fluoreszenzmikroskop mit einer 50fachen Vergrößerung detektiert. Die Hippokampusregionen CA1 bis -3 und die Schichten Stratum oriens (Or), Stratum pyramidale (Py), Stratum radiatum (Ra), Stratum lacunosum moleculare (LM), Stratum moleculare (Mo), Stratum granulosum (Gr), Stratum lucidum (Lu) und die polymorphe Synapsenschicht (Po) sind markiert. B: Analoge Proben aus dem Striatum wurden zusätzlich mit einem Antikörper gegen DAT (M369) markiert.

Abb. 11: Vergleichende konfokale Fluoreszenzanalyse von α -Synuclein-Nullmutanten und von Wildtyp-Mäusen mit und ohne MPTP-Behandlung. 10 μ m dicke Gefrierschnitte wurden mit den bezeichneten Antikörpern doppelt gefärbt (α -Synuclein: U1126; β -Synuclein: U1128; TH: α TH). Fluoreszenzsignale der sekundären Antikörpern wurden mit 400facher Vergrößerung detektiert. Kolokalisation ist in gelb gefärbt. Die mit 30 mg/kg MPTP behandelte Maus wurde fünf Tage nach i.p.-Injektion analysiert und zeigte eine Reduktion der TH-Immunofärbung.

α -Synuclein war im präsynaptischen Zytosol angereichert. Insofern stellte sich die Frage, ob die Deletion von α -Synuclein einen Einfluß auf die Verteilung anderer synaptischer Proteine hatte. Hierfür wurden die Mengen von mehr als 40 neuronalen Proteinen über Immunoblot-Analyse quantifiziert. Wenn möglich wurden die Mengen eines Proteins mit verschiedenen Antikörpern bestimmt. Die Mengen aller getesteten Proteine, einschließlich der getesteten 15 synaptischen Vesikelproteine, waren unverändert (Tab. 1; Abb. 13). Insbesondere waren die Mengen von Markern dopaminergener Neuronen (Tyrosinhydroxylase, vesikulärer Monoamintransporter 2 (VMAT 2) und Dopamintransporter) im Gesamtgehirn bzw. im Striatum unverändert. Auch die Mengen von β -Synuclein unterschieden sich in den Gesamtgehirnhomogenaten nicht von Kontrolltieren. Wurden jedoch die Mengen im Striatum untersucht, so zeigte sich eine geringfügige, statisch signifikante, Heraufregulation von ca. 11 % in den α -Synuclein-Nullmutanten und von ca. 18 % in der Mauslinie mit der chromosomalen Deletion.

Protein	α -Synuclein -/-	+/+	Antikörper
Aktin	94 $\pm$ 3	100 $\pm$ 5	AC-40
Amphiphysin	105 $\pm$ 15	100 $\pm$ 14	P924
APP	99 $\pm$ 6	100 $\pm$ 10	U955
Complexin 1	109 $\pm$ 6	100 $\pm$ 6	P942
Complexin 2	107 $\pm$ 5	100 $\pm$ 5	P942
CSP	101 $\pm$ 14	100 $\pm$ 4	α CSP
DOC2A	105 $\pm$ 3	100 $\pm$ 3	α DOC2
Dynamin	103 $\pm$ 8	100 $\pm$ 8	E765
GDI	109 $\pm$ 10	100 $\pm$ 5	Cl81.2
Mint	95 $\pm$ 5	100 $\pm$ 5	P932
Munc13-1	99 $\pm$ 10	100 $\pm$ 12	3H5
Munc18	109 $\pm$ 6	100 $\pm$ 9	I370
Neurologin I	100 $\pm$ 14	100 $\pm$ 8	4C12
NMDA-R1	99 $\pm$ 3	100 $\pm$ 4	Cl54.1
NSF	95 $\pm$ 7	100 $\pm$ 8	I372
p116	94 $\pm$ 6	100 $\pm$ 9	587 <i>Str.</i>
Presinilin I Schleife	103 $\pm$ 5	100 $\pm$ 6	α PSI
Rab3A	97 $\pm$ 6	100 $\pm$ 8	Cl42.2
Rab3B	104 $\pm$ 7	100 $\pm$ 12	U954
Rab3C	100 $\pm$ 5	100 $\pm$ 3	P180
Rabaptin	99 $\pm$ 5	100 $\pm$ 7	R321
Rabphilin	100 $\pm$ 7	100 $\pm$ 6	I734
RIM	109 $\pm$ 5	100 $\pm$ 6	α RIM <i>Str.</i>
SCAMP	98 $\pm$ 5	100 $\pm$ 2	P936
mSEC7	104 $\pm$ 4	100 $\pm$ 7	SA3613
aSNAP	102 $\pm$ 6	100 $\pm$ 3	I373
SNAP-23	103 $\pm$ 3	100 $\pm$ 6	P914
SNAP-25	98 $\pm$ 4	100 $\pm$ 2	Cl72.2
Synapsin Ia	103 $\pm$ 5	100 $\pm$ 5	E028
Synapsin Ib	98 $\pm$ 6	100 $\pm$ 5	E028
Synaptobrevin 1	99 $\pm$ 7	100 $\pm$ 11	P938
Synaptobrevin 2	98 $\pm$ 2	100 $\pm$ 4	Cl69.1
Synaptojanin	102 $\pm$ 3	100 $\pm$ 6	P923
Synaptogyrin	101 $\pm$ 5	100 $\pm$ 8	P925
Synaptophysin I	95 $\pm$ 4	100 $\pm$ 4	C7.2
Synaptophysin II	95 $\pm$ 7	100 $\pm$ 3	α p37
Synaptotagmin I	111 $\pm$ 6 94 $\pm$ 10	100 $\pm$ 7 100 $\pm$ 11	V216 V216 <i>Str.</i>
Syntaxin	94 $\pm$ 7	100 $\pm$ 3	Cl78.2
Syntaxin 1b	97 $\pm$ 6	100 $\pm$ 2	P941
α -Synuclein	15 $\pm$ 2 3 $\pm$ 1	100 $\pm$ 25 100 $\pm$ 13	S053 α Syf
β -Synuclein	107 $\pm$ 7 105 $\pm$ 4	100 $\pm$ 8 100 $\pm$ 6	U1127 U1128
α -Tubulin	97 $\pm$ 6	100 $\pm$ 2	DM1a
β -Tubulin	97 $\pm$ 6	100 $\pm$ 6	Tub2.1
TH	110 $\pm$ 8	100 $\pm$ 8	α TH

Tab. 1: Quantifizierung der Proteinmengen im Gehirn von α -Synuclein-Nullmutanten im Vergleich zu Wildtyp-Geschwistertieren. Postnukleäre Überstände aus dem Frontalhirn bzw. Striatum (Str.) von jeweils fünf Tieren jeder Gruppe wurden über SDS-PAGE aufgetrennt und über radioaktive Immunoblotanalyse mit den angegebenen Antikörpern quantifiziert. Angegeben sind die Mittelwerte $\pm$ Standardabweichung.

Die unveränderte Menge der synaptischen Vesikelproteine in α -Synuclein-Nullmutanten ist ein Indiz unveränderter Anzahl synaptischer Vesikel, wie der Vergleich mit quantitativer Auswertung morphologischer Daten in anderen Nullmutanten zeigte (Rosahl et al. 1995). Analog weist die unveränderte Menge von Proteinkomponenten der aktiven Zone (Munc13-1 und RIM) auf eine unveränderte Anzahl und Größe von Synapsen hin. Analog kann aus den Ergebnissen der Quantifizierung von VMAT 2 und DAT im Striatum auf eine unveränderte Anzahl dopaminerger synaptischer Vesikel und Axone im nigrostriatalen System geschlossen werden.

	wt [nmol/mg]	ko [nmol/mg]
Taurin	111,68 $\pm$ 5,85	119,01 $\pm$ 5,71
Aspartat	23,85 $\pm$ 2,97	19,36 $\pm$ 1,84
Glutamat	109,43 $\pm$ 7,31	97,37 $\pm$ 4,08
Glycin	8,57 $\pm$ 0,34	7,65 $\pm$ 0,54
GABA	7,78 $\pm$ 0,83	8,61 $\pm$ 1,26

	wt [ng/mg]	ko [ng/mg]
Dopamin	112,00 $\pm$ 3,43	107,41 $\pm$ 3,39
DOPAC	7,90 $\pm$ 0,71	7,17 $\pm$ 0,61
HVA	8,02 $\pm$ 0,94	9,02 $\pm$ 0,43
Serotonin	3,91 $\pm$ 0,33	4,22 $\pm$ 0,42
5-HIAA	1,76 $\pm$ 0,12	1,77 $\pm$ 0,24

Tab. 2: Striatale Neurotransmittermengen in α -Synuclein-Nullmutanten (ko) und Wildtyp-Geschwistertieren (wt). Obere Tabelle mit Werten von jeweils acht Tieren und untere Tabelle mit Werten von jeweils 24 Tieren. Angegeben ist der Mittelwert der chromatographischen Bestimmung $\pm$ des Standardfehlers.

Weiterhin wurden die Mengen verschiedener Neurotransmitter im Striatum analysiert (Tab. 2). Es ergaben sich keine signifikanten Unterschiede. Insbesondere die Mengen von Dopamin und Serotonin waren unverändert, im Gegensatz zu einer bereits veröffentlichten Studie von α -Synuclein-Mausnullmutanten, die eine Dopaminreduktion von ca. 18 % nachwiesen (Abeliovich et al. 2000).

Zusammengenommen zeigten diese Befunde, daß die Deletion von α -Synuclein eine normale neuronale Funktion zuließ und morphologische und biochemische Veränderung des Gehirns nicht detektierbar waren.

Abb. 12: Striatale Dopamin-, DOPAC- und Serotonin-Mengen in Wildtyp-Mäusen und α -Synuclein-Nullmutanten in Abhängigkeit von MPTP oder Methamphetamin. Mäusen wurden im Abstand von je zwei Stunden die angegebenen Dosen MPTP oder Methamphetamin i.p. injiziert. Kontrolltiere erhielten das gleiche Volumen der Trägersubstanz. Die Neurotransmitter-Mengen wurden fünf Tage nach Applikation aus deproteinierten Striatumextrakten über HPLC ermittelt. Aufgetragen sind die relativen Werte bezogen auf die Wildtyp-Kontrolltiere aus vier kumulierten Experimenten. Die Anzahl der analysierten Tiere ist am Fuß jedes Balkens dargestellt. Werte sind als Mittelwerte $\pm$ Standardfehler dargestellt. Statistisch signifikante Unterschiede (ANOVA: $p < 0,05$) sind mit einem Sternchen markiert. schwarze Balken: Wildtyp; graue Balken: α -Synuclein-Nullmutanten.

4.13 Pharmakologisches Tiermodell eines Parkinson-Syndroms

In Mäusen kommt keine der Parkinson-Erkrankung ähnliches Syndrom vor. Allerdings löst MPTP eine Vielzahl von Veränderungen aus, die der Parkinson-Erkrankung gleichen. Um den Einfluß von α -Synuclein auf die Pathogenese dieser Erkrankung zu untersuchen, wurde angenommen, daß die idiopathische Form prinzipiell dem gleichen pathogenetischen Mechanismus folgt, wie die durch das Toxin MPTP ausgelöste Erkrankung. α -Synuclein-Nullmutanten und Wild-Typ-Geschwistertiere bekamen verschiedene Dosen dieses Toxins injiziert. Methamphetamin behandelte Mäuse dienten als Kontrolle, da beide Toxine eine akute Dopaminfreisetzung induzieren, jedoch unterschiedliche chronische Effekte aufweisen (Giovanni et al. 1994a; Giovanni et al. 1994b; Hogan et al. 2000; O'Dell et al. 1993; Sirinathsinghji et al. 1988; Sonsalla et al. 1992; Sulzer und Rayport 1990). Daher konnten die Effekte von MPTP und Methamphetamin möglicherweise helfen, zwischen akuten, durch Dopaminfreisetzung verursachten, und chronischen pathologischen Effekten zu unterscheiden. Die verabreichten MPTP-Mengen reichten von relativ milden Dosen (eine i.p.-Injektion von 20 mg/kg) bis zu hohen Dosen (vier i.p.-Injektionen von 20 mg/kg im Abstand von je 2 h) mit signifikanter akuter Mortalität. Die verwendeten Methamphetamin-Mengen mit drei i.p.-Injektionen von 5 mg/kg waren eher moderat. Die Tiere wurden fünf oder zehn Tage nach Behandlung getötet, einem Zeitpunkt, an dem die akuten Effekte beider Toxine vorüber waren (Fornai et al. 1997a; Fornai et al. 1999; Heikkila et al. 1984; Sonsalla et al. 1989).

Erste Hinweise auf eine mögliche Protektion der α -Synuclein-Nullmutanten gegenüber der MPTP-Toxizität ergaben sich aus der erhöhten Letalität in der Wild-Typ-Gruppe. Vier der 57 behandelten Tiere verstarben innerhalb der ersten 24 h, wohingegen alle der 58 behandelten Nullmutanten überlebten. Es konnten keine wesentlichen Verhaltensveränderungen zwischen den beiden Gruppen festgestellt werden. In beiden induzierte MPTP eine kurze Aktivitätssteigerung, die von einer katatonischen Phase gefolgt war. Nach Applikation der höchsten MPTP-Dosis waren die Wildtyp-Tiere unfähig sich fortzubewegen, wohingegen die Nullmutanten im Beobachtungszeitraum von fünf Minuten kurze Distanzen zurückgelegt hatten.

Nach Applikation von Methamphetamin vollführten sowohl die Nullmutanten als auch die Wildtyp-Geschwistertiere stereotype Verhaltensmuster, wie Lecken, Nagen und Fellpflege, die besonders nach der dritten Applikation evident waren.

Bei der Analyse wurden zuerst die Gehirne der MPTP-behandelten Mäuse morphologisch untersucht. In Gefrierschnitten wurde immunzytochemisch TH angefärbt (Abb. 11). Die Reduktion der TH-positiven Terminalen in den MPTP-behandelten Tieren variierte stark zwischen einzelnen analysierten Mäusen, wohingegen in den Methamphetamin behandelten Tieren keine Reduktion deutlich wurde. Alternativ wurden die Mengen an Dopamin und seiner Metaboliten im Striatum als Funktion der Behandlung untersucht (Abb. 12). Als Kontrolle dienten die Konzentrationen von Serotonin, das ebenfalls durch MPTP und Methamphetamin akut freigesetzt wird, dessen Mengen jedoch keiner chronischen Veränderung unterliegen. Mit steigenden MPTP-Dosen zeigte sich eine deutliche Reduktion des striatalen Dopamins. Diese verringerte sich um bis zu 90 % bei der höchsten angewendeten Dosis. Im Vergleich dazu veränderten sich die Serotonin-Konzentrationen nicht, so daß die Reduktion auf chronische Effekte zurückzuführen war. Die α -Synuclein-Nullmutanten waren signifikant gegenüber der MPTP-Behandlung geschützt. Bei der Behandlung mit der geringsten MPTP-Dosis war dieser Effekt

besonders deutlich. Hier wiesen die Nullmutanten eine Dopamin-Reduktion von lediglich ca. 15 % verglichen zu 45 % bei den Wildtyp-Geschwistertieren auf. Das gleiche Ergebnis zeigte sich bei DOPAC, einem Dopamin-Metaboliten.

Abb. 13: Striatale Proteinmengen in α -Synuclein-Nullmutanten und Wildtyp-Mäusen in Abhängigkeit von MPTP oder Methamphetamin. Die angegebenen Dosen MPTP, Methamphetamin oder physiologische Kochsalzlösung in Kontrolltieren wurden im Abstand von je zwei Stunden i.p. injiziert. Die Proteinmengen in PNS-Überständen aus Striatum-Homogenaten wurden fünf Tage nach Applikation über Immunoblotanalyse mit radioaktiver Quantifizierung bestimmt. Die Ergebnisse aus vier unabhängigen Experimenten wurden kumuliert und die Werte relativ zu

Wildtyp-Kontrolltieren (Mittelwert $\pm$ Standardfehler) dargestellt. Die Anzahl der analysierten Tiere ist jeweils am Fue des Balkens angegeben. schwarze Balken: Wildtyp; graue Balken: α -Synuclein-Nullmutanten.

Abb. 14: Striatale Dopamin-, DOPAC- und Homovanillinsäure-Mengen in Wildtyp-Mäusen, α -Synuclein-Nullmutanten und der α -Synuclein Deletionsmauslinie C57Bl6/J/ola/hsd in Abhängigkeit von MPTP oder Methamphetamin. Mäusen wurde 20 mg/kg MPTP oder dreimal 5 mg/kg Methamphetamin im Abstand von je zwei Stunden i.p. injiziert. Kontrolltiere erhielten das gleiche Volumen der Trägersubstanz. Die Neurotransmitter-Mengen wurden fünf Tage (B) oder 10 Tage (A) nach Applikation aus deproteinierten Striatumextrakten über HPLC ermittelt. Die Anzahl der analysierten Tiere ist am Fuß jedes Balkens dargestellt. Die Dopaminmetaboliten in ng/mg Protein sind als Mittelwerte $\pm$ Standardfehler dargestellt. Statistisch signifikante Unterschiede (ANOVA: $p < 0,05$) sind mit einem Sternchen markiert. schwarze Balken: Wildtyp; graue Balken: α -Synuclein-Nullmutanten; grau gemusterte Balken: heterozygote C57Bl6/J/ola/hsd-Mäuse; schwarz gemusterte Balken: homozygote C57Bl6/J/ola/hsd-Mäuse.

Überraschend war der entgegengesetzte Effekt bei der Methamphetamin-Behandlung. Hier zeigten die α -Synuclein-Nullmutanten eine doppelt so starke Empfindlichkeit verglichen mit den Wildtyp-Geschwistertieren. Die Mengen an Dopamin und seiner Metaboliten in den Wildtyp-Mäusen waren nur moderat um ca. 15 % reduziert, wohingegen die Reduktion bei den Nullmutanten ca. 40 % betrug. Wiederum hatte die Behandlung in beiden Gruppen keinen chronischen Effekt auf den striatalen Serotoningehalt.

Die immunhistochemische Analyse der dopaminergen Terminalen im Striatum hatte eine Reduzierung durch MPTP gezeigt. Um diesen Effekt zwischen den beiden Mausgruppen quantitativ vergleichen zu können, wurden Markerproteine dopaminerg Terminalen als Funktion der MPTP- und Methamphetamin-Behandlung quantifiziert (Abb. 13). Aufgrund eines einzelnen Aminosäureaustausches im C-Terminus des Maus-VMAT 2-Sequenz waren viele gegen die Rattensequenz gerichtete, kommerziell erhältliche Antikörper nicht verwendbar. Mit einem von Prof. Weihe (Marburg) freundlicherweise zur Verfügung gestellten Antikörper, gerichtet gegen die Maussequenz, konnten einige Tiere analysiert werden. Die starke Reduktion dieses Proteins deutete auf eine verminderte Menge dopaminerg synaptischer Vesikel hin, die in der Größenordnung des Dopaminverlustes lagen. Die Protektion in den α -Synuclein-Nullmutanten war auf Proteinebene nur andeutungsweise detektierbar, jedoch nicht statistisch signifikant. Interessant war die Reduktion der VMAT 2-Mengen in den mit Methamphetamin behandelten Tieren, da sich in diesem Falle keine sichtbare Reduktion der immunzytochemisch gefärbten Terminalen abgezeichnet hatte. Der Plasmamembranmarker dopaminerg Neuronen, DAT, war in den mit MPTP behandelten Tieren ebenfalls vermindert. Hier war die Protektion in den Nullmutanten nur angedeutet und nicht statistisch signifikant. Das Ausmaß der Reduktion von TH, einem zytosolischen Protein, war nach MPTP-Behandlung relativ gering. Bei der Methamphetamin-Behandlung ergab sich jedoch eine signifikante Überempfindlichkeit in den Nullmutanten. Im Gegensatz zu VMAT 2, das in den präsynaptischen Terminalen angereichert ist (Dr. S. Takamoori, persönliche Mitteilung), kommen TH wie auch DAT im gesamten Neuron verteilt vor. Daher könnte die zu den DAT-Mengen vergleichsweise milde Reduktion der TH-Mengen durch MPTP auf eine kompensatorische Heraufregulation des Schrittmacherenzym der Dopaminsynthese hindeuten.

Für α - und β -Synuclein wurde ebenfalls eine von der MPTP-Behandlung abhängige Abnahme festgestellt. Beide Proteine wurden auch in den nicht dopaminerg Synapsen des Striatums nachgewiesen (Abb. 11). Die Mengen des ubiquitär vorkommenden präsynaptischen Proteins Rab3A waren bei den hohen MPTP-Dosen leicht verringert, wohingegen GAPDH- und NR1-Mengen behandlungsunabhängig waren.

4.14 Untersuchung der C57Bl6/J/ola/hsd-Mauslinie

Bei der Rückkreuzung der erzeugten α -Synuclein-Mausnullmutanten in kommerziell erhältliche C57Bl6-Linien wurde bei der Linie C57Bl6/J/ola/hsd eine Mutation im α -Synuclein-Gen entdeckt, die ebenfalls zu einem Verlust des Proteins führte (Abb. 9). Um die Ergebnisse in den α -Synuclein-Nullmutanten an einer unabhängigen α -Synuclein-defizienten Linie zu überprüfen, wurde das pharmakologisch induzierte Parkinson-Modell an C57Bl6/J/ola/hsd-Mäusen getestet. Als Wildtyp-Kontrolle wurde die Inzuchtlinie C57Bl6/J von Cerj verwendet. Zehn Tage nach Injektion wurden wie für die Nullmutanten beschrieben die striatalen Dopamin-Mengen bestimmt. In diesen Versuchen konnte kein signifikanter Unterschied zwischen beiden Mauslinien gegenüber der Behandlung mit 20 mg/kg MPTP oder 3 x 5 mg/kg Methamphetamin gefunden werden (Abb. 14). Ein parallel durchgeführtes Experiment mit den erzeugten α -Synuclein-Nullmutanten zeigte wiederum eine Protektion gegenüber der MPTP-Behandlung an, obwohl sie geringer ausfiel als bei der Analyse nach fünf Tagen. Inzuchtlinien sind bekannt für eine unterschiedliche Empfindlichkeit gegenüber MPTP, die dominant vererbt wird (Hamre et al. 1999). Um mögliche genetische Hintergrundeffekte weiter einzuschränken wurden die

α -Synuclein-defizienten C57Bl6/J/ola/hsd-Mäuse mit Wildtyp-Mäusen aus der α -Synuclein-Nullmutanten-Linie gekreuzt und die F2-Nachkommen analysiert. Die Größe der spontanen chromosomalen Deletion war nicht bekannt, so daß keine Sonde für dieses Allel konstruiert werden konnte. Um zwischen Wildtyp-Tieren und den für die spontane Deletion heterozygoten Tieren unterscheiden zu können, wurden die striatalen α -Synuclein-Mengen nach dem Experiment quantifiziert. Heterozygote Mäuse wiesen ~60 % der Wildtyp-Mengen auf. Bei Wildtyp- und α -Synuclein-defizienten Mäusen war der Dopamingehalt nach 20 mg/kg MPTP nicht signifikant unterschiedlich und betrug nach fünf Tagen 56 % des Kontrollwertes. In heterozygoten Mäusen war die Reduktion geringer und fiel um ~27 % gegenüber den Kontrolltieren ab. Vergleichbar waren auch die Ergebnisse der Dopamin-Metaboliten DOPAC und HVA. Überraschenderweise bestätigten diese Versuche nicht die Ergebnisse der α -Synuclein-Nullmutanten, so daß zusammengekommen eine Beteiligung von α -Synuclein an der MPTP- und Methamphetamin-Toxizität unwahrscheinlich erscheint. Die Effekte waren wahrscheinlich durch ein mit dem α -Synuclein-Gen zusammen vererbten Gen verursacht, da die analysierten Mäuse einen C57Bl6/J-129Sv-Hybridstamm bildeten.

4.15 Untersuchung der Modulation des synaptischen Dopamin-transportes durch α -Synuclein

Sowohl MPTP als auch Methamphetamin bewirken eine akute Freisetzung von Dopamin, auch wenn ihre pharmakologische Wirkung stark unterschiedlich ist (Miller et al. 1999; Sirinathsinghji et al. 1988; Sonsalla et al. 1992; Sulzer und Rayport 1990). Sowohl MPTP als auch Methamphetamin führten zu einem Verlust von nigrostriatalem Dopamin, eine Veränderung der Tyrosinhydroxylase-Mengen und -aktivität und einer Inhibition der synaptosomalen und vesikulären Dopaminaufnahme (Hogan et al. 2000). In den α -Synuclein-Nullmutanten war die Sensitivität gegenüber beiden Komponenten verändert. Veränderungen des synaptischen Dopamin-Transportes zeigen einen Einfluß auf die Empfindlichkeit von MPTP und Methamphetamin (Fon et al. 1997; Fumagalli et al. 1998; Fumagalli et al. 1999; Gainetdinov et al. 1997; Gainetdinov et al. 1998). Es besteht somit die Möglichkeit, daß die veränderte Toxinempfindlichkeit durch einen veränderten synaptischen Dopamintransport verursacht wurde.

Um einen Einfluß der Mutation auf den Transport von Dopamin über die Plasmamembran zu untersuchen, wurde die Dopaminaufnahme in striatalen Synaptosomen gemessen (Abb. 15). In beiden Gruppen (Wildtyp und Nullmutanten) wurde die Aufnahme durch 1 μ M Methamphetamin um ~50 % inhibiert. Auch die Absolutwerte mit 140 pmol/mg Protein/min für die Wildtyp-Mäuse und 161 pmol/mg Protein/min für die α -Synuclein-Nullmutanten waren nicht signifikant unterschiedlich.

Die vesikuläre Dopaminaufnahme wurde mit Hilfe von partiell gereinigten synaptischen Vesikeln untersucht. Auch hier ergab sich kein wesentlicher Unterschied zwischen Wildtyp- und α -Synuclein defizienten Mäusen (Abb. 15). Methamphetamin inhibierte die Aufnahme in beiden Gruppen gleichermaßen, wenn auch mit geringerer Potenz, als sie für die synaptosomale Aufnahme beobachtet wurde. Da α - oder β -Synuclein nicht auf dieser Art von Vesikeln nachweisbar waren, untersuchten wir die vesikuläre Aufnahme nach Zugabe von rekombinant hergestellten Proteinen. Hierzu wurden die entsprechenden Fusionsproteine exprimiert und über Glutathion-Agarose gereinigt. GST wurde über die TEV-Protease abgespalten und das Produkt

gegen Wasser dialysiert. Die Reinheit der rekombinanten Proteinen wurde über gefärbte SDS-PAGE-Gele bestimmt und betrug mehr als 95 %.

Abb. 15: Synaptischer Dopamintransport in α -Synuclein-Nullmutanten und Wildtyp-Mäusen. Die Aufnahme von Dopamin in die rohe Synaptosomenfraktion (P2) von Wildtyp-Mäusen (wt; schwarze Balken; N=3) und Nullmutanten (KO; graue Balken; N=3) ist im oberen Diagramm dargestellt. Werte als Dublikate gemessen wurden um die unspezifische Aufnahme, gemessen in der Anwesenheit von 0,1 mM GBR12909 (wt: 9,5 pmol/mg Protein/min; ko: 10,4 pmol/mg Protein/min), korrigiert. Die Dopaminaufnahme unter Kontrollbedingungen (wt: 140 pmol/mg Protein/min; ko: 161 pmol/mg Protein/min) wurde gleich 100 % gesetzt und die Werte $\pm$ des Standardfehlers dargestellt. Die Aufnahme von Dopamin in die rohe synaptische Vesikelfraktion (LP2) ist im unteren Diagramm dargestellt (wt: schwarze Balken; KO: graue Balken). Hintergrundwerte wurden in der Anwesenheit von 50 μ M Reserpin gemessen (wt: 0,17 pmol/mg Protein/min; ko: 0,17 pmol/mg Protein/min). Werte als Dublikate gemessen sind dargestellt wie oben beschrieben (Kontrolle wt: 3,3 pmol/mg Protein/min; Kontrolle ko: 3,4 pmol/mg Protein/min). Die Aufnahme wurde in Anwesenheit von rekombinantem humanem Wildtyp- α -Synuclein (hSyf), humanem α -Synuclein mit den Mutationen A30P (A30P), S129D (S129D), A30P und S129D (A30P S129D) oder Methamphetamine gemessen.

Weder α -Synuclein noch die mutierten Formen hatten einen signifikanten Einfluß auf den vesikulären Dopamintransport. Da die α -Synuclein-Funktion möglicherweise durch Phosphorylierung an der Position Serin-129 reguliert wird, wurde diese Aminosäure durch Aspartat

ersetzt, um ein konstitutiv phosphoryliertes Protein zu imitieren. Auch dieses entsprechend mutierte rekombinante Protein beeinflusste die vesikuläre Dopaminaufnahme nicht.

Zusammengenommen zeigten diese Versuche, daß eine Regulation weder des synaptischen noch des vesikulären Dopamintransports durch α -Synuclein wahrscheinlich ist und die unterschiedliche Empfindlichkeit gegenüber MPTP und Methamphetamin in den α -Synuclein-Nullmutanten nicht erklären kann.

4.16 Herstellung und Analyse transgener, α -Synuclein überexprimierender Mäuse

Im Gegensatz zu Menschen und Primaten sind in Mäusen keine Parkinson-ähnlichen Krankheitsbilder bekannt. Um zu untersuchen, ob das humane α -Synuclein-Ortholog oder verschiedene Mutanten ein solches in Mäusen induzieren können, wurden verschiedene α -Synuclein-Konstrukte transgen in Mäusen exprimiert.

Das Vektorrückgrat wurde aus den transgenen Konstrukten mit *PvuI* und *NotI* ausgeschnitten und die transgene Expressionskassette, gesteuert vom Thy1-Promotor, in Vorkerne befruchteter Oozyten von FVB-Mäusen injiziert (Abb. 16). Die in NMRI-Mäusen ausgetragenen Ur-Transgenen wurden über PCR mit den Primerpaaren 2475/2476 für die Linie des humanen α -Synuclein (hSyf) und 1333/1334 für alle weiteren Linien auf chromosomale Insertion getestet. Insgesamt vier verschiedene transgene Konstrukte, die das humane α -Synuclein-Ortholog, ohne und mit den Mutationen A30P, A53T und A30P S87D exprimierten, wurden erstellt. 18 % der injizierten Oozyten mit dem A30P-, 16 % mit dem A53T- und 19 % mit dem A30P S87D-Konstrukt enthielten eine chromosomale Insertion. Von humanen Wildtyp-Konstrukten waren noch keine Mäuse erhalten worden. ~54 % der A30P-Linien, ~64 % der A53T-Linien und ~36 % der A30P S87D-Linien vererbten die Insertion. Diese Mäuse wurden mit α -Synuclein-Nullmutanten gekreuzt, um individuelle Linien zu erhalten, die nur das humane Ortholog exprimierten. Drei Ur-Transgene der Linie A30P S87D waren gegenüber Geschwistertieren in der Größe vermindert und zeugten auch keine Nachkommen. Im Gegensatz dazu waren die anderen Ur-Transgene unauffällig und entwickelten auch im Alter von mehr als einem Jahr keine Symptome. Erst nach Kreuzung mit α -Synuclein-Nullmutanten entwickelten ~40 % der A30P- und A30P S87D- und ~90 % der A53T-Linien neurologische Symptome (Tab. 3).

Mauslinie	α -Syn	Symptom- beginn	Leitsymp- tome	Mauslinie	α -Syn	Symptom- beginn	Leitsymp- tome
wt	100 $\pm$ 1 (8)	-	-	M58A53T	255 $\pm$ 22 (3)	336 $\pm$ 56 (4)	Bs, mU, P
M48A30P	145 $\pm$ 18 (5)			M70A53T	219 $\pm$ 20 (4)	237 $\pm$ 47 (10)	P hE, Gs
M49A30P	322 $\pm$ 42 (4)	216 $\pm$ 21 (13)	P hE, (Gs)	M78A53T	55 $\pm$ 3 (3)	372 $\pm$ 17 (2)	P hE
M57A30P		244 $\pm$ 82 (3)	mU, (P hE)	M87A53T	152 $\pm$ 9 (2)	445 $\pm$ 30 (3)	
M82A30P	108 $\pm$ 13 (3)	348 (1)		F89A53T	65 $\pm$ 2 (2)		
M83A30P	141 $\pm$ 12 (3)			F3A30PS87D	67 $\pm$ 4 (2)		
M87A30P	123 $\pm$ 9 (3)			F5A30PS87D	75 $\pm$ 7 (3)		
F106A30P	112 $\pm$ 9 (3)	165 (1)		M6A30PS87D	106 $\pm$ 26 (3)		
M49A30P M70A53T	276 (1)	33 $\pm$ 4 (3)	Wr, ksG	F11A30PS87D		24 (1)	
M4A53T	112 $\pm$ 4 (4)	345 $\pm$ 35 (6)		M12A30PS87D	237 $\pm$ 2 (2)	54 $\pm$ 2 (3)	mU, At, Bs
F12A53T	208 $\pm$ 6 (3)	313 $\pm$ 47 (12)	Bs, Fl, (mU)	M20A30PS87D	194 (1)	k.K.T.	Wr
M13A53T	142 $\pm$ 68 (3)	704 $\pm$ 31 (2)	mU, Bs	F33A30PS87D	283 (1)	k.K.T.	Wr
M28A53T	188 $\pm$ 20 (5)	272 $\pm$ 66 (4)	mU, eA				

Tab. 3: Expressionsmengen des transgenen α -Synuclein der einzelnen transgenen Linien relativ zur Menge in Wildtyp-Mäusen. Rohe Synaptosomenfraktionen (P2) aus über sechs Monate alten und vorwiegend symptomatischen Mäusen wurden über SDS-PAGE aufgetrennt und über Immunoblotanalyse mit dem Antikörper α SyF und radioaktive Detektion quantifiziert. Aufgetragen sind die Mittelwerte $\pm$ Standardfehler. In Klammern ist die Anzahl der analysierten Tiere angegeben. Der mittlere Erkrankungsbeginn in Tagen $\pm$ Standardfehler und in Klammern die Anzahl der erkrankten Tiere mit den beobachteten Symptomen ist in den anderen Spalten angegeben (At: Ataxie; Fl: Flexion der Wirbelsäule; hE: hintere Extremität; P: Parese; eA: epileptogene Anfälle; mU: motorische Unruhe; Bs: Bewegungsstarre/Akinese; Gs: Gleichgewichtsstörung; ksG: kleinschrittiger Gang; Wr: Wachstumsretardierung). Zusätzlich zeigten sechs Linien der A30P-Mutation, fünf Linien der A53T-Mutation und sieben Linien der A30P S87D-Mutation keine Keimbahntransmission (k.K.T.).

Abb. 17: Fortgeschrittene Stadien der Erkrankung α -Synuclein transgener Mäuse. Mäuse der Linien M49A30P (oben) und F12A53T (Mitte) wurden im Alter von sechs bzw. neun Monaten photographiert. Die Maus M49A30P verschlechterte sich innerhalb weniger Tage bis zu einem Zustand, in dem sie sich nicht mehr fortbewegen konnte. Im Vordergrund stand die Parese der hinteren Extremitäten bei erhöhtem Muskeltonus und Streckstellung. Zusätzlich viel eine Flexion der Wirbelsäule auf. Die Maus der Linie F12A53T entwickelte über Wochen immer wieder Phasen der Bewegungsstarre, in der sie bis zu eine Minute verharrte, um danach wieder normal herumzulaufen. Geschwistertiere der Verpaarung der Linien M70A53T und M49A30P wurden im Alter von 8 Wochen photographiert (unteres Bild). Die doppelt-transgene Maus (unteres Bild, unten) ist im Vergleich zu der einzel-transgenen Maus (unteres Bild, oben) im Wachstum verlangsamt. Weiterhin ist ihr Gangbild kleinschrittig und mit verbreiteter Basis der hinteren Extremitäten.

4.17 Untersuchung neurologischer Ausfälle durch Mutationen der familiären Parkinson-Syndrome

Das Symptommuster und auch der Beginn der neurologischen Symptome war bei den einzelnen Linien verschieden. Innerhalb einer Linie war die Symptomatik relativ konstant. In den Linien A30P- und A53T- war der mittlere Beginn im Zeitraum von 5 bis 14 Monaten (Tab. 3). Dabei sind von den meisten Linien erst einzelne Tiere erhalten worden und auch nicht alle über diesen langen Zeitraum beobachtet worden, so daß noch keine sicheren Aussagen über die Penetranz gemacht werden können. In Linien mit den schwersten Symptomen, wie M49A30P oder F12A53T, schienen bis zu 100 % der Mäuse zu erkranken, wohingegen in Linien mit eher milden Symptomen, z.B. M28A53T, nur eine Penetranz von etwa 10 % beobachtet wurde. Das Symptommuster war in den einzelnen Linien sehr unterschiedlich. Die Linie M49A30P entwickelte als Leitsymptom eine Parese der hinteren Extremitäten (Abb. 17). Die Muskeln waren atrophisch und im Tonus erhöht. Die Progredienz war bei dieser Linie schnell und mit lethalem Ausgang, so daß die Mäuse in der Regel nach ein bis zwei Wochen so beeinträchtigt waren, daß sie sich nicht mehr fortbewegen konnten. In diesem Stadium waren die hinteren Extremitäten maximal extendiert.

Die Linie M57A30P fiel insbesondere durch motorische Unruhe auf, so daß sie unkontrolliert über den Tisch rannten und sprangen ohne auf Hindernisse zu achten. Später im Verlauf wurde auch eine Parese und Atrophie der hinteren Extremitäten deutlich. Die Linien F12A53T und M58A53T hatten als Leitsymptom eine Bewegungsstarre, die insbesondere bei ersterer deutlich ausgeprägt war (Abb. 17). Die Mäuse verharrten bis zu einer Minute in einer unergonomischen Haltung, in der sie über den Tisch geschoben werden konnten. Löste sich diese Starre, so fielen sie durch einen gesteigerten Bewegungsdrang auf. Bei der Linie F12A53T entwickelte sich später eine Flexion der Wirbelsäule. Die Progredienz der Symptome war eher langsam, so daß über Wochen keine Verschlechterung feststellbar war. Die Linien M13A53T und M28A53T waren insbesondere in ihrer Bewegung gesteigert, so daß sie beim Öffnen der Käfige aus diesen sprangen. Bei den Linien M70A53T und M78A53T fiel als erstes eine Parese der hinteren Extremität auf, wobei die Progredienz im Vergleich zur Linie M49A30P wesentlich langsamer war.

4.18 Symptomverstärkung in doppelt-transgenen Mäusen

Um die Wirkung einer gleichzeitigen Expression beider Parkinson-Mutationen zu untersuchen, wurden doppelt-transgene Mäuse erstellt. Hierzu wurden die beiden Linien, die die höchsten transgenen Proteinmengen exprimierten, M49A30P und M70A53T, miteinander gekreuzt. Um den Genotyp der Nachkommen zu bestimmen, wurde die mit der Punktmutation eingefügte Markersequenz verwendet. Das A53T-Allel konnte spezifisch mit dem Primerpaar 2474/2473 amplifiziert werden. Nach Amplifikation mit dem Primerpaar 1333/1334 konnte das PCR-Produkt vom A30P-Allel mit *SmaI* und vom A53T-Allel mit *NcoI* geschnitten werden. *NcoI* schnitt in beiden Allelen zusätzlich am Startcodon, so daß das *NcoI*-verdaute PCR-Produkt kleiner war als das unverdaute. Die möglichen Genotypen konnten somit durch die spezifischen Restriktionsmuster identifiziert werden (Abb. 16). Bei den doppelt transgenen Mäusen ergab die PCR mit dem Primerpaar 1333/1334 ein Mischprodukt, von denen ein Teil mit *SmaI* und der andere mit *NcoI* geschnitten werden konnte. Die PCR-Produktmenge vom A30P-Allel war

wesentlich höher als die vom A53T-Allel, was wahrscheinlich durch eine höhere Kopienzahl bedingt war.

Die doppelt-transgenen Mäuse entwickelten wesentlich früher (nach ca. 30 Tagen) neurologische Ausfallserscheinungen (Tab. 3; Abb. 17). Die bisher erzeugten drei Mäuse zeigten eine Wachstumsretardierung und ein kleinschrittiges tippelndes und breitbasiges Gangbild. Insgesamt waren die Veränderungen wie schon in den einzel-transgenen Linien in den hinteren Extremitäten betont.

Abb. 18: Dopamingehalt im Striatum α -Synuclein-transgener Mäuse. Deproteinierte Extrakte aus dem Striatum symptomatischer transgener Mäuse wurden gewonnen und die Dopaminmengen und seine Metaboliten DOPAC und Homovanillinsäure über HPLC bestimmt. Kumulierte Werte sind relativ zu Wildtyp-Kontrolltieren aufgetragen. Die Anzahl der untersuchten Tiere ist im Fuß der Balken angegeben.

4.19 Symptomatik bei Imitierung eines konstitutiv phosphorylierten Serin-87

Da in den Maus- und Ratten-Orthologen von α -Synuclein als auch im β - und γ -Synuclein an dieser Position ein Asparagin enthalten ist, wurde getestet, ob eine Phosphorylierung einen Einfluß auf die Pathogenese haben könnte. Mit der Mutation S87D wurde ein konstitutiv phosphoryliertes Serin imitiert.

Interessanterweise entwickelten drei der Ur-Transgenen Symptome in Form einer Wachstumsretardierung. In den etablierten Linien war der Symptombeginn in zweien im Vergleich zu den A30P- und A53T-Linien früher. So waren die Mäuse nach Kreuzung in die α -Synuclein-Nullmutanten-Linie bereits nach 24 bzw. 54 Tagen neurologisch auffällig. Bei der Linie M12A30P S87D stand eine Bewegungsunruhe im Vordergrund. Als weitere Symptome fielen eine Ataxie und eine leichte Bewegungsstarre auf, die jedoch nicht so ausgeprägt war wie bei der

Linie F12A53T. Die symptomatische Maus der Linie F11A30PS87D verstarb bereits am Tag der Symptombestimmung und weitere transgene Nachkommen wurden bisher nicht erhalten.

4.20 Vergleich der Expressionsstärke mit der Schwere der neurologischen Ausfälle

Um die Symptomschwere und deren Beginn mit der Expressionsstärke des transgenen Konstruktes zu vergleichen, wurden die α -Synuclein-Mengen in den transgenen Linien quantifiziert (Tab. 3). Die Bestimmung erfolgte vorwiegend an symptomatischen und alten (mehr als 6 Monate) Tieren. Im Vordergrund stand die Untersuchung des dopaminergen Systems, das überwiegend in frontale Gehirnabschnitte projiziert. Ungereinigte Synaptosomenfraktionen (P2) aus dem Frontalhirn (Cortex und Zwischenhirn) wurden gewonnen und die α -Synuclein-Mengen durch quantitative Immunoblotanalyse bestimmt. Im Vergleich zu den α -Synuclein-Mengen in Wildtyp-Mäusen waren die transgenen Expressionsmengen bis zu mehr als dreimal so hoch. Bei den einzel-transgenen Linien mit den Parkinson-Mutationen zeigte die Mauslinie M49A30P mit der schnellsten Progression der neurologischen Symptomatik auch die höchsten Expressionsraten. Die doppelt transgenen Mäuse wurden schon nach wenigen Wochen symptomatisch. Es fiel auf, daß die Expressionsmengen in ihnen geringer waren als die in der M49A30P-Linie, aus der sie generiert wurden. Wurden noch nicht symptomatische einzel-transgene Geschwistertiere untersucht, so betrug die Menge in den doppelt-transgenen Tieren soviel wie die Summe der Mengen in den einzel-transgenen. Die Expression der beiden α -Synuclein-Mutanten erfolgte somit unabhängig voneinander, so daß die erhöhte transgene Proteinmenge für den frühen Symptombeginn verantwortlich schien. Die erhöhten Proteinmengen in alten Tieren deuteten entweder auf Proteinakkumulation oder -ablagerungen oder eine Erhöhung der Expressionsraten des transgenen Konstruktes mit zunehmendem Alter hin.

Die Linien mit den schwersten Verläufen der neurologischen Ausfälle waren auch die Linien mit den höchsten Expressionsraten der Parkinson-Mutationen. Die Expressionsraten des transgenen α -Synuclein der Linien M78A53T und F89A53T betrugen nur ca. die Hälfte der Wildtyp- α -Synuclein-Mengen. Eine dieser beiden Linien entwickelte erst sehr spät leichte neurologische Veränderungen. Für die Entwicklung neurologischer Ausfälle war eine Überexpression der mutierten α -Synuclein-Formen insofern nicht essentiell.

Die Linie F11A30P S87D entwickelte sehr früh Symptome, deren Progredienz vergleichbar schnell wie bei der Linie M49A30P war. Die Expressionsrate der Linie M12A30P S87D und auch der symptomatischen Ur-Transgene lag deutlich unterhalb der Linie M49A30P, so daß die zusätzliche Mutation S87D eine Beschleunigung der transgen hervorgerufenen Pathogenese bewirkte.

4.21 Einfluß der α -Synuclein-Mutanten auf das dopaminerge System

Um zu untersuchen, ob die neurologischen Symptome durch Veränderungen im dopaminergen System hervorgerufen wurden, wurden Mäuse im späten Stadium der Ausfallserscheinungen morphologisch, neurochemisch und biochemisch untersucht. Die bisherigen immunhistochemischen Ergebnisse, die in der Abteilung für Neuropathologie der Southwestern Medical Center in Dallas (USA) durchgeführt wurden, zeigten keine wesentlichen Zell- und Synapsen-

verluste im Striatum und der Substantia nigra. Auch Einschlußkörperchen konnten bisher nicht nachgewiesen werden.

Für eine quantitative Analyse wurde der Dopamingehalt im Striatum chromatographisch und die Menge verschiedener Proteine über Immunoblotanalyse bestimmt. Der Dopamingehalt in zwei der A30P- und vier der A53T-Linien war nicht signifikant gegenüber Wildtyp-Mäusen verändert (Abb. 18). Die doppelt-transgenen Mäuse und die A30P S87D-Linien konnten diesbezüglich noch nicht untersucht werden. Neben α -Synuclein wurden im Striatum dopaminerge Markerproteine, β -Synuclein und weitere Kontrollproteine untersucht (Tab. 4). Die striatalen α -Synuclein-Mengen in den A53T-Linien glichen denen, die in Synaptosomen des Frontalhirns bestimmt wurden. In den untersuchten A30P-Linien waren die transgenen Proteinmengen im Striatum jedoch wesentlich höher. So enthielten die transgenen Mäuse der Linie M49A30P 5,5mal so viel α -Synuclein im Striatum als Wildtyp-Kontrolltiere, wohingegen die α -Synuclein-Mengen im gesamten Frontalhirn nur 3,3mal so hoch waren. Da dieses Phänomen in mehreren Linien beobachtet und für beide Konstrukte die gleichen Promotorsequenzen verwendet wurden, könnte eine spezifische Akkumulation der A30P-Mutante im Striatum zu den erhöhten Werten geführt haben. Auch in den doppelt-transgenen Mäusen waren die striatalen Werte gegenüber den Werten des gesamten Frontalhirns erhöht. In der Linie M12A30P S87D waren die Mengen im Striatum und Frontalhirn vergleichbar, wohingegen in den beiden untersuchten symptomatischen Urtransgenen M20A30P S87D und M33A30P S87D die striatalen α -Synuclein-Mengen 70 bis 80 % höher waren als im gesamten Frontalhirn.

	wt	M4A53T	F12A53T	M28A53T	M70A53T	M87A53T	F89A53T
α-Synuclein	100 $\pm$ 5 (23)	123 $\pm$ 7 (7)	262 $\pm$ 8 (4)	122 $\pm$ 14 (11)	260 $\pm$ 26 (5)	155 $\pm$ 8 (2)	54 $\pm$ 1 (2)
β-Synuclein	100 $\pm$ 3 (19)	95 $\pm$ 4 (6)	86 $\pm$ 10 (4)	81 $\pm$ 4 (7)	70 $\pm$ 6 (5)	99 $\pm$ 8 (2)	136 $\pm$ 10 (2)
GAPDH	100 $\pm$ 2 (23)	109 $\pm$ 3 (7)	99 $\pm$ 2 (4)	112 $\pm$ 6 (11)	101 $\pm$ 5 (5)	103 $\pm$ 0 (2)	98 $\pm$ 3 (2)
VMAT 2	100 $\pm$ 2 (23)	138 $\pm$ 10 (6)	88 $\pm$ 8 (4)	100 $\pm$ 6 (7)	101 $\pm$ 8 (5)	103 $\pm$ 2 (2)	90 $\pm$ 5 (2)
DAT	100 $\pm$ 3 (19)		99 $\pm$ 10 (4)	97 $\pm$ 4 (5)	104 $\pm$ 1 (3)	105 $\pm$ 1 (2)	107 $\pm$ 7 (2)
TH	100 $\pm$ 2 (19)	113 $\pm$ 7 (2)	100 $\pm$ 3 (4)	107 $\pm$ 4 (5)	100 $\pm$ 4 (5)	115 $\pm$ 3 (2)	100 $\pm$ 4 (2)
NR1	100 $\pm$ 2 (23)	100 $\pm$ 6 (6)	92 $\pm$ 6 (4)	101 $\pm$ 6 (7)	102 $\pm$ 2 (5)	133 $\pm$ 5 (2)	83 $\pm$ 4 (2)
Rab3A	100 $\pm$ 2 (11)			103 $\pm$ 2 (2)	96 $\pm$ 5 (2)		
Rab3B	100 $\pm$ 3 (19)	94 $\pm$ 8 (7)	105 $\pm$ 12 (4)	110 $\pm$ 7 (11)	101 $\pm$ 16 (5)	90 $\pm$ 19 (2)	89 $\pm$ 5 (2)
Rab3C	100 $\pm$ 2 (12)	96 $\pm$ 6 (6)	106 $\pm$ 5 (4)	91 $\pm$ 3 (5)	99 $\pm$ 6 (3)	109 $\pm$ 1 (2)	93 $\pm$ 10 (2)

	wt	M48A30P	M49A30P	M57A30P	M70A53T M49A30P	M12A30P S87D
α-Synuclein	100 $\pm$ 5 (23)	265 $\pm$ 88 (2)	550 $\pm$ 31 (10)	491 $\pm$ 63 (4)	511 $\pm$ 39 (3)	277 $\pm$ 15 (2)
β-Synuclein	100 $\pm$ 3 (19)	165 $\pm$ 7 (2)	94 $\pm$ 5 (9)	105 $\pm$ 6 (4)	55 $\pm$ 17 (3)	82 $\pm$ 4 (2)
GAPDH	100 $\pm$ 2 (23)	100 $\pm$ 2 (2)	98 $\pm$ 3 (10)	103 $\pm$ 8 (4)	101 $\pm$ 2 (3)	96 $\pm$ 5 (2)
VMAT 2	100 $\pm$ 2 (23)	94 $\pm$ 1 (2)	91 $\pm$ 6 (9)	97 $\pm$ 6 (3)	84 $\pm$ 12 (3)	106 $\pm$ 8 (2)
DAT	100 $\pm$ 3 (19)		112 $\pm$ 7 (9)	91 $\pm$ 10 (4)	104 (1)	
TH	100 $\pm$ 2 (19)	103 $\pm$ 6 (2)	105 $\pm$ 3 (9)	114 $\pm$ 2 (4)	100 (1)	105 $\pm$ 2 (2)
NR1	100 $\pm$ 2 (23)	91 $\pm$ 9 (2)	103 $\pm$ 6 (9)	110 $\pm$ 7 (4)	117 $\pm$ 13 (3)	102 $\pm$ 2 (2)
Rab3A	100 $\pm$ 2 (11)		97 $\pm$ 3 (5)			
Rab3B	100 $\pm$ 3 (19)	133 $\pm$ 3 (2)	129 $\pm$ 4 (10)	89 $\pm$ 10 (3)	118 $\pm$ 14 (3)	112 $\pm$ 6 (2)
Rab3C	100 $\pm$ 2 (12)	99 $\pm$ 1 (2)	105 $\pm$ 4 (4)	95 $\pm$ 5 (4)	89 $\pm$ 7 (3)	99 $\pm$ 3 (2)

Tab. 4: Quantifizierung der Proteinlevel im Striatum in α -Synuclein transgenen Linien. Postnukleäre Überstände wurden über SDS-PAGE aufgetrennt und Immunoblotanalyse radioaktiv quantifiziert. Mittelwerte $\pm$ Standardfehler der analysierten Mäuse (Anzahl in Klammern) wurden relativ zu Wildtyp-Kontrolltieren bestimmt. Statistisch signifikante Unterschiede im Vergleich zu Wildtyp-Kontrollen (Ttest: $p < 0,05$) sind in Fett dargestellt.

In den α -Synuclein-Nullmutanten hatte die Abwesenheit von α -Synuclein zu einer leichten Erhöhung der β -Synuclein-Mengen geführt. In den transgenen Mäusen wurde nun untersucht, inwieweit die Überexpression der α -Synuclein-Mutanten einen Einfluß auf die β -Synuclein-Mengen im Striatum hatte. Vier der sechs untersuchten A53T- und zwei der drei untersuchten A30P-Linien zeigten keine Veränderung der β -Synuclein-Mengen. Die Linien M28A53T und M70A53T zeigten eine Reduktion von 20 bis 30 %, wohingegen die β -Synuclein-Mengen in der Linie M48A30P um 65 % erhöht waren. Auch in den doppelt-transgenen Mäusen zeigte sich eine deutliche Reduzierung der β -Synuclein-Mengen, die jedoch sehr variabel und insofern bei drei untersuchten Tieren nicht statistisch signifikant war. In der Linie M12A30P S87D war die Reduktion um ~20 % bei bisher zwei analysierten Tieren noch nicht gesichert. Überraschenderweise korrelierten die β -Synuclein-Veränderungen nicht mit den Überexpressionsraten von α -Synuclein. Bei Überexpression wurden sowohl eine Steigerung, als auch eine Reduktion oder keine Veränderung der β -Synuclein-Mengen gefunden. Wie in Abb. 7 gezeigt exprimierten die meisten Synapsen α - und β -Synuclein gleichzeitig, andere jedoch nur eine beider Isoformen. Insofern könnte das Expressionsmuster des transgenen α -Synuclein einen Einfluß auf die β -Synuclein-Mengen haben. Dies wird noch mit Hilfe der Immunhistochemie untersucht werden. Die dopaminergen Marker VMAT 2, DAT und TH waren nur in vier Linien deutlich verändert. In der Linie M4A53T, die nur eine moderate Überexpression des mutierten α -Synuclein zeigte, waren die VMAT 2 Mengen um ~40 % gesteigert. In den doppelt-transgenen Mäusen und der F12A53T-Linie waren diese im Gegensatz dazu um 12 bis 16 % reduziert, wobei dieser Wert wiederum durch mehr analysierte Tiere abgesichert werden müßte. Tyrosinhydroxylase war nur

in der Linie M57A30P signifikant um 14 % erhöht und DAT war in allen untersuchten Linien unverändert. Insbesondere war eine Reduktion der VMAT 2-Mengen nicht mit einer Reduktion der DAT-Mengen korreliert. In der Linie F12A53T bewirkte die Reduktion des dopaminergen Vesikelmarkers keine Reduktion des striatalen Dopamingehaltes, so daß eventuell die zytoplasmatische Konzentration erhöht war. In diesem Fall wäre eine Reduktion der vesikulären Dopaminaufnahme zu erwarten, die noch untersucht wird. Zusammengekommen zeigten diese Ergebnisse, daß weder die morphologischen, noch die neurochemischen oder biochemischen Parameter des nigrostriatalen Systems wesentlich verändert waren und daher keine Erklärung für die beobachteten neurologischen Veränderungen liefern.

Als Kontrolle wurden die Mengen von GAPDH, NR1 und drei Rab3-Isoformen bestimmt. GAPDH, NR1, Rab3A und C waren in den einzelnen Linien nicht signifikant verändert. Überraschenderweise waren in zwei A30P-Linien die Rab3B-Mengen um 30 % erhöht. Die Rab3-Isoformen weisen ein unterschiedliches synaptisches Expressionsmuster auf (Schlüter 2000). Somit könnte die selektive Erhöhung von Rab3B auf eine Beeinflussung nur eines Subtyps von Synapsen durch die Überexpression von α -Synuclein A30P hindeuten.

Abb. 19: Immunoblotanalyse von nitrosylierten Tyrosinresten in postnukleären Überständen. Proben von α -Synuclein-Nullmutanten (KO), Wildtyp-Mäusen, der transgenen Linien M49A30P und M70A53T wurden mit Peroxynitrit (PO +) oder als Kontrolle mit der Trägersubstanz Natronlauge (PO -) inkubiert. 80 μ g Gesamtprotein wurden auf einem 12 %igem Gel aufgetrennt und über Immunoblotanalyse mit einem Nitrotyrosin-spezifischen Antikörper (HM11) und ECL-Detektion analysiert. Unten ist eine längere Exposition dargestellt, um die mit einem Sternchen markierte schwache Bande in Wildtyp-Mäusen darzustellen.

4.22 *In-vitro*-Nitrosylierung von α -Synuclein

In Lewy-Körpern konnte eine Nitrosylierung von Tyrosinresten von α -Synuclein nachgewiesen werden (Giasson et al. 2000). MPTP-Administration führt akut ebenfalls zur Nitrosylierung von Tyrosinhydroxylase und α -Synuclein (Ara et al. 1998; Przedborski et al. 2001). Um zu testen, ob α -Synuclein in den am stärksten symptomatischen transgenen Mäusen auf diese Art modifiziert ist, wurden Gewebekomogenate mit einem Nitrotyrosin-spezifischen Antikörper analysiert (Abb. 19). Als Positivkontrolle wurden die Proben mit Peroxynitrit behandelt. In den beiden analysierten transgenen Linien konnten Nitrotyrosinreste nur nach Peroxynitritbehandlung nachgewiesen werden. Nur nach langer Exposition konnte auch in behandelten Proben von Wildtyp-Mäusen ein schwaches Signal detektiert werden, welches auf modifiziertes α -Synuclein zurückzuführen war, da es nicht in der unbehandelten Probe und auch nicht in den α -Synuclein-Nullmutanten auftrat. Die α -Synuclein-Expressionsmengen lagen in den transgenen Mäusen drei bis fünffach über den Wildtyp-Mäusen. Daher liegt zumindest der Großteil des transgen exprimierten α -Synuclein nicht nitrosyliert vor.

5 Diskussion

Die Identifizierung von Punktmutationen im α -Synuclein-Gen in familiären Formen der Parkinson-Syndrome demonstrierte eine molekulare Beteiligung von α -Synuclein an der Pathogenese einer Gruppe von autosomal dominanten Formen der Parkinson-Erkrankung (Polymeropoulos et al. 1997; Krüger et al. 1998). Da α -Synuclein ein Hauptbestandteil der Lewy-Körper, den charakteristischen pathomorphologischen Veränderungen der Parkinson-Erkrankung, bildet, ist eine Beteiligung auch an der idiopathischen Form wahrscheinlich (Spillantini et al. 1998; Spillantini et al. 1997). In dieser Arbeit wurde die synaptische und pathogenetische Funktion von α -Synuclein untersucht.

5.1 Physiologische Funktion von α -Synuclein

α -Synuclein ist ein abundantes lösliches Protein der Präsynapse. *In vitro* bindet es an Vesikel mit einem hohen Anteil von sauren Phospholipiden (Davidson et al. 1998). Die Bindung wird von einer drastischen Konformationsänderung begleitet, während der das ungefaltete Protein eine überwiegend α -helikale Struktur annimmt (Davidson et al. 1998; Weinreb et al. 1996). An welche Membranen α -Synuclein in Neuronen bindet ist nicht geklärt. So zeigten Untersuchungen eine Assoziation mit synaptischen Vesikeln, Endozytosevesikeln aber auch der Plasmamembran (Clayton und George 1999; George et al. 1995; Leng et al. 2001). In der in dieser Arbeit durchgeführten subzellulären Fraktionierung wurden α - und β -Synuclein eindeutig in der Zytoplasmafraktion der Synapse nachgewiesen. Eine Membranbindung ist daher entweder transientser Natur oder auf eine Subpopulation des Proteins beschränkt, so daß der Großteil des Proteins gelöst vorliegt. Eine zytosolische Lokalisation wird auch durch die Interaktion mit Synphilin-1 gestützt (Engelender et al. 1999). Synphilin-1 ist ebenfalls ein lösliches Protein und neben α -Synuclein Bestandteil von Lewy-Körpern (Wakabayashi et al. 2000). Die Funktion von Synphilin-1 ist unbekannt, so daß sich auch keine Anhaltspunkte für die Funktion von α -Synuclein ergeben. Ein weiterer Interaktionspartner von α -Synuclein ist Phospholipase D2 (PLD2) (Jenco et al. 1998). Dieses Enzym ist an die Plasmamembran gebunden und hydrolysiert Phosphatidylcholin in Cholin und Phosphatidsäure (Exton 1997). Diese Funktion kann *in vitro* effizient durch α - und β -Synuclein inhibiert werden. Eine erhöhte Phospholipaseaktivität stimuliert die Endozytose, so daß α -Synuclein als Regulator der enzymatischen Aktivität von PLD2 an der Endozytose beteiligt sein könnte. Die Endozytose ist ein integraler Schritt des synaptischen Vesikelzyklus. Ihre Veränderung bzw. Störung führt daher ultimativ zu Veränderungen der Anzahl synaptischer Vesikel. Diese wurde in neuronalen Primärkulturen untersucht, wobei eine Reduzierung der α -Synuclein-Expression zu einer Abnahme des synaptischen Vesikelpools führte (Murphy et al. 2000). Dieses Ergebnis war überraschend, da die durch α -Synucleinreduzierung aufgehobene Inhibition der Phospholipase D2 zu einer erhöhten Endozytoserate führen sollte.

Um die *in vitro* charakterisierten Funktionen von α -Synuclein im lebenden Organismus zu validieren, wurden im Rahmen dieser Arbeit α -Synuclein-Mausnullmutanten erzeugt und charakterisiert. In einer detaillierten Analyse der synaptischen Proteinkomposition und Gehirnmorphologie konnten in den α -Synuclein-Nullmutanten keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Somit wird α -Synuclein nicht für die Entwicklung und Aufrechterhaltung

einer normalen Gehirnfunktion und -zusammensetzung benötigt. In einer unabhängigen Studie, die mit Hilfe anderer Methoden ebenfalls keine wesentlichen Veränderungen in ihren α -Synuclein-Nullmutanten aufzeigen konnten, wurden diese Ergebnisse bestätigt (Abeliovich et al. 2000). α -Synuclein ist für die normale Funktion des Gehirns somit nicht essentiell. Dies wird auch durch die Tatsache verdeutlicht, daß die in dieser Arbeit entdeckte spontane Deletion des α -Synuclein-Gens in einer von vielen Forschungseinrichtungen genutzten und analysierten Mausinzuchtlinie bisher verborgen geblieben war.

Synuclein tritt phylogenetisch erst spät in Erscheinung. So fehlen in Invertebraten Synuclein-Orthologe und erst in Vertebraten ist das Protein erstmals vorhanden. Daher scheint es wahrscheinlich, daß neuronale Verschaltungen prinzipiell ohne Synuclein funktionieren können. Die Funktion des Proteins hängt wahrscheinlich mit den spezifischen Anforderungen an die neuronalen Netzwerke höherentwickelter Lebewesen zusammen.

In Mäusen werden vier Synuclein-Paraloge exprimiert. α - und β -Synuclein werden in einem Großteil der Synapsen koexprimiert. Aufgrund der hohen Sequenzübereinstimmung ist es möglich, daß β -Synuclein eine essentielle Funktion von α -Synuclein in Mäusen maskiert. Funktionelle Redundanz ist ein generelles Problem bei der Erstellung von Maus-Nullmutanten. So wurde z.B. die essentielle Funktion des synaptischen Proteins Rab3 in Mäusen erst durch die Deletion aller vier Isoformen deutlich (Schlüter 2000). Im Wurm *Caenorabditis elegans* führte die Ausschaltung des entsprechenden Paralogen nur zu vergleichsweise milden Veränderungen (Nonet et al. 1997). Letzte Sicherheit gäbe somit nur die parallele Ausschaltung aller Synuclein-Gene.

Leichte Veränderungen in α -Synuclein-Mausnullmutanten wurden im dopaminergen System gefunden (Abeliovich et al. 2000). Durch die Deletion dieses Proteins ist die Dopaminfreisetzung im Striatum erhöht, wohingegen keine Unterschiede im Hippokampus gefunden wurden. Diese selektive Beeinflussung des dopaminergen Systems ist insofern überraschend, als im Striatum die α -Synuclein-Mengen vergleichsweise gering sind. Andererseits sind die nigrostriatalen Neurone beim Morbus Parkinson als erstes betroffen, so daß diese Neuronen besonders sensibel auf Veränderungen der Synucleinfunktion reagieren könnten. Ein direkter Einfluß von α -Synuclein auf den Dopamintransport konnte in der vorliegenden Arbeit weder auf Ebene des Plasmamembrantransports noch des vesikulären Transports nachgewiesen werden. Somit ist die erhöhte Dopaminfreisetzung am ehesten auf einen veränderten Vesikeltransport zurückzuführen. Auf eine regulatorische Funktion von α - und β -Synuclein deutet die direkte Wechselwirkung mit Signaltransduktionskaskaden über die Phospholipase D2 und die phosphorylierungsabhängige Modulation dieser Funktion durch G-Protein-gekoppelte Rezeptorkinasen hin (Jenco et al. 1998; Pronin et al. 2000). Inwieweit auch die Serin-Phosphorylierung über Casein-Kinase oder die Tyrosin-Phosphorylierung über Src-Kinase physiologisch bedeutsam sind und eine reversible Membranassoziation bewirken, bleibt zu zeigen (Okochi et al. 2000; Ellis et al. 2001; Leng et al. 2001). Die Funktion von α -Synuclein ist nicht nur auf ein Transmittersystem beschränkt, wie die breite Verteilung in verschiedenen Hirnregionen zeigt. Prinzipiell sollten Veränderungen daher in allen involvierten Synapsen evident werden.

5.2 Pharmakologisch induziertes Parkinson-Syndrom

MPTP induziert einen selektiven Untergang dopaminerger Nervenendigungen und Neurone. Diese Wirkung ist bei Menschen irreversibel und die verursachten Symptome gleichen der beim Morbus Parkinson. Aufgrund dieser Tatsache wurde MPTP bevorzugt verwendet, um ein tierexperimentelles Parkinson-Syndrom zu erzeugen und untersuchen zu können. Zwischen Tierespezies gibt es jedoch bezüglich der MPTP-Sensitivität dramatische Unterschiede. Im Gegensatz zu Menschen und Affen sind bei Mäusen zehnfach höhere Dosen notwendig, um eine vergleichbare Reduktion des Dopamingehalts des nigrostriatalen Systems zu erreichen (Fornai et al. 1997b). Die Veränderungen sind in Mäusen reversibel, so daß sich das System nach mehreren Wochen wieder erholt.

Die Gemeinsamkeiten der Parkinson-Erkrankung und des durch MPTP-induzierten Syndroms sind neben der klinischen Symptomatik folgende: 1. Dopaminerge Neurone der SNC sind bevorzugt betroffen. 2. Dieses führt in beiden Fällen zu einer Reduktion der nigrostriatalen Dopamin-konzentration. 3. Die Komplex I-Aktivität der mitochondrialen Atmungskette in der SNC ist reduziert (Nicklas et al. 1985; Schapira et al. 1990). 4. Oxidative Entgleisungen sind in beiden Fällen an der Pathogenese beteiligt (Zhang et al. 2000b). So sind die Glutathion- und Ferritin-Spiegel in der SNC von Parkinson-Patienten reduziert und es kann eine erhöhte Lipid-peroxidation nachgewiesen werden (Dexter et al. 1986; Dexter et al. 1992; Dexter et al. 1989; Dexter et al. 1990; Jellinger et al. 1993; Smith et al. 1987). Eine Auslösung oxidativer Entgleisungen durch MPTP wurde tierexperimentell nachgewiesen. Reaktive Sauerstoffspezies entstehen durch die inhibierende Wirkung von MPP⁺, dem aktiven MPTP-Metaboliten, auf die mitochondriale NADH-Dehydrogenase und die intrazelluläre Oxidation von Dopamin (Chan et al. 1991; Lotharius und O'Malley 2000; Lotharius et al. 1999; Nicklas et al. 1985; Ramsay et al. 1986; Ramsay et al. 1991). Mäuse, die transgen Cu/Zn-SOD oder Mn-SOD überexprimieren, zeigen eine verminderte Empfindlichkeit gegenüber MPTP, wohingegen diese in Glutathionperoxidase-, Cu/Zn-SOD und Mn-SOD-Nullmutanten gesteigert ist (Andreassen et al. 2001; Klivenyi et al. 1998; Przedborski et al. 1992; Zhang et al. 2000a).

Das entscheidende Oxidationsmittel scheint Peroxynitrit zu sein, welches durch die chemische Reaktion von Stickstoffmonoxid- und Sauerstoffradikalen gebildet wird (Good et al. 1998; Pennathur et al. 1999; Schulz et al. 1995). Ein Marker für durch Peroxynitrit verursachte Schäden ist 3-Nitrotyrosin (Beckman et al. 1990). Neueste *in vitro* Befunde zeigen, daß α -Synuclein *in vivo* durch MPTP-Behandlung nitrotyrosyliert wird (Przedborski et al. 2001). Die Tyrosin-Nitrosylierung durch MPTP modifiziert nur wenige Proteine, unter anderem auch Tyrosinhydroxylase, deren enzymatische Aktivität so blockiert wird (Ara et al. 1998). Den Einfluß von Stickstoffmonooxid zumindest am MPTP-induzierten Parkinson-Syndrom zeigt die Verminderung der Sensitivität gegenüber MPTP durch Inhibitoren der neuronalen Stickstoffmonooxid-Synthetase (nNOS) in Primaten und die Deletion des Gens in Mäusen (Hantraye et al. 1996; Przedborski et al. 1996). Bei Ausschaltung der induzierbaren NOS (iNOS) in Gliazellen beschränkt sich die protektive Wirkung auf den verminderten Zellverlust in der SNC, nicht jedoch auf die Reduktion der dopaminerger Terminalen und Dopamin im Striatum (Dehmer et al. 2000; Liberatore et al. 1999). Oxidative Veränderungen an der DNA aktivieren das Reparatur-Enzym Poly-ADP-Ribose-Polymerase (PARP). Da PARP-Inhibitoren und Nullmutationen gegenüber MPTP-Toxizität schützen, scheint der durch PARP-Aktivierung zusätzliche ATP-

Verbrauch fatale Folgen für dopaminerge Neuronen zu haben (Cosi und Marien 1998; Mandir et al. 1999; Schulz et al. 1995).

Auch bei der Pathogenese der Parkinson-Erkrankung führen die oxidativen Entgleisungen zu einer Nitrotyrosylierung von α -Synuclein. Diese Modifikation konnte in Lewy-Körpern immunhistochemisch nachgewiesen werden (Giasson et al. 2000). α -Synuclein ist bisher das einzige Protein, dem eine pathogenetische Rolle beim idiopathischen Parkinson-Syndrom zugeschrieben wird.

In dieser Arbeit wurde die Annahme gemacht, daß die molekulare Pathogenese des MPTP-induzierten Parkinson-Syndroms über die oxidativen Entgleisungen in wesentlichen Aspekten der idiopathischen Form gleicht. Es wurde die Wirkung von MPTP auf α -Synuclein-Mausnullmutanten untersucht. Die über homologe Rekombination hergestellten Nullmutanten zeigten eine deutliche Protektion gegenüber der Behandlung. Diese konnte jedoch nicht in der Mauslinie HW mit einer spontanen Deletion des α -Synuclein-Gens bestätigt werden. Die Deletion ist kleiner als 2 cM und betrifft höchstwahrscheinlich nur das α -Synuclein-Gen (Specht und Schoepfer 2001). Daher fallen mögliche kompensatorische Effekte weiterer Gendeletionen außer Betracht. Im ersten Versuch wurde die HW-Linie mit C57Bl6/J-Mäusen verglichen, der sie ursprünglich abstammt. Die Mäuse der Linie HW sind jedoch als eigene Inzuchtlinie über Jahre bei Züchtern in England und Holland gehalten worden und weisen somit wahrscheinlich genetische Unterschiede im Vergleich zur Ursprunglinie von Jackson-Laboratories auf. Die verwendeten genetischen Tests der Züchter zeigten keine Unterschiede zu der Linie C57Bl6/J und so wurde sie auch als C57Bl6/J-Linie vertrieben, lediglich mit dem Züchterzusatz /ola/hsd. Die in dieser Arbeit identifizierte Gendeletion ist über Jahre nicht bemerkt worden. Die verwendeten Vergleichsmäuse der Linie C57Bl6/J entstammten dem Zuchtbetrieb CERJ und wurden regelmäßig durch Mäuse vom Zuchtbetrieb Jackson Laboratories aufgefrischt. Um auszuschließen, daß die protektive Wirkung der α -Synuclein-Gendeletion durch weitere genetische Unterschiede in den zwei Inzuchtlinien maskiert wurden, wurde die Linie HW in Wildtyp-Mäuse zurückgekreuzt und die Nachkommen der für das α -Synuclein heterozygoten Tiere erneut getestet. Die Gendeletion von α -Synuclein führte auch in diesen Mäusen nicht zu einer veränderten Empfindlichkeit gegenüber MPTP oder Methamphetamin.

Wie oben beschrieben führten Veränderungen der Genexpression von Proteinen, die an der Regulation oxidativer Entgleisungen beteiligt sind, zu einer veränderten Empfindlichkeit gegenüber MPTP. Die Gendeletion von α -Synuclein, dem Protein, das als einziges nachweislich an der idiopathischen Form der Parkinson-Syndrome beteiligt ist, blieb jedoch wie hier gezeigt ohne Einfluß auf die MPTP-Empfindlichkeit. Dies legt nahe, daß die molekularen Mechanismen, die einerseits zur Parkinson-Erkrankung und andererseits zum MPTP-induzierten Parkinson-Syndrom führen, unterschiedlich sind. Obwohl α -Synuclein auch im MPTP-Modell nitrotyrosyliert wird, ist diese Veränderung nicht kausal im Zusammenhang mit den neurochemischen Veränderungen zu sehen. Dies wird auch durch das kurze Zeitfenster von nur wenigen Stunden deutlich, in der die oxidative Modifikation zu beobachten ist (Przedborski et al. 2001). Das Endresultat, die Verminderung des nigrostriatalen Dopamingehaltes, ist nicht nur diesen beiden Formen der Parkinson-Syndrome gemeinsam. Auch die Encephalitis lethargica, deren Ätiologie eine Viruserkrankung ist, und Infarkte in den Basalganglien können zu einem Parkinson-Syndrom führen (Lang und Lozano 1998). Nur in der idiopathischen und den familiären Formen mit Mutationen im α -Synuclein Gen entstehen Lewy-Körper, so daß diese ein Charakteristikum

der α -Synuclein-abhängigen Syndrome zu sein scheinen. So konnten bisher auch nur in Affen Lewy-Körper-ähnliche eosinophile Einschlusskörperchen induziert werden, die α -Synuclein und Ubiquitin enthielten, nicht jedoch die elektronenmikroskopischen Charakteristika der Lewy-Körper aufwiesen (Forno et al. 1993; Kowall et al. 2000). Dies schließt nicht aus, daß auch gemeinsame Aspekte zwischen den verschiedenen Syndromen vorhanden sind, wie z.B. eine Gliose in der SNC nach Untergang der Neuronen. Ein fehlender Einfluß von α -Synuclein an der MPTP-Toxizität wurde auch in transgenen Mäusen nachgewiesen, die humane α -Synuclein-Orthologe exprimierten (Rathke-Hartlieb et al. 2001). Interessant ist in diesem Zusammenhang die Entstehung von Lewy-Körpern durch die Verwendung eines anderen mitochondrialen Toxins, dem Rotenon, in Ratten (Betarbet et al. 2000). In diesem Parkinson-Modell wurde das Toxin über einen Zeitraum von vier Wochen appliziert. Im Gegensatz zum MPTP-Modell in Mäusen zeigten die so behandelten Ratten auch für die Parkinson-Erkrankung typische Verhaltensveränderungen. Ob in diesem Modell α -Synuclein eine Rolle spielt und ob es in Mäusen reproduziert werden kann, wird momentan untersucht.

Warum zeigten die hergestellten α -Synuclein-Nullmutanten eine Protektion gegenüber MPTP? Im Gegensatz zu den HW-Mäusen haben diese Mäuse einen hybriden genetischen Hintergrund. Bei der Verpaarung der aus den Stammzellen entstanden chimären Männchen mit C57Bl6/J-Mäusen entstehen Nachkommen, deren genetische Information zur Hälfte der Mauslinie 129/Sv/ola und zur anderen Hälfte der Linie C57Bl6/J entstammt. Durch Rückkreuzungen in die C57Bl6/J-Linie kann der genetische Anteil der Linie 129/Sv reduziert werden. Die unmittelbar benachbarten Gene zu der über homologe Rekombination eingeführten Neomycin-Resistenzkassette entstammen jedoch weiterhin der 129/Sv-Linie, wohingegen das α -Synuclein-Wildtyp-Allel seinen Ursprung aus der C57Bl6/J-Linie hat. Insofern besteht die Möglichkeit, daß eines oder mehrere der gekoppelten Gene für die Protektion gegenüber der MPTP-Toxizität verantwortlich ist und α -Synuclein keine Rolle spielt. In der Tat zeigen verschiedene Mauslinien eine unterschiedliche Empfindlichkeit gegenüber MPTP (Hamre et al. 1999). Dieser Effekt zeigt, wie wichtig die Kontrolle des genetischen Hintergrundes von transgenen Tieren sein kann. Um die Hypothese der gekoppelten Gene zu überprüfen, könnte das α -Synuclein Wildtyp-Allel aus der Linie 129/Sv/ola in die Nullmutanten gekreuzt werden.

Methamphetamin führt wie MPTP zu einer akuten Dopaminfreisetzung. Semichronische Effekte sind jedoch unterschiedlich. Um zwischen der Wirkung von α -Synuclein auf akute und chronische Effekte unterscheiden zu können, wurden Mäuse als Kontrolle mit Methamphetamin behandelt. Interessanterweise zeigten hier die α -Synuclein-Nullmutanten eine erhöhte Empfindlichkeit. Diese bestätigte sich jedoch nicht bei Mäusen mit der spontanen Gendelektion, so daß die Überempfindlichkeit wiederum durch die gleichen gekoppelten Gene auf dem 129/Sv-Allel bedingt sein könnten.

5.3 Rolle von α -Synuclein in der Pathogenese der Parkinson-Syndrome

Die Parkinson-Erkrankung ist eine chronisch degenerative Erkrankung insbesondere der dopaminergen Neurone der SNC. α -Synuclein ist ein Hauptbestandteil von Lewy-Körpern, den charakteristischen pathomorphologischen Veränderungen dieser Erkrankung (Spillantini et al. 1997). Zwei Aminosäureaustausche im α -Synuclein führen zu familiären Formen der

Parkinson-Syndrome, die durch einen frühen Erkrankungsbeginn gekennzeichnet sind (Polymeropoulos et al. 1997; Krüger et al. 1998). Die Ausschaltung des α -Synuclein-Gens in Mäusen führt nicht zu einem Parkinson-Syndrom. Dies wird eindrucksvoll von der natürlich entstandenen Mauslinie HW, der das Gen fehlt, belegt. Auch in den hier hergestellten α -Synuclein-Mausnullmutanten führte die Ausschaltung des Gens insbesondere im Alter nicht zu Parkinson-Syndromen. Die neurochemische Analyse ergab keine Hinweise auf subklinische Veränderungen des nigrostriatalen Systems. Dies legt nahe, daß es sich bei den α -Synuclein-Mutationen A30P und A53T um *gain of function*-Mutationen handelt und sie nicht zu einem Funktionsverlust führen. Die dominanten Vererbungsmuster bestätigen diese Schlußfolgerung.

Um insbesondere dem chronischen Aspekt der Entstehung der Parkinson-Erkrankung Rechnung zu tragen und die pathogenetische Rolle von α -Synuclein zu untersuchen, wurden transgene Mäuse hergestellt, die humane α -Synuclein-Isoformen exprimieren. Die Expression der α -Synuclein-Polymorphismen A30P und A53T führte zu neurologischen Ausfällen. Dabei zeigten sich folgende Charakteristika: 1. Die Ursprungstrangene aus der Linie FVB erkrankten nicht. Erst nach Rückkreuzung in die Hybridlinie C57Bl6/J x 129Sv/ola der α -Synuclein-Nullmutanten zeigten die Mäuse Symptome. Dabei spielte der Maus- α -Synuclein-Genotyp keine Rolle. 2. Die transgenen Mäuse erkrankten erst im fortgeschrittenen Alter frühestens nach einem halben Jahr. 3. Die Schwere der Erkrankung nahm mit der Expressionsstärke zu. 4. Das Symptommuster war heterogen. Im Vordergrund standen Veränderungen des motorischen Systems mit Paresen und Muskelatrophien insbesondere der hinteren Extremität. Weitere Symptome waren Akinese, Bewegungsunruhe und Krampfanfälle.

Neurochemisch, biochemisch wie auch morphologisch ergaben sich keine Veränderungen im Striatum und der SNC, die auf ein Parkinson-Syndrom hingedeutet hätten. α -Synuclein-Einschlußkörperchen wurden auch nicht in anderen Hirnarealen gefunden. Die α -Synuclein-Mengen nahmen in den phänotypisch stärksten Mauslinien mit dem Alter zu. Dies legt nahe, daß die Akkumulation des humanen α -Synuclein für die neurologischen Ausfälle verantwortlich ist. Von anderen Gruppen hergestellte transgene Mäuse, die α -Synuclein aus Mensch exprimierten, zeigten ebenfalls motorische Störungen (Masliah et al. 2000; van der Putten et al. 2000). Die Überexpression der humanen Wildtyp-Isoform führte zur Bildung von Einschlußkörperchen, die jedoch nicht Lewy-Körpern glichen (Masliah et al. 2000). Diese enthielten ausschließlich das humane und nicht das murine α -Synuclein. Die Symptome der erkrankten Tiere waren im Vergleich zu den in dieser Arbeit erzeugten milder. Dies legt den Schluß nahe, daß Einschlußkörperchen nicht ursächlich an der Entstehung der Erkrankung mitwirken. Möglicherweise werden durch die Überexpression von α -Synuclein Interaktionspartner gebunden und dadurch ihre Funktion blockiert. Die Blockierung könnte dabei durch die familiären Polymorphismen A30P und A53T verstärkt sein. In der Tat wurde eine erhöhte Affinität für die humane A53T-Isoform zu Synphilin-1 gemessen (Engelender et al. 1999). Synphilin-1 ist ebenfalls Bestandteil der Lewy-Körper, so daß eventuell das blockierte Protein zusammen mit α -Synuclein in diesen abgelagert wird (Wakabayashi et al. 2000). Die Affinität der A30P-Isoform an Synphilin-1 ist vergleichbar mit der der humanen Wildtyp-Isoform. Insofern ist auch die Beeinflussung anderer Interaktionspartner wahrscheinlich.

Die juvenile rezessive Form der Parkinson-Erkrankung wird durch Mutationen im Parkin-Gen verursacht, die dieses Protein inaktivieren (Kitada et al. 1998). Wie neueste Befunde zeigen, ist dieses Protein für die Ubiquitinierung von α -Synuclein verantwortlich (Shimura et al. 2001).

Patienten mit der juvenilen rezessiven Form der Parkinson-Erkrankung haben keine Lewy-Körper. Dies legt den Schluß nahe, daß die Ubiquitinierung von α -Synuclein für die Entstehung von Lewy-Körpern entscheidend ist. Möglicherweise beeinflusst die Überexpression von α -Synuclein und insbesondere die von den mutierten Formen die Effizienz der Ubiquitinierung und des folgenden Abbaus durch Proteasomen, so daß der Abbau anderer Proteine gehemmt wird. In der Tat akkumulieren in Patienten mit einem Defekt im Parkin neben α -Synuclein auch andere Proteine (Imai et al. 2001). Die Überexpression von Parkin kann in der Zellkultur den durch ungefaltete Proteine ausgelösten Zelltod inhibieren (Imai et al. 2000). Eine mögliche Wirkung der Überexpression von α -Synuclein-Isoformen könnte daher die Ansammlung toxischer ungefalteter Proteine sein. Unterstützt wird diese Hypothese auch durch die Beobachtung, daß die α -Synuclein-Mengen selbst mit dem Alter der transgenen Mäuse zunehmen, diese jedoch nicht in Einschußkörperchen abgelagert sind.

Interessanterweise erkrankten auch transgene Mäuse, die nur 50-60% der in Wildtyp-Tieren gemessenen α -Synuclein-Mengen exprimierten. Dies könnte zweierlei Ursachen haben. 1. Die Mutation A53T inhibiert das Parkinsystem so effizient, daß auch die geringen Mengen ausreichen, um die Akkumulation toxischer Produkte zu begünstigen. 2. Die transgene Expression wird durch den Thy1-Promotor gesteuert, so daß α -Synuclein auch in Neuronen exprimiert wird, in denen es physiologischerweise nicht vorkommt. Daher könnten diese Neuronen besonders empfindlich gegenüber den zerstörenden Effekten der humanen A53T-Isoform sein.

Eine wichtige Frage bleibt, warum die Überexpression der humanen α -Synuclein-Isoformen zu neurologischen Ausfällen führt, die jedoch nicht einem Parkinson-Syndrom entsprechen. Die Paresen und insbesondere die Atrophie der betroffenen Muskeln spricht für einen Funktionsverlust der Motoneurone. In diesen ist α -Synuclein normalerweise nicht enthalten, so daß diese Neuronen empfindlicher auf die Überexpression der mutierten Isoformen reagieren könnten. Veränderungen in den motorischen Endplatten wurden in einer unabhängigen Studie nachgewiesen, die das humane α -Synuclein A53T exprimierten (van der Putten et al. 2000). Auch in diesen Mäusen waren Paresen das Leitsymptom.

α -Synuclein ist bei mehreren neurologischen Erkrankungen in Einschußkörperchen zu finden, so daß diese unter dem Oberbegriff der Synucleopathien zusammengefaßt wurden. Die Parkinson-Erkrankung, Demenzen mit Lewy-Körpern, Hallervorden-Spatz-Syndrom und Varianten der Alzheimer-Erkrankung haben Lewy-Körper in verschiedenen Hirnarealen, die α -Synuclein enthalten. Unterformen der multiplen Systematrophien weisen hingegen Einschußkörperchen (Sichelkörper) auf, die in Oligodendrozyten vorkommen. Dies zeigt, daß α -Synuclein in sehr verschiedenen Zellen an deren Untergang beteiligt sein kann. Inwieweit sich die pathogenetischen Mechanismen gleichen ist noch offen. Es wird der Eindruck gewonnen, daß für die Entwicklung eines Parkinson-Syndroms in Mäusen noch andere ätiologische Faktoren neben den mutierten α -Synuclein-Isoformen gleichzeitig vorhanden sein müßten. Die Penetranz der dominant vererbten Parkinson-Syndrome liegt unter 100 %, so daß auch im Menschen weitere ätiologische Faktoren eine Rolle spielen müssen, und das mutierte α -Synuclein nicht alleine unweigerlich zur Entstehung eines Parkinsons-Syndroms führt (Polymeropoulos et al. 1997). Ob es sich dabei um Umweltfaktoren oder um genetische Prädisposition handelt, ist noch offen. Ein genetischer Faktor wurde auch in der vorliegenden Arbeit deutlich, da die Urtransgenen im FVB-Hintergrund nicht erkrankten. Insofern waren für die Entstehung der beschriebenen neurologischen Ausfälle in Mäusen zum einen die Überexpression der mutierten α -Synuclein-

Isoformen und zum anderen der genetische Hintergrund der C57Bl6/J x 129Sv/ola-Hybridmäuse entscheidend.

Eine alternative Erklärung für das Fehlen der charakteristischen neurochemischen und pathomorphologischen Veränderungen eines Parkinson-Syndroms in Mäusen könnte die im Vergleich zum Menschen kurze Lebensspanne der Mäuse sein. Dies scheint jedoch unwahrscheinlich, da anscheinend auch transgene Fliegen (*Drosophila melanogaster*) ein Parkinson-Syndrom entwickeln können (Feany und Bender 2000). In diesen wurde die humane α -Synuclein-A53T-Isoform überexprimiert, welche zum Untergang von dopaminergen Neuronen und der Entstehung von Lewy-Körpern führte. Im Fliegen-Genom konnten bisher keine Hinweise auf ein α -Synuclein-Ortholog gefunden werden. Die Lewy-Körper entstehen in Fliegen relativ schnell, so daß sich möglicherweise in Vertebraten Schutzmechanismen gegen die Aggregation von α -Synuclein gebildet haben. Erst wenn diese aussetzen kann sich eine Parkinson-Erkrankung entwickeln. In Fliegen wäre dann dieser Schutzmechanismus nicht vorhanden, so daß sie relativ leicht erkranken könnten.

Der Polymorphismus A53T führt im Menschen zum Parkinson-Syndrom. Die Orthologe aus Mäusen, Ratten und Vögeln haben an dieser Position bereits ein Threonin. In diesen Tieren ist jedoch kein Parkinson-Syndrom bekannt. Daher wurde in dieser Arbeit die Hypothese aufgestellt, daß eventuell eine weitere Aminosäure im humanen α -Synuclein für die Entstehung der Parkinson-Erkrankung notwendig ist. Als möglicher Kandidat wurde das Serin an der Position 87 identifiziert. Alle anderen bisher sequenzierten α -Synuclein-Orthologe, aber auch die Paralogue Synoretin, β - und γ -Synuclein tragen an dieser Position ein Asparagin. Analog zur Hyperphosphorylierung bei den Tauopathien wurde vermutet, daß das Serin-87 phosphoryliert werden und diese zusätzliche Modifikation die Entstehung eines Parkinson-Syndroms beschleunigen könnte. *In vitro* kann diese Aminosäure über Caseinkinase phosphoryliert werden, obwohl das Serin an der Position 129 bevorzugt modifiziert wird (Okochi et al. 2000; Pronin et al. 2000). Um die Signifikanz dieser Phosphorylierung *in vivo* zu testen, wurden transgene Mäuse erstellt, die die Mutation S87D enthielten. Das Aspartat ist negativ geladen und kann zur Imitierung einer Serin-Phosphorylierung verwendet werden. Interessanterweise waren bereits mehrere der Ursprungstransgenen im FVB-Hintergrund phänotypisch auffällig. In zwei der Linien, die in den bereits erwähnten Hybridhintergrund gekreuzt werden konnten, verstärkte sich die Symptomatik, so daß diese Mäuse bereits nach wenigen Wochen neurologische Ausfälle zeigten. Eine detaillierte Analyse dieser Mäuse wird zeigen, ob in ihnen Einschußkörperchen oder neurochemische Veränderungen in der Substantia nigra bzw. im Striatum gefunden werden können, und so eine Rolle der Phosphorylierung von α -Synuclein in der Pathogenese der Parkinson-Erkrankung nachgewiesen werden kann.

6 Zusammenfassung

Die Synuclein-Proteinfamilie besteht aus den vier Paralogen α -, β -, γ -Synuclein und Synoretin. α - und β -Synuclein werden hauptsächlich im Gehirn, γ -Synuclein im peripheren Nervensystem und Synoretin in der Retina exprimiert. Subzelluläre Fraktionierungen und immunzytochemische Untersuchungen zeigten eine Lokalisation von α - und β -Synuclein im synaptischen Zytoplasma. In neuronalen Primärkulturen und auch im Mausgehirn ist ein Großteil des α - und β -Synucleins in Synapsen kolokalisiert.

Insbesondere wegen seiner Beteiligung an der Parkinson-Erkrankung hat α -Synuclein große Aufmerksamkeit erhalten. Dieses Protein wird bevorzugt in rostralen Hirnabschnitten exprimiert, doch ist die Konzentration im Striatum vergleichsweise gering. Die Ausschaltung der α -Synuclein-Expression in Mäusen veränderte die molekulare synaptische Architektur und auch die mikroskopische Gehirnstruktur nicht meßbar. Alte α -Synuclein-Mausnullmutanten zeigten keine pathomorphologischen oder neurochemischen Veränderungen im nigrostriatalen System. Diese Befunde zeigen, daß α -Synuclein weder essentiell für eine normale Funktion des Gehirns ist noch ein Verlust eine erhöhte Anfälligkeit gegenüber Parkinson-Syndromen bewirkt.

Zur Untersuchung der Pathogenese der Parkinson-Erkrankung im Tierexperiment wird in der Regel MPTP benutzt, da es wesentliche Symptome der idiopathischen Erkrankung kopiert. Wie an Mäusen mit einer spontanen α -Synuclein-Gendeletion gezeigt, ist α -Synuclein nicht an der Pathogenese des durch MPTP induzierten Parkinson-Syndroms in Mäusen beteiligt. Eine unterschiedliche Empfindlichkeit der hergestellten α -Synuclein-Nullmutanten und Wildtyp-Geschwistertiere war höchst wahrscheinlich durch die mit dem Resistenzgen kosegregierten Genen der Mauslinie 129/Sv/ola bedingt. Dies zeigt zum einen, wie wichtig die Kontrolle des genetischen Hintergrundes in der Analyse von transgenen Tieren sein kann und zum anderen, daß noch weitere, bisher noch nicht identifizierte Proteine an der Pathogenese der MPTP-induzierten Parkinson-Syndrome beteiligt sind. Proteine sowohl des Dopamintransports als auch der Regulation von Redoxvorgängen in Neuronen haben *in vivo* einen Einfluß auf pharmakologisch induzierte Parkinson-Modelle. Im Gegensatz zu diesen Proteinen wurde für α -Synuclein eine wesentliche Rolle in der Entstehung familiärer als auch der idiopathischen Parkinson-Erkrankung nachgewiesen. Diese Arbeit zeigt, daß sich die Pathogenese der toxischen Syndrome und der idiopathischen Parkinson-Erkrankung in einem wesentlichen molekularen Aspekt unterscheiden, und unterstützt die Annahme, daß es mehrere Mechanismen gibt, die zum Ausfall des nigrostriatalen Systems führen können. In dieser Hinsicht müssen die bisher aus pharmakologisch induzierten Parkinson-Syndromen abgeleiteten Mechanismen in einem neuen Kontext interpretiert werden.

Die transgene Expression der familiären Parkinson-Mutationen in Mäusen führte expressions- und zeitabhängig zu neurologischen Ausfällen, die nicht durch Veränderungen des nigrostriatalen Systems verursacht waren. Diese Ergebnisse zeigen, daß α -Synuclein multiple neurologische Erkrankungen verursachen kann und daß weitere ätiologische Faktoren für die Entstehung der Parkinson-Erkrankung wahrscheinlich sind.

Stichwörter: *α -Synuclein; MPTP; Parkinson-Syndrom; Maus-Nullmutanten*

7 Summary

The Synuclein protein family comprises the paralogs α -, β -, γ -Synuclein and Synoretin. α - and β -Synuclein are predominantly expressed in the brain, whereas γ -Synuclein is expressed in the peripheral nervous system and Synoretin in the retina. Subcellular fractionations and immunocytochemistry showed a localisation of α - and β -Synuclein in the synaptic cytosol. In neuronal primary cultures and the mouse brain, the majority of α - and β -Synuclein are colocalized in the synapses.

In the past, α -Synuclein has received considerable attention because of its contribution to Parkinson's disease. This protein is predominantly expressed in rostral brain areas, although the concentration in the striatum is comparatively low. The deletion of the α -Synuclein expression in mice did not change the molecular synaptic architecture or the microscopic brain structure. Old α -Synuclein deficient mice did not show any pathomorphological or neurochemical changes in the nigrostriatal system. These findings show, that α -Synuclein is neither essential for normal brain function nor does the deletion cause an elevated susceptibility for parkinsonism.

MPTP is used commonly to investigate the pathogenesis of Parkinson's disease in animal models as it mimics fundamental changes of the idiopathic disease. As shown among mice with a spontaneous α -Synuclein gene deletion, α -Synuclein is not involved in the pathogenesis of MPTP-induced parkinsonism in mice. A difference in the sensitivity of the α -Synuclein deficient mice generated in the present study as compared to wildtype littermates was most likely caused by cosegregated genes of the mouse line 129/Sv/ola with the marker gene for antibiotic resistance. This demonstrates the importance of genetic background effects in the analysis of transgenic mice and suggests that additional yet unidentified proteins are involved in the pathogenesis of MPTP-induced parkinsonism. Proteins involved both, in dopamine transport and the regulation of redox processes in neurons, have an influence on pharmacologically induced models of parkinsonism *in vivo*. In contrast to these proteins, however, only α -Synuclein was shown to have an essential role in the development of both, familial and idiopathic Parkinson's syndromes. The present thesis shows, that the pathogenesis of toxic syndromes and the idiopathic Parkinson's disease are different in a substantial molecular aspect, and supports the assumption that multiple mechanisms exist which lead to a loss of the nigrostriatal system. As a consequence, current molecular models of pharmacologically induced parkinsonism mechanisms must be reinterpreted on the background of the present study.

The transgenic expression in mice of α -Synucleins with the familial Parkinson mutations led to the expression and time dependent onset of neurological deficits which were not caused by changes in the nigrostriatal system. These results show, that α -Synuclein can cause multiple neurological diseases and additional etiological factors are likely to contribute to the development of Parkinson's disease.

keywords: *α -Synuclein; MPTP; Parkinson syndrome; targeted deletion in mice*

8 Literaturverzeichnis

- Abeliovich A, Schmitz Y, Farinas I, Choi-Lundberg D, Ho WH, Castillo PE, Shinsky N, Verdugo JM, Armanini M, Ryan A, Hynes M, Phillips H, Sulzer D und Rosenthal A** (2000): Mice lacking alpha-synuclein display functional deficits in the nigrostriatal dopamine system. *Neuron* 25, 239-252.
- Akopian AN und Wood JN** (1995): Peripheral nervous system-specific genes identified by subtractive cDNA cloning. *J Biol Chem* 270, 21264-21270.
- Andreassen OA, Ferrante RJ, Dedeoglu A, Albers DW, Klivenyi P, Carlson EJ, Epstein CJ und Beal MF** (2001): Mice with a partial deficiency of manganese superoxide dismutase show increased vulnerability to the mitochondrial toxins malonate, 3- nitropropionic acid, and MPTP. *Exp Neurol* 167, 189-195.
- Ara J, Przedborski S, Naini AB, Jackson-Lewis V, Trifiletti RR, Horwitz J und Ischiropoulos H** (1998): Inactivation of tyrosine hydroxylase by nitration following exposure to peroxynitrite and 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP). *Proc Natl Acad Sci U S A* 95, 7659-7663.
- Beckman JS, Beckman TW, Chen J, Marshall PA und Freeman BA** (1990): Apparent hydroxyl radical production by peroxynitrite: implications for endothelial injury from nitric oxide and superoxide. *Proc Natl Acad Sci U S A* 87, 1620-1624.
- Bernheimer H, Birkmayer W, Hornykiewicz O, Jellinger K und Seitelberger F** (1973): Brain dopamine and the syndromes of Parkinson and Huntington. Clinical, morphological and neurochemical correlations. *J Neurol Sci* 20, 415-455.
- Betarbet R, Sherer TB, MacKenzie G, Garcia-Osuna M, Panov AV und Greenamyre JT** (2000): Chronic systemic pesticide exposure reproduces features of Parkinson's disease. *Nat Neurosci* 3, 1301-1306.
- Betz A, Ashery U, Rickmann M, Augustin I, Neher E, Südhof TC, Rettig J und Brose N** (1998): Munc13-1 is a presynaptic phorbol ester receptor that enhances neurotransmitter release. *Neuron* 21, 123-136.
- Blanchard MM, Taillon-Miller P, Nowotny P und Nowotny V** (1993): PCR buffer optimization with uniform temperature regimen to facilitate automation. *PCR Methods Appl* 2, 234-240.
- Brose N, Huntley GW, Stern-Bach Y, Sharma G, Morrison JH und Heinemann SF** (1994): Differential assembly of coexpressed glutamate receptor subunits in neurons of rat cerebral cortex. *J Biol Chem* 269, 16780-16784.
- Buchman VL, Adu J, Pinon LG, Ninkina NN und Davies AM** (1998a): Persyn, a member of the synuclein family, influences neurofilament network integrity. *Nat Neurosci* 1, 101-103.
- Buchman VL, Hunter HJ, Pinon LG, Thompson J, Privalova EM, Ninkina NN und Davies AM** (1998b): Persyn, a member of the synuclein family, has a distinct pattern of expression in the developing nervous system. *J Neurosci* 18, 9335-9341.
- Capecchi MR** (1989): Altering the genome by homologous recombination. *Science* 244, 1288-1292.
- Castillo PE, Janz R, Südhof TC, Tzounopoulos T, Malenka RC und Nicoll RA** (1997): Rab3A is essential for mossy fibre long-term potentiation in the hippocampus. *Nature* 388, 590-593.

- Chan P, DeLanney LE, Irwin I, Langston JW und Di Monte D** (1991): Rapid ATP loss caused by 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine in mouse brain. *J Neurochem* 57, 348-351.
- Chen C und Okayama H** (1987): High-efficiency transformation of mammalian cells by plasmid DNA. *Mol Cell Biol* 7, 2745-2752.
- Chou JH und Jahn R** (2000): Binding of Rab3A to synaptic vesicles. *J Biol Chem* 275, 9433-9440.
- Clayton DF und George JM** (1998): The synucleins: a family of proteins involved in synaptic function, plasticity, neurodegeneration and disease. *Trends Neurosci* 21, 249-254.
- Clayton DF und George JM** (1999): Synucleins in synaptic plasticity and neurodegenerative disorders. *J Neurosci Res* 58, 120-129.
- Colley WC, Sung TC, Roll R, Jenco J, Hammond SM, Altshuler Y, Bar-Sagi D, Morris AJ und Frohman MA** (1997): Phospholipase D2, a distinct phospholipase D isoform with novel regulatory properties that provokes cytoskeletal reorganization. *Curr Biol* 7, 191-201.
- Conway KA, Harper JD und Lansbury PT, Jr.** (2000): Fibrils formed in vitro from alpha-synuclein and two mutant forms linked to Parkinson's disease are typical amyloid. *Biochemistry* 39, 2552-2563.
- Cosi C und Marien M** (1998): Decreases in mouse brain NAD⁺ and ATP induced by 1-methyl-4-phenyl-1, 2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP): prevention by the poly(ADP-ribose) polymerase inhibitor, benzamide. *Brain Res* 809, 58-67.
- Davidson WS, Jonas A, Clayton DF und George JM** (1998): Stabilization of alpha-synuclein secondary structure upon binding to synthetic membranes. *J Biol Chem* 273, 9443-9449.
- Dehmer T, Lindenau J, Haid S, Dichgans J und Schulz JB** (2000): Deficiency of inducible nitric oxide synthase protects against MPTP toxicity in vivo. *J Neurochem* 74, 2213-2216.
- Del Sal G, Manfioletti G und Schneider C** (1988): A one-tube plasmid DNA mini-preparation suitable for sequencing. *Nucleic Acids Res* 16, 9878.
- Dexter D, Carter C, Agid F, Agid Y, Lees AJ, Jenner P und Marsden CD** (1986): Lipid peroxidation as cause of nigral cell death in Parkinson's disease. *Lancet* 1986, 2, 639-640.
- Dexter DT, Carter CJ, Wells FR, Javoy-Agid F, Agid Y, Lees A, Jenner P und Marsden CD** (1989): Basal lipid peroxidation in substantia nigra is increased in Parkinson's disease. *J Neurochem* 52, 381-389.
- Dexter DT, Carayon A, Vidailhet M, Ruberg M, Agid F, Agid Y, Lees AJ, Wells FR, Jenner P und Marsden CD** (1990): Decreased ferritin levels in brain in Parkinson's disease. *J Neurochem* 55, 16-20.
- Dexter DT, Jenner P, Schapira AH und Marsden CD** (1992): Alterations in levels of iron, ferritin, and other trace metals in neurodegenerative diseases affecting the basal ganglia. The Royal Kings and Queens Parkinson's Disease Research Group. *Ann Neurol* 32, S94-100.
- Dougherty WG, Carrington JC, Cary SM und Parks TD** (1988): Biochemical and mutational analysis of a plant virus polyprotein cleavage site. *Embo J* 7, 1281-1287.
- Edelmann L, Hanson PI, Chapman ER und Jahn R** (1995): Synaptobrevin binding to synaptophysin: a potential mechanism for controlling the exocytotic fusion machine. *Embo J* 14, 224-231.
- Ellis CE, Schwartzberg PL, Grider TL, Fink DW und Nussbaum RL** (2001): alpha-synuclein is phosphorylated by members of the Src family of protein-tyrosine kinases. *J Biol Chem* 276, 3879-3884.

Engelender S, Kaminsky Z, Guo X, Sharp AH, Amaravi RK, Kleiderlein JJ, Margolis RL, Troncoso JC, Lanahan AA, Worley PF, Dawson VL, Dawson TM und Ross CA (1999): Synphilin-1 associates with alpha-synuclein and promotes the formation of cytosolic inclusions. *Nat Genet* 22, 110-114.

Exton JH (1997): Phospholipase D: enzymology, mechanisms of regulation, and function. *Physiol Rev* 77, 303-320.

Farrer M, Gwinn-Hardy K, Muentner M, DeVrieze FW, Crook R, Perez-Tur J, Lincoln S, Maraganore D, Adler C, Newman S, MacElwee K, McCarthy P, Miller C, Waters C und Hardy J (1999): A chromosome 4p haplotype segregating with Parkinson's disease and postural tremor. *Hum Mol Genet* 8, 81-85.

Feany MB und Bender WW (2000): A Drosophila model of Parkinson's disease. *Nature* 404, 394-398.

Fearnley JM und Lees AJ (1991): Ageing and Parkinson's disease: substantia nigra regional selectivity. *Brain* 114 (Pt 5), 2283-2301.

Feinberg AP und Vogelstein B (1983): A technique for radiolabeling DNA restriction endonuclease fragments to high specific activity. *Anal Biochem* 132, 6-13.

Fon EA, Pothos EN, Sun BC, Killeen N, Sulzer D und Edwards RH (1997): Vesicular transport regulates monoamine storage and release but is not essential for amphetamine action. *Neuron* 19, 1271-1283.

Fornai F, Alessandri MG, Torracca MT, Bassi L und Corsini GU (1997a): Effects of noradrenergic lesions on MPTP/MPP+ kinetics and MPTP-induced nigrostriatal dopamine depletions. *J Pharmacol Exp Ther* 283, 100-107.

Fornai F, Vaglini F, Maggio R, Bonuccelli U und Corsini GU (1997b): Species differences in the role of excitatory amino acids in experimental parkinsonism. *Neurosci Biobehav Rev* 21, 401-415.

Fornai F, Giorgi FS, Alessandri MG, Giusiani M und Corsini GU (1999): Effects of pretreatment with N-(2-chloroethyl)-N-ethyl-2- bromobenzylamine (DSP-4) on methamphetamine pharmacokinetics and striatal dopamine losses. *J Neurochem* 72, 777-784.

Forno LS, DeLanney LE, Irwin I und Langston JW (1993): Similarities and differences between MPTP-induced parkinsonism and Parkinson's disease. Neuropathologic considerations. *Adv Neurol* 60, 600-608.

Franken SM, Scheidig AJ, Krengel U, Rensland H, Lautwein A, Geyer M, Scheffzek K, Goody RS, Kalbitzer HR, Pai EF und Wittinghofer A (1993): Three-dimensional structures and properties of a transforming and a nontransforming glycine-12 mutant of p21H-ras. *Biochemistry* 32, 8411-8420.

Fumagalli F, Gainetdinov RR, Valenzano KJ und Caron MG (1998): Role of dopamine transporter in methamphetamine-induced neurotoxicity: evidence from mice lacking the transporter. *J Neurosci* 18, 4861-4869.

Fumagalli F, Gainetdinov RR, Wang YM, Valenzano KJ, Miller GW und Caron MG (1999): Increased methamphetamine neurotoxicity in heterozygous vesicular monoamine transporter 2 knock-out mice. *J Neurosci* 19, 2424-2431.

Fykse EM, Takei K, Walch-Solimena C, Geppert M, Jahn R, De Camilli P und Südhof TC (1993): Relative properties and localizations of synaptic vesicle protein isoforms: the case of the synaptophysins. *J Neurosci* 13, 4997-5007.

- Gainetdinov RR, Fumagalli F, Jones SR und Caron MG** (1997): Dopamine transporter is required for in vivo MPTP neurotoxicity: evidence from mice lacking the transporter. *J Neurochem* 69, 1322-1325.
- Gainetdinov RR, Fumagalli F, Wang YM, Jones SR, Levey AI, Miller GW und Caron MG** (1998): Increased MPTP neurotoxicity in vesicular monoamine transporter 2 heterozygote knockout mice. *J Neurochem* 70, 1973-1978.
- Gasser T, Muller-Myhsok B, Wszolek ZK, Oehlmann R, Calne DB, Bonifati V, Bereznoi B, Fabrizio E, Vieregge P und Horstmann RD** (1998): A susceptibility locus for Parkinson's disease maps to chromosome 2p13. *Nat Genet* 18, 262-265.
- George JM, Jin H, Woods WS und Clayton DF** (1995): Characterization of a novel protein regulated during the critical period for song learning in the zebra finch. *Neuron* 15, 361-372.
- Giasson BI, Duda JE, Murray IV, Chen Q, Souza JM, Hurtig HI, Ischiropoulos H, Trojanowski JQ und Lee VM** (2000): Oxidative damage linked to neurodegeneration by selective alpha-synuclein nitration in synucleinopathy lesions. *Science* 290, 985-989.
- Giovanni A, Sonsalla PK und Heikkila RE** (1994a): Studies on species sensitivity to the dopaminergic neurotoxin 1-methyl- 4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine. Part 2: Central administration of 1-methyl-4-phenylpyridinium. *J Pharmacol Exp Ther* 270, 1008-1014.
- Giovanni A, Sieber BA, Heikkila RE und Sonsalla PK** (1994b): Studies on species sensitivity to the dopaminergic neurotoxin 1-methyl- 4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine. Part 1: Systemic administration. *J Pharmacol Exp Ther* 270, 1000-1007.
- Goedert M** (2001): The significance of tau and alpha-synuclein inclusions in neurodegenerative diseases. *Curr Opin Genet Dev* 11, 343-351.
- Good PF, Hsu A, Werner P, Perl DP und Olanow CW** (1998): Protein nitration in Parkinson's disease. *J Neuropathol Exp Neurol* 57, 338-342.
- Graham FL, Smiley J, Russell WC und Nairn R** (1977): Characteristics of a human cell line transformed by DNA from human adenovirus type 5. *J Gen Virol* 36, 59-74.
- Guan KL und Dixon JE** (1991): Eukaryotic proteins expressed in Escherichia coli: an improved thrombin cleavage and purification procedure of fusion proteins with glutathione S-transferase. *Anal Biochem* 192, 262-267.
- Hamre K, Tharp R, Poon K, Xiong X und Smeyne RJ** (1999): Differential strain susceptibility following 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6- tetrahydropyridine (MPTP) administration acts in an autosomal dominant fashion: quantitative analysis in seven strains of Mus musculus. *Brain Res* 828, 91-103.
- Hantraye P, Brouillet E, Ferrante R, Palfi S, Dolan R, Matthews RT und Beal MF** (1996): Inhibition of neuronal nitric oxide synthase prevents MPTP-induced parkinsonism in baboons. *Nat Med* 2, 1017-1021.
- Heikkila RE, Hess A und Duvoisin RC** (1984): Dopaminergic neurotoxicity of 1-methyl-4-phenyl-1,2,5,6- tetrahydropyridine in mice. *Science* 224, 1451-1453.
- Hell JW, Maycox PR, Stadler H und Jahn R** (1988): Uptake of GABA by rat brain synaptic vesicles isolated by a new procedure. *Embo J* 7, 3023-3029.
- Higuchi R**. Site directed mutagenesis. In: PCR Protocols: A Guide to Methods and Applications; hrsg. v. Innis D, Gelfand H, Sninsky JJ, und White TJ. Academic Press New York 1990, 177-183.
- Hogan KA, Staal RG und Sonsalla PK** (2000): Analysis of VMAT2 binding after methamphetamine or MPTP treatment: disparity between homogenates and vesicle preparations. *J Neurochem* 74, 2217-2220.

- Hooper M, Hardy K, Handyside A, Hunter S und Monk M** (1987): HPRT-deficient (Lesch-Nyhan) mouse embryos derived from germline colonization by cultured cells. *Nature* 326, 292-295.
- Hörtnagl H, Berger ML, Sperk G und Pifl C** (1991): Regional heterogeneity in the distribution of neurotransmitter markers in the rat hippocampus. *Neuroscience* 45, 261-272.
- Huttner WB, Schiebler W, Greengard P und De Camilli P** (1983): Synapsin I (protein I), a nerve terminal-specific phosphoprotein. III. Its association with synaptic vesicles studied in a highly purified synaptic vesicle preparation. *J Cell Biol* 96, 1374-1388.
- Imai Y, Soda M und Takahashi R** (2000): Parkin suppresses unfolded protein stress-induced cell death through its E3 ubiquitin-protein ligase activity. *J Biol Chem* 275, 35661-35664.
- Imai Y, Soda M, Inoue H, Hattori N, Mizuno Y und Takahashi R** (2001): An unfolded putative transmembrane polypeptide, which can lead to endoplasmic reticulum stress, is a substrate of Parkin. *Cell* 105, 891-902.
- Irizarry MC, Kim TW, McNamara M, Tanzi RE, George JM, Clayton DF und Hyman BT** (1996): Characterization of the precursor protein of the non-A beta component of senile plaques (NACP) in the human central nervous system. *J Neuropathol Exp Neurol* 55, 889-895.
- Iwai A, Masliah E, Yoshimoto M, Ge N, Flanagan L, de Silva HA, Kittel A und Saitoh T** (1995): The precursor protein of non-A beta component of Alzheimer's disease amyloid is a presynaptic protein of the central nervous system. *Neuron* 14, 467-475.
- Jakes R, Spillantini MG und Goedert M** (1994): Identification of two distinct synucleins from human brain. *FEBS Lett* 345, 27-32.
- Javitch JA, D'Amato RJ, Strittmatter SM und Snyder SH** (1985): Parkinsonism-inducing neurotoxin, N-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine: uptake of the metabolite N-methyl-4-phenylpyridine by dopamine neurons explains selective toxicity. *Proc Natl Acad Sci U S A* 82, 2173-2177.
- Jellinger KA, Kienzl E, Rumpelmaier G, Paulus W, Riederer P, Stachelberger H, Youdim MB und Ben-Shachar D** (1993): Iron and ferritin in substantia nigra in Parkinson's disease. *Adv Neurol* 60, 267-272.
- Jenco JM, Rawlingson A, Daniels B und Morris AJ** (1998): Regulation of phospholipase D2: selective inhibition of mammalian phospholipase D isoenzymes by alpha- and beta-synucleins. *Biochemistry* 37, 4901-4909.
- Jones DH und Matus AI** (1974): Isolation of synaptic plasma membrane from brain by combined flotation-sedimentation density gradient centrifugation. *Biochim Biophys Acta* 356, 276-287.
- Kahle PJ, Neumann M, Ozmen L, Muller V, Jacobsen H, Schindzielorz A, Okochi M, Leimer U, van Der Putten H, Probst A, Kremmer E, Kretzschmar HA und Haass C** (2000): Subcellular localization of wild-type and Parkinson's disease-associated mutant alpha-synuclein in human and transgenic mouse brain. *J Neurosci* 20, 6365-6373.
- Kitada T, Asakawa S, Hattori N, Matsumine H, Yamamura Y, Minoshima S, Yokochi M, Mizuno Y und Shimizu N** (1998): Mutations in the parkin gene cause autosomal recessive juvenile parkinsonism. *Nature* 392, 605-608.
- Klivenyi P, St Clair D, Wermer M, Yen HC, Oberley T, Yang L und Flint Beal M** (1998): Manganese superoxide dismutase overexpression attenuates MPTP toxicity. *Neurobiol Dis* 5, 253-258.

- Kowall NW, Hantraye P, Brouillet E, Beal MF, McKee AC und Ferrante RJ** (2000): MPTP induces alpha-synuclein aggregation in the substantia nigra of baboons. *Neuroreport* 11, 211-213.
- Krüger R, Kuhn W, Muller T, Woitalla D, Graeber M, Kosel S, Przuntek H, Epplen JT, Schols L und Riess O** (1998): Ala30Pro mutation in the gene encoding alpha-synuclein in Parkinson's disease. *Nat Genet* 18, 106-108.
- Laemmli UK** (1970): Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage T4. *Nature* 227, 680-685.
- Lang AE und Lozano AM** (1998): Parkinson's disease. First of two parts. *N Engl J Med* 339, 1044-1053.
- Langston JW, Ballard P, Tetrud JW und Irwin I** (1983): Chronic Parkinsonism in humans due to a product of meperidine-analog synthesis. *Science* 219, 979-980.
- Lavedan C, Leroy E, Dehejia A, Buchholtz S, Dutra A, Nussbaum RL und Polymeropoulos MH** (1998): Identification, localization and characterization of the human gamma-synuclein gene. *Hum Genet* 103, 106-112.
- Leng Y, Chase TN und Bennett MC** (2001): Muscarinic receptor stimulation induces translocation of an {alpha}-synuclein oligomer from plasma membrane to a light vesicle fraction in cytoplasm. *J Biol Chem* 3, 3.
- Leroy E, Boyer R, Auburger G, Leube B, Ulm G, Mezey E, Harta G, Brownstein MJ, Jonnalagada S, Chernova T, Dehejia A, Lavedan C, Gasser T, Steinbach PJ, Wilkinson KD und Polymeropoulos MH** (1998): The ubiquitin pathway in Parkinson's disease. *Nature* 395, 451-452.
- Li C, Takei K, Geppert M, Daniell L, Stenius K, Chapman ER, Jahn R, De Camilli P und Südhof TC** (1994): Synaptic targeting of rabphilin-3A, a synaptic vesicle Ca²⁺/phospholipid-binding protein, depends on rab3A/3C [published erratum appears in Neuron 1995 Jul;15(1):following 239]. *Neuron* 13, 885-898.
- Liberatore GT, Jackson-Lewis V, Vukosavic S, Mandir AS, Vila M, McAuliffe WG, Dawson VL, Dawson TM und Przedborski S** (1999): Inducible nitric oxide synthase stimulates dopaminergic neurodegeneration in the MPTP model of Parkinson disease. *Nat Med* 5, 1403-1409.
- Lotharius J und O'Malley KL** (2000): The parkinsonism-inducing drug 1-methyl-4-phenylpyridinium triggers intracellular dopamine oxidation. A novel mechanism of toxicity. *J Biol Chem* 275, 38581-38588.
- Lotharius J, Dugan LL und O'Malley KL** (1999): Distinct mechanisms underlie neurotoxin-mediated cell death in cultured dopaminergic neurons. *J Neurosci* 19, 1284-1293.
- Lowe J, McDermott H, Landon M, Mayer RJ und Wilkinson KD** (1990): Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase (PGP 9.5) is selectively present in ubiquitinated inclusion bodies characteristic of human neurodegenerative diseases. *J Pathol* 161, 153-160.
- Lowry OH, Rosebrough NJ, Farr AL und Randall RJ** (1951): Protein measurement with the Folin phenol reagent. *J Biol Chem* 193, 265-275.
- Mandell JW, Townes-Anderson E, Czernik AJ, Cameron R, Greengard P und De Camilli P** (1990): Synapsins in the vertebrate retina: absence from ribbon synapses and heterogeneous distribution among conventional synapses. *Neuron* 5, 19-33.
- Mandir AS, Przedborski S, Jackson-Lewis V, Wang ZQ, Simbulan-Rosenthal CM, Smulson ME, Hoffman BE, Guastella DB, Dawson VL und Dawson TM** (1999): Poly(ADP-

ribose) polymerase activation mediates 1-methyl-4-phenyl-1, 2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP)-induced parkinsonism. *Proc Natl Acad Sci U S A* 96, 5774-5779.

Markey SP, Johannessen JN, Chiueh CC, Burns RS und Herkenham MA (1984): Intraneuronal generation of a pyridinium metabolite may cause drug-induced parkinsonism. *Nature* 311, 464-467.

Maroteaux L und Scheller RH (1991): The rat brain synucleins; family of proteins transiently associated with neuronal membrane. *Brain Res Mol Brain Res* 11, 335-343.

Maroteaux L, Campanelli JT und Scheller RH (1988): Synuclein: a neuron-specific protein localized to the nucleus and presynaptic nerve terminal. *J Neurosci* 8, 2804-2815.

Masliah E, Rockenstein E, Veinbergs I, Mallory M, Hashimoto M, Takeda A, Sagara Y, Sisk A und Mucke L (2000): Dopaminergic loss and inclusion body formation in alpha-synuclein mice: implications for neurodegenerative disorders. *Science* 287, 1265-1269.

Matsumine H, Yamamura Y, Kobayashi T, Nakamura S, Kuzuhara S und Mizuno Y (1998): Early onset parkinsonism with diurnal fluctuation maps to a locus for juvenile parkinsonism. *Neurology* 50, 1340-1345.

Matteoli M, Takei K, Cameron R, Hurlbut P, Johnston PA, Südhof TC, Jahn R und De Camilli P (1991): Association of Rab3A with synaptic vesicles at late stages of the secretory pathway. *J Cell Biol* 115, 625-633.

McGeer PL, Itagaki S, Akiyama H und McGeer EG (1988): Rate of cell death in parkinsonism indicates active neuropathological process. *Ann Neurol* 24, 574-576.

McMahon HT und Südhof TC (1995): Synaptic core complex of synaptobrevin, syntaxin, and SNAP25 forms high affinity alpha-SNAP binding site. *J Biol Chem* 270, 2213-2217.

Miller GW, Gainetdinov RR, Levey AI und Caron MG (1999): Dopamine transporters and neuronal injury. *Trends Pharmacol Sci* 20, 424-429.

Murphy DD, Rueter SM, Trojanowski JQ und Lee VM (2000): Synucleins are developmentally expressed, and alpha-synuclein regulates the size of the presynaptic vesicular pool in primary hippocampal neurons. *J Neurosci* 20, 3214-3220.

Nakajo S, Omata K, Aiuchi T, Shibayama T, Okahashi I, Ochiai H, Nakai Y, Nakaya K und Nakamura Y (1990): Purification and characterization of a novel brain-specific 14-kDa protein. *J Neurochem* 55, 2031-2038.

Nakajo S, Tsukada K, Omata K, Nakamura Y und Nakaya K (1993): A new brain-specific 14-kDa protein is a phosphoprotein. Its complete amino acid sequence and evidence for phosphorylation. *Eur J Biochem* 217, 1057-1063.

Nakajo S, Shioda S, Nakai Y und Nakaya K (1994): Localization of phosphoneuroprotein 14 (PNP 14) and its mRNA expression in rat brain determined by immunocytochemistry and in situ hybridization. *Brain Res Mol Brain Res* 27, 81-86.

Nicklas WJ, Vyas I und Heikkila RE (1985): Inhibition of NADH-linked oxidation in brain mitochondria by 1-methyl-4-phenyl-pyridine, a metabolite of the neurotoxin, 1-methyl-4-phenyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine. *Life Sci* 36, 2503-2508.

Nonet ML, Staunton JE, Kilgard MP, Fergestad T, Hartwig E, Horvitz HR, Jorgensen EM und Meyer BJ (1997): *Caenorhabditis elegans* rab-3 mutant synapses exhibit impaired function and are partially depleted of vesicles. *J Neurosci* 17, 8061-8073.

O'Dell SJ, Weihmuller FB und Marshall JF (1993): Methamphetamine-induced dopamine overflow and injury to striatal dopamine terminals: attenuation by dopamine D1 or D2 antagonists. *J Neurochem* 60, 1792-1799.

- Okochi M, Walter J, Koyama A, Nakajo S, Baba M, Iwatsubo T, Meijer L, Kahle PJ und Haass C** (2000): Constitutive phosphorylation of the Parkinson's disease associated alpha-synuclein. *J Biol Chem* 275, 390-397.
- Pennathur S, Jackson-Lewis V, Przedborski S und Heinecke JW** (1999): Mass spectrometric quantification of 3-nitrotyrosine, ortho-tyrosine, and o,o'-dityrosine in brain tissue of 1-methyl-4-phenyl-1,2,3, 6- tetrahydropyridine-treated mice, a model of oxidative stress in Parkinson's disease. *J Biol Chem* 274, 34621-34628.
- Perin MS, Fried VA, Mignery GA, Jahn R und Südhof TC** (1990): Phospholipid binding by a synaptic vesicle protein homologous to the regulatory region of protein kinase C. *Nature* 345, 260-263.
- Piccini P, Burn DJ, Ceravolo R, Maraganore D und Brooks DJ** (1999): The role of inheritance in sporadic Parkinson's disease: evidence from a longitudinal study of dopaminergic function in twins. *Ann Neurol* 45, 577-582.
- Polymeropoulos MH, Lavedan C, Leroy E, Ide SE, Dehejia A, Dutra A, Pike B, Root H, Rubenstein J, Boyer R, Stenroos ES, Chandrasekharappa S, Athanassiadou A, Papapetropoulos T, Johnson WG, Lazzarini AM, Duvoisin RC, Di Iorio G, Golbe LI und Nussbaum RL** (1997): Mutation in the alpha-synuclein gene identified in families with Parkinson's disease. *Science* 276, 2045-2047.
- Pronin AN, Morris AJ, Surguchov A und Benovic JL** (2000): Synucleins are a novel class of substrates for G protein-coupled receptor kinases. *J Biol Chem* 275, 26515-26522.
- Przedborski S, Jackson-Lewis V, Yokoyama R, Shibata T, Dawson VL und Dawson TM** (1996): Role of neuronal nitric oxide in 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6- tetrahydropyridine (MPTP)-induced dopaminergic neurotoxicity. *Proc Natl Acad Sci U S A* 93, 4565-4571.
- Przedborski S, Kostic V, Jackson-Lewis V, Naini AB, Simonetti S, Fahn S, Carlson E, Epstein CJ und Cadet JL** (1992): Transgenic mice with increased Cu/Zn-superoxide dismutase activity are resistant to N-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-induced neurotoxicity. *J Neurosci* 12, 1658-1667.
- Przedborski S, Chen Q, Vila M, Giasson BI, Djaldatti R, Vukosavic S, Souza JM, Jackson-Lewis VV, Lee VM und Ischiropoulos H** (2001): Oxidative post-translational modifications of alpha-synuclein in the 1- methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP) mouse model of Parkinson's disease. *J Neurochem* 76, 637-640.
- Ramsay RR, Salach JJ, Dadgar J und Singer TP** (1986): Inhibition of mitochondrial NADH dehydrogenase by pyridine derivatives and its possible relation to experimental and idiopathic parkinsonism. *Biochem Biophys Res Commun* 135, 269-275.
- Ramsay RR, Krueger MJ, Youngster SK, Gluck MR, Casida JE und Singer TP** (1991): Interaction of 1-methyl-4-phenylpyridinium ion (MPP+) and its analogs with the rotenone/piericidin binding site of NADH dehydrogenase. *J Neurochem* 56, 1184-1190.
- Rathke-Hartlieb S, Kahle PJ, Neumann M, Ozmen L, Haid S, Okochi M, Haass C und Schulz JB** (2001): Sensitivity to MPTP is not increased in Parkinson's disease-associated mutant alpha-synuclein transgenic mice. *J Neurochem* 77, 1181-1184.
- Robinson PJ, Sontag JM, Liu JP, Fykse EM, Slaughter C, McMahon H und Südhof TC** (1993): Dynamin GTPase regulated by protein kinase C phosphorylation in nerve terminals [see comments]. *Nature* 365, 163-166.
- Rosahl TW, Geppert M, Spillane D, Herz J, Hammer RE, Malenka RC und Südhof TC** (1993): Short-term synaptic plasticity is altered in mice lacking synapsin I. *Cell* 75, 661-670.

- Rosahl TW, Spillane D, Missler M, Herz J, Selig DK, Wolff JR, Hammer RE, Malenka RC und Südhof TC** (1995): Essential functions of synapsins I and II in synaptic vesicle regulation. *Nature* 375, 488-493.
- Saiki RK, Gelfand DH, Stoffel S, Scharf SJ, Higuchi R, Horn GT, Mullis KB und Erlich HA** (1988): Primer-directed enzymatic amplification of DNA with a thermostable DNA polymerase. *Science* 239, 487-491.
- Sanger F, Nicklen S und Coulson AR** (1977): DNA sequencing with chain-terminating inhibitors. *Proc Natl Acad Sci U S A* 74, 5463-5467.
- Schapira AH, Cooper JM, Dexter D, Clark JB, Jenner P und Marsden CD** (1990): Mitochondrial complex I deficiency in Parkinson's disease. *J Neurochem* 54, 823-827.
- Schlüter OM: Funktionelle Analyse des Rab3/Rabphilin-Zyklus in Maus-Nullmutanten. Nat. Diss. Hannover 2000.
- Schulz JB, Matthews RT, Muqit MM, Browne SE und Beal MF** (1995): Inhibition of neuronal nitric oxide synthase by 7-nitroindazole protects against MPTP-induced neurotoxicity in mice. *J Neurochem* 64, 936-939.
- Serpell LC, Berriman J, Jakes R, Goedert M und Crowther RA** (2000): Fiber diffraction of synthetic alpha-synuclein filaments shows amyloid-like cross-beta conformation. *Proc Natl Acad Sci U S A* 97, 4897-4902.
- Shibayama-Imazu T, Okahashi I, Omata K, Nakajo S, Ochiai H, Nakai Y, Hama T, Nakamura Y und Nakaya K** (1993): Cell and tissue distribution and developmental change of neuron specific 14 kDa protein (phosphoneuroprotein 14). *Brain Res* 622, 17-25.
- Shimura H, Schlossmacher MG, Hattori N, Frosch MP, Trockenbacher A, Schneider R, Mizuno Y, Kosik KS und Selkoe DJ** (2001): Ubiquitination of a new form of alpha-synuclein by parkin from human brain: implications for Parkinson's disease. *Science* 293, 263-269.
- Sian J, Dexter DT, Lees AJ, Daniel S, Agid Y, Javoy-Agid F, Jenner P und Marsden CD** (1994): Alterations in glutathione levels in Parkinson's disease and other neurodegenerative disorders affecting basal ganglia. *Ann Neurol* 36, 348-355.
- Sirinathsinghji DJ, Heavens RP und McBride CS** (1988): Dopamine-releasing action of 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP) and 1-methyl-4-phenylpyridine (MPP+) in the neostriatum of the rat as demonstrated in vivo by the push-pull perfusion technique: dependence on sodium but not calcium ions. *Brain Res* 443, 101-116.
- Smith MT, Sandy MS und Di Monte D** (1987): Free radicals, lipid peroxidation, and Parkinson's disease. *Lancet* 1987, 1, 38.
- Song JY, Ichtchenko K, Südhof TC und Brose N** (1999): Neuroligin 1 is a postsynaptic cell-adhesion molecule of excitatory synapses. *Proc Natl Acad Sci U S A* 96, 1100-1105.
- Sonsalla PK, Nicklas WJ und Heikkila RE** (1989): Role for excitatory amino acids in methamphetamine-induced nigrostriatal dopaminergic toxicity. *Science* 243, 398-400.
- Sonsalla PK, Giovanni A, Sieber BA, Donne KD und Manzino L** (1992): Characteristics of dopaminergic neurotoxicity produced by MPTP and methamphetamine. *Ann N Y Acad Sci* 648, 229-238.
- Southern EM** (1975): Detection of specific sequences among DNA fragments separated by gel electrophoresis. *J Mol Biol* 98, 503-517.
- Specht CG und Schoepfer R** (2001): Deletion of the alpha-synuclein locus in a subpopulation of C57BL/6J inbred mice. *BMC Neurosci* 2, 11.
- Spillantini MG, Schmidt ML, Lee VM, Trojanowski JQ, Jakes R und Goedert M** (1997): Alpha-synuclein in Lewy bodies. *Nature* 388, 839-840.

- Spillantini MG, Crowther RA, Jakes R, Hasegawa M und Goedert M** (1998): alpha-Synuclein in filamentous inclusions of Lewy bodies from Parkinson's disease and dementia with lewy bodies. *Proc Natl Acad Sci U S A* 95, 6469-6473.
- Sulzer D und Rayport S** (1990): Amphetamine and other psychostimulants reduce pH gradients in midbrain dopaminergic neurons and chromaffin granules: a mechanism of action. *Neuron* 5, 797-808.
- Surguchov A, Surgucheva I, Solessio E und Baehr W** (1999): Synoretin--A new protein belonging to the synuclein family. *Mol Cell Neurosci* 13, 95-103.
- Teng L, Crooks PA, Sonsalla PK und Dwoskin LP** (1997): Lobeline and nicotine evoke [3H]overflow from rat striatal slices preloaded with [3H]dopamine: differential inhibition of synaptosomal and vesicular [3H]dopamine uptake. *J Pharmacol Exp Ther* 280, 1432-1444.
- Towbin H, Staehelin T und Gordon J** (1979): Electrophoretic transfer of proteins from polyacrylamide gels to nitrocellulose sheets: procedure and some applications. *Proc Natl Acad Sci U S A* 76, 4350-4354.
- Ueda K, Fukushima H, Masliah E, Xia Y, Iwai A, Yoshimoto M, Otero DA, Kondo J, Ihara Y und Saitoh T** (1993): Molecular cloning of cDNA encoding an unrecognized component of amyloid in Alzheimer disease. *Proc Natl Acad Sci U S A* 90, 11282-11286.
- van der Putten H, Wiederhold KH, Probst A, Barbieri S, Mistl C, Danner S, Kauffmann S, Hofele K, Spooren WP, Ruegg MA, Lin S, Caroni P, Sommer B, Tolnay M und Bilbe G** (2000): Neuropathology in mice expressing human alpha-synuclein. *J Neurosci* 20, 6021-6029.
- Wakabayashi K, Engelender S, Yoshimoto M, Tsuji S, Ross CA und Takahashi H** (2000): Synphilin-1 is present in Lewy bodies in Parkinson's disease. *Ann Neurol* 47, 521-523.
- Wei Y, Zhang Y, Derewenda U, Liu X, Minor W, Nakamoto RK, Somlyo AV, Somlyo AP und Derewenda ZS** (1997): Crystal structure of RhoA-GDP and its functional implications. *Nat Struct Biol* 4, 699-703.
- Weinreb PH, Zhen W, Poon AW, Conway KA und Lansbury PT, Jr.** (1996): NACP, a protein implicated in Alzheimer's disease and learning, is natively unfolded. *Biochemistry* 35, 13709-13715.
- Wilkinson KD, Lee KM, Deshpande S, Duerksen-Hughes P, Boss JM und Pohl J** (1989): The neuron-specific protein PGP 9.5 is a ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase. *Science* 246, 670-673.
- Wilkinson KD, Deshpande S und Larsen CN** (1992): Comparisons of neuronal (PGP 9.5) and non-neuronal ubiquitin C-terminal hydrolases. *Biochem Soc Trans* 20, 631-637.
- Zhang J, Graham DG, Montine TJ und Ho YS** (2000a): Enhanced N-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine toxicity in mice deficient in CuZn-superoxide dismutase or glutathione peroxidase. *J Neuropathol Exp Neurol* 59, 53-61.
- Zhang Y, Dawson VL und Dawson TM** (2000b): Oxidative stress and genetics in the pathogenesis of Parkinson's disease. *Neurobiol Dis* 7, 240-250.

Danksagung

Herrn Prof. Dr. med. T. C. Südhof und Herrn Dr. med. M. Geppert danke ich für die Anregung und Betreuung der Arbeit.

Herrn Prof. Dr. med. T. C. Südhof, Herrn PD Dr. rer. nat. N. Brose und Herrn Prof. Dr. rer. nat. R. Jahn danke ich für ihre Unterstützung und viele anregende Diskussionen.

Herrn PD Brose, Herrn Prof. Dr. rer. nat. K.-A. Nave und Herrn Prof. Dr. rer. nat. T. A. Trautner danke ich für die finanzielle Unterstützung, die Aufrechterhaltung des Laborplatzes und den Zugang zu Abteilungsressourcen für die Durchführung dieser Arbeit.

Auch bedanke ich mich bei Herrn F. Benseler und Frau I. Thannhäuser für die DNA-Sequenzierungen und –synthesen, bei Herrn Dr. S. Takamori für die Unterstützung bei der Durchführung der Dopamintransportmessungen und bei meinen Kollegen für die interessanten Diskussionen und den Zugang zu Antikörperressourcen.

Mein besonderer Dank gilt Herrn Dr. F. Fornai für die fruchtbare Zusammenarbeit und die Einführung in tierexperimentelle Parkinson-Syndrome und Herrn Dr. med. vet. Riedesel und seinen Mitarbeitern, insbesondere Frau S. Schmidt und Frau U. Bornemann, für die Unterstützung bei der Herstellung und Zucht transgener Mäuse.

Lebenslauf

Am 24.07.1969 wurde ich in Göttingen geboren. Ich bin verheiratet und Vater einer Tochter.

Nach Besuch des Reismann-Gymnasium in Paderborn erhielt ich die Allgemeine Hochschulreife am 11.05.1989.

Das Biochemiestudium begann ich zum Wintersemester 1989/1990 an der Universität Bayreuth und schloß es nach Wechsel an die Universität Hannover am 31.10.1994 erfolgreich ab. Die Arbeiten für die naturwissenschaftliche Promotion führte ich unter Anleitung von Herrn Prof. Dr. med. T. C. Südhof am Max-Planck-Institut für Experimentelle Medizin in Göttingen durch und bekam die Doktorwürde am 06.12.2000 von der Universität Hannover verliehen.

Das Medizinstudium begann ich zum Wintersemester 1992/1993 an der Medizinischen Hochschule Hannover und schloß es nach Wechsel an die Universität Göttingen am 25.05.2000 erfolgreich ab.

Die medizinische Promotion begann ich am 01.01.1997 in der Abteilung Molekulare Neurobiologie am Max-Planck-Institut für Experimentelle Medizin.