Induktion und Spezifikation serotonerger Neurone des ventralen Rhombencephalon der Maus

Dissertation

zur Erlangung des mathematisch-naturwissenschaftlichen Doktorgrades

"Doctor rerum naturalium"

der Georg-August-Universität Göttingen

vorgelegt von

Nadja Osterberg

aus Kassel (Hessen)

Göttingen 2008

Referent: Herr Prof. G. Bucher

Korreferent: Herr Prof. R. Heinrich

Tag der mündlichen Prüfung: 12. Januar 2009

Die vorliegende Dissertation wurde in der Zeit von Oktober 2005 bis Oktober 2008 in der Arbeitsgruppe von Frau Prof. Dr. med. dent. E. Roussa, der Abteilung Neuroanatomie des Zentrums für Anatomie der Georg-August-Universität, Göttingen angefertigt und durch Frau Prof. E. Roussa betreut. Unterstützt wurde die Arbeit durch das DFG Forschungszentrum für Molekulare Physiologie des Gehirns (CMPB), Göttingen.

Referenzen

Veröffentlichungen

Characterization of primary neurospheres generated from mouse ventral rostral hindbrain.

Nadja Osterberg and Eleni Roussa
in press

Sim1 is a novel regulator in the differentiation of a mouse serotonergic neuron subpopulation.

Nadja Osterberg, Michael Wiehle, Oliver Oehlke, Stefanie Heidrich, Cheng Xu, Chen-Ming Fan, Kerstin Krieglstein, and Eleni Roussa
submitted

Posterpräsentationen

Induction and specification of serotonergic neurons of the ventral rhombencephalon.

N. Osterberg, B. Rahhal, K. Krieglstein, E. Roussa
23. Arbeitstagung der Anatomischen Gesellschaft in Würzburg, September 2006

Research Field B1: From Neurogenesis to Synaptogenesis

Induction and specification of hindbrain serotonergic networks.

N. Osterberg, A. Mansouri, A. Stoykova, K. Krieglstein, and E. Roussa
Center of Molecular Physiology of the Brain, CMPB-Retreat, September 2006

Induction and specification of serotonergic neurons of the ventral rhombencephalon.

N. Osterberg, B. Rahhal, K. Krieglstein, E. Roussa
7. Göttinger Tagung der Deutschen Neurowissenschaftlichen Gesellschaft e.V., März 2007

Characterization of primary neurospheres generated from mouse ventral rostral hindbrain.

N. Osterberg, E. Roussa
31. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Zellbiologie, März 2008

Danksagung

Ich möchte mich an dieser Stelle bei Frau Prof. Krieglstein für die Gelegenheit bedanken, in ihrer Abteilung meine Doktorarbeit anfertigen zu können.

Größter Dank gilt meiner „Doktormutter“ Frau Prof. Roussa. Beginnend mit der Wahl des Themas sowie durch viele Gespräche, durch Hilfestellung bei der Planung von Experimenten bis hin zum Schreiben dieser Arbeit, hat Frau Prof. Roussa unschätzbar zum Gelingen dieser Arbeit und darüber hinaus beigetragen – DANKE!

Meinen Betreuern, seitens der Biologischen Fakultät, Göttingen, Herrn Prof. Bucher und Herrn Prof. Heinrich, möchte ich herzlich für ihr Interesse an meiner Arbeit, ihre Anregungen und für die Zeit, die sie sich genommen haben, danken.

Ich danke Frau Prof. Flügge, Herrn Prof. Mansouri, Herrn Prof. Wimmer und Herrn Prof. Wodarz sehr für ihr Entgegenkommen und ihre Bereitschaft, als Mitglieder der Prüfungskommission zu fungieren.

Es gibt keine Worte, um auszudrücken, wieviel Dank ich Steffi schulde. Dank für ihre kostbare Hilfe, ihre Unterstützung in jeder Hinsicht, am meisten jedoch für ihre unschätzbare Freundschaft – Du fehlst hier!

Felicitas und Markus möchte ich besonderen Dank sagen, ohne sie wäre der Start in Freiburg sehr schwer geworden. Danke, dass ihr mich bei Euch aufgenommen habt und ich mich bei Euch zuhause fühlen durfte. Es gibt nichts, was damit vergleichbar wäre!

Bedanken möchte ich mich auch bei Ellen und Oli für ihre Unterstützung und gute Zusammenarbeit in Freiburg.

Meinen Eltern und meiner Schwester verdanke ich so unendlich viel, so dass ein Danke niemals ausreichen kann. Ihr habt mich immer unterstützt und an mich geglaubt – es gibt keine bessere Familie als Euch.

Inhaltsverzeichnis

Referenzen.....	iii
Danksagung	iv
Inhaltsverzeichnis	v
I. Abstract /Zusammenfassung	1
1.2. Zusammenfassung	3
II. Einleitung.....	5
2.1. Anatomie und Funktionen des serotonergen Systems	5
2.2. Die Entwicklung 5-HT-Neurone des ventralen Rhombencephalon der Maus — Zusammenspiel intrinsischer und extrinsischer Faktoren.....	8
2.2.1. Organisationszentren des ZNS der Vertebraten.....	8
2.2.2. Zeitliche und räumliche Entstehung 5-HT-Neurone.....	12
2.2.3. Intrinsische Faktoren bestimmen das Vorläuferstadium 5-HT-Neurone.....	13
2.2.4. Vom postmitotischen Neuron bis zum Erlangen des 5-HT-Phänotyps	14
2.3. Tgf- β („ <i>Transforming growth factor-β</i> “) — Ein extrinsisches Signalmolekül und seine Bedeutung für die Entwicklung ventraler Neuronenpopulationen	16
2.4. Der Transkriptionsfaktor „ <i>Single-minded</i> “ (sim) — Ein intrinsischer Faktor und seine Bedeutung für die Bildung der ventralen Mittellinie in <i>D. melanogaster</i>	19
III. Zielsetzung der Arbeit.....	20
IV. Materialien und Methoden.....	23
4.1.1. Organismen	23
Mikroorganismen	23
Eukaryontische Zelllinien	23
Mausstämme	23
4.1.2. Medien.....	24
Mikrobiologische Kulturmedien	24
Eukaryontische Zellkulturmedien	24
Antibiotika und Medienzusätze	25
Faktoren	25
4.1.3. Plasmidvektoren	25
Überexpressionsplasmide.....	25
<i>In situ</i> -RNA-Sondenplasmide	26
4.1.4. Oligonukleotide	26
Primer der Polymerase-Ketten-Reaktion.....	26
Primer der Quantitativen-„ <i>Real-Time</i> “-Polymerase-Ketten-Reaktion	27
Primer der Klonierung von <i>in situ</i> -RNA-Sonden	27
siRNA-Oligonukleotide.....	27
4.1.5. Enzyme, Inhibitoren und Beschichtungskomponenten	28
Enzyme.....	28
Inhibitoren.....	28
Beschichtungskomponenten und Aminosäurederivate	28
4.1.6. Antikörper	29

Primäre Antikörper	29
Sekundäre Antikörper	29
4.1.7. Molekulare Standards	30
4.1.8. Kommerzielle Reinigungs- und Nachweissysteme	30
4.1.9. Chemikalien und Biochemikalien	30
4.1.10. Lösungen und Puffer	33
4.1.11. Verbrauchsmaterialien	37
4.1.12. Geräte	37
4.2. Methoden	39
4.2.1. Mikrobiologische Methoden	39
4.2.1.1. Herstellung von Bakterienkulturplatten	39
4.2.1.2. Herstellung chemisch kompetenter <i>E. coli DH5α</i> -Zellen	39
4.2.1.3. Transformation chemisch kompetenter <i>E. coli DH5α</i> Zellen	40
4.2.2. Methoden der eukaryontischen Zellkultur	40
4.2.2.1. Kultivierung und Passage der Zelllinie <i>MN9D</i>	40
4.2.2.2. Kryokonservierung und Auftauen von eukaryontischen Zellen	41
4.2.2.3. Transiente Transfektion von <i>MN9D</i> -Zellen durch Lipofectamine	42
4.2.2.4. Liposomen vermittelte Einbringung von „ <i>short interfering</i> “-RNA in Zellen der eukaryontischen Zelllinie <i>MN9D</i>	43
4.2.3. Techniken der Primärkultur	44
4.2.3.1. Präparation des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12)	44
4.2.3.2. Silikonisierung von Pasteur-Pipetten	46
4.2.3.3. Aufarbeitung embryonalen Gewebes (E12) des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus zur Gewinnung einer Einzelzellsuspension	47
4.2.3.4. Generierung primärer Neurospheres des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12)	48
4.2.3.5. Dissoziation generierter primärer Neurospheres	49
4.2.3.6. Erzeugung sekundärer Neurospheres aus dissoziierten primären Neurospheres des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12)	50
4.2.3.7. Poly-Ornithine-/Laminin-Beschichtung von Deckgläsern	50
4.2.3.8. 5'-Bromodeoxyuridin-(BrdU)-Proliferationsassay	51
4.2.3.9. Behandlung von Primärkulturen und primären Neurospheres des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12) durch Faktorengabe	52
4.2.4. Immunzytochemische Charakterisierung von Primärzellen und primärer Neurospheres des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12)	53
4.2.5. Histologische Methoden	55
4.2.5.1. Fixierung von Mausembryonen unterschiedlicher Entwicklungsstadien für die Herstellung von Gewebeschnitten	55
4.2.5.2. Paraffineinbettung von PFA-fixierten Mausembryonen	55
4.2.5.3. Herstellung von Gewebeschnitten	56
4.2.5.4. Immunhistochemische Untersuchungen an Schnittpräparaten des zentralen Nervensystems der Maus (E14.5 und P0)	57
4.2.6. Molekularbiologische Methoden	59
4.2.6.1. Isolierung von Plasmid-DNA	59
4.2.6.2. Präparation von Plasmid-DNA in analytischen Mengen	59
4.2.6.3. Restriktionsverdau von Plasmid-DNA	60

4.2.6.4. Isolierung von Gesamt-RNA aus eukaryontischen Zellkulturen und embryonalem Gewebe der Maus des Embryonaltages (E) 11 und E12	61
4.2.6.5. Gelelektrophoretische Auftrennung von RNA-Proben	62
4.2.6.7. Photometrische Konzentrationsbestimmung von wässrigen Nukleinsäure-Lösungen.....	64
4.2.6.8. Analyse der Genexpression mittels Polymerase-Ketten-Reaktion (PCR)	64
4.2.6.9. Quantitative-“ <i>Real-Time</i> “-Polymerase-Ketten-Reaktion (qRT-PCR).....	65
4.2.6.10. DNA-Agarosegelelektrophorese.....	67
4.2.6.11. Aufreinigung von DNA-Fragmenten aus Agarosegelen	68
4.2.6.12. Genexpressionsstudie mittels cDNA-Mikroarray-Analyse.....	69
4.2.7. <i>In situ</i> -RNA-Hybridisierung.....	70
4.2.7.1. Klonierung von <i>in situ</i> -RNA-Sondenplasmiden — Ligation von DNA-Molekülen	70
4.2.7.2. Herstellung von <i>in situ</i> -RNA-Sonden durch <i>in vitro</i> -Transkription	70
4.2.7.3. Effizienzbestimmung von <i>in situ</i> -RNA-Sonden	71
4.2.7.4. <i>In situ</i> -RNA-Hybridisierung an embryonalen Gewebeschnitten der Maus (E12).....	72
4.2.8. Proteinbiochemische Methoden.....	75
4.2.8.1. Isolierung des Gesamtproteins aus Gewebe und Zellkulturproben.....	75
4.2.8.2. Photometrische Bestimmung der Proteinkonzentration nach Bradford	75
4.2.8.3. Größenabhängige Auftrennung von Proteinen durch diskontinuierliche SDS-Polyacrylamidgelelektrophorese (SDS-PAGE).....	76
4.2.8.4. Western-Blot-Analyse	77
4.2.9. Statistische Auswertung.....	78
V. Ergebnisse	79
5.1. Etablierung und Charakterisierung eines Kultursystems primärer Neurospheres aus dem ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12)	79
5.1.1. Morphologie primärer Neurospheres aus dem ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12)	79
5.1.2. Bildung sekundärer Neurospheres.....	80
5.1.3. Primäre Neurospheres aus dem ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12) besitzen Proliferationspotential	81
5.1.4. Zelluläre Zusammensetzung primärer Neurospheres aus dem ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E 12)	83
5.1.5. Zellen primärer Neurospheres aus dem ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12) besitzen die Fähigkeit zur Differenzierung in unterschiedliche zelluläre Abstammungslinien	87
5.2. Einfluss des extrinsischen Signalmoleküls Tgf- β auf die Induktion und Spezifikation rostraler serotonerger Neurone des ventralen Rhombencephalon der Maus (E12).....	89
5.2.1. <i>In vitro</i> -Beeinflussung der Genexpression von primären Neurospheres des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus E12 durch Behandlung mit Faktoren	89
5.2.2. Beeinflussung der Genexpression <i>in vitro</i> von Primärzellen des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12) durch externe Faktoren	93
5.3. Analyse der Bedeutung des Transkriptionsfaktors Sim1 für die Entwicklung von 5-HT-Neuronen des ventralen Rhombencephalon der Maus	96
5.3.1. Nachweis der Expression von Sim1 im ventralen Rhombencephalon an verschiedenen Embryonalstadien der Maus	96

5.3.2. <i>Sim1</i> -defiziente Mausmutanten (P0) weisen eine signifikante Reduktion der 5-HT-Neuronenpopulation des Nucleus raphe dorsalis auf	99
5.3.3. “ <i>Gain-of-function</i> ” Experimente	100
5.3.4. „ <i>Loss-of-function</i> “-Experimente	108
5.4. Identifizierung von Kandidatengenien der Entwicklung von 5-HT-Neuronen durch Vergleich des Genexpressionsmusters von ventralem rostralem Rhombencephalon und ventralem Mesencephalon der Maus (E11)	113
5.4.1. Überprüfung der präparierten Gehirnregionen des ventralen Mesencephalon und ventralen Rhombencephalon der Maus, E11	113
5.4.2. Validierung der durch cDNA-Mikroarray ermittelten Genexpressionsdaten	115
5.4.3. Auswahl von Kandidatengenien auf Grundlage der mittels cDNA-Mikroarray ermittelten Genexpressionsdaten	116
Der Transkriptionsfaktor <i>Brn3.2</i> – Ein Zielgen von <i>Sim1</i>	117
Das Regulatorprotein <i>Rgs4</i> – Ein Zielgen von <i>Sim1</i>	118
Der Transkriptionsfaktor <i>Lhx8</i> – Ein Zielgen von TGF- β und <i>Sim1</i>	118
5.4.4. <i>Sim1</i> -Überexpression in <i>MN9D</i> -Zellen führt zu einer signifikanten Steigerung der Expression der Kandidatengene <i>Brn3.2</i> und <i>Rgs4</i>	120
VI. Diskussion	123
VII. Anhang	147
7.1. Abbildungsverzeichnis	147
7.2. Tabellenverzeichnis	151
7.3. Literaturverzeichnis	152
7.4. Plasmide und Sequenzen	167
7.5. Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen	170
7.6. Curriculum vitae	176

Anmerkung zur Schreibweise:

In dieser Arbeit verwendete Bezeichnungen von Genen sind in kursiver Schrift angegeben, Proteine in normaler Schrift. Generell ist hierbei der erste Buchstabe gross geschrieben, ausgenommen hiervon sind Bezeichnungen für Gene und Proteine aus *D. melanogaster*.

I. Abstract /Zusammenfassung

1.1. Abstract

The serotonergic (5-HT) system is involved in the modulation of mood and behaviour. Extrinsic factors, such as fibroblast growth factor 4 (Fgf4), Fgf8, and sonic hedgehog (Shh), dictate the development of hindbrain 5-HT neurons. In addition, the developmental network is regulated by transcription factors, such as Nkx2.2, Lmx1b, Gata2, and Pet1. However, the regulatory network of extrinsic and intrinsic factors directing the development of 5-HT neurons is not fully elucidated. In order to complete the network, a primary neurospheres culture system from mouse ventral rostral hindbrain embryonic day (E) 12 has been established. This model system exhibits the main characteristics of progenitor cells: a) the ability to proliferate and b) the capacity of multilineage differentiation. Hereby it allows the enrichment of progenitor cells, and also triggers these cells towards a specific cell fate. Tgf- β treatment of primary neurospheres from mouse ventral rostral hindbrain (E12) does not influence the expression of *Gata2*. However, the functional blocking of Tgf- β signalling results in a significant down regulation of *Gata2*, indicating that the maintenance of *Gata2* expression is Tgf- β dependent. Treatment of primary neurospheres with Tgf- β has no effect on *Pet1* expression, whereas the inhibition of Tgf- β signaling led to a significant down regulation of *Pet1* expression. These results suggest a role of Tgf- β in regulating the differentiation of progenitors towards the terminal 5-HT phenotyp via the maintenance of *Gata2* and *Pet1* expression.

Additionally, the function of the transcription factor Sim1 (*Single-minded homolog 1*), the murine homologue of sim, a master regulator of CNS midline formation in *D. melanogaster*, in the development of 5-HT neurons has been analysed. Immunohistological analysis of newborn *Sim1* $-/-$ mice compared with *wt* littermates revealed a significantly reduced number of 5-HT neurons within a 5-HT neuron subpopulation, the dorsal raphe nucleus, at about 30%. The underlying molecular mechanisms were investigated by gain- and loss-of-function experiments using the *MN9D* cell line. Gene expression changes were analysed after *Sim1* overexpression by quantitative Real-Time-PCR. *Sim1* overexpression did not result in an upregulation of *Gata2*. In contrast, a significant upregulation of the expression of *Pet1* after *Sim1* overexpression has been observed and confirmed after down-regulating *Sim1* by transfection using *Sim1* specific siRNA. Moreover, an upregulation of *Tph2* expression was observed after *Sim1* overexpression. These data suggest a relevance of *Sim1* for the differentiation of 5-HT neurons, and allow to position *Sim1* upstream *Pet1* and *Tph2* within the regulatory network directing the formation of 5-HT neurons. In order to identify new members of the regulatory network directing the development of 5-HT neurons, a cDNA

microarray has been performed, comparing the gene expression pattern of mouse ventral midbrain with that of ventral rostral hindbrain, E11. Three genes highly upregulated in ventral hindbrain, were further investigated by Sim1 overexpression in *MN9D* cells: *Rgs4*, a regulator of G-protein coupled receptors, such as 5-HT receptors, and the transcription factors *Brn3.2* and *Lhx8*. Sim1 overexpression led to a significant upregulation of *Rgs4* and *Brn3.2*. In summary, the results indicate a role of Sim1 during the late development of 5-HT neurons, at least in a subpopulation of 5-HT neurons, either directly, on Tph2 and Pet1 by regulating their expression, or indirectly via induction of Brn3.2. Furthermore the results suggest an indirect regulation of serotonin release by Sim1 via Rgs4, and thereby directing the development of 5-HT neurons themselves and their target areas.

keywords: primary neurospheres, raphe, rhombencephalon, serotonergic neurons

1.2. Zusammenfassung

Das serotonerge (5-HT) System ist maßgeblich an der Modulation des Verhaltens und der Gemütslage beteiligt. In ihrer Entwicklung sind 5-HT-Neurone des Rhombencephalon von extrinsischen Faktoren wie Fgf4 („*Fibroblast growth factor 4*“), Fgf8 und Shh („*Sonic hedgehog*“) sowie u. a. von den Transkriptionsfaktoren Nkx2.2, Lmx1b, Gata2 und Pet1 abhängig. Bis heute ist, über die genannten extrinsischen und intrinsischen Faktoren hinausgehend, die Steuerung der Entwicklung von 5-HT-Vorläuferzellen hin zum terminalen 5-HT-Phänotyp nicht vollständig aufgeklärt. Ziel der vorliegenden Arbeit war es daher, das regulatorische Netzwerk der 5-HT-Neuronenentwicklung zu ergänzen. Hierzu wurde zunächst das Kultursystem primärer Neurospheres des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus des Embryonaltages (E) 12 etabliert und charakterisiert. Es konnte gezeigt werden, dass diese primären Neurospheres grundlegende Eigenschaften von Vorläuferzellen aufweisen: a) die Fähigkeit zur Proliferation und b) die Möglichkeit, sich in unterschiedliche neurale Zelltypen zu differenzieren. Somit ermöglicht dieses Modellsystem die Anzahl von Vorläuferzellen zu erhöhen und die Zellen in Richtung eines bestimmten zellulären Schicksals zu steuern. Dieses Kultursystem wurde verwendet, um zunächst den Einfluss des extrinsischen Signalmolekül Tgf- β („*Transforming growth factor- β* “) auf die Entwicklung von 5-HT-Neuronen untersucht. Behandlung primärer Neurospheres mit Tgf- β führte zu keiner Steigerung der *Gata2*-Expression. Neutralisation endogen synthetisierten Tgf- β resultierte hingegen in einer signifikanten Herabregulation von *Gata2*. Tgf- β -Behandlung primären Neurospheres des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12) bedingte keine Erhöhung der *Pet1*-Expression. Eine funktionelle Blockierung der Tgf- β -abhängigen Signaltransduktionskaskade führte jedoch zu einer signifikanten Reduktion der *Pet1*-Transkription. Hieraus kann gefolgert werden, dass Tgf- β auf die Differenzierung von neuronalen Vorläuferzellen zu 5-HT-Neuronen über die Aufrechterhaltung der *Gata2*- und *Pet1*-Expression Einfluss nimmt.

Neben Tgf- β wurde die Bedeutung des Transkriptionsfaktors Sim1 („*Single-minded homolog 1*“) für die Entwicklung von 5-HT-Neuronen analysiert. Die Deletion des *Sim1*-Gens äußert sich in neugeborenen *Sim1*-defizienten Mäusen in einer Reduktion der Anzahl 5-HT-Neuronen einer Subpopulation, dem Nucleus dorsalis raphe, um 30%. Die diesem Befund zugrunde liegenden molekularen Regulationsmechanismen wurden durch *Sim1*-Überexpressions- und *Sim1*-spezifische siRNA-Experimente in *MN9D*-Zellen untersucht. Durch Analyse der Änderungen des Genexpressionmusters nach *Sim1*-Überexpression konnte gezeigt werden, dass *Sim1* die Expression von *Gata2* nicht induziert. Die Expression der Gene *Pet1* und *Tph2* wurde im Gegensatz hierzu durch eine *Sim1*-Überexpression in *MN9D*-Zellen signifikant gesteigert. Dies zeigt, dass *Sim1* zwar keine Bedeutung für die

Induktion wohl aber für die Differenzierung von 5-HT-Neuronen über eine Regulation von *Pet1* sowie *Tph2* besitzt. Somit konnte Sim1 eine bisher unbekannte Funktion innerhalb des transkriptionellen Netzwerkes der 5-HT-Neuronenentwicklung zugewiesen werden.

Um bisher unbekannte Elemente des regulatorischen Netzwerkes der Entwicklung 5-HT-Neuronen zu identifizieren, wurde ein cDNA-Mikroarray durchgeführt und das Genexpressionsmuster des ventralen rostralen Rhombencephalon mit dem des ventralen Mesencephalon (E11) der Maus verglichen. Drei der im ventralen Rhombencephalon im Vergleich zum ventralen Mesencephalon am stärker exprimierten Gene wurden durch Sim1-Überexpressionsversuche auf eine denkbare Sim1-abhängige Expressionsregulation in *MN9D*-Zellen untersucht: *Rgs4*, ein Regulator G-Protein-gekoppelter Rezeptoren, wie 5-HT-Rezeptoren, sowie die Transkriptionsfaktoren *Brn3.2* und *Lhx8*. Eine Überexpression von Sim1 führte zu einer signifikanten Steigerung der Expression von *Rgs4* und *Brn3.2*.

Zusammenfassend weisen die Ergebnisse daraufhin, dass Sim1 die späte Entwicklungsphase von 5-HT-Neuronen durch Regulation der Expression von *Pet1* und *Tph2* zumindest in einer Subpopulation steuert. Es ist denkbar, dass dies indirekt über eine Sim1-abhängige Regulation der Expression von *Brn2.3* erfolgt. Des Weiteren ist eine funktionelle Regulation der Serotonin-Freisetzung durch Sim1, vermittelt über *Rgs4*, denkbar, wodurch die Entwicklung von 5-HT-Neuronen selbst und von ihnen innervierten Gehirnregionen beeinflusst wird.

Schlagwörter: primäre Neurospheres, Raphe, Rhombencephalon, serotonerge Neurone

II. Einleitung

2. Das serotonerge System des zentralen Nervensystems der Säugetiere

2.1. Anatomie und Funktionen des serotonergen Systems

Das serotonerge (5-HT-) System des zentralen Nervensystems (ZNS) ist von großer Bedeutung für die Modulation und Koordination von Verhaltensweisen sowie verschiedener Bewusstseinslagen. Hierzu zählen u. a. die Regulation des Schlaf-Wach-Rhythmus, die Regulation der Körpertemperatur, die Beeinflussung emotionaler Vorgänge und die Schmerzperzeption. Des Weiteren ist das 5-HT-System an der Steuerung von Entwicklungsprozessen des ZNS beteiligt, einerseits durch autoregulatorische Prozesse (Diefenbach et al., 1995, Lauder et al., 2000), andererseits durch die Beeinflussung innervierter Gehirnnareale (Daval et al., 1987; Gaspar et al., 2003; Lauder et al., 1982). Obwohl die Zahl der Serotonin-(5-Hydroxytryptamin, 5-HT)-synthetisierenden Neurone im Vergleich zu anderen Neuronenpopulationen innerhalb des ZNS relativ gering ist, verfügt das 5-HT-System somit über ein überaus breites Funktionsspektrum. Zusammen mit den catecholaminergen (adrenerge, noradrenerge und dopaminerge) Neuronen bilden 5-HT-Neurone die Familie der monoaminergen Neurone. 5-HT-Neurone befinden sich in der *Formatio reticularis* (FR) des Hirnstamms des adulten Gehirns der Säugetiere. Die FR erstreckt sich von der *Medulla oblongata* über den Pons bis zum kaudalen Mesencephalon. Innerhalb der FR treten 5-HT-Neurone als diffuse Neuronenansammlungen entlang der rostro-kaudalen Achse innerhalb und lateral der Mittellinie auf. Dort bilden sie ein weitverzweigtes, axonales Netzwerk. Eine erste Einteilung der in der FR gelegenen 5-HT-Neuronenansammlungen zu Kerngebieten (B1–B9) und Beschreibung ihrer Projektionen nahmen Dahlström und Fuxe 1964 vor. Die Gruppen B1–B4 sind innerhalb der *Medulla oblongata* lokalisiert. Sie umfassen die kaudalen Kerngebiete, wobei die Gruppe B1 die am weitesten kaudal gelegene Neuronenansammlung bezeichnet. Den kaudalen Kerngebieten steht die Gruppe rostraler Kerngebiete gegenüber, welche die Gebiete B5–B9 beinhaltet. Diese erstrecken sich von dem Pons bis hin zum kaudalen Mesencephalon. Der Großteil der 5-HT-Neurone befindet sich in den *Nuclei raphes* (Raphe-Kerne), deren Einteilung weitestgehend der zeitlich vorangegangenen B-Gruppenklassifikation entspricht (Jacobs und Azmitia, 1992; Törk, 1990). Eine Zuordnung der B-Gruppen zu den sich aus ihnen zusammensetzenden *Nuclei raphes* ist in Tab. 1 (Seite 6) wiedergegeben.

Tab.1: B-Gruppenklassifikation und Lokalisation der Nuclei raphe des Rhombencephalon der Säugetiere

	B-Gruppe	Nucleus raphe	Lokalisation
kaudal	B1	Nucleus raphe pallidus	Medulla oblongata
	B2/B4	Nucleus raphe obscurus	Medulla oblongata
	B3	Nucleus raphe magnus Nucleus paragigantocellularis reticularis	Pons (kaudal) Medulla oblongata (rostral)
rostral	B5/B8	Nucleus raphe medialis	B8-Kernhauptanteil: Pons (kaudal) B5 : Pons (kaudal von B8)
	B6/7	Nucleus raphe dorsalis	B7-Hauptkern: Mesencephalon B6: Pons
	B8	Nucleus raphe medialis	Pons
	B8/B9	Nucleus raphe pontis	Pons

Die in der Medulla oblongata gelegenen Nuclei raphe (B1-B4) projizieren in die Medulla spinalis und in das Cerebellum. Die Kerne B5-B9, lokalisiert innerhalb des Pons und des Mesencephalon, innervieren, wie die Abb. 1 (Seite 7) zeigt, durch ihre aufsteigenden Projektionen nahezu alle Gehirnbereiche. Hierzu zählen Hippocampus, Amygdala, Hypothalamus, Thalamus und die Basalganglien bis hin zum Neocortex (Azmitia und Segal, 1978; Fuxe, 1965; Skagerberg und Björklund, 1985; Waterhouse et al., 1986). Die rostralen und kaudalen Nuclei raphe unterscheiden sich jedoch nicht nur bezüglich ihrer Lokalisation, ihrer Projektionen und damit verbunden in ihren Funktionen voneinander, sondern auch in ihrer zeitlichen Entwicklung. So beginnt die Entstehung der rostralen Nuclei raphe der Maus um den Embryonaltag (E) 10.5, die der kaudalen Nuclei raphe hingegen einen Tag später (Ding et al., 2003). Selbst innerhalb einzelner Nuclei raphe sind Unterschiede der Neuronengruppen und Abstufungen hinsichtlich ihrer pharmakologischen Sensitivität erkennbar (Beck et al., 2004). Darüber hinaus lassen sich gruppen-charakteristische Besonderheiten in den jeweiligen während der Entwicklung erforderlichen Bedingungen feststellen (Brodski et al., 2003; Craven et al., 2004; Pattyn et al., 2003). Somit handelt es sich bei dem 5-HT-System des ZNS, um ein sehr heterogenes System, dessen Entwicklung bisher noch nicht umfassend aufgeklärt werden konnte.

Abb.1: Kaudale und rostrale B-Gruppen serotonerger (5-HT) Neurone des zentralen Nervensystems (ZNS) der Säugetiere und ihre Projektionen am Beispiel der Ratte, aus: The Biology of Serotonergic Transmission, Consolazione, A. und Cuello, A., New York: John Willey & Sons, 1982, 29–61.

Dysfunktionen des 5-HT-Systems, und damit einhergehend z. B. die Deregulation der Serotonin-Ausschüttung und seine Wiederaufnahme im ZNS, werden mit einer Vielzahl von Erkrankungen in Verbindung gebracht. Hierzu zählen unter anderem Migräne, depressive Erkrankungen, Angst- und Panikzustände bis hin zu Zwangsneurosen, Borderline-Persönlichkeitsstörungen, Schizophrenie und Autismus (Dean und Hayes, 1996; Goodman und New, 2000; Murphy et al., 1989; Nelson und Chiavegatto, 2001; Jones und Blackburn, 2002). Einige psychiatrische Erkrankungen, wie z. B. Formen der Depression, konnten partiell auf genetische Funktionsstörungen des 5-HT-Systems zurückgeführt werden (Carpenter et al., 1993). Eine mögliche Ursache für unterschiedlich ausgeprägte Schweregrade mancher psychiatrischer Erkrankungen, z. B. des Autismus, könnte eine hohe Genvariabilität aber auch eine starke Sensitivität der 5-HT-Neurone gegenüber Veränderungen der direkten Zellumgebung (z. B. nach Alkoholmissbrauch) während der neuronalen Entwicklung sein. Zudem verfügt das 5-HT-System über eine außerordentliche Vielfalt an 5-HT-Rezeptoren (5-HTR). Eine gestörte oder gar fehlende Expression der Rezeptoren hat erheblichen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des 5-HT-Systems. Bisher wurden drei Klassen von 5-HT-Rezeptoren beschrieben, die wiederum jeweils mehrere Familien und Subtypen umfassen. Bis auf 5-HTR3, ein Liganden-gesteuerter Ionenkanal, gehören alle 5-HT-Rezeptoren zur Superfamilie der G-Protein gebundenen Rezeptoren („*G-protein coupled receptors*“, GCRs; Martin et al., 1998; Pauwels, 2000), deren Signaltransduktion über $G_{i/o}$ - und G_q -Proteine vermittelt wird. Diese beinhaltet z. B. die Inhibition und Aktivierung der Adenylatzyklase und Proteinkinase A (AC/PKA), die Steuerung der intrazellulären Ca^{2+} -Konzentration, die Aktivierung der NF κ B- („*Nuclear factor- κ B*“)-, der

PI3K-(„*Phosphoinosid 3-kinases*“)- oder der ERK1/2-(„*Extracellular signal-regulated kinases*“)-Signaltransduktionskaskade (Baumgarten und Grozdanovic, 1995; Cox und Cohen, 1996, Hoyer et al., 2002). Im Hinblick auf neue therapeutische Ansätze ist die Erforschung der Entwicklung, der Erhaltung und Funktionsregulation zentraler 5-HT-Neurone von größtem Interesse.

2.2. Die Entwicklung 5-HT-Neurone des ventralen Rhombencephalon der Maus — Zusammenspiel intrinsischer und extrinsischer Faktoren

2.2.1. Organisationszentren des ZNS der Vertebraten

Die Entwicklung 5-HT-Neurone erfolgt in der Maus zwischen dem E10.5 und E12.5. Damit gehören 5-HT-Neurone zu den ersten sich entwickelnden Neuronen des ZNS. Maßgeblich ist ihre Entwicklung von zwei lokalen Organisationszentren abhängig, dem Isthmus-Organizer (IstO) sowie der Grundplatte (siehe Abb. 2, Seite 9). Organisationszentren weisen sich durch die Fähigkeit aus, nach Transplantation in Gewebe anderer regionaler Abstammung ihnen normalerweise benachbarte Gewebestrukturen ektopisch zu induzieren. So ist der IstO nach Transplantation in das kaudale Diencephalon in der Lage, in diesem Gehirnbereich cerebrale und mesencephale Strukturen zu induzieren. IstO und Grundplatte dirigieren die anterior-posterior (A-P) und dorso-ventral (D-V) Achsenbildung innerhalb des sich entwickelnden Gehirns. Die D-V-Achse wird durch die Grundplatte, der Mittellinie des Neuralrohres, bestimmt. Das induzierende Signalmolekül ist Shh („*Sonic hedgehog*“), das Maushomologon zu Hedgehog (hh) aus *D. melanogaster* (Nüsslein-Volhard und Wieschaus, 1980). Als sogenanntes Segmentpolaritätsgen trägt hh zur Etablierung der A-P-Grenzen der Parasegmente in *D. melanogaster* bei (Mohler und Vani, 1992). Shh wird zunächst von der Chorda dorsalis, einer embryonalen Struktur mesodermalen Ursprungs, sezerniert. Bereits nach kurzer Zeit beginnen Zellen der Grundplatte indessen selbst Shh zu synthetisieren (Martí et al., 1995; Roelink et al., 1994). Durch Diffusion entsteht ein von ventral nach dorsal gerichteter Hh- bzw. Shh-Konzentrationsgradient. Eine Abhängigkeit der Induktion und Spezifikation 5-HT-Neurone von Shh konnte durch Explantatversuche nachgewiesen werden (Hynes und Rosenthal, 1999; Goridis und Rohrer, 2002). So können 5-HT-Neurone durch externe Applikation von Shh in Explantaten des dorsalen Rhombencephalon des Huhns und der Maus ektopisch induziert werden (Yamada et al., 1991). Diese durch Shh vermittelte Induktion ist nicht in Explantaten aus anderen entlang der A-P-Achse gelegenen Gehirnregionen möglich. Dies lässt auf eine komplizierte, regionale Spezifizierung der 5-HT-Vorläuferzellen schließen, auf die im nächsten Abschnitt näher eingegangen werden soll. Die

Dorsalisierung des Neuralrohres wird durch Zytokinsignale der Bmp-(„*Bone morphogenetic protein*“)-Familie vermittelt. Dabei spielen insbesondere Bmp-4, Bmp-5 und Bmp-7, sezerniert vom Ektoderm, eine wichtige Rolle bei der dorsalen Limitierung der ventralisierenden Aktivität von Shh (Barth et al., 1999; Bauer et al., 2001; Timmer et al., 2002).

Abb.2: Schematische Darstellung der Lokalisation kaudaler und rostraler serotonerger (5-HT-) Neurone des ventralen Rhombencephalon unter Berücksichtigung der beiden essentiellen Organisationszentren, Isthmus-Organizer (IstO) und Grundplatte, im zentralen Nervensystem (ZNS) der Maus des Embryonalaltages (E) 12. (Shh: „*Sonic hedgehog*“, FGF8: „*Fibroblast growth factor 8*“, BMP5: „*Bone morphogenetic protein 5*“, Rhombomer: r; aus: Goridis C. & Rohrer H., Specification of Catecholaminergic and Serotonergic Neurons, Nature Reviews Neuroscience 3, 2002, 531-541.)

Der IstO lässt sich als eine neuroepitheliale Einschnürung zwischen Mesencephalon und Rhombencephalon erkennen — dem Isthmus. Tatsächlich liegt der IstO der Maus leicht kaudal des Isthmus. Die Bildung des IstO ist Teil der A-P-Achsenbildung des Neuralrohres, an der während der Gastrulation Fgf-(„*Fibroblast growth factor*“)-Signalmoleküle und Wnt-(„*Wingless-related MMTV integration site*“)-Signale beteiligt sind (Rhinn et al., 2005; Olander et al., 2006). Der IstO selbst wird im Wesentlichen durch zwei Gene spezifiziert, *Otx2* und *Gbx2* (siehe Abb. 3, Seite 10). *Otx2* („*Orthodenticle homeobox homolog 2*“) wird im Mesencephalon exprimiert (Acampora et al., 1995; Matsuo et al., 1995), während *Gbx2* („*Gastrulation brain homeobox 2*“) ausschließlich im Rhombencephalon exprimiert wird (Millet et al., 1999; Waters und Levandowski, 2006). Die Deletion des Gens bewirkt im Falle von *Otx2* die ausbleibende Bildung des Mesencephalon, im Falle von *Gbx2* den Verlust

rostraler rhombencephaler Strukturen sowie den Verlust dorsaler Anteile des Rhombencephalon. Durch gegenseitige Hemmung der Genexpression von *Otx2* und *Gbx2* entsteht eine exakt definierte Grenze zwischen Mesencephalon und Rhombencephalon (Glavic et al., 2002).

Eine Vielzahl sich in ihrer Expression überlappenden oder gegenseitig reprimierender Gene, *En1* und *En2* („*Engrailed 1/2*“), *Wnt1*, „*Paired box gene 2*“ (*Pax2*) und *Pax5*, sind an der Etablierung und Aufrechterhaltung des IstO beteiligt und nimmt Einfluss auf sich entwickelnde, benachbarte Regionen (Echevarría et al., 2003; Joyner, 1996; Prakash und Wurst, 2004; Wassef und Joyner, 1997). Wichtigstes Signalmolekül der 5-HT-Neurogenese, welches durch den IstO sezerniert wird, ist *Fgf8*. Dieses wird an der Grenze zwischen den beiden *Otx2*- bzw. *Gbx2*-exprimierenden Regionen induziert. Die Expression von *Fgf8* überlappt zunächst mit dem Expressionsmuster von *Gbx2*. Hierbei ist die *Fgf8*-Expression anfänglich im gesamten anterioren Rhombencephalon zu beobachten, wird jedoch kontinuierlich stärker auf den IstO begrenzt. Damit etabliert sich im Rhombencephalon ein von kaudal zu rostral ansteigender Gradient des Signalmoleküls *Fgf8*.

Abb. 3: Schematische Darstellung der Ausbildung des Isthmus-Organizer (IstO) der Maus des Embryonalaltages (E) 8-9.5. Gegenseitige Hemmung der Expression der intrinsischen Faktoren *Otx2*, exprimiert im Mesencephalon (Mes), und *Gbx2*, exprimiert im frühen rostralen Rhombencephalon (Metencephalon, Met), führt zur Ausbildung einer Expressionsgrenze zwischen Mes und Met. Im Zuge der weiteren räumlichen Definierung des IstO wird die Expression extrinsischer Faktoren, u. a. *Fgf* und *Wnt1*, zunehmend auf bestimmte Regionen beschränkt. Modifiziert nach: Joyner A., Liu A. und Millet S., *Otx2*, *Gbx2* and *Fgf8* Interact to Position and Maintain a Mid-Hindbrain Organizer, *Current Opinion in Cell Biology*, Volume 12, Issue 6, 2000, 736-741.)

5-HT-Neurone entstehen kaudal des IstO im Rhombencephalon aus neuroepithelialen Vorläuferzellen der ventrikulären Zone (VZ, Neuroepithelium). Es konnte gezeigt werden, dass Fgf8 für die Induktion der ventralen rostralen 5-HT-Neurone des Rhombencephalon essentiell ist. Dies gilt insbesondere für den Nucleus raphe dorsalis (NRD), ein Abkömmling des ventralen Rhombomers 1 (R1), welches unmittelbar kaudal des IstO lokalisiert ist. Wird die Otx2-Expression nach kaudal ausgedehnt, und damit der IstO nach kaudal verschoben, so bedingt dies eine Verkleinerung des Expressionsgebietes von Fgf8. Hierdurch kommt es zu einer Reduzierung der Anzahl 5-HT-Neurone des NRD. Komplementär hierzu wird die Anzahl der dopaminergen (DA-) Neurone des Mesencephalon erhöht. Wird hingegen durch Verschiebung der Grenze der Gbx2-Expression die Expression von Fgf8 nach rostral ausgedehnt, so hat dies eine Erhöhung der Anzahl 5-HT-Neurone des NRD zur Folge (Brodski et al., 2003). Während der Entwicklung der kaudalen 5-HT-Gruppe scheint, im Gegensatz zur rostralen Gruppe, Retinolsäure (RA, „*Retinoid acid*“), sezerniert vom paraxialem Mesoderm, wichtige Information bezüglich der räumlichen Lokalisation der Vorläuferzellen zu vermitteln. RA bildet hierbei einen dem Signalmolekül Fgf8 entgegengesetzten Gradienten aus (Durstun et al., 1989; Hernandez et al., 2007).

Im Unterschied zu 5-HT-Neuronen entstehen DA-Neurone des ventralen Mesencephalon aus rostral des IstO gelegenen Vorläuferzellen der VZ. Beide, DA- und 5-HT-Neuronentypen stehen in enger ontogenetischer Verwandtschaft zueinander. Sowohl rostrale 5-HT- als auch mesencephale DA-Neurone sind während der Induktion auf Fgf8- und Shh-Signale der beiden Organisationszentren IstO und Grundplatte angewiesen. Diese Beobachtung wirft zugleich die Frage auf, durch welches Signal die Entwicklung von Vorläuferzellen zu 5-HT-Neurone im Unterschied zur Entwicklung hin zu DA-Neuronen entschieden wird. Die Behandlung von Explantaten des ventralen Mesencephalon der Maus durch externe Gabe von Fgf4 führt zur ektopischen Induktion 5-HT-Neurone und einer gleichzeitigen Abnahme der Anzahl DA-Neurone (Hynes und Rosenthal, 1999; Ye et al., 1998). Somit sind Shh und Fgf8 zwar notwendig, jedoch nicht ausreichend, um 5-HT-Neurone zu induzieren. 5-HT-Vorläuferzellen bedürfen zudem Fgf4, welches im Primitivstreifen synthetisiert wird. Damit ist die Abhängigkeit von Fgf4 ein wesentlicher Unterschied zwischen 5-HT- und DA-Vorläuferzellen in ihrer Entwicklung. Aufgrund der frühen Einflussnahme von Fgf4 wird angenommen, dass Fgf4 als ein Signal der vorausgehenden, zellulären Prägung fungiert. Trotz fortschreitender Forschung konnte die Bedeutung extrinsischer Signalmoleküle für die Entwicklung der Gesamtheit 5-HT-Neurone oder einzelner Subpopulationen bisher jedoch nicht eindeutig geklärt werden.

2.2.2. Zeitliche und räumliche Entstehung 5-HT-Neurone

Bevor erste 5-HT-Zellgruppen erkennbar sind, erfährt das Rhombencephalon um E8.5 eine der Segmentierung in *D. melanogaster* ähnliche, vorübergehende Gliederung in sieben gleichförmige Abschnitte, die sogenannten Rhombomere (R1-7; Lumsden und Krumlauf, 1996). Die Individualität der Rhombomere wird durch die Expression von *Hox*- („*Homeobox*“)-Genen in für die einzelnen Rhombomere spezifischer Zusammenstellung bestimmt, die durch den zuvor erwähnten RA-Gradienten induziert wird (Gavalas et al., 1997; Guthrie und Lumsden, 1991; Papalopulu et al., 1991). Die Ausbildung der Grenzen der Rhombomere, bedingt durch gegenseitige, durch Zellkontakt vermittelte Repulsion von Grenzzellen, wird durch spezifische Ephrine und ihre Rezeptoren vermittelt. Direkt kaudal des Isthmus liegt das R1. Die rostralen Nuclei raphes entstehen aus den R1-3, wobei aus R1 ausschließlich 5-HT-Neurone des Nucleus raphe dorsalis (NRD) hervorgehen. Aus ventralen Vorläuferzellen der R5-7 gehen die 5-HT-Neurone der kaudalen Nuclei raphes hervor.

Beide 5-HT-Gruppen werden anatomisch durch das R4 voneinander getrennt, in dem sich keine 5-HT-Neurone entwickeln (Pattyn et al., 2003). Der Entwicklung 5-HT-Neurone geht die Bildung kranialer branchialer Motoneurone (MNs) und visceraler Motoneurone (MNv) voraus (Pattyn et al., 2003). Wie die Entstehung der 5-HT-Neurone ist auch die Entwicklung von Motoneuronen räumlich und zeitlich exakt festgelegt. Zeitgleich mit der Bildung der MNs in R2-4 und MNv in R5-7 beginnt um E9.5 die Generierung von 5-HT-Neuronen in R1. Wie bereits angedeutet, ist R1 von der Bildung der Motorneuronen ausgenommen. Es folgt um E10.5 die zusätzliche Bildung von 5-HT-Vorläuferzellen in den R1-3. Ungefähr einen Tag später, E11.5, setzt die Entwicklung der kaudalen 5-HT-Neurone ein, während im R4 weiterhin MNv gebildet werden. Das Ausbleiben der Induktion 5-HT-Neurone und die ausschließliche Generierung von Motoneuronen in R4 beruht auf einer gleichbleibenden Expression von *Phox2b* („*Paired-like homeobox-domain protein 2 beta*“). Diese wird durch die Homeobox-Transkriptionsfaktoren *Hox1b*, *Nkx6.1* („*NK6 transcription factor related, locus 1*“) und *Nkx6.2* bedingt. Während in R1 keine *Phox2b*-Expression detektierbar ist, wird *Phox2b* bis zum E10.5 in R2-3 und R5-7 exprimiert. Zu späteren Zeitpunkten wird es in diesen Bereichen durch *Nkx2.2* („*NK2 transcription factor related, locus 2*“) in seiner Expression reprimiert. Diese Hemmung gibt den Weg zur Induktion 5-HT-Neurone frei. *Phox2b* gilt daher als zentraler Repressor der Entwicklung 5-HT-Neurone (Pattyn et al., 2000). In *Phox2b*-defizienten Mäusen sind Vorläufer visceraler Motoneurone nicht nachweisbar. Hingegen werden 5-HT-Neurone, obgleich nicht vollständig ausgereift, in diesen Mausmutanten in allen Rhombomeren verstärkt gebildet.

2.2.3. Intrinsische Faktoren bestimmen das Vorläuferstadium 5-HT-Neurone

Die räumlich und zeitlich korrekte Induktion und Differenzierung 5-HT-Neurone steht einerseits unter Kontrolle der bereits erwähnten externen Signalmoleküle Shh, Fgf4 und Fgf8. Andererseits sind diese extrinsischen Faktoren eng mit transkriptionellen Regulationsmechanismen verknüpft, mit denen sie ein kompliziertes Netzwerk bilden. Dabei sind extrinsische Signalmoleküle und intrinsische Transkriptionsfaktoren nicht für alle 5-HT-Neurone in gleichem Maße von Bedeutung. Bisher ist es noch nicht gelungen, dieses Netzwerk für die einzelnen Subpopulationen der 5-HT-Neurone vollständig aufzuklären.

Auf transkriptioneller Ebene lässt sich die Entwicklung von 5-HT-Neuronen in zwei Phasen unterteilen. Erstens die Induktion von 5-HT-Vorläuferzellen, zweitens die postmitotische Entwicklung bis hin zur terminalen Differenzierung und Ausbildung des 5-HT-Phänotyps.

Die Expression von *Nkx2.2*, die dem Shh-Signal der Bodenplatte nachfolgt, besitzt eine essentielle Bedeutung für die Spezifizierung ventraler Zelltypen. Dieser Transkriptionsfaktor wird als einer der ersten Faktoren von allen 5-HT-Vorläuferzellen bis zum Verlassen des Zellzyklus exprimiert (Briscoe et al., 1999). Beobachtungen an *Nkx2.2*-defizienten Mäusen zeigten, dass *Nkx2.2* die Entwicklung der kaudalen, jedoch nicht aller rostralen 5-HT-Neurone bestimmt. So sind 5-HT-Neurone des NRD, einem Abkömmling des R1, in *Nkx2.2*-defizienten Mausmutanten weiterhin vorhanden. Es wird vermutet, dass der dem Transkriptionsfaktor *Nkx2.2* verwandte Faktor *Nkx2.9*, welcher in R1 exprimiert wird, möglicherweise einen Verlust von *Nkx2.2* kompensiert. *Nkx2.2* wiederum induziert *Nkx6.1* in Zellen der Vorläuferregion. Eine Deletion von *Nkx6.1* führt zum Ausbleiben der Expression von Genen, welche die Differenzierung zu 5-HT-Neuronen kontrollieren, und somit zum vollständigen Verlust aller 5-HT-Neurone. *Nkx2.2* und *Nkx6.1* regulieren gemeinsam die Expression von Gata-Transkriptionsfaktoren („*GATA-binding protein 2/3*“, *Gata2* und *Gata3*), die eine bedeutende Rolle in der postmitotischen Entwicklung 5-HT-Neurone spielen. Wie bereits erwähnt, ist *Nkx2.2* von essentieller Bedeutung für die zeitliche Kontrolle der Initiierung der 5-HT-Neurogenese zu Lasten der Entwicklung von Motoneuronen durch Hemmung der Expression von *Phox2b*.

Mash1 („*Mouse achaete-scute homolog 1*“), ein bHLH- („*Basic helix-loop-helix*“)-Transkriptionsfaktor, wird bereits sehr früh in der VZ exprimiert und gehört zu den proneuralen bHLH-Transkriptionsfaktoren (Bertrand et al. 2002; Guillemot und Joyner, 1993). *Mash1* ist nach Herabregulation von *Phox2b* direkt an der Generierung von postmitotischen 5-HT-Vorläufern beteiligt. Die Bedeutung dieses Transkriptionsfaktors wird anhand von Untersuchungen von *Mash1*-defizienten Mäusen deutlich (Pattyn et al., 2004). Diese weisen eine gestörte Neurogenese zentraler 5-HT-Neuronen auf. Darüber hinaus lassen sich keine der folgenden, postmitotisch exprimierten Transkriptionsfaktoren nachweisen: *Lmx1b*

(„*LIM homeobox transcription factor 1 beta*“), Gata2/3 und Pet1 („*Plasmacytoma expressed transcript 1*“). Die Genexpressionsmuster von Nkx2.2, Nkx2.9 und Phox2b bleiben hingegen unverändert. Interessanterweise werden Nkx2.2 und Mash1 auch in Vorläuferzellen, die nicht den 5-HT-Entwicklungsweg einschlagen, exprimiert. Es ist daher anzunehmen, dass mindestens ein weiterer Faktor zur Festlegung der Entwicklung von 5-HT-Neuronen notwendig ist. Diese Annahme wird durch die Tatsache gestützt, dass eine ektopische Expression von Nkx2.2 und Mash1 nicht in der Lage ist, 5-HT-Neurone zu induzieren (Pattyn et al., 2004). Ein möglicher Transkriptionsfaktor, dem die Rolle der Festlegung von Vorläuferzellen auf die Entwicklung zu 5-HT-Neurone zukommen könnte, ist Foxa2 („*Forkhead box A2*“). Foxa2 wird ventral von jener Vorläuferzellpopulation verstärkt exprimiert, die von der Bildung von MNv zur Entwicklung 5-HT-Neurone umschalten. Dieses Umschalten geht mit einer Herabregulation von Phox2b einher (Jacob et al., 2007).

2.2.4. Vom postmitotischen Neuron bis zum Erlangen des 5-HT-Phänotyps

Pet1 ist bislang das einzige identifizierte Markergen, das spezifisch ausschließlich in postmitotischen 5-HT-Neuronen exprimiert wird. Seine beginnende Expression um E10.75 geht der Expression des Gens *Tph2* („*Tryptophanhydroxylase 2*“) um 6-12 h voraus. Auch im adulten Stadium wird *Pet1* in seiner Expression aufrecht erhalten. Die Spezifität des Transkriptionsfaktors *Pet1* für 5-HT-Neurone lässt sich durch die Tatsache erklären, dass in Promotorregionen der Gene *Sert* („*Plasma membrane serotonin transporter*“), *Tph2*, *Aadc* („*Aromatic L-aminoacid-decarboxylase*“) und des Autorezeptor *5-HTR1a* Bindungsstellen für *Pet1* identifiziert werden konnten (Hendricks et al., 1999). *Pet1*-defiziente Mäuse zeigen eine Reduktion 5-HT-Neurone um nahezu 70% (Hendricks et al., 2003). Die verbleibenden 5-HT-Neurone weisen eine verminderte Expression oben genannter, den 5-HT-Phänotyp spezifizierender Gene auf, wodurch die 5-HT-Synthese, seine Wiederaufnahme und Speicherung eingeschränkt werden. Die Tatsache, dass in *Pet1*-defizienten Mausmutanten dennoch 5-HT-Neurone vorliegen, deutet darauf hin, dass die Funktion von *Pet1* in diesen Zellen durch ein weiteres Mitglied der Familie der ETS-Transkriptionfaktoren kompensiert wird. Es könnte sich hierbei auch um 5-HT-Neurone handeln, deren Vorläufer einen späteren, bisher unbekannten und zudem von *Pet1* unabhängigen Entwicklungsweg eingeschlagen haben. Im Gegensatz zu anderen Mausmutanten, defizient für Gene der 5-HT-Neuronenentwicklung, sind *Pet1*-defiziente Mutanten lebensfähig. Jedoch zeigen Mäuse dieses Genotyps ein deutlich gesteigertes Furchtverhalten und Aggressivität ähnlich Mäusen defizient für *Lmx1b* oder für einzelne 5-HT-Rezeptortypen (Gaspar et al., 2003; Gingrich et al., 2003).

Gata2 und Gata3 verknüpfen das 5-HT-Vorläuferstadium, welches durch eine Expression von Nkx2.2 und Mash1 gekennzeichnet ist, mit der postmitotischen Entwicklungsstufe (Nardelli et al., 1999). Erste postmitotische 5-HT-Neurone lassen sich um E11.5 im rostralen Rhombencephalon immunhistochemisch nachweisen. Ein Ausschalten eines der Gene, *Gata2* oder *Gata3*, führt in Mäusen zum frühen embryonalen Tod (E 9.5–12.5). Hierzu tragen unter anderem gravierende neurogenetische Defekte bei (Pandolfi et al., 1995; Tsai et al., 1994). Gata2 übernimmt eine bedeutende Rolle in der Generierung rostraler und kaudaler rhombencephaler 5-HT-Neurone. Es ist notwendig für die Induktion der Expression von Lmx1b und Pet1. Für die Induktion 5-HT-Neurone des R1 ist Gata2 nicht nur notwendig, sondern auch ausreichend. Dies wird durch Beobachtungen an *Gata2*-defizienten Mausmutanten gestützt. 5-HT-Neurone, abstammend von Vorläuferzellen des R1, werden in diesen Mutanten nicht ausgebildet, was gegen eine mögliche Kompensation durch Gata3 spricht (Craven et al., 2004). Ob Gata3 in seiner Expression von Gata2 abhängig ist, konnte bisher nicht eindeutig geklärt werden. Gata3, so zeigen konventionelle *Gata3*-Mausmutanten, ist im Gegensatz zu Gata2 für die Entwicklung der kaudalen 5-HT-Neurone essentiell. Zwar wird es auch von rostralen 5-HT-Neuronen exprimiert, jedoch entwickeln sich diese auch in *Gata3*-defizienten Mäusen in nahezu normaler Anzahl. Fehlt *Gata3*, so führt dies zu einem Verlust von circa 80% der kaudalen 5-HT-Neurone, aber nur zu einer Reduktion um circa 30% der Anzahl rostraler 5-HT-Neurone. Die Expression von Lmx1b und Pet1 ist durch das Fehlen von *Gata3* nicht beeinträchtigt, was dafür spricht, dass diese Faktoren parallel zueinander agieren.

Lmx1b ist ein Zink-Finger-Transkriptionsfaktor mit weiter Verbreitung im ZNS. Er ist unter anderem für die weitere postmitotische Entwicklung aller 5-HT-Vorläuferzellen notwendig (Chen et al., 2003; Ding et al., 2003). In Mäusen führt die Gendeletion von *Lmx1b* zum völligem Fehlen zentraler 5-HT-Neurone und zum perinatalen Tod. Mausmutanten, in denen die *Lmx1b*-Expression konditionell ausschließlich in Pet1-exprimierenden Zellen aufgehoben ist, weisen dennoch eine vorübergehende Expression von Pet1 in postmitotischen 5-HT-Vorläuferzellen auf (Zhao et al., 2006). Diese Expression geht jedoch im Zuge der weiteren Entwicklung verloren. Daher ist davon auszugehen, dass Lmx1b nicht die Expression von Pet1 initiiert, jedoch für die Aufrechterhaltung der Pet1-Expression notwendig ist. Ein gänzlicher Verlust von *Lmx1b* führt in Mäusen des Weiteren zu einer räumlichen Ausdehnung der 5-HT-Vorläuferzellregion von ventral zu dorsal. Somit scheint Lmx1b zusätzlich eine regulatorische Funktion bei der Festlegung der regionalen Identität oder direkt bei der Regulation von Migrationsvorgängen zu besitzen. Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass Lmx1b während der Entwicklung mesencephaler dopaminerger (DA-) Neurone ebenfalls eine wesentliche Bedeutung zu kommt, was ein weiterer Hinweis auf eine ontogenetische Verwandtschaft beider Neuronengruppen sein könnte.

Der ausgereifte, terminale 5-HT-Phänotyp wird schließlich durch die Expression der Gene *Tph2*, eine nur im ZNS exprimierte Isoform des Tryptophanhydroxylase-Gens, des *Sert*-Gens und des *Vmat2* („*Vesicular monoamine transporter 2*“)-Gens erreicht.

2.3. Tgf- β („*Transforming growth factor- β* “) — Ein extrinsisches Signalmolekül und seine Bedeutung für die Entwicklung ventraler Neuronenpopulationen

DA-Neurone des ventralen Mesencephalon stehen in enger Verwandtschaft zu 5-HT-Neuronen des ventralen Rhombencephalon. So entstehen beide Neuronentypen aus Vorläuferzellen beiderseits des IstO. Kaudal des IstO entstehen 5-HT-Neurone, rostral des IstO befinden sich Vorläuferzellen der mesencephalen DA-Neurone. Neben dieser räumlichen Beziehung zueinander weisen beide Neuronentypen auch bezüglich ihrer Entwicklung Parallelen auf. Hierzu zählt beider Abhängigkeit von Shh, Signalmolekül der Grundplatte, als auch von Fgf8, sezerniert vom IstO. Shh und Fgf8 sind jedoch nicht die einzigen extrinsischen Signalmoleküle die in diesen Strukturen exprimiert werden und in angrenzenden Geweben ihren positionsdefinierenden Einfluss ausüben. Weitere in diesen Regionen endogen exprimierte Moleküle sind zwei Isoformen des Zytokins Tgf- β („*Transforming growth factor- β* “), Tgf- β 2 und Tgf- β 3. Während der Entwicklung regulieren Tgf- β s unter anderem wichtige zelluläre Prozesse wie Proliferation, Differenzierung, Apoptose, aber auch zelluläres Überleben in späteren Stadien. Weitere regulatorische Aufgaben erfüllen Tgf- β s in der Regulierung der Synthese extrazellulärer Matrixkomponenten, in der Hämatopoese und in immunologischen Prozessen (Unsicker et al., 1996). Tgf- β s werden zunächst als Vorläuferproteine sekretiert und nachfolgend durch proteolytische Spaltung aktiviert. Die Smad- („*Mothers against DPP homolog*“)-abhängige Signaltransduktion erfolgt, stark vereinfacht, über die Bindung von Tgf- β an den homodimeren Tgf- β -Rezeptor Typ II („*Rezeptor serin/threonin kinase Typ II*“). Dieser rekrutiert, bindet und aktiviert den Tgf- β -Rezeptor Typ I („*Rezeptor serin/threonin kinase typ I*“; „*Activin receptor-like kinase 5*“, Alk5). Im Anschluss hieran phosphoryliert der Tgf- β -Rezeptor Typ I Smad2 oder Smad3. Einmal phosphoryliert, dissoziiert der homotrimere Smad-Komplex vom Rezeptorkomplex und bindet Co-Smad/Smad4. Der Smad-Proteinkomplex transloziert schließlich in den Nucleus und induziert die Expression spezifischer Zielgene. Hierzu zählen auch die Gene der inhibitorischen Smad-Proteine 6 und 7. Diese inhibitorischen Smad-Proteine stehen in Konkurrenz mit aktivierenden Smad-Proteinen um die Bindung an den zuvor aktivierten Tgf- β -Rezeptor Typ I. Die beschriebene Smad-abhängige Signaltransduktionskaskade stellt nur einen der durch Tgf- β s induzierten

Signaltransduktionswege dar. Neben diesem sind auch Smad-unabhängige Signaltransduktionskaskaden durch Tgf- β s aktivierbar (Moustakas und Heldin, 2005). Die zelluläre Antwort auf Tgf- β ist extrem variabel und wird unter anderem durch den jeweiligen Zelltyp und die Zellumgebung determiniert (Rahimi und Leof, 2007; Zhu und Burgess, 2001). Bisher wurden drei Tgf- β -Isoformen (Tgf- β 1/2 und 3) in Säugetieren beschrieben, die innerhalb der Tgf- β -Superfamilie eine eigenständige Familie bilden. Eine Expression von Tgf- β 1 konnte in neuralem Gewebe unter normalen, physiologischen Bedingungen nicht beobachtet werden. Im Gegensatz hierzu werden die Tgf- β -Isoformen 2 und 3 in weiten Teilen des adulten ZNS und peripheren Nervensystem (PNS) exprimiert (Unsicker und Strelau, 2000). Obwohl die Expression der Tgf- β -Isoformen 2 und 3 häufig überlappen, resultieren beide Gendeletionen in unterschiedlich ausgeprägten Phänotypen der jeweiligen Mausmutanten. *Tgf- β 3*-defiziente Mäuse leiden unter anderem an einer ausgeprägten Gaumenspalte. Diese Missbildung bedingt eine Störung der Atmung und der Nahrungsaufnahme und hierdurch den Tod der Mutanten innerhalb eines Tages nach der Geburt (Proetzel et al., 1995). Der Phänotyp einer Gendeletion von *Tgf- β 2* äußert sich weitaus vielfältiger. So lassen sich skelettale Missbildungen, organischen Missbildungen, insbesondere des Herzens, der Lunge, des Auges und Innenohres sowie des Urogenitaltraktes beschreiben. Aufgrund kongenitaler Zyanose tritt bei *Tgf- β 2*-defizienten Mäusen der Tod bereits perinatal ein (Dünker und Kriegelstein, 2002).

Bedeutsam in Hinblick auf die Entwicklung mesencephaler DA-Neurone ist die Expression der beiden Tgf- β -Isoformen 2 und 3 in der Substantia nigra (SN). Während früher Embryonalstadien sind diese beiden Tgf- β -Isoformen zudem in der Chorda dorsalis und der Grundplatte nachweisbar (Böttner et al., 1996; Farkas et al., 2003; Flanders et al., 1991; Unsicker et al., 1996). Darüber hinaus konnten Tgf- β 2, Tgf- β 3 und die Tgf- β -Rezeptoren Typ I und II im ventralen Mesencephalon der Maus ab dem E12 nachgewiesen werden. Eine spezifische Bedeutung der Tgf- β s für die Entwicklung und Aufrechterhaltung DA-Neurone des ventralen Mesencephalon konnte durch die Applikation von Tgf- β s *in vitro* an mesencephalen Zellkulturen der Ratte und *in vivo* an Hühnerembryonen zu unterschiedlichen Zeitpunkten der Entwicklung abgeleitet werden (Farkas et al., 2003). Durch externe Tgf- β -Gabe konnte die Anzahl Tyrosinhydroxylase-(TH)-exprimierender Zellen *in vitro* in mesencephalen Zellkulturen der Ratte (E12) signifikant erhöht werden. Dieser Effekt ließ sich durch Blockierung aller endogen exprimierten Tgf- β -Isoformen mittels eines spezifischen Antikörpers umkehren. Die Expression von TH definiert das Erreichen des terminalen DA-Phänotyps und entspricht damit der Expression von Tph2 in 5-HT-Neuronen. Interessanterweise zeigte sich in den obig beschriebenen *in vitro*-Versuchen eine starke gegenseitige Abhängigkeit der durch Tgf- β s und Shh induzierten Effekte. Trotz endogen

verfügbarem Shh-Signal resultierte die Blockierung endogen vorliegender TGF- β s *in vitro* in einem Ausbleiben der Induktion DA-Neurone. Eine Blockierung des Shh-Moleküls, nicht aber der endogenen exprimierten Tgf- β s, durch einen spezifischen Antikörper führte wiederum zu vergleichbaren Ergebnissen (Farkas et al., 2003). Noch deutlicher wurde die Bedeutung der Tgf- β s für die Induktion DA-Neurone anhand ihrer ektopischen Induktion im dorsalen Mesencephalon durch Tgf- β s (Roussa et al., 2006). Behandlung von primären Zellkulturen des ventralen Mesencephalon der Ratte (E14) mit Tgf- β s über einen längeren Zeitraum hinweg begünstigt das Überleben TH-exprimierender Neurone. Tgf- β hat hierbei keinen Einfluss auf die Zellproliferation, sondern reduzieren tatsächlich die Anzahl apoptotischer Zellen. Dieser Effekt lässt sich verstärken, wenn Tgf- β in Verbindung mit Shh und Fgf8 appliziert wird (Roussa et al., 2004). Der positive Effekt von Tgf- β auf das Überleben DA-Neurone konnte auch *in vivo* demonstriert werden. Hierzu wurde in Hühnerembryonen (E6 - E10) nach Abschluss der Induktion der Entwicklung von DA-Neuronen endogen synthetisierte Tgf- β s durch einen, die Tgf- β -Funktion blockierenden, Antikörper neutralisiert. Dies führte zu einer deutlichen Abnahme der Anzahl DA-Neurone (Farkas et al., 2003).

Tgf- β 2 und 3 lassen sich beginnend mit dem Embryonaltag 12 auch im ventralen Rhombencephalon nachweisen (Flanders et al., 1991). Einzelne Applikation der Tgf- β -Isoformen 2 und 3 führten *in vitro* jeweils zu einem vergleichbar hohen Anstieg der Anzahl 5-HT-Neurone in primären Zellkulturen des ventralen Rhombencephalon der Ratte, E14 (Galter et al., 1999). Der Anstieg der Anzahl 5-HT-Neurone beschränkte sich hierbei auf 5-HT-Neurone, die dem kaudalen Abschnitt des Rhombencephalon entstammten. Im Gegensatz hierzu blieb die Anzahl der 5-HT-Neurone der rostralen Raphe unverändert. Eine sich über einen längeren Zeitraum erstreckende Einzelbehandlung von Kulturen des rostralen und kaudalen Rhombencephalon früherer Embryonalstadien (E12 und E13) mit Tgf- β s zeigte deutlich, dass es sich bei der Empfänglichkeit der Zellen für Tgf- β -Isoformen um ein zeitlich und räumlich regulierten Effekt handelt. Eine externe Tgf- β 2 oder 3 Gabe steigerte die Zahl rostraler 5-HT-Neurone um den E12 und E13, während die sich zu entwickeln beginnenden kaudale Population von 5-HT-Neuronen zunächst nicht beeinflusst wurde (Galter et al., 1999). *In vivo*-Studien von *Tgf- β* -Mausmutanten stützen die These, dass Tgf- β s sowohl an der Induktion als auch der Aufrechterhaltung von 5-HT-Neuronen beteiligt sind. Interessanterweise deuten in unserem Labor durchgeführte immunhistochemische Untersuchungen an *Tgf- β 2*-defizienten Mäusen auf eine Reduktion der Anzahl rostraler 5-HT-Neurone um E11.5 hin (Roussa E., persönliche Mitteilung). Zu diesem Zeitpunkt sind einzelne Nuclei raphes noch nicht identifizierbar. Ebenso sind die kaudalen 5-HT-Neurone noch nicht in die postmitotische Entwicklung eingetreten. Dies deutet auf eine induktive Funktion von Tgf- β 2 für die Entwicklung rostraler 5-HT-Neurone des ventralen

Rhombencephalon hin. Zu einem späteren Zeitpunkt, E18.5, lässt sich eine Reduktion von 5-HT-Neurone der paramedianen Raphe (B5/B8) beobachten. Der selektive Verlust dieser Neuronen legt die Vermutung nahe, dass Tgf- β 2 zumindest für die Aufrechterhaltung diese Subpopulation von 5-HT-Neuronen notwendig ist. Der molekulare Mechanismus einer Tgf- β 2-abhängigen Induktion und Aufrechterhaltung 5-HT-Neurone ist bisher nicht aufgeklärt.

2.4. Der Transkriptionsfaktor „*Single-minded*“ (*sim*) — Ein intrinsischer Faktor und seine Bedeutung für die Bildung der ventralen Mittellinie in *D. melanogaster*

Die Mittellinie von *D. melanogaster* ist ein wichtiges Organisationszentrum für die Ausbildung der D-V-Achse des ZNS (Nambu et al., 1993; Lee et al., 1999). Sie stammt vom Mesektoderm, einer Kette von Einzelzellen ab, welches das Mesoderm vom Neuroektoderm während der Gastrulation trennt (Kosman et al., 1991). „*Single-minded*“ (*sim*) kodiert für einen bHLH-PAS-Transkriptionsfaktor und stellt ein Hauptregulatorgen der Neurogenese, insbesondere der Bildung der Mittellinie in *D. melanogaster*, dar. Dabei aktiviert *sim* die Expression von Genen der Mittellinie, z.B. „*rhomboid*“ (*rho*), „*engrailed*“ (*en*) und „*epidermal growth factor receptor*“ (*egfr*). Diese sind notwendig, um die Expression von Genen zu regulieren, die für die D-V-Achsenbildung verantwortlich sind. Gleichzeitig reprimiert *Sim* in den Mittellinienzellen die Expression von weiter lateral im ZNS zu exprimierenden Genen (Kim, I.O. et al., 2005). Die Zellen der Mittellinie fungieren als Signalzentren für sie umgebendes Gewebe und differenzieren sich in Gliazellen sowie in verschiedene neuronale Zelltypen. Die spezifische Expression von *sim* in Zellen der Mittellinie wird durch das dorso-ventrale Expressionsregulationssystem, bestehend aus *dorsal*, *twist* und *snail*, sowie durch das Notch-Delta-System kontrolliert. In *sim*-defizienten *D. melanogaster* lässt sich beobachten, dass sich Zellen der Mittellinie nicht in die entsprechenden, ausgereiften Zelltypen differenzieren und in ihrer Migration beeinträchtigt sind, so dass sie ihre endgültige, zuge dachte Position innerhalb des ZNS nicht einnehmen können. In der Folge wird keine Mittellinie gebildet (Crews et al., 1988; Thomas et al., 1988). Zudem führt die ektopische Expression von *sim* in Zellen des lateralen ZNS von *D. melanogaster* zur Ausbildung einer Mittellinienzellen-spezifischen Morphologie und Genexpression (Nambu et al., 1991). Nicht nur an der Ausbildung der Mittellinie in *D. melanogaster* ist *sim* beteiligt, sondern auch an der Ausformung des visuellen Systems. Nach der hh-abhängigen Induktion der *sim*-Expression in den Ganglienzellen wird *sim* benötigt, um die synaptische Assoziation der Axone von Photorezeptorzellen mit den Ganglienzellen zu regulieren (Umetsu et al., 2006). Darüber

hinaus wirkt *sim* wesentlich an der korrekten asymmetrischen (links-rechts) Entwicklung innerer Organe von *D. melanogaster* mit (Maeda et al., 2007). In Säugetieren wurden bisher zwei *sim*-Homologe identifiziert, die als *Sim1* und *Sim2* bezeichnet werden (Ema et al., 1996; Fan et al., 1996; Moffett et al., 1996; Yamaki et al., 1996). *Sim2* wird im embryonalen Diencephalon, einschließlich seiner Mittellinie, exprimiert. Das humane *Sim2*-Gen wird mit der Ausbildung des Down-Syndrom assoziiert und ist in Tumoren des Colon, der Prostata und des Pankreas nachweisbar (Chen et al., 1995; Dahmane et al., 1995; Woods et al., 2008). *Sim1* wird im Gegensatz zu *Sim2* direkt lateral zur Mittellinie des Diencephalon und des Rückenmarks sowie in weiteren Bereichen des ZNS und in der sich entwickelnden Niere exprimiert. Während der Entwicklung hypothalamischer neuroendokriner Zellen des Nucleus paraventricularis anterior (aPV), des Nucleus paraventricularis (PVN), der für die Regulation des Körpergewichts von entscheidender Bedeutung ist, und des Nucleus supraopticus (SO) der Maus lassen sich sowohl *Sim1* als auch *Sim2* nachweisen (Holder et al., 2000; Goshu et al., 2002). Histologische Untersuchungen an *Sim1*-defizienten Mäusen zeigten, dass der PVN und der SO unterentwickelt sind. Neuroendokrine Zellen dieser Kerne (aPV, PVN, SO), welche für die Neurosekretion von Somatostatin, Vasopressin, Oxytozin, Corticoliberin („*Corticotropin releasing hormone*“, CHR) und Tyroliberin („*Thyrotropin releasing hormone*“, TRH) verantwortlich sind, sind nicht in der Lage den Zustand der terminalen Differenzierung zu erreichen. Dies führt schließlich kurz nach der Geburt zum Tod der homozygoten *Sim1*-Mutanten (Michaud et al., 1998). *Sim2*-defiziente Mäuse besitzen hingegen einen normalen PVN und SO (Goshu et al., 2002). Aus diesem Grund wird angenommen, dass nur *Sim1* essentiell für die Bildung der oben genannten hypothalamischen Kerne ist und ein Fehlen von *Sim1* nicht durch *Sim2* kompensiert werden kann. Auch *Sim2*-Mausmutanten sterben perinatal, spätestens drei Tage nach der Geburt. Der Tod tritt durch gravierende Defekte des respiratorischen Apparates, beruhend auf Missbildungen der Rippen, der Pleurahöhlen und des Diaphragma, ein (Goshu et al., 2002).

Die durch *Sim1*-vermittelte Transkriptionsaktivierung wird durch die Bindung von Heterodimeren aus *Sim1* und Arnt2 („*Aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator*“), dem Orthologon des Tango-Proteins aus *D. melanogaster*, an die CME-(„*CNS midline element*“)-Sequenz vermittelt. Mögliche Zielgene von *Sim1* wurden durch Analysen der Genexpression mittels cDNA-Mikroarray anhand eines *in vitro*-Zellsystems identifiziert (Liu et al., 2003). *Sim1*- und Arnt2-überexprimierende *Neuro2a*-Zellen, eine neuronale Säugerzelllinie, wiesen eine gesteigerte Expression einer Vielzahl von Genen auf. Zu diesen möglichen Zielgenen von *Sim1* zählten interessanterweise auch *Gata2* und *Gdnf* („*Glia cell Line derived neurotrophic factor*“), ein Mitglied der Tgf- β -Superfamilie (Liu et al., 2003), welches für das Überleben von DA-Neuronen des Mesencephalon essentiell ist (Clarkson et al., 1997; Choi-Lundberg et al., 1997). Es wäre denkbar, dass der Transkriptionsfaktor *Sim1* in die

Neurogenese ventraler Vorläuferzellen des ZNS der Säuger involviert ist. Hierfür spricht zum einen die Bedeutung von *sim* in der Ausbildung der Mittellinie in *D. melanogaster* und damit einhergehend die Beeinflussung der Entwicklung von neuronalen Zelltypen. Zum anderen zeigte ein Vergleich der Genexpression zwischen ventralem und dorsalem Mesencephalon der Maus (E11) mittels Mikroarray-Analyse der Genexpressionsmuster eine deutlich stärkere *Sim1*-Expression im ventralen Gewebe (persönliche Mitteilung: Roussa E.). Inwieweit *Sim1* als ventraler Determinant auch in die Induktion und Spezifikation 5-HT-Neurone involviert ist, ist bisher nicht bekannt.

III. Zielsetzung der Arbeit

Die Entwicklung rostraler 5-HT-Neurone des ventralen Rhombencephalon wird durch ein zeitlich und räumlich genau festgelegtes Zusammenspiel extrinsischer und intrinsischer Faktoren bestimmt, welches bisher nur ansatzweise aufgeklärt werden konnte. Die vorliegende Arbeit soll dazu beitragen, weitere Erkenntnisse über die molekularen Mechanismen der Induktion und Spezifikation 5-HT-Neurone zu gewinnen. Im Fokus wird hierbei die Untersuchung einer denkbaren Beteiligung des extrinsischen Signalmoleküls Tgf- β und des Transkriptionsfaktors Sim1, als intrinsischer Faktor, an der Entwicklung 5-HT-Neurone des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12) stehen.

Aus diesem Forschungsansatz ergeben sich folgende Ziele der Arbeit:

- **Die Etablierung und Charakterisierung eines *in vitro*-Systems des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12), das es ermöglicht, die Induktion und Spezifizierung 5-HT-Neurone *in vitro* zu untersuchen und gezielt zu beeinflussen.**
- **Die Untersuchung eines vorstellbaren Einflusses des extrinsischen Signalmoleküls Tgf- β auf die Entwicklung und Differenzierung 5-HT-Neurone aus Vorläuferzellen des rostralen Rhombencephalon.**
- **Die Analyse einer möglichen Bedeutung des Transkriptionsfaktors Sim1 für die Entwicklung von 5-HT-Neuronen des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus.**
- **Die Identifizierung von bisher unbekannten Genen, die an der Induktion und Spezifikation von rostralen 5-HT-Neuronen des ventralen Rhombencephalon der Maus beteiligt sein könnten, und hierdurch die Ergänzung fehlender Elemente innerhalb des transkriptionellen Netzwerkes, welches der Entwicklung rostraler 5-HT-Neurone zugrunde liegt.**

IV. Materialien und Methoden

4.1. Materialien

4.1.1. Organismen

Mikroorganismen

Escherichia coli DH5 α

Stratagene, La Jolla, California, USA

DH5 α (F' , $\phi 80dlacZ\Delta M15$, $\Delta(lacZY A-argF)$, *U169*, *deoR*, *recA1*, *endA1*, *hsdR17*, (*rK*-, *mK*+), *supE44*, λ -, *thi-1*, *gyrA96*, *relA1*)

Eukaryontische Zelllinien

MN9D-Zelllinie („*Mouse neuronal cell line clone 9D*“)

Durch somatische Zellfusion generierte, immortalisierte, klonale Hybridzelllinie aus Zellen des rostralen mesencephalen Tegmentum der Maus (E14); Choi et al., 1991.

Mausstämme

NMRI Mausstamm

Mauslinie des „*Naval Medical Research Institute*“, Teil des U.S. Navy's National Naval Medical Center. *NMRI*-Mäuse wurden von der zentralen tierexperimentellen Einrichtung der Universitätsmedizin Göttingen bezogen.

Sim1-defizienter Mausstamm

Die *Sim1*-defiziente Mauslinie mit genetischem *C57BL/6*-Hintergrund (Michaud et al., 1998) wurde freundlicherweise durch Herrn Dr. Chen-Ming Fan (Carnegie Institution, Department of Embryology, Baltimore, Maryland 21218, USA) zur Verfügung gestellt.

4.1.2. Medien

Mikrobiologische Kulturmedien

Luria-Bertani-(LB)-Flüssigmedium	1,0 g Trypton
	10,0 g NaCl
	0,5 g Hefeextrakt
	ad 1 l A. bidest

Für die Erstellung von Selektivkulturmedien wurden Ampicillin oder Kanamycin in einer Endkonzentration von 100 µg/l bzw. 50 µg/l zugesetzt.

LB-Kulturplattenmedium	1,5% Agar-Agar in LB-Flüssigmedium
------------------------	------------------------------------

Eukaryontische Zellkulturmedien

Dulbecco's modified Eagle medium-F12 (DMEM-F12)	Gibco/Invitrogen, Karlsruhe, D
DMEM-F12-Komplettmedium der Primärkultur	2,5 ml N1-Mix
	5 ml PSN (100×)
	5 ml Glutamin
	1,43 ml BSA (35%)
	1 ml Insulin
	3,9 ml Glucose (33 mM)
	ad 500 ml DMEM-F12
DMEM-F12 MN9D Kulturmedium	5% FCS
	50 µg/ml Genitacin
CMF (Calcium-Magnesium-freies Medium)	50 ml HBBS 10x
	5 ml Natriumbicarbonat (7,5%)
	ad 500 ml A bidest
2x Einfriermedium	20% DMSO
	40% FCS („Fetal calf serum“)
	Lösung in DMEM-F12 Medium
„Magnesium-free Hank's balanced salt solution“ (HBBS); 10x	Gibco/Invitrogen, Karlsruhe, D
Natriumbicarbonat; 7,5%	Gibco/Invitrogen, Karlsruhe, D

Opti-MEM („Reduced serum medium, modification of MEM Eagle`s“)	Gibco/Invitrogen, Karlsruhe, D
---	--------------------------------

Antibiotika und Medienzusätze

Insulin	Sigma-Aldrich Laborchemikalien GmbH, Seelze, D
N1-Mix Medium Supplement (100×)	Sigma-Aldrich Laborchemikalien GmbH, Seelze, D
Penicillin (100 mg/ml)/Streptomycin (0,5 mg/ml)/ Neomycin (100 mg/ml); PSN-Lösung (100×)	Sigma-Aldrich Laborchemikalien GmbH, Seelze, D
Geneticin (50 mg/ml)	Sigma-Aldrich Laborchemikalien GmbH, Seelze, D
Ampicilin-Stammlösung (100 mg/ml in A. bidest, Lagerung bei –20 °C)	Carl Roth GmbH, Roth, Karlsruhe, D
Kanamycin-Stammlösung (50 mg/ml A. bidest, Lagerung bei -20 °C)	Carl Roth GmbH, Roth, Karlsruhe, D

Faktoren

Tgf-β1	0,5 µg/ml, PeproTech, Hamburg, D
α-Tgf-β1/2/3	R&D Systems, Minnesota, USA
Fgf2, 100 µg/ml	Invitrogen GmbH, Karlsruhe, D
Egf, 100 µg/ml	Invitrogen GmbH, Karlsruhe, D

4.1.3. Plasmidvektoren

(Sequenzangaben siehe Anhang, Punkt 7.4. Plasmide und Sequenzen, Seite 167)

Überexpressionsplasmide

pcDNA3 CMVProm, bla, neo, BGH PolyA	Tetsuo Mashima, Cancer Research, Tokyo, J
--	---

pcDNA3::Sim1

freundlicher Weise zur Verfügung gestellt von
Herrn Dr. Chen-Ming Fan (Carnegie Institution,
Baltimore, Maryland 21218, USA)

In situ*-RNA-SondenplasmidepGEM-T Easy* Vector System I

Promega, Mannheim, D

pGEM-T Easy::Sim1 (213 bp)**4.1.4. Oligonukleotide**

Synthetische Oligonukleotid-Primer, wie z.B. Oligo(dT)₁₂₋₁₈-Primer, die in die cDNA-Synthese eingesetzt wurden, wurden von Invitrogen GmbH (Karlsruhe, D) bezogen. Alle hier angegebenen Oligonukleotide wurden zu einer Konzentration von 100 pmol/μl in DEPC behandeltem A. bidest aufgenommen.

Primer der Polymerase-Ketten-Reaktion

Name	Primer vorwärts 5'-3'	Primer rückwärts 5'-3'
<i>Fgf4</i>	TCTACTGCAACGTGGGCAT	AGGAAGGAAGTGGGTTACCTT
<i>Fgf8</i>	GTAGTTGAGGAACTCGAAGCG	TTTACACAGCATGTGAGGGAG
<i>Gapdh</i>	AGTATGATGACATCAAGAAGG	ATGGTATTCAAGAGAGTAGGG
<i>Gbx2</i>	TCTGGAGAGCGATGTGGATTA	ATAGCGAACCTGCTAACGTGA
<i>Gfap</i>	AGGCAGAGAACAACCTGGCT	CTCCTCCTCCAGCGATTCAA
<i>Lmx1b</i>	ATGTTGGACGGCATCAAGAT	TCACAGAGTCAGACTCGTCCG
<i>Nestin</i>	CAGGCTTCTCTTGGCTTTCTCTG	GGTGAGGGTTGAGGGGTGG
<i>Nkx2.2</i>	GAAGCGCCGAGTGCTCTTCTCC	GCCGAGCTGTACTGGGCGTTGT
<i>Otx2</i>	TATGGAGCTTCAAGCTTGGGT	GTCCATTTCAAGTTGCTGGTT
<i>Shh</i>	TGATGTGTGGGCCCGGCAGGGGGTTT	TCAGCCGCCGGATTTGGCCGCC ACG
<i>β-III-Tubulin</i>	ACCTTGTGTCTGCCACCATGA	TTACTCTGGATGGCCAGCAT

Primer der Quantitativen-„Real-Time“-Polymerase-Ketten-Reaktion

Name	Primer vorwärts 5'-3'	Primer rückwärts 5'-3'
<i>Atoh1</i>	CACGGGCTGAACCACG	CGTTGATGTAGATCTGGGCC
<i>Brn3.2</i>	ACATCGTCTCCCAGAGTAAGAG	CACGGGATGGTGTCTTG
<i>Gapdh</i>	CGGCCGCATCTTCTTG	TGACCAGGCGCCCAATAC
<i>Gata2</i>	CACCCCGCCGTATTGAATG	CCTGCGAGTCGAGATGGTTG
<i>Meis1</i>	CAGTGAGCAAGGTGATGGCTT	AGATGCCACGCTTTTTGTGAC
<i>Mash1</i>	ACTTGAACCTATGGCGGGT	CCAGTTGGTAAAGTCCAGCAG
<i>Lmx1b</i>	TTCCTGATGCGAGTCAACGAG	TCCGATCCCGGAAGTAGCAG
<i>Lhx8</i>	ACACGAGCTGCTACATTAAGGA	CCCAGTCAGTCGAGTGGATG
<i>Pet1</i>	AGCAAGCCTAACATGAACTACG	AAGTCAAAGCGGTAGGCG
<i>Rgs4</i>	GAGTGCAAAGGACATGAAACATC	TTTTCCAACGATTCAGCCCAT
<i>Sema5a</i>	AGGTGCCACTTCCATCAAACA	TGGGTCATGCTCAGACTCTCC
<i>Sim1</i>	CTTTCTTTTATACTTACACCTCACGTTTTC	AACATAACTTTAAACAGGAGGCTG AAG
<i>Tph2</i>	AGTCGAAATCTTCGTGGACTG	GGCGGATTCAGGGTCACAAT

Primer der Klonierung von *in situ*-RNA-Sonden

Name	Primer vorwärts 5'-3'	Primer rückwärts 5'-3'
<i>Sim1</i> (213 bp)	CCAGATATCAGCCTCTAAGCC	TATCAGTCAGGGGACTTCCAC

siRNA-Oligonukleotide

AllStars Negative Control siRNA Alexa 488, 5 nmol	Qiagen GmbH, Hamburg, D
Mm_Sim1_1 HP siRNA Cy5 (NM_011376), 20 nmol	Qiagen GmbH, Hamburg, D

4.1.5. Enzyme, Inhibitoren und Beschichtungskomponenten

Enzyme

DNase-Lösung (RNase-frei), 10 mg/ml	Qiagen, Hilden , D
ProteinaseK-Lösung	Roche Diagnostics, Mannheim, D
RevertAidTM MmuLV Reverse-Transkriptase 200 U/μl	MBI Fermentas, St.Leon-Rot, D
Ribonuklease-(RNase)-A-Lösung, 10 mg/ml TE, pH 8	Sigma-Aldrich Laborchemikalien GmbH, Seelze, D
Sp6-Polymerase 20 U/μl	MBI Fermentas, St.Leon-Rot, D
<i>taq</i> -Polymerase 5 U/μl	MBI Fermentas, St.Leon-Rot, D
T4-DNALigase 5 U/μl	MBI Fermentas, St.Leon-Rot, D
T7-Polymerase 20 U/μl	MBI Fermentas, St.Leon-Rot, D
0,15% Trypsin/0,02% EDTA	Gibco/Invitrogen, Karlsruhe, D
EcoRI	MBI Fermentas, St.Leon-Rot, D
SacII	MBI Fermentas, St.Leon-Rot, D
Sall	MBI Fermentas, St.Leon-Rot, D

Inhibitoren

<i>Complete</i> TM Preproteinase Cocktail	Roche Diagnostics, Mannheim, D
Pefa-Block	Biomol GmbH, Hamburg, D
Ribonuklease-(RNase)-Inhibitor	MBI Fermentas, St.Leon-Rot, D
SB421543 (Alk 4/5/7-Inhibitor 1614) 10 mM in DMSO, Lagerung bei -20 °C	Tocris, London, UK

Beschichtungskomponenten und Aminosäurederivate

Laminin (1 mg/ml)	Sigma-Aldrich Laborchemikalien GmbH, Seelze, D
Poly-D-Lysin (1 mg/ml)	Sigma-Aldrich Laborchemikalien GmbH, Seelze, D
Poly-L-Ornithine (10 mg/ml 150 mM H ₃ BO ₃ NaOH, pH 8,3)	Sigma-Aldrich Laborchemikalien GmbH, Seelze, D

4.1.6. Antikörper

Primäre Antikörper

α -Gapdh hergestellt in Maus, monoklonal	Abcam, Cambridge, UK
α - β -III-Tubulin, hergestellt in Maus, monoklonal	Developmental Studies Hybridoma Bank, University of Iowa, USA
α -Nestin, hergestellt in Maus, monoklonal	Developmental Studies Hybridoma Bank, University of Iowa, USA
α -Gfap, hergestellt in Kaninchen, polyklonal	Dako, Hamburg, D
α -O4, hergestellt in Maus, monoklonal	Chemicon/Millipore, Hofheim, D
α -Digoxigenin-(DIG)-Alkalische-Phosphatase	Roche Diagnostics, Mannheim, D
α -5-HT, hergestellt in Kaninchen, polyklonal	Sigma-Aldrich Laborchemikalien GmbH, Seelze, D
α -Sim1, hergestellt in Kaninchen, polyklonal	Chemicon/Millipore, Hofheim, D
α -Alkalische Phosphatase, hergestellt in Kaninchen, gekoppelt an Alkalische-Phosphatase	Nordic Immunological Laboratories, Tilburg, NL
α -Alkalische Phosphatase, hergestellt in Maus, gekoppelt an Alkalische-Phosphatase Streptavidin-FITC	Nordic Immunological Laboratories, Tilburg, NL Dako Diagnostika GmbH, Hamburg, D

Sekundäre Antikörper

Ziege- α -Kaninchen IgG, biotinyliert	Sigma-Aldrich Laborchemikalien GmbH, Seelze, D
Esel- α -Maus-IgG-Cy3	Jackson Immuno Research Europe, Newmarket, Suffolk, UK
Ziege- α -Maus-IgG-FITC	Jackson Immuno Research Europe, Newmarket, Suffolk, UK
Ziege- α -Kaninchen-IgG-FITC	Jackson Immuno Research Europe, Newmarket, Suffolk, UK
Esel- α -Kaninchen-HRP	GE Healthcare, UK
Ziege- α -Maus-HRP	GE Healthcare, UK

4.1.7. Molekulare Standards

Hyperladder II (100 bp-Längenstandard)	Bioline GmbH, Luckenwalde, D
„Prestained“-Proteinstandard	BioRad GmbH, Hamburg, D

4.1.8. Kommerzielle Reinigungs- und Nachweissysteme

GeneChip® 430A Mouse Genome Array	Affymetrix GmbH, München, D
5-Brom-2-desoxyuridin-(BrdU)- Proliferationsassay	Roche Dagnostics, Mannheim, D
3,3'-Diaminobenzidin (DAB)	Linaris Biologische Produkte GmbH, Wertheim - Bettingen, D
NucleoBond® Xtra Midi-Kit	Macherey-Nagel GmbH & Co. KG, Düren, D
QiaEx-Gelelutionskit	Qiagen GmbH, Hilden, D
RNAeasy-Kit	Qiagen GmbH, Hilden, D

4.1.9. Chemikalien und Biochemikalien

Azeton	Carl Roth GmbH, Roth, Karlsruhe, D
Acrylamid-Bis-Lösung (29:1, 30%)	Serva GmbH, Duisburg, D
Entwickler-Lösung	Adefo Chemie GmbH, Nürnberg, D
Fixierlösung	Adefo Chemie GmbH, Nürnberg, D
Agarose NEO Ultra 2267	Carl Roth GmbH, Roth, Karlsruhe, D
Ammoniumpersulfat (APS)	Carl Roth GmbH, Roth, Karlsruhe, D
Bromchloridinolylphosphat (50 mg BCIP/ml Dimethylformamid)	Roche, Mannheim, D
β-Mercaptoethanol	Fluka/Sigma, Taufkirchen, D
Bovines Serumalbumin (BSA)	Sigma-Aldrich Laborchemikalien GmbH, Seelze, D
Bradford-Reagenz	Carl Roth GmbH, Roth, Karlsruhe, D
Chemilumineszenz-Reagenz	PerkinElmer Life and Analytical Sciences, Malland, ITA
Coomassie brilliant blue R250	BioRad GmbH, München, D
deionisiertes Formamid	Carl Roth GmbH, Roth, Karlsruhe, D

Dextransulfat	Carl Roth GmbH, Roth, Karlsruhe, D
4',6'-Diamidino-2-phenylindoldihydrochlorid (DAPI)	10 mg/ml A. bidest, Sigma-Aldrich Laborchemikalien GmbH, Seelze, D
Diethylpyrocarbonat (DEPC, C ₆ H ₁₀ O ₅)	Sigma-Aldrich Laborchemikalien GmbH, Seelze, D
Digoxigenin-(DIG)-Mix labeling 10x	Roche, Mannheim, D
DIG-„labeled control“-RNA, 10 µg/ml	Roche, Mannheim, D
Di-Natriummethylenediamintetra-Acetat (EDTA)	Carl Roth GmbH, Roth, Karlsruhe, D
Di-Natriumhydrogenphosphat-dihydrat (Na ₂ HPO ₄ x 2H ₂ O)	Merck, Darmstadt, D
Denhardt`s-Lösung 100x	Eppendorf, Hamburg, D
dNTPs (dATP, dCTP, dGTP, dTTP, Endkonzentration 10 µM in A. bidest)	MBI Fermentas, St.Leon-Rot, D
Eisessig/Essigsäure	Carl Roth GmbH, Roth, Karlsruhe, D
Entellan	Merck, Darmstadt, D
Essigsäureanhydrid	Carl Roth GmbH, Roth, Karlsruhe, D
Ethanol, absolut	Carl Roth GmbH, Roth, Karlsruhe, D
Ethidiumbromid (C ₁₂ H ₂₀ BrN ₃ , EtBr); 10 mg/ml	Sigma-Aldrich Laborchemikalien GmbH, Seelze, D
Formaldehydlösung, 37%	Merck, Darmstadt, D
Glycerol	Carl Roth GmbH, Roth, Karlsruhe, D
Glycin	Carl Roth GmbH, Roth, Karlsruhe, D
Hefe-Extrakt	Becton, Dickinson & Company, Sparks, USA
Hefe-tRNA (10 mg/ml)	Roche, Mannheim, D
Heringspermien-DNA (10 mg/ml)	Promega, Mannheim, D
HiPerFect	Qiagen, Hilden, D
Isopropanol/2-Propanol	Carl Roth GmbH, Roth, Karlsruhe, D
Kaliumchlorid (KCl)	Merck, Darmstadt, D
Kaliumdihydrogenphosphat (KH ₂ PO ₄)	Merck, Darmstadt, D
Levamisol	Sigma-Aldrich Laborchemikalien GmbH, Seelze, D
Lipofectamine	Invitrogen GmbH, Karlsruhe, D
Lithiumchlorid (LiCl)	Carl Roth GmbH, Roth, Karlsruhe, D
Magermilchpulver	Sucofin, Zeven, D
Methanol	Carl Roth GmbH, Roth, Karlsruhe, D
3-[N-morpholino]propansulfonsäure (MOPS)	Carl Roth GmbH, Roth, Karlsruhe, D
Natriumazid (NaN ₃)	Carl Roth GmbH, Roth, Karlsruhe, D

Natriumchlorid (NaCl)	Fluka, Taufkirchen, D
Natriumdihydrogenphosphat (NaH ₂ PO ₄)	Merck, Darmstadt, D
Natriumdodezylsulfat (SDS)	Applichem, Darmstadt, D
Natriumhydroxid (NaOH)	Carl Roth GmbH, Roth, Karlsruhe, D
Natrumzitratedihydrat (C ₆ H ₅ Na ₃ O ₇ x 2H ₂ O)	Sigma-Aldrich Laborchemikalien GmbH, Seelze, D
NBT (50 mg Nitroblautetrazolium/ml 70% Dimethylformamid)	Roche, Mannheim, D
NBT/BCIP Stock-Solution	Roche, Mannheim, D
Paraformaldehyd (PFA)	Merck GmbH, Darmstadt, D
PonceauS	Sigma-Aldrich Laborchemikalien GmbH, Seelze, D
Saccharose	Carl Roth GmbH, Roth, Karlsruhe, D
Salzsäure (HCl)	Carl Roth GmbH, Roth, Karlsruhe, D
Silikonöl	Serva GmbH, Duisburg, D
SYBR®-GREEN I PCR Master Mix	Applied Biosystems, Foster City, CA, USA
Tetramethylethyldiamin (TEMED)	Sigma-Aldrich Laborchemikalien GmbH, Seelze, D
Triethanolaminhydrochlorid (C ₆ H ₁₅ NO ₃ HCl)	Carl Roth GmbH, Roth, Karlsruhe, D
Trishydroxyaminomethan (Tris)	Carl Roth GmbH, Roth, Karlsruhe, D
Triton X-100	Fluka/Sigma, Taufkirchen, D
Trypton	Becton, Dickinson & Company, Sparks, USA
Tween-20	Carl Roth GmbH, Roth, Karlsruhe, D
Wasserstoffperoxid (H ₂ O ₂)	Sigma-Aldrich Laborchemikalien GmbH, Seelze, D
Xylol	Carl Roth GmbH, Roth, Karlsruhe, D
Vectashield Eindeckmedium	Linaris Biologische Produkte GmbH, Wertheim - Bettingen, D
Ziegenserum („Normal goat serum“, NGS)	Dako Diagnostika GmbH, Hamburg, D

4.1.10. Lösungen und Puffer

Alkalische Phosphatase (AP)-Puffer	100 mM Tris 100 mM NaCl 50 mM MgCl ₂ pH 8,9
AP-Färbelösung	66 µl NBT-Lösung 33 µl BCIP-Lösung in 10 ml AP-Puffer
1% BSA/0,01% PBS-Azid	1% BSA (w/v) 0,01% Natriumazid (w/v) in 1x PBS
Coomassie-Proteingel-Färbung	0,5% (w/v) Coomassie brilliant blue R250 20% Eisessig 80% Ethanol
DNA-Ladepuffer Orange G (50 bp), 6×	0,2% (w/v) OrangeG 1% (w/v) SDS 50% (w/v) Saccharose Lösung in A. bidest
DEPC	0,1% DEPC in A. bidest, ü.N. rühren und anschließend autoklavieren.
0,5 M EDTA-Lösung	18,11 g EDTA × 2H ₂ O unter Rühren und Zuabe von 2N NaOH lösen und auf 1 l mit DEPC-behandeltem A. bidest auffüllen, pH 8
50 mM CaCl ₂ -Lösung	
0,1 M Glycin-Lösung	3,75 g Glycin in 500 ml 1× PBS lösen
50 mM Glycin in Ethanol	
Homogenisierungspuffer	280 mM Mannitol 10 mM HEPES 10 mM KCl 1 mM MgCl ₂ 0,1 mM Pefablock (1 ml einer 100 mM Stammlösung/500ml H ₂ O) 250 µl Proteinase-Inhibitor-Lösung/500 ml

Hybridisierungslösung	<p>5 ml 50%iges deionisiertes Formamid</p> <p>2 ml 50%iges Dexransulfat</p> <p>100 ml 100× Denhard`s Lösung</p> <p>0,5 ml Lachsspermien-DNA (10 mg/ml)</p> <p>0,25 ml Hefe-tRNA (10 mg/ml)</p> <p>1,3 ml 20× SSC (<i>“Sodium chloride/sodium citrate”</i>)</p> <p>ad 10 ml DEPC-behandeltes A. bidest,</p> <p>Lagerung bei –20 °C</p>
KCM-Lösung	<p>500 mM KCl</p> <p>100 mM $\text{CaCl}_2 \times 2\text{H}_2\text{O}$</p> <p>250 mM $\text{MgCl}_2 \times 6\text{H}_2\text{O}$</p> <p>ad 50 ml H_2O</p> <p>sterilfiltrieren, Lagerung bei 4 °C</p>
1M Levamisol-Lösung	2,4 ng/ml
4 mM LiCl-Lösung	
MOPS-Puffer, 10×	<p>41,9 g MOPS (säure-frei)</p> <p>6,8 g Natriumacetat</p> <p>20 ml 0,5 M EDTA, pH 8</p> <p>ad 1 l A. bidest, pH 7</p> <p>lichtgeschützt bei 4 °C lagern, nicht autoklavieren</p>
Paraformaldehyd-Lösung, 4 %ige	<p>4 % (w/v) Paraformaldehyd in 1× PBS bis max. 60 °C erwärmen und mit 1N NaOH klären und nach Abkühlung abfiltrieren</p>
PBS (<i>„Phosphat buffered saline“</i>) 10×	<p>2 g KCl</p> <p>2 g KH_2PO_4</p> <p>80 g NaCl</p> <p>11,5 g Na_2HPO_4</p> <p>ad 1 l A. bidest</p>
PBST	1x PBS unter Zugabe von 0,1% Triton X-100
PonceauS-Lösung	<p>0,25% PonceauS</p> <p>40% Methanol</p> <p>15% Eisessig</p>
Proteingel-Entfärbelösung	<p>10% Ethanol</p> <p>15% Eisessig</p>

Proteinproben-Puffer, 6×	62,5 mM Tris, pH 6,8 2% SDS 10% Glycin 5% β-Mercaptoethanol 0,001% Bromphenolblau
Puffer I	0,1M Tris 150 mM NaCl in A. bidest lösen und auf pH 7,5 einstellen, autoklavieren
Puffer III	100 mM Tris 100 mM NaCl 50 mM MgCl ₂ × 6H ₂ O ad 500 ml H ₂ O, pH 9,5 nicht autoklavieren
RNA-Gel-Laufpuffer	100 ml 10x RNA-Gel-Puffer 120 ml 37%ige Formaldehyd-Lösung 880 ml DEPC-behandeltes A. bidest
RNA-Gel-Puffer, 10×	200 mM MOPS 50 mM Natriumacetat 20 ml 0,5 M EDTA, pH 8 ad 1 l DEPC-behandeltes A. bidest, pH 7
RNA-Probenpuffer, 6×	25 mg Bromphenolblau 80 µl 0,5 M EDTA, pH 8 750 µl 37% Formaldehyd 2 ml Glycerol 3084 µl Formamid 4 ml 10× MOPS-Puffer ad 10 ml A. bidest
Sammelgel-Puffer	4× Tris/HCl, pH 6,8 6,05 g Tris in 40 ml A. bidest lösen und auf pH 6,8 mit HCL einstellen, hiernach durch Ø 0,45 µm Einmalfilter filtrieren und 0,4 g SDS zugeben
SDS-Elektrophorese-Puffer, 5×	15,1 g Tris 72 g Glycin 5 g SDS ad 1 l A. bidest, pH 8,3

1% SDS/0,01% PBS-Azid	1% SDS (w/v) 0,01% Natriumazid (w/v) in 1x PBS
20× SSC-Lösung	87,5 g NaCl 44,1 g Natriumcitrat in 500 ml A. bidest lösen und mit Zitronensäure auf pH 7 einstellen
TAE-Puffer, 50×	242 g Tris 57,1 ml Eisessig 100ml 0,5 M EDTA, pH 8 ad 1 l A. bidest
TE-Puffer	0,6 g Tris 019 g EDTA in 500 ml A. bidest lösen und pH 8 einstellen
0,1 M Trap-Puffer	9,3 g Triethanolaminhydrochlorid in 500 ml A. bidest lösen und auf pH 8 einstellen
Transfer-Puffer	0,25 M Tris 0,19 M Glycin 10% Methanol pH 8,4–8,6 mit konzentrierter HCl einstellen
Trenngel-Puffer	4× Tris/HCl pH 8,8 91 g Tris in 300 ml A. bidest lösen und pH 8,8 einstellen. Lösung auf 500 ml auffüllen und mit Ø 0,45 µm Einmalfilter sterilfiltrieren, hiernach 2 g SDS zugeben (0,4%)
10× TTBS	1 M Tris 1,5 M NaCl 1% Tween-20 pH 7,5 durch 37%ige HCl (ca. 60-70 ml/l) einstellen

4.1.11. Verbrauchsmaterialien

Deckgläschen, Ø 12 mm	Menzel-Gläser, Braunschweig, D
Easy Flask 75 Filt und 25 Filt	Nunc™, Roskilde, Dänemark
Einmalküvetten (1,5 ml)	Brand GmbH & Co KG, Wertheim, D
Falcon-Röhrchen, 15 ml und 50 ml	Falcon/Becton Dickinson, Heidelberg, D
Kammerkulturplatten, 24 und 48 well plates	Falcon/Becton Dickinson, Heidelberg, D
Kryoröhrchen, 2 ml	Carl Roth GmbH, Roth, Karlsruhe, D
MicroAmp™Fast Optical Adhesive Film	Applied Biosystems, Foster City, CA, USA
MicroAmp™Fast Optical 96 well Reaction Plate	Applied Biosystems, Foster City, CA, USA
Nitrozellulose Hybond N+Membran	Amersham Bioscience, Freiburg, D
Objektträger	Carl Roth GmbH, Roth, Karlsruhe, D
Objektträger <i>SuperFrostPlus</i>	Menzel, Braunschweig, D
Parafilm'M®LaboratoryFilm	American National CAN, Chicago, IL, USA
Pasteur-Pipetten, 230 mm	Pasteurpipetten, Glas WU, Mainz
PCR-Softtubes, 0,2 ml	Biozym Scientific GmbH, Hess. Oldendorf, D
Petrischalen, Ø 10 cm	Greiner, Bio-one GmbH, Frickenhausen, D
PVDF-Membran	Amersham Bioscience, Freiburg, D
Röntgenfilm X-Omat Blue	Kodak/PerkinElmer Life and Analytical Sciences, Mailand, Italien
SafeLock-Reaktionsgefäße, 0,5 ml; 1,5 ml und 2 ml	Eppendorf, Hamburg, D
Sterilfilter Ø 0,22 µm und Ø 0,45 µm	Sartorius
Whatman-Vliespapier	Schleicher & Schuell Biosciences GmbH, Whatman Group, Dassel, D
Zellkulturschalen, Ø 30 mm	Nunc™, Roskilde, Dänemark

4.1.12. Geräte

Autoklav 5050 ELV	Systemec GmbH, Wettenberg, D
Binokular	Wild M3Z, Heerbrugg, CH
BioPhotometer	Eppendorf AG, Hamburg, D
Brutschrank InCuSafe Co ₂ Inkubator	Sanyo FISCHER Sales GmbH, München, D
Centrifuge 5804R	Eppendorf, Hamburg, D
Einbettautomat Leica ASP200	Leica Mikrosystems GmbH, Wetzlar, D

Elektrophoresekammer 41-2025	PeqLab Biotechnologie GmbH, Erlangen, D
Fluoreszenzmikroskop ECLIPSE E600	Nikon GmbH, Düsseldorf, D
FACS („ <i>Fluorescence activated cell sorter</i> “)	Core Facility, ZFK Freiburg, D
Gelimager Classico Uno	Intas, Göttingen, GmbH, D
Heizblock neoBlock II	NeoLab Migge Laborbedarf-Vertriebs GmbH, Heidelberg, D
Homogenisator Ultra-Turrax	IKA Labortechnik AG, Liiau, D
Horizontalschüttler Polymax 1040	Heidolph Elektro GmbH % Co KG, Kelheim, D
Hybridisierungssofen Thermo Hyoid	Thermofischer Scientific GmbH, Ulm, D
Shak'n'Stack	
Kühlzentrifuge 5417R (Rotor FA 45-24-11)	Eppendorf AG, Hamburg, D
Mikroskop Stemi DV4	Carl Zeiss GmbH, Jena, D
Mini-PROTEAN® Elektrophorese-Zelle	BioRad Laboratories GmbH, München, D
Neubauerzählkammer „ <i>improved</i> “	Laboroptik GmbH, Friedrichsdorf, D
Paraffinausgießstation EG 1150C	Leica Mikrosystems GmbH, Wetzlar, D
pH-Meter pH526 Multical	WTW, Weilheim, D
Power Supply Standard Power Pack P25	Biometra, München, D
„ <i>Real-Time</i> “-PCR Cyclyer ABI7500	Applied Biosystems, Foster City, CA, USA
Rollschüttler CAT RM5	NeoLab, Migge Laborbedarf-Vertriebs GmbH, Heidelberg, D
Rotationsmikrotom RM2125RT	Leica Mikrosystems GmbH, Wetzlar, D
Rotationsschüttler Unitron	Infors AG, Bottmingen, D
Sterilbank Heraeus HeraSafe	Kendro Laboratory Products GmbH, Langenselbold, D
Termocycler Mastercycler personal	Eppendorf AG, Hamburg, D
Ultrazentrifuge Sorvall Evolution RC (Rotor Sorvall SLA-1500 SuperLite)	Kendro Laboratory Products GmbH, Langenselbold, D
Ultraschallgerät Sonoplus	Bandelin electronics, Berlin, D
Wärmeschrank Modell 600	Memmert GmbH & Co. KG, Schwabach, D

4.2. Methoden

4.2.1. Mikrobiologische Methoden

4.2.1.1. Herstellung von Bakterienkulturplatten

Zur Herstellung von Bakterienkulturplatten wurden 500 ml Luria-Bertani-(LB)-Medium (1% Trypton, 0,5% Hefeextrakt, 1% NaCl, 1,5% Agar-Agar) nach dem Autoklavieren auf circa 60 °C abgekühlt. Sofern die Kulturplatten zur Selektion von transformierten *E. coli DH5α*, welche eine plasmid-kodierte Ampicillin-(Amp)- oder Kanamycin-(Km)-Resistenz trugen, bestimmt waren, wurden dem Plattenmedium vor dem Gießen 500 µl einer Amp-Stammlösung (100 mg/ml A. bidest, sterilfiltriert) bzw. 500 µl einer Km-Stammlösung (50 mg/ml A. bidest) zugefügt und diese gleichmäßig im Medium verteilt. Das Medium wurde anschließend auf Plastik-Petrischalen (Ø 10 cm) aufgeteilt und die Platten hiernach verschlossen. Bis zur Verwendung wurden die Kulturplatten nach dem vollständigen Erkalten bei 4 °C gelagert.

4.2.1.2. Herstellung chemisch kompetenter *E. coli DH5α*-Zellen

Zur Herstellung chemisch kompetenter *E. coli*-Zellen des Stammes *DH5α* wurde mittels einer abgeflamten Impföse einem Glycerol-Stock dieses Bakterienstammes eine geringe Menge entnommen und diese durch Dreistrich auf einer LB-Kulturplatte verteilt. Die Platte wurde anschließend bei 37 °C ü. N. im Brutschrank inkubiert. Eine Einzelkolonie der Plattenkultur wurde zur Beimpfung von 3 ml LB-Flüssigkulturmedium in einem 15 ml Falcon-Röhrchen verwendet und die Vorkultur bei 37 °C bei 150 Upm ü. N. inkubiert. Am folgenden Tag wurden 100 ml LB-Flüssigkulturmedium mit 1 ml der Vorkultur inokuliert und diese bis zum Erreichen einer Optischen Dichte (OD) von 0,3–0,4 bei einer Wellenlänge von $\lambda = 600$ nm bei 37 °C und 150 Upm für circa 3–4h kultiviert. Die Kultur wurde nun in zwei vorgekühlte 50 ml Falcon-Röhrchen überführt. Im Anschluss hieran wurden die Bakterien durch Zentrifugation bei 3500 Upm für 10 min bei 4 °C sedimentiert und auf Eis gestellt. Das LB-Kulturmedium wurde vollständig dekantiert und die beiden Zellpellets in jeweils 50 ml einer 50 mM CaCl_2 -Lösung durch vorsichtiges Auf- und Abpipettieren vollständig resuspendiert. An eine 20minütige Inkubation der Zellsuspension auf Eis schloss sich eine erneute Zentrifugation bei 3500 Upm bei 4 °C für 10 min an. Nach Sedimentierung der Zellen wurde der Überstand verworfen und die beiden Pellet zusammen in 9 ml eiskalter 50 mM CaCl_2 -

Lösung aufgenommen. Der Bakteriensuspension wurde nun Glycerol bis zu einem Anteil von 15% des Gesamtvolumens zugefügt und durch Schwenken im Ansatz verteilt. Die Zellen wurden für weiter 20 min auf Eis belassen und anschließend zu je 100 µl in sterile, vorgekühlte 1,5 ml Eppendorf-Reaktionsgefäße aliquotiert. Nach Schockgefrieren der Zellen in flüssigem N₂ wurden diese bei –80 °C gelagert.

4.2.1.3. Transformation chemisch kompetenter *E. coli DH5α* Zellen

Die Transformation chemisch kompetenter *E. coli DH5α* Zellen erfolgte durch Anwendung des Hitzeschockverfahrens. Hierzu wurde pro Transformationsansatz ein 100 µl Aliquot kompetenter *E. coli DH5α*-Zellen (Punkt 4.2.1.2., Seite 39) langsam auf Eis aufgetaut. Für Retransformationen wurden zu den Zellen 30 ng Plasmid-DNA zugegeben, für Transformationen durch Ligationsansätze wurden von diesem 10 µl zugesetzt. Des Weiteren wurden den Transformationsansätzen jeweils 20 µl einer 5fach konzentrierten KCM-Lösung sowie 70 µl autoklaviertes A. bidest zugefügt und die Ansätze durch leichtes Schwenken gemischt. Hiernach wurden die Zellen für 30 min auf Eis belassen. Die Aufnahme der Plasmid-DNA erfolgte durch einen Hitzeschock bei 42 °C für 45 s im Heizblock. Anschließend wurden die Ansätze für 1 min auf Eis abgekühlt. 1 ml auf 37 °C vorgewärmtes LB-Flüssigkulturmedium wurde nun zu den Transformationsansätzen pipettiert und die Ansätze bei 37 °C und 65 Upm im Schüttler für 1h inkubiert. Nach Ablauf der Inkubation wurden die Zellen bei 300 Upm für 5 min bei RT abzentrifugiert und der Überstand bis auf 200 µl abgenommen. In dem verbleibendem Medium wurden die sedimentierten Zellen resuspendiert und auf geeignete Selektivkulturplatten ausplattiert. Die Kultivierung der Platten erfolgte ü. N. bei 37 °C im Brutschrank.

4.2.2. Methoden der eukaryontischen Zellkultur

4.2.2.1. Kultivierung und Passage der Zelllinie *MN9D*

Zur Kultivierung der murinen Zelllinie *MN9D* wurde DMEM-F12-Minimalmedium unter Zusatz von 5% fetales Kälberserum („*Fetal calf serum*“, FCS) und 50 µg/ml Genitacin verwendet. Die Zellen wurden in 20 ml dieses Mediums in unbeschichteten 75 cm²-Zellkulturflaschen unter physiologischen Bedingungen, d. h. bei 37 °C, 5% CO₂, 95% Luft und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 100%, in einem Brutschrank kultiviert. Eine Passagierung der Zellen wurde nach Erreichen einer Zellkonfluenz von circa 80% der

Wachstumssoberfläche vorgenommen. Hierzu wurde das Medium mit einer sterilen Pasteur-Pipette, welche mit einer Pumpe verbunden war, vorsichtig abgesogen. Zur Ablösung der Zellen vom Boden der Kulturflasche wurden 3 ml einer 0,15%igen Trypsin-/Ethylendiamintetraacetat-(EDTA, 0,02%)-Lösung auf den Zellen gleichmäßig verteilt und diese bei 37 °C für circa 3 min im Brutschrank inkubiert. Die enzymatische Ablösung der *MN9D*-Zellen wurde durch Zugabe von 9 ml Kulturmedium inhibiert. Der Boden der Kulturflasche wurde mehrmals durch Auf- und Abpipettieren des Mediums abgespült, und die Zellsuspension in ein steriles 15 ml Falcon-Röhrchen überführt. Nach Zentrifugation bei RT für 5 min und 100 Upm wurde der Überstand vorsichtig abgesogen und das gewonnene Zellpellet in 5 ml Medium resuspendiert. In eine 75 cm²-Zellkulturflasche wurden 20 ml des im Wasserbad auf 37 °C temperierten Kulturmedium vorgelegt und 500 µl der Zellsuspension zugegeben. Die weitere Kultivierung der Zellen erfolgte unter den zuvor beschriebenen physiologischen Bedingungen.

Für die im Rahmen dieser Arbeit vorgenommenen Transfektionen wurde eine Passagenzahl von 20 nicht überschritten, um ein Vorliegen spontan differenzierter *MN9D*-Zellen in der Kultur zu vermeiden. Sofern eine genaue Bestimmung der Zellzahl erforderlich war, wurde diese unter Verwendung einer Neubauer-Zählkammer ermittelt. Hierzu wurden die Kammer mit 10 µl einer homogenen Einzelzellsuspension, basierend auf den zwischen Deckglas und Kammer herrschenden Kapillarkräften, befüllt. Anschließend wurden vier Großquadrate der Zählkammer, bestehend aus jeweils 16 Kleinstquadraten, mäanderförmig ausgezählt. Die Zellzahl pro ml ergibt sich aus dem Mittelwert für ein Großquadrat multipliziert mit dem Kammerfaktors 10⁴/ml. Für Transfektionen wurden die Zellen in einer Zelldichte von 1×10⁶ in 7,5 ml Kulturmedium in 25 cm² Zellkulturflaschen unter den oben angegebenen Bedingungen kultiviert.

4.2.2.2. Kryokonservierung und Auftauen von eukaryontischen Zellen

Zur dauerhaften Zellkonservierung der Zelllinie *MN9D* wurden diese wie unter Punkt 4.2.2.1. (Seite 40) dargelegt durch Trypsinierung vom Boden der Kulturflasche abgelöst. Nach Zentrifugation der Zellen wurden diese in 10 ml DMEM-F12-Medium (5% FCS, 50 µg/ml Genitacin) gewaschen und bei 1000 Upm und RT für 5 min abzentrifugiert. Das Zellpellet wurde in 5 ml DMEM-F12-Medium ohne Zusätze resuspendiert und nach Bestimmung der Zellzahl letztere auf eine Dichte von 1×10⁶ Zellen pro ml Medium eingestellt. In 2 ml Kryoröhrchen wurde nun 1 ml des 2fach konzentrierten Einfriermediums (20% Dimethylsulfoxid (DMSO), 40% FCS in DMEM-F12) vorgelegt und 1 ml der Zellsuspension zugegeben. Die Röhrchen wurden verschlossen und 2 h bei -20 °C in einem mit

Isopropanol gefülltem Einfrierbehälter heruntergekühlt. Im Anschluss hieran wurden die Zellen ü. N. bei $-80\text{ }^{\circ}\text{C}$ gelagert und am darauffolgenden Tag in flüssigem N_2 gelagert.

Um *MN9D*-Zellen in Kultur zu nehmen, wurden diese zügig im Wasserbad aufgetaut und direkt in eine mit 7,5 ml DMEM-F12 (5% FCS, 50 $\mu\text{g}/\text{ml}$ Genitacin) gefüllte 25 cm^2 -Kulturflasche überführt. Nach Anheftung der Zellen wurde das Kulturmedium ausgewechselt, um das DMSO aus der Kultur zu entfernen.

4.2.2.3. Transiente Transfektion von *MN9D*-Zellen durch Lipofectamine

Die Untersuchung der regulatorischen Einflussnahme des Transkriptionsfaktors Sim1 auf die Expression von Genen, die in die Entwicklung serotonerger Neurone und ihrer terminale Differenzierung involviert sind, wurde *unter Verwendung des MN9D-Zellkulturmodells* durch Transfektion des Überexpressionsplamides *pcDNA3::Sim1 in vitro* analysiert. Zur transienten Transfektion der *MN9D*-Zellen wurden diese am Vortag der Transfektion in einer Zelldichte von 1×10^6 Zellen pro 7,5 ml in einer 25 cm^2 -Kulturflasche ausgesät und unter physiologischen Bedingungen kultiviert. Je Zeitpunkt der beabsichtigten Probennahme (24 h, 48 h und 72 h nach der Transfektion) und des zu verwendenden Plasmides (*pcDNA3* bzw. *pcDNA3::Sim1*) wurden zwei Kulturflaschen angesetzt. Am nächsten Tag wurde das Kulturmedium gegen 7,5 ml DMEM-F12-Medium ohne Zusätze ausgetauscht und die Zellen im Brutschrank bis zur Transfektion belassen. Für jede Flasche wurden die Transfektionsreagenzien, wie im Folgenden beschrieben, angesetzt. Zu 750 μl Opti-MEM in einem sterilen 1,5 ml Eppendorf-Reaktionsgefäß wurden 6 μg der Plasmid-DNA gegeben und der Ansatz gemischt. In 750 μl Opti-MEM wurden 30 μl des zuvor gründlich gemischten Lipofectamin sorgfältig suspendiert. Nach einer Inkubation von 5 min bei RT wurden beide Ansätze zusammengefügt und für weitere 20 min bei RT zur Bildung von Liposomen-/DNA-Komplexen belassen. Das Transfektionsgemisch wurde anschließend zu den Zellen gegeben und durch Schwenken im Medium verteilt. Die Aufnahme der Plasmid-DNA durch Endozytose erfolgt innerhalb einer vierstündigen Inkubation im Brutschrank. Nach Ablauf dieser Zeit wurde das Medium abgesogen und durch DMEM-F12 (5% FCS, 50 $\mu\text{g}/\text{ml}$ Genitacin) ersetzt. Zum Zeitpunkt der Probennahme wurden die Zellen von je zwei Kulturflaschen, welche mit *pcDNA3* als Kontrollprobe bzw. mit *pcDNA3::Sim1* transfiziert worden waren, wie unter Punkt 4.2.2.1. (Seite 40) beschrieben trypsiniert. Nach Zentrifugation und Verwerfen des Überstandes wurden die Zellen in 10 ml PBS gewaschen und erneut bei 1000 Upm, bei $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ für 5 min sedimentiert. Das Zellpellet wurde anschließend in 3 ml PBS aufgenommen. 1 ml der Zellsuspension wurde für die Isolation von Gesamt-RNA verwendet und hierzu bei 1000 Upm, bei $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ für 5 min sedimentiert. Die

Isolation der Gesamt-RNA erfolgte wie unter Punkt 4.2.6.4. (Seite 61) beschrieben. 2 ml der Zellsuspension wurden in ein 15 ml Falcon-Röhrchen überführt und wie unter Punkt 4.2.8.1. (Seite 75) erläutert zur Isolation von Gesamt-Protein eingesetzt.

4.2.2.4. Liposomen vermittelte Einbringung von „*short interfering*“-RNA in Zellen der eukaryontischen Zelllinie *MN9D*

RNA-Interferenz (RNAi) bietet die Möglichkeit, spezifisch die Expression eines zu untersuchenden Gens in Zellkulturmodellen herunterzuregulieren. Diese „*Loss-of-function*“-Technik kann Hinweise auf die jeweilige Funktion des Gens liefern, da hierdurch der Einfluss des herabregulierten Gens auf nachgeschaltete Gene analysiert werden kann. Die am häufigsten angewendete Methode der RNAi-Technik bedient sich der Transfektion von Zellen mit kurzen, doppelsträngigen RNA-Molekülen. Diese RNA-Moleküle werden als „*short interfering*“-RNA bezeichnet (siRNA). Die siRNA wird in einen Proteinkomplex aufgenommen, dem RNA induzierten *Silencing*-Komplex („*RNA induced silencing complex*“, RISC). In der Folge leitet der „*anti-sense*“-Strang den Proteinkomplex RISC zur komplementären mRNA, die anschließend abgebaut wird. Durch den Abbau der mRNA wird die Translation und somit die Bildung des spezifischen Genproduktes verhindert. Wichtig bei der Auswahl der Sequenz des siRNA-Moleküls ist es, dass der „*sense*“-Strang nicht mit mRNA anderer Gene interagieren kann und somit nicht unbeabsichtigte Nebeneffekte ausgelöst werden. Im Rahmen dieser Arbeit sollte die Expression des für den Transkriptionsfaktor *Sim1* kodierenden Gens in *MN9D*-Zellen durch spezifische siRNA herunterreguliert werden. Hierzu wurden *MN9D*-Zellen in einer 75 cm²-Kulturflasche, wie unter Punkt 4.2.2.1. (Seite 40) beschrieben, durch Trypsinierung vom Boden der Kulturflasche abgelöst. Nach Sedimentierung und Suspendierung der Zellen in 10 ml DMEM-F12-Kulturmedium (5% FCS und 50 µg/ml Genitacin) wurde mittels einer Neubauer-Zählkammer (*improved*) die Zellzahl bestimmt. Jeweils 1×10⁶ Zellen wurden in eine 25 cm²-Zellkulturflasche ausgesät und für 2 h unter physiologischen Bedingungen inkubiert, um ein Anheften der Zellen an die Oberfläche des Kulturbodens zu ermöglichen. Zur Transfektion wurde eine *Sim1*-spezifische siRNA (siehe Punkt 4.1.4., Seite 27), welche durch das Fluorophor Cyanin-5 (Cy5) markiert war, sowie eine Kontroll-siRNA (Ctr-siRNA), welche Alexa-488 gebunden vorlag, eingesetzt (siehe Punkt 4.1.4., Seite 27). Die Sequenz der Ctr-siRNA weist keinerlei Homologie zu bekannten Genen der Säuger auf. Je zu verwendender siRNA wurden sechs Kulturflaschen angesetzt. Pro Kulturflasche wurde in einem 1,5 ml Eppendorf-Reaktionsgefäß 1 ml DMEM-F12 ohne weitere Zusätze vorgelegt. Als Transfektionsreagenz wurde HiPerFect verwendet. Nach gründlichem Vortexen des

Reagenz wurden von diesem 30 µl in das vorgelegte Medium pipettiert und dieses sofort gründlich gemischt. Hierzu wurden 30 µl einer kurz vor Verwendung angesetzten 1:10 Verdünnung einer 20 µM siRNA-Stammlösung in A. bidest hinzugefügt, dies entspricht 750 ng siRNA. Der Transfektionsansatz wurde erneut gevortext und schließlich für 25 min bei RT belassen. Im wässriger Lösung bilden die kationischen Lipide des Transfektionsreagenz Komplexe mit den siRNA-Molekülen welche endozytotisch durch die Zellen aufgenommen werden. Nach Ablauf der Inkubationszeit wurde der Transfektionsansatz langsam auf die Zellen aufgetropft. Um einen optimalen Kontakt der Zellen zum Transfektionsansatz zu erreichen, wurde beim Auftropfen die Kulturflasche schräg gehalten. Im Anschluss wurden die Zellen wieder in horizontaler Lage der Kulturflasche unter normalen, physiologischen Bedingungen für 24 h kultiviert. Ein Mediumwechsel nach der Transfektion war nicht erforderlich. 24 h nach der Transfektion wurden die Zellen, wie unter Punkt 4.2.2.1. (Seite 40) erläutert, geerntet und die Gesamt-RNA der Zellen zur Analyse der Genexpression isoliert (Punkt 4.2.6.4, Seite 61).

4.2.3. Techniken der Primärkultur

4.2.3.1. Präparation des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12)

Um die Entwicklung serotonerger Neurone des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus genauer studieren zu können, wurde zunächst ein *in vitro*-Zellkulturmodell dieses Gehirnbereiches des Embryonaltages (E)12 etabliert. Ausgangspunkt hierzu war die Präparation des ventralen rostralen Rhombencephalon von Embryonen der Maus (E12) der Mauslinie *NMRI* („*Naval Medical Research Institute*“). Diese Mauslinie wurde an der Tierexperimentelle Einrichtung des Universitätsklinikums, Göttingen gehalten und terminiert verpaart. Nach Verpaarung wurden die Weibchen auf die Bildung des vaginalen „Plug“ getestet. Ein positives „Plug“-Ergebnis wurde mit dem Embryonalstadium (E) 1 gleichgesetzt. Am errechneten Embryonaltag 12 wurden trächtige Weibchen durch Genickbruch getötet und im direkten Anschluss die Embryonen entnommen. Hierzu wurde zunächst die Bauchwand des Muttertieres durch 70%iges Ethanol gesäubert und die Haut im Bereich des Abdomens circa 2 cm weit aufgeschnitten ohne hierbei das darunter liegende Peritoneum zu verletzen. Dieses wurde mit einer sterilen Pinzette gefasst und leicht angehoben, so dass während der Durchtrennung des Bauchfells mit einer sterilen Schere der Darm nicht verletzt wurde. Innere Organe und Fettgewebe wurden zu Seite geschoben und der Uterus freigelegt. Durch leichtes Anheben eines Uterusschenkels mit der Pinzette konnte die Uterusverankerung lokalisiert und durchtrennt werden, wodurch der Uterus komplett entnommen werden konnte. Der Uterus wurde nun in ein mit Calcium-

sowie Magnesium-freiem „*Hank's balanced salt solution*“ (mit 0,04% Natriumbicarbonat, CMF) gefülltes und auf Eis vorgekühltes 50 ml Falcon-Röhrchen überführt. Zur Entnahme der Embryonen wurde eine Ø 10 cm-Petrischale mit kaltem CMF befüllt, die Unterusschenkel hierin überführt und jeweils ein kleiner Schnitt in die Uteruswandung gesetzt. Die Embryonen wurden leicht aus dem Uterus herausgeschoben und das Amnion entfernt. In dieser Weise isolierte Embryonen wurden in frischem, kaltem CMF gesammelt. Zur Präparation des ventralen rostralen Rhombencephalon wurde, wie Abb. 4A (Seite 46) zeigt, eine sterile Glasplatte mit einigen Tropfen CMF benetzt und ein Embryo darauf gelegt. Die Präparation wurde unter einem Binokular durchgeführt. Die Meningen wurden entfernt und knapp kaudal des Isthmus, welcher anhand einer Gewebeseinschnürung zwischen Mesencephalon und Rhombencephalon zu erkennen ist, ein circa 3 mm langer Schnitt zum Embryo hin gesetzt (Abb. 4B). Zur Erleichterung der weiteren Präparationsschritte wurde das Mesencephalon leicht nach vorne geschoben. Der zweite Schnitt wurde circa 1 mm kaudal des ersten Schnittes geführt, was im Gewebe etwa der Höhe des 4. Rhombomers (R) entspricht. Hiernach wurde die geschlossene Schere auf der ventralen Seite des durch beide Schnitte vom umgebenden Gehirngewebe getrennten Bereiches angesetzt und vorsichtig der Gewebeabschnitt herausgeschoben. Der herausgelöste Gehirnbereich wurde im Anschluss hieran auf die Seite gedreht. Hierdurch ließ sich, wie in Abb. 4C dargestellt, das Neuralrohr deutlich als ringförmige Struktur erkennen. Das Neuralrohr wurde dorsal geöffnet und bis auf den Bereich der ventralen Grundplatte das angrenzende Gewebe entfernt (Abb. 4D). Das ventrale Gewebestück wurde vorsichtig mit der Pinzette in ein mit CMF gefülltes 15 ml Falcon-Röhrchen überführt. Die innerhalb einer Stunde präparierten Gewebestücke des ventralen rostralen Rhombencephalon wurden auf Eis gesammelt und sedimentierten am Boden des Falcon-Röhrchens.

Abb.4: Präparation des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus des Embryonaltages 12 (E12). **A:** Lateralansicht eines isolierten Mausembryos (E12) nach Entfernung der Meningen. **B:** Der erste Schnitt (Pfeil) wird knapp kaudal des Isthmus gesetzt, der zweite Schnitt (gestrichelte Linie) erfolgt circa 1 mm caudal des 1. Schnittes zum Embryo hingerrichtet. Das Gewebestück, welches das rostrale Rhombencephalon umfasst, wird mittels Präparationsschere ausgehend von der ventralen Seite herausgeschoben. **C:** Aufsicht auf den Neuralrohrabschnitt des rostralen Rhombencephalon. Angedeutet ist der die Vorläuferzellen enthaltene Gewebebereich beiderseits der ventralen Mittellinie, der nach Öffnung des Neuralrohres (**D**) isoliert wird. (Isthmus: Isth, Mesencephalon: Mes, Rhombencephalon: Rhom)

4.2.3.2. Silikonisierung von Pasteur-Pipetten

Um eine Zerstörung sowie ein Anheften der Zellen während ihrer Isolierung aus primärem Gewebe des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12) oder während der Aufarbeitung aus diesen Zellen gebildeter primärer Neurospheres zu verhindern, wurden die zur Titrierung eingesetzten Pasteur-Pipetten silikonisiert. Hierzu wurden diese mit der kleinen Öffnung nach oben gerichtet in einen 250 ml-Glaszylinder gestellt und dieser mit Silikonöl gefüllt, bis die Pasteur-Pipetten vollständig bedeckt waren. Nach 10 min wurde das wiederverwendbare Silikonöl abgossen und die Pasteur-Pipetten fünfmal mit A. bidest

gewaschen. Die Trocknung der Pasteur-Pipetten erfolgte ü. N. bei 50 °C im Wärmeschrank. Zur Einbrennung der Silikonbeschichtung wurden die Pipetten anschließend bei 150 °C für eine Stunde gebacken. Nach Abkühlung wurden die weiten Pipettenenden mit Watte gestopft und autoklaviert.

4.2.3.3. Aufarbeitung embryonalen Gewebes (E12) des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus zur Gewinnung einer Einzelzellsuspension

Zur Gewinnung einer Einzelzellsuspension aus dem Gewebe des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12) wurden die in eisgekühltem CMF in einem 15 ml-Falcon-Röhrchen gesammelten Gewebestücke zunächst durch Zentrifugation für 5 min bei 1000 Upm und 4 °C sedimentiert. Der Überstand wurde vorsichtig mit einer sterilen, silikonisierten Pasteur-Pipette, deren Öffnung zuvor durch Abschmelzen in der Flamme von scharfen Unebenheiten befreit worden war, abgesogen. Die Auflockerung der Gewebestruktur erfolgte durch enzymatischen Verdau des Gewebes in 300-500 µl einer 0,15%igen Trypsin-/EDTA-(0,02%)-Lösung, je nach Menge des vorliegenden Gewebes, bei 37 °C im Wasserbad für 15 min. Die Inaktivierung des Trypsins erfolgte durch Zugabe von 500 µl fetalem Kälberserum (FCS). Durch den enzymatischen Verdau freigesetzte genomische DNA wurde durch Zugabe von 10 µl DNase-Lösung (10 mg/ml Stammlösung) abgebaut. Eine silikonisierte, sterile Pasteur-Pipette wurde unmittelbar am Beginn des dünnen Schaftes abgebrochen und die Bruchstellen in einer Flamme glatt geschmolzen. Diese Pipette diente zur gleichmäßigen Durchmischung der Trypsin-Lösung, der darin enthaltenen Gewebestücke und des zugegebenen FCS sowie der DNase-Lösung durch zweimaliges, vorsichtiges Titrieren des Gemisches. Das Falcon-Röhrchen wurde nun für 8 min auf Eis gestellt, währenddessen die Gewebestücke zum Boden absinken konnten. Der Überstand wurde vorsichtig abgesogen und verworfen. Nachdem das Pellet in 1 ml FCS, 2 ml CMF und 10 µl DNase-Lösung gelöst wurde, konnte anschließend mit der mechanischen Vereinzelung der Zellen aus dem Gewebeverband begonnen werden. Hierzu wurden die Gewebestücke mit der gesamten sie umgebenden Flüssigkeit langsam durch den schmalen Schaft der silikonisierten Pasteur-Pipette aufgezogen und vorsichtig zurück in das Falcon-Röhrchen gegeben. Dabei war darauf zu achten, dass keine Schaumbildung auftrat. Dieser als Titrierung bezeichnete Vorgang wurde 8mal wiederholt und anschließend das Röhrchen wiederum für 8 min auf Eis belassen. In dieser Zeit sanken die schwereren Gewebestücke zum Boden des Falcon-Röhrchens; wohingegen Einzelzellen im Überstand verblieben. Dieser Überstand wurde abgehoben und in ein vorgekühltes 15 ml-Falcon-Röhrchen überführt. Beginnend mit der Zugabe von FCS, CMF und DNase-Lösung

auf das verbleibende Pellet wurden die oben aufgeführten Schritte erneut zweimal durchgeführt und alle Überstände zusammen in einem Falcon-Röhrchen gesammelt. Nach insgesamt drei Titruierungsgängen waren in der Regel keine weiteren Gewebestücke mehr zu erkennen, wodurch auf eine erneute Trypsinierung verzichtet wurde. In seltenen Fällen, in denen noch Restgewebe vorlag, wurde der Vorgang mit einer zusätzlichen Inkubation in Trypsin-/EDTA-Lösung wieder aufgenommen. Die gesammelten Überstände, welche die gewonnenen Einzelzellen enthielten, wurden bei 4 °C, 1000 Upm für 10 min abzenrifugiert. Der Überstand wurde verworfen und das Zellpellet in serum-freien DMEM-F12-Komplettmedium (siehe Punkt 4.1.2., Seite 24) suspendiert und zentrifugiert. Dieser Vorgang wurde nochmals durchgeführt um das FCS vollständig zu entfernen. Nach erneuter Zentrifugation wurden die Zellen in 3 ml DMEM-F12-Komplettmedium aufgenommen und die Zellzahl pro ml, wie unter Punkt 4.2.2.1. (Seite 40) erläutert, in einer Neubauer-Zählkammer bestimmt.

Für Experimente an direkt ausplattieren Zellen des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12) wurde die Zellzahl auf 2×10^5 Zellen/100 µl DMEM-F12-Komplettmedium eingestellt. Die Zellsuspension wurde nun auf PORN-/Laminin-beschichtete Ø 12 mm-Deckgläschen gleichmäßig aufgetropft. Um die Handhabung zu erleichtern wurden die Deckgläschen vor dem Auftropfen der Zellsuspension auf umgekehrte, sterile Abschlussdeckel von Eppendorf-Reaktionsgefäßen, welche in sterilen Ø 10 cm-Petrischalen verteilt wurden, ausgelegt. Zur Ermöglichung der Anheftung der Zellen an die beschichtete Oberfläche der Deckgläschen wurden die Zellen für 1 h im Brutschrank inkubiert. Hiernach wurden sie mit den Deckgläschen in eine mit je 650 µl DMEM-F12-Komplettmedium pro Kammer befüllte, vorgewärmte 24-Kammerkulturplatte gelegt und in den Brutschrank zurückgestellt.

4.2.3.4. Generierung primärer Neurospheres des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12)

Zur Bildung von primären Neurospheres wurden, wie unter Punkt 4.2.3.3. (Seite 47) angegeben, die gesammelten Überstände bei 1000 Upm und 4 °C für 10 min abzentrifugiert und die isolierten Einzelzellen aus dem ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12) in 3 ml serumfreien DMEM-F12-Medium unter Zusatz von jeweils 20 ng/ml der Mitogene Fgf2 („*Fibroblast growth factor 2*“) und Egf („*Epidermal growth faktor*“) suspendiert. Hiernach wurde die Zellzahl pro ml bestimmt. Diese wurde auf 5×10^5 Zellen pro ml DMEM-F12-Medium (inklusive Fgf2 und Egf) eingestellt. In unbeschichtete Ø 35 mm-Petrischalen wurden 2 ml des mitogen-haltigen Kulturmediums vorgelegt und 1 ml der Zellsuspension

darin verteilt. Die Zellen wurden nun für circa 10 Tage zur Bildung primärer Neurospheres unter einer Atmosphäre von 37 °C, 5% CO₂ und 95% Luft und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 100% kultiviert.

4.2.3.5. Dissoziation generierter primärer Neurospheres

Die Bildungsdauer primärer Neurospheres aus dem ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12) betrug 7–10 Tage. Zur Ernte der generierten primären Neurospheres wurden 2 ml des DMEM-F12-Komplettmedium (20 ng Fgf2/ml, 20 ng Egf/ml) aus den, die primären Neurospheres enthaltenden, Petrischalen (Ø 30 mm) entnommen und in 15 ml-Falcon-Röhrchen gesammelt. Mit dem restlichen in der Petrischale verbliebenen Medium wurden die Petrischale vorsichtig gewaschen, um teilweise adherente primäre Neurospheres zu lösen. In dieser Weise wurden alle Petrischalen behandelt und das primäre Neurospheres enthaltende Medium gesammelt. Die Zellen wurden durch Zentrifugation bei 1000 Upm bei 4 °C für 10 min sedimentiert. Zur enzymatischen Vereinzelung der Zellen wurden nach Entfernen des Überstandes 300 µl einer 0,15%igen Trypsin-/EDTA-(0,02%)-Lösung zugegeben, das Zellpellet aufgewirbelt und schließlich bei 37 °C im Wasserbad für 15 min inkubiert. Durch Zusatz von 500 µl FCS sowie 10 µl DNase-Lösung (Stammlösung: 10 µg/ml) wurde die Enzymaktivität des Trypsins inhibiert und durch den Verdau freigesetzte, genomische DNA abgebaut. Nach Hinzufügen von 1 ml DMEM-F12-Komplettmedium (Punkt 4.1.2., Seite 24) wurden die Zellen achtmal durch langsames Aufziehen und Ablassen mittels einer abgeflamnten, silikonisierten Pasteur-Pipette tituiert. Die Zellsuspension wurde nun für 8 min auf Eis belassen und der Überstand in einem 15 ml-Falcon-Röhrchen aufgefangen. Drei weitere Titrierungsgänge schlossen sich, wie unter Punkt 4.2.3.3. (Seite 47) beschrieben, an. Die erhaltenen Überstände wurden dem ersten Überstand zugefügt und bis zur Beendigung der Dissoziation auf Eis belassen. Im Anschluss wurde der gesamte Überstand bei 1000 Upm für 5 min bei 4 °C zentrifugiert. Der Überstand wurde verworfen und mit 10 ml DMEM-F12-Komplettmedium gewaschen, um das Trypsin vollständig zu entfernen. Das Zellpellet wurde nun in 3 ml Komplettmedium resuspendiert und die Zellzahl durch Auszählung in einer Neubauer-Zählkammer bestimmt (siehe Punkt 4.2.2.1., Seite 40). Sollten die vereinzelter Zellen der Immunzytochemie zugeführt werden, wurden diese in einer Zellzahl von 2×10^5 Zellen in 100 µl auf PORN-/Laminin-beschichtete Ø 12 mm-Deckgläschen, wie unter Punkt 4.2.3.3. (Seite 47) beschrieben, ausplattiert („*Day in vitro*“, DIV0). Zur Isolierung von Gesamt-RNA oder Gesamt-Protein wurden die Zellen in einer Zelldichte von $5\text{--}7,5 \times 10^5$ Zellen in 3 ml Komplettmedium auf PORN-/Laminin-beschichtete Ø 30 mm-Petrischalen ausgesät. Die

weitere Vorgehensweise zur Generierung von sekundären Neurospheres aus dissoziierten primärer Neurospheres des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12) ist unter dem nachfolgendem Punkt 4.2.3.6. beschrieben.

4.2.3.6. Erzeugung sekundärer Neurospheres aus dissoziierten primären Neurospheres des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12)

Die Fähigkeit von Stamm- und Vorläuferzellen zu proliferieren, lässt sich durch die Generierung sekundärer Neurospheres aus dissoziierten primären Neurospheres demonstrieren. Hierzu wurde, nach Titrierung der primären Neurospheres, der gewonnene Überstand in einem 15 ml-Falcon-Röhrchen bei 1000 Upm und 4 °C für 5 min zentrifugiert (Punkt 4.2.3.5., Seite 49). Der Überstand wurde nun vorsichtig entfernt und das Zellpellet in 3 ml DMEM-F12-Komplettmedium nach Zugabe der Mitogene Fgf2 und Egf (jeweils 20 ng/ml) resuspendiert. Die Zellzahl wurde in einer Neubauer-Zählkammer bestimmt. In die Kammern einer unbeschichteten 48-Kammerkulturplatte wurden jeweils 250 µl DMEM-F12-Komplettmedium (20 ng/ml Fgf2, 20 ng/ml Egf) vorgelegt und die Zellen in einer Dichte von 10×10^3 Zellen/100 µl dem vorgelegten DMEM-F12-Komplettmedium hinzugefügt. Die Bildung sekundärer Neurospheres wurde über einen Zeitraum von 22 Tagen hinweg photographisch dokumentiert (Nikon Eclipse TE 200).

4.2.3.7. Poly-Ornithine-/Laminin-Beschichtung von Deckgläschen

Um isolierten Primärzellen des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12) die Differenzierung zu gestatten, wurden Ø 12 mm-Glasdeckgläschen mit Poly-Ornithine und Laminin (PORN/Lam) beschichtet. Hierdurch wurde auf der Oberfläche der Deckgläschen eine extrazelluläre Matrix (EZM) simuliert und die Zelldifferenzierung ermöglicht. Vorbereitend zur Beschichtung der Deckgläschen wurden diese in 100% Ethanol bei 4 °C gelagert. Nach kurzem Abflammen wurden die Deckgläschen einzeln in eine 24-Kammerkulturplatte ausgelegt und mit 500 µl einer frisch angesetzten Verdünnung von Poly-L-Ornithine in A. bidest in einer Konzentration von 0,1 mg/ml (PORN-Stammlösung: 10 mg/ml 150 mM H_3BO_3 NaOH, pH 8,3) bedeckt. Die Platte wurde nun für 1 h bei RT belassen. Die PORN-Lösung wurde abgesogen und nicht gebundenes PORN durch dreimaliges Waschen der Deckgläschen in A. bidest entfernt. Die Beschichtung mit Laminin (Lam) erfolgte durch Übersichten der Deckgläschen mit 500 µl einer Verdünnung der Laminin-Stammlösung (1 mg/ml) in DMEM-F12 ohne weitere Zusätze in einer Endkonzentration von 1 µg/ml. Die

Kulturplatte wurde ü. N. bei 37 °C im Brutschrank inkubiert. Zur Verwendung der Kulturplatte wurde die Laminin-Lösung abgesogen und die Kammern dreimal mit DMEM-F12-Medium ohne Zusätze gewaschen und anschließend jede Kammer mit 750 µl DMEM-F12-Komplettmedium befüllt.

4.2.3.8. 5'-Bromodeoxyuridin-(BrdU)-Proliferationsassay

Zum Nachweis der Fähigkeit von Vorläuferzellen in primären Neurospheres des ventralen rostralen Rhombencephalon zur Proliferation wurde der 5'-Bromodeoxyuridin-(BrdU)-Inkorporationsassay angewendet. Als chemisches Analogon des Nukleosids Thymidin wird BrdU nach Phosphorylierung in der Zelle anstelle des Nukleotids Desoxythymidintriphosphat (dTTP) während der mitotischen S-Phase in den neusynthetisierten Strang der Desoxynukleinsäure (DNA) eingebaut. Das BrdU wird anschließend immunzytochemisch nachgewiesen. Für den BrdU-Inkorporationsassay wurden primäre Neurospheres (DIV8) aus primären Zellen des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12) eingesetzt. Zunächst wurde eine 1:1000 Verdünnung der BrdU-Stammlösung (Stammlösung: 10 nmol) in 1 ml des DMEM-F12 (20 ng/ml Fgf2, 20 ng/ml Egf) frisch angesetzt, zu den 3 ml DMEM-F12 (20 ng/ml Fgf2, 20 ng/ml Egf) der Kultur primärer Neurospheres gegeben und durch Schwenken im Medium gleichmäßig verteilt. Die BrdU-Endkonzentration betrug 10 µmol/ml Kulturmedium. Die Zellen wurden bis zur Probenentnahme nach 2 h, 4 h, 6 h und 8 h nach BrdU-Gabe in Ø 30 mm-Kulturschalen im Brutschrank inkubiert. Zur Probennahme wurden je zwei Kulturschalen verwendet. Das Medium wurde bis auf 1 ml aus den Kulturschalen entnommen und auf Eis in einem 15 ml-Falcon-Röhrchen gesammelt. Das restliche in den Petrischalen vorliegende Medium wurde zum Abspülen adherenter primärer Neurospheres verwendet und ebenfalls in das Falcon-Röhrchen überführt. Die primären Neurospheres wurden bei 1000 Upm und 4 °C für 5 min sedimentiert und mit 5 ml DMEM-F12-Komplettmedium gewaschen. Nach erneuter Zentrifugation wurden die Zellen in 400 µl Komplettmedium überführt. Je 100 µl der Zellsuspension wurde auf ein PORN-/Lam-beschichtetes Ø 12 mm-Deckgläschen (Punkt 4.2.3.7., Seite 50) pipettiert und unter normalen Kulturbedingungen im Brutschrank für 1 h inkubiert, um eine erste Anheftung der undissoziierten primären Neurospheres zu ermöglichen. Hiernach wurden die Deckgläschen in die Kammern einer mit 650 µl Komplettmedium pro Kammer befüllten 24-Kammerkulturplatte gelegt und für 72 h im Brutschrank belassen, um ein Eintreten der Zellen in die Differenzierung zu erlauben. Nach drei Tagen wurde das Medium entfernt und die Zellen dreimal in PBS gewaschen. Die azidische Fixierung und Permeabilisierung der Zellen erfolgte durch eine 20minutige

Inkubation der Zellen in einer kalten 50 mM Glycin-Lösung in Ethanol bei $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$. Das Fixanz wurde durch dreimalige Waschung mit PBS entfernt. Im Anschluss wurden die Deckgläschen in eine mit Parafilm ausgekleidete Feuchtkammer gelegt und mit 100 μl der Anti-BrdU-Lösung bedeckt. Die Anti-BrdU-Lösung enthält neben einem monoklonalem, gegen BrdU gerichteten und in Maus hergestellten Antikörper unbekannter Konzentration zusätzlich 200 nM β -Mercaptoethanol sowie Nukleasen zur Denaturierung der DNA. Inkorporiertes BrdU wird hierdurch für die Bindung des primären Antikörpers zugänglich. Die Antikörper-Lösung wurde für 30 min bei $37\text{ }^{\circ}\text{C}$ in einem Wärmeschrank auf den Deckgläschen belassen. Die Deckgläschen wurden anschließend dreimal in PBS gewaschen. Als sekundärer Antikörper wurde ein im Schaf hergestellter, gegen Maus gerichteter und mit Fluorescein markierter Antikörper der Immunglobinklasse G verwendet. Dieser wurde 1:10 in PBS verdünnt und jeweils 100 μl der Verdünnung auf ein Deckgläschen aufpipettiert. Die Bindung des sekundären Antikörpers erfolgte während einer 30minütigen Inkubation bei $37\text{ }^{\circ}\text{C}$ im Wärmeschrank in einer Feuchtkammer. Zum Abschluss des Nachweises von BrdU wurden die Deckgläschen dreimal in PBS gewaschen.

Für den Nachweis spezifische Markerproteine neuraler Zelltypen in Zellen, die von proliferierenden Vorläuferzellen innerhalb primärer Neurospheres abstammten, wurden wie unter Punkt 4.2.4. (Seite 53) erläutert, weitere immunzytochemische Analysen angeschlossen. Sofern keine weiteren immunzytochemischen Analysen angeschlossen werden sollten, wurden die Zellen in Vectashield eingedeckt, mit Klarlack versiegelt und am Fluoreszenzmikroskop (Nikon Eclipse E600) das Ergebnis dokumentiert.

4.2.3.9. Behandlung von Primärkulturen und primären Neurospheres des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12) durch Faktorengabe

Eine Behandlung durch externe Faktorengabe wurde sowohl an Primärzellen als auch an primären Neurospheres des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12) vorgenommen. Hierzu wurden die nach Aufarbeitung embryonalen Gewebes (E12) des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus gewonnene Einzelzellsuspension auf PORN-/Lam-beschichtete $\varnothing$ 12 mm-Deckgläschen in einer Zelldichte von 2×10^5 Zellen/750 μl DMEM-F12-Komplettmedium ausplattiert und ü. N. im Brutschrank unter Normalbedingungen kultiviert (Punkt 4.2.3.4, Seite 48). Primäre Neurospheres wurden, wie unter Punkt 4.2.3.5. (Seite 49) erläutert, in PORN-/Lam-beschichtete $\varnothing$ 30 mm-Kulturschalen in einer Zelldichte von 5×10^5 /3 ml DMEM-F12-Komplettmedium ausgesät. Die Faktorengabe wurde am darauffolgenden Tag (DIV1) durchgeführt. Hierzu wurden 2/3 des Medium

abgezogen und durch frisches Komplettmedium ersetzt, in welchem der jeweilige Faktor in der sich auf das Gesamtvolumen beziehenden Konzentration verdünnt war. Verwendet wurde Tgf- β 1 in einer Endkonzentration von 1 ng/ml. Des Weiteren kam zur Blockierung endogen synthetisierter Tgf- β s ein alle drei Tgf- β -Isoformen neutralisierender Antikörper (anti TGF β 1/2/3), in einer Endkonzentration von 10 μ g/ml zum Einsatz. Ein synthetischer Inhibitor der Rezeptoren Alk-(„*Activin receptor-like kinase*“)-4/5 und 7 (SB431542) wurde in einer Endkonzentration von 15 μ M verwendet, durch welchen unter anderem die Tgf- β -induzierte Signaltransduktionskaskade blockiert wurde. Als Negativkontrollen wurden parallel nicht behandelte Kulturen der gleichen Zellpräparation verwendet, bei denen lediglich das DMEM-F12-Komplettmedium zu 2/3 ausgetauscht wurde. An Tag 3 nach der Faktorengabe (DIV3) wurden die Zellen der Isolation von Gesamt-RNA bzw. Gesamt-Protein zugeführt (Punkt 4.2.6.4. und Punkt 4.2.8.1., Seite 61 sowie Seite 75).

4.2.4. Immunzytochemische Charakterisierung von Primärzellen und primärer Neurospheres des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12)

Der immunzytochemische Nachweis von spezifischen Markerproteinen neuraler Zelltypen wurden an Einzelzellen des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12) sowie an dissoziierten primären, aus Einzelzellsuspensionen generierten Neurospheres desselben Gehirnbereiches durchgeführt. Hierzu wurden die Zellen an Tag 3 (DIV3) nach Ausplattierung auf PORN-/Lam-beschichtete Deckgläschen in einer 24-Kammerkulturplatte durch Übersichtung mit einer 4%igen PFA-Lösung für 30 min bei RT fixiert. Das Fixierungsmittel wurde durch dreimalige Waschung in PBS für jeweils 5 min entfernt. Im Anschluss wurde das PBS abgesogen und die Zellen durch Inkubation in eiskaltem Azeton für 10 min bei -20°C permeabilisiert. Nach Entfernung des Azetons wurden die Deckgläschen wie zuvor in PBS gewaschen und in eine mit Parafilm ausgekleidete, lichtundurchlässige Feuchtkammer überführt. Unspezifische Bindungsstellen wurden durch eine Inkubation in 100 μ l einer 10%igen Ziegerserum-Lösung („*Normal goat serum*“, NGS) in PBS für 1 h bei RT blockiert. Die Bindung des jeweiligen primären Antikörpers erfolgte ü. N. bei 4°C in 100 μ l einer Verdünnung in PBST (10% NGS und 0,1% Triton-X 100) pro Deckgläschen. Die verwendeten Antikörper und ihre spezifische Verdünnung sind in nachfolgender Tabelle (Tab. 2, Seite 54) zusammengefasst:

Tab. 2: Zur immunzytochemischen Charakterisierung von Primärzellen und primären Neurospheres des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12) eingesetzte, primäre Antikörper

		Ursprungsorganismus	Verdünnungsstufe
α -Nestin	monoklonal	Maus	1:20
α - β -III-Tubulin	monoklonal	Maus	1:20
α -Gfap	polyklonal	Kaninchen	1:1000
α -O4	monoklonal	Maus	1:400

Nicht gebundene Antikörper wurden am folgenden Tag durch dreimaliges Waschen für 5 min in PBS entfernt. Anschließend erfolgte die Bindung des gegen die Ursprungsspezies des primären Antikörpers gerichteten und im Esel hergestellten, sekundären Antikörpers der Immunglobulinklasse G. Die sekundären Antikörper waren entweder an das Fluorophor Cy3 (Verdünnung 1:600) oder an das Fluorophor Fluorecein (FITC, Verdünnung 1:100) gekoppelt und wurden, wie in obiger Tab. 2 angegeben, in PBS verdünnt. Verwendet wurden jeweils 100 μ l der Antikörper-Lösung pro Deckgläschen. Nach einstündiger Inkubation bei RT wurden die Deckgläschen wie zuvor beschrieben in PBS gewaschen und eine Kernfärbung mittels 4',6-Diamidino-2-phenylindol (DAPI) durch eine 5minutige Inkubation mit 100 μ l einer 1:1000 Verdünnung (DAPI-Stammlösung: 10 mg/ml) in PBS angeschlossen. Im Falle zuvor BrdU-behandelter Zellen wurde auf eine zusätzliche Kernfärbung verzichtet. Schließlich wurden die Deckgläschen einmal in PBS gewaschen, in Vectashield eingedeckt und mit Klarlack versiegelt.

Für den immunzytochemischen Nachweis von 5-HT musste das oben aufgeführte Protokoll wie folgt modifiziert werden. Die 5-HT-Detektion in Zellpräparaten des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12) erforderte eine Fixierung der Zellen in Methanol/Azeton (1:1) auf Eis für 10 min. Die Deckgläschen wurden dreimal für je 5 min in PBS gewaschen und in eine Feuchtkammer überführt. Die Blockierung erfolgte in 100 μ l einer 10%igen NGS-Lösung in PBS für 1 h bei RT. Als primärer Antikörper wurde ein in Kaninchen hergestellter, gegen 5-HT gerichteter, polyklonaler Antikörper verwendet. Dieser wurde 1:1000 in PBS verdünnt und jeweils 100 μ l der Verdünnung auf die Deckgläschen aufpipettiert. Nach einer Inkubation ü. N. bei 4 °C wurde nicht gebundener Antikörper durch dreimaliges Waschen mit PBS für 5 min entfernt. Als Verstärkung des späteren Fluoreszenzsignals wurde als sekundärer Antikörper ein in der Ziege hergestellter, biotinylierter und gegen Kaninchen gerichteter Antikörper der Immunglobulinklasse G verwendet. Dieser wurde 1:200 in PBS verdünnt und je 100 μ l dieser Verdünnung zur einstündigen Inkubation der Deckgläschen bei RT benutzt. Die Deckgläschen wurden wie zuvor beschrieben in PBS gewaschen und nachfolgend mit Streptavidin-FITC in einer Verdünnung von 1:200 in PBS für 30 min bei RT

inkubiert. Durch die mehrfache Bindung des FITC-markierten Streptavidins an das Biotin des sekundären Antikörpers wurde eine Verstärkung des Fluoreszenzsignals erreicht. Die Deckgläschen wurden im Anschluss dreimal in PBS gewaschen und zum Abschluss eine DAPI-Kernfärbung durchgeführt. Nach Eindeckung der Zellen in Vectashield und Versiegelung der Deckgläschen mit Klarlack wurden die Zellpräparate am Fluoreszenzmikroskop (Nikon Eclipse E600) ausgewertet.

4.2.5. Histologische Methoden

4.2.5.1. Fixierung von Mausembryonen unterschiedlicher Entwicklungsstadien für die Herstellung von Gewebeschnitten

Im Rahmen dieser Arbeit kamen zur Untersuchung von Genexpressionsmustern immunhistochemische Verfahren und die Methode der *in situ*-RNA-Hybridisierung an Paraffinschnitten sowie Mausembryonen zum Einsatz. Hierzu wurden frisch entnommene Embryonen von *NMRI*-Mäusen des Embryonaltages (E) 12 oder E14.5 und präparierte Gehirne von neugeborenen *NMRI*-Mäusen (postnatales Stadium, P0) in einer 4%igen Paraformaldehyd (PFA)-Lösung immersionsfixiert, wodurch eine Quervernetzung der Proteine erfolgte. Die Fixierungsdauer richtete sich nach dem Stadium der zu fixierenden Embryonen, beginnend mit einer Dauer von 3h bei RT unter sanftem Schütteln für Embryonen des Embryonaltages (E) 12 bis hin zur Fixierung ü. N. bei 4 °C von Präparaten des Gesamtgehirns neugeborener *NMRI*-Mäuse. Die weitere Behandlung des Gewebes richtete sich nach der anzuwendenden Analysetechnik und wird daher unter dem jeweiligen Unterpunkt erläutert.

4.2.5.2. Paraffineinbettung von PFA-fixierten Mausembryonen

Nach Immersionsfixierung der Mausembryonen durch eine 4%ige PFA-Lösung wurde das Gewebe bis zur Einbettung in Paraffin zur Herstellung von Gewebeschnitten mehrmals in 70%igem Ethanol gewaschen und ebenfalls in 70%igem Ethanol bei 4 °C gelagert. Die Einbettung in Paraffin erfolgte in einem Paraffineinbett-Automaten beginnend mit einer Entwässerung des Gewebes über eine aufsteigende Ethanolreihe. Diese gliederte sich in folgende Schritte:

80 min	70% Ethanol
80 min	85% Ethanol
80 min	95% Ethanol
80 min	95% Ethanol
120 min	100% Ethanol
120 min	100% Ethanol

Als Intermediärmedium zwischen Ethanol und flüssigem, 60 °C warmen Paraffin wurde Xylol verwendet, wodurch dem Gewebe zusätzlich noch vorhandenes Restwasser entzogen wurde.

80 min	Xylol
80 min	Xylol
60 min bei 60 °C	Paraffin
60 min bei 60 °C	Paraffin

Nach Abschluss der Paraffinierung wurde das Gewebe an einer Paraffin-Ausgießstation in passenden Metallformen in der gewünschten Ausrichtung der späteren sagittalen bzw. frontalen Schnittebene ausgerichtet und die Form mit Paraffin vollständig ausgegossen. Die Metallformen wurden im direkten Anschluss auf einer Kühlplatte positioniert, um eine gleichmäßige und schnelle Abkühlung des Paraffins, welche die Schneideeigenschaften des Paraffins maßgeblich beeinflusst, zu erreichen.

4.2.5.3. Herstellung von Gewebeschnitten

Die Herstellung von Gewebeschnitten nach Einbettung der Mausembryonen in Paraffin (siehe Punkt 4.2.5.2., Seite 55) erfolgte an einem Rotationsmikrotom generell unter RNase-freien Bedingungen, um sowohl immunhistochemische Untersuchungen als auch *in situ*-RNA-Hybridisierungen an dem selben Präparat durchführen zu können. Das Gewebe wurde in Schnittserien einer Schnittdicke von 10 µm geschnitten und anschließend je zwei Schnitte auf silanisierte *SuperFrostPlus*-Objektträger aufgezogen. Auf einer 37 °C warmen Metallplatte wurden die Schnitte vorgetrocknet. Die vollständige Trocknung der Schnitte erfolgte ü. N. im Wärmeschrank bei 37 °C. Die Schnitte wurden im Anschluss bis zur Verwendung trocken gelagert.

4.2.5.4. Immunhistochemische Untersuchungen an Schnittpräparaten des zentralen Nervensystems de Maus (E14.5 und P0)

Für den immunhistochemischen Nachweis von 5-HT-Neuronen der Raphe in *wt*-Mäusen und *Sim1*-defizienten Mäusen des gleichen Wurfes wurden serielle, 10 µm dicke, frontale Paraffinschnittserien (siehe Punkt 4.2.5.3., Seite 56) des murinen Gehirns unterschiedlicher Entwicklungsstadien (E14.5 und P0) zunächst wie folgt entparaffiniert:

2×10 min	Xylol
2×10 min	100% Ethanol
5 min	95% Ethanol
5 min	80% Ethanol
5 min	75% Ethanol

Hieran schloss sich ein dreimaliges Waschen der Schnitte in PBS für jeweils 5 min bei RT an. Um die Zugänglichkeit der zu detektierenden Antigene zu erhöhen, wurden die Schnitte in eine abgedeckte Glasschale umgebettet und für 5 min in 0,1 M Citrat-Puffer (pH 6) in einer Mikrowelle bei 600 W erwärmt. Nach 20minütiger Abkühlung auf RT wurden die Schnitte 5 min in PBS gewaschen und eine Blockierung endogener Peroxidasen angeschlossen, um eine unspezifische Hintergrundfärbung durch die spätere DAB-Reaktion zu vermeiden. Hierfür wurden die Schnitte in 3% H₂O₂ in Methanol für 30 min bei RT inkubiert und im Anschluss erneut für 5 min in PBS gewaschen. Zur Absättigung unspezifischer Bindungsstellen wurden die Gewebeschnitte für 3 h in PBS (10% NGS, 0,1% Triton-X 100) bei RT blockiert. Die Detektion von 5-HT-Neuronen im Gewebe erfolgte unter Verwendung eines spezifischen, gegen Serotonin gerichteten, polyklonalen und in Kaninchen hergestellten Antikörpers in einer Verdünnung von 1:1000 in PBS (10% NGS, 0,1% Triton-X 100). Die Antikörperbindung erfolgte ü. N. bei 4°C. Als Negativ-Kontrolle wurde der primäre Antikörper durch PBS ersetzt und die nachfolgend beschriebenen Schritte ebenfalls durchgeführt. Am darauffolgenden Tag wurde ungebundener, gegen 5-HT-gerichteter Antikörper durch dreimaliges Waschen in PBS für jeweils 5 min entfernt. Als sekundärer Antikörper wurde ein in der Ziege hergestellter, Peroxidase-gekoppelter und gegen Kaninchen gerichteter Antikörper der Immunglobulinklasse G eingesetzt. Dieser wurde in einer Verdünnung von 1:100 in PBS verwendet und die Schnitte mit der Verdünnung des sekundären Antikörpers für 1 h bei RT inkubiert. Nach wiederholtem Waschen in PBS wurde ein gegen Peroxidase gerichteter und selbst Peroxidase-gekoppelter, im Kaninchen hergestellter Antikörper in einer Verdünnung von 1:800 in PBS

verwendet. Die Inkubation wurde nach Ablauf von 1 h durch dreimaliges, 5minütiges Waschen in PBS beendet. Hieran schloss sich die 3,3'-Diaminobenzidin Tetrahydrochlorid-(DAB)-vermittelte Visualisierung der Peroxidase-Reaktion an. Zur Verstärkung des Signals wurde die Reaktion durch Zugabe von NiCl_2 zur DAB-Lösung gemäß den Angaben des Herstellers (Vectashield) intensiviert. Nach kurzer Inkubation in PBS, um die Reaktion abzustoppen, wurden die Schnitte der aufsteigenden Ethanolreihe zugeführt und schließlich in Entellan eingedeckt. Die Auszählung der 5-HT-immunpositiven Neurone in Gewebeschnitten der *wt*- und *Sim1*-defizienten Mäuse erfolgte lediglich an jedem fünften Schnitt, um mehrfach Zählung derselben Zelle in aufeinanderfolgenden Schnitten zu umgehen. Es wurden nur jene Zellen als positiv angesehen, die keine unspezifische Kernfärbung erkennen ließen und deren Zytoplasma eine relativ dunkle, Nickel-bedingte Färbung aufwiesen. Die statistische Auswertung der Ergebnisse der Zählungen ist unter Punkt 4.2.9. (Seite 78) dargelegt.

Für den gleichzeitigen immunhistologischen Nachweis der Expression des Transkriptionsfaktors *Sim1* und Serotonin (5-HT) wurde das oben beschriebene Protokoll wie folgt modifiziert. Zum spezifischen Nachweis von Serotonin-positiven Neuronen in Frontalschnitten der Maus (*wt*) des postnatalen Stadiums P0 wurde ein in Maus hergestellter, monoklonaler Primärantikörper in einer Verdünnung von 1:100 in PBS (10% NGS, 0,1% Triton-X 100) eingesetzt. Für den Nachweis von *Sim1* wurde ein polyklonaler, in Kaninchen hergestellter primärer Antikörper in einer Verdünnung von 1:200 in PBS (10% NGS, 0,1% Triton-X 100) verwendet. Hierdurch wurde eine gleichzeitige Inkubation der Gewebeschnitte mit beiden primären Antikörpern ermöglicht. Nach Bindung der primären Antikörper ü. .N. bei 4 °C wurden die Schnittpräparate zunächst dreimal für jeweils 5 min in PBS gewaschen. Als sekundärer Antikörper wurde ein in der Ziege hergestellter, gegen Maus gerichteter und FITC-markierter Antikörper der Immunoglobinklasse G (1:100 in PBS) bzw. ein in der Ziege hergestellter, Cy3-gekoppelter und gegen Kaninchen gerichteter sekundärer Antikörper (IgG, 1:600 in PBS) benutzt. Die Bindung der sekundären Antikörper erfolgte während einer 1 h Inkubation bei RT. Hiernach wurden die Gewebeschnitte dreimal für 5 min in PBS gewaschen und schließlich in Vectashield eingedeckt. Die Auswertung und Dokumentation der Doppelimmunfärbung wurde an einem Fluoreszenzmikroskop (Nikon Eclipse 600) vorgenommen.

4.2.6. Molekularbiologische Methoden

4.2.6.1. Isolierung von Plasmid-DNA

Die Isolierung von Plasmid-DNA aus Bakterienkulturen in größerem Maßstab erfolgte durch klassische alkalische SDS-Lyse transformierter *E. coli DH5 α* . 200 ml LB_{Amp}-Medium wurden mit einer Einzelkolonie inokuliert und die Flüssigkultur ü. N. bei 250 Upm und 37 °C inkubiert. Die Kultur wurde in sterile 50 ml-Falcon-Röhrchen aufgeteilt und durch 10minütige Zentrifugation bei 6000 Upm und 4 °C die Zellen geerntet. Die alkalische SDS-Lyse und die Aufreinigung der Plasmid-DNA erfolgte unter Verwendung des QiagenTip100-Systems. Die Zellpellets wurden zusammen in 10 ml 4°C kaltem Puffer 1 resuspendiert und vorsichtig 10 ml P2 zugegeben. Der Ansatz wurde fünfmal leicht gekippt und für maximal 5 min bei RT belassen. Die Neutralisation erfolgte durch Zugabe von 10 ml kaltem Puffer 3. Das Zelllysate wurde in eine Filterspritze gefüllt und hierin 10 min bei RT ruhen gelassen. Das Lysat wurde filtriert und in einem 50 ml-Falcon-Röhrchen aufgefangen. Zur Bindung der Plasmid-DNA an die Silika-Matrix der Aufreinigungssäule wurde die Anionenaustauschersäule mit 10 ml QBT equilibriert. Nach Durchlauf des Puffers wurde das Filtrat nochmals gemischt und auf die Säule aufgetragen. Zur Entfernung von Proteinen wurde die Säule nach vollständigem Durchlauf des Lysates zweimal mit jeweils 30 ml OC gewaschen. Die Elution der gebundenen Plasmid-DNA erfolgte durch 15 ml QF. Das Eluat wurde in einem 50 ml-Falcon-Röhrchen aufgefangen und mit 12,5 ml Isopropanol (RT) zur Fällung der Plasmid-DNA versetzt. Hierzu wurde die Lösung der Plasmid-DNA in zwei 15 ml-Falcon-Röhrchen gefüllt und eine Zentrifugation bei 14000 Upm für 30 min bei 4 °C angeschlossen. Die Überstände wurden vorsichtig dekantiert und die DNA-Pellets mit jeweils 500 μ l 70%igem Ethanol gewaschen. Nach einer erneuten Zentrifugation für 15 min bei 14000 Upm und 4 °C wurde das Ethanol weitestgehend entfernt und die DNA luftgetrocknet. Jedes DNA-Pellet wurde zunächst in 50 μ l A. bidest aufgenommen und die Lösungen anschließend in einem 1,5 ml-Eppendorf-Reaktionsgefäß zusammen gefügt. Nach photometrischer Bestimmung der Nukleinsäurekonzentration (Punkt 4.2.6.7., Seite 64) wurde die Plasmid-DNA bei –20 °C gelagert.

4.2.6.2. Präparation von Plasmid-DNA in analytischen Mengen

Zur Gewinnung von Plasmid-DNA im kleineren Maßstab, z.B. zur Identifizierung positiver, transformierter *E. coli DH5 α* -Klone mittels anschließender Restriktionskontrolle, wurde eine Einzelkolonie in 3 ml einer LB_{Amp}-Flüssigkultur in 15 ml-Falcon-Röhrchen suspendiert und

ü. N. bei 37 °C und 150 Upm inkubiert. 1,5 ml der Bakterienkultur wurden in ein 2 ml-Eppendorf-Reaktionsgefäß überführt und bei 6000 Upm für 3 min sedimentiert. Der Überstand wurde verworfen und das Pellet in 80 µl P1 suspendiert. Nach Zugabe von 80 µl P2 und leichtem Kippen der Lösung wurden die Zellen bei RT für 5 min lysiert. Die Neutralisation erfolgte durch Zugabe von 80 µl P3 zum Lysat. Zur Fällung von Proteinen und Membranbestandteilen wurde der Ansatz für 10 min auf –20 °C gekühlt und anschließend für 15 min bei 13000 Upm abzentrifugiert. Der Überstand wurde in ein 1,5 ml-Eppendorf-Reaktionsgefäß überführt und mit 600 µl 100%igem Ethanol zur Fällung der Plasmid-DNA versetzt. Dieser Vorgang wurde durch Inkubation bei –20 °C für 30 min unterstützt. Durch einstündige Zentrifugation bei 4 °C und 13000 Upm wurde die Plasmid-DNA sedimentiert. Der Überstand wurde verworfen und die DNA mit 200 µl 70%igem Ethanol gewaschen. Nach Zentrifugation bei 13000 Upm für 20 min und 4 °C wurde das Ethanol entfernt und das DNA-Pellet luftgetrocknet. Die DNA wurde in 30 µl DEPC-behandeltem A. bidest gelöst und bei –20 °C gelagert.

4.2.6.3. Restriktionsverdau von Plasmid-DNA

Die sequenzspezifische Aufspaltung von Plasmid-DNA durch Endonukleasen wurde sowohl zur Identifizierung positiver *E. coli DH5α*-Klone (siehe Punkt 4.2.1.3., Seite 40 und Punkt 4.2.6.2., Seite 59) als auch zur Vorbereitung der RNA-Sonden-Plasmid-DNA für die *in vitro*-Transkription eingesetzt (Punkt 4.2.7.2., Seite 70). Daher werden an dieser Stelle beide Verfahren erläutert.

Zur Kontrolle der isolierten Plasmid-DNA auf korrekte Insertion wurden verschiedene Restriktionsspaltungen vorgenommen und positive Klone anhand des Fragmentenmusters identifiziert. Das Reaktionsvolumen betrug jeweils 10 µl.

Zusammensetzung der Reaktionsansätze:

Plasmid-DNA	4,0 µl
A. bidest	4,5 µl
Puffer (10×)	1,0 µl
Enzym (5 U/µl)	0,5 µl

Der Ansatz erfolgte auf Eis. Die DNA-Probe wurden vorgelegt, die restlichen Reaktionskomponenten als Master-Mix zugefügt und der Ansatz kurz anzentrifugiert. Die Spaltungsreaktion erfolgte während einer Inkubation ü. N. bei 37 °C und wurde hiernach

durch Zusatz von 6× DNA-Probenpuffer gestoppt. Die Auftrennung der Restriktionsprodukte erfolgte in 2%igen Agarosegelen bei 120 V.

Zur Vorbereitung der *in vitro*-Transkription (Punkt 4.2.7.2., Seite 70) zur Herstellung von *Sim1*-RNA-Sonden für die *in situ*-Hybridisierung (Punkt 4.2.7.4., Seite 72) wurden die folgenden Restriktionsansätze verwendet:

<i>pGemTEasy::Sim1</i>	5 µg
Puffer (10×)	5 µl
Enzym (5 U/µl)	2 µl
A. bidest ad	50 µl

Zur Linearisierung des *pGemTEasy::Sim1* Vektors vor dem T7-Promotor, zur Herstellung der „sense“-*Sim1*-RNA-Sonde wurde das Enzym *SacII* eingesetzt, zur Linearisierung vor dem Sp6-Promotor, zur Herstellung der „anti-sense“-*Sim1*-RNA-Sonde das Restriktionsenzym *Sall*. Die Spaltungsreaktionen verliefen ü. N. bei 37 °C und wurde durch 20minutige Hitzedenaturierung der Enzyme bei 65 °C beendet.

4.2.6.4. Isolierung von Gesamt-RNA aus eukaryontischen Zellkulturen und embryonalem Gewebe der Maus des Embryonaltages (E) 11 und E12

Zur Gewinnung der Gesamt-RNA wurde der RNA-Isolationskit RNEasy der Firma Qiagen verwendet. Die Zellen wurden wie unter Punkt 4.2.2.1. (Seite 40) beschrieben trypsiniert, für die RNA-Isolation durch Zentrifugation pelletiert und in 600 µl Lysepuffer (Zugabe von 1 µl β-Mercaptoethanol pro 100 µl „*Rapid lysis buffer*“, RLB) aufgenommen. Sollte aus embryonalem Gewebe die Gesamt-RNA isoliert werden, so wurde das Gewebe während der Präparation (Punkt 4.2.3.1., Seite 44) in einem 2 ml-Eppendorf-Reaktionsgefäß in 600 µl RLB mit β-Mercaptoethanol auf Eis gesammelt. Das Gewebe wurde für 40 s im Homogenisator zerkleinert und danach sofort auf Eis gestellt. Die weitere Vorgehensweise unterschied sich für beide Ausgangsproben nicht. Das Lysat wurde durch mehrmaliges Auf- und Abziehen durch eine Spritze (Kanülendurchmesser: Ø 0,025 µm) bis zur vollständigen Auflösung des Gewebeverbandes aufgeschlossen und mit 600 µl 70%igem Ethanol in DEPC-behandeltem A. bidest versetzt. Das Lysat wurde nun auf eine Säule zur Bindung an deren Silikatmatrix aufgetragen und bei 10000 Upm für 30 s abzentrifugiert. Der Durchfluss

wurde verworfen und der Vorgang bis zur vollständigen Auftragung des Lysates wiederholt. Die Säule wurde mit 350 µl RW1-Puffer gewaschen und erneut abzentrifugiert. Der Durchfluss wurde verworfen und direkt auf der Säule ein Verdau der genomischen DNA vorgenommen. Hierzu wurden 10 µl der DNase-Stammlösung (10 mg/ml Stammlösung) in 70 ml RDD-Puffer verdünnt und die Lösung direkt auf die Säulematrix pipettiert. Nach einer Inkubation von 15 min bei RT wurden die durch den DNA-Verdau freigesetzten Nukleotide durch Waschung mit 350 µl RW1 Puffer von der Säule entfernt. Im Anschluss wurden 600 µl RPE-Puffer auf die Säule aufgetragen, diese erneut zentrifugiert und der Durchfluss entfernt. Dieser Vorgang wurde mit 200 µl RPE-Puffer wiederholt und die Dauer der Zentrifugation auf 2 min erhöht, um die Säulenmatrix zu trocknen. Die Säule wurde nun auf ein steriles 1,5 ml-Eppendorf-Reaktionsgefäß gesetzt. Durch Auftragung von 20–40 µl RNase-freien A. bidest auf die Säule (je nach zu erwartender RNA-Menge), wurde die RNA durch Zentrifugation bei 10000 Upm für 1 min eluiert. Zur Erhöhung der RNA-Ausbeute wurde das Eluat erneut auf die Säule aufgetragen und der Vorgang wiederholt. Die Konzentration der RNA-Lösung wurde photometrisch (Punkt 4.2.6.7., 64) Seite bestimmt und bis zur weiteren Verwendung die Proben bei –80 °C gelagert.

4.2.6.5. Gelelektrophoretische Auftrennung von RNA-Proben

Die erfolgreiche Durchführung eines cDNA-Mikroarray ist abhängig von Qualität und Reinheit der verwendeten RNA-Proben. In dieser Arbeit wurden, wie unter Punkt 4.2.6.4. (Seite 61) beschrieben, die Gesamt-RNA aus Gewebepreparationen des ventralen rostralen Rhombencephalon und des ventralen Mesencephalon der Maus (E11) isoliert. Nach photometrischer Bestimmung der Konzentration und Reinheit der RNA-Proben (Punkt 4.2.6.7., Seite 64) wurde die Integrität der isolierten RNA-Proben mittels denaturierender Formaldehyd-Agarose-Gelelektrophorese überprüft. Hierbei lässt die Detektion intakter 28S- und 18S-r-(ribosomale)-RNA-Banden im Gel indirekt auf eine nicht degradierte Gesamt-RNA schließen. mRNA-Moleküle sind zu klein und in ihrer Größe zu heterogen, um als Bande sichtbar zu sein. Je RNA-Probe wurden 0,5 µg RNA, mit 6x RNA-Probenpuffer versetzt, diese bei 65 °C für 10 min denaturiert und der Ansatz sofort auf Eis gestellt. Jeder RNA-Probe wurde 1 µl der Ethidium-(EtBr)-Stammlösung einer Konzentration von 10 mg/ml zugesetzt, um die RNA später unter UV-Licht dokumentieren zu können. Die elektrophoretische Auftrennung erfolgte in einem 1,2%igem Agarosegel. Hierzu wurden 0,6 g Agarose mit 36 ml DEPC-behandeltem A. bidest und 5 ml 10fach konzentriertem 3-[N-morpholino]propansulfonsäure-(MOPS)-Puffer aufgeköcht. Nach Abkühlung auf 60 °C wurden 9 ml 37%ige Formaldehyd-Lösung unter dem Abzug zugesetzt und das Gel sofort

gegossen. Nach Erkalten des Gels wurde dieses in eine Gelapparatur, welche mit Paraformaldehyd-haltigem RNA-Laufpuffer gefüllte war, eingesetzt, das Gel mit Laufpuffer überschichtet und der Probenkamm entnommen. Nach Beladung des Gels wurde der Lauf bei 40 V für circa 1 h gestartet. Die Integrität der RNA-Proben wurde im Anschluss an dem UV-Transilluminator überprüft.

4.2.6.6. cDNA-Synthese aus Präparationen von Gesamt-RNA durch Reverse-Transkription (RT-PCR)

Die Synthese komplementärer DNA („*complementary DNA*“, cDNA) erfolgte mittels reverser Transkription ausgehend von 1 µg einer Präparation von Gesamt-RNA (4.2.6.4., Seite 61). Der Ansatz der Reaktion erfolgte in 0,2 ml-„*PCR-Softtubes*“ (Biozym) auf Eis. Zur Denaturierung der RNA wurde das 1 µg entsprechende Volumen der RNA-Lösung auf ein Gesamtvolumen von 19,8 µl durch RNase-freies A. bidest ergänzt und im Thermozykler für 10 min bei 70 °C die Sekundärstruktur der RNA aufgebrochen. Der Ansatz wurde auf Eis gekühlt und die folgenden Reaktionskomponenten hinzugefügt, wodurch sich ein Gesamtvolumen des Reaktionsansatzes von 30 µl ergab. Analog hierzu wurde als Negativkontrolle, welche den Nachweis von genomischer DNA mittels PCR erlaubte, ein Ansatz ohne Zugabe der Reversen-Transkriptase vorbereitet.

5× Reaktionspuffer	6,0 µl
dNTP-Mix (10 mM)	2,0 µl
Oligo-dT-Primer (100 pmol)	1,0 µl
RNase-Inhibitor (40 U/µl)	0,5 µl
M-MuLV Reverse-Transkriptase (20 U/µl)	0,7 µl

Die Reaktionsansätze wurde im Thermozykler bei 42 °C für 1 h inkubiert. Hieran schloss sich eine Inaktivierung der reversen Transkriptase durch Erhitzung des Ansatzes auf 70 °C für 10 min an. Sofern keine Analyse der Genexpression im direkten Anschluss vorgenommen wurde, wurden die cDNA-Proben bei –20 °C dauerhaft gelagert.

4.2.6.7. Photometrische Konzentrationsbestimmung von wässrigen Nukleinsäure-Lösungen

Die Konzentration von Nukleinsäure-Präparationen wurde durch photometrisch Messung der Lichtabsorption (A) der Lösung bei einer Wellenlänge von $\lambda = 260$ nm bestimmt. Hierzu wurde eine Verdünnung von 1:100 der Nukleinsäure-Lösung in A. bidest angesetzt. Die Messungen erfolgten in einer Quarzküvette (Schichtdicke 10 mm, Probenvolumen 100 μ l) gegen A. bidest, dessen Absorption gleich Null gesetzt wurde. Die Konzentration der Nukleinsäure-Lösung ergibt sich unter Berücksichtigung der Verdünnungsstufe wie folgt:

$$A_{260} = 1,0 = 50 \mu\text{g doppelsträngige DNA/ml}$$

$$A_{260} = 1,0 = 40\mu\text{g RNA/ml}$$

Zur Abschätzung der Reinheit wurde der Quotient A_{260}/A_{280} errechnet. Werte für reine Proben liegen zwischen 1,8 und 2,0. Stärker abweichende Werte weisen auf eine Verunreinigung z. B: durch Proteine oder Lösungsmittel hin.

4.2.6.8. Analyse der Genexpression mittels Polymerase-Ketten-Reaktion (PCR)

Der Nachweis der Expression von Genen erfolgte nach Synthese der cDNA aus Gewebe und Zellkulturproben (Punkt 4.2.6.6., Seite 63) mittels der exponentiellen Amplifikation eines als Matrize dienenden, einzelsträngigen cDNA Abschnittes mittels genspezifischer Primer durch Polymerase-Ketten-Reaktion (PCR). Der Ansatz der PCR-Reaktionen mit einem Gesamtvolumen von 30 μ l erfolgte auf Eis in sterilen 0,2 ml-„PCR-Softtubes“ (Biozym). Der PCR-Reaktionsansatz umfasste die folgenden Komponenten:

10x Reaktionspuffer	3,0 μ l
dNTP-Mix (10 mM)	1,2 μ l
MgCl ₂ (25 mM)	1,8 μ l
vorwärts-Primer (100 pmol)	1,2 μ l
rückwärts-Primer (100 pmol)	1,2 μ l
cDNA-Matrize	1–2 μ l
<i>taq</i> -Polymerase (5 U/ μ l)	0,3 μ l
A. bidest ad	30 μ l

Die PCR wurde in einem Thermozykler durchgeführt und gliederte sich in die nachstehenden Schritte. Einer initialen Denaturierung der cDNA für 3 min bei 95 °C folgte die zyklische Abfolge einer Denaturierung bei 95 °C für 30 s, gefolgt von der Anlagerung der Primermoleküle an die cDNA-Matrize bei spezifischer, optimaler Bindungstemperatur (T_m -Werte, $T_m = 4 (G+C) + 2 (A+T)$) des Primerpaares für 30 s und die Amplifikation des gesuchten Genabschnittes während einer 40 s bis 1 min dauernden Elongationsphase bei 72 °C durch die *taq*-Polymerase. Dabei richtete sich die Dauer dieser Phase nach der Größe des zu amplifizierenden cDNA-Abschnittes. Die Wiederholung dieser drei Schritte umfasste 30 bis maximal 35 Zyklen. Hiernach wurde zur finalen Elongation der Amplifikate eine Erhitzung auf 72 °C für 5 min vorgenommen und im Anschluss die Reaktion durch Abkühlung des Ansatzes auf 10 °C beendet. Zur Analyse der PCR wurden die Amplifikationsprodukte gelelektrophoretisch gemäß ihrer Größe aufgetrennt (siehe hierzu Punkt 4.2.6.10., Seite 67).

4.2.6.9. Quantitative-“*Real-Time*“-Polymerase-Ketten-Reaktion (qRT-PCR)

Die Quantitative-„*Real-Time*“-PCR (qPCR) kommt vorwiegend für vergleichende Genexpressionsanalysen zum Einsatz. Im Gegensatz zur herkömmlichen PCR erlaubt die qRT-PCR die Amplifikation von cDNA-Abschnitten mittels spezifischer Primerpaare und deren zeitgleiche Detektion. Hierdurch wird es möglich, unter Verwendung eines Referenzgenes („*Housekeeping gene*“, Haushaltsgen), welches in seiner Expression nicht durch die experimentellen Bedingungen beeinflusst ist, eine relative Quantifizierung der Expression eines Gens in einer oder mehrerer Proben im Vergleich zu einer Kontrollprobe durchzuführen. Das Referenzgen hat hierbei die Aufgabe, einen mathematischen Ausgleich der Variationen in der Ausgangsmenge der eingesetzten DNA zu ermöglichen. Die Detektion der Amplifikate erfolgt über die Emission eines in die amplifizierte, doppelsträngige DNA interkalierenden Fluoreszenzfarbstoffes. In der vorliegenden Arbeit wurde *SYBR Green I* verwendet. Beginnend mit einer initialen Denaturierung der als Template dienenden cDNA bei 95 °C schließen sich wie bei der klassischen PCR zyklische Wiederholungen der Denaturierung, der Primer-Anlagerung („*Annealing*“) und der Elongation des komplementären DNA-Stranges durch die *taq*-Polymerase an. In den nach Ablauf der Elongation vorliegenden doppelsträngigen DNA-Strang interkaliert der Fluoreszenzfarbstoff während der Synthese. Zu diesem Zeitpunkt wird die Emission des *SYBR Green I*-DNA-Komplexes nach Anregung bei einer Wellenlänge (λ) von 521 nm gemessen. Mit jedem Zyklus verstärkt sich hierdurch das detektierbare Fluoreszenzsignal proportional zur Menge der amplifizierten Fragmente. Nach Ablauf von max. 40 Zyklen, wird eine Schmelzkurven-

analyse der Amplifikate angeschlossen, um Fehlamplikate, die anhand eines abweichenden Schmelzpunktes von dem des spezifisch amplifizierten DNA-Fragmentes unterscheidbar sind, angeschlossen. Die Schmelztemperatur („*Melting temperature*“, T_m) gibt die jeweilige Temperatur an, bei der 50% der Menge eines spezifische amplifizierten DNA-Fragmentes als Einzelstrang vorliegt. Für die Erstellung der Schmelzkurve werden zunächst alle doppelsträngigen DNA-Moleküle denaturiert und bei 60 °C hybridisiert. Hierbei interkaliert wiederum der *SYBR Green I*-Fluoreszenzfarbstoff in die doppelsträngigen DNA-Moleküle. Denaturierung und Hybridisierung wechseln miteinander ab, wobei die Hybridisierungstemperatur sukzessive erhöht wird. Infolgedessen bleiben doppelsträngige Amplifikate der selben Fragmentlänge bei einer für sie spezifischen Temperatur, über dem eigentlichen T_m -Wert, in Einzelstränge getrennt und das Fluoreszenzsignal nimmt proportional ab.

Die qRT-PCR wurde unter Verwendung des RT-PCR-Thermozyklers ABI Prism 7500, des *SYBR Green I*-Mastermix und speziellen 96-Kammerplatten, die eine Messung des Fluoreszenzsignals zulassen, der Firma Applied Biosystems GmbH durchgeführt. Der Reaktionsansatz pro Kammer und das PCR-Programm sind im folgenden wiedergegeben:

Reaktionsansatz		qPCR Programm		
2× <i>SYBR Green I</i> -Mix	12,5 µl	1. Initiale Denaturierung	10 min	95 °C
vorwärts-Primer	2,5 µl	2. Denaturierung	30 s	95 °C
(10 pmol)				
rückwärts-Primer	2,5 µl	3. Primer-Anlagerung	30 s	T_m (Primer).
(10 pmol)				
cDNA Template	2,5 µl	4. Elongation	40 s	72 °C
H ₂ O	5 µl	Zyklen (2-4)	40	
Gesamtvolumen	25 µl			
		Schmelzkurve:		
		A: 15 s 95 °C	1 min 60 °C	
		B: 15 s 95 °C	1 min x °C – 0,5 °C	

Die Amplifikation des DANN-Templates wird in drei Abschnitte untergliedert, einer Basisphase, in der die Zahl der Ausgangskopien noch zu gering ist, um quantitativ auswertbar zu sein, die exponentielle Phase, in der die der amplifizierten DNA-Fragmente exponentiell und daher quantifizierbar ansteigt, sowie die dritte Phase, die stationäre Phase, in der Substratverbrauch, multiple Produkte und nachlassende Enzymaktivität zu suboptimalen Reaktionsbedingungen führen. Um die Messung für die einzelnen Proben

stets zu Beginn der exponentiellen Phase durchführen zu können, bedient man sich des Ct-Wertes („*Threshold cycle*“). Der Ct-Wert beschreibt den jeweiligen Zyklus, bei dem das Fluoreszenzsignal erstmals signifikant über die Hintergrundfluoreszenz ansteigt. Die Auswertung der Genexpressionsdaten, die auf diese Weise gemessen werden, lässt sich nur unter der Voraussetzung durchführen, dass die Amplifikation des Referenzgenes, hier *Gapdh*, und des Zielgens eine nicht zu stark voneinander abweichende Effizienz besitzen.

Die Effizienz (E) wird mittels einer Standardkurve für jedes Primerpaar bestimmt und ergibt sich wie folgt aus der Steigung (m) der Standardkurve:

$$E = 10^{-1/m} - 1$$

Eine Effizienz von 100% entspricht einer Steigung von $-3,32$ und einer Verdopplung der Amplifikate pro Zyklus.

Die unterschiedliche Expression eines Gens lässt sich als n -fache Expression ($2^{-\Delta\Delta Ct}$) durch den $\Delta\Delta Ct$ -Wert angeben. Hierzu wird die Differenz des Ct-Wertes des Zielgens und des Ct-Wertes des Referenzgens gebildet (ΔCt) wodurch Unterschiede in der Ausgangsmenge des Templates kompensiert werden (1). Im nächsten Schritt wird die Differenz aus dem ΔCt -Wert einer Probe und dem ΔCt -Wert der Kontrollprobe errechnet (2), der durch $2^{-\Delta\Delta Ct}$ auch als absoluter Wert angegeben werden kann (3). Die Standardabweichungen (s) ergeben sich aus den unten aufgeführten mathematischen Formeln (5), welche ebenfalls als Absolutwerte angegeben werden können.

$$(1) \quad \Delta Ct = Ct_{\text{Zielgen}} - Ct_{\text{Referenzgen}}$$

$$(2) \quad \Delta\Delta Ct = \Delta Ct_{\text{Probe}} - \Delta Ct_{\text{Kontrollprobe}}$$

$$(3) \quad 2^{-\Delta\Delta Ct}$$

$$(4) \quad s = \sqrt{s_{\text{Zielgen}}^2 + s_{\text{Referenzgen}}^2}$$

$$(5) \quad 2^{-(\Delta\Delta Ct + s)}; 2^{-(\Delta\Delta Ct - s)}$$

4.2.6.10. DNA-Agarosegelelektrophorese

Die elektrophoretische Größenaufftrennung von DNA-Fragmenten nach DNA-Restriktion oder aus PCR-Reaktionen (Punkte 4.2.6.3. und Punkt 4.2.6.8., Seiten 60 und 64) wurde in 2%igen Submers-Agarosegelen vorgenommen. Hierzu wurden zunächst 8 g Agarose in

400 ml 1× TAE-Puffer durch Aufkochen gelöst, verdunstete Flüssigkeit ergänzt und die Lösung unter Schwenken auf ca. 60 °C abgekühlt. Zur Detektion der DNA-Fragmente unter UV-Licht wurde dem Gel Ethidiumbromid (EtBr) in einer Konzentration von 0,4 µg/ml zugesetzt. Die Agarose-Lösung wurde gründlich gemischt, in eine abgedichtete Gelträgerwanne gefüllt und die Probenkämme zur Bildung der Auftragstaschen eingesetzt. Nach Erstarren des Agarosegels wurde dieses mit dem Träger in die Elektrophoresekammer eingesetzt, mit 1× TAE-Puffer überschichtet und vorsichtig die Probenkämme entfernt. Die DNA-Proben wurden mit dem entsprechenden Volumen DNA-Probenpuffer (6×) versetzt und vollständig aufgetragen. Zur Größenbestimmung der Fragmente wurde das Agarosegel mit 6 µl des 100 bp-DNA-Größenstandards beschickt. Die elektrophoretische Auftrennung der DNA-Fragmente erfolgte bei 120 V und wurde anschließend unter UV-Licht photographisch dokumentiert.

4.2.6.11. Aufreinigung von DNA-Fragmenten aus Agarosegelen

Die PCR-Produkte der *Sim1*-Amplifikation zur Generierung eines RNA-Sonden-Plasmides für den Einsatz in die *in situ*-RNA-Hybridisierung wurden elektrophoretisch in einem 2%igen TAE-Agarosegel bei 120 V aufgetrennt. Die Elution der zu ligierenden Fragmente wurde unter Verwendung des QIAEX II-Elutionskits vorgenommen. Hierzu wurden die DNA-Bande einer Fragmentgröße von 213 bp im Gel auf dem Transilluminator mit einem sterilen Skalpell markiert und anschließend entnommen. Nach Gewichtsbestimmung wurden 3 VT QX1 sowie 2 VT DEPC-behandeltes A. bidest zugesetzt und der Ansatz bis zur Auflösung des Gels gevortext. Es wurden nun 10 µl der gründlich suspendierten Silika-Matrix (QIAX2) zugesetzt, gemischt und der Ansatz für 10 min bei 50 °C und 14000 Upm zur DNA-Bindung an die Matrix im Thermomixer inkubiert. Zur Sedimentierung der matrixgebundenen DNA-Fragmente wurde der Ansatz 30 s bei 14000 Upm abzentrifugiert und der Überstand gründlich abpipettiert. Es folgte ein Waschschriff mit 500 µl QX1 sowie eine zweimaliges Waschen mit 500 µl PE-Puffer. Nach Verwerfen des Überstandes wurde das Pellet luftgetrocknet. Zur Elution der DNA-Fragmente wurde das Matrix-Pellet in 15 µl DEPC-behandeltes A. bidest sowie 5 µl 10 mM Tris-HCl (pH 7,5) resuspendiert und 5 min bei 50 °C unter gelegentlichem Invertieren inkubiert. Durch Zentrifugation bei 14000 Upm für 1 min wurde die Matrix abgetrennt und der die DNA enthaltende Überstand in ein neues Eppendorf-Reaktionsgefäß überführt. 1/3 des Eluates wurden zur Abschätzung der Konzentration nochmals elektrophoretisch aufgetrennt (Punkt 4.2.6.10, Seite 67). Bis zur Ligation in einen geeigneten Vektor wurden die DNA-Lösung bei -20 °C gelagert.

4.2.6.12. Genexpressionsstudie mittels cDNA-Mikroarray-Analyse

Zur Identifizierung bisher unbekannter Kandidatengene, die Einfluss auf die Entwicklung von 5-HT-Neuronen des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus nehmen könnten, wurde die Tatsache genutzt, dass Vorläuferzellen mesencephaler DA-Neurone und rhombencephaler 5-HT-Neurone in enger ontogenetischer Verwandtschaft zueinander stehen. Somit sollte ein Vergleich der Genexpressionen beider Gewebegebiete zu einem geeigneten, frühen Zeitpunkt der Entwicklung Unterschiede in der Expression von Genen aufweisen, die bisher nicht in diesem entwicklungsbiologischen Kontext untersucht wurden. Als geeignet Stadium wurde der Embryonaltag (E11) gewählt, da zu diesem Zeitpunkt nur vereinzelt differenzierte rostrale 5-HT-Neurone im Rhombencephalon detektierbar sind. Der Vergleich der Genexpression wurde durch cDNA-Mikroarray-Analyse durchgeführt. Hierfür wurde Gesamt-RNA sowohl des ventralen Mesencephalon als auch des ventralen rostralen Rhombencephalon, wie unter Punkt 4.2.6.4. (Seite 61) erläutert, isoliert. Die Mikroarray-Analyse erforderte eine hochwertige Präparation der Gesamt-RNA, so dass vor der Durchführung zunächst die Integrität der RNA mittels denaturierender Formaldehyd-Gelelektrophorese überprüft wurde (Punkt 4.2.6.5., Seite 62). Zum Vergleich des Genexpressionsmusters wurde der GeneChip® Mouse Genome 430A 2.0-Array von Affimetrix verwendet, auf welchem synthetisch hergestellte Oligonukleotide in definierter Position („Slide“) auf der Oberfläche gebunden vorliegen, die spezifisch für 22000 gut charakterisierten Genen des Mausgenoms sind. Je RNA-Probe wurden 11 µg für die Synthese der cDNA verwendet. Die cDNA-Synthese wurde am Steinbeis-Transferzentrum für Proteom-Analysen, Rostock durchgeführt. Hierbei wurden die beiden zu vergleichenden cDNA-Proben, ventrales Mesencephalon und ventrales rostrales Rhombencephalon der Maus (E11) durch zwei unterschiedliche Fluoreszenzfarbstoffe markiert. In der anschließenden Hybridisierungsreaktion wurden die cDNA-Proben an die synthetischen Oligonukleotide des Mikrochip gebunden. Nach Abschluss der Hybridisierung wird der Mikrochip durch Laser ausgelesen. Hierbei werden die in die cDNA inkorporierten Fluorophore der beiden Proben bei spezifischer Wellenlänge angeregt. Die hierbei ausgelöste Emission jedes Fluorophors eines „Slides“ wird gemessen und anschließend der Quotient beider Werte errechnet. Der Quotient der Emissionen beider Proben gibt an, ob das Gen, welches durch das hybridisierte Oligonukleotid repräsentiert wird, in einer Probe relativ zur zweiten Probe herauf- oder herunterreguliert ist oder keine Unterschiede bezüglich der Expression vorliegen. Die Normalisierung der Daten erfolgt durch den Vergleich der Expression von verschiedenen „Housekeeping“-Genen in beiden cDNA-Proben.

4.2.7. *In situ*-RNA-Hybridisierung

4.2.7.1. Klonierung von *in situ*-RNA-Sondenplasmiden — Ligation von DNA-Molekülen

Zur Klonierung eines *Sim1*-Sondenplasmides wurde das *pGEM-T Easy* Vektor-System verwendet. Der linearisierte Vektor trägt an den 3'-Enden eine Thymidin-Überhang wodurch die Insertion von PCR-Produkten, welche in Abhängigkeit der verwendeten *taq*-Polymerase einen Adenin-Überhang an den 5'-Enden besitzen, erleichtert wird. Zur Ligation des eluierten *Sim1*-Genfragments (213 bp) in den *pGEM-T Easy* Vektor wurde ein Verhältnis des Inserts zum Vektor von nahezu 3:1 gewählt.

Zusammensetzung des Ligationsansatzes in einem 0,5 ml-Eppendorf-Reaktionsgefäß:

2× „ <i>Rapid ligation buffer</i> “	5 µl
PCR Produkt	3 µl
<i>pGEM-T Easy</i> Vektor	1 µl
T4 DNA-Ligase (5 U/µl)	1 µl
A. bidest ad	50 µl

Die Ligationsreaktion verlief ü. N. bei 4 °C und wurde am folgenden Tag zur Transformation chemisch kompetenter *E. coli DH5α* eingesetzt (Punkt 4.2.1.3., Seite 40).

4.2.7.2. Herstellung von *in situ*-RNA-Sonden durch *in vitro*-Transkription

Zur *in vitro*-Transkription wurde jeweils 1 µg des geschnittenen *pGem-T Easy::Sim1*- (213 bp)-Sondenplasmides eingesetzt. Wurde der Vektor vor dem T7-Promotor linearisiert, wurde für die *in vitro*-Transkription die Sp6-Polymerase verwendet. Für eine *in vitro*-Transkription des vor dem Sp6-Promotor linearisierten Vektors wurde entsprechend die T7-Polymerase benutzt. Hierdurch wurden beide komplementären DNA-Stränge des *Sim1*-Inserts in mRNA transkribiert und auf diese Weise eine „*sense*“- (Sp6) und eine „*anti-sense*“- (T7)-RNA-Hybridisierungssonde gegen *Sim1*-mRNA der Größe von 301 bp bzw. 322 bp gewonnen.

Im Folgenden ist der Ansatz der *in vitro*-Transkriptionsreaktion dargelegt:

DIG-Labeling Mix	2 µl
5× Transkriptionspuffer	4 µl
RNase-Inhibitor	1 µl
linearisierte Plasmid-DNA	10 µl
T7- bzw. Sp6 Polymerase (10 U/µl)	1 µl
DEPC-behandeltes A. bidest	ad 20 µl

Die *in vitro*-Transkription verlief bei 37 °C im Wärmeblock für 150 min. Zur Fällung der RNA-Sonden wurde der Ansatz mit 5 µl einer 4M LiCl-Lösung sowie 150 µl 100%igem Ethanol versetzt und bei –80 °C für 30 min inkubiert. Die RNA wurde durch Zentrifugation bei 12000 Upm und 4 °C für 30 min sedimentiert. Hiernach wurde die RNA in 200 µl 70%igem Ethanol gewaschen und bei 12000 Upm und 4 °C für 15 min abzentrifugiert. Nach Lufttrocknung der RNA-Sondenproben wurden diese in 20 µl DEPC-behandeltem A. bidest gelöst und bei –80 °C gelagert.

4.2.7.3. Effizienzbestimmung von *in situ*-RNA-Sonden

Um die Effizienz der *in vitro*-Transkription (Punkt 4.2.7.2., Seite 70) zu bestimmen und die in die *in situ*-RNA-Hybridisierung einzusetzenden Volumina der „sense“- und „anti-sense“-DIG-markierten RNA-Sonde zu bestimmen, wurde von jeder RNA-Sonde eine Verdünnungsreihe in DEPC-behandeltem A. bidest angesetzt. Verwendet wurden je eine 1:10, 1:50, 1:100, 1:1000 und 1:10000 Verdünnungsstufe. Zur späteren Konzentrationsabschätzung der transkribierten RNA-Sonden wurde eine DIG-markierte Kontroll-RNA einer Konzentration von 1 µg/µl in gleicher Weise verdünnt. Von jeder Verdünnungsstufe der Sonden-RNA bzw. Kontroll-RNA wurde 1 µl auf eine Nitrozellulose-Membran aufgetropft und diese 10 min luftgetrocknet. Die Bindung der RNA-Moleküle an die Membran erfolgte durch 2minütige Fixierung durch UV-Bestrahlung („Cross-linking“). Die Membran wurde in eine Ø 10 cm-Petrischale gelegt und diese 3 min lang in Puffer I äquilibriert. Unspezifische Bindungsstellen wurden durch Inkubation in Magermilchpulver-gesättigtem Puffer I (4% Milchpulver, MP) für 15 min auf einem Horizontalschüttler erreicht. Hiernach erfolgte die Bindung des gegen DIG-gerichteten und an alkalische Phosphatase gebundenen Antikörpers in einer Verdünnung von 1:5000 in MP-gesättigtem Puffer I für 30 min bei RT. Nach zweimaligem Waschen in Puffer I für jeweils 10 min wurde die Membran in Puffer III umgepuffert. Die alkalische Phosphatase-vermittelte Farbreaktion wurde durch Inkubation in 5-Brom-4-chlor-3-indoxylphosphat-(BCIP)/Nitroblau-Tetrazoliumchlorid-(NBT)-Lösung (1:50

in Puffer III) unter Lichtabschluss gestartet. Nach deutlicher Farbentwicklung wurde der Puffer entfernt, die Membran mehrmals in Leitungswasser gewaschen und die Membran luftgetrocknet.

4.2.7.4. *In situ*-RNA-Hybridisierung an embryonalen Gewebeschnitten der Maus (E12)

Der *in situ*-Nachweis der Expression des für den Transkriptionsfaktor *Sim1* kodierenden Gens erfolgte durch Hybridisierung genspezifischer, DIG-markierter RNA an 10 µm dicken Paraffinschnitten der Maus des Embryonaltages (E) 12, welche durch PFA fixiert worden waren. Zum direkten Vergleich der, wie unter Punkt 4.2.7.2. (Seite 70) erläutert, hergestellten “sense”- und “anti-sense”-RNA-Sonden gegen *Sim1*-mRNA wurden je zwei direkt aufeinander folgende Objektträger mit jeweils zwei Schnitten verwendet. Die *in situ*-RNA-Hybridisierung wurde unter RNase-freien Bedingungen in sterilen Glasküvetten sowie unter Verwendung RNase-freier, DEPC-behandelter und autoklavierter Lösungen durchgeführt. Zunächst wurden die Paraffinschnitte durch zweimalige, 10minutige Inkubation in Xylol entparaffiniert. Hieran schloss sich eine Rehydrierung des Gewebes durch eine absteigende Ethanolreihe und anschließende Waschung in PBS an.

10 min	100% Ethanol
10 min	100% Ethanol
5 min	95% Ethanol
5 min	80% Ethanol
5 min	70% Ethanol
3 × 5 min	PBS

Nach Rehydrierung wurden die Schnitte zur Absättigung freier Aldehydgruppen für 5 min in einer 0,1 M Glycin-Lösung inkubiert. Während einer dreimaligen Waschung der Schnitte in PBS für jeweils 5 min wurde der Raum um die Schnitte mittels eines Fettstiftes begrenzt, um das in späteren Schritten einzusetzende Volumen von Enzymlösungen und der, die RNA-Sonden enthaltende, Hybridisierungslösung zu verringern. Nach Abschluss der Waschung in PBS wurden die beiden Gewebeschnitte eines Objektträgers mit 100 µl einer Proteinase K-Lösung (10 µg/ml in TE-Puffer, pH 8) bedeckt. Die Schnitte wurden nun in einer mit angefeuchtetem Fliespapier ausgekleideten Kammer bei 37 °C für 30 min inkubiert. Durch die Proteinase K-Behandlung werden intrazelluläre Proteine abgebaut, darunter auch DNasen und RNasen. Des Weiteren werden durch diese enzymatische

Behandlung Nukleinsäuren für die späteren Hybridisierung der RNA-Sonden zugänglich. Nach Ablauf der Inkubation wurden die Schnitte erneut in 4%igem PFA für 3 min in einer Glasküvette fixiert und hierdurch die Aktivität der Proteinase K inhibiert. Zur Reduktion einer später auftretenden Hintergrundfärbung durch endogene Phosphatasen wurde eine Inkubation in 0,1 M Tris-Puffer unter Zusatz von 0,25% Essigsäureanhydrid für 10 min unter Lichtabschluss angeschlossen. Die Schnitte wurden nun in einer Feuchtkammer mit je 100 µl der Hybridisierungslösung bedeckt und für 1h bei RT prähybridisiert. Kurz vor Beendigung der Prähybridisierung wurden 50 ng der DIG-markierten, gegen *Sim1*-gerichteten “*sense*”- bzw. “*anti-sense*”-RNA-Sonde in einem Gesamtvolumen von jeweils 10 µl in DEPC-behandeltem A. bidest verdünnt und die RNA bei 65 °C für 3 min denaturiert. Danach wurden die RNA-Proben für 2 min auf Eis gestellt, wodurch eine spontane Hybridisierung der RNA-Moleküle mit sich selbst oder miteinander unterbunden wurde. Den RNA-Proben wurden nun 90 µl Hybridisierungslösung zugegeben. Je ein Objektträger wurde mit einer RNA-Probe nach Entfernen der Prähybridisierungslösung bedeckt. Die Hybridisierung der RNA-Sonden an mRNA des *Sim1*-Gens erfolgte ü. N. bei 42 °C im Wärmeschrank in einer Feuchtkammer.

Am folgenden Tag wurden die Schnitte zunächst in einer Glasküvette mit 4fach konzentrierter, auf 42 °C temperierten SSC-Lösung gewaschen. Nicht gebundene oder unvollständig gebundenen RNA-Sondenmoleküle wurden durch eine anschließende RNase A-Behandlung (10 µg/ml RNase A in TE-Puffer, pH 8) entfernt. Die nachfolgenden Waschungen wurden ebenfalls bei 42 °C in vorgewärmten SSC-Lösungen absteigender Konzentration durchgeführt.

15 min	2x SSC
15 min	0,1x SSC
5 min	0,05x SSC

Hieran schloss sich eine Äquilibrierung der Gewebeschnitte in Puffer I für 10 min an. Unspezifischer Bindungsstellen wurden durch eine 30minutige Inkubation der Gewebeschnitte in Magermilchpulver-gesättigtem (4% MP) Puffer I blockiert. Die Verdünnung des anti-DIG, alkalische Phosphatase-gebundenen Antikörpers zum Nachweis der DIG-markierten, hybridisierten RNA-Sonde erfolgte im gleichen Puffer, im Verhältnis 1:400. Hiervon wurden jeweils 100 µl auf die beiden Gewebeschnitte eines Objektträgers verteilt und diese zur Bindung des Antikörpers in einer Feuchtkammer bei 4 °C, ü. N. inkubiert.

Der indirekte Nachweis gebundener DIG-markierter, gegen *Sim1*-mRNA-gerichteter RNA-Sondenmoleküle erfolgte am darauffolgenden Tag durch alkalische Phosphatase-(AP)-vermittelte Farbreaktion. Hierzu wurden nicht gebundene, gegen DIG-gerichtete, AP-markierte Antikörper durch dreimalige Waschung der Gewebeschnitte in Puffer I entfernt. Durch 5minutige Inkubation der Gewebeschnitte in Puffer III wurden die optimalen Pufferbedingungen der AP im Gewebe hergestellt. Je 20 µl NBT- und BCIP-Lösung als Substrat der AP-Reaktion sowie 1 µl einer Levamisol-Stammlösung (2,4 mg/ml) zur Inhibierung endogener alkalischer Phosphatasen wurden in einem Gesamtvolumen von 1 ml in Puffer III verdünnt. 100 µl der Reaktionslösung wurden auf die Gewebeschnitte eines Objektträgers pipettiert. Die Farbreaktion wurde in einer lichtgeschützten Feuchtkammer durchgeführt und gelegentlich unter dem Mikroskop beobachtet. Nachdem eine deutliche bläulich-violette, zytoplasmatische Färbung zu erkennen war, wurde die Farbreaktion der mit “*anti-sense*”- und der entsprechenden “*sense*”-RNA-Sonde hybridisierten Gewebeschnitte durch einen 5minutigen Waschschrift in TE-Puffer abgestoppt. Anschließend wurden die Gewebeschnitte kurz in A. bidest getaucht und durch eine aufsteigende Ethanolreihe dehydriert.

1 min	70% Ethanol
1 min	80% Ethanol
1 min	95% Ethanol
2× 2 min	100% Ethanol

Die Entwässerung des Gewebes wurde durch zweimalige Inkubation in Xylol für jeweils 3 min abgeschlossen. Zur permanenten Konservierung der gefärbten Gewebeschnitte wurden diese in Entellan eingedeckt.

4.2.8. Proteinbiochemische Methoden

4.2.8.1. Isolierung des Gesamtproteins aus Gewebe und Zellkulturproben

Wie unter Punkt 4.2.2.1. (Seite 40) beschrieben wurden *MN9D*-Zellen zur Proteinisolation nach Transfektion der Zellen trypsinisiert und durch Zentrifugation in einem 15 ml-Falcon-Röhrchen sedimentiert. Das Zellpellet wurde nun in 5 ml kaltem Homogenisierungspuffer resuspendiert und bei 250 g und 4 °C für 5 min abzentrifugiert. Dieser Vorgang wurde zweimal wiederholt und schließlich das Zellpellet in 100 µl Homogenisierungspuffer (siehe Punkt 4.1.10., Seite 33) aufgenommen. Die Zellprobe wurde an einem Stab-Ultraschallgerät für dreimal 5 s zur Zerstörung von Komponenten der Zellmembran beschallt. Durch die Hitzeentwicklung war eine Kühlung der Probe auf Eis zwischen den einzelnen Ultraschall-Gaben notwendig. Die Proteinkonzentration wurde gemäß Punkt 4.2.8.2. (Seite 75) photometrisch bestimmt. Bis zur gelelektrophoretischen Auftrennung wurden die Proteine bei –80 °C gelagert.

4.2.8.2. Photometrische Bestimmung der Proteinkonzentration nach Bradford

Die Konzentration von Proteinlösungen (Punkt 4.2.8.1., Seite 75) erfolgte gemäß der Konzentrationsbestimmung nach Bradford. Diese Methode basiert auf der proportionalen Anlagerung des Coomassie-Farbstoffes an Proteine. Die Absorption des Farbstoffes wird anschließend photometrisch bei einer Wellenlänge (λ) von 595 nm gemessen und anhand einer parallel erstellten Standardkurve die Proteinkonzentration errechnet. Für Gesamtprotein-proben, isoliert aus *MN9D*-Zellen, wurde eine 1:20, eine 1:40 sowie eine 1:80 Verdünnung in A. bidest verwendet. Stammt die Probe von primären Neurospheres, so wurde aufgrund der erwarteten geringen Konzentration ein 1:5 und eine 1:10 Verdünnung in A. bidest verwendet. Die Regressionsgerade wurde anhand der Absorptionen ($A_{595\text{ nm}}$) einer BSA-Reihe bekannter Konzentration erstellt (0,1 mg/ml, 0,3 mg/ml, 0,5 mg/ml, 0,7 mg/ml sowie 1 mg/ml A. bidest). Zu jeweils 25 µl der Verdünnung wurde 1 ml des 1fach konzentrierten Bradford-Reagenz zugegeben und die Ansätze gut gemischt. Nach einer Inkubation von 10 min bei RT wurden die Proben in Einwegküvetten überführt, Luftblasen entfernt und die Absorption der Proben bei einer Wellenlänge von $\lambda = 595\text{ nm}$ gemessen.

4.2.8.3. Größenabhängige Auftrennung von Proteinen durch diskontinuierliche SDS-Polyacrylamidgelelektrophorese (SDS-PAGE)

Die Auftrennung der Proteinproben erfolgte durch diskontinuierliche SDS-PAGE in einer Mini-Protean-Gelapparatur (Bio-Rad). Nach Entfettung der beiden Glasplatten (7×8,3 cm×0,1 cm) wurden Abstandhalter (0,5cm Breite×0,15cm Tiefe) links und rechts zwischen die Glasplatten eingefügt, die Glasplatten in die Gelhalterung eingesetzt und schließlich in die Gießvorrichtung eingespannt. Die vorbereitete Lösung des Trenngels wurde zum Starten der Polymerisationsreaktion mit 50 µl APS (10% Ammoniumpersulfat) und 20 µl TEMED versetzt, gut gemischt und bis zu einem Abstand von ca. 2 cm zur oberen Glaskante zwischen die Glasplatten pipettiert. Bis zur vollständigen Polymerisation wurde das Trenngel mit Butanol überschichtet. Nach 20 h wurde das Butanol durch mehrmaliges Spülen mit A. bidest entfernt und restliche Flüssigkeit mit etwas Vliespapier abgesogen. Danach wurde der Probenkamm zur Bildung der Auftragstaschen zwischen die Glasplatten eingesetzt. Der angesetzten Lösung des Sammelgels wurden 50 µl APS (10 %) und 20 µl TEMED (Tetramethylethylendiamin) zugefügt, die Lösung gevortext und mit einer 1 ml-Pipette langsam an der Seite des Probenkammes auf das Trenngel pipettiert.

9%iges Trenngel		Sammelgel	
4×Tris/HCl-SDS; pH 8,8	3,75 ml	4×Tris/HCl-SDS pH 6,8	3,50 ml
A. bidest	6,75 ml	A. bidest	7,16 ml
Bisacrylamid (30%)	4,50 ml	Bisacrylamid (30%)	0,65 ml
10% APS	50 µl	10% APS	50 µl
TEMED	20 µl	TEMED	20 µl

Nach erfolgter Polymerisation des Sammelgels wurde das Gel aus der Gießapparatur genommen, in die Elektrophoresekammer eingesetzt und diese mit 1× Laufpuffer bis zur oberen Gelkante gefüllt. Der Probenkamm wurde vorsichtig entfernt und die Geltaschen mittels einer 25 µl-Hamilton-Spritze mit Laufpuffer gespült. Die Proteinproben wurden nun mit 6× Protein-Probenpuffer versetzt und bei 95 °C für 5 min denaturiert und direkt an die Denaturierung anschließend auf Eis gekühlt. Die Volumina der Proteinproben wurden nun in die Geltaschen pipettiert. Zur Abschätzung des Molekulargewichtes wurden 8 µl des „*prestained*“-Protein-Standards (BioRad) mitaufgetragen. Die Elektrophorese wurde bei 90 V begonnen und nachdem die Proben das Trenngels erreicht hatten, wurde die

Spannung auf 120 V erhöht. Sobald die Laufront die untere Gelkante erreicht hatte, wurde die Elektrophorese beendet.

4.2.8.4. Western-Blot-Analyse

Gegen Ende der elektrophoretischen Auftrennung der Proteinproben wurde eine PVDF-Membran in der Größe des Trenngels zugeschnitten und für den Proteintransfer vorbereitet. Hierzu wurde die Membran zunächst für 1 min in Methanol gelegt und schließlich bis zum Aufbau des Transfers in Transferpuffer äquilibriert. Nach Beendigung der SDS-PAGE wurde das Gel der Kammer entnommen und das Trenngel mittels Skalpell vom Sammelgel getrennt. Der Blot wurde von Kathode zu Anode in einem „*Blotsandwich*“ wie folgt aufgebaut: Begonnen wurde mit einem puffergetränkten Schwämmchen, hierauf wurde ein angefeuchtetes Whatman-Papier gegeben und auf dieses die PVDF-Membran. Nun wurde auf die Membran das Trenngel gelegt und die obere linke Kante der Membran gekennzeichnet. Auf das Trenngel wurde ein weiteres, puffergetränktes Whatman-Papier gegeben. Zur Entfernung möglicher Luftblasen wurde vorsichtig eine Pipette über den Transferaufbau gerollt. Zuletzt wurde ein nasses Schwämmchen aufgelegt und der „*Blotsandwich*“ geschlossen. Dieser wurde nun in die Blotapparatur zwischen Anode und Kathode so eingesetzt, dass das Trenngel sich auf der Seite der Kathode befand. Die Kammer wurde vollständig mit Transferpuffer gefüllt. Mit Hilfe eines Magnetrührers wurde das Durchmischen des Transferpuffers sichergestellt. Der Transfer erfolgte ü. N. bei 18 V und 4 °C.

Nach Beendigung des Proteintransfers wurde die PVDF-Membran entnommen und zur Überprüfung des Transfers für 1 min in Ponceau S-Lösung geschwenkt. Nach unspezifischer Anfärbung der Proteine wurde die Membran solange in A. bidest gewaschen, bis einzelne Banden sichtbar wurden. Zur Entfärbung der Membran wurde diese dreimal kurz in PBS (0,1% Tween-20) gewaschen. Die nachfolgenden Inkubationsschritte und Waschungen des Western-Blots erfolgten unter stetigem, leichtem Schwenken auf einem Horizontalschüttler bei 200 Upm. Die PVDF-Membran wurde zweimal für 5 min in TTBS (0,1% MP) gewaschen, woran sich ein 15minütiger Waschschrift anschloss. Die Absättigung der Membran wurde durch Inkubation in TTBS mit 3% MP für 8 h bei 4°C vorgenommen. Hiernach erfolgte die Bindung des primären Antikörpers. Es wurde ein polyklonaler, in Kaninchen hergestellter und gegen Sim1 gerichteter Antikörper in einer Verdünnung von 1:1000 in TTBS (0,1% MP) benutzt. Die Bindung des Primärantikörpers an das Sim1-Epitop erfolgte ü. N. bei 4°C unter kontinuierlichem, leichtem Schwenken. Am darauffolgenden Tag wurde die Membran mehrmals wie zuvor beschrieben gewaschen. Als sekundärer

Antikörper wurde ein an HRP-gebundener, in Ziege hergestellter Antikörper und gegen Kaninchen gerichteter Antikörper der Immunglobulinklasse G benutzt, der in einer Verdünnung von 1:10000 in TTBS verwendet wurde. Zur Antikörperbindung wurde die Membran in dieser Lösung für 1 h bei RT unter Schwenken inkubiert. Nach mehrmaligem Waschen in TTBS wurde die indirekte Detektion der Proteine durch Peroxidase-vermittelter Chemilumineszenz durchgeführt. Hierzu wurde der Puffer abgegossen, überschüssige Feuchtigkeit mit Filterpapier abgesogen und mit der ECL- („*Enhanced chemiluminescence*“)-Reaktionslösung bedeckt. Nach einer Inkubation von 1 min bei RT wurde die Membran zwischen zwei Folien gelegt und mit einem weichen Tuch entstandene Luftblasen beseitigt. Herausfließende Flüssigkeit wurde entfernt und die Membran in eine Filmkassette gelegt. Je nach Signalintensität wurde bei Verwendung von X-Omat/Blue (Kodak) für eine Dauer von 1 min bis zu 1 h exponiert und die Filme manuell entwickelt. Zur Überprüfung der Gleichmäßigkeit der verwendeten Proteinproben wurde ein Western-Blot für das „*Housekeeping*“-Gen Gapdh in gleicher Weise durchgeführt. Zur Anwendung kam hierbei ein gegen Gapdh gerichteter, monoklonaler und in Maus hergestellter Primärantikörper in einer Verdünnung von 1:1000. Als sekundärer Antikörper wurde ein gegen Maus gerichteter, an HRP-gebundener Antikörper der Immunglobulinklasse G verwendet, welcher 1:1000 in TTBS verdünnt wurde. Die Entwicklung des Western-Blot erfolgte wie oben beschrieben, die Belichtungszeit lag im Sekundenbereich.

4.2.9. Statistische Auswertung

Die in dieser Arbeit dargestellten Daten der Zellzählung und qRT-PCR sind als Mittelwert $\pm$ SEM („*Standard error of the mean*“) wiedergegeben. Die Unterschiede in der Anzahl der 5-HT-immunpositiven Zellen in den experimentellen Gruppen, *wt*- und *Sim1*-defiziente Mäuse sowie Unterschiede der Expressionswerte der cDNA-Proben eines Zeitpunktes aus „*Gain-of-function*“- und „*Loss-of-function*“-Experimenten und ihrer entsprechenden Kontrollen, wurden mit Hilfe des zweiseitigen „*Student's t-test*“ unter Annahme einer Normalverteilung auf ihre Signifikanz hin untersucht. Unterschiede zwischen mehreren experimentellen Gruppen, wie z. B. Expressionsdaten nach Behandlung von primären Zellkulturen mit Faktoren, wurden durch den „*One-Way*“-Anova- und Bonferroni-post-hoc-Test bestimmt. Statistische Signifikanz wurde wie folgt angenommen: * $P < 0,05$, ** $P < 0,01$, *** $P < 0,001$. $P > 0,05$ wurde als statistisch nicht signifikant angesehen (n. s.).

V. Ergebnisse

5.1. Etablierung und Charakterisierung eines Kultursystems primärer Neurospheres aus dem ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12)

5.1.1. Morphologie primärer Neurospheres aus dem ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12)

Pluripotente neurale Vorläuferzellen besitzen die Fähigkeit zu proliferieren und sich in unterschiedliche neurale Zelltypen, d. h. Neurone, Astrozyten und Oligodendrozyten, zu differenzieren (Uchida et al., 2000; Weissman, 2000). Aufgrund ihres Proliferationsvermögens bilden sie unter Einfluss von Mitogenen Neurospheres (Reynolds und Weiss, 1992; Morshead et al., 1994; Palmer et al., 1997; Gage, 2000; Roisen et al., 2001; Roussa et al., 2006). Um zu untersuchen, ob isolierte Zellen aus dem ventralen rostralen Rhombencephalon in der Lage sind, primäre Neurospheres zu bilden, wurde Gewebe dieser Gehirnregion mechanisch und enzymatisch in Einzelzellen dissoziiert (siehe hierzu Punkt 4.2.3.1., Seite 44). Eine auf diese Weise gewonnene Zellsuspension wurde in Gegenwart der Mitogene Fgf2 und Egf unter serumfreien Bedingungen kultiviert. Hierbei wurde den Zellen keine die extrazelluläre Matrix (EZM) nachahmende Oberfläche geboten. In Abb. 5 (Seite 80) sind die sich bildenden, primären Neurospheres aus dem ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12) als kugelförmige Zellaggregate unterschiedlicher Größe zu erkennen. Diese Zellaggregate ließen sich bereits nach vier Tagen in Kultur beobachten. Zum Großteil lagen die primären Neurospheres aus dem ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12), wie in Abb. 5A dargestellt, freischwimmend vor. Lediglich vereinzelt traten adherente, primäre Neurospheres auf, wie es in Abb. 5A exemplarisch durch einen Pfeil angezeigt ist. Die Bildung primärer Neurospheres beruht möglicherweise auf der Proliferationsaktivität vereinzelter, in der Zellsuspension enthaltener neuraler Stamm- und Vorläuferzellen als Antwort auf Fgf2 und Egf. Nur selten, wie in Abb. 5B durch einen Stern markiert, befanden sich in der Kultur neben primären Neurospheres auch Zellen, die aufgrund der mechanischen und enzymatischen Dissoziation des Ausgangsgewebes nicht überlebten.

Abb. 5: Zellen des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus des Embryonalaltages (E) 12 besitzen die Fähigkeit zur Bildung primärer Neurospheres **A:** Unter serumfreien Kulturbedingungen in Gegenwart von Fgf2 und Egf entstehen frei-schwimmende, primäre Neurospheres. Vereinzelt treten adherente Neurospheres auf (Pfeil). **B:** Morphologie primärer Neurospheres in höherer Vergrößerung. Nur wenige nicht vitale Zellen sind zu erkennen (Stern).

5.1.2. Bildung sekundärer Neurospheres

Um zu überprüfen, ob primäre Neurospheres des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus E12 aufgrund der Proliferation von pluripotenten, zur Selbsterneuerung befähigten Vorläuferzellen, entstanden, wurden die primären Neurospheres enzymatisch und mechanisch in einzelne Zellen dissoziiert (siehe Punkt 4.2.3.6, Seite 50). Die hierdurch erhaltenen Zellen wurden erneut unter serum-freien Bedingungen in Anwesenheit der Mitogene Fgf2 und Egf kultiviert. Die Kultur in einer geringen Zelldichte von 5×10^3 Zellen/Kammer einer 48-Kammerplatte ermöglichte die zeitliche Verfolgung einzelner, jedoch nicht klonaler Zellen. Abb. 6 (Seite 81) zeigt die Entwicklung eines sekundären Neurosphere über einen Zeitraum von 22 Tagen hinweg. Ließen sich primäre Neurospheres des ventralen rostralen Rhombencephalon bereits nach vier Tagen beobachten, so konnten im Gegensatz hierzu sekundäre Neurospheres, wie in Abb. 6A gezeigt, erst nach einer Kulturdauer von 12 Tagen festgestellt werden. Diese sekundären Neurospheres sind zunächst noch sehr klein. Abb. 6B gibt das Entwicklungsstadium des selben sekundären Neurospheres (Abb. 6A) nach weiteren drei Tagen („Day in vitro“ 15, DIV15) wieder. Deutlich ist die Größenzunahme aufgrund einer Erhöhung der Zellzahl erkennbar. Noch offensichtlicher ist diese Zellzahlzunahme sieben Tage später (DIV22) wie sie in Abb. 6C aufgezeigt ist. Die Bildung sekundärer Neurospheres ist ein weiterer Hinweis auf die Existenz neuraler Vorläuferzellen in Zellpräparationen aus dem ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12).

Abb.: 6A-C: Darstellung der zeitlichen Entwicklung (DIV "*Day in vitro*" 12-22) eines sekundären Neurospheres aus dissoziierten, primären Neurospheres des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (Embryonaltag, E12) unter Einfluss der Mitogene Fgf2 und Egf sowie serumfreier Kulturbedingungen.

5.1.3. Primäre Neurospheres aus dem ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12) besitzen Proliferationspotential

Um nachzuweisen, dass Zellen primärer Neurospheres aus dem ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12) zur Proliferation befähigt sind, wurde zusätzlich ein Bromdesoxyuridin-(BrdU)-Inkorporationsassay durchgeführt. BrdU ist ein chemisches, putativ mutagenes und zytotoxisches Analogon des Nukleosids Thymidin. Dieses Analogon wird in der Zelle phosphoryliert und anstelle des Nukleotids Desoxythymidintriphosphat (dTTP) im Zuge der Chromatiden-Replikation während der mitotischen S-Phase in die neu zu synthetisierende DNA eingebaut. Nach Denaturierung der genomischen DNA ermöglicht eine anschließende, immunzytochemische Nachweisreaktion die Markierung proliferierender, BrdU-positiver Zellen.

Primäre Neurospheres des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12) wurden für eine Zeitspanne von 2 h, 4 h, 6 h und 8 h nach Zugabe von BrdU (Endkonzentration: 10 μ M) zum Medium ohne Serum, unter Fgf2 und Egf Einfluss inkubiert (siehe Punkt 4.2.3.8., Seite 51). Um die BrdU-Inkorporation zu beenden, wurden die primären Neurospheres auf PORN-/Laminin-beschichtete Deckgläschen ohne eine vorangegangene Dissoziation plattiert. Nach Fixierung durch Ethanol/Glycin, und somit gleichzeitige Denaturierung der genomischen DNA, wurden die primären Neurospheres schließlich der immunzytochemischen Detektion des BrdU zugeführt. Verwendet wurde hierzu ein spezifisch gegen BrdU gerichteter monoklonaler, in Maus hergestellter primärer Antikörper. Als sekundärer Antikörper dienten im Esel hergestellte und gegen Maus gerichtete Immunglobuline der Klasse G, welche an FITC-gekoppelt waren. Die Abbildungen 7A-C (Seite 83) zeigen BrdU-positive Zellen (grün), wie sie nach 2 h, 4 h und 6 h BrdU-Behandlung immunzytochemisch nachgewiesen werden konnten. Deutlich ließen sich zu

allen drei Zeitpunkten eine Vielzahl proliferierender, BrdU-positiver Zellen feststellen. Darüber hinaus konnten auch nicht-fluoreszierende und somit sich nicht in der Zellteilung befindliche Zellen beobachtet werden. Neurale Vorläuferzellen lassen sich auch durch den immunzytochemischen Nachweis des spezifischen Neurofilaments, Nestin (Lendahl et al., 1990), markieren. Um Nestin exprimierende Vorläuferzellen in primären Neurospheres nachzuweisen, wurden primäre Neurospheres aus dem ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12), wie unter Punkt 4.2.3.3. (Seite 47) beschrieben, dissoziiert und auf PORN-/Laminin-beschichtete Deckgläschen ausplattiert. Nach dreitägiger Kultur wurden die Zellen durch PFA fixiert und immunzytochemisch untersucht (Punkt 4.2.4., Seite 53). Als primärer Antikörper wurde ein monoklonaler, gegen Nestin gerichteter, in Maus hergestellter Antikörper verwendet. Als sekundärer Antikörper dienten in der Ziege hergestellte und gegen Maus gerichtete Immunglobuline der Klasse G, welche an Cy3-gebunden vorlagen. Das Ergebnis des immunzytochemischen Nachweises von Nestin ist in Abb. 7D dargestellt. Eine hohe Anzahl Nestin-positiver Zellen konnte in der dissoziierten Kultur primärer Neurospheres beobachtet werden. Diese Zellen wiesen die für das Neurofilament Nestin charakteristische, zytoplasmatische Immunreaktivität auf. Es handelt sich somit wahrscheinlich um Vorläuferzellen. Neben diesen Zellen konnten auch Nestin-immunnegative Zellen in der Kultur festgestellt werden.

Abb. 7: Zellen primärer Neurospheres des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12) besitzen die Fähigkeit zur Proliferation. **A-C:** Immunzytochemische BrdU-Detektion (grün) in ausplattierten primären Neurospheres 2 h, 4 h und 6 h nach externer BrdU-Gabe (Endkonzentration 10 µM). **D:** Darstellung von Vorläuferzellen innerhalb dissoziierter, primärer Neurospheres DIV („Day *in vitro*“) 3 des ventralen rostralen Rhombencephalon (Maus, E12) mittels immunzytochemischer Detektion des spezifischen, neuralen Vorläuferzellmarkers Nestin (rot).

5.1.4. Zelluläre Zusammensetzung primärer Neurospheres aus dem ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E 12)

Um eine exakte und durch angrenzende Gewebe nicht kontaminierte Präparation des verwendeten ventralen rostralen Gewebes des Rhombencephalon der Maus (E12) sicherzustellen, wurde zunächst die Expression der Gene *Otx2* und *Gbx2* (Millet et al., 1999; Wassarman et al., 1997) in primären Neurospheres und entsprechendem, primärem Gewebe des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12) mittels Polymerasekettenreaktion und spezifischen Primern (Punkt 4.1.4., Seite 26) nach vorangegangener reverser Transkription (RT-PCR) analysiert. Abb. 8A (Seite 86) zeigt das Ergebnis der Amplifikation des *Otx2*- bzw. *Gbx2*-Gens in cDNA-Proben primärer Neurospheres und entsprechendem primärem Gewebe. Weder in primären Neurospheres (Spur 4), noch in primärem Gewebe (Spur 5) ließ sich eine Expression des mesencephalen Markergens *Otx2* (334 bp) nachweisen. *Gbx2* ist ein spezifisches Markergen des Rhombencephalon und, wie *Otx2*, an

der Ausbildung des IstO beteiligt. In Abb. 8A (Spur 6) konnte deutlich eine *Gbx2*-Expression (407 bp) in primären Neurospheres aus dem ventralen rostralen Rhombencephalon detektiert werden. Ebenso ließ sich in Abb. 8A (Spur 7) eine deutliche *Gbx2*-Expression in primärem Gewebe erkennen. Diese Ergebnisse belegen, dass die Präparation primären Gewebes des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12) nicht durch angrenzende mesencephale Gewebereiche verunreinigt war.

Obwohl primäre Neurospheres hinsichtlich der in ihnen enthaltenen Vorläuferzellen angereichert sind, besitzen primäre Neurospheres eine heterogene zelluläre Zusammensetzung. Dies basiert nicht zuletzt auf der charakteristischen Fähigkeit neuraler Vorläuferzellen, sich in unterschiedliche neurale Zelltypen, d. h. in Neurone und gliale Zellen, zu differenzieren (Uchida et al., 2000; Weissman, 2000). Um die zelluläre Zusammensetzung primärer Neurospheres des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12) näher zu untersuchen, wurde ein Vergleich der Genexpressionen zwischen diesen primären Neurospheres und primärem Gewebe des gleichen rhombencephalen Ursprunges vorgenommen. Die Genexpression bekannter Markergene unterschiedlicher neuraler Zelltypen wurde hierzu ebenfalls mittels RT-PCR bestimmt (siehe Punkt 4.2.6.8, Seite 64). Die Ergebnisse der RT-PCR-Analyse sind in den Abbildungen 8B-D dargestellt.

Die Expression des für neurale Vorläuferzellen spezifischen Gens *Nestin* (438 bp) konnte, wie in Abb. 8B dargestellt, sowohl in primären Neurospheres (Spur 2), als auch in primärem Gewebe des ventralen rostralen Rhombencephalon (Spur 3) in gleicher Stärke nachgewiesen werden. Abb. 8B zeigt des Weiteren die Expression von *β -III-Tubulin*, einem Neuronen spezifischen Anteil der Mikrotubuli und frühestes Markergen der neuronalen Differenzierung (Caccamo et al., 1989). *β -III-Tubulin* (327 bp) konnte mittels RT-PCR in primären Neurospheres (Spur 4) und in primärem Gewebe des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12, Spur 5) detektiert werden. Hierbei lag eine deutlich stärkere Expression dieses Gens in der primärem Gewebepräparation (Spur 5) vor. Eine Expression von *Gfap* („*Glial fibrillic acid protein*“, 97 bp), charakteristisch für Astrozyten, konnte hingegen, wie der Abb. 7A zu entnehmen ist, weder in cDNA-Proben primärer Neurospheres (Spur 9), noch im primären Gewebe des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12, Spur 10) detektiert werden.

Aufgrund der Tatsache, dass die Induktion 5-HT-Neurone des ventralen rostralen Rhombencephalon maßgeblich durch *Shh*, *Fgf8* und *Fgf4* bestimmt wird (Ye et al., 1998), wurden sowohl primäre Neurospheres als auch primäres Gewebe des ventralen rostralen Rhombencephalon auf eine endogene Genexpression dieser Faktoren hin untersucht. Abb. 8C gibt die Ergebnisse der Analyse der *Shh*-, *Fgf4*- und *Fgf8*-Genexpression in beiden cDNA-Proben wieder. Das Amplifikationsprodukt für *Shh* (523 bp) konnte in beiden Proben detektiert werden. Die Expression des Gens *Shh* war jedoch in primären Neurospheres

(Spur 4) im Vergleich zu primärem Gewebe (Spur 5) deutlich stärker. *Fgf4* (355 bp) konnte in seiner Expression hingegen in beiden Proben (Spuren 6 und 7) in gleichem Maße schwach nachgewiesen werden. Im Gegensatz hierzu war die Detektion einer endogenen Expression von *Fgf8* (494 bp) nur im primärem Gewebe des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12, Spur 10), nicht jedoch in primären Neurospheres (Spur 9), möglich.

Um zu untersuchen, ob mitotische Vorläuferzellen, welche dem Entwicklungsweg 5-HT-Neurone folgen könnten, vorhanden waren, wurden cDNA-Proben primärer Neurospheres des ventralen rostralen Rhombencephalon (E12) und primären Gewebes gleichen Ursprungs auf die Expression von Genen charakteristischer Transkriptionsfaktoren hin untersucht. Zu diesen Genen zählen *Nkx2.2* und *Lmx1b*. Die Abb. 8C zeigt die Ergebnisse des Expressionsvergleiches dieser Gene zwischen beiden cDNA-Proben. Eine erhöhte Genexpression von *Nkx2.2* (374 bp) konnte in primären Neurospheres des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E 12, Spur 10) im Vergleich zu primärem Gewebe (Spur 11) gezeigt werden. Ebenfalls gesteigert im Vergleich zu primärem Gewebe (Spur 13) erscheint die Expression von *Lmx1b* (492 bp) in primären Neurospheres (Spur 12).

Die Analyse der Expression von Markergenen der postmitotischen Entwicklungsstufe der 5-HT-Neurone zeigte weitere Unterschiede zwischen primären Neurospheres und primärem Gewebe des ventralen rostralen Rhombencephalon von Mausembryonen (E12) auf. Zu den analysierten Markergenen zählten *Gata2*, als mitotisch und postmitotisch exprimiertes Markergen der rostralen 5-HT-Neuronen Entwicklung, *Pet1*, als einziges spezifisches, postmitotisches Markergen für 5-HT-Neuronen, und *Tph2*, als Determinant der terminalen Spezifizierung des 5-HT-Phänotyps. Wie die Abb. 8D veranschaulicht, wurde *Gata2* (129 bp) sowohl in primärer Neurospheres (Spur 2) als auch in primärem Gewebe (Spur 3) in gleicher Stärke exprimiert. Hingegen konnte, wie in Abb. 8D dargestellt, sowohl für *Pet1* (109 bp, Spur 4) als auch für *Tph2* (99 bp, Spur 6) in primären Neurospheres eine erhöhte Genexpression im Vergleich zu primärem Gewebe des ventralen rostralen Rhombencephalon von Mausembryonen (E12, Spur 5 bzw. Spur 7) aufgezeigt werden.

Abb. 8: Vergleich der Genexpression zwischen primären Neurospheres (NS) und primärem Gewebe (T) des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12) mittels Polymerasekettenreaktion und genspezifischer Primer nach vorangegangener reverser Transkription (RT-PCR) **A–B:** Expression der den Isthmus (IstO) determinierenden Gene *Otx2* (Mesencephalon) und *Gbx2* (Rhombencephalon) sowie Expression der spezifischen Markergene *Gfap* (Astrozyten), *Nestin* (neurale Vorläuferzellen), und β -III-Tubulin (Neurone). **C :** Endogene Expression der Signalmoleküle *Fgf4*, *Fgf8* und *Shh* sowie Expression der Transkriptionsfaktoren *Nkx2.2* und *Lmx1b* als frühe Determinanten der Entwicklung serotonerger (5-HT-) Neurone **D:** Analysis der Genexpression von *Gata2*, frühes postmitotisches Markergen der rostralen 5-HT-Neuronenentwicklung, sowie *Pet1* und *Tph2* als Determinanten der terminalen Differenzierung serotonerger Neuronen.

5.1.5. Zellen primärer Neurospheres aus dem ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12) besitzen die Fähigkeit zur Differenzierung in unterschiedliche zelluläre Abstammungslinien

Um die gemischte zelluläre Zusammensetzung primäre Neurospheres des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12) auch auf Ebene der Proteinexpression nachzuweisen, wurden immunzytochemische Färbungen vorgenommen. Hierzu wurden primäre Neurospheres des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12) in Einzelzellen dissoziiert und auf PORN-/Laminin-beschichtete Deckgläschen plattiert (siehe hierzu Punkt 4.2.3.3., Seite 47). Für eine Dauer von drei Tagen wurden die Zellen unter serumfreien Bedingungen kultiviert, wodurch ihre Differenzierung ermöglicht werden sollte. Hiernach wurden die Zellen fixiert und immunzytochemisch die Expression zelltypspezifischer Markerproteine nachgewiesen (Punkt 4.2.4., Seite 53). Die Ergebnisse der immunzytochemischen Untersuchungen sind in den Abb. 9A-C sowie in Abb. 9E (Seite 88) wiedergegeben. Wie der Abb. 9A zu entnehmen ist, waren, wie für diesen Zeitpunkt der Differenzierung zu erwarten, in den dissoziierten Kulturen primärer Neurospheres des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12) nahezu keine Gfap-positiven (rot) Zellen zu beobachten. Im Gegensatz hierzu war, wie die Abb. 9B zeigt, eine hohe Anzahl Vorläuferzellen, repräsentiert durch Nestin-positve (rot) Zellen, innerhalb der Kulturen zu erkennen. In Abb. 9C sind jene Zellen dargestellt, die bereits in die Differenzierung zu Neuronen eingetreten waren, und aufgrund ihrer charakteristischen Immunreaktivität für β -III-Tubulin (grün) markiert werden konnten. Ebenso konnten bereits differenzierte, 5-HT-positive (grün) Zellen, wie Abb. 9D zeigt, innerhalb der Kulturen dissoziierter, primärer Neurospheres nachgewiesen werden.

Um nachzuweisen, ob die sich in Neurone differenzierenden Zellen von proliferierenden Vorläuferzellen innerhalb primärer Neurospheres abstammen, wurde durch BrdU-Inkorporationsversuche in primären Neurospheres und anschließende immunzytochemische Nachweisreaktionen für BrdU sowie für spezifische Markerproteine neuraler Zelltypen untersucht (siehe Punkt 4.2.3.8. und 4.2.4., Seite 51 und Seite 53). Abb. 9E zeigt eine deutliche, zelluläre Kolokalisation von β -III-Tubulin (rot) und BrdU (grün). Zudem weisen diese Zellen eine deutlich ausgereifte, neuronale Morphologie auf. In Abb. 9F sind Oligodendrozyten, hier repräsentiert durch O4-positive (rot) Zellen, dargestellt. O4 steht für einen Antikörper, der an ein Oligodendrozyten spezifisches, sulfatiertes Glycolipid („*Proligodendrocyte antigene*“, POA) bindet (Gard und Pfeiffer, 1989). Neben O4-positiven, BrdU-negativen Zellen zeigen einige O4-positive Zellen zugleich eine deutliche BrdU-positive Immunreaktivität (grün). Somit weisen primäre Neurospheres des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12) einerseits eine heterogene zelluläre Zusammensetzung

auf, und andererseits besitzen die in ihnen nachgewiesene Vorläuferzellen die Fähigkeit, sich in unterschiedliche neurale Zelltypen zu differenzieren.

Abb. 9: Primäre Neurospheres des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12) zeigen eine heterogene zelluläre Zusammensetzung. Vorläuferzellen aus primären Neurospheres des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12) besitzen die Fähigkeit zur Differenzierung in gliale und neuronale Zelltypen. **A-C:** Immunzytochemische Untersuchung von Kulturen dissoziierter, primärer Neurospheres an DIV3 („Day in vitro“ 3), Nachweis von Gfap-positiven Gliazellen (**A**, rot), von Nestin-immunpositiven Vorläuferzellen (**B**, rot) und β -III-Tubulin-immunreaktiven Neuronen (**C**, grün) **D:** β -III-Tubulin-positive Zellen (rot) sind häufig BrdU-positiv (grün) und weisen zudem eine ausgereifte neuronale Morphologie auf (in höherer Vergrößerung) **E:** Innerhalb der Kulturen finden sich auch Serotonin-(5-HT)-immunpositive Zellen (grün). **F:** Oligodendrozyten (O4-immunpositiv, rot) sind teils BrdU-positiv (grün), teils BrdU-negativ. **A-C und E:** Kerngegenfärbung durch DAPI (blau).

5.2. Einfluss des extrinsischen Signalmoleküls Tgf- β auf die Induktion und Spezifikation rostraler serotonerger Neurone des ventralen Rhombencephalon der Maus (E12)

5.2.1. *In vitro*-Beeinflussung der Genexpression von primären Neurospheres des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus E12 durch Behandlung mit Faktoren

Eine Einflussnahme von Tgf- β auf die Steuerung der Induktion und Spezifizierung von 5-HT-Neuronen des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12) wurde durch die Behandlung primärer Neurospheres dieses Bereiches durch externe Tgf- β -Gabe bzw. Blockierung endogener Tgf- β s und anschließende qRT-PCR-Analyse der Genexpression der Gene *Lmx1b*, *Gata2* und *Pet1* untersucht. Hierzu wurden primäre Neurospheres nach einer Generationszeit von acht Tagen enzymatisch und mechanisch dissoziiert und in einer Zelldichte von 5×10^5 Zellen auf PORN-/Lam-beschichtete $\varnothing$ 30 mm-Zellkulturschalen ausplattiert (Punkt 4.2.3.9., Seite 52). Am folgenden Tag (DIV1) wurde die Behandlung der Zellen aus primären Neurospheres des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus E12 vorgenommen. Hierzu wurden Zellen mit Tgf- β 1, in einer Endkonzentration von 1 ng/ml Kompletmedium, behandelt. Eine weitere Zellprobe erhielt eine Gabe eines gegen alle drei Tgf- β -Isoformen gerichteten Antikörpers, α -Tgf- β 1/2/3, in einer Endkonzentration von 10 μ g/ml Kompletmedium. Hierdurch wurden endogen synthetisierte Tgf- β s in dieser Zellkultur neutralisiert. Als Kontrolle wurden jeweils Zellen der gleichen Gewebepreparation, aus welcher die primären Neurospheres generiert wurden, eingesetzt, die keiner Behandlung unterzogen wurden. Nach einer Kulturdauer von drei Tagen (DIV3) wurden die Zellen zur Gewinnung der Gesamt-RNA lysiert (Punkt 4.2.6.4., Seite 61).

Zunächst wurde die Änderung der Expression des mitotisch in 5-HT-Progenitoren exprimierten Gens *Lmx1b* mittels qRT-PCR bestimmt (Punkt 4.2.6.9., Seite 65). Die Änderung der Genexpression drei Tage nach Behandlungsbeginn der dissoziierten und ausplattierten primären Neurospheres des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12) im Vergleich zu unbehandelten Kontrollen (Ctr, blau) ist in Abb. 10 (Seite 90) dargestellt. Die Behandlung durch Tgf- β 1 (rot: $0,57 \pm 0,03/-0,025$; $P = 0,3014$) führte nach drei Tagen zu keiner signifikanten Änderung der Expression von *Lmx1b* im Vergleich zur Expression in unbehandelten Kontrollen (blau: $1 \pm 0,284/-0,221$). Eine Behandlung durch α -Tgf- β 1/2/3 (grün) bedingte in behandelten Zellen eine nahezu vollständige, signifikante Reduktion der Expression von *Lmx1b* auf das 0,09fache ($+0,019/-0,019$; $*P = 0,009$) in Bezug auf unbehandelte Zellen ($1 \pm 0,284/-0,221$).

Abb. 10: Quantitative-„Real-Time“-PCR-(qRT-PCR)-Analyse der Expression des mitotisch in Progenitoren zentraler serotonerger (5-HT-) Neuronen exprimierten Gens *Lmx1b* in einem repräsentativen Versuch. Analysiert wurde cDNA aus dissoziierten und auf PORN-/Laminin-beschichtete $\varnothing$ 30 mm-Kulturschalen ausplattierte primäre Neurospheres des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus des Embryonaltages (E) 12 nach externer Faktorengabe, Tgf- β 1 (1 ng/ml; rot)) und des funktionsblockierenden, gegen alle drei Tgf- β -Isoformen gerichteten Antikörpers α -Tgf- β 1/2/3 (10 μ g/ml; grün) drei Tage nach Behandlungsbeginn („Day in vitro“ 3, DIV3). (Bestimmung der relativen RNA-Mengen mittels mathematischer Anwendung der vergleichenden $\Delta\Delta C_t$ Methode, ($2^{-\Delta\Delta C_t}$), statistische Signifikanz: * $P < 0,05$; ** $P < 0,01$; *** $P < 0,001$; statistisch nicht signifikant (n. s.) $P \geq 0,05$).

Die Analyse der Expression des frühen, mitotisch und postmitotisch in 5-HT-Neuronen des rostralen Rhombencephalon der Maus exprimierten Transkriptionsfaktors *Gata2* wurde ebenfalls mittels qRT-PCR anhand von cDNA-Proben behandelte Zellen aus dissoziierten und ausplattierten primären Neurospheres im Vergleich zu unbehandelten Zellen gleichen Ursprungs vorgenommen. Drei Tage nach Behandlungsbeginn der Zellen durch Tgf- β 1 (1 ng/ml Komplettmedium) zeigten diese keine wesentliche Veränderung der Expression von *Gata2* (rot: 0,96 $\pm$ 0,004/–0,049; $P = 0,988$) im Vergleich zu unbehandelten Zellen (blau: 1 $\pm$ 0,081/–0,075). Eine signifikante Reduktion der *Gata2*-Expression auf das 0,21fache (grün: $\pm$ 0,002; *** $P = 0,0006$) in Bezug auf unbehandelte Kontrollen (blau: 1 $\pm$ 0,081/–0,075) ließ sich, wie Abb. 11 (Seite 91) graphisch wiedergibt, nach drei Tagen nach Behandlung der Zellen durch α -Tgf- β 1/2/3 (10 μ g/ml Komplettmedium, grün) feststellen.

Abb. 11: Quantitative-„Real-Time“-PCR-(qRT-PCR)-Analyse eines repräsentativen Versuchs der Expression des Gen *Gata2* als frühes Markergen der Entwicklung serotonerger (5-HT-) Neuronen in cDNA aus dissoziierten und ausplattierten primären Neurospheres des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus des Embryonalaltages (E)12 nach externer Faktorengabe. Als externe Faktoren wurden Tgf- β 1 (1 ng/ml Komplettmedium; rot) als auch der funktionsblockierende, gegen alle drei Tgf- β -Isoformen gerichteten Antikörper α -Tgf- β 1/2/3 (10 μ g/ml Komplettmedium; grün) verwendet. Als Kontrolle dienten unbehandelte Zellen (blau). Drei Tage nach Behandlungsbeginn („Day in vitro“ 3, DIV3) wurden die Zellen zur Expressionsanalyse eingesetzt. (Bestimmung der relativen RNA-Mengen mittels mathematischer Anwendung der vergleichenden $\Delta\Delta C_t$ Methode, ($2^{-\Delta\Delta C_t}$), statistische Signifikanz: * $P < 0,05$; ** $P < 0,01$; *** $P < 0,001$; statistisch nicht signifikant (n. s.) $P \geq 0.05$).

Zusätzlich zu *Gata2* als mitotisch in 5-HT-Vorläuferzellen exprimierter Transkriptionsfaktor wurde auch das 5-HT-Neuronen-spezifische, postmitotisch exprimierte Gen *Pet1* in seiner Expression durch Behandlung der Zellen beeinflusst. Wie Abb. 12 (Seite 92) zeigt, kam es in Zellen aus dissoziierten, ausplattierten primären Neurospheres durch Tgf- β 1 (rot: $0,69 \pm 0,032/-0,035$; $P = 0,1524$) zu keiner Änderung der *Pet1*-Expression im Vergleich zu unbehandelten Zellen (blau: $1 \pm 0,254/-0,203$). Hingegen führte die Gabe von α -Tgf- β 1/2/3 (grün) nach drei Tagen nach Behandlungsbeginn zu einer signifikanten Reduktion der Expression von *Pet1* in den behandelten Zellen im Vergleich zur unbehandelten Kontrolle (blau). Die Reduktion erfolgte auf das 0,3fache ($+0,028/-0,019$; ** $P = 0,0054$) des Expressionswertes der unbehandelten Kontrolle ($1 \pm 0,254/-0,203$).

Abb. 12: Quantitative-„Real-Time“-PCR-(qRT-PCR)-Analyse der Expression eines repräsentativen Versuchs des Gen *Pet1* als frühestes spezifisches Markergen serotonerger (5-HT-) Neurone an cDNA aus dissoziierten und ausplattierten primären Neurospheres des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus des Embryonaltages (E)12 nach externer Faktorengabe. Als externe Faktoren wurden Tgf- β 1 (1 ng/ml Komplettmedium) als auch der funktionsblockierende, gegen alle drei Tgf- β -Isoformen gerichteten Antikörper α -Tgf- β 1/2/3 (10 μ g/ml Komplettmedium) verwendet. Drei Tage nach Behandlungsbeginn („Day in vitro“ 3, DIV3) wurden die Zellen zur Expressionsanalyse eingesetzt. (Bestimmung der relativen RNA-Mengen mittels mathematischer Anwendung der vergleichenden $\Delta\Delta C_t$ Methode, ($2^{-\Delta\Delta C_t}$), statistische Signifikanz: * $P < 0,05$; ** $P < 0,01$; *** $P < 0,001$; statistisch nicht signifikant (n. s.)

5.2.2. Beeinflussung der Genexpression *in vitro* von Primärzellen des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12) durch externe Faktoren

Um zu analysieren, auf welchem molekularen Mechanismus der Einfluss von Tgf- β 2 auf die Entwicklung von 5-HT-Neurone basiert, wurden die folgenden *in vitro*-Behandlungen an Primärzellen des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus E12 durchgeführt. Nach Dissoziation des Gewebes des ventralen rostralen Rhombencephalon wurden die Einzelzellen, wie ausführlich unter Punkt 4.2.3.3. (Seite 47) beschrieben, in einer Zelldichte von 3×10^5 Zellen auf PORN-/Lam-beschichtete $\varnothing$ 12 mm-Deckgläschen ausplattiert, wodurch den Zellen der Eintritt in die Differenzierung ermöglicht wurde. Am folgenden Tag wurden die Zellen, wie unter Punkt 4.2.3.9. (Seite 52) erläutert, durch eine externe Faktorengabe behandelt. Als Kontrolle wurden Zellen der gleichen Präparation verwendet, die jedoch unbehandelt blieben. Eine Zellprobe wurde durch die Gabe von Tgf- β 1 in einer Konzentration von 10 ng/ml Kompletmedium behandelt und die Zellen unter serumfreien Bedingungen kultiviert. Des Weiteren erhielt eine dritte Zellprobe eine Gabe des synthetischen Inhibitors SB431242, in einer Endkonzentration von 15 μ M. Dieser Inhibitor blockiert die Rezeptoren Alk4 („*Activin receptor-like kinase typ I*“), Alk5 („*TGF- β receptor typ I*“) und Alk7, wodurch die durch Tgf- β -induzierte Signaltransduktionskaskade unterbrochen wird (Inman et. al, 2002). Drei Tage nach externer Faktorengabe (DIV3) wurden die Zellen der Isolation der Gesamt-RNA zugeführt (siehe hierzu Punkt 4.2.6.4., Seite 61). Die Veränderung der Genexpression der Gene *Gata2* und *Pet1* in cDNA-Proben behandelter Primärzellen des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12) im Vergleich zu unbehandelten Zellen wurde durch qRT-PCR ermittelt und sind in nachfolgenden Abb. 13-14 dargestellt.

Abb. 13 (Seite 94) gibt das Ergebnis der Expressionsänderung von *Gata2* in dissoziierten Zellen des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12) ohne Expansion der Progenitoren vor dem Ausplattieren der Zellen auf PORN-/Lam-beschichtete Deckgläschen durch Behandlung externer Faktoren wieder. Eine Behandlung der Zellen mit Tgf- β 1 (rot) führt zu keiner signifikanten Änderung der *Gata2*-Expression ($2,52 \pm 0,128/-0,117$; $P = 0,1246$) im Vergleich zur unbehandelten Kontrolle (blau: $1 \pm 0,654/-0,395$). Wurden die direkt ausplattierten Zellen des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12) mit dem synthetischen Alk4/5/7-Inhibitor SB431542 (violett) behandelt, so führte dies zu einer deutlichen, signifikanten Reduktion der Expression von *Gata2* auf das 0,17fache ($+0,0016/-0,003$; $^*P = 0,0016$) im Bezug auf die Expression von *Gata2* in unbehandelten Kontrollen (blau, $1 \pm 1,035/-0,509$).

Abb. 13: Quantitative-„Real-Time“-PCR-(qRT-PCR)-Analyse eines repräsentativen Versuchs der Expression des Gen *Gata2* als frühes Markergen der Entwicklung serotonerger (5-HT-) Neuronen in cDNA aus Primärzellen des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus des Embryonaltages (E)12 nach externer Faktorengabe, Tgf- β 1 (1 ng/ml, rot) und des synthetischen Alk4/5/7-Inhibitors SB431542 (15 μ M, violett) drei Tage nach Behandlungsbeginn („Day in vitro“ 3, DIV3). (Bestimmung der relativen RNA-Mengen mittels mathematischer Anwendung der vergleichenden $\Delta\Delta C_t$ Methode, ($2^{-\Delta\Delta C_t}$), statistische Signifikanz: * $P < 0,05$; ** $P < 0,01$; *** $P < 0,001$; statistisch nicht signifikant (n. s.) $P \geq 0,05$).

Wie im Falle behandelter, dissoziierter primärer Neurospheres des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12) wurde auch *Pet1*, als frühestes spezifisches Markergen der 5-HT-Neurone bezüglich einer Expressionsänderung in direkt ausplattierten Zellen des ventralen Rhombencephalon nach drei Tagen nach Behandlung mit Tgf- β 1 bzw. dem Inhibitor SB431542 analysiert. Das Ergebnis der ermittelten Expressionsänderung ist graphisch in Abb. 14 (Seite 95) dargestellt. Eine Gabe von Tgf- β 1 (rot) über einen Zeitraum von drei Tagen (DIV3) führte in ausplattierten Primärzellen, ohne vorangehende Expansion, zu keiner signifikanten Heraufregulation der *Pet1*-Expression ($2,42 \pm 0,117$, * $P = 0,0573$) des Kontrollwertes (blau: $1 \pm 0,597/-0,374$). Durch die Behandlung mit dem Inhibitor SB431542 (violett) wurde ebenfalls keine Änderung der Expression von *Pet1* ($0,76 \pm 0,2541/-0,1962$; $P = 0,428$) in direkt ausplattierten Primärzellen nach deren Ausplattieren im Vergleich zu unbehandelten Zellen ausgelöst.

Abb. 14: Quantitative-„Real-Time“-PCR-(qRT-PCR)-Analyse der Expression des Gen *Pet1* als frühestes Markergen der Entwicklung serotonerger (5-HT-) Neuronen in cDNA aus Primärzellen des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus des Embryonaltages (E)12 nach externer Faktorengabe, Tgf- β 1 (1 ng/ml, rot) und des synthetischen Alk4/5/7-Inhibitors SB431542 (15 μ M, violett) drei Tage nach Behandlungsbeginn in einem repräsentativen Versuch („Day in vitro“ 3, DIV3). Als Vergleich wurden unbehandelte Zellen, gleichen präparativen Ursprungs verwendet (Ctr, blau). (Bestimmung der relativen RNA-Mengen mittels mathematischer Anwendung der vergleichenden $\Delta\Delta C_t$ Methode, ($2^{-\Delta\Delta C_t}$), statistische Signifikanz: * $P < 0,05$; ** $P < 0,01$; *** $P < 0,001$; statistisch nicht signifikant (n. s.) $P \geq 0,05$).

5.3. Analyse der Bedeutung des Transkriptionsfaktors Sim1 für die Entwicklung von 5-HT-Neuronen des ventralen Rhombencephalon der Maus

5.3.1. Nachweis der Expression von Sim1 im ventralen Rhombencephalon an verschiedenen Embryonalstadien der Maus

Der Transkriptionsfaktor *sim* ist maßgeblich an der Ausbildung und Differenzierung von Zellen der ventralen Mittellinie von *D. melanogaster* beteiligt (Crews et al., 1988; Thomas et al., 1988). Zudem zeigte ein Vergleich der Genexpressionsmuster des ventralen und dorsalen Mesencephalon der Maus (E11) mittels cDNA-Mikroarray eine deutlich höhere Expression des *sim*-Homologen der Säuger, *Sim1*, im ventralen Gewebe. Diese Beobachtungen führten zu der Vermutung, dass Sim1 eine Rolle in der Induktion und Spezifikation ventraler Neuronenpopulationen, wie jener der 5-HT-Neurone, in Säugetieren spielen könnte. Um dies zu überprüfen, wurde zunächst immunhistochemisch untersucht, ob Sim1 *in vivo* in 5-HT-Neuronen im Rhombencephalon der Maus exprimiert wird (siehe hierzu 4.2.5.4, Seite 57). Abb. 15 zeigt exemplarisch eine Immunfluoreszenzfärbung des im Zellkern lokalisierten Transkriptionsfaktors Sim1 (rot) und des zytoplasmatischen Markers für 5-HT-Neuronen, Serotonin (5-HT, grün), in einem frontalem Paraffinschnitt des postnatalen rostralen Rhombencephalon (P0) der Maus. Dargestellt ist der ventrale Bereich des Rhombencephalon an welchen das Lumen des IV. Ventrikels grenzt. Deutlich ist eine Kolokalisation von 5-HT und Sim1 in 5-HT-Neuronen zu erkennen. Darüber hinaus sind auch Sim1-immunpositive Zellen festzustellen, welche 5-HT nicht exprimieren.

Abb. 15: Immunhistochemischer Nachweis der Expression von Sim1 („*Single-minded homologon 1*“, rot) und Serotonin (5-HT, grün) in Zellen des Rhombencephalon der Maus des Postnaltages (P) 0. Sim1 wird in ventralen Neuronenpopulationen exprimiert, darunter auch in serotonergen (5-HT-) Neuronen, wie die Kolokalisation von 5-HT und Sim1 in diesen Neuronen bestätigt. (frontaler Paraffinschnitt, Schnittdicke 10 µm).

Um zu untersuchen, ob das Expressionsmuster die These einer Beteiligung des Transkriptionsfaktors Sim1 an der Induktion 5-HT-Neurone unterstützt, wurde zeitnah zum Beginn der Entstehung 5-HT-Neurone (E11) die Expression von *Sim1*-m(messenger)RNA mittels nicht-radioaktiver *in situ*-RNA-Hybridisierung (ISH) nachgewiesen (siehe Punkt 4.2.7.4, Seite 72). Verwendet wurden hierzu aufeinanderfolgende sagittale Paraffinschnitte der Maus E12, um einen direkten Vergleich der Hybridisierung von Sim1-„sense“- (Sp6) und „anti-sense“-RNA-Sonde (T7) zu ermöglichen (Punkt 4.2.7.2, Seite 70). Die Ergebnisse der Sim1-RNA-ISH sind in Abb. 16A-D (Seite 98) zusammengefasst. Abb. 16A zeigt die durch alkalische Phosphatase katalysierte Farbreaktion nachgewiesene Hybridisierung der *Sim1*-„anti-sense“-RNA-Sonde. Deutlich ist eine Färbung im Bereich des ventralen Rhombomer 1 (R1) festzustellen, die zum ventralen R2 hin schwächer wird. Dies deutet auf eine graduelle Expression von *Sim1* hin. Darüber hinaus lässt sich eine stärkere Färbung im ventralen Gewebe im Vergleich zum dorsalen Gewebe des Rhombencephalon erkennen. Abb. 16B gibt das Hybridisierungsergebnis in einer höheren Vergrößerung wieder, in der eindeutig eine zytoplasmatische Färbung (blau) erkennbar ist. Zum Vergleich ist die ISH der „sense“-RNA-Sonde gegen *Sim1* am direkt nachfolgenden Schnitt in Abb. 16C und Abb. 16D aufgezeigt. Die ISH der „sense“-RNA-Sonde von *Sim1* erbrachte keine *Sim1*-spezifische, zytoplasmatische Färbung. Zu beobachten ist lediglich eine bräunliche Hintergrundfärbung. Eine Aussage bezüglich der Bedeutung von Sim1 für die Entstehung 5-HT-Neurone einzelner Nuclei raphes lässt sich aufgrund des frühen Zeitpunktes (E12) nicht treffen. In diesem Stadium, in dem sich rostrale 5-HT-Neurone zu differenzieren beginnen, ist die endgültige Lokalisation und Gruppierung 5-HT-Neurone zu abgrenzbaren, rostralen rhombencephalen Kerngebieten noch nicht erreicht. Jedoch zeigt die ISH, dass *Sim1* graduell in Regionen des rostralen Rhombencephalon, insbesondere des R1, exprimiert wird, aus deren Vorläuferzellen ventraler 5-HT-Neurone hervorgehen.

Abb.16 A-D: Nachweis der *Sim1*-Expression durch nicht-radioaktive *in situ*-RNA-Hybridisierung (ISH) an sagittalen Paraffinschnitten (Schnittdicke 10 µm) der Maus des Embryonalaltages (E) 12. **A:** Die *Sim1*-„anti-sense“-RNA-Sondenhybridisierung zeigt eine *Sim1*-Expression im ventralen Rhombomere (R)1 und einen von R1 zu R2 schwächer werdenden Expressionsgradienten **C:** *Sim1*-Expression in höherer Vergrößerung. Die ISH der „anti-sense“-RNA-Sonde gegen *Sim1* zeigt eine deutliche zytoplasmatische Färbung (blau). **B und D:** Kontrolle der *Sim1*-ISH mittels „sense“-RNA-Sondenhybridisierung (Cb: Cerebellum; IV.: IV. Ventrikel)

Um zu untersuchen, ob die Expression von *Sim1* im Rhombencephalon während einem früheren Zeitpunkt für die Entwicklung 5-HT-Neuronen *in vivo* relevant ist, wurde nach immunhistochemischem Nachweis von Serotonin mittels Peroxidase-vermittelter Farbreaktion (Diaminobenzidin-Tetrahydrochlorid, DAB) die Anzahl 5-HT-positiver Neurone in Frontalschnitten des ventralen Rhombencephalon (E14.5) in *wt*- und *Sim1*-defizienten Mausembryonen bestimmt (siehe Punkt 4.2.5.4., Seite 57). Verglichen wurden jeweils *wt*-Embryonen und homozygote, *Sim1*-defiziente Embryonen eines Muttertieres. Es wurden je Genotyp mindestens drei Embryonen untersucht ($n = 3$). Das Ergebnis des quantitativen Vergleiches der Anzahl 5-HT-Neurone ist graphisch in Abb. 17 (Seite 99) dargestellt. Die Gesamtzahl 5-HT-Neurone im Rhombencephalon von *Sim1*-defizienten Embryonen (Säule 2) ist im Vergleich zu *wt*-Embryonen (Säule 1) reduziert, jedoch ist diese Reduktion nicht signifikant ($P = 0,027$; $n = 4$). Inwieweit jedoch Subpopulationen 5-HT-Neurone durch die Deletion von *Sim1* selektiv in ihrer Induktion und Spezifikation betroffen sind, lässt sich aufgrund der nicht möglichen Abgrenzung einzelner Kerngebiete in diesem Stadium nicht beurteilen.

Abb. 17: Quantitativer Vergleich der Gesamtzahl serotonerger (5-HT-) Neurone des rostralen Rhombencephalon der Maus in Wildtyp (*wt*) und homozygoten *Sim1*-Mutanten des Embryonaltages (E) 14.5. Der Vergleich der Gesamtzahl 5-HT-Neurone der rostralen Kerngebiete B4–9 zwischen *wt* und *Sim1* ^{-/-} (Anzahl n = 3) ergab keinen signifikanten Unterschied ($P \geq 0,05$). (Statistische Auswertung mittels zweiseitigen „Student's *t*-test“, Darstellung als Mittelwert der Gesamtzahlen Serotonin-(5-HT)-immunpositiver Neurone $\pm$ Standardfehler des Mittelwertes (MW $\pm$ SEM), statistische Signifikanz: * $P < 0,05$; ** $P < 0,01$; *** $P < 0,001$; statistisch nicht signifikant (n. s.) $P \geq 0,05$)

5.3.2. *Sim1*-defiziente Mausmutanten (P0) weisen eine signifikante Reduktion der 5-HT-Neuronenpopulation des Nucleus raphe dorsalis auf

Um zu bestimmen, ob der *Sim1* für die Differenzierung einzelner Nuclei raphes bzw. für die Aufrechterhaltung 5-HT-Neurone notwendig ist, wurde die Anzahl 5-HT-immunpositiver Neurone zum Zeitpunkt P0 bestimmt. Hierzu wurden in Frontalschnitten des rostralen Rhombencephalon von *wt*-Mäusen und *Sim1*-defizienten Mäusen (P0) 5-HT-Neurone immunhistochemisch über eine Peroxidase-vermittelte DAB-Farbreaktion nachgewiesen (Punkt 4.2.5.4., Seite 57). Abb. 18 (Seite 100) gibt die statistischen Auswertung des Vergleiches der 5-HT-Neurone des rostralen Rhombencephalon in Wildtyp (*wt*) und homozygoten *Sim1*-Mausmutanten graphisch wieder. Zur Auswertung wurden jeweils die Ergebnisse von drei Tieren der entsprechenden Genotypen (n = 3) gemittelt, wobei *Sim1*-defiziente Mäuse jeweils mit *wt*-Mäusen des gleichen Wurfes verglichen wurden. Wie der Abb. 18 zu entnehmen ist, konnte bezogen auf die Gesamtzahl der 5-HT-Neurone im rostralen Rhombencephalon, welches die Kerngebiete B4–B9 umfasst, kein signifikanter (n. s.; $P = 0,08$) Unterschied zwischen *wt* (Säule 1, $11792,5 \pm 1060,9$; n = 4) und *Sim1*-defizienten Mäusen (Säule 2, $9870 \pm 170,4$; n = 3) festgestellt werden. Der Vergleich einzelner rostraler Nuclei raphes (B4–B9) bezüglich der Anzahl der in ihnen enthaltenen 5-HT Neurone machte hingegen deutlich, dass die Anzahl 5-HT-Neurone des Nucleus raphe dorsalis (NRD, B6/B7) in *Sim1*-defizienten Mausmutanten (Säule 4, $3803 \pm 31,8$; n = 3) im

Vergleich zum *wt* (Säule 3, 5440 ± 298 ; $n = 4$) zum Zeitpunkt P0 signifikant um circa 30% (** $P = 0,0057$) reduziert ist. Dieses Ergebnis lässt auf eine Bedeutung von Sim1 für die Differenzierung und/oder die Aufrechterhaltung dieser Subpopulation rostraler 5-HT-Neurone schließen. Aufgrund der perinatalen Letalität der homozygoten *Sim1*-Mutanten konnten spätere Zeitpunkte nicht untersucht werden.

Abb. 18: Vergleich der Gesamtzahl serotonerger (5-HT-) Neurone des rostralen Rhombencephalon der Maus zum postnatalen Zeitpunkt (P) 0 in Wildtyp (*wt*) und homozygoten *Sim1*-Mutanten. Der Vergleich der Gesamtzahl 5-HT-Neurone der rostralen Kerngebiete B4–B9 zwischen *wt* und *Sim1* $-/-$ ergab keinen signifikanten Unterschied ($P > 0,05$). Die Anzahl 5-HT-Neurone des Nucleus raphe dorsalis (NRD, B7) ist in *Sim1* $-/-$ hingegen im Vergleich zum *wt* signifikant um circa 30% (** $P < 0,0057$) reduziert. (Statistische Auswertung mittels zweiseitigen „Student's *t*-test“, Darstellung als Mittelwert der Gesamtzahlen Serotonin (5-HT)-immunpositiver Neurone $\pm$ Standardfehler des Mittelwertes (MW $\pm$ SEM), statistische Signifikanz: * $P < 0,05$; ** $P < 0,01$; *** $P < 0,001$; statistisch nicht signifikant (n. s.) $P \geq 0,05$)

5.3.3. “Gain-of-function” Experimente

Um die molekularen Grundlagen einer auf *in vivo*-Beobachtungen (Punkt 5.3.1., Seite 96 und Punkt 5.3.2., Seite 99) gestützten, denkbaren Funktion von Sim1 während der Entwicklung rostraler Subpopulationen 5-HT-Neuronen zu untersuchen, wurden „Gain-of-function“-Experimente durchgeführt. Zellen der Zelllinie MN9D wurde hierbei als *in vitro*-Kulturmodell eingesetzt. Es handelt sich bei diesen Zellen um Fusionszellen aus embryonalen Zellen des ventralen Mesencephalon der Maus und Neuroblastoma-Zellen (Choi et al., 1991). Da diese Zelllinie insbesondere als Modell für DA-Neurone verwendet wird, wurde zunächst die Expression von Genen, die für die Entwicklung 5-HT-Neurone mitverantwortlich sind, durch

RT-PCR und spezifische Primer (Punkt 4.1.4., Seite 26), wie unter Punkt 4.2.6.8. (Seite 64) beschrieben, überprüft. Die Ergebnisse der Expressionsanalyse sind der Abb. 19 (Seite 101) zu entnehmen. Deutlich ist zu erkennen, dass *MN9D*-Zellen sowohl frühe als auch späte Determinanten der Entwicklung 5-HT-Neurone exprimieren. Hierzu zählen *Gata2* (Spur 3) und das 5-HT-spezifische Markergen *Pet1* (Spur 4). Ebenfalls detektiert werden konnte in cDNA-Proben von *MN9D*-Zellen die Expression des Gens *Tph2* als Marker der terminalen Differenzierung von 5-HT-Neuronen (Spur 5). Darüber hinaus konnte das Amplifikationsprodukt von *Sim1*, als ventral exprimierter Transkriptionsfaktor schwach aber deutlich nachgewiesen werden (Spur 6). Hieraus konnte geschlossen werden, dass sich *MN9D*-Zellen als *in vitro*-Modell für Untersuchung des Einflusses von Sim1 auf die Entwicklung 5-HT-Neurone mittels Überexpression des *Sim1*-Gens eignen würden.

Abb. 19: Analyse der Expression von *Gata2*, *Pet1* und *Tph2* als Vertreter von Markergenen der Entwicklung serotonerger (5-HT-) Neurone und des ventral exprimierten Transkriptionsfaktors *Sim1* in *MN9D*-Zellen mittels Reverser-Transkriptions-(RT)-PCR. Sowohl *Gata2*, ein frühes postmitotisches Markergen der Entwicklung rostraler rhombencephaler 5-HT-Neurone, als auch *Pet1* und *Tph2* als Determinanten der terminalen Differenzierung von 5-HT-Neuronen sind in *MN9D*-Zellen exprimiert. Eine schwache Expression von *Sim1* ließ sich ebenfalls nachweisen.

Die Durchführung der Überexpression von *Sim1* in *MN9D*-Zellen ist unter Punkt 4.2.2.3. (Seite 42) im Detail erläutert. 1×10^6 *MN9D*-Zellen wurden in 25 cm²-Kulturflaschen ausplattiert und am folgenden Tag mittels des Transfektionsreagenz Lipofectamine mit dem Überexpressionsplasmid *pcDNA3::Sim1* transfiziert. Als Kontrollplasmid wurde *pcDNA3* verwendet und dieses analog zum Überexpressionsplasmid transfiziert. Nach 4 h wurde die Reaktion durch Wechsel des Kulturmediums gestoppt und die Expression des *Sim1*-Gens nach 24 h, 48 h und 72 h durch Probenahme unterbrochen. Aus *MN9D*-Zellen, die mit dem *Sim1*-Überexpressionsplasmid transfiziert worden waren und aus *pcDNA3*-transfizierten *MN9D*-Zellen des gleichen Zeitpunktes wurde sowohl Gesamt-RNA (siehe Punkt 4.2.6.4.; Seite 61) als auch Gesamt-Protein (Punkt 4.2.8.1., Seite 75) isoliert. Die Proben wurden anschließend hinsichtlich einer erfolgten *Sim1*-Überexpression auf RNA- bzw. Protein-Ebene analysiert. Nachfolgende Abb. 20 zeigt exemplarisch die Überexpression des *Sim1*-Gens in

MN9D-Zellen auf RNA-Ebene nach 24 h, 48 h und 72 h im Vergleich zu Zellproben der Kontrollen, wie sie nach RT-PCR Analyse der Genexpression bestimmt werden konnte. Wie die RT-PCR für *Gapdh* (Spuren 2–7) zeigt, wurde von allen Proben die gleiche Menge cDNA (ausgehend von 1 µg Gesamt-RNA) in der PCR-Reaktion eingesetzt, wodurch ein direkter Vergleich der relativen Expression des *Sim1*-Gens in *MN9D*-Vergleichsproben (Ctr) und in Proben von *pcDNA3::Sim1*-transfizierten *MN9D*-Zellen (*Sim1*) möglich ist. Bereits nach einer Dauer von 24 h konnte in der Probe von *pcDNA3::Sim1*-transfizierten *MN9D*-Zellen (Spur 10) eine gesteigerte Expression von *Sim1* im Vergleich zur Probe der Kontrolle (Spur 9) nachgewiesen werden. Die Überexpression von *Sim1* ließ sich nach 48 h (Spur 12) und 72 h (Spur 14) noch deutlich im Vergleich zu Kontrollproben (Spuren 11 und 13) bestimmen.

Abb. 20: Reverse Transkriptions-(RT)-PCR-Analyse der Überexpression von *Sim1* (Sim1) in *MN9D*-Zellen nach 24 h, 48 h und 72 h nach Transfektion mit *pcDNA3::Sim1* im Vergleich zu *pcDNA3*-transfizierten Kontrollen (Ctr) unter Berücksichtigung der jeweils für die PCR eingesetzten cDNA-Menge (*Gapdh*).

Um sicherzustellen, dass eine *Sim1*-Überexpression auf Protein-Ebene erreicht wurde, wurde dies mittels Western-Blot-Analyse (siehe Punkt 4.2.8.4., Seite 77) überprüft. Abb. 21 (Seite 103) gibt die Ergebnisse des Western-Blot von drei „*Gain-of-function*“-Experimente wieder. Aufgetragen wurden jeweils 20 µg Gesamt-Protein der Probe aus *pcDNA3*-transfizierten *MN9D*-Zellen (Ctr) und der entsprechenden Probe von *pcDNA3::Sim1*-transfizierten *MN9D*-Zellen (Sim1). Gewählt wurde jeweils der Zeitpunkt, zu dem die Expression von *Sim1* innerhalb eines Versuches zuvor auf RNA-Ebene als am höchsten bestimmt worden war. Als Vergleichsprotein wurde erneut *Gapdh* (36 kDa), welches nicht durch eine *Sim1*-Überexpression in seiner eigenen Expression beeinflusst wurde, gewählt (Abb. 21A). Der Nachweis des *Sim1*-Proteins (85,5 kDa, Abb. 21B) erfolgte durch Bindung eines, im Kaninchen hergestellten polyklonalen Antikörper (1:1000), welcher durch einen, an HRP („*Horseradish peroxidase*“) gekoppelten, gegen Kaninchen gerichteten, sekundären Antikörper gebunden wurde. Im Anschluss an die Bestimmung des *Sim1*-Proteins mittels Chemilumineszenz-Reaktion wurde die Proteinexpression des „*Housekeeping*“-Gens *Gapdh*

durch einen in Maus hergestellten, monoklonalen Antikörper (1:10000) und anschließende Bindung eines, an HRP gebundenen, gegen Maus gerichteten, sekundären Antikörper nachgewiesen. Dies ermöglichte einen direkten Vergleich der Proteinmengen von den Proben der Kontrollen und den jeweils korrespondierenden Proben von Sim1-überexprimierender *MN9D*-Zellen. Wie in Abb. 21A ersichtlich wurden von den beiden Proben eines Versuches vergleichbare Proteinmengen eingesetzt. Die Expression des Sim1-Proteins zeigt Abb. 21B. Eine prominente Bande von circa 85,5 kDa konnte in den Proben der Kontrollen nachgewiesen werden, was der Molmasse von „full-length“-Sim1 entspricht. Versuch 1 (1. V.) konnte nach einer Expressionsphase von 24 h eine deutlich gesteigerte Expression des Sim1-Proteins in der Probe von *pcDNA3::Sim1*-transfizierten *MN9D*-Zellen (Spur 2) im Vergleich zur Probe *pcDNA3*-transfizierter Zellen (Spur 1) festgestellt werden. Auch in den Versuchen 2 und 3 konnte 48 h nach der Transfektion eine gesteigerte Expression des Sim1-Proteins in Proben *pcDNA3::Sim1*-transfizierter Zellen (Spuren 4 und 6) im Vergleich zu den entsprechenden *pcDNA3*-transfizierter *MN9D*-Zellen (Spur 3 und 5) bestimmt werden.

Abb. 21: Western-Blot-Analyse repräsentativer „Gain-of-Function“-Versuche, (V)1–3, zum Zeitpunkt der jeweils höchsten Sim1-Proteinexpression. **A:** Nachweis des Gapdh-Proteins (36 kDa) durch einen gegen Gapdh gerichteten, monoklonalen Antikörper aus Maus (α -Gapdh) und anschließende Chemilumineszenz-Reaktion des sekundären, Merretich-Peroxidase-(HRP, *Horseradish Peroxidase*)-konjugierten Antikörpers **B:** Chemilumineszenz-basierter Nachweis der Expression des Sim1-Proteins (85,5 kDa) durch einen polyklonalen, gegen Sim1 gerichteten Antikörper aus Kaninchen (α -Sim1) (Ctr: Probe der als Kontrolle dienenden *pcDNA3*-transfizierten *MN9D*-Zellen; Sim1: Probe der *pcDNA3::Sim1*-transfizierten *MN9D*-Zellen)

Um eine mögliche Regulation der Expression von Genen, die für die transkriptionelle Kontrolle der 5-HT-Neuronen Differenzierung bekannt sind, durch den Transkriptionsfaktor Sim1 zu analysieren, wurde, wie unter Punkt 4.2.6.9. (Seite 65) beschrieben, die Genexpression von *Mash1*, *Gata2*, *Pet1* und *Tph2* mittels qRT-PCR in cDNA-Proben Sim1-überexprimierender *MN9D*-Zellen zu drei unterschiedlichen Zeitpunkten nach der Transfektion (24 h, 48 h, 72 h) ermittelt. Diese wurde mit der Expression dieser Gene in zeitlich entsprechenden, als Kontrolle dienenden, *pcDNA3*-transfizierten *MN9D*-Zellen verglichen. In nachfolgender Abb. 22 ist die Expression von *Mash1*, als allgemeines Markergen für neurale Vorläuferzellen (Lo et al., 1991), nach Überexpression von Sim1 in *MN9D*-Zellen (rot) nach 24 h, 48 h und 72 h im Vergleich zu nicht Sim1-überexprimierenden Kontrollen (blau) dargestellt (n = 3). Hier zeigt sich, dass eine Überexpression von Sim1 zu keinem der drei genannten Zeitpunkte einen signifikanten Einfluss auf die Expression von *Mash1* im Vergleich zu den Kontrollen ausübt (nach 24 h: Ctr 1 +0,35/-0,27; Sim1 0,94 +0,6/-0,34; $P = 0,4$, nach 48 h: Ctr 1 +0,24/-0,2; Sim1 0,88 +0,31/-0,38; $P = 0,26$ und nach 72 h: Ctr 1 +0,29/-0,32; Sim1 0,84 +0,24/-0,29; $P = 0,29$, statistische Signifikanz: * $P < 0,05$, ** $P < 0,01$, *** $P < 0,001$; statistisch nicht signifikant (n. s.) $P \geq 0,05$).

Abb. 22: Quantitative-„Real-Time“-PCR-(qRT-PCR)-Analyse der *Mash1*-Expression in cDNA aus *MN9D*-Zellen nach Überexpression des Transkriptionsfaktors Sim1(rot) im Vergleich zu cDNA aus *MN9D*-Kontrollansätzen (blau) zu verschiedenen Zeitpunkten (24 h, 48 h, 72 h). Sim1-Überexpression in *MN9D*-Zellen führt zu keiner signifikanten Änderung der Expression von *Mash1* im Vergleich zu den nicht Sim1-überexprimierenden Kontrollen. (Bestimmung der relativen RNA-Mengen mittels mathematischer Anwendung der vergleichenden $\Delta\Delta C_t$ Methode ($2^{-\Delta\Delta C_t}$), statistische Signifikanz: * $P < 0,05$; ** $P < 0,01$; *** $P < 0,001$; statistisch nicht signifikant (n. s.) $P \geq 0,05$, n = 3.)

In Abb. 23 ist die Expressionsanalyse des Gens *Gata2*, ein in 5-HT-Vorläuferzellen des rostralen Rhombencephalon der Maus exprimiertes Gen, exemplarisch dargestellt. 24 h, 48 h und ebenso 72 h nach Transfektion der *MN9D*-Zellen durch *pcDNA3::Sim1* (rot) führt die Überexpression des *Sim1*-Gens verglichen zu nicht *Sim1*-überexprimierenden Zellen (*pcDNA3*, blau) zu keiner signifikanten Änderung der Expression von *Gata2* (nach 24 h: Ctr 1 +0,186/−0,157; Sim1 0,97 +0,05/−0,04; $P = 0,81$, nach 48 h: Ctr 1 +0,15/−0,13; Sim1 0,77 +0,18/−0,15; $P = 0,17$ und nach 72 h: Ctr 1 +0,018/−0,189; Sim1 0,62; +0,29/−0,19; $P = 0,15$).

Abb. 23: Repräsentative, quantitative-„Real-Time“-PCR-(qRT-PCR)-Analyse der Expression von *Gata2* in cDNA aus *MN9D*-Zellen nach Überexpression des Transkriptionsfaktors Sim1 (*pcDNA3::Sim1*, rot) im Vergleich zu cDNA aus *MN9D*-Kontrollansätzen (*pcDNA3*, blau) zu verschiedenen Zeitpunkten (24 h, 48 h, 72 h). Sim1-Überexpression in *MN9D*-Zellen führt zu keinem Zeitpunkt nach der Transfektion (24 h, 48 h und 72 h) zu einer signifikanten Expressionsänderung von *Gata2* im Vergleich zu nicht Sim1-overexprimierenden Kontrollen. (Bestimmung der relativen RNA-Mengen mittels mathematischer Anwendung der vergleichenden $\Delta\Delta C_t$ Methode ($2^{-\Delta\Delta C_t}$), statistische Signifikanz: * $P < 0,05$; ** $P < 0,01$; *** $P < 0,001$; statistisch nicht signifikant (n. s.) $P \geq 0,05$,

In Abb. 24 ist die Expression des Gens *Pet1* in cDNA-Proben von Sim1-überexprimierenden (*pcDNA3::Sim1*) MN9D-Zellen (Sim1, rot) in Relation zu *pcDNA3*-transfizierten MN9D-Zellen (Ctr, blau) zu unterschiedlichen Zeitpunkten wiedergegeben. Deutlich zu erkennen ist, dass eine Sim1-Überexpression nach 24 h zu keiner Änderung der *Pet1*-Expression des Kontrollwertes auf RNA-Ebene führt (Ctr 1 +0,43/-0,31; Sim1 1,14 ±0,10; $P = 0,127$). Die Expression von *Pet1* nimmt jedoch nach einem Zeitraum von 48 h signifikant auf das 3,16fache (Ctr 1 +0,52/-0,35; Sim1 3,16 +1,14/-1,23; $P = 0,003$) des Kontrollwertes zu und erreicht nach 72 h eine signifikante Steigerung um das 4,2fache (Ctr 1 +0,09/-0,1; Sim1 +2,4/-1,65; $P = 0,01$) der Expression in *pcDNA3*-transfizierten MN9D-Zellen. Hieraus kann geschlossen werden, dass Sim1 *in vitro* die *Pet1*-Expression in MN9D-Zellen positiv reguliert.

Abb. 24: Quantitative-„Real-Time“-PCR-(qRT-PCR)-Analyse der *Pet1*-Expression in cDNA aus MN9D-Zellen nach Überexpression des Transkriptionsfaktors Sim1(rot) im Vergleich zu cDNA aus MN9D-Kontrollansätzen (blau) zu verschiedenen Zeitpunkten (24 h, 48 h, 72 h). Sim1-Überexpression in MN9D-Zellen führt zu einer signifikanten Heraufregulation nach 48 h ($P = 0,003$) und 72 h ($P = 0,01$) der *Pet1*-Expression im Vergleich zu den nicht Sim1-überexprimierenden Kontrollen. (Bestimmung der relativen RNA-Mengen mittels mathematischer Anwendung der vergleichenden $\Delta\Delta C_t$ Methode ($2^{-\Delta\Delta C_t}$), statistische Signifikanz: * $P < 0,05$; ** $P < 0,01$; *** $P < 0,001$; statistisch nicht signifikant (n. s.) $P \geq 0,05$, $n = 2$).

In gleicher Weise wurde die relative Expression des *Tph2*-Gens nach Überexpression von *Sim1* in *MN9D*-Zellen mittels qRT-PCR untersucht. Wie Abb. 25 graphisch veranschaulicht, konnte 24 h nach Transfektion des Überexpressionsplasmides *pcDNA3::Sim1* (rot) keine Änderung der *Tph2*-Expression in *Sim1*-überexprimierenden Zellen im Vergleich zu der *Tph2*-Expression in der entsprechenden cDNA der Kontrolle nachgewiesen werden. Nach 48 h jedoch wurde eine signifikante Steigerung der *Tph2*-Expression auf das 1,82fache ($+/-0,37$; $**P = 0,006$; Ctr 1 $+0,04/-0,05$) und nach weiteren 24 h um das 2,47fache ($+0,76/-0,51$; $***P = 0,0009$; Ctr 1 $\pm 0,11$) des Kontrollwertes ermittelt. Eine Überexpression des *Sim1*-Proteins *in vitro* führt somit zu einer deutlichen, signifikanten Steigerung der Expression des *Tph2*-Gens nach 48 h und 72 h.

Abb. 25: Quantitative-„Real-Time“-PCR-Analyse der Genexpression von *Tph2* in cDNA aus *Sim1*-überexprimierenden *MN9D*-Zellen (*Sim1*, rot) im Vergleich zu cDNA-Proben aus *pcDNA3*-transfizierten *MN9D*-Zellen (blau) zu unterschiedlichen Zeitpunkten (24 h, 48 h und 72 h). Überexpression von *Sim1* führt zu einer gesteigerten, signifikanten Expression von *Tph2* in *MN9D*-Zellen innerhalb von 48 h ($**P = 0,006$) und 72 h ($***P = 0,0009$) nach erfolgter *pcDNA3::Sim1*-Transfektion. (Bestimmung der relativen RNA-Mengen mittels mathematischer Anwendung der vergleichenden $\Delta\Delta C_t$ Methode ($2^{-\Delta\Delta C_t}$), statistische Signifikanz: $*P < 0,05$; $**P < 0,01$; $***P < 0,001$; statistisch nicht signifikant (n. s.) $P \geq 0,05$, $n = 2$).

5.3.4. „Loss-of-function“-Experimente

Um die Wirkung von Sim1 auf die Regulation der Expression von Genen, die für die Entwicklung und Differenzierung von 5-HT-Neuronen relevant sind, zu analysieren, wurden „Loss-of-function“-Experimente durchgeführt. Diese Experimente beruhen auf der Blockierung der Translation der *Sim1*-mRNA mittels spezifischer siRNA-Moleküle. Als Kultursystem wurden wiederum *MN9D*-Zellen verwendet, deren Transfektion mit Fluorophor-markierten siRNA-Molekülen verfolgt werden konnte. Dabei handelte es sich zum einen um Cy5-gekoppelte siRNA, mit komplementärer Sequenz zu einem Sequenzabschnitt der mRNA des *Sim1*-Gens (*Sim1*-siRNA-Cy5, siehe Punkt 4.1.4., Seite 27). Zum anderen wurde als Kontrolle eine FITC-konjugierte siRNA zum Einsatz, welche aufgrund ihrer pflanzlichen Ursprungssequenz keine Komplementarität zu mRNA-Sequenzen der Maus aufweist und im weiteren als Kontroll-siRNA (Ctr-siRNA-Alexa488, Punkt 4.1.4., Seite 27) bezeichnet wird. Die Transfektion wurde wie unter Punkt 4.2.2.4. (Seite 43) beschrieben durchgeführt. Nachfolgende Abb. 26 (Seite 109) zeigt exemplarisch *MN9D*-Zellen in einer Dichte von 1×10^5 Zellen/Poly-D-Lysin-beschichtetem Deckgläschen ($\varnothing$ 12 mm) nach erfolgter Transfektion. Nach Ablauf von 24 h wurden die Zellen durch eine 4%ige PFA-Lösung fixiert und die Zellkerne durch DAPI (blau) markiert. In Abb. 26A ist die deutlich als rote, zytoplasmatische Fluoreszenz erkennbare Transfektion der *MN9D*-Zellen durch siRNA-*Sim1*-Cy5 (37,5 ng/ 1×10^5 Zellen) nach 24 h zu erkennen (rot). Die Effizienz der Transfektion lag bei circa 40%. Demgegenüber, war die Effizienz der Transfektion der FITC-konjugierten Ctr-siRNA-Alexa 488 (grün) geringer und betrug circa 30%. Abb. 26B zeigt die Transfektion des als Kontrolle verwendeten Ctr-siRNA-FITC-Moleküls (37,5 ng/ 1×10^5 Zellen) ebenfalls 24 h nach Transfektion der Zellen.

Abb. 26: Transfektion von *MN9D*-Zellen mit *Sim1*-mRNA-spezifischer siRNA (**A**: *Sim1*-Cy5, rot) bzw. einer nicht zur komplementären Sequenzbindung fähigen Kontroll-siRNA (**B**: Ctr-siRNA-Alexa 488, grün). *MN9D*-Zellen wurden unmittelbar vor der Transfektion in einer Dichte von 1×10^5 Zellen/Poly-D-Lysin beschichtetem, $\varnothing$ 12 mm-Deckgläschen plattiert und mit 70 ng siRNA pro Deckgläschen transfiziert. Die Aufnahme und zytoplasmatische Lokalisation der Fluorophormarkierten siRNA-Moleküle wurde fluoreszenzmikroskopisch ausgewertet. Kernfärbung durch DAPI (blau).

Die Abnahme der Expression von *Sim1* in *MN9D*-Zellen auf RNA-Ebene durch spezifische *Sim1*-siRNA wurde, wie unter Punkt 4.2.6.8. (Seite 64) beschrieben, durch RT-PCR Nachweis des *Sim1*-Amplifikationsproduktes bestätigt. Hierzu wurde die Expression des *Sim1*-Gens in cDNA-Proben aus siRNA-*Sim1*-Cy5-transfizierten *MN9D*-Zellen mit der Expression von *Sim1* in parallel gewonnenen cDNA-Proben aus Ctr-siRNA-Alexa488-transfizierten Zellen verglichen. Die Ergebnisse der *Sim1*-Expression zu unterschiedlichen Zeitpunkten nach siRNA-Transfektion sind der Abb. 27 (Seite 110) zu entnehmen. Abb. 27A zeigt eine vergleichbar starke *Gapdh*-Expression in cDNA-Proben der mit Ctr-siRNA-Alexa 488-transfizierten *MN9D*-Zellen (Ctr) und in entsprechenden cDNA-Proben *Sim1*-siRNA-Cy5-transfizierter Zellen (Spur 2 bzw. Spur 3), 48 h nach erfolgter Transfektion. Ebenso ist die jeweilige dazugehörige *Gapdh*-Expression 72 h nach Transfektion der Zellen durch *Sim1*-siRNA-Cy5 bzw. Ctr-siRNA-Alexa488 (Spur 4 bzw. 5) einander vergleichbar. Die Analyse der Expression von *Sim1* ist in Abb. 27B dargestellt. Hier wird deutlich, dass durch die eingesetzte *Sim1*-siRNA-Cy5 bereits nach 48 h nach Transfektion eine Absenkung der *Sim1*-Expression (Spur 2) auf RNA-Ebene im Vergleich zur Probe der mit Ctr-siRNA-Alexa 488-transfizierten *MN9D*-Zellen (Spur 1) erzielt werden konnte. Deutlicher ist die Minderung der *Sim1*-Expression 72 h nach der Transfektion zu erkennen. So lässt sich in Spur 4 eine Amplifikation von *Sim1* im Vergleich zur entsprechenden Kontrolle (Spur 3) nur schwach nachweisen.

Abb. 27: Analyse der Herabregulation der *Sim1*-Expression mittels spezifischer siRNA (*Sim1*-Cy3) in *MN9D* Zellen durch Reverse-Transkriptions(RT)-PCR. **A:** Expression des *Gapdh*-Gens in cDNA-Proben von *MN9D*-Zellen, die mit einer Alexa 488-markierten Kontroll-siRNA (Ctr-siRNA-Alexa 488) transfiziert wurden im Vergleich zu cDNA-Proben von mit siRNA-*Sim1*-Cy5-transfizierten *MN9D*-Zellen des selben Zeitpunktes, 48 h bzw. 72 h, nach der Transfektion. **B:** Nachweis des *Sim1*-Amplifikationsproduktes in cDNA Proben der siRNA-*Sim1*-Cy3-transfizierten *MN9D*-Zellen im Vergleich zu cDNA-Proben von Ctr-siRNA-Alexa 488-transfizierten Zellen. 48 h nach der Transfektion konnte eine eindeutige Reduktion der *Sim1*-Expression auf RNA-Ebene erzielt werden, die nach weiteren 24 h nahezu vollständig war. (Ctr: Ctr-siRNA-Alexa 488; *Sim1* siRNA: siRNA-*Sim1*-Cy5).

Wie in Abb. 24 (Seite 106) dargelegt wurde, führt eine Überexpression von Sim1 in *MN9D*-Zellen zu einer gesteigerten Expression des 5-HT-spezifischen Transkriptionsfaktors *Pet1*. Dieser Befund wurde nun durch „Loss-of-function“-Experimente mittels *Sim1*-spezifischer siRNA und anschließende Analyse der Änderung der Expression von *Pet1* durch qRT-PCR untermauert. Hierzu wurden *MN9D*-Zellen wie unter Punkt 4.2.2.4. (Seite 43) erläutert mittels *Sim1*-spezifischer siRNA (siRNA-*Sim1*-Cy5) transfiziert und anschließend transfizierte Zellen durch FACS („*Fluorescence activated cell sorting*“) bei einer Wellenlänge (λ) von 670 nm aus der Gesamtzellpopulation herausgefiltert. Als Kontrollen wurden mit Ctr-siRNA-Alexa 488-transfizierte *MN9D*-Zellen aus der gleichen Passage verwendet. Wie nachfolgender repräsentativer Versuch, wiedergegeben in Abb. 28 (Seite 111), zeigt, führt eine Blockierung der Translation der *Sim1*-mRNA zu einer signifikanten Minderung der Expression von *Pet1*

nach 24 h in siRNA-Sim1-Cy5-transfizierten und FACS-sortierten *MN9D*-Zellen ($0,08 \pm 0,181/-0,056$; $^*P = 0,0163$) im Vergleich zu Kontrollen (Ctr-siRNA-Alexa 488, $1 \pm 0,138/-0,121$). Somit ist *Pet1* ein potentielles Zielgen von Sim1.

Abb. 28: Repräsentative Analyse der Genexpression von *Pet1* mittels Quantitativer-„Real-Time“-PCR in *MN9D*-Zellen nach Herabregulation der Expression von *Sim1* mittels spezifischer siRNA (*Sim1*-Cy5) nach 24 h im Vergleich zu Ctr-siRNA-Alexa 488-transfizierten *MN9D*-Zellen. *Pet1* wird nach Reduktion der Translation der *Sim1*-mRNA signifikant herunterreguliert. Statistische Signifikanz: $^*P < 0,05$, $^{**}P < 0,01$, $^{***}P < 0,001$.; statistisch nicht signifikant (n. s.) $P \geq 0,05$.

5.3.5. Die Einflussnahme von Tgf- β auf die Entwicklung von 5-HT-Neurone verläuft unabhängig von Sim1

Basierend auf der Identifizierung von möglichen Zielgenen des Transkriptionsfaktors Sim1 als Mitglieder der Tgf- β -Superfamilie (Liu et al. 2003) wurde untersucht, ob Sim1 einen denkbaren, regulatorischen Einfluss auf die Expression endogener Tgf- β s ausübt. Zu diesem Zweck wurde die cDNA Sim1-überexprimierender *MN9D*-Zellen bezüglich ihrer Tgf- β 2-Expression mittels qRT-PCR mit nicht Sim1-überexprimierenden *MN9D*-Zellen verglichen. Tgf- β 2 wurde aufgrund seines *in vivo* beobachteten Einflusses auf die Induktion rostraler 5-HT-Neurone des ventralen Rhombencephalon und Aufrechterhaltung 5-HT-Neurone der Paramedianen Raphe (B5/B8, siehe hierzu Punkt 2.3., Seite 16) als relevanteste Tgf- β -Isoform gewählt. Abb. 29 (Seite 112) zeigt die Ergebnisse des Expressionsvergleiches von cDNA-Proben aus *Sim1*-überexprimierenden (*pcDNA3::Sim1*) *MN9D*-Zellen (rot) mit

entsprechenden cDNA-Proben, der als Kontrolle dienenden, mit *pcDNA3*-transfizierten Zellen (blau) in graphischer Darstellung der Expression $2^{-\Delta\Delta Ct}$ zu drei unterschiedlichen Zeitpunkten, 24 h, 48 h und 72 h nach Transfektion. Lediglich nach 24 h war durch die Überexpression von Sim1 eine signifikante Steigerung der *Tgf-β2*-Expression auf das 1,42fache ($+0,12/-0,08$; $^*P = 0,016$) des Kontrollwertes ($1 +0,06/-0,03$) zu bestimmen. Zu späteren Zeitpunkten (48 h und 72 h) nach Transfektion der Zellen konnte jedoch keine weitere signifikante Änderung der Expression von *Tgf-β2* im Vergleich zu entsprechenden Kontrollen auf RNA-Ebene festgestellt werden.

Abb. 29: Quantitative-„Real-Time“-PCR-Analyse der Genexpression von *Tgf-β2* in cDNA-Proben aus Sim1-überexprimierenden MN9D-Zellen (*pcDNA3::Sim1*, rot) im Vergleich zu cDNA-Proben nicht *Sim1*-überexprimierender Zellen (*pcDNA3*, blau) zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Überexpression von *Sim1* führte zu einer vorübergehenden, signifikanten Änderung der Expression von *Tgf-β2* auf RNA-Ebene in MN9D-Zellen innerhalb von 24 h ($^*P = 0,02$) nach der Transfektion. 48 h und 72 h nach Transfektion der Plasmid-DNA erfolgt signifikante keine Änderung der *Tgf-β2*-Expression. (Bestimmung der relativen RNA-Mengen mittels mathematischer Anwendung der vergleichenden $\Delta\Delta Ct$ Methode, ($2^{-\Delta\Delta Ct}$), statistische Signifikanz: $^*P < 0,05$; $^{**}P < 0,01$; $^{***}P < 0,001$; statistisch nicht signifikant (n. s.) $P \geq 0,05$, $n = 2$).

Die durch qRT-PCR erhaltenen Daten der *Tgf-β2*-Expression zeigen, dass eine Überexpression von Sim1 in MN9D-Zellen in keiner langfristigen Regulation der endogenen Expression von *Tgf-β2* resultiert.

5.4. Identifizierung von Kandidatengenenen der Entwicklung von 5-HT-Neuronen durch Vergleich des Genexpressionsmusters von ventralem rostralem Rhombencephalon und ventralem Mesencephalon der Maus (E11)

5.4.1. Überprüfung der präparierten Gehirnregionen des ventralen Mesencephalon und ventralen Rhombencephalon der Maus, E11

Basierend auf der ontogenetischen Verwandtschaft rostraler 5-HT-Neurone des ventralen Rhombencephalon mit DA-Neurone des ventralen Mesencephalon wurde ein Genexpressionsvergleich dieser beiden Gehirnbereiche mittels cDNA-Mikroarray durchgeführt. Als Ausgangsmaterial diente hierzu Gesamt-RNA aus Gewebe des ventralen Mesencephalon und des ventralen rostralen Rhombencephalon am E11 der Maus, dem Zeitpunkt des Beginns der Induktion von 5-HT-Neuronen und DA-Neuronen. Hierdurch sollte es ermöglicht werden, erste Hinweise auf jene wesentlichen Unterschiede in der Genexpression intrinsischer Faktoren ventraler Vorläuferzellen beider Neuronenpopulationen zu gewinnen, die zur Entwicklung des einen bzw. des anderen Neuronentyps führen. Nach Isolation der Gesamt-RNA und Überprüfung der RNA-Integrität (siehe hierzu Punkte 4.2.6.4. und 4.2.6.5., Seite 61 bzw. Seite 62) wurden die Proben zur cDNA-Synthese eingesetzt. Letztere sowie die Mikroarray-Analyse wurden im Steinbeis-Transferzentrum für Proteom-Analysen (Rostock) durchgeführt. Für den Vergleich der Genexpression zwischen ventralem Mesencephalon und ventralem, rostralem Rhombencephalon wurde der GeneChip® Mouse Genome 430A 2.0 Array von Affimetrix verwendet.

Abb. 30 (Seite 114) zeigt eine graphische Auftragung der Expressionsdaten, welche zur Überprüfung der präparierten Gewebebereiche herangezogen wurden. Auf der y-Achse ist die relative Expression, $2^{-\Delta\Delta Ct}$ (rot), im ventralen Rhombencephalon im Vergleich zum ventralen Mesencephalon der Maus E11 aufgetragen. Ebenfalls angegeben ist der *P*-Wert (Überschreitungswahrscheinlichkeit) der ermittelten Expressionswerte, wobei Expressionswerte mit einem *P*-Wert (blau) von $\leq 0,05$ als signifikant eingestuft wurden. Deutlich zu erkennen ist die fehlende Expression des mesencephalen Transkriptionsfaktors *Otx2* im ventralen Rhombencephalon der Maus am Embryonaltag E11. Demgegenüber ist das rhombencephale Markergen *Gbx2* um das 2fache stärker im ventralen Rhombencephalon exprimiert als im ventralen Mesencephalon der Maus (E11). Somit kann davon ausgegangen werden, dass es während der Präparation der beiden Ausgangsgewebe zu keiner Gewebekontamination und damit Verfälschung der Expressionsdaten gekommen ist. Um darüber hinaus die kaudale Grenze des präparierten ventralen Rhombencephalon festzulegen, wurden die relativen Expressionswerte einzelner *Hox*-Gene graphisch aufgetragen, welche die Rhombomere 1–7 determinieren (Krumlauf et al., 1993) Die

Zuordnung der exprimierten *Hox*-Gene *Hoxb1*, *Hoxa2*, *Hoxb2*, *Hoxa3*, *Hoxb3*, *Hoxd3* und *Hoxa4* zu den Rhombomeren ist in einer Farbtabelle widerspiegelt. Hier zeigt sich, dass einzelne *Hox*-Gene in mehreren Rhombomeren zum Zeitpunkt E11 exprimiert werden, so z.B. *Hoxa2* oder *Hoxd3*. Hierdurch lassen sich auch die stark variierenden Expressionswerte der *Hox*-Gene untereinander erklären. Anhand der Darstellung der Expressionsdaten in Bezug auf die einzelnen Rhombomere konnte bestimmt werden, dass die in den Mikroarray eingesetzte cDNA des ventralen Rhombencephalon einer präparierten Geweberegion der R1–R6 entspricht. Aufgrund eines sehr hohen *P*-Wertes ($P = 0,15$), wurde der Expressionswert des Gens *Hoxa4* als nicht zuverlässig eingestuft. Ein höherer *P*-Wert der detektierbaren Expression hängt unter anderem mit einer sehr schwachen Signalstärke zusammen, so dass davon auszugehen ist, dass das Gebiet des R7 nicht vollständig in der Gewebepreparation erfasst wurde.

Abb. 30: Graphische Darstellung der relativen Werte der Genexpression im ventralen Rhombencephalon im Vergleich zum ventralen Mesencephalon der Maus des Embryonalaltages (E) 11, ermittelt durch Vergleich der entsprechenden Genexpressionsmuster mittels cDNA-Mikroarray. Dargestellt ist die relative Expression $2^{-\Delta\Delta C_t}$ (rot) sowie der *P*-Wert (*P*, blau) für *Gbx2* und *Otx2*, als Determinanten des ventralen Rhombencephalon bzw. des ventralen Mesencephalon, sowie Vertreter der *Hox*-Genfamilie als Determinanten der Rhombomere 1-7. Expressionswerte mit einem *P*-Wert (P) $\geq 0,05$ wurden als nicht signifikant eingestuft und nicht in die Beurteilung der Qualität der, dem cDNA-Mikroarray zugrunde liegenden, Gewebepreparationen einbezogen. Eine Expression *Otx2* im ventralen Rhombencephalon lag nicht vor. *Gbx2* wurde hingegen im Vergleich zum ventralen Mesencephalon über das 2fache erhöht im ventralen Rhombencephalon exprimiert. Eine Zuordnung der Expression repräsentativer *Hox*-Gene zu den einzelnen Rhombomeren (R) spiegelt die präparierte Geweberegion des Rhombencephalon wieder, welche die R1–6 umfasst.

5.4.2. Validierung der durch cDNA-Mikroarray ermittelten Genexpressionsdaten

Um die durch die cDNA-Mikroarray-Analyse gewonnenen Daten der relativen Genexpression zu überprüfen, wurden die Expressionswerte für einzelne Genen durch qRT-PCR überprüft, wie es unter Punkt 4.2.6.9. (Seite 65) beschrieben ist. Eingesetzt wurden hierbei die, mit den für den cDNA-Mikroarray verwendeten, identischen RNA-Proben des ventralen Rhombencephalon und ventralen Mesencephalon der Maus, E11. Nachfolgende Tab. 3 zeigt die durch qRT-PCR ermittelten, relativen Expressionswerte der Gene, *Atoh1*, *Cyp26B1*, *Meis1* sowie *Sema6d* im ventralen Rhombencephalon im Vergleich zum ventralen Mesencephalon der Maus (E11). Die Gegenüberstellung der durch Mikroarray-Analyse erhaltenen Expressionsdaten für diese Gene im ventralen Rhombencephalon (E11) zeigt weitgehend eine Übereinstimmung der durch beide Methoden ermittelten, relativen Expressionswerte. Somit kann davon ausgegangen werden, dass die Daten des cDNA-Mikroarray als eine Grundlage für die Ermittlung von bisher unbekannten Kandidatengenen der Induktion und Spezifizierung 5-HT-Neurone des ventralen Rhombencephalon der Maus dienen können.

Tab. 3: Gegenüberstellung der durch Quantitative-„*Real-Time*“-PCR (qRT-PCR) bzw. cDNA-Mikroarray erhaltenen, relativen Genexpressionsdaten des ventralen Rhombencephalon im Vergleich zum ventralen Mesencephalon der Maus des Embryonaltages (E) 11. Die Expressionswerte der qRT-PCR sind mit denen des cDNA-Mikroarray vergleichbar.

Gen	qRT-PCR	cDNA-Mikroarray	P-Wert
		$2^{-\Delta\Delta Ct}$	$2^{-\Delta\Delta Ct}$
<i>Atoh1</i>	3,64	2,89	0,000244
<i>Cyp26B1</i>	4,57	4,38	0,001221
<i>Meis1</i>	3,4	3,98	0,005859
<i>Sema6d</i>	3,67	3,55	0,00293

5.4.3. Auswahl von Kandidatengenen auf Grundlage der mittels cDNA-Mikroarray ermittelten Genexpressionsdaten

Literaturrecherchen führte zu einer ersten, vorläufigen Selektion von Kandidatengenen, welche im ventralen Rhombencephalon im Vergleich zum ventralen Mesencephalon der Maus (E11) mindestens um das 2,5fache heraufreguliert waren. Auswahlkriterien waren hierbei in erster Linie bisherige Erkenntnisse über eine Beteiligung des jeweiligen Gens in generelle, entwicklungsbiologische Prozesse. Hierzu gehört z. B. eine nachgewiesene Beteiligung an der Neurogenese oder Zellmigration. Darüber hinaus wurden ebenfalls Gene in die Auswahl aufgenommen, die im Bezug zu neurologischen Erkrankungen stehen, welche Ähnlichkeiten zu Erkrankungen basierend auf einer Dysfunktion des 5-HT-Systems aufweisen. Gene mit erhöhtem Fehlerwert ($P \geq 0,05$) wurden zu diesem Zeitpunkt noch nicht von der Auswahl ausgeschlossen. Die Auswahl beschränkte sich zunächst nur auf Gene, die im ventralen Rhombencephalon im Vergleich zum ventralen Mesencephalon heraufreguliert waren. Interessante Gene, die jedoch eine geminderte Expression im ventralen Rhombencephalon aufwiesen, wurden zu diesem Zeitpunkt nicht berücksichtigt. Nachfolgende Abb. 31 (Seite 117) gibt eine erste Auswahl von Genen wieder, welche im Vergleich zu einer Expression im ventralen Mesencephalon zu den 300 am höchsten im ventralen Rhombencephalon der Maus (E11) exprimierten Genen gehören.

Abb. 31: Graphische Darstellung der relative Genexpression, $2^{-\Delta\Delta Ct}$, von ausgesuchten Genen, basierend auf einem Genexpressionsvergleich des ventralem Rhombencephalon mit dem ventralem Mesencephalon der Maus des Embryonaltages (E) 11. Angegeben sind Gene mit u. a. bekanntem Bezug zu entwicklungsbiologischen Prozessen und einer denkbaren Beteiligung an der Induktion und Spezifikation serotonerger (5-HT-) Neurone des ventralen Rhombencephalon der Maus. Ebenfalls angegeben ist der *P*-Wert (*P*) der Expression jedes Gens, welcher jedoch zunächst nicht in die Auswahl miteinbezogen wurde. (* = gewählte Kandidatengene)

Die, sich aus den in Abb. 31 angegebenen Genen zusammensetzende, Auswahl wurde in Hinblick auf mögliche regulatorische Interaktion dieser Genprodukte mit Tgf- β s und Sim1 weiter eingegrenzt (*in Abb. 31). Auf drei Kandidatengene soll im Weiteren näher eingegangen werden: *Brn3.2*, *Rgs4* und *Lhx8*.

Der Transkriptionsfaktor Brn3.2 — Ein Zielgen von Sim1

Der Transkriptionsfaktor Brn3.2 („*Brain-specific homeobox/POU domain protein 3b*“, *Pou4f2*) gehört zur Klasse der Pou-Homeodomänen Proteine (Schonemann et al., 1998) und wies im cDNA-Mikroarray eine um das 3,62fache höhere Expression im ventralen Rhombencephalon der Maus (E11) im Vergleich zum ventralen Mesencephalon auf. Der im ZNS exprimierte Transkriptionsfaktor Brn3.2 ist z. B. an der terminalen Differenzierung neuronaler Phänotypen beteiligt. Interessanter Weise konnte gezeigt werden, dass in Teratocarcinoma and Neuroblastoma Zellen Brn3.2 in seiner Expression durch Retinolsäure (RA) reguliert wird (Turner et al., 1994). Des Weiteren ist Brn3.2 z. B. zusammen mit Islet1 („*Insulin related protein 1*“), einem LIM-Homeodomänen Transkriptionsfaktor, an der Differenzierung der

retinalen Ganglionzellen („*Retinal ganglion cells*“, RGC) beteiligt (Mu et al., 2008; Pan et al., 2008). Darüber hinaus nimmt es nicht nur Einfluss auf die Differenzierung der Vorläuferzellen in Richtung zu RGC, sondern erfüllt auch eine wesentliche Funktion bei der Unterdrückung anderer Entwicklungsprogramme in den Vorläuferzellen (Qiu et al., 2008).

Das Regulatorprotein *Rgs4* – Ein Zielgen von *Sim1*

Ebenfalls in die Auswahl aufgenommen wurde *Rgs4* („*Regulator of G-protein signalling 4*“) mit einer relativen, um 2,58 höheren Expression im ventralen Rhombencephalon im Vergleich zum ventralen Mesencephalon der Maus (E11). Es wird stark im zentralen Nervensystem exprimiert. Eine deutlich geringere Expression findet sich in Herz, Lunge, Leber und skeletaler Muskulatur (Nomoto et al., 1997). *Rgs4* ist ein GTPase-aktivierendes Protein, spezifisch für Gi- und G_q- α Untereinheiten von G-Proteinen, die durch *Rgs4* negativ reguliert werden. Obwohl kein Transkriptionsfaktor, weist *Rgs4* mehrere interessante Bezüge zur Regulation des 5-HT-System und seiner Dysfunktionen, z. B. der Schizophrenie auf, entweder durch genetische Polymorphismen oder durch eine Veränderung seiner regulatorischen Funktion (Ding et al., 2007)

Der Transkriptionsfaktor *Lhx8* – Ein Zielgen von TGF- β und *Sim1*

Der Transkriptionsfaktor *Lhx8* („*LIM homeobox 8*“, L3) gehört mit einer relativen Expression von 5,94 zu den am stärksten hochregulierten Genen im ventralen Rhombencephalon der Maus (E11) im Vergleich zum ventralen Mesencephalon. Er gehört zur Klasse der LIM-Homeobox-Transkriptionsfaktoren, die an verschiedenen Entwicklungsprogrammen beteiligt sind, hierzu gehören die Organisation des Zytoskeletts, zelluläre Spezifikation, Muskelzellen- und Neuronendifferenzierung sowie die Bildung des Auges. *Lhx8* ist in die Spezifikation und Differenzierung unterschiedlicher neuronaler Zelltypen, wie cholinergen Neuronen des basalen Telencephalon, während der embryonalen Entwicklung beteiligt (Manabe et al., 2007) sowie der Determinierung des GABAergen Phänotyps (Manabe et al., 2005). Neben diesen, das Gehirn betreffenden Funktionen, konnte eine Bedeutung von *Lhx8* auch in der Zahnentwicklung (Shibaguchi et al., 2003) und in der embryonalen Entwicklung des Gaumens gezeigt werden (Zhao et al., 1999).

Die Angaben der Genexpression der drei Kandidatengene *Brn3.2*, *Rgs4* und *Lhx8* im ventralen rostralen Rhombencephalon im Vergleich zum ventralen Mesencephalon der Maus (E11) wie sie nach dem cDNA-Mikroarray erhalten worden waren, wurden ebenfalls durch qRT-PCR unter Verwendung der selben, in den cDNA-Mikroarray eingesetzten cDNA-Proben, überprüft (Punkt 4.2.6.9., Seite 65). Nachfolgende Abb. 32 zeigt die durch qRT-PCR ermittelten, relativen Expressionswerte der drei Kandidatengene *Brn3.2*, *Rgs4* sowie *Lhx8* im ventralen Rhombencephalon im Vergleich zum ventralen Mesencephalon. Eine deutlich erhöhte Expression im ventralen rostralen Rhombencephalon im Vergleich zum ventralen Mesencephalon der Maus (E11) konnte für alle drei Gene bestätigt werden.

Abb. 32: Gegenüberstellung der durch Quantitative-„Real-Time“-PCR (qRT-PCR) bzw. cDNA-Mikroarray-Analyse erhaltenen, relativen Genexpressionsdaten der Kandidatengene *Brn3.2*, *Lhx8* und *Rgs4* im ventralen Rhombencephalon im Vergleich zum ventralen Mesencephalon der Maus des Embryonaltages (E) 11. Die gesteigerte Expression der drei Kandidatengene im ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E11), wie sie die Auswertung des cDNA-Mikroarray zeigte, konnte mittels qRT-PCR-Analyse bestätigt werden.

5.4.4. Sim1-Überexpression in *MN9D*-Zellen führt zu einer signifikanten Steigerung der Expression der Kandidatengene *Brn3.2* und *Rgs4*

Um eine vorstellbare Regulation der Gene *Brn3.2* und *Rgs4* durch Sim1 zu untersuchen, wurden „Gain-of-function“-Experimente durchgeführt. Zum Einsatz kamen hierbei Zellen der Zelllinie *MN9D*, die wie unter Punkt 4.2.2.3. (Seite 42) beschrieben, mit dem Überexpressionsplasmid *pcDNA3::Sim1* bzw. zum Zwecke der Kontrolle mit *pcDNA3* transfiziert wurden. 1×10^6 *MN9D*-Zellen wurden in 25 cm²-Kulturflaschen ausplattiert und am folgenden Tag mittels des Transfektionsreagenz Lipofectamine transfiziert. 24 h, 48 h und 72 h nach erfolgter Transfektion der Zellen wurde aus beiden experimentellen Gruppen die Gesamt-RNA isoliert und diese in gleich hoher Konzentration in die cDNA-Synthese eingesetzt (siehe Punkt 4.2.6.6., Seite 63). Des Weiteren wurde aus dem gleichen Zellmaterial Gesamt-Protein isoliert (Punkt 4.2.8.1., Seite 75) um eine Sim1-Überexpression auch auf Proteinebene nachweisen zu können. Konnte eine Überexpression von Sim1 in *MN9D*-Zellen durch Western-Blot-Analyse, wie unter Punkt 4.2.8.4. (Seite 77) erläutert, bestimmt werden, wurde der Einfluss dieser Sim1-Überexpression auf die Expression der Gene *Rgs4* und *Brn3.2* durch qRT-PCR untersucht. In Abb. 33 (Seite 121) ist die Expression des *Rgs4*-Gens in cDNA-Proben von Sim1-überexprimierenden (*pcDNA3::Sim1*) *MN9D*-Zellen (Sim1, rot) und von *pcDNA3*-transfizierten *MN9D*-Zellen (Ctr, blau) dargestellt. 24 h nach Transfektion der *MN9D*-Zellen mit *pcDNA3::Sim1* ist im Vergleich zur Expression des *Rgs4*-Gens in mit *pcDNA3*-transfizierten *MN9D*-Zellen eine Heraufregulation der *Rgs4*-Expression festzustellen (Ctr 1 +0,06/–0,07; Sim1 1,7 +0,15/–0,16; ***P* = 0,003). Eine Heraufregulation von *Rgs4* konnte in cDNA aus *pcDNA3::Sim1*-transfizierten *MN9D*-Zellen im Vergleich zu *pcDNA3*-transfizierten Zellen nach 48 h (Ctr 1 +0,32/–0,24; Sim1 1,29 +0,39/–0,12; *P* = 0,0998) sowie 72 h (Ctr 1 +0,85/–0,46; Sim1 1,63 +0,83/–0,15; *P* = 0,21) nach der Transfektion nicht dokumentiert werden. Hieraus kann geschlossen werden, dass Sim1 *in vitro* die Expression von *Rgs4* in *MN9D*-Zellen innerhalb von 24 h nach Transfektion positiv reguliert.

Abb. 33: Quantitative-„Real-Time“-PCR-(qRT-PCR)-Analyse der Expression von *Rgs4* in cDNA aus *MN9D*-Zellen nach Überexpression des Transkriptionsfaktors Sim1(rot) im Vergleich zu cDNA aus *MN9D*-Kontrollansätzen (blau) zu verschiedenen Zeitpunkten (24 h, 48 h, 72 h). Sim1-Überexpression in *MN9D*-Zellen führt zu einer signifikanten Heraufregulation der Expression von *Rgs4* nach 24 h im Vergleich zu nicht Sim1-überexprimierenden Kontrollen. Bestimmung der relativen RNA-Mengen mittels mathematischer Anwendung der vergleichenden $\Delta\Delta C_t$ Methode, ($2^{-\Delta\Delta C_t}$), statistische Signifikanz: * $P < 0,05$; ** $P < 0,01$; *** $P < 0,001$; statistisch nicht signifikant (n. s.) $P \geq 0,05$, $n = 3$.

Abb. 34 (Seite 122) zeigt die Ergebnisse der qRT-PCR Analyse der *Brn3.2*-Genexpression in Sim1-überexprimierenden *MN9D*-Zellen (*pcDNA3::Sim1*, rot) im Vergleich zu in *pcDNA3*-transfizierten *MN9D*-Zellen (blau). Während 24 h sowie 72 h nach der Transfektion keine Beeinflussung der *Brn3.2*-Expression durch Sim1 nachweisbar war (Ctr $1 \pm 0,05/-0,06$; Sim1 $1,1 \pm 0,06/-0,29$; $P = 0,154$ bzw. (Ctr $1 \pm 0,14/-0,13$; Sim1 $1,1 \pm 1,15/-0,7$; $P = 0,21$), konnte 48 h nach der Transfektion eine signifikante Heraufregulation der *Brn3.2*-Expression festgestellt werden (Ctr $1 \pm 0,1$; Sim1 $1,94 \pm 0,31/-0,27$; ** $P = 0,0023$). Somit führt eine Überexpression von Sim1 *in vitro* zu einer signifikanten Heraufregulation der *Brn3.2*-Expression in *MN9D*-Zellen innerhalb von 48 h nach Beginn der Transfektion.

Abb. 34: Quantitative-„Real-Time“-PCR-Analyse der Genexpression von *Brn3.2* in cDNA aus Sim1-überexprimierenden *MN9D*-Zellen (Sim1, rot) im Vergleich zu cDNA-Proben aus *pcDNA3*-transfizierten *MN9D*-Zellen (blau). Überexpression von Sim1 führt zu einer signifikant gesteigerten Expression von *Brn3.2* in *MN9D*-Zellen innerhalb eines Zeitraumes von 48 h nach erfolgter *pcDNA3::Sim1*-Transfektion. Bestimmung der relativen RNA-Mengen mittels mathematischer Anwendung der vergleichenden $\Delta\Delta C_t$ Methode, ($2^{-\Delta\Delta C_t}$), statistische Signifikanz: * $P < 0,05$; ** $P < 0,01$; *** $P < 0,001$; statistisch nicht signifikant (n. s.) $P \geq 0,05$, $n = 3$.

VI. Diskussion

Während der Entwicklung des ZNS erfolgt die Induktion neuronaler Zellpopulationen bis hin zum Erreichen des jeweiligen terminalen Differenzierungszustandes über die Abfolge spezifischer, exakt regulierter Prozesse. Wie kompliziert hierbei die regulatorischen Netzwerke sind, welche die Induktion und Spezifikation neuraler Vorläuferzellen zu unterschiedlichen Zelltypen bestimmen, verdeutlicht die Tatsache, dass selbst Subpopulationen der gleichen neuronalen Zellpopulation sich in ihrer Abhängigkeit von extrinsischen Signalmolekülen und der Expression intrinsischer Faktoren erheblich unterscheiden können. Das umfassende Verständnis der molekularen Mechanismen der Entwicklung und Aufrechterhaltung der verschiedenen neuronalen Zellpopulationen ist Grundlage für die erfolgreiche Behandlung neurologischer und neurodegenerativer Erkrankungen. Die Relevanz der Erforschung der Entstehung und Steuerung der vielfältigen Funktionen des 5-HT-Systems des ZNS wird deutlich, wenn man die Auswirkungen einer Dysfunktion dieses Systems bedenkt. So sind Migräne, Formen der Depression, Zwangsneurosen sowie schwere Erkrankungen wie Borderline-Persönlichkeitsstörungen, Schizophrenie und Autismus, aber auch Drogenmissbrauch eng mit dem 5-HT-System verknüpft (Croonenberghs et al., 2007; Ressler und Nemeroff, 2000; Yoon et al., 2008). Darüber hinaus ist das 5-HT-System an Mechanismen der Gedächtnisbildung und des Lernens beteiligt (King et al., 2008).

Wie auch für andere Neuronenpopulationen ist das Netzwerk aus intrinsischen und extrinsischen Faktoren, welches für die Entstehung von 5-HT-Neuronen verantwortlich ist, bisher nur unzureichend aufgeklärt worden. Einen essentiellen Beitrag zur Entstehung zentraler 5-HT-Neurone steuern Signalmoleküle wichtiger Signalzentren bei. 5-HT-Neurone entstehen kaudal des IstO im Rhombencephalon aus neuroepithelialen Vorläuferzellen der ventrikulären Zone („*Ventricular zone*“, VZ). In unmittelbarer Nachbarschaft wird Fgf8 im Isthmus synthetisiert und freigesetzt (Crossley and Martin, 1995). Zu weiteren, bislang bekannten extrinsischen Faktoren gehören Shh (Briscoe et al., 1999; Echelard et al., 1993), sezerniert von der Grundplatte, sowie Fgf4 (Shamim und Mason, 1999). Dabei ist die Bedeutung des Einflusses von Fgf4 für die Entwicklung von 5-HT-Neuronen im Gegensatz zu den ihnen ontogenetisch verwandten dopaminergen (DA-) Neuronen hervorzuheben. Dennoch ist Fgf4 nicht allein für die Einschlagung des Entwicklungsweges von neuralen Vorläuferzellen zu 5-HT-Neurone verantwortlich. Weitere Untersuchungen auf diesem Weg sind notwendig, um weitere Faktoren ermitteln zu können. Die extrinsische Signalmoleküle Shh, Fgf8 und Fgf4 werden auf transkriptioneller Ebene durch intrinsische Faktoren zu einem regulatorischen Netzwerk ergänzt, welches jedoch nicht allgemeingültig, sondern im Hinblick auf die Entwicklung einzelner Subpopulationen 5-HT-Neurone, variabel ist. Zeitlich lässt sich

die Entwicklung von neuronalen Vorläuferzellen zu 5-HT-Neuronen in zwei Phasen gliedern, die durch die Expression von Transkriptionsfaktoren definiert werden. Nach Induktion der 5-HT-Vorläuferzellen treten diese in die zweite Entwicklungsphase, die postmitotische Entwicklung ein, welche beginnend mit der Differenzierung bis zur Ausbildung des terminalen 5-HT-Phänotyps andauert. Als mitotisch exprimierte, intrinsische Faktoren, welche zur Entwicklung 5-HT-Neurone beitragen, wurden bisher die Transkriptionsfaktoren *Nkx2.2* und *Mash1* identifiziert (Cheng et al., 2003; Pattyn et al., 2004; Guillemot et al., 1993). Der durch *Shh* induzierte Transkriptionsfaktor *Nkx2.2* ist bedeutsam für die Spezifizierung ventraler Zelltypen und ist als einer der ersten Transkriptionsfaktoren der Induktionsphase in 5-HT-Vorläuferzellen exprimiert (Vokes et al., 2007; Hynes et al., 2000). Bereits in diesem frühen Stadium zeigt sich eine unterschiedliche Abhängigkeit von 5-HT-Subpopulationen von der Expression von Transkriptionsfaktoren. So sind 5-HT-Neuronen der kaudalen Gruppe von *Nkx2.2* abhängig, rostrale 5-HT-Neuronen weisen diese Abhängigkeit jedoch nur mit Ausnahme des Abkömmlings des Rombomers (R) 1, dem Nucleus raphe dorsalis (NRD), auf (Ding et al., 2003; Pattyn et al., 2003). Wie *Nkx2.2* wird auch *Mash1* in ventralen Vorläuferzellen exprimiert, hierunter auch in 5-HT-Vorläufern. Eine ektopische Expression von *Nkx2.2* und *Mash1* ist jedoch, obwohl beide Transkriptionsfaktoren für die Entwicklung eines Großteils von 5-HT-Neuronen notwendig sind, nicht in der Lage 5-HT-Neurone zu induzieren (Pattyn et al. 2004). Die Identität von mindestens einem weiteren essentiellen Faktor, welcher die endgültige Festlegung von Vorläuferzellen auf den Entwicklungsweg von 5-HT-Neuronen bestimmt, konnte bisher nicht aufgedeckt werden. Mit Eintritt in die postmitotische Entwicklungsstufe von 5-HT-Neuronen werden die Transkriptionsfaktoren *Gata2* (Craven et al., 2004), bzw. in Vorläuferzellen der kaudalen 5-HT-Neuronenpopulation im Rhombencephalon der Maus *Gata3* exprimiert. Als einziger spezifischer Marker von 5-HT-Neuronen konnte bisher nur der Transkriptionsfaktor *Pet1* bestimmt werden (Fyodorov et al., 1998). *Pet1* reguliert u. a. die Expression der Gene *Tph2*, *Vmat* und *Sert* und hierdurch das Erreichen der terminalen Differenzierung zum 5-HT-Neuron (Hendricks et al., 1999). Bis heute ist weder vollständig bekannt, wie die beschriebenen intrinsischen und extrinsischen Faktoren in Bezug zueinander stehen, noch ist bekannt welche weiteren Faktoren an der Entwicklung von 5-HT-Neuronen beteiligt sind. Weiter unten wird detailliert dargestellt, dass die bislang identifizierten Faktoren allein nicht zur terminalen Differenzierung der Vorläuferzellen und der Determinierung des serotonergen Phänotyps ausreichen. Die Aufklärung des komplexen Zusammenspiels extrinsischer Signalmoleküle und intrinsischer Faktoren während der Neurogenese erfordert ein geeignetes experimentelles System, welches es erlaubt, pluripotente Vorläuferzellen in ihrer Induktion und Differenzierung in unterschiedliche neurale Zelltypen zu beobachten und experimentell zu beeinflussen. Insbesondere die häufig frühe, embryonale Sterblichkeit von Mausmutanten

und die zeitintensive Generierung von konditionellen Mutanten limitieren ihren Einsatz für die Erforschung von Induktions- und Differenzierungsmechanismen von neuronalen Vorläuferzellen. Ein Ziel der vorliegenden Arbeit war es daher, ein geeignetes Kultursystem aus dem ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus zu etablieren und dieses in Hinblick auf seine spezifischen Eigenschaften und zelluläre Zusammensetzung zu charakterisieren, als auch in gezielter Weise experimentell in seiner zellulären Entwicklung zu kontrollieren.

Ein häufig in der Literatur beschriebenes System ist das Kulturmodell primärer Neurospheres. Als Neurospheres werden frei-schwimmende Zellaggregate bezeichnet, deren Bildung auf die Proliferation von in ihnen enthaltenen Stamm- und Vorläuferzellen unter dem Einfluss von Mitogenen, z.B. Fgf2 oder Egf, zurückzuführen ist. Somit bietet das System die Möglichkeit, *in vitro* die Vorläuferzellpopulation eines Gewebes zu expandieren und hierdurch den Anteil von Vorläuferzellen zu vergrößern (Ciccolini, 2001; Gritti et al., 1995; Kelly C.M. et al., 2003; Reynolds und Weiss, 1992; Zhu et al., 1999). Nach Dissoziation der Neurospheres, Ausplattieren derselbigen unter Bedingungen, welche die Differenzierung begünstigen, und Behandlung durch unterschiedliche Faktoren ist es zudem möglich, diese Vorläuferzellen in eine spezifische Richtung hin zu einem bestimmten Neurotransmitterphänotyp zu dirigieren. Die Anwendung des Kultursystems primärer Neurospheres konnte bereits für viele verschiedene Bereiche sowohl des embryonalen als auch des adulten Gehirns von Säugern demonstriert werden, wie z. B. dem Mesencephalon, dem Striatum, dem Hippocampus und dem Telencephalon (Morshead et al. 1994; Palmer et al., 1997; Reynolds und Weiss, 1992; Roisen et al., 2001). Jedoch wurde bisher keine Anwendung dieses Kultursystems primärer Neurospheres aus dem embryonalen ventralen Rhombencephalon der Maus zur Analyse des Netzwerkes intrinsischer und extrinsischer Faktoren der Entwicklung von 5-HT-Neuronen beschrieben. Zu diesem Zweck wurde in der vorliegenden Arbeit Gewebe des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus des Embryonaltages E12 auf seine Fähigkeit zur Bildung von primären Neurospheres hin untersucht. Hierzu wurde das Gewebe zunächst mechanisch und enzymatisch dissoziiert. Die aus Einzelzellen bestehende Zellsuspension wurde unter dem Einfluss der Mitogene Egf und Fgf2 kultiviert. Die Kultivierung der Zellen erfolgte unter serumfreien Bedingungen, wodurch eine nicht kontrollierbare Einflussnahme unbekannter, im Serum enthaltener, Faktoren auf die Zellen verhindert wurde. Sowohl frei-schwimmende als auch teilweise adherente Zellaggregate, sogenannte primäre Neurospheres, konnten aus dem ventralen rostralen Rhombencephalon gewonnen werden, deren Bildung bereits nach vier Tagen sichtbar war (Abb. 5, Seite 80). Der Zeitpunkt der Präparation des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus wurde mit dem Embryonaltag 12 zeitlich nahe dem ersten Auftreten von rostralen 5-HT-Neuronen (E11) gewählt. Des Weiteren ist die Anzahl von in

diesem Gewebe lokalisierten Vorläuferzellen zu diesem Zeitpunkt am höchsten. Ursprünglich war das Kultursystem primärer Neurospheres zur Anreicherung des Pools neuraler Stammzellen gedacht (Marshall et al., 2008; Rietze und Reynolds, 2006). Daraus folgt, dass die Neurospheres als solche zwei grundlegende Eigenschaften aufweisen müssen: Einerseits die Fähigkeit zur Selbsterneuerung und andererseits die Möglichkeit sich in alle in neuralem Gewebe vorliegenden Zelltypen zu differenzieren (Bazán et al., 2004; Uchida et al. 2000; Weissman, 2000), d. h. in Neurone, Astrozyten und Oligodendrozyten. Die von mir generierten primären Neurospheres besitzen durchaus beide Eigenschaften. Ein erster Hinweis auf die Fähigkeit zur Selbsterneuerung ist die Bildung sekundärer Neurospheres. Letztere wurden nach Dissoziation primärer Neurospheres und Kultivierung in minimaler Zelldichte unter gleichen Kulturbedingungen wie primäre Neurospheres, d. h. in Anwesenheit der Mitogene Fgf2 und Egf generiert (Abb. 6, Seite 81). Grundlegend sollten die Kulturbedingungen die Bildung eines sekundären Neurospheres aus einer einzelnen Stamm- oder Vorläuferzelle ermöglichen. Da in der vorliegenden Arbeit die dissoziierten primären Neurospheres in einer so geringen Zelldichte kultiviert wurden, ist anzunehmen, dass die gebildeten sekundären Neurospheres ebenfalls von einzelnen Vorläuferzellen abstammen. Gleichzeitig konnte durch die Bildung sekundärer Neurospheres nachgewiesen werden, dass die Bildung primären Neurospheres in der Tat auf die Proliferation von neuronalen Vorläuferzellen zurückzuführen war und nicht auf eine Aggregatbildung der Zellen aufgrund einer zu hohen Zelldichte. Ein weiterer Hinweis auf die Fähigkeit zur Proliferation von in primären Neurospheres des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12) enthaltenen neuronalen Vorläuferzellen lieferten BrdU-Inkorporationsexperimente. Mitotisch aktive Zellen innerhalb der primären Neurospheres konnten durch Nachweis des inkorporierten BrdU nachgewiesen werden (Abb. 7, Seite 83). Schließlich waren auch mehrere Zellen innerhalb der primären Neurospheres immunreaktiv für das Intermediärfilament Nestin (Lendahl et al. 1990), ein etablierter Marker für Vorläuferzellen (Abb. 7D, Seite 83). Insgesamt belegen die Ergebnisse, dass die in dieser Arbeit generierten primären Neurospheres aus dem ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12) über die Eigenschaft der Selbsterneuerung verfügen. Darüber hinaus konnte die zweite grundlegende Eigenschaft primärer Neurospheres, d. h. die Fähigkeit zu Differenzierung in mehrere neurale Zelltypen („*Multilineage differentiation*“), ebenfalls bestätigt werden. Für diesen Nachweis wurde folgendes experimentelles Protokoll angewandt. Primäre Neurospheres wurden während ihrer Proliferation über eine Zeitspanne von 2 h–8 h mit BrdU behandelt. Anschließend wurden die primären Neurospheres ausplattiert, und auf PORN-/Lam-beschichtete Deckgläschen plattiert, wodurch die Differenzierung der Zellen ermöglicht wurde. Drei Tage nach dem Ausplattieren wurden die Neurospheres fixiert und immunzytochemisch analysiert. Hierzu wurden β -III-Tubulin (Caccamo et al., 1989), Gfap

(Bignami und Dahl, 1977) und O4 (Sommer und Schachner, 1981), als spezifische Marker für differenzierte Neurone, Astrozyten bzw. Oligodendrozyten eingesetzt. Es konnten Zellen nachgewiesen werden, die sowohl BrdU-positiv als auch β -III-Tubulin-immunreaktiv waren (Abb. 9E, Seite 88). Dies bedeutet, dass diese Neurone tatsächlich von proliferierenden Vorläuferzellen abstammten. Ebenso konnten O4-immunpositive Zellen nachgewiesen werden, die gleichzeitig BrdU-positiv waren (Abb. 9F, Seite 88). Somit stammte zumindest ein Teil der Zellen, welche auf den neuronalen bzw. den glialen Entwicklungsweg festgelegt waren, von proliferierenden neuralen Vorläuferzellen innerhalb der primären Neurospheres aus dem ventralen rostralen Rhombencephalon ab. Im Gegensatz zu O4-immunpositiven Zellen konnten in den primären Neurospheres keine Gfap-immunreaktiven Zellen detektiert werden. Dieser Befund beruht möglicherweise auf dem frühen Zeitpunkt der Kultivierung und/oder auf der spontanen und nicht experimentell gesteuerten Differenzierung der primären Neurospheres zu Astrozyten. An dieser Stelle sei daraufhingewiesen, dass sich innerhalb der primären Neurospheres auch O4- bzw. β -III-Tubulin-positive Zellen aufzeigen ließen, in denen keine gleichzeitige Immunreaktivität für BrdU vorlag (Abb. 9, Seite 88). Dies belegt, dass die β -III-Tubulin-positiven bzw. O4-immunpositiven jedoch BrdU-negativen Zellen bereits vor der BrdU-Behandlung ausdifferenziert waren und daher nicht von proliferierenden Vorläuferzellen in den primären Neurospheres abstammten. Für das hier etablierte Kultursystem primärer Neurospheres aus dem ventralen rostralen Rhombencephalon bedeutet dies, dass dieses Kultursystem eine heterogene, zelluläre Zusammensetzung aufweist, bestehend aus proliferierenden Vorläuferzellen aber auch aus bereits in die Differenzierung eingetretenen Zellen, Neuronen und Oligodendrozyten. Vereinzelt konnten sogar 5-HT-immunpositive Zellen nachgewiesen werden (Abb. 9D, Seite 88).

Die komplexe zelluläre Zusammensetzung der primären Neurospheres konnte zudem durch RT-PCR untermauert werden. Das Vorliegen von sich zu Neuronen und Oligodendrozyten differenzierenden Zellen konnte durch RT-PCR bestätigt werden (Abb. 8A und B, Seite 86). So ließen sich die Amplifikationsprodukt der Gene *Nestin* und *β -III-Tubulin*, nicht jedoch das Gen *Gfap*, nachweisen. Eine gesteigerte Expression der Gene *Nkx2.2* und *Lmx1b* in primären Neurospheres des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12) im Vergleich zu primärem Gewebe gleichen Ursprungs (Abb. 8C), weist auf eine Anreicherung der Zellpopulation primärer Neurospheres mit neuralen Vorläuferzellen hin. Interessanterweise konnte auch eine Expression des Gens *Tph2* in primären Neurospheres des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12) aufgezeigt werden (Abb. 8D). Die Expression des *Tph2*-Gens war in primären Neurospheres höher als im Gewebe, was auf den ersten Blick irritierend ist. Dieses Ergebnis kann jedoch dadurch erklärt werden, dass in primären Neurospheres der relative Anteil differenzierter 5-HT-Neurone gegenüber dem im Gewebe

vorliegenden Anteil bezogen auf die Gesamtzellzahl höher ist. Dies mag auch der Grund für die gleich hohe Expression des Gens *β-III-Tubulin* im Vergleich zwischen primären Neurospheres einerseits und Gewebe gleichen Ursprungs andererseits sein. Die Charakterisierung des hier generierten Kultursystems primärer Neurospheres zeigte darüber hinaus, dass die generierten primären Neurospheres aus dem ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12) eine gewisse regionale Spezifizierung beibehalten haben. Dies konnte gezeigt werden, nachdem die korrekte, d. h. von Kontaminationen durch mesencephale Gewebeanteile freie, Präparation des ventralen rostralen Rhombencephalon durch RT-PCR überprüft worden war. Im präparierten Gewebe des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12) war keine Expression des mesencephalen Markergens *Otx2* feststellbar (Abb. 8A). Ebenso konnte gezeigt werden, dass Zellen der primären Neurospheres nach wie vor ihre Festlegung auf ihren rhombencephalen Ursprung besitzen, wie eine deutliche Expression des rhombencephalen Markergens *Gbx2* (Brodski et al., 2003; Millet et al., 1999) dokumentierte. Ebenfalls exprimiert wurden in primären Neurospheres des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12) die extrinsischen Signalmoleküle *Shh* und *Fgf4* (Abb. 7C), deren Einfluss essentiell für die Entwicklung von 5-HT-Neuronen sind (Hynes und Rosenthal, 1999; Goridis und Rohrer, 2002). Hingegen wurde *Fgf8* in primären Neurospheres im Gegensatz zu primärem Gewebe des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12) nicht exprimiert. Dies beruht wahrscheinlich auf dem Fehlen des IstO und hieraus resultierend dem Fehlen des von ihm ausgehenden Fgf8 Gradienten, wodurch wiederum Fgf8 normalerweise in seiner Expression aufrechterhalten wird. Hierbei sei darauf hingewiesen, dass die zur Generierung der primären Neurospheres isolierten Zellen bereits dem Einfluss von Fgf8 innerhalb des Gewebeverbandes zum Zeitpunkt E12 ausgesetzt waren. Eine Expression der Gene *Gata2* und *Pet1*, als frühe und späte Markergene serotonerger Neurone, sowie des Gens *Tph2*, als Marker der terminalen Differenzierung zu 5-HT-Neuronen, konnten innerhalb der primären Neurospheres wie im primären Gewebe detektiert werden (Abb. 8D, Seite 86). So fand sich eine nahezu gleich starke Expression von *Gata2* in primärem Gewebe des ventralen rostralen Rhombencephalon und in primären Neurospheres. Die Expression von *Pet1* und *Tph2* war in primären Neurospheres im Vergleich zu primärem Gewebe erhöht. In der Zellpopulation primäre Neurospheres des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12) befanden sich somit auch einzelne Neurone, die bereits den terminalen Differenzierungszustand von 5-HT-Neuronen erreicht hatten. Dieser Befund wurde ebenfalls durch immunzytochemischen Nachweis der 5-HT-Expression bestätigt (Abb. 9D, Seite 88). Der Besitz einer regionalen Identität primärer Neurospheres aus dem ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus steht im Einklang mit Ergebnissen für primäre Neurospheres anderer Gehirnareale, wie dem

Mesencephalon, dem Cortex oder dem Striatum (Hitoshi et al., 2002; Ostenfeld et al., 2002; Parmar et al., 2002; Roussa et al., 2006; Armando et al., 2007).

Insgesamt konnte durch mehrere experimentelle Ansätze gezeigt werden, dass die im Rahmen dieser Arbeit generierten primären Neurospheres des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12) über eine heterogene Zellzusammensetzung aus proliferierenden neuralen Vorläuferzellen und sich differenzierenden, neuronalen und glialen Zellen verfügen. Es konnte darüber hinaus festgestellt werden, dass dies, was auf den ersten Blick vielleicht als Nachteil angesehen werden könnte, sich aufgrund der Beibehaltung der regionalen Spezifizierung als Vorteil in der Untersuchung der Entwicklung 5-HT-Neurone erweist. Die Tatsache, dass nach Dissoziation der primärer Neurospheres die Differenzierung der Vorläuferzellen unter serumfreien Bedingungen erfolgte, stellt das hier etablierte Kulturmodell als besonders wertvoll für die Untersuchung des Einflusses extrinsischer Wachstumsfaktoren auf die Entwicklung von 5-HT-Neuronen dar.

Wir haben daher dieses System eingesetzt, um den Einfluss von Tgf- β auf die Differenzierung von Vorläuferzellen des rostralen Rhombencephalon in Richtung des 5-HT-Phänotyps zu untersuchen.

Hierzu wurden primäre Neurospheres einen Tag (DIV1) nach Dissoziation und Ausplattieren auf PORN-/Lam-beschichtete Kulturschälchen entweder mit 1 ng/ml exogenem Tgf- β 1 oder mit einem funktionell blockierenden Antikörper gegen alle TGF- β -Isoformen (α -Tgf- β 1/2/3), in einer Konzentration von 10 μ g/ml behandelt. Als Kontrollen dienten unbehandelte, dissoziierte primäre Neurospheres der gleichen Präparation. An DIV3 wurde aus den behandelten Zellproben und den zugehörigen Kontrollen die Gesamt-RNA isoliert und das Genexpressionsmuster von *Gata2*, *Pet1* und *Lmx1b* in en experimentellen Gruppen durch qRT-PCR untersucht.

Mehrere Gründe haben zu der Entscheidung geführt, den Einfluss von Tgf- β auf die Induktion und Differenzierung 5-HT-Vorläuferzellen in Richtung des 5-HT-Phänotyps zu untersuchen. Isoformen des Zytokins Tgf- β sind an wichtigen zellulären Prozessen wie Proliferation, Differenzierung, Apoptose oder Überleben in mehreren Systemen beteiligt (Krieglstein et al., 2000 und 2002, Schober et al., 1999). Drei Tgf- β -Isoformen sind bisher bekannt, Tgf- β 1, 2 und 3, wobei nur die Isoformen 2 und 3 unter physiologischen Bedingungen im Gehirn exprimiert werden (Flanders et al., 1991). In Bezug auf die Entwicklung monoaminerger Neurone konzentrierte sich die Forschung bisher fast ausschließlich auf dopaminerge Neurone. So ist bekannt, dass Tgf- β notwendig für die Induktion und Differenzierung mesencephaler dopaminerge Neurone aus Vorläuferzellen ist (Farkas et al., 2003; Roussa und Krieglstein 2004; Roussa et al. 2006). Für die Untersuchung einer Tgf- β -Funktion in der Regulation der Entwicklung mesencephaler DA-Neurone wurde die gleiche experimentelle Strategie wie für die Untersuchung der

Entwicklung 5-HT-Neurone verwendet. Jedoch wurden hierbei primäre Neurospheres aus dem ventralen Mesencephalon generiert. Behandlung primärer Neurospheres des ventralen Mesencephalon durch eine exogene Tgf- β -Gabe führte zu einer signifikanten Steigerung der Anzahl immunpositiver Zellen für Nurr1, ein frühes Markerprotein DA-Neurone (Kim I.O. et al., 2003; Saucedo-Cardenas et al., 1998). Darüber hinaus war die Anzahl von Zellen die einen ausgeprägten neuronalen Phänotyp, sowie einer Immunreaktivität für TH, besaßen ebenfalls signifikant gesteigert. Diese Ergebnisse wurden durch *in vivo*-Daten untermauert. So erbrachten immunhistochemische Untersuchungen an homozygoten *Tgf- β 2*-defizienten Mausembryonen des Embryonaltages 12 eine signifikante Reduktion der Anzahl DA-Neurone im Vergleich zu *wt*-Embryonen des gleichen Muttertieres. In *Tgf- β 2*^{-/-} *Tgf- β 3*^{-/-} Mutanten ist die Anzahl DA-Neuronen dramatisch reduziert jedoch nicht vollständig abwesend. Interessanterweise zeigte sich im Vergleich der dreialleligen Mutanten *Tgf- β 2*^{-/-} *Tgf- β 3*^{+/-} mit Mutanten des Genotyps *Tgf- β 2*^{+/-} *Tgf- β 3*^{-/-}, dass der Isoform Tgf- β 2 eine größere Bedeutung für DA-Neurone zukommt als der Isoform Tgf- β 3. Dies manifestiert sich in einem deutlicheren Verlust DA-Neurone in *Tgf- β 2*^{-/-}; *Tgf- β 3*^{+/-} Mutanten (Roussa et al., 2004). Untersuchungen an in unserem Labor generierten *Tgf- β 2*-defizienten Mäusen haben gezeigt, dass am Embryonaltag 12 die Anzahl der rostralen 5-HT-Neurone ebenfalls signifikant reduziert ist (unveröffentlichte Daten unseres Labors). Dies ist durchaus kein überraschendes Ergebnis, wenn man die ontogenetische Verwandtschaft der Vorläuferzellen von DA- und 5-HT-Neurone bedenkt.

Die diesem Befund zugrunde liegenden molekularen Mechanismen aufzuklären war das Ziel unserer *in vitro*-Untersuchungen der Genexpression von behandelten primären Neurospheres und Primärzellen aus dem Gewebe des ventralen Rhombencephalon der Maus (E12). Gewählt wurden etablierte Markergene der mitotischen und postmitotischen Entwicklung von 5-HT-Neuronen. Erstens, *Gata2* als mitotisch in 5-HT-Vorläuferzellen exprimiertes Markergen, welches insbesondere in rostralen 5-HT-Neuronen die Expression von *Lmx1b* und *Pet1* initiiert (Craven et al., 2004) und an der Regulation des Eintritts in die postmitotische Entwicklungsphase von neuronalen Vorläuferzellen beteiligt zu sein scheint (El Wakil et al., 2006). Fehlt *Gata2*, wie in *Gata2*-defizienten Mäusen gezeigt wurde, so führt dies zum frühen embryonalen Tod der Mutanten um den Embryonaltag E9.5–12.5 (Nardelli et al., 1999). Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass eine Behandlung primärer Neurospheres des ventralen rostralen Rhombencephalon (E12) durch Tgf- β zu keiner signifikanten Veränderung der Expression von *Gata2* führt (Abb. 11, Seite 91). Eine *in vitro*-Studie an direkt ausplattierten Primärzellen des rostralen Rhombencephalon der Ratte (E12) nach Tgf- β -Behandlung eine signifikante Steigerung der rostralen 5-HT-Neurone (Galter et al., 1999). Insbesondere in letzterem Fall handelte es sich jedoch um ein grundlegend anderes Kultursystem. Erstens wurden die Vorläuferzellen nicht zuvor über die Generierung

primärer Neurospheres expandiert. Damit kann in diesem Modell nicht wie in primären Neurospheres die Induktion der Entwicklung von Vorläuferzellen zu 5-HT-Neuronen sondern eher die Differenzierung von 5-HT-Neuronen durch externe Faktorengabe beeinflusst werden. Zweitens handelte es bei der Ratte um einen, sich hinsichtlich ihrer Entwicklung im Vergleich zur Maus, unterscheidenden Modellorganismus. Wurden, ähnlich zu genannten Arbeiten von Galter et al. (1999), nicht primäre Neurospheres des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12), sondern Primärzellen dieses Gehirnbereichs ohne vorherige Expansion des Anteils von Vorläuferzellen an der Gesamtzellzahl ausplattiert, so zeigte sich, dass die Behandlung dieser Zellen durch Tgf- β 1 ebenfalls zu keinem deutlichen Anstieg der Expression von *Gata2* führte (Abb. 13, Seite 94). Um des Weiteren die Notwendigkeit von Tgf- β für die Induktion von 5-HT-Neuronen in primären Neurospheres des ventralen rostralen Rhombencephalon (E12) zu untersuchen, wurde ein funktionsblockierender Antikörper (α -Tgf- β 1/2/3) in der Behandlung eingesetzt. Dieser Antikörper ist, wie vielfach in der Literatur beschrieben (Roussa et al., 2008), als blockierender Antikörper aller endogen exprimierten TGF- β -Isoformen etabliert. Behandlung primärer Neurospheres mit α -Tgf- β 1/2/3 führte zu einer signifikanten Reduktion der Expression von *Gata2* (Abb. 11, Seite 91). Daher ist zu vermuten, dass Tgf- β für die Aufrechterhaltung der *Gata2*-Expression notwendig ist. In direkt ausplattierten Zellen des ventralen rostralen Rhombencephalon wurde die biologische Bedeutung von Tgf- β für die Entwicklung 5-HT-Neurone durch Verwendung des synthetischen Inhibitors SB431542 untersucht. Dieser inhibiert die Rezeptoren Alk4/5 und 7 und blockiert hierdurch die Tgf- β -induzierte Signaltransduktionskaskade (Alk5, Tgf- β -Rezeptor Typ I; Ho et al., 2006; Matsuyama et al., 2003). Wie aus der Rezeptorspezifität des Inhibitors SB431542 hervorgeht, blockiert dieser nicht nur die Tgf- β -abhängige Signaltransduktionskaskade, sondern auch z. B. die durch Activin, einem Mitglied der Tgf- β -Superfamilie, aktivierte Signalweiterleitung. Jedoch ist bisher für andere Mitglieder der Tgf- β -Superfamilie, wie dem genannten Activin, ein Einfluss weder auf die Entwicklung DA-, noch 5-HT-Neuronen beschrieben worden. Aus diesem Grund ist davon auszugehen, dass zur Untersuchung der Relevanz von Tgf- β für die Induktion und Differenzierung 5-HT-Neurone des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus der Inhibitor 431542 eingesetzt werden kann. Wurden primäre Neurospheres des ventralen Mesencephalon (E12) mit diesem Alk4/5/7-spezifischen Inhibitor behandelt, so führte dies zu einer signifikanten Reduktion der Anzahl DA-Neurone (Roussa et al., 2006). Behandlung von direkt ausplattierten Primärzellen des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12) zeigen nach einer Behandlung mit dem Inhibitor SB431245 (Abb. 13, Seite 94) eine signifikanten Herabregulation der *Gata2*-Expression, was auf eine Aufrechterhaltung der *Gata2*-Expression durch Tgf- β schließen lässt. Insgesamt zeigen α -Tgf- β -1/2/3 und der Inhibitor SB431542 vergleichbare Effekte (Abb. 11 und 13).

Insgesamt können die Ergebnisse von primären Neurospheres und direkt plattierten Primärzellen des ventralen rostralen Rhombencephalon nach Behandlung mit Tgf- β so interpretiert werden, dass es sich bei der Regulation der Induktion und der Differenzierung um zwei verschiedene Regulationswege handelt. Die Induktion des 5-HT-Phänotyps wird durch Tgf- β nicht über *Gata2* reguliert, wohingegen Tgf- β möglicherweise über die Regulation der Expression von *Gata2* Einfluss auf die Differenzierung von Vorläuferzellen zu 5-HT-Neuronen nimmt. In beiden Kultursystemen ist jedoch Tgf- β für eine Aufrechterhaltung der Expression von *Gata2* notwendig.

Als nächstes Gen wurde *Pet1* als postmitotisch exprimierter Transkriptionsfaktor und einziger bisher bekannter 5-HT-spezifischer Marker nach Behandlung durch Tgf- β analysiert. Die Deletion dieses Markergens führt in Mausmutanten zu einer deutlichen Reduktion der Anzahl 5-HT-Neurone um etwa 70%, sowie eine teilweise nicht vollständige Ausreifung der verbleibenden 5-HT-Neurone zum terminalen 5-HT-Phänotyp (Hendricks et al., 2003). Das jedoch nicht alle 5-HT-Neurone in *Pet1*-defizienten Mäusen verloren gehen, weist bereits daraufhin, dass es zumindest einen von *Pet1*-unabhängigen Entwicklungsweg für 5-HT-Neurone geben muss. Die Analyse der Expression des postmitotischen Markergens *Pet1* nach Behandlung der primären Neurospheres des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus durch exogenes Tgf- β zeigte im Vergleich zu unbehandelten Kontrollen keine signifikante Einflussnahme von Tgf- β auf die *Pet1*-Expression (Abb. 12, Seite 92). Wurden jedoch die Zellen primärer Neurospheres mit dem funktionsblockierenden α -Tgf- β 1/2/3 Antikörper behandelt, so resultierte hieraus eine signifikante Reduktion der Expression von *Pet1* (Abb. 12, Seite 92). Dies weist darauf hin, dass Tgf- β nicht die *Pet1*-Expression induziert, jedoch möglicherweise an der Aufrechterhaltung der Expression von *Pet1* beteiligt ist. Des Weiteren lässt sich auf Basis dieser Ergebnisse spekulieren, dass die *in vivo* festgestellte, signifikante Reduktion der Anzahl rostraler 5-HT-Neurone in *Tgf- β 2* $-/-$ Mausmutanten des E12.5, eine von Tgf- β -abhängige Induktion der Entwicklung 5-HT-Neurone über eine Tgf- β -regulierte Aufrechterhaltung der *Pet1*-Expression erfolgt. Wenn das Kulturmodell der direkt, d. h. ohne vorherige Expansion der Vorläuferzellen, ausplattierten Primärzellen des ventralen Rhombencephalon der Maus (E12) als experimentelles System angewendet wurde, so zeigte sich nach Tgf- β -Gabe keine signifikante Änderung der *Pet1*-Expression im Vergleich zur unbehandelten Kontrolle (Abb. 14, Seite 95). Wurden die direkt ausplattierten Zellen mit SB431542 behandelt, so führte dies ebenfalls zu keiner Änderung der *Pet1*-Expression im Vergleich zum Expressionsniveau in unbehandelten Kontrolle (Abb. 14). Ähnlich den Ergebnissen zu *Gata2* weisen die Expressionsdaten des Markergens *Pet1* daraufhin, dass Induktion und Differenzierung von 5-HT-Neurone durch zwei unterschiedliche Wege reguliert werden könnten. Dies spiegelt deutlich die Komplexität der Regulation der Entwicklung 5-HT-Neurone wieder, ebenso zeigen die Ergebnisse deutlich,

wie vielfältig die Interaktion intrinsischer und extrinsischer Faktoren ist. Ob eine parallele und konvergierende oder eine nacheinanderfolgende Regulation der Gene *Gata2* und *Pet1* vorliegt, ist bisher noch nicht analysiert. Davon abgesehen unterstreichen die Ergebnisse in Zusammenhang mit den dargelegten *in vivo*-Daten, auch wenn der genaue Mechanismus noch nicht aufgedeckt wurde, die Bedeutung von Tgf- β für die Induktion 5-HT-Neurone.

Schließlich wurde die Expression von *Lmx1b* nach Tgf- β -Behandlung in primären Neurospheres untersucht. *Lmx1b* ist ein Transkriptionsfaktor, der als postmitotisch exprimiertes Markergen in 5-HT-Neuronen die Expression von weiteren Genen der postmitotischen Entwicklung 5-HT-Neurone reguliert. Mäuse defizient für *Lmx1b* besitzen keine zentralen 5-HT-Neurone und sterben perinatal (Ding et al., 2003). Der diesem Phänotyp zugrunde liegende Mechanismus ist jedoch nicht bekannt. Dies hebt die Relevanz dieses Transkriptionsfaktors für die Induktion von 5-HT-Neurone deutlich hervor. An dieser Stelle sei betont, dass *Lmx1b* nicht ausschließlich in 5-HT-Vorläuferzellen exprimiert wird, sondern auch in den ihnen ontogenetisch verwandten und sich rostral des IstO befindenden Progenitoren der mesencephalen DA-Neurone exprimiert wird. Dies könnte auf der Beteiligung von *Lmx1b* an der Ausbildung des IstO und damit der Expression von *Fgf8* basieren (Guo et al., 2007), welches für die Entwicklung beider Neuronenpopulationen notwendig ist. Unerwarteterweise führt die Behandlung der primären Neurospheres des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12) durch Tgf- β (Abb. 10, Seite 90) zu keiner Beeinflussung der Expression von *Lmx1b* in Bezug auf die unbehandelte Kontrolle. Die Behandlung primärer Neurospheres des ventralen Rhombencephalon (E12) durch Applikation des funktionsblockierenden Antikörper α -Tgf- β 1/2/3 (Abb. 10) hingegen zeigte eine nahezu vollständige Ausschaltung der Expression von *Lmx1b* auf transkriptioneller Ebene im Vergleich zur unbehandelten Kontrolle. Dies könnte eine duale Funktion von Tgf- β s in der Regulation des Gleichgewichtes von Proliferation und Differenzierung neuraler Vorläuferzellen widerspiegeln. So könnte Tgf- β zum einen durch negative Regulation der *Lmx1b*-Expression einen Eintritt der Vorläuferzellen in das Differenzierungsstadium begünstigen. Zum anderen könnte eine durch Tgf- β -vermittelte Aufrechterhaltung der *Lmx1b*-Expression in Vorläuferzellen Lmx1b-abhängige Mechanismen der Signaltransduktion positiv regulieren.

Nachdem mit Tgf- β der Einfluss eines extrinsischen Faktor auf die Entwicklung von 5-HT-Neuronen untersucht worden war, war es ein weiteres Ziel der Arbeit, die potentielle Rolle des intrinsischen Faktors Sim1 („*Single-minded homolog 1*“) für Differenzierung und Aufrechterhaltung 5-HT-Neurone des ZNS zu untersuchen. Der Transkriptionsfaktor Sim1 wurde aus mehreren Gründen als Komponente des regulatorischen Netzwerkes der Entwicklung 5-HT-Neurone in Betracht gezogen. Sim spielt eine Hauptrolle in der Bildung der Mittellinie in *D. melanogaster*. So haben Untersuchungen an transgenen *D. melanogaster*

gezeigt, dass *sim* notwendig und ausreichend für die Differenzierung der Mittellinie des ZNS innerhalb der ventralen neurogenen Zone von *D. melanogaster* ist (Nambu et al., 1991). Das *sim*-Protein wirkt vermutlich über seine bHLH-(„Basic helix-loop-helix“)-Domäne als Transkriptionsaktivator (Nambu et al., 1991). Im Allgemeinen sind bHLH-Transkriptionsfaktoren u. a. für ihre Bedeutung in der Determinierung des Zellschicksals und ihre Rolle in Proliferations- und Differenzierungsprozessen während der embryonalen Entwicklung bekannt. Die Mittellinie ist das wichtigste Organisationszentrum für die Ausbildung der D-V-Achse in *D. melanogaster* und steuert die Entwicklung unterschiedlicher Neuronenpopulationen (Nambu et al., 1993; Lee et al., 1999; Tear, 1999). Konsequenterweise sterben *sim*-defiziente *D. melanogaster* und bilden keine Mittellinie aus. In der Maus wurden bisher zwei Homologe des *sim*-Gens aus *D. melanogaster* identifiziert, *Sim1* und *Sim2*. Diese weisen nur zum Teil ein überlappendes Expressionsmuster auf. *Sim1* wird im Gegensatz zu *Sim2* direkt lateral zur Mittellinie des Diencephalon und des Rückenmarks sowie in weiteren Bereichen des ZNS, wie auch dem Rhombencephalon und in der sich entwickelnden Niere exprimiert (Goshu et al., 2002). Sowohl *Sim1*- als auch *Sim2*-defiziente Mäuse sterben perinatal. *Sim2*-defiziente Mausmutanten sterben aufgrund von Lungenatelektase und folglich einer Aussetzung der Atmung. Hier von grundlegend verschieden äußert sich der Phänotyp von *Sim1*-Mausmutanten. Auch diese Mutanten sterben perinatal, jedoch aufgrund von Entwicklungsdefekten des hypothalamischen Nucleus paraventricularis anterior (aPV), des Nucleus paraventricularis (PVN) sowie des Nucleus supraopticus (SO) (Michaud et al., 1998). Der Hypothalamus stellt eine Gehirnregion dar, welche eine Vielfalt von neurosekretorischen Populationen beinhaltet, die einen unterschiedlichen Entwicklungshintergrund besitzen. Ein weiterer Grund die Rolle von *Sim1* näher zu untersuchen war, dass die in der Arbeit von Liu et al. (2003) dargelegten potentiellen Zielgene von *Sim1* auch für Faktoren kodieren, welche in der Regulation der Entwicklung von 5-HT-Neuronen wichtige regulatorische Funktionen innehaben. Diese Zielgene wurden durch cDNA-Mikroarray-Analysen der Genexpression von *Sim1*-überexprimierenden *Neuro2a*-Zellen, als artifizielles System im Vergleich zu nicht-transfizierten Zellen ermittelt (Liu et al., 2003). Zu diesen möglichen Zielgenen gehört auch *Gdnf*. *Gdnf*, ein Mitglied der Tgf- β -Superfamilie ist ein etablierter Faktor des Überlebens mesencephaler dopaminerger Neurone *in vitro* und *in vivo* (Krieglstein 2004; Yang et al., 2008). Des Weiteren wurde in dieser Studie *Gata2*, ein an der Entwicklung 5-HT-Neuronen beteiligter bHLH-Transkriptionsfaktor, ebenfalls als Zielgen von *Sim1* identifiziert. Für die in dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen einer möglichen biologischen Bedeutung von *Sim1* für die Entwicklung serotonerger Neurone als Vertreter ventraler Neuronenpopulationen, wurden *Sim1*-defiziente Mäuse im Vergleich zu *wt*-Mäusen des gleichen Wurfs in Bezug auf die Anzahl 5-HT-immunpositiver Neurone untersucht. Zwei

Stadien wurden hierzu herangezogen. Zum einen Embryonen des Stadiums E14.5, um die frühe Differenzierung von 5-HT-Neuronen zu analysieren. Zum anderen wurden neugeborene Mausmutanten (P0) untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass die Anzahl der 5-HT-Neurone zum Zeitpunkt E14.5 im Vergleich zum *wt* nicht signifikant verändert ist (Abb. 17, Seite 99). Dies deutet darauf hin, dass *Sim1* nicht in die frühe Differenzierung von 5-HT-Neuronen involviert ist. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass zu diesem frühen Zeitpunkt eine Unterscheidung der einzelnen 5-HT-Kerngebiete nicht möglich ist. Ähnliche Ergebnisse bezogen auf die Gesamtzahl 5-HT-Neurone wurden zum Zeitpunkt P0 ermittelt (Abb. 18, Seite 100). Vergleicht man jedoch die Anzahl 5-HT-Neurone in den einzelnen Nuclei raphes (B1-B9) von *Sim1*-defizienten Mäusen im Vergleich zu *wt*-Mäusen, so stellte sich heraus, dass die Anzahl der 5-HT-Neurone im NRD (B6/B7) um circa 30% und damit signifikant reduziert war. Dies deutet darauf hin, dass *Sim1* einen selektiven Einfluss auf die Entwicklung einer Subpopulation von 5-HT-Neuronen ausübt. Gleichzeitig weist dieses Ergebnis darauf hin, dass die unterschiedlichen 5-HT-Neuronenpopulationen möglicherweise unterschiedlichen regulatorischen Prozessen in ihrer Entwicklung unterliegen und unterschiedliche Abhängigkeit von einem intrinsischen Faktor, *Sim1*, aufweisen. In der Tat spiegelt sich die Heterogenität des 5-HT-Systems u.a. in der Existenz von neun unterscheidbaren Nuclei raphes (B1-B9) wieder, welche sich gemäß ihrer Lokalisation entlang der A-P-Achse in eine kaudale und eine rostrale Gruppe zusammenfassen lassen (Hornung, 2003). Neben ihrer Lokalisation unterscheiden sich die Kerne auch in den Projektionsgebieten, welche sie innervieren (Rubenstein, 1998, Westlund et al., 1991). Auch hinsichtlich einer Einflussnahme von extrinsischen Faktoren wie Tgf- β zeigen sich Unterschiede zwischen den einzelnen 5-HT-Neuronengruppen. So führt eine externe Tgf- β 1, 2 oder 3 Gabe zu einer gesteigerten Anzahl rostraler 5-HT-Neurone um den E12 und E13 der Ratte, während die kaudale 5-HT-Neuronenpopulation zunächst nicht beeinflusst wird (Galter et al., 1999). Die Heterogenität beschränkt sich nicht allein auf die Lokalisation oder divergierende Abhängigkeit der Entwicklung und Aufrechterhaltung der einzelnen Kerngebiete von intrinsischen und extrinsischen Faktoren, sondern umfasst auch die zelluläre Morphologie und Funktionsfähigkeit der Neurone. So konnte gezeigt werden, dass 5-HT-Neurone des NRD und des Nucleus raphe magnus (NRM) deutlich bezüglich ihrer synaptischen Morphologie und ihren elektrophysiologischen Eigenschaften voneinander abweichen (Kosofsky und Molliver, 1987; Trulsson und Frederickson, 1987). Selbst innerhalb eines Kerns sind unterschiedliche Subpopulationen zu bestimmen, wie z.B. im NRD. Dem NRD kommt als Abkömmling des R1 eine gesonderte Stellung innerhalb der rostralen 5-HT-Neuronenpopulation zu. U. a. gehen von diesem Kern aufsteigende Projektionen zur Amygdala und dem Hypothalamus als Komponenten des limbischen Systems aus.

Um die möglichen molekularen Mechanismen, auf welche sich die Reduktion von 5-HT-Neuronen des NRD von *Sim1*-defizienten Mausmutanten um P0 zurückführen lassen könnten, aufzuklären, wurde ein *in vitro*-Zellsystem eingesetzt. Dies war notwendig, da Primärzellen des ventralen rostralen Rhombencephalon E12 sich nicht zur Durchführung von "Gain-of-function"-Experimenten aufgrund einer nur minimalen Transfektionseffizienz eignen. Es kamen daher *MN9D*-Zellen aus fusionierten Neuroblastoma und embryonalen mesencephalen Zellen zum Einsatz (Choi et al., 1991 und 1992), die unterschiedliche Differenzierungszustände der Zellen innerhalb der gleichen Kultur aufweisen. *MN9D*-Zellen gelten als Modellsystem zur Untersuchung der Entwicklung mesencephaler DA-Neurone und exprimieren die etablierten DA-Markergene ohne jedoch die elektrophysiologischen Eigenschaften vollkommen differenzierter DA-Neurone aufzuweisen (Rick et al., 2006). *MN9D*-Zellen eignen sich, wie in dieser Arbeit gezeigt werden konnte, bedingt durch die Expression von 5-HT-Markergenen (*Gata2*, *Pet1*, *Tph2*) auch als Modellsystem für 5-HT-Neuronen (Abb. 19, Seite 101). Darüber hinaus macht eine gute Transfizierbarkeit diese Zelllinie zu einem idealen Modellsystem für „Gain“- und „Loss-of-function“-Experimente. So kann eine Überexpression von *Nurr1* in *MN9D*-Zellen eine Differenzierung hin zum Phänotyp DA-Neurone induzieren und hierdurch die Zahl TH-immunreaktiver Zellen signifikant gesteigert werden (Castro et al., 2001). Die Differenzierung von *MN9D*-Zellen lässt sich des Weiteren durch Gdnf einleiten, was bedeutet, dass diese Zellen theoretisch auch für eine Behandlung durch extrinsische Faktoren nutzbar sind (Heller et al., 1996).

Um potentielle Zielgenen von *Sim1* unter den Genen, die bekannter Weise in die Entwicklung von 5-HT-Neuronen involviert sind, im Rahmen dieser Arbeit zu identifizieren, wurden klassische „Gain-of-function“-Experimente durchgeführt. Hierzu wurden *MN9D*-Zellen mit dem Überexpressionsplasmid *pcDNA3::Sim1* transfiziert und die Änderung der Genexpression im Vergleich zu mit *pcDNA3*-transfizierten Zellen mittels qRT-PCR in einem Zeitraum von 72 h nach erfolgter Transfektion ermittelt. Die Effizienz der Überexpression wurde zuvor durch PCR und Western-Blot (Abb. 20 und 21, Seite 102 und 103) überprüft.

Im Fokus der Untersuchungen stand zunächst der Einfluss von *Sim1* auf die Expression bekannter Gene, die bereits als Mitglieder des transkriptionellen Netzwerkes der Entwicklung von 5-HT-Neuronen identifiziert worden waren. Hierdurch sollte eine Positionierung von *Sim1* innerhalb dieses Netzwerkes ermöglicht werden. Eine Überexpression von *Sim1* in *MN9D*-Zellen hatte in einem Zeitraum von 24 h bis 72 h nach der Transfektion keinen Einfluss auf die Expression des proneuralen Gens *Mash1* (Abb. 22, Seite 104). *Mash1* ist wie *Sim1* ein bHLH-Transkriptionsfaktor, der in 5-HT-Vorläuferzellen des ventralen Rhombencephalon als auch in anderen Neuronenvorläuferzellen, teilweise kolokalisiert mit *Nkx2.2*, exprimiert wird (Pattyn et al., 2004). Dennoch konnte gezeigt werden, dass *Mash1* eine spezielle und essentielle Funktion für die Entwicklung von 5-HT-Neuronen zukommt. Als Gene, die einer

Mash1-Expression nachgeschaltet sind, konnten *Gata2*, *Lmx1b* und *Pet1* bestimmt werden, somit gilt Mash1 als determinierender Faktor der zellulären Festlegung auf den Entwicklungsweg zu 5-HT-Neuronen. *Mash1*-defizienten Mausmutanten weisen einen nahezu vollständigen Verlust zentraler 5-HT-Neurone auf. Nur wenige 5-HT-Neurone lassen sich in der MHB („Midbrain-hindbrain-boundary“) nachweisen (Pattyn et al., 2004). Das Sim1 *in vitro* keinen Einfluss auf die Expression von *Mash1* besitzt, lässt die Vermutung zu, dass Sim1 neurale Progenitoren während der frühesten Entwicklungsphase nicht beeinflusst.

Eine maßgebliche Funktion in der Regulation des Überganges von mitotischer zur postmitotischen Entwicklungsphase serotonerger Vorläuferzellen des rostralen Rhombencephalon kommt dem Zink-Finger-Transkriptionsfaktor Gata2 zu. Gata2 wird durch Nkx2.2 und Nkx6.1 in Shh-abhängiger Weise induziert. *Gata2*-defiziente Mäuse sterben in frühen Embryonalstadien (E9.5-10.5) und weisen interessanterweise keine Abkömmlinge des R1 auf (Carven et al., 2004). Abkömmlinge des R1 sind die 5-HT-Neurone des NRD, welche die ersten sich entwickelnden 5-HT-Neurone darstellen. Somit zeigen *Sim1*-defiziente Mäuse und *Gata2*-Mausmutanten einen ähnlichen Phänotyp hinsichtlich der Anzahl 5-HT-Neurone einer Subpopulation, dem NRD. Während in anderen Bereichen der Bildung zentraler 5-HT-Neurone die Expression von Gata2 notwendig ist, um die Expression der Transkriptionsfaktoren Lmx1b und Pet1 anzuschalten, ist Gata2 im ventralen R1 sogar ausreichend, um dort 5-HT-Neurone zu induzieren (Craven et al., 2004). Auch hier zeigt sich die zuvor angesprochene Variabilität der Entwicklungswege einzelner Subpopulationen, welche zum 5-HT-Neurotransmitterphänotyp führen. Ein weiterer Hinweis auf eine Regulation von *Gata2* durch Sim1 kam durch Genexpressionsanalysen mittels cDNA-Mikroarray durch Liu et al. (2003) auf. *Neuro2a*-Zellen zeigten nach Überexpression von Sim1 und Arnt eine signifikante Steigerung der *Gata2*-Expression. Eine solche Steigerung der Expression konnte durch eine in dieser Arbeit durchgeführte Überexpression von Sim1 in *MN9D*-Zellen zu keinem Zeitpunkt innerhalb einer Dauer von 72 h nach Beginn der Transfektion gezeigt werden (Abb. 23, Seite 105). Zieht man in Betracht, dass sowohl Sim1 als auch Gata2 ihre Bedeutung für die Entwicklung 5-HT-Neurone in einer Subpopulation manifestieren, so kann spekuliert werden, dass sich eine Sim1-gesteuerte Regulation von *Gata2* nur in bestimmten Zellen, d. h. zelltyp-abhängig, verläuft. Das verwendete Kultursystem der *MN9D*-Zellen spiegelt jedoch ein heterogenes Kulturmodell aller 5-HT-Subpopulation und ihrer Vorläuferzellen wider und ermöglicht nur allen Subpopulationen gemeinsame Mechanismen zu untersuchen. Weiterhin legen die dargelegten Daten nahe, dass Sim1 in Bezug auf Vorläufer aller Subpopulationen 5-HT-Neurone keinen Einfluss auf die frühe Entwicklung dieser Neurone über eine Regulation von Gata2 besitzt. Wäre dies der Fall, so müsste sich ein Verlust von *Sim1* und in seiner Folge ein Verlust der Gata2-Expression bereits im Embryonalstadium E14.5 in *Sim1*-defizienten Mäusen als eine

Reduktion der Anzahl 5-HT-Neurone bemerkbar machen. Ein Verlust von 5-HT-Neuronen lässt sich jedoch erst spät, um P0 im NRD feststellen.

Ganz anders ist jedoch die Situation im Hinblick auf eine Sim1-abhängige Regulation von Genen, die eine terminale Differenzierung von 5-HT-Vorläuferzellen steuern. Hierzu zählt *Pet1* als einziger 5-HT-spezifischer Transkriptionsfaktor der ETS-Familie. *Pet1*-defiziente Mausmutanten weisen eine Reduktion der Gesamtzahl der 5-HT-Neurone um bis zu 70% auf (Hendrickson et al., 1999 und 2003). Es entwickeln sich zwar 5-HT-Neurone, welche jedoch nicht den vollständigen, terminalen Differenzierungszustand erreichen. Somit könnte es sein, dass diese 5-HT-Neurone zunächst einem von *Pet1*-unabhängigen Entwicklungsweg folgen und eine *Pet1*-Expression nur während der terminalen Differenzierung erforderlich ist, um die nachgeschalteten, den 5-HT-Phänotyp determinierenden Gene *Aadc*, *Sert*, *Vmat* und *Tph2* zu induzieren. Wurde in dieser Arbeit Sim1 in *MN9D*-Zellen überexprimiert, so führte dies 48 h und 72 h nach erfolgter Transfektion der Zellen zu einer signifikanten Steigerung der *Pet1*-Expression im Vergleich zu nicht transfizierten Zellen (Abb. 24, Seite 106). Der Vermutung, dass eine *Pet1*-Expression durch Sim1 induziert wird, wurde anschließend durch „Loss-of-function“-Experimente nachgegangen. Hierzu wurden *MN9D*-Zellen durch Sim1-spezifische siRNA transfiziert und ihre Genexpression mit Zellen, welche zur Kontrolle mit einer nicht zu Genen der Säuger komplementären Ctr-siRNA transfiziert worden waren, verglichen. Dabei zeigte sich, dass 24 h nach der Transfektion eine Herabregulation der Expression von Sim1 in *MN9D*-Zellen in einer signifikanten Minderung der *Pet1*-Expression resultierte (Abb. 28, 111). Die Tatsache dass durch „Loss-of-function“-Experimente eine Sim1-induzierte Heraufregulation von *Pet1* umgekehrt werden konnte, weist *Pet1* als Zielgen von Sim1 aus. Damit lässt sich Sim1 eine erste Position innerhalb des transkriptionellen Netzwerkes der Regulation der Entwicklung 5-HT-Neurone zuweisen.

Einen weiteren Hinweis, dass Sim1 für die postmitotische Entwicklungsstufe 5-HT-Neurone und insbesondere der terminalen Differenzierung ist, erhielten wir im Rahmen dieser Arbeit durch Analyse der Auswirkung einer gesteigerten Sim1-Expression in *MN9D*-Zellen auf die Regulation der Expression des *Tph2*-Gens. *Tph2* ist eine spezifisch im ZNS exprimierte Isoform der Tryptophanhydroxylase (Nakamura, K. und Hasegawa, 2007). Es stellt das limitierende Enzym der 5-HT-Synthese dar und definiert somit den terminalen Differenzierungszustand des 5-HT-Phänotyps (Zhang et al., 2006). 24 h und 48 h nach Transfektion der *MN9D*-Zellen durch das Überexpressionsplasmid *pcDNA3::Sim1*, zeigten diese im Vergleich zur durch *pcDNA3*-transfizierten Kontrollgruppe eine signifikante Steigerung der *Tph2*-Expression (Abb. 25, Seite 107). Aus diesen Daten geht hervor, dass Sim1 zum einen direkt auf das Gen *Tph2* wirken und hierdurch positiv regulieren könnte. Denkbar wäre zum anderen aber auch, dass Sim1 das Gen *Tph2* indirekt über die zuvor beschriebene Induktion von *Pet1* reguliert. Neben den Nuclei raphe findet sich eine

Expression des *Tph2*-Gens im Cortex, dem Thalamus, dem Hypothalamus, der Amygdala und dem Cerebellum (Zill et al., 2007). Wie bereits erwähnt, nimmt das zentrale 5-HT-System über seine Projektionen Einfluss auf die Entwicklung seiner Zielregionen. Man könnte spekulieren, dass der NRD über seine Projektionen über die Amygdala in den Hypothalamus an der Entwicklung des Hypothalamus beteiligt ist. Fehlt *Sim1* in Mausmutanten, so führt dies zur Verminderung der Anzahl 5-HT-Neurone des NRD, ggf. aufgrund einer nicht erfolgten *Pet1*- oder *Tph2*-Induktion in diesen Zelltypen. Eine *Sim1*-Deletion führt schließlich in Mäusen zu einem Verlust neurosekretorischer Zellen des SON sowie PVN, was den perinatal eintretenden Tod der Mutanten zur Folge hat. Ob dies auf einen fehlenden regulatorischen Einfluss einer *Sim1*-abhängigen Subpopulation des NRD zurückzuführen ist, muss jedoch erst durch weiterführende Experimente geklärt werden. Zusammengefasst führen die aus diesem Teil der vorliegenden Arbeit resultierenden Ergebnisse zu einer Positionierung von *Sim1* in der späten Determinierung des 5-HT-Phänotyps unter besonderer Berücksichtigung der Bedeutung des Transkriptionsfaktors *Sim1* für eine Subpopulation 5-HT-Neurone des NRD. Dennoch bleiben viele Fragen zum vollständigen Verständnis der Induktion und Spezifikation 5-HT-Neurone weiterhin unbeantwortet.

Ein weiteres Ziel der Arbeit war es somit bisher unbekannte Gene zu identifizieren, die an der Induktion und Spezifikation von rostralen 5-HT-Neuronen des Rhombencephalon beteiligt sein könnten. Hierdurch sollte eine Ergänzung fehlender Elemente innerhalb des transkriptionellen, regulatorischen Netzwerkes, welches die Entwicklung rostraler 5-HT-Neurone steuert, erreicht werden. Obwohl Vorläuferzellen 5-HT- und DA-Neurone in naher ontogenetischer Verwandtschaft zueinander stehen und zum Teil die gleiche Abhängigkeit von signalgebenden Molekülen des umgebenden Gewebes während ihrer Entwicklung besitzen, ist dieses Netzwerk aus intrinsischen und extrinsischen Faktoren bis heute nur unzureichend entschlüsselt. Entscheidende signalgebende Zentren der näheren Umgebung sind zum einen der IstO, die Grenze zwischen Mesencephalon und Rhombencephalon, welcher für die Freisetzung des Signalmoleküls *Fgf8* verantwortlich ist (Nakamura und Watanabe, 2005). Ein weiteres Signalzentrum stellt zum anderen die Grundplatte dar, von der aus sich ein nach dorsal schwächer werdender Gradient des Signalmoleküls *Shh* ausbildet. *Shh* wirkt als generell ventralisierender Faktor (Echelard et al., 1993). Sowohl 5-HT- als auch DA-Neurone sind als ventrale Populationen daher von *Shh* in ihrer Entwicklung abhängig. Eine vergleichbare Abhängigkeit der Zellen von einem Faktor gilt auch für *Fgf8*, welches im IstO synthetisiert und von diesem abgegeben wird (Ye et al., 1998). *Fgf8* ist maßgeblich an der Ausbildung und Aufrechterhaltung dieses Signalzentrums, dem IstO, beteiligt (Martinez et al., 1999). Direkt rostral des Isthmus liegen die Vorläuferzellen mesencephaler DA-Neurone. Hingegen sind Vorläufer der serotonergen

Neurone des Rhombencephalon wiederum direkt kaudal des Isthmus lokalisiert und zeigen eine mit größerer Entfernung zum IstO abnehmende Abhängigkeit von Fgf8. So zeigen serotonerge Abkömmlinge des R1 eine die am stärksten ausgeprägte Abhängigkeit von diesem Signalmolekül unter den verschiedenen 5-HT-Neuronenpopulationen (Teraoka et al., 2004; Walshe et al., 2002).

Wie bereits zuvor diskutiert ist Tgf- β sowohl für die Entwicklung und Differenzierung DA-Neurone als auch der ihnen verwandten 5-HT-Neurone notwendig (Roussa und Krieglstein, 2004; Roussa et al., 2006). Die ontogenetische Verwandtschaft spiegelt sich auch in der Expression verschiedener Transkriptionsfaktoren wieder, die sowohl in Vorläuferzellen als auch in postmitotischen Entwicklungsstufen dieser beiden 5-HT- und DA-Neuronenpopulationen exprimiert werden. Zu nennen sind hierbei die Transkriptionsfaktoren Mash1 und Lmx1b (Pattyn et al., 2004). Lmx1b wird in beiden Vorläuferpopulationen exprimiert. So ist in 5-HT-Vorläufer eine Expression von Lmx1b nach Eintritt in die postmitotische Entwicklungsphase detektierbar. In DA-Vorläuferzellen wird die Expression dieses Transkriptionsfaktors beginnend mit der mitotischen Entwicklungsphase bis zum Erreichen des terminalen Neurotransmitterphenotyps beibehalten. Gemeinsamkeiten von 5-HT- und DA-Neuronen in der Expression von intrinsischen Faktoren und Abhängigkeit extrinsischen Signalmolekülen führen zu der Frage, in welchen Signalen sich beide Neuronenpopulationen in ihrer Entwicklung unterscheiden. Zu einem entscheidenden Faktor gehört Fgf4, der – sezerniert von der Grundplatte – als ein Signal der vorausgehenden zellulären Prägung wirkt. Fgf4 ist notwendig für die Induktion 5-HT-Neurone jedoch nicht der mesencephaler DA-Neurone (Kim et al., 2002). Obwohl notwendig, reicht Fgf4 jedoch nicht aus, um 5-HT-Neurone ektopisch zu induzieren (Ye et al., 1998). Dies verdeutlicht, wie unzureichend bisher der molekulare Mechanismus der Entwicklung von 5-HT-Neurone aufgeklärt wurde. Wesentliche Mitspieler in diesem Prozess sind zweifellos Otx2 und Gbx2, welche als wichtigste Faktoren überhaupt die Festlegung des IstO durch gegenseitige Hemmung bestimmen und hierdurch die territoriale Zugehörigkeit der Vorläuferzellen maßgeblich bedingen (Garda et al., 2001). Eine Verschiebung des Expressionsgebietes von Otx2 nach kaudal in transgenen Mäusen, führt zu einer Reduktion der Anzahl 5-HT-Neurone, wohingegen die Anzahl DA-Neurone steigt. Dem entsprechend führt eine Ausdehnung der Gbx2-Expression nach rostral zu einem Anstieg der Zahl 5-HT-Neurone auf Kosten der Anzahl DA-Neurone (Brodsky et al., 2003)

Ein experimenteller Ansatz, um Unterschiede in den Genexpressionsmustern von Vorläufern DA- und 5-HT-Neurone zu ermitteln und hierdurch fehlende Elemente zu identifizieren, war die Durchführung eines cDNA-Mikroarrays. Diese Methode ermöglicht den Vergleich der Expression von vielen Genen in einem Schritt. Hierzu wird RNA aus den zu vergleichenden Geweben oder Zellen extrahiert und in der nachfolgenden cDNA-Synthese diese durch

unterschiedliche Fluoreszenzfarbstoffe markiert. Im Anschluss erfolgt die Hybridisierung jeder Probe auf einen Mikrochip. An diesen Träger sind an seiner Oberfläche in definierter Position synthetisch hergestellte spezifische Oligonukleotide gebunden. Nach der Hybridisierung und Entfernung der ungebundenen cDNA-Moleküle wird das Fluoreszenzsignal jeder Position auf dem Träger durch einen Laser ausgelesen. Der Vergleich der Signalstärke auf zwei zu vergleichenden Trägern wird schließlich bioinformatisch durchgeführt und hierbei die Signale normalisiert, um Artefakte, welche zu einer Fehlinterpretation der Daten führen würden, zu vermindern. Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein cDNA-Mikroarray durchgeführt, um das Genexpressionsmuster des ventralen Mesencephalon mit dem des rostralen ventralen Rhombencephalon der Maus (E11) zu vergleichen. Hierfür wurde der GeneChip® Mouse Genome 430A 2.0 Array von Affimetrix verwendet, der einen Vergleich von 22000 gut charakterisierten Genen der Maus erlaubt. Als Ausgangsproben wurden am Embryonaltag (E) 11 aus dem entsprechenden Gehirnbereich isolierte Gesamt-RNA-Proben eingesetzt, da zu diesem Zeitpunkt die Entwicklung serotonerger und DA-Neurone beginnt und nur vereinzelt, erste postmitotische 5-HT-Neurone feststellbar sind. Somit sollten zu diesem Zeitpunkt Gene identifizierbar sein, welche wesentlich zur Entwicklung von 5-HT-Neuronen im Gegensatz zu DA-Neuronen beitragen. Zur Normalisierung der Daten wurden die Signalwerte der „Housekeeping“-Gene *Gapdh*, *β-Aktin*, *Transferrin-Rezeptor* und *Pyrovalcarboxylase* verwendet.

Bevor eine Analyse der durch den cDNA-Mikroarray gewonnen Daten des ventralen Mesencephalon und des ventralen rostralen Rhombencephalon vorgenommen werden konnte, war es erforderlich, eine Kontamination der beiden benachbarten Gehirnbereiche miteinander ausschließen zu können. Eine Kontamination konnte aufgrund in der Abb. 30 (Seite 114) dargelegten Ergebnisse ausgeschlossen werden. So ist *Otx2*, als spezifischer Determinant des Mesencephalon nicht in der Probe des Rhombencephalon exprimiert. Ebenso konnte im Mesencephalon keine Expression des *Gbx2*-Gens als Determinant des Rhombencephalon nachgewiesen werden. Dass diese Daten verlässlich waren, zeigte der geringe *P*-Wert ($P < 0,05$). Um die kaudale Grenze des präparierten Gewebebereiches genauer bestimmen zu können, wurden die Expressionswerte der rhombomer-spezifisch exprimierten *Hox*-Gene genauer analysiert. (Hunt et al., 1991a; b; Marshall H., 1996). Die Daten zeigten, dass das eingesetzte Gewebe einen Bereich von direkt kaudal des Isthmus bis zum R6 umfasste. Des Weiteren wurden die gewonnenen Daten stichprobenartig auf ihre Richtigkeit durch qRT-PCR, als deutlich sensitivere Methode, validiert (Tab. 3, Seite 115). Die Ergebnisse zeigten, dass keine größeren Abweichung der Daten der qRT-PCR von denen des Mikroarray vorlagen. Somit waren die Expressionsdaten des cDNA-Mikroarray als zuverlässig einzustufen. Sofern Gene in die engere Auswahl als Kandidatengene, welche möglicherweise an der Regulation der Entwicklung von 5-HT-Neuronen beteiligt sind,

aufgenommen wurden, wurden die zugehörigen Expressionsdaten des Mikroarrays ebenfalls mittels qRT-PCR überprüft (siehe hierzu Abb. 32, Seite 119).

Aufgrund der hohen Datenmenge die durch den Genexpressionsvergleich gewonnen wurden, war es notwendig die Auswahl der zu analysierenden Gene zu limitieren. So wurden zunächst nur Gene berücksichtigt, die im ventralen Rhombencephalon eine um das 2,5fach höhere Expression im Vergleich zum ventralen Mesencephalon aufwiesen. Gene die durch eine Herabregulation im Rhombencephalon eine ebenso wichtige Funktion in der Entwicklung 5-HT-Neurone besitzen könnten, wurden aufgrund der Datenmenge an dieser Stelle vom weiteren Auswahlverfahren ausgeschlossen. Die Gruppe der 300 am stärksten exprimierten Gene im ventralen Rhombencephalon im Vergleich zum ventralen Mesencephalon der Maus (E11) umfasste sowohl für Transkriptionsfaktoren als auch für Strukturproteine der EZM, Signalmoleküle, Enzyme, Regulatorproteine bis hin zu für Ionenkanäle kodierende Gene, so z. B. *Ceacam11*, *Cyp26b1*, *Barx1*, *Rab25* oder *Kcnq5*. Eine zusätzliche Eingrenzung der Gruppe interessanter Gene wurde gemäß einer nachgewiesenen Beteiligung der Gene an entwicklungsbiologischen Prozessen, einer Involvierung an der Steuerung der Zellmigration, oder eine bereits nachgewiesene Beteiligung an der Differenzierung von neuronalen Vorläuferzellen vorgenommen (Abb. 31, Seite 117). Im Rahmen dieser Arbeit, die sich insbesondere mit der Bedeutung von Tgf- β und des Transkriptionsfaktors Sim1 für die Induktion und Spezifikation 5-HT-Neurone beschäftigte, wurde ein möglicher Bezug der Gene zu Tgf- β und/oder mit Sim1 als weitere Parameter der Selektion gewählt. In die engere Auswahl kamen schließlich drei Gene, *Brn3.2*, *Lhx8* und *Rgs4*, auf die im folgenden näher eingegangen werden soll.

Lhx8 wurde ausgewählt, weil dieser Transkriptionsfaktor nachweislich an der Spezifikation und Differenzierung unterschiedlicher Zelltypen während der embryonalen Entwicklung beteiligt ist. So konnte z.B. in *Lhx8*-defizienten Mäusen eine signifikante Reduktion der Anzahl cholinergischer Neurone des Telencephalon festgestellt werden (Zhao et al., 2003). Die Möglichkeit einer ektopischen Induzierung der *Lhx8*-Expression durch Tgf- β 3 zusammen mit Fgf8 deutet auf eine denkbare Involvierung von Lhx8 über eine Tgf- β -induzierte Regulationskaskade in die Entwicklung 5-HT-Neurone hin (Inoue et al., 2006). Darüber hinaus wurde *Lhx8* in Sim1- sowie Arnt-überexprimierenden *Neuro2a*-Zellen durch cDNA-Mikroarray-Analyse der Genexpression als potentiell Zielgen von Sim1 identifiziert (Liu et al., 2003).

Ebenfalls zur Gruppe der ausgewählten Transkriptionsfaktoren, gehört das für *Brn3.2*, auch *Pou4f2* genannt, kodierende Gen. Bisher konnte dem Transkriptionsfaktor *Brn3.2* eine Bedeutung in der Regulation der Differenzierung der retinalen Ganglionzellen und der Haarzellen des auditiven Systems zugeordnet werden (DeCarvalho et al., 2004). Aufgrund seiner selektiven Expression in postmitotischen Neuronen scheint sich hierbei seine Funktion

auf die Spezifikation des terminalen neuronalen Phänotyps zu beschränken. Ein weiterer Vertreter der Brn-Familie ist Brn2, welches mehrere für die vorliegende Arbeit interessante Eigenschaften aufweist. Wie Mash1 interagiert Brn2 mit der Promotorregion des Notch-Liganden Delta1, wodurch das *Delta1*-Gen positiv reguliert wird. Somit ist Brn2 ein wichtiger Regulator der Neurogenese (Castro et al., 2006). *In vivo*-Untersuchungen durch Michaud et al. (1998) haben gezeigt, dass Brn2 einer Expression von Sim1 nachgeschaltet und wie dieses während der Entwicklung im anterioren Hypothalamus lokalisiert ist. Man geht davon aus, dass Sim1 für die Aufrechterhaltung der Brn2-Expression notwendig ist, die wiederum die terminale Differenzierung neurosekretorischer Zellen des SON und PVN steuert (Acampora et al., 1999). *Sim1*-defiziente Mäuse zeigen insbesondere in neuroendokrinen Zellen einen Verlust der Brn2-Expression. *Brn2*-defiziente Mausmutanten wiederum besitzen wie *Sim1*-Mutanten einen Defekt in hypothalamischen sekretorischen Neuronen. Ein Verknüpfungspunkt von Transkriptionsfaktoren der Brn-Familie und der Entwicklung der zentralen 5-HT-Neurone ergibt sich aus der Tatsache, dass Brn2 in der dorsalen Raphe des adulten Gehirns der Ratte exprimiert wird und dort mit Tph2 kolokalisiert. Die Tatsache, dass Brn2 in der Lage ist, die Expression von Tph2 über die Bindung des Promotors des *Tph2*-Gens zu beeinflussen, macht die Brn-Proteinfamilie zu geeigneten Kandidaten als Regulatoren der Entwicklung 5-HT-Neurone (Scheuch et al., 2007). Aufgrund der Vermutung, dass *Brn3.2* ein weiteres Zielgen von Sim1 sein könnte, wurden „*Gain-of-function*“-Experimente durchgeführt, um dies zu überprüfen. Hierzu wurde Sim1 in *MN9D*-Zellen überexprimiert und über einen Zeitraum von 72 h der Einfluss von Sim1 auf die Expression von *Brn3.2* im Vergleich zu nicht Sim1-überexprimierenden Zellen mittels qRT-PCR bestimmt. Eine Überexpression von Sim1 führt zu einer deutlichen, signifikanten Steigerung der *Brn3.2*-Expression 48 h nach erfolgter Transfektion (Abb.34, Seite 122). Somit wurde Brn3.2 im Rahmen dieser Arbeit erstmals als ein mögliches Element des regulatorischen Netzwerkes, welches die Entwicklung serotonerger Neurone beschreibt. Zudem war es möglich *Brn3.2* innerhalb dieses Netzwerkes, als mögliches Zielgen von Sim1 zu positionieren. Da Sim1 nach Überexpression auch die Expression von *Tph2* positiv reguliert (Abb. 25, Seite 107) und Tph2 wiederum durch Brn2 nachweislich reguliert wird, kann vermutet werden, dass Sim1 über Brn3.2 als auch Brn2 auf die Entwicklung von 5-HT-Neuronen Einfluss nehmen könnte. Diese Vermutung soll daher durch weitere Experimente, wie „*Loss-of-function*“-Experimente und Untersuchungen von *Brn3.2*-defizienten Mäusen untermauert werden. In zukünftigen Forschungsprojekten soll durch Brn3.2-Überexpression und durch Blockierung der Translation der *Brn3.2*-mRNA durch spezifische siRNA Experimente die Bedeutung dieses Transkriptionsfaktors für die Entstehung von 5-HT-Neuronen aufgeklärt werden. Insgesamt ergeben sich drei mögliche Funktionswege, über die Sim1 das *Tph2*-Gen, und damit die terminale Differenzierung von 5-HT-Neuronen regulieren

könnte. Zum einen eine direkte Regulation des *Tph2*-Gens (Abb. 25, Seite 107), zweitens eine indirekte Regulation von *Tph2*, welche durch eine *Sim1*-abhängige Regulation der Transkription von *Pet1* vermittelt wird (Abb. 24, Seite 106) und schließlich eine Regulation über das Gen *Brn2*. Diese Wege könnten parallel zueinander oder nacheinandergeschaltet verlaufen sowie eine Abhängigkeit vom jeweiligen Zelltyp aufweisen. Bedenkt man, dass 5-HT-Neurone die Entwicklung von Zielregionen des Gehirns regulieren, so könnte hierdurch der Verlust des SON und PVN in *Sim1*-defizienten Mausmutanten (P0), welcher zur perinatalen Letalität der Mutanten führt, erklärt werden. So ist es vorstellbar, dass durch Verlust des *Sim1*-Gens einer der drei zuvor beschriebenen Regulationsmechanismen unbrochen wird, woraus eine Reduktion der Anzahl 5-HT-Neurone des NRD resultiert. Der NRD wiederum projiziert über die Amygdala in den Hypothalamus. Ist eine 5-HT-Subpopulation des NRD reduziert, wie dies in *Sim1*-defizienten Mutanten der Fall ist, so könnte dies wiederum über fehlende Projektionen dieser Neurone in den Hypothalamus dessen Entwicklung, insbesondere der neurosekretorischen Kerne, gravierend beeinträchtigen.

Rgs4 wurde als weiteres, dem ersten Anschein nach ungewöhnliches Kandidatengen ausgewählt. Für dieser Entscheidung waren mehrere Gründe ausschlaggebend. Das *Rgs4*-Protein lässt sich ausschließlich im ZNS nachweisen und ist in seiner Expression zeitlich und räumlich genau festgelegt (Gold et al., 1997). Neben einer deutlich erhöhten Expression in der medianen und paramedianen Raphe der Maus (P0) ist auch eine Überlappung der Expression von *Rgs4* mit dem Expressionsmuster von *Sim1* nachweisbar. Für eine mögliche Regulation der Expression von *Rgs4* durch *Sim1* spricht auch die Beobachtung, dass in *Sim1*-defizienten Mausmutanten die Expression von *Rgs4* im Hypothalamus reduziert ist (Caqueret et al., 2006). Eine Reduktion der Expression von *Rgs4* konnte des Weiteren post mortem bei Schizophrenie-Patienten im Gyrus temporalis superior nachgewiesen werden (Bowden et al., 2007). Ein Befund, der ebenfalls eine Bedeutung von *Rgs4* für das zentrale 5-HT-System unterstreicht. Als Regulator der Funktion G-Protein-gekoppelter Rezeptoren verschiedener Neurotransmitter besteht eine mögliche, direkte Beziehung zur Funktion des 5-HT-Systems, welches ebenfalls über G-Protein-gekoppelte Rezeptoren, wie z. B. dem somatodendritischen Rezeptor 5-HTR1a, der über einen negativen Rückkopplungsmechanismus die Freisetzung von Serotonin kontrolliert, im ZNS gesteuert wird. Eine Regulation des 5-HTR1a-Autorezeptors des NRD durch *Rgs4* konnte in der Tat bereits gezeigt werden (Beyer et al., 2004). Ergebnisse und Literaturhinweise können so interpretiert werden, dass *Sim1* über eine funktionelle Verknüpfung via die Expressionsregulation von *Rgs4* in die Steuerung der Freisetzung von Serotonin in die Entwicklung und Aufrechterhaltung der dorsalen Raphe eingreift. Damit hat *Sim1* über *Rgs4* indirekt einen regulatorischen Einfluss auf 5-HT-Neurone sowie auf die Entwicklung von

Zielregionen der 5-HT-Neurone, wie dem Hypothalamus. Aufgrund der beschriebenen Befunde wurde die Hypothese einer Regulierung der Expression von *Rgs4* durch *Sim1* in dem in dieser Arbeit angewendeten „*Gain-of-function*“-Modell überprüft. Wie die Ergebnisse zeigen, führt eine *Sim1*-Überexpression zu einer signifikanten Heraufregulation von *Rgs4* nach 24 h (Abb. 33, Seite 121). Somit konnte mit *Rgs4* eine weitere Komponente des *Sim1*-nachgeschalteten Netzwerkes identifiziert werden. Eine direkte Beteiligung von *Rgs4* an dem regulatorischen Netzwerk der Entwicklung serotonerger Neurone konnte nicht durch die bisher durchgeführten Experimente aufgedeckt werden. Ein Beitrag von *Rgs4* zur Steuerung der Entwicklung serotonerger Neurone ist jedoch aufgrund seiner oben beschriebenen regulatorischen Funktionen und seines Expressionsmusters denkbar.

Fasst man die Möglichkeiten der Interaktion von *Sim1* mit den hier genannten Genen zusammen, so ergibt sich eine denkbare duale Rolle des Transkriptionsfaktors *Sim1* in der Entwicklung und Aufrechterhaltung von 5-HT-Neuronen. Zum einen eine Regulation der späten Differenzierung von 5-HT-Neuronen auf transkriptioneller Ebene über *Brn3.2* oder *Brn2*, sowie Regulation von *Pet1* und *Tph2*. Darüber hinaus ist eine Regulation der Entwicklung insbesondere einer Subpopulation des NRD und der Entwicklung von Zielregionen des zentralen 5-HT-Systems über eine *Rgs4* vermittelte, funktionelle Steuerung des Autorezeptors 5-HTR1a denkbar.

Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit gewonnenen Daten führen zu einer Erweiterung des bisher gültigen, jedoch unvollständigen regulatorischen Netzwerkes aus intrinsischen und extrinsischen Faktoren, welche die Entwicklung von 5-HT-Progenitoren hin zu terminal differenzierten 5-HT-Neuronen steuern. Der Beitrag dieser Arbeit ist zum Abschluss in der nachfolgenden Abbildung 35 dargestellt.

Abb. 35: Erweitertes Modell des regulatorischen Netzwerkes aus intrinsischen und extrinsischen Faktoren der Entwicklung serotonerger (5-HT-) Neurone des ventralen Rhombencephalon der Maus unter Berücksichtigung der Einflussnahme von Tgf- β auf die Expression der Transkriptionsfaktoren Gata2 und Pet1, sowie multiple Sim1-abhängige Regulationswege der terminalen Differenzierung von 5-HT-Neuronen. Sim1 nimmt zudem Einfluss auf die Entwicklung von Zielgebieten des 5-HT-Systems über Regulation der Expression von Rgs4 und damit Regulation der Funktion des somatodendritischen 5-HT-Autorezeptors 5-HTR1A (Kasten).

VII. Anhang

7.1. Abbildungsverzeichnis

Abb. 1:	Kaudale und rostrale B-Gruppen serotonerger (5-HT-) Neurone des zentralen Nervensystems (ZNS) der Säugetiere und ihre Projektionen am Beispiel der Ratte.	Seite 7
Abb. 2:	Schematische Darstellung der Lokalisation kaudaler und rostraler serotonerger (5-HT-) Neurone des ventralen Rhombencephalon unter Berücksichtigung der beiden essentiellen Organisationszentren, Isthmus-Organizer (IstO) und Grundplatte im zentralen Nervensystem (ZNS) der Maus des Embryonaltages (E) 12.	Seite 9
Abb. 3:	Schematische Darstellung der Ausbildung des Isthmus-Organizer (IstO) der Maus des Embryonaltages (E) 8-9.5.	Seite 10
Abb. 4:	Präparation des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus des Embryonaltages 12 (E12).	Seite 46
Abb. 5:	Zellen des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus des Embryonaltages (E) 12 besitzen die Fähigkeit zur Bildung primärer Neurospheres.	Seite 80
Abb.: 6	Darstellung der zeitlichen Entwicklung (DIV12-22) eines sekundären Neurospheres aus dissoziierten, primären Neurospheres des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12) unter Einfluss der Mitogene Fgf2 und Egf sowie serumfreier Kulturbedingungen.	Seite 81
Abb. 7:	Zellen primärer Neurospheres des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12) besitzen die Fähigkeit zur Proliferation.	Seite 83
Abb. 8:	Vergleich der Genexpression zwischen primären Neurospheres (NS) und primärem Gewebe (T) des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12) mittels Polymerasekettenreaktion und genspezifischer Primer nach vorangegangener reverser Transkription (RT-PCR).	Seite 86
Abb. 9:	Primäre Neurospheres des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12) zeigen eine heterogene zelluläre Zusammensetzung.	Seite 88

- Abb. 10:** Quantitative-„*Real-Time*“-PCR-(qRT-PCR)-Analyse der Expression des mitotisch in Progenitoren zentraler serotonerger (5-HT-) Neuronen exprimierten Gens *Lmx1b* in einem repräsentativen Versuch. Seite 90
- Abb. 11:** Quantitative-„*Real-Time*“-PCR-(qRT-PCR)-Analyse eines repräsentativen Versuchs der Expression des Gen *Gata2* als frühes Markergen der Entwicklung serotonerger (5-HT-) Neuronen in cDNA aus dissoziierten und ausplattierten primären Neurospheres des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus des Embryonaltages (E) 12 nach externer Faktorengabe. Seite 91
- Abb. 12:** Quantitative-„*Real-Time*“-PCR-(qRT-PCR)-Analyse der Expression eines repräsentativen Versuchs des Gen *Pet1* als frühestes spezifisches Markergen serotonerger (5-HT-) Neurone an cDNA aus dissoziierten und ausplattierten primären Neurospheres des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus des Embryonaltages (E) 12 nach externer Faktorengabe. Seite 92
- Abb. 13:** Quantitative-„*Real-Time*“-PCR-(qRT-PCR)-Analyse eines repräsentativen Versuchs der Expression des Gen *Gata2* als frühes Markergen der Entwicklung serotonerger (5-HT-) Neuronen in cDNA aus Primärzellen des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus des Embryonaltages (E) 12 nach externer Faktorengabe. Seite 94
- Abb. 14:** Quantitative-„*Real-Time*“-PCR-(qRT-PCR)-Analyse der Expression des Gen *Pet1* als frühestes Markergen der Entwicklung serotonerger (5-HT-) Neuronen in cDNA aus Primärzellen des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus des Embryonaltages (E) 12 nach externer Faktorengabe. Seite 95
- Abb. 15:** Immunhistochemischer Nachweis der Expression von Sim1 („*Single-minded homologon 1*“) und Serotonin (5-HT-) in Zellen des Rhombencephalon der Maus des Postnatalaltages (P) 0. Seite 96
- Abb. 16:** Nachweis der *Sim1*-Expression durch nicht-radioaktive RNA-*in situ*-Hybridisierung (ISH) an sagittalen Paraffinschnitten (Schnittdicke 10 µm) der Maus des Embryonaltages (E) 12. Seite 98
- Abb. 17:** Quantitativer Vergleich der Gesamtzahl serotonerger (5-HT-) Neurone des rostralen Rhombencephalon der Maus in Wildtyp (*wt*) und homozygoten *Sim1*-Mutanten des Embryonaltages (E) 14.5. Seite 99

- Abb. 18:** Vergleich der Gesamtzahl serotonerger (5-HT-) Neurone des rostralen Rhombencephalon der Maus zum postnatalen Zeitpunkt (P) 0 in Wildtyp (*wt*) und homozygoten *Sim1*-Mutanten. Seite 100
- Abb. 19:** Analyse der Expression von *Gata2*, *Pet1* und *Tph2* als Vertreter von Markergenen der Entwicklung serotonerger (5-HT-) Neurone und des ventral exprimierten Transkriptionsfaktors *Sim1* in *MN9D*-Zellen mittels Reverser Transkriptions (RT)-PCR. Seite 101
- Abb. 20:** Reverse-Transkriptions-(RT)-PCR-Analyse der Überexpression von *Sim1* in *MN9D*-Zellen nach 24 h, 48 h und 72 h nach Transfektion mit *pcDNA3::Sim1* im Vergleich zu *pcDNA3*-transfizierten Kontrollen (Ctr) unter Berücksichtigung der jeweils für die PCR eingesetzten cDNA-Menge. Seite 102
- Abb. 21:** Western-Blot-Analyse repräsentativer „*Gain-of-function*“-Versuche zum Zeitpunkt der jeweils höchsten *Sim1*-Proteinexpression. Seite 103
- Abb. 22:** Quantitative-„*Real-Time*“-PCR-(qRT-PCR)-Analyse der *Mash1*-Expression in cDNA aus *MN9D*-Zellen nach Überexpression des Transkriptionsfaktors *Sim1* im Vergleich zu cDNA aus *MN9D*-Kontrollansätzen zu verschiedenen Zeitpunkten. Seite 104
- Abb. 23:** Repräsentative Quantitative-„*Real-Time*“-PCR-(qRT-PCR)-Analyse der Expression von *Gata2* in cDNA aus *MN9D*-Zellen nach Überexpression des Transkriptionsfaktors *Sim1* im Vergleich zu cDNA aus *MN9D*-Kontrollansätzen zu verschiedenen Zeitpunkten. Seite 105
- Abb. 24:** Quantitative-„*Real-Time*“-PCR-(qRT-PCR)-Analyse der *Pet1*-Expression in cDNA aus *MN9D*-Zellen nach Überexpression des Transkriptionsfaktors *Sim1* im Vergleich zu cDNA aus *MN9D*-Kontrollansätzen zu verschiedenen Zeitpunkten. Seite 106
- Abb. 25:** Quantitative-„*Real-Time*“-PCR-Analyse der Genexpression von *Tph2* in cDNA aus *Sim1*-überexprimierenden *MN9D*-Zellen im Vergleich zu cDNA-Proben aus *pcDNA3* transfizierten *MN9D*-Zellen zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Seite 107
- Abb. 26:** Transfektion von *MN9D*-Zellen mit *Sim1*-mRNA spezifischer siRNA bzw. einer nicht zur komplementären Sequenzbindung fähigen Kontroll-siRNA. Seite 109
- Abb. 27:** Analyse der Herabregulation der *Sim1*-Expression mittels spezifischer siRNA (*Sim1*-Cy3) in *MN9D*-Zellen durch Reverse Transkriptions(RT)-PCR. Seite 110
Repräsentative Analyse der Genexpression von *Pet1* mittels

- Abb. 28:** Quantitativer-„*Real-Time*“-PCR in *MN9D*-Zellen nach Herabregulation der Expression von Sim1 mittels spezifischer siRNA (*Sim1*-Cy5) nach 24 h im Vergleich zu Ctr-siRNA-Alexa 488 transfizierten *MN9D*-Zellen. Seite 111
- Abb. 29:** Quantitative-„*Real-Time*“-PCR-Analyse der Genexpression von *Tgf-β2* in cDNA-Proben aus Sim1-überexprimierenden *MN9D*-Zellen im Vergleich zu cDNA-Proben nicht Sim1-überexprimierender Zellen zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Seite 112
- Abb. 30:** Graphische Darstellung der relativen Werte der Genexpression im ventralen Rhombencephalon im Vergleich zum ventralen Mesencephalon der Maus des Embryonaltages (E) 11, ermittelt durch Vergleich der entsprechenden Genexpressionsmuster mittels cDNA-Mikroarray. Seite 114
- Abb. 31:** Graphische Darstellung der relative Genexpression ($2^{-\Delta\Delta Ct}$) von ausgesuchten Genen, basierend auf einem Genexpressionsvergleich des ventralen Rhombencephalon mit dem ventralen Mesencephalon der Maus des Embryonaltages (E) 11. Seite 117
- Abb. 32:** Gegenüberstellung der durch Quantitative-„*Real-Time*“-PCR (qRT-PCR) bzw. cDNA-Mikroarray-Analyse erhaltenen, relativen Genexpressionsdaten der Kandidatengene *Brn3.2*, *Lhx8* und *Rgs4* im ventralen Rhombencephalon im Vergleich zum ventralen Mesencephalon der Maus des Embryonaltages (E) 11. Seite 119
- Abb. 33:** Quantitative-„*Real-Time*“-PCR (qRT-PCR) Analyse der Expression von *Rgs4* in cDNA aus *MN9D*-Zellen nach Überexpression des Transkriptionsfaktors Sim1 im Vergleich zu cDNA aus *MN9D*-Kontrollansätzen zu verschiedenen Zeitpunkten. Seite 121
- Abb. 34:** Quantitative-„*Real-Time*“-PCR-Analyse der Genexpression von *Brn3.2* in cDNA aus Sim1-überexprimierenden *MN9D*-Zellen im Vergleich zu cDNA-Proben aus *pcDNA3*-transfizierten *MN9D*-Zellen. Seite 122
- Abb. 35:** Erweitertes Modell des regulatorischen Netzwerkes aus intrinsischen und extrinsischen Faktoren der Entwicklung serotonerger (5-HT-) Neurone des ventralen Rhombencephalon der Maus unter Berücksichtigung der Einflussnahme von Tgf-β auf die Expression der Transkriptionsfaktoren Gata2 und Pet1, sowie multiple Sim1-abhängige Regulationswege der terminalen Differenzierung von 5-HT-Neuronen. Seite 146

7.2. Tabellenverzeichnis

- Tab. 1:** B-Gruppenklassifikation und Lokalisation der Nuclei raphes des Rhombencephalon der Säugetiere. Seite 5
- Tab. 2:** Zur immunzytochemischen Charakterisierung von Primärzellen und primären Neurospheres des ventralen rostralen Rhombencephalon der Maus (E12) eingesetzte Primärantikörper. Seite 54
- Tab. 3:** Gegenüberstellung der durch Quantitative-„*Real-Time*“-PCR (qRT-PCR) bzw. cDNA-Mikroarray Analyse erhaltenen, relativen Genexpressionsdaten des ventralen Rhombencephalon im Vergleich zum ventralen Mesencephalon der Maus des Embryonaltages (E) 11. Seite 115

7.3. Literaturverzeichnis

Acampora, D, Mazan, S, Lallemand, Y, Avantaggiato, V, Maury, M, Simeone, A, Brûlet, P, (1995) Forebrain and midbrain regions are deleted in *Otx2*^{-/-} mutants due to a defective anterior neuroectoderm specification during gastrulation. *Development* 121(10): 3279-90.

Acampora, D, Mazan, S, Lallemand, Y, Avantaggiato, V, Maury, M, Simeone, A, Brûlet, P, (1999) Forebrain and midbrain regions are deleted in *Otx2*^{-/-} mutants due to a defective anterior neuroectoderm specification during gastrulation. *Development* 121(10):3279-90.

Adams, W, Kusljic, S, van den Buuse, M, (2008) Serotonin depletion in the dorsal and ventral hippocampus: Effects on locomotor hyperactivity, prepulse inhibition and learning and memory. *Neuropharmacology*. 2008 Jun 27. Epub ahead of print.

Armando, S, Lebrun, A, Hugnot, JP, Ripoll, C, Saunier, M, Simonneau, L, (2007) Neurosphere-derived neural cells show region-specific behaviour in vitro. *Neuroreport* 18(15):1539-42.

Azmitia, EC, Segal, M, (1978) An autoradiographic analysis of the differential ascending projections of the dorsal and median raphe nuclei in the rat. *J Comp Neurol* 179(3):641-67.

Barth, KA, Kishimoto, Y, Rohr, KB, Seydler, C, Schulte-Merker, S, Wilson, SW, (1999) Bmp activity establishes a gradient of positional information throughout the entire neural plate. *Development* 126(22):4977-87.

Bauer, H, Lele, Z, Rauch, GJ, Geisler, R, Hammerschmidt, M, (2001) The type I serine/threonine kinase receptor *Alk8/Lost-a-fin* is required for *Bmp2b/7* signal transduction during dorsoventral patterning of the zebrafish embryo. *Development* 128(6):849-58.

Baumgarten, HG, Grozdanovic, Z, (1995) Psychopharmacology of central serotonergic systems. *Pharmacopsychiatry Suppl* 2:73-9.

Bazán, E, Alonso, FJ, Redondo, C, López-Toledano, MA, Alfaro, JM, Reimers, D, Herranz, AS, Paíno, CL, Serrano, AB, Cobacho, N, Caso, E, Lobo, MV, (2004) In vitro and in vivo characterization of neural stem cells. *Histol Histopathol* 19(4):1261-75.

Beck, SG, Pan, YZ, Akanwa, AC, Kirby, LG, (2004) Median and dorsal raphe neurons are not electrophysiologically identical. *J Neurophysiol* 91(2):994-1005.

Bertrand, N, Castro, DS, Guillemot, F, (2002) Proneural genes and the specification of neural cell types. *Nat Rev Neurosci* 3(7):517-30.

Beyer, CE, Ghavami A, Lin, Q, Sung, A, Rhodes, KJ, Dawson, LA, Schechter, LE, Young, KH, (2004) Regulators of G-protein signaling 4: modulation of 5-HT_{1A}-mediated neurotransmitter release in vivo. *Brain Res* 1022(1-2):214-20.

Bignami, A, Dahl, D, (1977) Specificity of the glial fibrillary acidic protein for astroglia. *Histochem Cytochem* 25(6):466-9.

- Böttner, M**, Unsicker, K, Suter-Crazzolara, C, (1996) Expression of TGF-beta type II receptor mRNA in the CNS. *Neuroreport* 7(18):2903-7.
- Bowden, NA**, Scott, RJ, Tooney, PA, (2007) Altered expression of regulator of G-protein signalling 4 (RGS4) mRNA in the superior temporal gyrus in schizophrenia. *Schizophr Res* 89(1-3):165-8.
- Briscoe, J**, Ericson, J, (1999a) The specification of neuronal identity by graded Sonic Hedgehog signalling. *Semin Cell Dev Biol* 10(3):353-62.
- Briscoe, J**, Sussel, L, Serup, P, Hartigan-O'Connor, D, Jessell, TM, Rubenstein, JL, Ericson, J, (1999b) Homeobox gene Nkx2.2 and specification of neuronal identity by graded Sonic hedgehog signalling. *Nature* 398(6728):622-7.
- Brodski, C**, Weisenhorn, DM, Signore, M, Sillaber, I, Oesterheld, M, Broccoli, V, Acampora, D, Simeone, A, Wurst, W, (2003) Location and size of dopaminergic and serotonergic cell populations are controlled by the position of the midbrain-hindbrain organizer. *J Neurosci* 23(10):4199-207.
- Caccamo, DV**, Herman, MM, Frankfurter, A, Katsetos, CD, Collins, VP, Rubinstein, LJ, (1989) An immunohistochemical study of neuropeptides and neuronal cytoskeletal proteins in the neuroepithelial component of a spontaneous murine ovarian teratoma.. *Am J Pathol* 135(5):801-13.
- Caqueret, A**, Boucher, F, Michaud, JL, (2006) Laminar organization of the early developing anterior hypothalamus. *Dev Biol* 298(1):95-106.
- Carpenter, WT**, Jr, Buchanan, RW, Kirkpatrick, B, Tamminga, C, Wood, F, (1993) Strong inference, theory testing, and the neuroanatomy of schizophrenia. *Arch Gen Psychiatry* 50(10):825-31.
- Castro, DS**, Hermanson, E, Joseph, B, Wallén, A, Aarnisalo, P, Heller, A, Perlmann, T, (2001) Induction of cell cycle arrest and morphological differentiation by Nurr1 and retinoids in dopamine MN9D cells. *J Biol Chem* 276(46):43277-84.
- Castro, DS**, Skowronska-Krawczyk, D, Armant, O, Donaldson, IJ, Parras, C, Hunt, C, Critchley, JA, Nguyen, L, Gossler, A, Göttgens, B, Matter, JM, Guillemot, F, (2006) Proneural bHLH and Brn proteins coregulate a neurogenic program through cooperative binding to a conserved DNA motif. *Dev Cell* 11(6):831-44.
- Chen, H**, Chrast, R, Rossier, C, Gos, A, Antonarakis, SE, Kudoh, J, Yamaki, A, Shindoh, N, Maeda, H, Minoshima, S, (1995) Single-minded and Down syndrome? *Nat Genet* 10(1): 9-10.
- Cheng, L**, Chen, CL, Luo, P, Tan, M, Qiu, M, Johnson, R, Ma, Q, (2003) Lmx1b, Pet-1, and Nkx2.2 coordinately specify serotonergic neurotransmitter phenotype. *J Neurosci* 23(31):9961-7.
- Choi, HK**, Won LA, Kontur, PJ, Hammond, DN, Fox, AP, Wainer, BH, Hoffmann, PC,

Heller, A, (1991) Immortalization of embryonic mesencephalic dopaminergic neurons by somatic cell fusion. *Brain Res* 552(1):67-76.

Choi, HK, Won, L, Roback, JD, Wainer, BH, Heller, A, (1992) Specific modulation of dopamine expression in neuronal hybrid cells by primary cells from different brain regions. *Proc Natl Acad Sci U S A* 89(19):8943-7.

Choi-Lundberg, DL, Lin Q, Chang YN, Chiang YL, Hay CM, Mohajeri H, Davidson BL, Bohn MC, (1997) Dopaminergic neurons protected from degeneration by GDNF gene therapy. *Science* 275(5301):838-41.

Ciccolini, F, (2001) Identification of two distinct types of multipotent neural precursors that appear sequentially during CNS development. *Mol Cell Neurosci* 17(5):895-907

Clarkson, ED, Zawada, WM, Freed, CR, (1997) GDNF improves survival and reduces apoptosis in human embryonic dopaminergic neurons in vitro. *Cell Tissue Res* 289: 207-210.

Consolazione, A, Cuello, A, (1982) The biology of serotonergic transmission, New York: John Willey & Sons, Seite 29–61.

Cox, DA, Cohen, ML, (1996) 5-HT_{2B} receptor signaling in the rat stomach fundus: dependence on calcium influx, calcium release and protein kinase C. *Behav Brain Res* 73(1-2):289-92.

Craven, SE, Lim, KC, Ye, W, Engel, JD, de Sauvage, F, Rosenthal, A, (2004) Gata2 specifies serotonergic neurons downstream of sonic hedgehog. *Development* 131(5): 1165-73.

Crews, ST, Thomas, JB, Goodman, CS, (1988) The *Drosophila* single-minded gene encodes a nuclear protein with sequence similarity to the *per* gene product. *Cell* 52(1): 143-51.

Croonenberghs, J, Wauters, A, Deboutte, D, Verkerk, R, Scharpe, S, Maes, M, (2007) Central serotonergic hypofunction in autism: results of the 5-hydroxy-tryptophan challenge test. *Neuro Endocrinol Lett* 28(4):449-55.

Crossley, PH, Martin, GR, (1995) The mouse *Fgf8* gene encodes a family of polypeptides and is expressed in regions that direct outgrowth and patterning in the developing embryo. *Development* 121(2):439-51.

Dahlström, A, Fuxe, K, (1964) Localization of monoamines in the lower brain stem. *Experientia* 20(7):398-9.

Dahmane, N, Charron, G, Lopes, C, Yaspo, ML, Maunoury, C, Decorte, L, Sinet, PM, Bloch, B, Delabar, JM, (1995) Down syndrome-critical region contains a gene homologous to *Drosophila* *sim* expressed during rat and human central nervous system development. *Proc Natl Acad Sci U S A* 92(20):9191-5.

Daval, G, Vergé, D, Becerril, A, Gozlan, H, Spampinato, U, Hamon, M, (1987) Transient

expression of 5-HT_{1A} receptor binding sites in some areas of the rat CNS during postnatal development. *Int J Dev Neurosci* 5(3):171-80.

Dean B, Hayes W, (1996) Decreased frontal cortical serotonin_{2A} receptors in schizophrenia. *Schizophr Res* 21(3):133-9.

DeCarvalho, AC, Cappendijk, SL, Fadool, JM, (2004) Developmental expression of the POU domain transcription factor Brn-3b (Pou4f2) in the lateral line and visual system of zebrafish. *Dev Dyn* 229(4):869-76.

Diefenbach, TJ, Sloley, BD, Goldberg, JI, (1995) Neurite branch development of an identified serotonergic neuron from embryonic *Helisoma*: evidence for autoregulation by serotonin. *Dev Biol* 167(1):282-93.

Ding, L, Mychaleckyj, JC, Hegde, AN, (2007) Full length cloning and expression analysis of splice variants of regulator of G-protein signaling RGS4 in human and murine brain. *Gene* 401(1-2):46-60.

Ding, YQ, Marklund, U, Yuan, W, Yin, J, Wegman, L, Ericson, J, Deneris, E, Johnson, RL, Chen, ZF, (2003) Lmx1b is essential for the development of serotonergic neurons. *Nat Neurosci* 6(9):933-8.

Dünker, N, Krieglstein, K, (2002) Tgfbeta2 ^{-/-} Tgfbeta3 ^{-/-} double knockout mice display severe midline fusion defects and early embryonic lethality. *Anat Embryol (Berl)* 206(1-2):73-83.

Durston, AJ, Timmermans, JP, Hage, WJ, Hendriks, HF, de Vries, NJ, Heideveld, M, Nieuwkoop, PD, (1989) Retinoic acid causes an anteroposterior transformation in the developing central nervous system. *Nature* 334(6229):140-4.

Echelard, Y, Epstein, DJ, St-Jacques, B, Shen, L, Mohler, J, McMahon, JA, McMahon, AP, (1993) Sonic hedgehog, a member of a family of putative signaling molecules, is implicated in the regulation of CNS polarity. *Cell*. 1993 Dec 31;75(7):1417-30.

Echevarría, D, Vieira, C, Gimeno, L, Martínez, S, (2003) Neuroepithelial secondary organizers and cell fate specification in the developing brain. *Brain Res Brain Res Rev* 43(2):179-91.

El Wakil, A, Francius, C, Wolff, A, Pleau-Varet, J, Nardelli, J, (2006) The GATA2 transcription factor negatively regulates the proliferation of neuronal progenitors. *Development* 133(11):2155-65.

Ema, M, Morita, M, Ikawa, S, Tanaka, M, Matsuda, Y, Gotoh, O, Saijoh, Y, Fujii, H, Hamada, H, Kikuchi, Y, Fujii-Kuriyama, Y, (1996) Two new members of the murine Sim gene family are transcriptional repressors and show different expression patterns during mouse embryogenesis. *Mol Cell Biol* 16(10):5865-75.

Ericson, J, Briscoe, J, Rashbass, P, van Heyningen, V, Jessell, TM, (1997) Graded sonic hedgehog signaling and the specification of cell fate in the ventral neural tube. *Cold Spring*

Harb Symp Quant Biol 62:451-66.

Fan, CM, Kuwana E, Bulfone, A, Fletcher, CF, Copeland, NG, Jenkins, NA, Crews, S, Martinez, S, Puellas, L, Rubenstein, JL, Tessier-Lavigne, M, **(1996)** Expression patterns of two murine homologs of *Drosophila* single-minded suggest possible roles in embryonic patterning and in the pathogenesis of Down syndrome. *Mol Cell Neurosci* 7(1):1-16.

Farkas, LM, Dünker, N, Roussa, E, Unsicker, K, Krieglstein, K, **(2003)** Transforming growth factor-beta(s) are essential for the development of midbrain dopaminergic neurons in vitro and in vivo. *J Neurosci* 23(12):5178-86.

Flanders, KC, Lüdecke, G, Engels, S, Cissel, DS, Roberts, AB, Kondaiah, P, Lafyatis, R, Sporn, MB, Unsicker, K, **(1991)** Localization and actions of transforming growth factor-beta s in the embryonic nervous system. *Development* 113(1):183-91.

Fuxe, K, **(1965)** Evidence for the existence of monoamine neurons in the central nervous system. 3. The monoamine nerve terminals. *Z Zellforsch Mikrosk Anat* 9;65:573-96.

Fyodorov, D, Nelson, T, Deneris, E, **(1998)** Pet-1, a novel ETS domain factor that can activate neuronal nAChR gene transcription. *J Neurobiol* 34(2):151-63.

Gage, FH, **(2000)** Mammalian neural stem cells. *Science* 287(5457):1433-8.

Galter, D, Böttner, M, Unsicker, K, **(1999)** Developmental regulation of the serotonergic transmitter phenotype in rostral and caudal raphe neurons by transforming growth factor-betas. *J Neurosci Res* 56(5):531-8.

Gard, AL, Pfeiffer, SE, **(1989)** Oligodendrocyte progenitors isolated directly from developing telencephalon at a specific phenotypic stage: myelinogenic potential in a defined environment. *Development* 106(1):119-32.

Garda, AL, Echevarría, D, Martínez, S, **(2001)** Neuroepithelial co-expression of *Gbx2* and *Otx2* precedes *Fgf8* expression in the isthmus organizer. *Mech Dev* 101(1-2):111-8.

Gaspar, P, Cases, O, Maroteaux, L, **(2003)** The developmental role of serotonin: news from mouse molecular genetics. *Nat Rev Neurosci* 4(12):1002-12.

Gavalas, A, Davenne, M, Lumsden, A, Chambon, P, Rijli, FM, **(1997)** Role of *Hoxa-2* in axon pathfinding and rostral hindbrain patterning. *Development* 124(19):3693-702.

Gingrich, JA, Ansorge, MS, Merker, R, Weisstaub, N, Zhou, M, **(2003)** New lessons from knockout mice: The role of serotonin during development and its possible contribution to the origins of neuropsychiatric disorders. *CNS Spectr* 8(8):572-7.

Glavic, A, Gómez-Skarmeta, JL, Mayor, R, **(2002)** The homeoprotein *Xiro1* is required for midbrain-hindbrain boundary formation. *Development* 129(7):1609-21.

Gold, SJ, Ni, YG, Dohlman, HG, Nestler, EJ, **(1997)** Regulators of G-protein signaling (RGS) proteins: region-specific expression of nine subtypes in rat brain. *J Neurosci* 17(20):8024-37.

Goodman, M, New, A, **(2000)** Impulsive aggression in borderline personality disorder. *Curr*

Psychiatry Rep 2(1):56-61

Goridis, C, Rohrer, H, (2002) Specification of Catecholaminergic and Serotonergic Neurons. *Nat Rev Neurosci* 3(7):531-41.

Goshu, E, Jin, H, Fasnacht, R, Sepenski, M, Michaud, JL, Fan, CM, (2002) Sim2 mutants have developmental defects not overlapping with those of Sim1 mutants. *Mol Cell Biol* 22(12):4147-57.

Gritti, A, Cova, L, Parati, EA, Galli, R, Vescovi, AL, (1995) Basic fibroblast growth factor supports the proliferation of epidermal growth factor-generated neuronal precursor cells of the adult mouse CNS. *Neurosci Lett* 185(3):151-4.

Guillemot, F, Joyner, AL, (1993) Dynamic expression of the murine Achaete-Scute homologue Mash-1 in the developing nervous system. *Mech Dev* 42 (3):171-85.

Guo, C, Qiu, HY, Huang, Y, Chen, H, Yang, RQ, Chen, SD, Johnson, RL, Chen, ZF, Ding, YQ, (2007) Lmx1b is essential for Fgf8 and Wnt1 expression in the isthmic organizer during tectum and cerebellum development in mice. *Development* 134(2):317-25.

Guthrie, S, Lumsden, A, (1991) Formation and regeneration of rhombomere boundaries in the developing chick hindbrain. *Development* 112(1):221-9.

Heller, A, Price, S, Won, L, (1996) Glial-derived neurotrophic factor (GDNF) induced morphological differentiation of an immortalized monoclonal hybrid dopaminergic cell line of mesencephalic neuronal origin. *Brain Res* 725(1):132-6.

Hendricks, TJ, Francis, N, Fyodorov, D, Deneris, ES, (1999) The ETS domain factor Pet-1 is an early and precise marker of central serotonin neurons and interacts with a conserved element in serotonergic genes. *J Neurosci* 19(23):10348-56.

Hendricks, TJ, Fyodorov, DV, Wegman, LJ, Lelutiu, NB, Pehek, EA, Yamamoto, B, Silver, J, Weeber, EJ, Sweatt, JD, Deneris, ES, (2003) Pet-1 ETS gene plays a critical role in 5-HT neuron development and is required for normal anxiety-like and aggressive behavior. *Neuron* 37(2):233-47.

Hernandez, RE, Putzke, AP, Myers, JP, Margaretha, L, Moens, CB, (2007) Cyp26 enzymes generate the retinoic acid response pattern necessary for hindbrain development. *Development* 134(1):177-87.

Hitoshi, S, Tropepe, V, Ekker, M, van der Kooy, D, (2002) Neural stem cell lineages are regionally specified, but not committed, within distinct compartments of the developing brain. *Development* 129(1):233-44.

Joyner, AL, (1996) Engrailed, Wnt and Pax genes regulate midbrain--hindbrain development. *Trends Genet* 12(1):15-20.

Joyner, AL, Liu, A, Millet, S, (2000) Otx2, Gbx2 and Fgf8 interact to position and maintain a mid-hindbrain organizer. *Curr Opin Cell Biol* 12(6):736-41.

Kelly, CM, Zietlow, R, Dunnett, SB, Rosser, AE, (2003) The effects of various

concentrations of FGF-2 on the proliferation and neuronal yield of murine embryonic neural precursor cells in vitro. *Cell Transplant* 12(3):215-23.

Kim, IO, Kim, IC, Kim, S, Kwon, YK, Han, PL, Jeon, SH, Kim, SH, (2005) CNS midline cells contribute to maintenance of the initial dorsoventral patterning of the *Drosophila* ventral neuroectoderm. *J Neurobiol* 62(4):397-405.

Kim, JY, Koh, HC, Lee, JY, Chang, MY, Kim, YC, Chung, HY, Son, H, Lee, YS, Studer, L, McKay, R, Lee, SH, (2003) Dopaminergic neuronal differentiation from rat embryonic neural precursors by *Nurr1* overexpression. *J Neurochem* 85(6):1443-54.

King, MV, Marsden, CA, Fone, KC, (2008) A role for the 5-HT(1A), 5-HT(4) and 5-HT(6) receptors in learning and memory. *Trends Pharmacol* 2008 Aug 7. Epub ahead of print.

Kosman, D, Ip, YT, Levin, M, Arora, K, (1991) Establishment of the mesoderm-neuroectoderm boundary in the *Drosophila* embryo. *Science* 254(5028):118-22.

Kosofsky, BE, Molliver, ME, (1987) The serotonergic innervation of cerebral cortex: different classes of axon terminals arise from dorsal and median raphe nuclei. *Synapse* 1(2):153-68.

Krieglstein, K, Richter, S, Farkas, L, Schuster, N, Dünker, N, Oppenheim, RW, Unsicker, K, (2000) Reduction of endogenous transforming growth factors beta prevents ontogenetic neuron death. *Nat Neurosci* 3(11):1085-90.

Krieglstein, K, Strelau, J, Schober, A, Sullivan, A, Unsicker, K, (2002) TGF-beta and the regulation of neuron survival and death. *J Physiol Paris* 96(1-2):25-30.

Krieglstein, K, (2004) Factors promoting survival of mesencephalic dopaminergic neurons. *Cell Tissue Res* 318(1):73-80.

Krumlauf, R, Marshall, H, Studer, M, Nonchev, S, Sham, MH, Lumsden, A, (1993) Hox homeobox genes and regionalisation of the nervous system. *J Neurobiol* 24(10):1328-40.

Lauder JM, Wallace JA, Krebs H, Petrusz P, McCarthy K. (1982) In vivo and in vitro development of serotonergic neurons. *Brain Res Bull* 9(1-6):605-25.

Lauder, JM, Wilkie, MB, Wu, C, Singh, S, (2000) Expression of 5-HT(2A), 5-HT(2B) and 5-HT(2C) receptors in the mouse embryo. *Int J Dev Neurosci* 18(7):653-62.

Lee, CM, Yu, DS, Crews, ST, Kim, SH, (1999) The CNS midline cells and spitz class genes are required for proper patterning of *Drosophila* ventral neuroectoderm. *Int J Dev Biol* 43(4):305-15.

Lendahl, U, Zimmerman, LB, McKay, RD, (1990) CNS stem cells express a new class of intermediate filament protein. *Cell* 60(4):585-95.

Liu, C, Goshu, E, Wells, A, Fan, CM, (2003) Identification of the downstream targets of SIM1 and ARNT2, a pair of transcription factors essential for neuroendocrine cell differentiation. *J Biol Chem* 278(45):44857-67.

Lo, LC, Johnson, JE, Wuenschell, CW, Saito, T, Anderson, DJ, (1991) Mammalian

achaete-scute homolog 1 is transiently expressed by spatially restricted subsets of early neuroepithelial and neural crest cells. *Genes Dev* 5(9):1524-37.

Lumsden, A, Krumlauf, R, (1996) Patterning the vertebrate neuraxis. *Science* 15;274(5290):1109-15.

Maeda, R, Hozumi, S, Taniguchi, K, Sasamura, T, Murakami, R, Matsuno, K, (2007) Roles of single-minded in the left-right asymmetric development of the *Drosophila* embryonic gut. *Mech Dev* 124(3):204-17.

Marshall, H, Morrison, A, Studer, M, Pöpperl, H, Krumlauf, R, (1996) Retinoids and Hox genes. *FASEB J* 10(9):969-78.

Manabe, T, Tatsumi, K, Inoue, M, Matsuyoshi, H, Makinodan, M, Yokoyama, S, Wanaka, A, (2005) L3/Lhx8 is involved in the determination of cholinergic or GABAergic cell fate. *J Neurochem* 94(3):723-30.

Manabe, T, Tatsumi, K, Inoue, M, Makinodan, M, Yamauchi, T, Makinodan, E, Yokoyama, S, Sakumura, R, Wanaka, A, (2007) L3/Lhx8 is a pivotal factor for cholinergic differentiation of murine embryonic stem cells. *Cell Death Differ* 14(6):1080-5. Epub 2007 Feb 23.

Marshall, GP, 2nd, Ross, HH, Suslov, O, Zheng, T, Steindler, DA, Laywell, ED, (2008) Production of neurospheres from CNS tissue. *Methods Mol Biol* 438:135-50.

Martí, E, Bumcrot, DA, Takada, R, McMahon, AP, (1995) Requirement of 19K form of Sonic hedgehog for induction of distinct ventral cell types in CNS explants. *Nature* 375(6529):322-5.

Martin, GR, Eglen, RM, Hamblin, MW, Hoyer, D, Yocca, F, (1998) The structure and signalling properties of 5-HT receptors: an endless diversity? *Trends Pharmacol Sci* 19(1):2-4.

Martinez, S, Crossley, PH, Cobos, I, Rubenstein, JL, Martin, GR, (1999) FGF8 induces formation of an ectopic isthmic organizer and isthmocerebellar development via a repressive effect on Otx2 expression. *Development* 126(6):1189-200.

Matsuo, I, Kuratani, S, Kimura, C, Takeda, N, Aizawa, S, (1995) Mouse Otx2 functions in the formation and patterning of rostral head. *Genes Dev* 9(21):2646-58.

Matsuyama, S, Iwadate, M, Kondo, M, Saitoh, M, Hanyu, A, Shimizu, K, Aburatani, H, Mishima, HK, Imamura, T, Miyazono, K, Miyazawa, K, (2003) SB-431542 and Gleevec inhibit transforming growth factor-beta-induced proliferation of human osteosarcoma cells. *Cancer Res* 63(22):7791-8.

Michaud, JL, Rosenquist, T, May, NR, Fan, CM, (1998) Development of neuroendocrine lineages requires the bHLH-PAS transcription factor SIM1. *Genes Dev* 12(20):3264-75.

Millet, S, Campbell, K, Epstein, DJ, Losos, K, Harris, E, Joyner, AL, (1999) A role for Gbx2 in repression of Otx2 and positioning the mid/hindbrain organizer. *Nature* 401(6749):161-4.

Moffett, P, Dayo, M, Reece, M, McCormick, MK, Pelletier, J, (1996) Characterization of

msim, a murine homologue of the *Drosophila* sim transcription factor. *Genomics* 35(1):144-55.

Mohler, J, Vani, K, (1992) Molecular organization and embryonic expression of the hedgehog gene involved in cell-cell communication in segmental patterning of *Drosophila*. *Development* 115(4):957-71.

Morshead, CM, Reynolds, BA, Craig, CG, McBurney, MW, Staines, WA, Morassutti, D, Weiss, S, van der Kooy, D, (1994) Neural stem cells in the adult mammalian forebrain: a relatively quiescent subpopulation of subependymal cells. *Neuron* 13(5):1071-82.

Moustakas, A, Heldin, CH, (2005) Non-Smad TGF-beta signals. *J Cell Sci* 118(Pt 16): 3573-84.

Mu, X, Fu, X, Beremand, PD, Thomas, TL, Klein, WH, (2008) Gene regulation logic in retinal ganglion cell development: Isl1 defines a critical branch distinct from but overlapping with Pou4f2. *Proc Natl Acad Sci U S A* 105(19):6942-7. Epub 2008 May 6.

Murphy, DL, Zohar, J, Benkelfat, C, Pato, MT, Pigott, TA, Insel, TR, (1989) Obsessive-compulsive disorder as a 5-HT subsystem-related behavioural disorder. *Br J Psychiatry Suppl* (8):15-24.

Nakamura, K, Hasegawa, H, (2007) Developmental role of tryptophan hydroxylase in the nervous system. *Mol Neurobiol* 35(1):45-54

Nakamura, H, Watanabe, Y, (2005) Isthmus organizer and regionalization of the mesencephalon and metencephalon. *Int J Dev Biol* 49(2-3):231-5.

Nambu, JR, Lewis, JO, Wharton, KA Jr, Crews, ST, (1991) The *Drosophila* single-minded gene encodes a helix-loop-helix protein that acts as a master regulator of CNS midline development. *Cell* 67(6):1157-67.

Nambu, JR, Lewis, JO, Crews, ST, (1993) The development and function of the *Drosophila* CNS midline cells. *Comp Biochem Physiol Comp Physiol* 104(3):399-409.

Nardelli, J, Thiesson, D, Fujiwara, Y, Tsai, FY, Orkin, SH, (1999) Expression and genetic interaction of transcription factors GATA-2 and GATA-3 during development of the mouse central nervous system. *Dev Biol* 210(2):305-21.

Nelson, RJ, Chiavegatto, S, (2001) Molecular basis of aggression. *Trends Neurosci* 24(12):713-9.

Nomoto, S, Adachi, K, Yang, LX, Hirata, Y, Muraguchi, S, Kiuchi, K, (1997) Distribution of RGS4 mRNA in mouse brain shown by in situ hybridization. *Biochem Biophys Res Commun* 241(2):281-7.

Nüsslein-Volhard C, Wieschaus E, (1980) Mutations affecting segment number and polarity in *Drosophila*. *Nature* 287(5785):795-801.

Olander, S, Nordström, U, Patthey, C, Edlund, T, (2006) Convergent Wnt and FGF signaling at the gastrula stage induce the formation of the isthmus organizer. *Mech Dev*

123(2):166-76.

Ostenfeld, T, Tai, YT, Martin, P, Déglon, N, Aebischer, P, Svendsen, CN, (2002) Neurospheres modified to produce glial cell line-derived neurotrophic factor increase the survival of transplanted dopamine neurons. *J Neurosci Res* 69(6):955-65.

Palmer, TD, Takahashi, J, Gage, FH, (1997) The adult rat hippocampus contains primordial neural stem cells. *Mol Cell Neurosci* 8(6):389-404.

Pan, L, Deng, M, Xie, X, Gan, L, (2008) ISL1 and BRN3B co-regulate the differentiation of murine retinal ganglion cells. *Development*. 135(11):1981-90. Epub 2008 Apr 23.

Pandolfi, PP, Roth, ME, Karis, A, Leonard, MW, Dzierzak, E, Grosveld, FG, Engel, JD, Lindenbaum, MH, (1995) Targeted disruption of the GATA3 gene causes severe abnormalities in the nervous system and in fetal liver haematopoiesis. *Nat Genet* 11(1):40-4.

Papalopulu, N, Clarke, JD, Bradley, L, Wilkinson, D, Krumlauf, R, Holder, N, (1991) Retinoic acid causes abnormal development and segmental patterning of the anterior hindbrain in *Xenopus* embryos. *Development* 113(4):1145-58.

Parmar, M, Skogh, C, Björklund, A, Campbell, K, (2002) Regional specification of neurosphere cultures derived from subregions of the embryonic telencephalon. *Mol Cell Neurosci* 21(4):645-56.

Pattyn, A, Hirsch, M, Goridis, C, Brunet, JF, (2000) Control of hindbrain motor neuron differentiation by the homeobox gene *Phox2b*. *Development* 127(7):1349-58.

Pattyn, A, Simplicio, N, van Doorninck, JH, Goridis, C, Guillemot, F, Brunet, JF, (2004) *Ascl1/Mash1* is required for the development of central serotonergic neurons. *Nat Neurosci* 7(6):589-95.

Pattyn, A, Vallstedt, A, Dias, JM, Samad, OA, Krumlauf, R, Rijli, FM, Brunet, JF, Ericson, J, (2003) Coordinated temporal and spatial control of motor neuron and serotonergic neuron generation from a common pool of CNS progenitors. *Genes Dev* 17(6):729-37.

Pauwels, PJ, (2000) Diverse signalling by 5-hydroxytryptamine (5-HT) receptors. *Biochem Pharmacol* 60(12):1743-50.

Prakash, N, Wurst, W, (2004) Specification of midbrain territory. *Cell Tissue Res* 318(1):5-14.

Proetzel, G, Pawlowski, SA, Wiles, MV, Yin, M, Boivin, GP, Howles, PN, Ding, J, Ferguson, MW, Doetschman, T, (1995) Transforming growth factor-beta 3 is required for secondary palate fusion. *Nat Genet* 11(4):409-14

Qiu, F, Jiang, H, Xiang, M, (2008) A comprehensive negative regulatory program controlled by *Brn3b* to ensure ganglion cell specification from multipotential retinal precursors. *J Neurosci* 28(13):3392-403.

Rahimi, RA, Leof, EB, (2007) TGF-beta signaling: a tale of two responses. *J Cell Biochem*

102(3):593-608.

Ressler, KJ, Nemeroff, CB, (2000) Role of serotonergic and noradrenergic systems in the pathophysiology of depression and anxiety disorders. *Depress Anxiety*. 12 Suppl 1:2-19

Reynolds, BA, Weiss, S, (1992) Generation of neurons and astrocytes from isolated cells of the adult mammalian central nervous system. *Science* 255(5052):1707-10.

Rhinn, M, Lun K, Luz, M, Werner, M, Brand, M, (2005) Positioning of the midbrain-hindbrain boundary organizer through global posteriorization of the neuroectoderm mediated by Wnt8 signaling. *Development* 132(6):1261-72.

Rick, CE, Ebert, A, Virag, T, Bohn, MC, Surmeier, DJ, (2006) Differentiated dopaminergic MN9D cells only partially recapitulate the electrophysiological properties of midbrain dopaminergic neurons. *Dev Neurosci* 28(6):528-37.

Rietze, RL, Reynolds, BA, (2006) Neural stem cell isolation and characterization. *Methods Enzymol* 419:3-23.

Roelink H, Augsburger A, Heemskerk J, Korzh V, Norlin S, Ruiz i Altaba A, Tanabe Y, Placzek M, Edlund T, Jessell TM, (1994) Floor plate and motor neuron induction by vhh-1, a vertebrate homolog of hedgehog expressed by the notochord. *Cell* 76(4):761-75.

Roisen, FJ, Klueber, KM, Lu, CL, Hatcher, LM, Dozier, A, Shields, CB, Maguire, S, (2001) Adult human olfactory stem cells. *Brain Res* 890(1):11-22.

Roussa, E, Farkas, LM, Kriegstein K, (2004) TGF-beta promotes survival on mesencephalic dopaminergic neurons in cooperation with Shh and FGF-8. *Neurobiol Dis* 16(2):300-10.

Roussa, E, Kriegstein, K, (2004) Induction and specification of midbrain dopaminergic cells: focus on SHH, FGF8, and TGF-beta. *Cell Tissue Res* 318(1):23-33.

Roussa, E, Oehlke, O, Rahhal, B, Heermann, S, Heidrich, S, Wiehle, M, Kriegstein, K, (2008) Transforming growth factor beta cooperates with persephin for dopaminergic phenotype induction. *Stem Cells* 26(7):1683-94.

Roussa, E, Wiehle, M, Dünker, N, Becker-Katins, S, Oehlke, O, Kriegstein, K, (2006) Transforming growth factor beta is required for differentiation of mouse mesencephalic progenitors into dopaminergic neurons in vitro and in vivo: ectopic induction in dorsal mesencephalon. *Stem Cells* 24(9):2120-9.

Rubenstein, JL, (1998) Development of serotonergic neurons and their projections. *Biol Psychiatry* 44(3):145-50.

Saucedo-Cardenas, O, Quintana-Hau, JD, Le, WD, Smidt, MP, Cox, JJ, De Mayo, F, Burbach, JP, Conneely, OM, (1998) Nurr1 is essential for the induction of the dopaminergic phenotype and the survival of ventral mesencephalic late dopaminergic precursor neurons. *Proc Natl Acad Sci U S A* 95(7):4013-8.

Scheuch, K, Lautenschlager, M, Grohmann, M, Stahlberg, S, Kirchheiner, J, Zill, P, Heinz,

A, Walther, DJ, Priller, J, (2007) Characterization of a functional promoter polymorphism of the human tryptophan hydroxylase 2 gene in serotonergic raphe neurons. *Biol Psychiatry* 62(11):1288-94.

Schober, A, Hertel, R, Arumäe, U, Farkas, L, Jaszai, J, Krieglstein, K, Saarma, M, Unsicker, K, (1999) Glial cell line-derived neurotrophic factor rescues target-deprived sympathetic spinal cord neurons but requires transforming growth factor-beta as cofactor in vivo. *J Neurosci* 19(6):2008-15.

Schonemann, MD, Ryan, AK, Erkman, L, McEvilly, RJ, Bermingham, J, Rosenfeld, MG, (1998) POU domain factors in neural development. *Adv Exp Med Biol* 449:39-53.

Shamim, H, Mason, I, (1999) Expression of *Fgf4* during early development of the chick embryo. *Mech Dev* 85(1-2):189-92.

Shibaguchi, T, Kato, J, Abe, M, Tamamura, Y, Tabata, MJ, Liu, JG, Iwamoto, M, Wakisaka, S, Wanaka, A, Kurisu, K, (2003) Expression and role of *Lhx8* in murine tooth development. *Arch Histol Cytol* 66(1):95-108.

Skagerberg, G, Björklund, A, (1985) Topographic principles in the spinal projections of serotonergic and non-serotonergic brainstem neurons in the rat. *Neuroscience* 15(2):445-80.

Sommer, I, Schachner, M, (1981) Monoclonal antibodies (O1 to O4) to oligodendrocyte cell surfaces: an immunocytochemical study in the central nervous system. *Dev Biol* 83(2):311-27.

Tear, G, (1999) Axon guidance at the central nervous system midline. *Cell Mol Life Sci* 55(11):1365-76.

Teraoka, H, Russell, C, Regan, J, Chandrasekhar, A, Concha, ML, Yokoyama, R, Higashi, K, Take-Uchi, M, Dong, W, Hiraga, T, Holder, N, Wilson SW, (2004), Hedgehog and *Fgf* signaling pathways regulate the development of *tphR*-expressing serotonergic raphe neurons in zebrafish embryos. *J Neurobiol* 60(3):275-88.

Thomas, JB, Crews, ST, Goodman, CS, (1988) Molecular genetics of the single-minded locus: a gene involved in the development of the *Drosophila* nervous system. *Cell* 52(1):133-41.

Timmer, JR, Wang, C, Niswander, L, (2002) BMP signaling patterns the dorsal and intermediate neural tube via regulation of homeobox and helix-loop-helix transcription factors. *Development* 129(10):2459-72.

Törk, I, (1990) Anatomy of the serotonergic system. *Ann N Y Acad Sci* 600:9-34.

Trulsson, ME, Frederickson, CJ, (1987) A comparison of the electrophysiological and pharmacological properties of serotonin-containing neurons in the nucleus raphe dorsalis, raphe medianus and raphe pallidus recorded from mouse brain slices in vitro: role of autoreceptors. *Brain Res Bull* 18(2):179-90.

Tsai, FY, Keller, G, Kuo, FC, Weiss, M, Chen, J, Rosenblatt, M, Alt, FW, Orkin, SH, (1994)

An early haematopoietic defect in mice lacking the transcription factor GATA-2. *Nature*. 371(6494):221-6.

Turner, EE, Jenne, KJ, Rosenfeld, MG, (1994) Brn-3.2: a Brn-3-related transcription factor with distinctive central nervous system expression and regulation by retinoic acid. *Neuron* 12(1):205-18.

Uchida, N, Buck, DW, He, D, Reitsma, MJ, Masek, M, Phan, TV, Tsukamoto, AS, Gage, FH, Weissman, IL, (2000) Direct isolation of human central nervous system stem cells. *Proc Natl Acad Sci U S A* 97(26):14720-5.

Umetsu, D, Murakami, S, Sato, M, Tabata, T, (2006) The highly ordered assembly of retinal axons and their synaptic partners is regulated by Hedgehog/Single-minded in the *Drosophila* visual system. *Development* 133(5):791-800.

Unsicker, K, Meier, C, Kriegstein, K, Sartor, BM, Flanders, KC, (1996) Expression, localization, and function of transforming growth factor-beta s in embryonic chick spinal cord, hindbrain, and dorsal root ganglia. *J Neurobiol* 29(2):262-76.

Unsicker, K, Strelau, J, (2000) Functions of transforming growth factor-beta isoforms in the nervous system. Cues based on localization and experimental in vitro and in vivo evidence. *Eur J Biochem* 267(24):6972-5.

Vokes, SA, Ji H, McCuine, S, Tenzen, T, Giles, S, Zhong, S, Longabaugh, WJ, Davidson, EH, Wong, WH, McMahon, AP, (2007) Genomic characterization of Gli-activator targets in sonic hedgehog-mediated neural patterning. *Development* 134(10):1977-89.

Walshe, J, Maroon, H, McGonnell, IM, Dickson, C, Mason, I, (2002) Establishment of hindbrain segmental identity requires signaling by FGF3 and FGF8. *Curr Biol* 12(13):1117-23.

Wassarman, KM, Lewandoski, M, Campbell, K, Joyner, AL, Rubenstein, JL, Martinez, S, Martin, GR, (1997) Specification of the anterior hindbrain and establishment of a normal mid/hindbrain organizer is dependent on Gbx2 gene function. *Development* 124(15):2923-34.

Wassef, M, Joyner, AL, (1997) Early mesencephalon/metencephalon patterning and development of the cerebellum. *Perspect Dev Neurobiol* 5(1):3-16.

Waterhouse, BD, Mihailoff, GA, Baack, JC, Woodward, DJ, (1986) Topographical distribution of dorsal and median raphe neurons projecting to motor, sensorimotor, and visual cortical areas in the rat. *J Comp Neurol* 249(4):460-76, 478-81.

Waters, ST, Lewandoski, M, (2006) A threshold requirement for Gbx2 levels in hindbrain development. *Development* 133(10):1991-2000.

Weissman, IL, (2000) Stem cells: units of development, units of regeneration, and units in evolution. *Cell* 100(1):157-68.

Westlund, KN, Sorkin, LS, Ferrington, DG, Carlton, SM, Willcockson, HH, Willis, WD,

(1991) Serotonergic and noradrenergic projections to the ventral posterolateral nucleus of the monkey thalamus. *J Comp Neurol* 295(2):197-207.

Woods, S, Farrall, A, Procko, C, Whitelaw, ML, (2008) The bHLH/Per-Arnt-Sim transcription factor SIM2 regulates muscle transcript myomesin2 via a novel, non-canonical E-box sequence. *Nucleic Acids Res* 36(11):3716-27

Yamada, T, Placzek, M, Tanaka, H, Dodd, J, Jessell, TM, (1991) Control of cell pattern in the developing nervous system: polarizing activity of the floor plate and notochord. *Cell* 64(3):635-47.

Yamaki, A, Noda, S, Kudoh, J, Shindoh, N, Maeda, H, Minoshima, S, Kawasaki, K, Shimizu, Y, Shimizu, N, (1996) The mammalian single-minded (SIM) gene: mouse cDNA structure and diencephalic expression indicate a candidate gene for Down syndrome. *Genomics* 35(1):136-43.

Yang, D, Peng, C, Li, X, Fan, X, Li, L, Ming, M, Chen, S, Le, W, (2008) Pitx3-transfected astrocytes secrete brain-derived neurotrophic factor and glial cell line-derived neurotrophic factor and protect dopamine neurons in mesencephalon cultures. *J Neurosci Res*. 2008 Jul 21. Published Online: 21 Jul 2008.

Ye, W, Shimamura, K, Rubenstein, JL, Hynes, MA, Rosenthal, A, (1998) FGF and Shh signals control dopaminergic and serotonergic cell fate in the anterior neural plate. *Cell* 93(5):755-66.

Yoon, HK, Yang, JC, Lee, HJ, Kim, YK, (2008) The association between serotonin-related gene polymorphisms and panic disorder. *J Anxiety Disord*. 2008 Mar 13. available online 13 March 2008.

Zhang, X, Beaulieu, JM, Gainetdinov, RR, Caron, MG, (2006) Functional polymorphisms of the brain serotonin synthesizing enzyme tryptophan hydroxylase-2. *Cell Mol Life Sci*. 63(1): 6-11.

Zhao, Y, Guo YJ, Tomac, AC, Taylor, NR, Grinberg, A, Lee, EJ, Huang, S, Westphal, H, (1999) Isolated cleft palate in mice with a targeted mutation of the LIM homeobox gene *lhx8*. *Proc Natl Acad Sci U S A* 96(26):15002-6.

Zhao, Y, Marín, O, Hermes, E, Powell, A, Flames, N, Palkovits, M, Rubenstein, JL, Westphal, H, (2003) The LIM-homeobox gene *Lhx8* is required for the development of many cholinergic neurons in the mouse forebrain. *Proc Natl Acad Sci U S A* 100(15): 9005-10.

Zhao, ZQ, Scott, M, Chiechio, S, Wang, JS, Renner, KJ, Gereau, RW 4th, Johnson, RL, Deneris, ES, Chen, ZF, (2006) *Lmx1b* is required for maintenance of central serotonergic neurons and mice lacking central serotonergic system exhibit normal locomotor activity. *J Neurosci* 26(49):12781-8.

Zhu, G, Mehler, MF, Mabie, PC, Kessler, JA, (1999) Developmental changes in progenitor

cell responsiveness to cytokines. *J Neurosci Res* 56(2):131-45.

Zhu, HJ, Burgess, AW, (2001) Regulation of transforming growth factor-beta signaling. *Mol Cell Biol Res Commun* 4(6):321-30.

Zill, P, Büttner, A, Eisenmenger, W, Möller, HJ, Ackenheil, M, Bondy, B, (2007) Analysis of tryptophan hydroxylase I and II mRNA expression in the human brain: a post-mortem study. *J Psychiatr Res* 41(1-2):168-73.

7.4. Plasmide und Sequenzen

A: Ausgangsvektor *pcDNA3* (Invitrogen, Leek, Niederlande) des Sim1-Überexpressionskonstruktes *pcDNA3::Sim1*

B: *pGEM-T Easy Vektor System I*, Ausgangsvektor des *in situ*-RNA-Sondenkonstruktes *pGEM-T::Sim1* (305 bp)

C: cDNA-Sequenz: *Sim1* („*Single-minded homolog 1*“, *D. melanogaster*) der Maus (NM_011376); mit einer cDNA Gesamtlänge („*full-length*“) von 2041 bp, unter Berücksichtigung des durch die Primer (grün) der Sondenklonierung flankieren Genabschnittes von 213 bp:

```

1 atgaaagaaa agtctaaaaa tgctgccga acgaggaggg agaaagaaaa cagtgaattt
61 tatgaactgg ctaaattact gcctttaccc tcagccatca cctcccaact ggacaaagca
121 tccatcatca gactcacgac cagctatctc aaaatgagag tggctttcc agaagggctt
181 ggcgaggcgt ggggccacac cagtcgaacc agccccttgg acaacgttgg tcgcgaactc
241 ggctctcatc tactccagac tctggatggc ttcatcttcg tggtgcccc agatgggaag
301 atcatgtaca ttccagagac agcttcagtt cacctgggcc ttctcaggt agagctgact
361 gggaacagca tctatgaata tatccaccg gctgaccacg atgagatgac agccgtgctc
421 acagcccatc agccctacca ctctcacttt gtacaggagt acgagatcga acgctcctc
481 ttctaagga tgaagtgtgt ttggccaag cggaatgctg gcctcacctg cggtggtctac
541 aaggctatc actgtatgg ctacctgaag atccgccagt acagcctgga tatgtctccc
601 ttgatggat gctacaaaaa tggggcttg gtggtgttg gtcactccct gcctccgagt
661 gctgtgacag agatcaaaact acacagcaac atgttcatgt tccagccag tctggatatg
721 aagcttattt tcttgactc cagggtgga gagctgactg gatatgaacc tcaggacttg
781 attgagaaga cctgtacca tcacgtgcat ggctgtgaca cctccacct acgctgtgca
841 caccacttac tgttggtgaa gggacaagt accaccaagt actacaggtt cttggcgaag
901 cagggcggtt ggtctgggt gcagagttac gccaccatcg tacacaacag ccgctcctc
961 agccgcact gcatgtcag cgtcaactac gtctcacag acacagaata caaagggcta
1021 cagctctccc tgaccagat atcagcctct aagcccactt tctctatac cagcagttcc
1081 actcccacta tctcggacaa caggaagggg gccaaagtaa ggctctccag tagcaagtca
1141 aaatctagga cctccccata tccccagtat tcgggattcc atactgagag atcggaatct
1201 gaccatgaca gccagtggg tggaagtccc ctgactgata ctgcctcccc acagctcctg
1261 gaccagaga ggctggctc tcagcacgaa ttgtctgtg cgtataggca gttccagat
1321 cgcagttctc tctgtatgg ttgtctctg gaccattcca ggctggtgga ggacaggcac
1381 ttccacaccc aagcctgcga gggaggacgg tgcgaggcag gcaggtactt cctgggagca
1441 ccacctactg ggagagatcc ctgggtgggc tctcgagcag ctttgctct taccaaggcc
1501 tccccggaga gcagagaagc ctatgagaac agcatgcctc atatcacctc catccacaga
1561 atccacggtc gaggtcactg ggaatgaagat agtgtgtgca gctctccaga cctgggtca

```

1621 gccagtgaat ctggtgaccg ataccgcacc gaacagtatc aaaatagccc acatgaacct
 1681 agcaaaattg aaactctcat aagagccacc cagcagatga ttaaagagga agagaacaga
 1741 ttacagctaa ggaaagcccc tccagaccaa ctggcttcca ttaatggagc tgggaaaaaa
 1801 cactccctct gtttgcaaa ctatcaacag cccccacca caggtgaggt ctgccacagc
 1861 tctgctcttg ccagcacttc accatgtgac catatccagc agagagaggg aaagatgctc
 1921 agccctcatg aaaatgacta tgacaacagc cccactgcac tgtctcggat aagtagtctt
 1981 agttctgacg gcattacaaa gtctagttta atcctggcta aagactatct acattcagat
 2041 atgtctcccc atcagacagc aggagaccat cctgccatct ctccaaactg ttttgctcc
 2101 caccggcagt attttgataa gcatgcctat acattgactg gttatgccct ggaacactta
 2161 tatgacagtg agactattag aaactattcc ttgggctgca atggctcaca ctttgatgtg
 2221 acttcccatc taaggatgca accagacca gcacaaggac acaagggaac atctgttata
 2281 ataaccaatg gaagttga

D: siRNA-Moleküle für die „*Loss-of-function*“-Experimente wurden von Qiagen GmbH (Hilden, Deutschland) bezogen:

- 1: AllStars Negative Control siRNA Alexa 488, keine Sequenzangabe verfügbar
- 2: siRNA-Sim1-Cy5, keine Sequenzangabe möglich, erstellt anhand der *Sim1*-Sequenz NM_011376, welche zu 99% homolog zu NM_005068 ist.

7.5. Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen

α	alpha, Antikörper gerichtet gegen, anti-
A	Absorption
A. bidest	Aqua bidestillata, bidestilliertes Wasser
Aadc	<i>Aromatic L-amino-acid-decarboxylase</i> , Aromatische-L-Aminosäure-Decarboxylase
Abb.	Abbildung
AC	<i>Adenylatcyclase</i> , Adenylatzyklase
ad	ergänzen auf
Alk5	<i>Activin receptor-like kinase 5</i>
Amp	Ampicillin
AP	Alkalische Phosphatase
A-P	anterior-posterior
APS	Ammoniumpersulfat
aPV	Nucleus pariventricularis anterior
Arnt	<i>Aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator</i>
Ascl1	<i>Achaete-scute complex homolog 1</i> , Synonym: Mash1
Atoh1	<i>Atonal homolog 1</i>
β	beta
B1-B9	Nuclei raphes, Raphe-Kerne
BCIP	5-Brom-4-chlor-3-indoxylphosphat
bHLH	<i>basic helix-loop-helix</i> -Motiv
Bmp	<i>Bone morphogenetic proteins</i> , Knochen-morphogenetische Proteine
bp	<i>base-pairs</i> , Basenpaare
BrdU	5'Bromo-2'Desoxy-Uridin
Brn3.2	<i>Brain-specific homeobox 3.2</i> , Synonym: Pou4f2
BSA	Bovines Serum Albumin
bzw.	beziehungsweise
°C	Grad Celcius
ca.	circa
cDNA	<i>complementary DNA</i>
CHR	<i>Corticotropin releasing hormone</i>
CME	<i>CNS midline element</i>
CMF	Calcium-Magnesium-freies Medium
CNS	<i>Central nervous system</i>
Ct	<i>Threshold cycle</i>
Cy3/5	Cyanin 3/5
d. h.	das heisst
Δ	delta

<i>D. melanogaster</i>	<i>Drosophila melanogaster</i> , Fruchtfliege
DA	Dopamin; Dopaminerg
Da	Dalton
DAB	3,3-Diaminobenzidin-Tetrachlorid
DAPI	4',6-Diamidino-2-phenylindol-Dihydrochlorid
dATP	Desoxyadenosintriphosphat
dCTP	Desoxycytosintriphosphat
dGTP	Desoxyguanosintriphosphat
DEPC	Diethylpyrocarbonat
DIG	Digoxigenin
DIV	<i>Day in vitro</i>
DMEM	<i>Dulbecco's modified Eagle's Medium</i>
DMSO	Dimethylsulfoxid
DNA	Desoxyribonukleinsäure
DNase	Desoxyribonuklease
dNTP	Desoxyribonukleosidtriphosphat
dTTP	Desoxythymidintriphosphat
DPP	<i>Decapentaplegic</i>
D-V	dorso-venral
<i>E</i>	Effizienz
E	Embryonaltag
<i>E. coli</i>	<i>Escherichia coli</i>
ECL	<i>Enhanced chemiluminescence</i>
EDTA	Ethylendiamintetraacetat
Egf	<i>Epidermal growth factor</i> , Epidermaler Wachstumsfaktor
egfr	<i>Epidermal growth factor receptor</i>
en	<i>Engrailed</i>
ERK	<i>Extracellular signal-regulated kinases</i>
et al.	et alteres
EthBr	Ethidiumbromid
ETS	DNA-Bindungsdomäne mit GGAA/T-Kernmotiv
EZM	Extrazelluläre Matrix
FACS	<i>Fluorescence activated cell sorting</i>
FCS	<i>Fetal calf serum</i> , fötales Kälberserum
Fgf	<i>Fibroblast growth factor</i> , Fibroblasten-Wachstumsfaktor
FITC	Fluorescein
Foxa2	<i>Forkhead box A2</i>
FR	Formatio reticularis
g	Gramm
GABA	Gamma-Aminobuttersäure
Gapdh	Glycerinaldehyd-3-phosphat-Dehydrogenase

Gata2/3	<i>GATA binding protein 2/3</i>
Gbx2	<i>Gastrulation brain homeobox 2</i>
GCR	<i>G-protein coupled receptor</i>
Gdnf	<i>Glia cell line derived neurotrophic factor</i>
Gfap	<i>Glial fibrillary acidic protein</i>
ggf.	gegebenenfalls
G-Protein	Guaninnukleotid bindendes Protein
h	Stunde
HBBS	Magnesium-freie <i>Hank's balanced salt solution</i>
HEPES	N-(2-Hydroxyethyl)-Piperazin-N'-2-Ethansulfonsäure
Hh	<i>Hedgehog</i>
Hox	<i>Homeobox</i> , Homöobox
HRP	<i>Horseradish peroxidase</i> , Meerrettichperoxidase
IgG	Immunoglobulin Klasse G
ISH	in situ-Hybridisierung
Islet1	<i>Insulin related protein 1</i>
IstO	Isthmus-Organizer
Km	Kanamycin
Km	Kanamycin
λ	lambda, Wellenlänge
l	Liter
Lam	Laminin
LB	Luria-Bertani
Lhx8	<i>LIM homeobox 8</i> ,
Lmx1b	<i>LIM homeobox transcription factor 1 beta</i>
m	Steigung
m	Milli
M	Mol, molar
Mash1	<i>Mouse achaete-scute homolog 1</i> , Synonym: <i>Ascl1</i>
Meis1	<i>Myeloid ecotropic viral integration site 1 homolog</i>
MEM	<i>Modified Eagle's Medium</i>
Mes	Mesencephalon
Met	Metencephalon
MHB	<i>Midbrain-hindbrain boundary</i> , Mittlhirn-Nachhirn-Grenze
min	Minute
MMLV RT	reverse Transkriptase aus murinem Leukämie Virus
<i>MN9D</i>	<i>Mouse neuronal cell line clone 9D</i>
MNs	kraniales branchiales Motoneuron
MNv	viscerales Motoneuron
MOPS	3-[N-morpholino]propansulfonsäure
MP	Magermilchpulver

mRNA	<i>messenger-RNA</i> , Boten-RNA
MW	Mittelwert
n	Nano
n	Probenanzahl
n. s.	nicht signifikant
NBT	Nitroblautetrazolium
NF κ B	<i>Nuclear factor-κB</i>
NGS	<i>Normal goat serum</i>
Nkx	<i>NKx transcription factor related</i>
NMRI	<i>Naval Medical Research Institute</i>
NRD	Nucleus raphe dorsalis
NRM	Nucleus raphe magnus
NS	primäre Neurospheres
OD	Optische Dichte
Opti-MEM	<i>Reduced serum medium, modification of MEM Eagle's</i>
Otx2	<i>Orthodenticle homeobox homolog 2</i>
p	piko
P0	Postnatalstadium
PAGE	Polyacrylamid-Gelelektrophorese
PAS	Period-Arnt-Sim-Domäne
Pax2	<i>Paired box gene 2</i>
PBS	<i>Phosphat-buffered saline</i>
PCR	<i>Polymerase-chain-reaction</i> , Polymerasekettenreaktion
Pet1	<i>Plasmacytoma expressed transcript 1</i>
PFA	Paraformaldehyd
pH	negativer Logarithmus der H ⁺ -Ionenkonzentration
Phox2b	<i>Paired-like homeobox-domain protein 2 beta</i>
PI3K	<i>Phosphoinosid 3-kinases</i>
PKA	Proteinkinase A
PNS	Peripheres Nervensystem
POA	<i>Proligodendrocyte antigene</i>
PORN	Poly-Ornithine
Pou4f2	<i>POU domain class 4 transcription factor 2</i> , entspricht Brn3.2
PSN	Penicillin/Streptomycin/Neomycin
PVDF	Polyvinylidendifluorid
PVN	Nucleus paraventricularis
P-Wert	Überschreitungswahrscheinlichkeit
qRT-PCR	Quantitative-„ <i>Real-Time</i> “-PCR
R	Rhombomer
RA	<i>Retinoid acid</i> , Retinolsäure
RGC	<i>Retinal ganglion cells</i> , retinale Ganglienzellen

Rgs4	<i>Regulator of G-protein signalling 4</i>
rho	<i>Rhomboid</i>
RISC	<i>RNA induced silencing complex</i>
RNA	Ribonukleinsäure
RNAi	RNA-Interferenz
RNase	Ribonuklease
rRNA	ribosomale RNA
RT	Raumtemperatur
RT-PCR	Reverse-Transkriptions-PCR
s	Standardabweichung
s	Sekunde
SB421543	synthetischer Alk 4/5/7 Inhibitor
SDS	Sodiumdodecylsulfat
SEM	<i>Standard error of the mean</i> , Standardfehler des Mittelwertes
Sema5a	<i>Sema domain, seven thrombospondin repeats, transmembrane domain and short cytoplasmic domain, (semaphorin) 5A</i>
Sert	<i>Plasma membrane serotonin transporter</i>
Shh	<i>Sonic hedgehog</i>
Sim	<i>Single-minded</i>
siRNA	<i>short-interfering RNA</i>
Smad	<i>Mothers against DPP homolog</i>
SN	Substantia nigra
SO	Nucleus supraopticus
SSC	<i>Sodium chloride/sodium citrate</i>
T	tissue, primäres Gewebe
Tab.	Tabelle
taq-Polymerase	DNA-Polymerase aus <i>Thermus aquaticus</i>
TE	Tris-EDTA-Puffer
TEMED	Tetramethylethyldiamin
Tgf- β	<i>Transforming growth factor beta</i> , Transformierender Wachstumsfaktor β
Tgf- β R	<i>Transforming growth factor beta receptor</i>
TH	Tyrosin-Hydroxylase
THR	<i>Thyrotropin releasing hormon</i>
T _m	<i>Melting temperature</i> , Schmelztemperatur
Tph2	Tryptophanhydroxylase 2
Tris	Tris(hydroxy)aminomethan
U	<i>Unit</i> , Einheit der Enzymaktivität
ü. N.	über Nacht
Upm	Umdrehungen pro Minute
V	Volt
UV	Ultraviolettes Licht

Vmat	<i>Vesicular monoamine transporter 2</i>
VT	Volumenanteil
VZ	ventrikuläre Zone, Neuroepithelium
w/v	<i>weight/volume</i>
Wnt	<i>Wingless-related MMTV integration site</i>
<i>wt</i>	Wildtyp
×	fach
μ	Mikro
z. B.	zum Beispiel
ZNS	Zentrales Nervensystem
5-HT	5-Hydroxytryptamin, Serotonin/serotonerg
5-HTR	Serotonin-Rezeptor

7.6. Curriculum vitae

Name: Osterberg
Vorname: Nadja
geboren: 22.04.1976
Geburtsort: Kassel
Familienstand: ledig
Wohnort: Runzmattenweg 2, 79110 Freiburg

Schul Ausbildung

Grundschule	1982 – 1986	Grundschule am Eichwäldchen, Kassel
Förderstufe	1986 - 1988	Josef von Eichendorf-Schule, Kassel
Gymnasium	1988 – 1995	Albert-Schweizer-Schule in Kassel
Abschluss	1995	Abitur

Hochschulausbildung und Berufstätigkeit

Studium der Biologie	17.10.95.–.11.09.2002	Gesamthochschule-Universität, Kassel
Vordiplom	15.10.1998	Gesamthochschule-Universität, Kassel
Diplomstelle	01.01.2002.–.30.09.2002	MPI für Experimentelle Medizin, Göttingen Abt.: Molekulare Biologie Neuronaler Signale
Diplom	11.09.2002	Gesamthochschule-Universität, Kassel
Doktorandenstelle	01.10.2002.–.31.03.2004	MPI für Experimentelle Medizin, Göttingen Abt.: Molekulare Biologie Neuronaler Signale
Doktorandenstelle	01.10.2005 – 31.10.2008	Georg-August-Universität, Göttingen Zentrum Anatomie Abt.: Neuroanatomie
weiterführende Beschäftigung	seit 01.11.2008	Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg Anatomie und Zellbiologie II Abt.: Molekulare Embryologie

Freiburg, den 26.11.2008