**Aus der Abteilung Gastroenterologie und Endokrinologie
(Prof. Dr. med. Dr. h.c. G. Ramadori)
im Zentrum Innere Medizin
der Medizinischen Fakultät der Universität Göttingen**

**Die Rolle der Transkriptionsfaktoren “runt-related transcription factor-2“
(RUNX2) und Osterix in humanen Osteoblasten**

In-vitro-Untersuchung zu Differenzierung und Einfluss der Hemmung von RUNX2 mittels siRNA

**INAUGURAL – DISSERTATION
zur Erlangung des Doktorgrades
der Medizinischen Fakultät
der Georg-August-Universität zu Göttingen**

**vorgelegt von
Markus Giesen
aus
Cádiz/Spanien**

Göttingen 2007

Dekan: Prof. Dr. med. C. Frömmel

- I. Berichterstatterin: PD Dr. med. H. Siggelkow**
- II. Berichterstatter/in:**
- III. Berichterstatter/in:**

Tag der mündlichen Prüfung:

INHALTSVERZEICHNIS

1	Einleitung	1
1.1	Aufbau des Knochengewebes	1
1.2	“Remodeling“	1
1.3	Zellen des Knochengewebes	1
1.3.1	Osteoblasten	2
1.3.2	Osteozyten	2
1.3.3	“Bone-Lining-Cells“	2
1.3.4	Osteoklasten	3
1.4	Knochengrundsubstanz	3
1.4.1	Mineralien	3
1.4.2	Organische Verbindungen	3
1.4.3	Alkalische Phosphatase (AP)	4
1.4.4	Osteokalzin (OC)	4
1.5	Differenzierung mesenchymaler Stammzellen	4
1.6	Differenzierung der Osteoblasten	6
1.6.1	“Runt-related transcription factor-2” (RUNX2)	6
1.6.2	Osterix (OSX)	8
1.7	Differenzierung der Adipozyten	9
1.8	Zellkulturmodelle zur Untersuchung der Differenzierung	10
1.8.1	Kulturen isolierter Knochenzellen	10
1.8.2	Tumorzelllinien	11
1.9	Der Einfluss von Stimulationsfaktoren auf den Knochenmetabolismus	11
1.9.1	“Transforming Growth Factor- β “ (TGF- β)	11
1.9.2	“Bone Morphogenetic Protein-2” (BMP2)	11
1.9.3	Glukokortikoide	12
1.9.4	Vitamin D ₃	12
1.9.5	Vitamin C	13
1.9.6	β -Glycerophosphat (β -GP)	13
1.10	Fragestellung	14
2	Material und Methoden	15
2.1	Material	15
2.1.1	Zellkultur	15
2.1.1.1	Humane Osteosarkomzelllinie 58	15
2.1.1.2	Primäre humane Osteoblasten	15

2.1.1.3	Humane mesenchymale Stammzellen	16
2.1.2	Materialien, Lösungen und Medien	16
2.1.2.1	Zellkultur	16
2.1.2.2	Polymerase-Kettenreaktion (PCR)	18
2.1.2.3	Reverse-Transkriptase-PCR	19
2.1.2.4	Agarose-Gelelektrophorese	19
2.1.2.5	Transfektion	20
2.2	Methoden	20
2.2.1	Methoden der Zellkultivierung	20
2.2.2	Polymerase-Ketten-Reaktion	23
2.2.3	Interner Standard	25
2.2.3.1	Durchführung einer PCR	29
2.2.4	Reverse-Transkriptase-PCR	32
2.2.5	Agarose-Gelelektrophorese	34
2.2.6	Statistische Auswertung	34
2.2.7	RNA-Interferenz	35
2.2.7.1	Elektroporation	35
2.2.7.2	Lipofektamin-Transfektion	36
3	Ergebnisse	41
3.1	Genexpressionsverhältnisse in pHOB	41
3.1.1	Genexpressionsmuster von OSX, RUNX2, OC, AP, PPAR γ 2, LPL und aP2 unter basalen und stimulierenden Bedingungen in mesenchymalen Stammzellen	41
3.1.2	Genexpressionsverhalten von OSX, RUNX2, OC und der AP in Primärkulturen humaner Osteoblasten	47
3.1.3	Genexpression von OSX, RUNX2, OC und der AP in pHOB unter basalen Kulturbedingungen	50
3.1.4	Systematische Untersuchung der Genexpression von OSX und RUNX2 in pHOB unter Stimulation mit Vitamin C, TGF- β 1, BMP2 und Dexamethason an Tag 4 und 28	52
3.1.5	Differenzierungsabhängige Genexpression von OSX und RUNX2 unter osteogener Stimulation in pHOB	55
3.2	Transfektionsergebnisse	56
3.2.1	Initialer Transfektionsversuch mit GAPDH an HOS 58	57
3.2.2	Konzentrationsabhängige Lipofektion an HOS 58	58

3.2.3	Optimierung der Lipofektion an HOS 58 unter Berücksichtigung der Transfektionsdauer	59
3.2.4	Initialer Transfektionsversuch mit GAPDH an pHOB	60
3.2.5	Lipofektion an frischen pHOB im Vergleich zu aufgetauten pHOB	61
3.2.6	Lipofektion an pHOB in Abhängigkeit der Transfektionsdauer	62
3.2.7	Vergleich von zwei verschiedenen siRNAs gegen RUNX2	63
3.2.8	Wirkdauer der Lipofektion an pHOB	64
3.2.9	1. Transfektionsversuch: Auswirkung einer Gensuppression von RUNX2 über 8 Tage auf die Genexpressionen von OC, AP, PPAR γ 2, LPL und aP2 unter basalen und stimulierenden Bedingungen	67
3.2.10	2. Transfektionsversuch: Auswirkung einer Gensuppression von RUNX2 über 8 Tage auf die Genexpressionen von OSX, OC, AP, PPAR γ 2, LPL und aP2 unter basalen und stimulierenden Bedingungen	70
3.3	Ergebnisse der Expression von OSX und RUNX2 in pHOB gesunder Patienten im Vergleich zu knochenmetabolisch erkrankten Patienten	75
4	Diskussion	79
4.1	Funktion von OSX und RUNX2 zu frühen Differenzierungszeitpunkten	80
4.1.1	Unterschiede im Genexpressionsverhalten von Osteoblasten in Primärkultur und Kulturen in der 2. Passage jeweils unter basalen Bedingungen	82
4.2	Untersuchung der Genexpression von RUNX2 und OSX unter Stimulationsbedingungen in pHOB	84
4.2.1	Kurzzeitstimulation mit Einzelfaktoren	84
4.2.2	Kontinuierliche Stimulation mit mehreren Faktoren	85
4.2.3	Zusammenfassung der Genexpressionsverläufe von den mesenchymalen Stammzellen bis zum reifen Osteoblasten	86
4.3	Auswirkung des RUNX2 „knock down“ in pHOB auf die osteoblastäre Differenzierung	89
4.4	Mögliche Rolle der Transkriptionsfaktoren OSX und RUNX2 in pathophysiologischen Prozessen knochenmetabolischer Erkrankungen	95
5.	Zusammenfassung	98
6.	Literaturverzeichnis	100

Abkürzungsverzeichnis

A	Adenin
Abb.	Abbildung
Amol	Attomol (10^{-18})
AP	alkalische Phosphatase
aP2	”fatty acid binding protein”
BMP-2	“bone morphogenetic protein-2”
Bone-Gla-Protein	Knochen- γ -Carboxyglutaminsäure-Protein (Osteokalzin)
Bp	Basenpaare
BSA	Bovines Serumalbumin
bzw.	beziehungsweise
C	Cytosin
C/EBP α	CCAAT / enhancer binding protein alpha
ca.	circa
CaCl ₂	Kalziumchlorid
cAMP	zyklisches Adenosinmonophosphat
cDNA	komplementäre DNA
CO ₂	Kohlendioxid
d	Tag
dATP	Desoxyadenosintriphosphat
dCTP	Desoxycytidintriphosphat
Dexa	Dexamethason
dGTP	Desoxyguanosintriphosphat
DMEM	Dulbecco’s MEM-Modifikation
DNA	Desoxyribonukleinsäure
dNTP	dATP + dCTP + dGTP + dTTP
DTT	Dithiothreitol
dTTP	Desoxythymidintriphosphat
EDTA	Ethylendiamintetraacetat
FCS	fetales Kälberserum
g	Gramm
G	Guanin
GAPDH	Glycerinaldehydphosphat-Dehydrogenase
h	Stunde
HOB	humane osteoblastäre Zellen
HOS	humane Osteosarkomzellen
l	Liter
LPL	Lipoproteinlipase
M	Molar
mg	Milligramm

µg	Mikrogramm
MgCl ₂	Magnesiumchlorid
min	Minute
ml	Milliliter
µl	Mikroliter
mM	Millimolar
mm	Millimeter
M-MLV	Moloney-Mäuseleukämievirus
µmol	Mikromol
mRNA	“messenger” RNA
n	Anzahl
NaCl	Natriumchlorid
nm	Nanometer
OC	Osteokalzin
OD	optische Dichte
OPG	Osteoprotegerin
OSX	Osterix
p	Irrtumswahrscheinlichkeit
PBS	phosphatgepufferte Salzlösung
PCR	Polymerase-Ketten-Reaktion
Pen/Strep	Penicillin / Streptomycin
pH	-log[H ⁺]
pHOB	primäre humane Osteoblasten
pmol	Pikomol
PPARγ2	“peroxisome proliferator activated receptor gamma 2”
RANKL	“receptor for activation of nuclear factor kappa B-Ligand”
RNA	Ribonukleinsäure
RNase	Ribonukleasen
RT	Reverse Transkriptase
RUNX2	“runt-related transcription factor-2”
s	Sekunde
SEM	“standard error of the mean” (Standardfehler des Mittelwertes)
siRNA	“small interfering RNA”
T	Thymin
Tab.	Tabelle
TGF-β	“transforming growth factor-β”
U	“unit”
UV	Ultraviolett
V	Volt
z.B.	zum Beispiel

1. Einleitung

Bedingt durch seine Trage-, Halte-, Stütz- und Schutzfunktion stellt der Knochen ein äußerst widerstandsfähiges Gewebe dar und zählt somit zu den härtesten Geweben des menschlichen Körpers. Zudem besitzt er entscheidende, dem Stoffwechsel zugehörige Aufgaben. So ist er der wichtigste Kalziumspeicher des Körpers, der durch sehr kontrollierte Mobilisation den jeweilig benötigten Kalziumspiegel gewährleistet. Diese Gegebenheit ist Ergebnis eines von unterschiedlichsten Faktoren beeinflussten Systems, welches durch geringe Schwankungen zu großen Veränderungen der Kalziumhomöostase führen kann.

Ziel der Forschung ist es, die an diesem hoch komplexen Prozess mitwirkenden Gene, Zellen und systembeeinflussenden Faktoren in ihren Funktionen besser zu verstehen.

1.1 Aufbau des Knochengewebes

Der Knochen wird gebildet aus einer Substantia compacta und einer Substantia spongiosa. Die Substantia compacta legt sich als äußere schützende Schicht um die innen gelegene Substantia spongiosa, die ein schwammartiges Balkengeflecht bildet. Innerhalb der Substantia compacta befinden sich Osteone, die aus einem Zentralkanal, Osteozyten und Kollagenfasern bestehen. Die Osteozyten und Kollagenfasern bilden Lamellen, die sich konzentrisch um den Zentralkanal anordnen. Aufgrund der unterschiedlichen Faserverläufe der einzelnen Lamellen wird eine hohe Festigkeit gewährleistet. Trotz struktureller Gemeinsamkeiten ist die Morphologie der Knochen im Körper an ihre Aufgaben angepasst. Die langen Röhrenknochen, von denen der größte Materialanteil für die Versuche, die in dieser Promotionsarbeit präsentiert werden, stammt, sind in drei Abschnitte gliederbar: 1) die Epiphysen, die sich an den jeweiligen Enden des Knochens befinden, 2) die Diaphyse, die den Mittelteil des Knochens bildet und 3) die Metaphyse, die als Bindeglied zwischen Epi- und Diaphyse fungiert. Zudem wird der Knochen bis auf die mit Knorpel überzogenen Stellen vom Periost umgeben. Unterhalb der Substantia compacta befindet sich das Endost. Beide Schichten bestehen aus Bindegewebe (Junqueira und Carneiro 2004).

1.2 “Remodeling“

Unter dem Begriff “Remodeling“ wird der Knochenumbau verstanden, wobei durch gleichzeitige Knochensynthese und Knochenresorption alte Knochenanteile ersetzt werden. Dieser Umbauprozess ist vor allem dort erforderlich, wo sich die statischen Verhältnisse ändern. Zuständig für die Umbauvorgänge sind Knochenzellfunktionseinheiten, die aus Osteoblasten für die Knochensynthese und aus Osteoklasten für die Knochenresorption bestehen (Parfitt 1994, Jilka 2003, Lemaire et al. 2004). Der folgende Abschnitt soll Aufschluss über die am Knochenstoffwechsel beteiligten Zellen geben.

1.3 Zellen des Knochengewebes

Zu den Zellen des Knochens gehören reife Osteoblasten, “Bone-Lining-Cells“, Osteozyten und Osteoklasten. Abgesehen von den Osteoklasten entwickeln sich die anderen Zelltypen aus Vorläuferzellen, die sich zu Osteoprogenitorzellen weiterdifferenzieren. Die Osteoprogenitorzellen

wiederum bilden den Zellpool für eine der drei Zelltypen. Es besteht ein gesicherter Anhalt dafür, dass sich die Vorläuferzellen und andere mesenchymale Zellen, wie beispielsweise Adipozyten, Fibroblasten, Chondroblasten aus pluripotenten Knochenmarksstammzellen differenzieren (s. 1.5). Zusätzliche Aspekte der Entwicklung von Osteoblasten werden im Kapitel 1.6 erläutert.

1.3.1 Osteoblasten

Zu den Charakteristika weit entwickelter Osteoblasten gehören ihre kuboidale Form, ein ausgeprägter Golgi-Apparat und ein stark ausgebildetes endoplasmatisches Retikulum (Marks und Popoff 1988). In Zellkulturen wird eine morphologische Verwandtschaft zu Fibroblasten beobachtet. Sie unterscheiden sich jedoch erheblich in ihren funktionellen Eigenschaften, da Osteoblasten unter anderem fähig zur Bildung einer mineralisierten extrazellulären Matrix sind. Ihre Hauptfunktion besteht in der Sekretion von Matrixproteinen und der Mineralisierung des Osteoids (Anderson 1989, Ducy et al. 2000). Neben den knochenbauenden Funktionen ist der Osteoblast auch an der Knochenresorption beteiligt, indem er Osteoklasten aktiviert (Chambers und Fuller 1985, Teitelbaum 2000). Zur Charakterisierung der osteoblastären Differenzierung wird u.a. das Expressionsmuster der alkalischen Phosphatase (AP), Kollagen 1, Osteokalzin (OC), "runt-related transcription factor-2" (RUNX2) und Osterix (OSX) studiert, wobei RUNX2 und OSX essenzielle Transkriptionsfaktoren der osteoblastären Differenzierung sind (s. 1.6.1 und 1.6.2) (Ducy et al. 1997, Nakashima et al. 2002, Harada S und Rodan 2003, Schröder et al. 2005). Viele Gene der Osteoblasten werden auch von anderen Zellen wie den Fibroblasten oder Chondrozyten exprimiert. Dennoch sind Proteine bekannt, die spezifisch für Osteoblasten sind. Dazu gehören OC und OSX.

1.3.2 Osteozyten

Osteozyten entwickeln sich aus Osteoblasten und sind gänzlich von Knochengrundsubstanz umgeben. Während dieses Differenzierungsprozesses vom Osteoblasten zum Osteozyten nimmt die Anzahl der Zellorganellen drastisch ab, so dass angenommen wird, dass die Syntheseleistung der Osteozyten gering ist (Gartland et al. 2004). Osteozyten stehen charakteristischerweise über sich in Knochenkanälchen befindenden Zellfortsätzen in Verbindung, die mittels "gap junctions" einen Stoffaustausch von Ionen und kleinen Molekülen ermöglichen (Aguirre et al. 2006). Es gibt Hinweise dafür, dass die Osteozyten mechanorezeptive Eigenschaften besitzen und dadurch beim Knochenumbau während der Anpassung an wechselnde Belastungen beteiligt sind (Aarden et al. 1994, You et al. 2004, Aguirre et al. 2006). Hierbei spielt der programmierte Zelltod in den Osteozyten eine zentrale Rolle (Robling et al. 2006).

1.3.3 "Bone-Lining-Cells"

Dieser flache Zelltyp kommt auf den nicht am "Remodeling" teilnehmenden Oberflächen des Knochens vor (Gartland et al. 2004) und kommuniziert über "gap junctions" mit Osteoblasten, Osteozyten und Osteoklasten (Robling et al. 2006, Eriksen et al. 2007). Sie besitzen ein schwach ausgeprägtes endoplasmatisches Retikulum und zeigen insgesamt nur eine geringe Anzahl von Zellorganellen (Miller 1987, Everts et al. 2002). Ihre genauen Aufgaben sind bis jetzt nicht bekannt. Es gibt Hinweise, die

darauf hindeuten, dass “Bone-Lining-Cells“ Einflüsse im Prozess des Knochenumbaus besitzen (Parfitt 1994, Everts et al. 2002, Eriksen et al. 2007). Es konnte gezeigt werden, dass sie demineralisiertes Kollagen entfernen, das von Osteoklasten unverdaut blieb (Everts et al. 2002). Auch ein Dedifferenzieren in osteoblastäre Zellen nach mechanischem Stimulus wurde beobachtet (Chow et al. 1998, Robling et al. 2006).

1.3.4 Osteoklasten

Die Osteoklasten entwickeln sich aus hämatopoetischen Stammzellen des Knochenmarks (Lemaire et al. 2004). Sie sind vielkernige, bewegliche und basophile Riesenzellen. Zur Differenzierung von Osteoklasten sind die Osteoblasten von besonderer Bedeutung, da sie zwei essenzielle Faktoren, M-CSF (macrophage colony-stimulating factor) und RANKL (receptor for activation of nuclear factor kappa B-ligand) synthetisieren (Ross und Christiano 2006). Diese beiden Faktoren binden an die Rezeptoren der Osteoklastenvorläuferzelle und aktivieren dadurch die osteoklastäre Differenzierung. Osteoblasten greifen im Differenzierungsprozess der Osteoklasten aber nicht nur fördernd, sondern auch hemmend ein, indem die Osteoblasten ein anderes Protein, OPG (Osteoprotegerin) sezernieren (Teitelbaum 2000). Die Hauptaufgabe der Osteoklasten besteht in der Knochenresorption (Chambers 1985). Dazu werden lysosomale Enzyme synthetisiert, mit denen die verkalkte Grundsubstanz des Knochens abgebaut wird (Teitelbaum 2000, Ross und Christiano 2006). Als Ergebnis der resorptiven Vorgänge entstehen sogenannte “Howshipsche Lakunen“ (Pfeilschifter 1990).

1.4 Knochengrundsubstanz

Die Knochengrundsubstanz setzt sich aus Mineralien (50%), organischen Verbindungen (25%) und Hydrationswasser (25%) zusammen.

1.4.1 Mineralien

Hierbei spielen Kalziumphosphatverbindungen, die im Knochen in Form von Apatitkristallen vorliegen, die entscheidende Rolle (Boskey und Posner 1984). Dabei handelt es sich überwiegend um Hydroxylapatitkristalle, die von einem Hydratmantel umgeben sind. Er ist für den Ionenaustausch zwischen den Kristallen und der Umgebung entscheidend. Diese Eigenschaft ist Grundvoraussetzung, um Kalzium zu mobilisieren oder einzulagern. Insgesamt sind ca. 99% des gesamten Kalziumvorrates im Knochen gespeichert.

1.4.2 Organische Verbindungen

Zu den organischen Verbindungen gehören kollagene und nicht-kollagene Proteine, die die unmineralisierte Knochenmatrix bilden. Kollagen I findet sich in der Knochenmatrix zu 90%, die restlichen 10% werden von nicht-kollagenen Proteinen, wie beispielsweise Osteonectin, Osteopontin und Proteoglykanen, gebildet. Davon sollen die AP und OC, da sie den osteoblastären Phänotyp charakterisieren, im folgenden Text näher beschrieben werden.

1.4.3 Alkalische Phosphatase (AP)

Die AP ist vorwiegend an der äußeren Plasmamembran der Osteoblasten über ein Phosphatidylinositolmolekül gebunden (Moss 1992, Simao et al. 2006) und besitzt enzymatische Funktion. Die genauen Aufgaben der AP sind noch nicht entschlüsselt. Es konnte gezeigt werden, dass sie die höchste Aktivität während der Mineralisation des Knochens aufweist (Golub et al. 1992). Die Tatsache, dass die AP organische Phosphatester spaltet und dadurch für hohe Konzentrationen an anorganischem Phosphat sorgt, deutet auf eine Beteiligung am Mineralisationsprozess hin. Zudem konnte in homozygoten AP-“knock-out“-Versuchen an Mäusen eine ausbleibende Mineralisation des Knochens nachgewiesen werden (Wennberg et al. 2000). Die Serummessung der AP ist möglich und gibt Aufschluss über ihre Aktivität (Wennberg et al. 2000). Es werden alters- und geschlechtsabhängige Unterschiede bezüglich ihrer Aktivität beschrieben (Grundberg et al. 2002, Havill et al. 2006). Da das Expressionsmuster der AP während der osteoblastären Differenzierung einen charakteristischen Verlauf zeigt (Owen TA et al. 1990, Siggelkow et al. 2002, Siggelkow et al. 2004), wird sie als Parameter der Osteoblastendifferenzierung verwendet.

1.4.4 Osteokalzin (OC)

Das auch als Bone-Gla-Protein (BGP) bekannte OC bildet einen großen Teil der nicht-kollagenen Proteine. Es handelt sich dabei um einen späten osteoblastären Marker (Ducy et al. 2000, Siggelkow et al. 2004), da seine Expression erst bei einsetzender Mineralisation beginnt (Grundberg et al. 1984). Die Synthese des OCs ist Vitamin-K-abhängig und kann mittels Vitamin D₃ induziert werden (Price 1989, Viereck et al. 2002). Da die Osteoblasten einen gewissen Prozentsatz des synthetisierten Proteins in das Blut abgeben (Hauschka et al. 1989), kann über den Serumspiegel von OC auf die osteoblastäre Aktivität geschlossen werden. Die genaue Funktion des OCs ist noch nicht bekannt. Es konnte beobachtet werden, dass OC Vorläuferzellen der Osteoklasten chemotaktisch anlockt, so dass OC möglicherweise Einflüsse während der Differenzierung von Osteoklasten besitzt (Glowacki et al. 1991). In OC-“knock-out“-Mäusen ließ sich eine gesteigerte Knochenentwicklung bei uneingeschränkter Knochenresorption detektieren. OC scheint somit im Prozess der Knochenreifung eine wesentliche Rolle zu spielen (Ducy et al. 1996).

1.5 Differenzierung mesenchymaler Stammzellen

Mesenchymale Stammzellen befinden sich im Knochenmark. Sie haben das Potenzial sich unter anderem zu Osteoblasten, Chondrozyten und Adipozyten differenzieren zu können (Owen M 1988, Bianco und Robey 2000, Harada S und Rodan 2003, Gimble und Nutall 2004, Arnold und Caplan 2005). Unter basalen Bedingungen zeigte sich in Untersuchungen an immortalisierten klonalen Stromazellen des Knochenmarks, dass es in den Zellen gleichzeitig zur Expression von Genen der chondrozytären Zelllinie, wie z.B. Kollagen Typ 2, 9 und 10, der adipozytären Zelllinie, wie beispielsweise “peroxisome proliferator activated receptor gamma 2“ (PPAR γ 2), “CCAAT / enhancer binding protein alpha“ (C/EBP α), “fatty acid binding protein“ (aP2), Lipoproteinlipase (LPL) und Leptin, und der osteoblastären

Zelllinie, wie “runt-related transcription factor-2“ (RUNX2), OC, AP und Kollagen I, kam (Ahdjoudj et al. 2001). Werden die mesenchymalen Stammzellen adipozytär, chondrozytär oder osteoblastär stimuliert, so kommt es zur vermehrten Expression der entsprechenden Marker der stimulierten Zelllinie, während die Marker der anderen Zelllinien gleichzeitig supprimiert werden (Ahdjoudj et al. 2001). Somit ist ein gemeinsamer Ursprung dieser Zelllinien sehr wahrscheinlich. Es konnte nachgewiesen werden, dass während der beginnenden Expression adipozytärer Marker die Expression von osteoblastären Markern beibehalten wird (Ahdjoudj et al. 2001). Diese Beobachtung deutet auf einen zunächst parallelen Differenzierungsverlauf der osteoblastären und adipozytären Zelllinien hin. Die Trennung der beiden Differenzierungswege scheint erst spät zu erfolgen (Ahdjoudj et al. 2001) (s. Abb. 1). Die Differenzierung dieser Zellen entlang bestimmter Differenzierungswege steht in engem Zusammenhang mit lokalen, hormonellen und mechanischen Faktoren. Sie führen zur Aktivierung spezifischer Transkriptionsfaktoren (Ahdjoudj et al. 2004). RUNX2 und OSX sind die entscheidenden Transkriptionsfaktoren während der osteoblastären Differenzierung (Ducy et al. 1997, Ducy et al. 2000, Nakashima et al. 2002, Gersbach et al. 2004). Eine zentrale Funktion nehmen C/EBP und PPAR γ hinsichtlich der adipozytären Entwicklung ein (Rosen und Spiegelman 2000, Akune et al. 2004). Des Weiteren ist bekannt, dass die mesenchymalen Zelllinien ein Transdifferenzierungspotential besitzen und somit beispielsweise vom osteoblastären Phänotyp zum adipozytären Phänotyp wechseln können (Nöth et al. 2002). Aber nicht nur ein Transdifferenzierungs- und Differenzierungspotenzial, sondern auch ein Dedifferenzierungspotenzial zurück zu mesenchymalen Stammzellen konnte nachgewiesen werden (Song und Tuan 2004).

Abb. 1: **Differenzierungspotential von humanen mesenchymalen Stammzellen** des Knochenmarks (modifiziert nach Harada S und Rodan 2003, S. 352).

1.6 Differenzierung der Osteoblasten

Osteoblasten differenzieren sich aus mesenchymalen Stammzellen, die zugleich Vorläuferzellen weiterer Zelllinien, wie beispielsweise der Adipozyten, Chondrozyten und Myozyten, darstellen (Bianco und Robey 2000, Harada S und Rodan 2003, Gimble und Nutall 2004, Arnold und Caplan 2005). Der Prozess der osteoblastären Differenzierung lässt sich in drei Phasen gliedern: 1. Proliferationsphase, 2. Matrixreifungsphase und 3. Mineralisationsphase. Die Proliferationsphase ist durch Expression bestimmter Proliferationsgene, wie z.B. c-myc und c-fos, DNA-bindender Histone und Kollagen I, charakterisiert. Die Matrixreifungsphase ist gekennzeichnet durch eine maximale Genexpression der AP und einen starken Anstieg der Genexpression von OC. Während der Mineralisationsphase werden Gene wie OC, Osteopontin und Knochensialopontin maximal exprimiert (s. Abb. 2). Dieses Differenzierungsmodell der Osteoblasten entstand nach Versuchen an Rattenkalvarienzellen (Stein et al. 1989, Owen TA et al. 1990).

Abb. 2: **Differenzierungsmodell primärer Rattenosteoblasten.** Abgebildet ist der sequenzielle Ablauf der Differenzierung anhand von Proliferation (Zellzahl) und Genexpression osteoblastencharakteristischer Proteine (Osteokalzin, Kollagen I, alkalische Phosphatase) (modifiziert nach Owen TA et al. 1990, S. 422).

Das Prinzip der sequenziellen Differenzierung konnte auch in anderen Zellsystemen, wie beispielsweise in Mäuseosteoblasten (Quarles et al. 1992) oder in primären humanen Osteoblasten (Siggelkow et al. 1999a, Siggelkow et al. 2004), nachgewiesen werden. Für die osteoblastäre Differenzierung gelten RUNX2 und OSX als absolut essenzielle Transkriptionsfaktoren, deren Bedeutung nachfolgend (s. 1.6.1 und 1.6.2) beschrieben wird.

1.6.1 “Runx-related transcription factor-2” (RUNX2)

Der Transkriptionsfaktor RUNX2 ist für die osteoblastäre Entwicklung essenziell und wurde 1997 erstmalig von Ducy et al. und Komori et al. beschrieben. Es sind zwei hauptsächliche Isoformen, RUNX2 I und RUNX2 II, bekannt (Xiao et al. 1998, Stock und Otto 2005). Er gehört mit den

Transkriptionsfaktoren RUNX1 und RUNX3 zur “runt-domain“-Genfamilie. Die Hauptaufgaben von RUNX1 und RUNX3 liegen in der Hämatopoese und in der Entwicklung von propriozeptiven Neuronen (Komori 2005). RUNX2 hingegen gilt als Regulatorprotein während der osteoblastären und späten chondrozytären Differenzierung, das selbst unter vielen Einflüssen steht. Es sind Co-Repressoren, Co-Aktivatoren, Transkriptionsfaktoren und extrazelluläre Faktoren bekannt, die erheblichen Einfluss auf die Genexpression von RUNX2 nehmen (Schröder et al. 2005). In diesem Zusammenhang konnte unter anderem “bone morphogenetic protein-2“ (BMP2) als Faktor nachgewiesen werden, der die Genexpression von RUNX2 stimuliert (Gori et al. 1999). Der Transkriptionsfaktor PPAR γ 2, ein früher Faktor der adipozytären Entwicklung, hemmt beispielsweise die Genexpression von RUNX2 in osteoblastären Zellen (Jeon et al. 2003, Kang et al. 2005) (s. Abb. 3). In-vivo-Versuche an Mäusen haben gezeigt, dass RUNX2 nicht nur bei biochemischen Regulationsprinzipien, sondern auch bei physiologischer mechanischer Beanspruchung ein Zielfaktor zu sein scheint, der die Aktivität der Osteoblasten reguliert (Salingcarnboriboon et al. 2006).

In homozygoten RUNX2-“knock-out“-Versuchen an Mäusen konnte keine osteoblastäre Differenzierung nachgewiesen werden (Komori et al. 1997). Auch die chondrozytäre Entwicklung wurde gehemmt, wobei der Zeitpunkt des Arrests im Differenzierungsweg später lag als bei der Entwicklung der Osteoblasten (Inada et al. 1999). Da in diesen homozygoten RUNX2-“knock-out“-Mäusen über eine forcierte Expression von RUNX2 durch den Kollagen-Typ-II-Promotor eine terminale chondrozytäre Entwicklung induzierbar war (Takeda et al. 2001), konnte die Annahme, dass RUNX2 ein ausschließlich für die osteoblastäre Differenzierung essenzieller Faktor sei, widerlegt werden. Das Fehlen von RUNX2 in den “knock-out“-Mäusen führte zu einer Suppression spezifischer osteoblastärer Marker (Ducy et al. 1997, Salingcarnboriboon et al. 2006), so lag die Genexpression von OC nahe der Nachweisgrenze. Die AP lag in ihrer Expression ebenfalls unter den Normalwerten, aber noch deutlich oberhalb der Nachweisgrenze (Komori et al. 1997). Den stärkeren supprimierenden Effekt des RUNX2-“knock-out“ auf die Genexpression von OC ist damit begründbar, dass RUNX2 an die Promotorregion von OC bindet (Geoffroy et al. 1995, Komori 2005). Insgesamt werden durch den homozygoten RUNX2 “knock-down“ 41 Gene beeinflusst (Vaes et al. 2006).

Heterozygote RUNX2-“knock-out“-Versuche an Mäusen spiegeln ein beim Menschen bekanntes Krankheitsbild, Dysplasia Cleidocranialis (CCD) (Mundlos et al. 1997), wieder, wobei sich die gestörte Knochenentwicklung auf Abnormalitäten während der desmalen Ossifikation beschränkt. Dieser Phänotyp ist unter anderem durch Hypoplasie der Klavikula, offene Fontanellen und Kleinwüchsigkeit charakterisiert (Morava et al. 2002).

Die Überexpression von RUNX2 im Mausmodell zeigte überraschenderweise ebenfalls eine gestörte osteoblastäre Differenzierung, die mit herabgesetzter Expression osteoblastärer Marker und multiplen Frakturen assoziiert war (Liu W et al. 2001). Eine der Hauptursachen des osteopenischen Phänotyps ist wahrscheinlich eine verstärkte Knochenresorption, die durch eine gesteigerte Osteoklastenaktivität hervorgerufen wird (Geoffroy et al. 2002). Unterstützt wird diese von Geoffroy im Jahre 2002 publizierte Beobachtung durch die Tatsache, dass RUNX2 die Differenzierung von Osteoklasten durch Induktion

von RANKL und Inhibition von OPG anregt (Enomoto et al. 2003). Die Überexpression von RUNX2 in vitro führte interessanterweise zu einer vermehrten Mineralisation und Genexpression osteoblastärer Marker (Byers et al. 2002). Die Diskrepanz der Ergebnislage hinsichtlich der in-vivo- und in-vitro-Versuche spiegelt die Komplexität der Regulation von RUNX2, für eine geregelte Knochenentwicklung, wider.

Abb. 3: **Interaktionsschema zwischen Transkriptionsfaktoren** der osteoblastären und adipozytären Differenzierung.

1.6.2 Osterix (OSX)

OSX ist ein "zinc finger-containing" Transkriptionsfaktor, der in allen sich desmal oder enchondral entwickelnden Knochen exprimiert wird und als früher osteoblastärer Marker zählt (Nakashima et al. 2002). In OSX-"knock-out"-Mäusen fehlte jegliche osteoblastäre Differenzierung. Auch die Expression osteoblastärer Marker wie OC war nicht detektierbar. Die chondrozytäre Entwicklung hingegen blieb durch den "knock-out" von OSX unbeeinflusst (Nakashima et al. 2002). Da in RUNX2-"knock-out"-Mäusen auch Effekte auf die Knorpeldifferenzierung nachgewiesen wurden (Inada et al. 1999), ist OSX nach heutigem Wissen der spezifischere osteoblastäre Marker. Es ist bekannt, dass der osteoblastäre und chondrozytäre Differenzierungsweg eng miteinander verknüpft sind (Lefebvre und Nakashima 2001). Sobald es zur Genexpression von OSX in sogenannten Osteochondroprogenitorzellen kommt, werden die chondrozytären Marker SOX9 und SOX5 herunterreguliert. Beim "knock-out" von OSX hingegen werden spezifische chondrozytäre Marker vermehrt exprimiert (Nakashima und Crombrughe 2003, Lian et al. 2004). Die Gegebenheiten, dass der Faktor OSX in RUNX2-"knock-out"-Versuchen nicht exprimiert wird, RUNX2 aber in OSX-"knock-out"-Versuchen nachweisbar ist, lassen den Schluss zu, dass OSX im Differenzierungsweg eines Osteoblasten später als RUNX2 exprimiert wird (Nakashima et al. 2002).

Es konnte gezeigt werden, dass die Überexpression von OSX unter osteogenen Bedingungen in embryonalen Stammzellen (denoted Tg2a E14) eine vermehrte Genexpression der osteoblastären Marker OC und RUNX2 zur Folge hatte (Tai et al. 2004), wobei der stimulierende Effekt auf den Transkriptionsfaktor RUNX2 bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht erklärbar ist, da OSX "downstream" von

RUNX2 liegt. Gleichzeitig wurde ein hemmender Einfluss durch die Überexpression von OSX auf den Transkriptionsfaktor PPAR γ 2 beobachtet (Tai et al. 2004). In mesenchymalen Stammzellen von Mäusen wurde ebenfalls ein Anstieg der Genexpression von OC und zusätzlich der AP nachgewiesen. Der stimulierende Einfluss von OSX auf die Expression von RUNX2 konnte in diesen Zellen nicht verifiziert werden (Tu et al. 2006).

Das Zusammenspiel der beiden Transkriptionsfaktoren OSX und RUNX2 ist noch unklar. Die “knock-out“-Experimente deuten darauf hin, dass die Genexpression von OSX in enger Abhängigkeit zur Genexpression von RUNX2 steht (Nakashima et al. 2002). Dennoch scheinen unabhängige Transduktionswege zu existieren, die eine Expression von OSX induzieren, da in homozygoten RUNX2-“knock-out“-Mäusen die alleinige Zugabe von BMP2 zu einer Genexpression von OSX führte (Lee MH et al. 2003). Ein direkter Zusammenhang der beiden Transkriptionsfaktoren OSX und RUNX2 ist aber sehr wahrscheinlich, da erst kürzlich in der Zelllinie ATDC5 erstmalig nachgewiesen werden konnte, dass RUNX2 in einem DNA (Desoxyribonukleinsäure)-Element im OSX-Promotor bindet und dadurch die Genexpression dieses Promotors erhöht wurde (Nishio et al. 2006).

1.7 Differenzierung der Adipozyten

Adipozyten entwickeln sich aus mesenchymalen Stammzellen (s. 1.5) (Bianco und Robey 2000, Harada S und Rodan 2003, Gimble und Nutall 2004, Arnold und Caplan 2005). Der Differenzierungsweg der Adipozyten unterliegt vielen transkriptionalen Einflüssen (MacDougald und Mandrup 2002). Eine zentrale Funktion spielt im adipozytären Differenzierungsprozess der Transkriptionsfaktor PPAR γ 2 (Mueller et al. 2002). Es sind zwei Isoformen, PPAR γ 1 und PPAR γ 2, bekannt, wobei PPAR γ 2 hauptsächlich in Fettzellen exprimiert wird (Zhu et al. 1995). Es existieren Liganden (endogene und pharmakologische), die mit unterschiedlicher Affinität die Genexpression von PPAR γ 2 induzieren. Thiazolidindione, die als Pharmaka bei der Behandlung des Diabetes mellitus Typ 2 eingesetzt werden, gehören zu den stärksten Agonisten (Gimble et al. 1996, Lecka-Czernik et al. 1999, Lecka-Czernik et al. 2002). PPAR γ 2 interagiert mit dem osteoblastären Transkriptionsfaktor RUNX2. Bei Überexpression von PPAR γ 2 wird RUNX2 und somit die osteoblastäre Differenzierung gehemmt (Lecka-Czernik et al. 1999, Jeon et al. 2003, Akune et al. 2004). Die Suppression von PPAR γ 2 in embryonalen Mäusestammzellen hingegen führte zur Hemmung der adipozytären Differenzierung, wobei sogar eine spontane osteoblastäre Reifung beobachtet wurde (Akune et al. 2004, Yamashita et al. 2006). Der Transkriptionsfaktor PPAR γ 2 ist für die Expression spezifischer, der Adipogenese zugehöriger Gene verantwortlich. Dazu gehören unter anderem die Lipoproteinlipase (LPL) und das “fatty acid binding protein“ (aP2) (Rosen und Spiegelman 2000). LPL fungiert durch Hydrolisierung von Triglyceriden in einfache Fettsäuren im Lipoproteinstoffwechsel als bedeutendes Enzym. Da es während der Adipozytendifferenzierung exprimiert wird, gilt die LPL als adipozytärer Marker. Schoonjans et al. identifizierten im Jahre 1996 im LPL-Promotor Bindungsregionen für PPAR γ 2. Beim Enzym aP2 handelt es sich um ein Fettsäuren bindendes Protein, das im Zytosol des braunen und weißen Fettgewebes vorkommt (MacDougald und

Lane 1995). Auch für die Aktivierung von aP2 durch PPAR γ 2 sind Bindungsstellen bekannt, so dass PPAR γ 2 die Genexpression von aP2 induzieren kann (Gregoire et al. 1998, Rosen et al. 2000, Thompson et al. 2004). Das “fatty acid binding protein“ zählt somit ebenfalls als Marker des adipozytären Phänotyps. Es wird beschrieben, dass im Differenzierungsweg eines Adipozyten das Protein aP2 als später Marker und LPL als früherer Marker gilt (Nuttall et al. 1998, Gregoire et al. 1998).

1.8 Zellkulturmodelle zur Untersuchung der Differenzierung

Zur Erforschung des Knochenstoffwechsels werden unterschiedliche Zellkultursysteme verwendet, um Informationen über die Funktion und Regulation während der osteoblastären Differenzierung zu gewinnen. Hierzu gehören Untersuchungen an Tumorzelllinien, an experimentell immortalisierten Zellen, an Kulturen isolierter Knochenzellen und an Knochenorgankulturen (Marks und Popoff 1988). Im folgenden Abschnitt werden die beiden verwendeten Zellkultursysteme, Tumorzelllinien und Kulturen isolierter Knochenzellen, mitsamt ihren Vor- und Nachteilen kurz umrissen.

1.8.1 Kulturen isolierter Knochenzellen

Mit diesem System können Forschungsergebnisse einem bestimmten Zelltypus zugeordnet werden. Peck et al. gelangen 1964 erstmalig die Isolation verschiedenster Zellpopulationen aus der Knochenmatrix fetaler Rattenkalvarienzellen unter Verwendung von Kollagenasen (Peck et al. 1964). Eine weitere Technik, die so genannte Explanttechnik, wurde 1983 entwickelt, wobei Osteoblasten aktiv aus manuell zerkleinerten Mäuseknochen auswuchsen (Ecarot-Charrier et al. 1983). Auf den Erkenntnissen dieser beiden Methoden basierend wurden weitere Isolationstechniken etabliert, um Knochenzellen aus humanen Knochenproben zu gewinnen (Auf'm Kolk et al. 1985, Beresford et al. 1984, Gheron und Termine 1985, Wergedal und Baylink 1984).

Vorteile dieses Zellkultursystems bestehen unter anderem in der guten Möglichkeit Differenzierungsvorgänge, die Proteinbiosynthese oder Zellmatrixinteraktionen zu analysieren. Als Nachteil wird die Gefahr der Überwucherung der Osteoblastenkulturen mit Fibroblasten beschrieben (Wong G und Cohn 1974). Auch die Tatsache, dass der osteoblastäre Differenzierungsgrad und das Differenzierungsstadium in Abhängigkeit zur Passage stehen, wird als Nachteil angesehen (Gerstenfeld et al. 1987). Zusätzlich zeigten sich Unterschiede hinsichtlich des Wachstums- und Proliferationsverhalten in vitro im Vergleich zu in-vivo-Bedingungen (Parfitt 1995). Das Etablieren homogener Kulturen wurde bisher noch nicht erreicht. Insbesondere Knochenmarkskulturen und osteoblastäre Kulturen weisen Inhomogenitäten auf, wobei Transdifferenzierungen und Dedifferenzierungen beschrieben werden (Rodan 2003). Dennoch bestehen Anhaltspunkte dafür, dass Zellkulturen aus Knochenfragmenten gewonnen werden können, die die Population in dem Knochenfragment widerspiegeln, da die Oberflächenantigene der Zellen der Knochenfragmente identisch mit den Antigenen der aus diesen Fragmenten auswachsenden Zellen waren (Tuli et al. 2003). Der Phänotyp dieser Zellen wies Antigene für nicht hämatopoetische Zellen (STRO-1, CD73, CD105) und keine Antigene von hämatopoetischen oder endothelialen Zelllinien (CD34, CD45, CD144) auf (Tuli et al. 2003).

1.8.2 Tumorzelllinien

Die Hauptvorteile dieses Zellsystems liegen in den schnellen proliferativen Eigenschaften und in der relativ guten Homogenität dieser Zellpopulationen. Es können aber auch verschiedene Zellklone entstehen, die sich von anderen Klonen beispielsweise in proliferativen Eigenschaften und Expressionseigenschaften unterscheiden. Das Vorhandensein von einer fast unbegrenzten Materialmenge ist ein Vorteil. Charakteristisch für Tumorzellen ist die Aufhebung der Trennung von Proliferation und Differenzierung (Stein und Lian 1993), sodass sich gewonnene Erkenntnisse nicht direkt auf untransformierte Zellen übertragen lassen.

1.9 Der Einfluss von Stimulationsfaktoren auf den Knochenmetabolismus

Der Knochenmetabolismus wird durch eine Vielzahl von Hormonen und Vitaminen reguliert, die die Proliferation und Differenzierung der Osteoblasten beeinflussen. Die Substanzen, die im Rahmen dieser Arbeit verwendet wurden, sollen im folgenden Abschnitt kurz beschrieben werden.

1.9.1 “Transforming growth factor- β ” (TGF- β)

Der Wachstumsfaktor TGF- β stellt ein Zytokin dar, das speziell Wachstum und Differenzierung unterschiedlicher Zellen reguliert. In vielen Publikationen ist der inhibierende Effekt auf die Adipogenese und Myogenese von TGF- β beschrieben. Des Weiteren ist bekannt, dass TGF- β ein Stimulans der chondrozytären und osteoblastären Differenzierung darstellt (Joyce et al. 1990, Massague 1990, Lee KS et al. 2000, Locklin et al. 1999, Fromigue et al. 2004), wobei OC und AP und somit die späte osteoblastäre Differenzierung gehemmt werden (Moerman et al. 2004). Hervorzuheben ist seine Rolle im Remodelingprozess des Knochens. Dabei wird die Aktivität der Osteoklasten und Osteoblasten reguliert. In diesem Zusammenhang werden Knochenvorläuferzellen, die Kollagensynthese und die Matrixreifung durch TGF- β stimuliert (Kimura et al. 1989, Hock et al. 1990, Mundy 1991). Eine vermehrte Freisetzung von TGF- β wird während der Knochenresorption beobachtet (Itoh et al. 2001). TGF- β ist möglicherweise ein Induktor der Apoptose reifer Osteoklasten (Hughes et al. 1996) und scheint über chemotaxische Einflüsse multipotente mesenchymale Vorläuferzellen anzulocken (Makhijani et al. 2005).

1.9.2 “Bone morphogenetic protein-2” (BMP2)

BMP2 gehört zur Zytokingruppe der “bone morphogenetic proteins“. Sie wurden als osteogene Stimulanzien identifiziert, da sie zu extraskelletalen Knochenbildungen führten (Urist 1965, Schmitt et al. 1999). Insgesamt sind über 20 Proteine dieser Zytokingruppe identifiziert worden. Sie haben einen wichtigen Einfluss während der osteoblastären Differenzierung in vivo und in vitro (Hogan 1996, Sykaras und Opperman 2003). Die Überexpression von BMP2 hemmt die Proliferation in osteoblastären Zellen. Späte Marker der Knochenentwicklung wie AP und OC wurden durch BMP2 induziert (Huang et al. 2002). Auch die Stimulation zweier für die osteoblastäre Differenzierung essenzieller Transkriptionsfaktoren, RUNX2 und OSX, konnte durch BMP2 beobachtet werden (Celil et al. 2005,

Nöth et al. 2003, Lee MH et al. 2003, Viereck et al. 2002). Die Adipogenese scheint durch BMP2 stimulierbar zu sein (Date et al. 2004), allerdings wurde ebenfalls ein hemmender Effekt von BMPs auf die adipozytäre Differenzierung nachgewiesen (Gimble et al. 1995).

1.9.3 Glukokortikoide

Glukokortikoide werden in der Pharmakotherapie hauptsächlich als Immunsuppressiva eingesetzt. Ihr Nebenwirkungsspektrum ist sehr weitreichend. In diesem Zusammenhang sind komplexe Effekte auf den Knochen bekannt, wobei insbesondere hohe Konzentrationen ein häufiger Grund für Osteopenien und Osteoporose mit Fraktur sind (Canalis 2000). Auch wenn verschiedene Mechanismen des Wirkprinzips von Glukokortikoiden bekannt sind, so bleiben die genauen Wirkungsweisen noch verborgen. Paradox erscheint die Gegebenheit, dass Steroide einerseits zu einer Stimulation der Knochenresorption, zur Abnahme der Knochendichte und zur Suppression von osteoblastenspezifischen Markern, wie Kollagen I und OC, führen (Delany et al. 1994) aber andererseits werden den Steroiden hinsichtlich der Osteogenese stimulierende Eigenschaften zugesprochen, da sich humane Knochenmarkszellen durch Dexamethason zum osteoblastären Phänotyp differenzierten. Auch ein Anstieg der Genexpression der AP, ein osteoblastärer Marker, konnte nachgewiesen werden (Cheng et al. 1994, Beloti und Rosa 2005). In primären humanen Osteoblasten wurde nach 24 h stündiger Stimulation mittels Dexamethason ein stimulierender Effekt hinsichtlich der Genexpression von RUNX2 und ein hemmender Einfluss auf die Genexpression von OC beobachtet (Viereck et al. 2002). Die Beobachtung, dass essenzielle Transkriptionsfaktoren wie RUNX2 durch Steroide stimuliert werden, konnte 2004 bestätigt werden, wobei zusätzlich der Transkriptionsfaktor OSX stimuliert wurde (Igarashi et al. 2004). Dennoch sind auch gegenteilige Ergebnisse publiziert worden. So konnte in Stammzellen eine supprimierende Wirkung von Dexamethason in Bezug auf die Genexpression von RUNX2 und gleichzeitig eine Induktion des Transkriptionsfaktors PPAR γ 2 nachgewiesen werden (Li et al. 2005).

Obgleich die Widersprüche hinsichtlich der Wirkungsweisen auf die osteoblastäre Differenzierung nicht vollends erklärbar sind, zählen Glukokortikoide als potente osteoblastäre Stimulatoren, die in vielen Zellkultursystemen Anwendung finden.

Zusätzlich konnte eruiert werden, dass Dexamethason einen stimulierenden Einfluss auf die Adipogenese in Knochenmarkszellen (Bennett et al. 1991, Yin et al. 2006) und pHOB (Nutall et al. 1998) besitzt, wobei die Dosierung hinsichtlich der adipozytären Stimulation um etwa den Faktor 100 höher liegt als bei der osteoblastären Stimulation.

1.9.4 Vitamin D₃

Vitamin D kommt in unterschiedlichen chemischen Formen vor, wobei das 1,25-Dihydroxyvitamin D₃ die biologisch aktive Form darstellt. Es beeinflusst den Phosphat- und Kalziumstoffwechsel am Darm, am Knochen und in den Nieren (Suda et al. 1990). Im Gastrointestinaltrakt führt Vitamin D₃ zur gesteigerten Kalzium- und Phosphatresorption. In den Nieren kommt es ebenfalls zur vermehrten Kalziumaufnahme, aber im Gegensatz zum Gastrointestinaltrakt wird hier Phosphat ausgeschieden. Im Knochen werden die

Osteogenese und die Mineralisation des Osteoids gefördert (Haussler et al. 1997, Suda et al. 2003). Durch Vitamin D₃ kann in pHOB die Genexpression von RUNX2 und OC induziert werden (Siggelkow et al. 1999b, Viereck et al. 2002). Es existieren weitere Arbeiten, die eine Stimulation osteoblastärer Marker bestätigen, so dass Vitamin D₃ als Induktor der Differenzierung der Osteoblasten anzusehen ist. Der Effekt von Vitamin D₃ hinsichtlich der Adipogenese wird kontrovers diskutiert, da stimulierende Einflüsse (Kelly und Gimble 1998, Duque et al. 2004) und antagonisierende Wirkungen (Bellows et al. 1994) nachgewiesen wurden.

1.9.5 Vitamin C

Das wasserlösliche Vitamin C ist für die Hydroxylierung von Prolin- und Lysinresten im Kollagen essenziell und trägt dadurch zur Stabilitätserhöhung der extrazellulären Matrix bei. Ein Mangel an Vitamin C führt zu der Erkrankung Skorbut, die erstmalig von Jaques Cartier 1536 beschrieben wurde (Major 1945).

Ein stimulierender Effekt von Vitamin C auf die osteoblastäre Differenzierung konnte durch Induktion der Kollagensynthese und der AP (Franceschi und Young 1990) nachgewiesen werden, die in Abhängigkeit zur Ascorbinsäurekonzentration steht (Owen TA et al. 1990). In-vivo-Untersuchungen mit Vitamin C Mangel zeigten eine niedrigere Knochendichte mit verminderter Mineralisierung und Kollagensynthese (Kipp et al. 1996). Zusätzlich ließ sich eine arretierte osteoblastäre Differenzierung feststellen (Mahmoodian et al. 1996). Der fördernde Einfluss auf die Knochenentwicklung gilt als gesichert, so dass Vitamin C in Differenzierungsmodellen als osteogener Induktor verwendet wird. Problematisch ist die Instabilität von Vitamin C in Lösung, so dass das verwendete Vitamin C erst unmittelbar vor der Stimulation in Wasser gelöst wurde. In den letzten Versuchen wurde Vitamin-C-Phosphat zur Stimulation benutzt, da es sich hierbei um ein sehr stabiles Ascorbinsäurederivat handelt (Takamizawa et al. 2004).

1.9.6 β -Glycerophosphat (β -GP)

β -Glycerophosphat ist ein organisches Phosphat, das in knochenbildenden Zellen die Mineralisierung induziert. Dabei dient β -GP wahrscheinlich der AP als Substrat (Tenenbaum et al. 1992). Zusätzlich konnte ein lokaler Anstieg des anorganischen Phosphates in Abhängigkeit zur Aktivität der AP im Medium gemessen werden, was darauf hinweist, dass β -GP durch die AP hydrolysiert wird (Chung et al. 1992). Die Aktivität der AP kann aber nicht durch die Stimulation mit β -GP induziert werden (Chak et al. 1995). Zur Dosierung und Stimulationsdauer existieren unterschiedliche Ansichten. In diesem Zusammenhang empfehlen Chung et al. (1992) eine Konzentration von 2 mM nicht zu überschreiten. In vielen Versuchen wird jedoch eine höhere Konzentration, z.B. 10 mM, eingesetzt. Feststeht, dass unterschiedliche Dosierungen und Stimulationszeiten verschiedenartige Effekte auf die Mineralisationsprozesse haben (Fratzl-Zelman et al. 1998).

1.10 Fragestellung

Die erste Zielsetzung dieser Arbeit war es, die frühen osteoblastären Marker, RUNX2 und OSX, in das von Siggelkow et al. mit pHOB reproduzierte Owen-Modell (Owen TA et al. 1990, Siggelkow et al. 2004) zu integrieren. Dabei sollten Ergebnisse im Mausmodell, dass OSX “downstream“ von RUNX2 gelegen ist (Nakashima et al. 2002), in pHOB verifiziert werden. In diesem Zusammenhang wurden ein Stammzellmodell und ein Primärkulturmodell etabliert, um einen möglichst frühen Differenzierungsgrad der Osteoblasten zu erhalten.

Im zweiten Teil sollte der Effekt einer Hemmung der RUNX2-Expression hinsichtlich der osteoblastären Differenzierung untersucht werden. Hierzu fand die siRNA-Methodik Anwendung, die in der Zellreihe HOS 58 und in den pHOB etabliert werden musste.

Zum Abschluss dieser Arbeit stand die Fragestellung nach einer möglicherweise klinischen Relevanz von RUNX2 und OSX im Vordergrund. Hierbei wurde die Genexpression der beiden zentralen Transkriptionsfaktoren RUNX2 und OSX in sehr heterogenem Probenmaterial untersucht. Zusätzlich wurden Korrelationen der beiden Transkriptionsfaktoren zu Knochenstoffwechsel-relevanten und histomorphometrischen Parametern durchgeführt.

2 Material und Methoden

2.1 Material

2.1.1 Zellkultur

2.1.1.1 Humane Osteosarkomzelllinie HOS 58

Diese Zelllinie HOS 58 fand ihren Ursprung in einem Osteosarkom eines 21jährigen männlichen Patienten. Das entnommene maligne Gewebe wurde in ein Nacktmäusemodell transplantiert, um eine stabile Zelllinie mit guten Proliferationseigenschaften zu gewinnen. Tatsächlich ist sie charakterisiert durch eine Verdopplungszeit von 36 Stunden, einen cAMP-Anstieg nach Stimulation durch PTH und Osteokalzinsynthese nach Stimulation mit Calcitriol (Schulz et al. 1993, Kern et al. 1990). Experimentell konnte eine Progression des Differenzierungsstatus anhand steigender Genexpression und Proteinbiosynthese des knochenspezifischen Proteins Osteokalzin belegt werden. Dennoch fehlt bis heute der Nachweis einer regulären Mineralisation (Siggelkow et al. 1998a, Siggelkow et al. 2002). Im Gegensatz zu den pHOB ist der Kollagenstoffwechsel nicht durch Vitamin C reguliert (Siggelkow et al. 1998b).

2.1.1.2 Primäre humane Osteoblasten

Hierbei handelt es sich um Zellmaterial, das aus Knochenfragmenten von Patienten etabliert wird. Das Knochenmaterial stammt somit von verschiedenen Patienten (s. Tab.1), welches durch indizierte operative Eingriffe herausgelöst und nach Absprache von den Abteilungen der Orthopädie (Prof. Dr. W. Schultz) und der Unfallchirurgie (Prof. Dr. K. M. Stürmer) des Universitätsklinikum Göttingens zur Verfügung gestellt wurde. Die Entnahmepunkte waren der Femurschaft, Beckenkamm oder das Tibiaplateau. Von jedem Patienten lag eine schriftliche Einverständniserklärung vor, auf Grund dessen die gespendeten Proben zu Forschungszwecken genutzt werden durften. Der Ethikantrag, Antragsnummer: 9/5/01, mit dem Studientitel „Etablierung eines humanen Osteoblasten-Zellkulturmodells zur Untersuchung der Differenzierung während der Zeit in Kultur“ wurde genehmigt.

Tab. 1: Übersicht zum verwendeten Knochenmaterial

Patient	Geschlecht	Alter	Ort der Probengewinnung
S.J.	männlich	30	Spongiosa Beckenkamm
K.G.	männlich	56	Spongiosa Femurschaft
O.N.	männlich	39	Spongiosa Femurschaft
S.C.	weiblich	67	Spongiosa Tibiaplateau
S.A.	weiblich	79	Spongiosa Femurschaft
K.H.	männlich	81	Spongiosa Femurschaft
H.W.	männlich	80	Spongiosa Tibiaplateau
R.J.	weiblich	67	Spongiosa Femurschaft
K.F.	männlich	67	Spongiosa Femurschaft
T.T.	weiblich	67	Spongiosa Femurschaft
U.K.	männlich	72	Spongiosa Tibiaplateau
M.J.	weiblich	65	Spongiosa Femurschaft
A.M.	männlich	57	Spongiosa Femurschaft
F.G.	männlich	67	Spongiosa Femurschaft
T.O.	männlich	25	Spongiosa Beckenkamm
K.S.	männlich	54	Spongiosa Beckenkamm
S.N.	männlich	23	Spongiosa Beckenkamm
S.K.	männlich	20	Spongiosa Beckenkamm
D.K.	männlich	21	Spongiosa Beckenkamm

2.1.1.3 Humane mesenchymale Stammzellen

Die Stammzellen wurden aus dem Knochenmark eines anonymen Spenders gewonnen. Bei den humanen mesenchymalen Stammzellen des Knochenmarks kann keine Expression der hämatopoetischen oder endothelialen Differenzierungsmarker nachgewiesen werden. Demhingegen werden auf der Mehrzahl der Zellen der Rezeptor für den Stammzellfaktor c-kit (CD117), der Korezeptor für “transforming growth factor-(TGF-) β endoglin“ (CD115), die Ektonukleotidase CD73 und das β_1 -Integrin CD29 exprimiert (Wulf et al. 2006, Pittenger et al. 1999, Friedenstein et al. 1974). Der Ethikantrag, Antragsnummer: 17/9/05, mit dem Studientitel „In-vitro-Differenzierung humaner mesenchymaler Vorläuferzellen aus Knochenmarkzellaspiraten“ wurde genehmigt.

2.1.2 Materialien, Lösungen und Medien

2.1.2.1 Zellkultur

Tab. 2: Grundmedien

Medium	Hersteller	Verwendung
Dulbecco's MEM (DMEM)	PAA, Cölbe	pHOB
Iscove-Medium (IMDM)	PAA, Cölbe	HOS 58

Tab. 3: Reagenzien zur Mediumherstellung

Reagenz	Hersteller
FCS (fetales Kälberserum)	PAA, Cölbe
L-Glutamin-Lösung (200mM)	Gibco BRL, Cölbe
Penicillin/streptomycin (Fertiglösung)	Gibco BRL, Cölbe

Tab. 4: Basismedien zur Zellversorgung

Medium	Zusammensetzung
pHOB-Basismedium	500ml Dulbecco's MEM + 50ml FCS + 5ml Pen/Strep-Lösung + 5ml L-Glutamin-Lösung
HOS-Basismedium	500ml ISCOVE-Medium + 50ml FCS + 2,5ml Pen/Strep-Lösung + 5ml L-Glutamin-Lösung

Tab. 5: Reagenzien und Zusammensetzung der Lösung zur Zellgewinnung

Reagenz	Hersteller
Trypanblau	Serva, Heidelberg
2-Mercaptoethanol	Sigma, Taufkirchen
Aqua bidestilliert, steril	Fresenius, Bad Homburg
RLT-Puffer (RNeasy-Mini-Kit)	Qiagen, Hilden
Lösung	Zusammensetzung
Lösung zum Abernten von Zellen	1ml RLT-Puffer + 10µl 2-Mercaptoethanol
Trypanblau-Lösung	9,9g NaCl + 0,5g Trypanblau ad 100,0ml Aqua bidest.
Trypsin-EDTA-Lösung	Gibco BRL, Cölbe

Tab. 6: Chemikalien zur Zellstimulation

Chemikalie	Hersteller
β- Glycerophosphat	Sigma, Steinheim
Vitamin-C-Phosphat	Sigma, Steinheim
"Bone morphogenetic Protein-2"	Promocell,
Dexamethason	Sigma, Steinheim
Vitamin D	Geschenk der Fa. Hoffmann La Roche, Basel

Tab. 7: Gefäße, Geräte und weitere Hilfsmittel für die Zellkultur

Produkt	Hersteller
Erlenmeyerkolben	Schott, Mainz
Einmalpipetten 10ml	Greiner, Nürtingen
Einmalpipetten 20ml	Greiner, Nürtingen
Pipettenspitzen 10µl	Biozym, Hessisch-Oldendorf
Pipettenspitzen 20µl	Biozym, Hessisch-Oldendorf
Pipettenspitzen 100µl	Biozym, Hessisch-Oldendorf
Pipettenspitzen 1000µl	Biozym, Hessisch-Oldendorf
Kryoröhrchen	Nalgene, Hereford, England
Flüssigstickstoff-Kontainer	Cryoson, Schöllkrippen
Behältnis für Kryoröhrchen	Nalgene, Hereford, England
Neubauer Zählkammer	Brand, Wertheim
Mikroplatte 6er "well"	Becton-Dickinson, Franklin Lakes, USA
6cm Platten	Greiner, Solingen
Petrischale 9,4x1,6cm	Greiner, Nürtingen
Kulturflaschen	Nunc, Roskilde, Dänemark
Falconröhrchen	Becton-Dickinson, Mountain View, USA
Cellstar-Röhrchen	Greiner, Nürtingen
Eppendorfcups, 500µl	Eppendorf GmbH, Hamburg
Eppendorfcups, 1500µl	Eppendorf GmbH, Hamburg
Pasteurpipetten	Brand, Wertheim
Kodak Photofilm Ektachrom 64T	Kodak, New York, USA
Sterilfilter Minisart	Sartorius, Göttingen
Absaugpumpe	Schütt, Göttingen
Biofug 13R	Schütt, Göttingen
Mikroskop CK 2 mit Kamera SC 35	Olympus, Tokyo, Japan
Photometer, Gene Quant II	Pharmacia Biotech, Cambridge, England
Fireboy S-1000	Tecnomara, Fernwald
Pipetboy Plus R-301	Tecnomara, Fernwald
Brutschrank Stericult 2000 Inkubator	Forma Scientific, Marietta, Ohio, USA
Kühlzentrifuge Rotixa	Hettich, Tuttlingen
Sterilbank	Schirp, Bork, Westfalen
Wasserbad	Gebr. Rettberg, Göttingen
Zentrifuge Zelllabor	Hettich, Lauenau
Rührer	Gerhardt, Bonn
Minishaker	IKA Works, Wilmington, USA
Skalpel	techno cut, Horsham, U.K.

2.1.2.2 Polymerase-Kettenreaktion

Tab. 8: Materialübersicht zur PCR

Utensil	Hersteller
Primer Sense (20pmol/µl)	MWG-Biotech, Ebersberg
Primer Antisense (20pmol/µl)	MWG-Biotech, Ebersberg
dNTP (0,1µmol/µl); TTP, GTP, CTP, ATP	Roche, Mannheim
dNTP mix (10mM)	10µl von jedem dNTP + 360 µl Ampuwa
PCR-Puffer	Roche, Mannheim
Taq DNA Polymerase (5U/µl)	Roche, Mannheim
Glykogen (50µg/ml)	Roche, Mannheim
Ampuwa, destilliertes Wasser	Fresenius, Bad Homburg
Thermocycler Primus	MWG-Biotech, Ebersberg
PCR Tubes	Biozym, Hessisch-Oldendorf

2.1.2.3 Reverse-Transkriptase-PCR (RT-PCR)

Tab. 9: Materialübersicht zur RT-PCR

Utensil	Hersteller
Primer p(dT) ₁₅ (8nmol)	Roche, Mannheim
RNAse Inhibitor (40U/μl)	Roche, Mannheim
Ampuwa, destilliertes Wasser	Fresenius, Bad Homburg
dNTP (0,1μmol/μl); TTP, GTP, CTP, ATP	Roche, Mannheim
dNTP mix (10mM)	10 μl von jedem dNTP + 360μl Ampuwa
DTT (0,1mol/l)	Invitrogen, Karlsruhe
M-MLV	Invitrogen, Karlsruhe
Thermocycler Primus	MWG-Biotech, Ebersberg
PCR Tubes	Biozym, Hessisch-Oldendorf

2.1.2.4 Agarose-Gelelektrophorese

Tab. 10: Materialien zur Agarose-Gelelektrophorese

Utensil	Hersteller
Ethidiumbromid	Sigma, Taufkirchen
Saccharose	Merck, Darmstadt
Harnstoff	Merck, Darmstadt
Aqua bidestilliert	eigene Herstellung
Borsäure	Sigma, Taufkirchen
Agarose	Biozym, Hessisch-Oldendorf
Tris Base	Roth GmbH, Karlsruhe
Bromphenolblau	Sigma, Taufkirchen
DNA-Längenstandard	Invitrogen, Karlsruhe
EDTA: 0,5M, pH 8	Gibco BRL, Cölbe
Spannungsgerät	Bio RAD, München
Elektrophoresekammer	Bio RAD, München

Tab. 11: Lösungszusammensetzungen für die Agarose-Gelelektrophorese

Lösung	Zusammensetzung
Auftragspuffer	21,00g Harnstoff + 25,00g Saccharose + 100,00μl EDTA 0,5M + 0,05g Bromphenolblau
20x TBE Puffer	216g Tris Base + 110g Borsäure + 40ml EDTA 0,5M + 400ml Ampuwa pH 8 bis 8,2 mit rauchender Salzsäure einstellen ad 1000ml Ampuwa
1x TBE Puffer	1:20 Verdünnung des 20x TBE Puffers mit Ampuwa
Agarosegel	125,00ml des 1x TBE Puffers + 1,85g Agarose
DNA-Längenstandard-mix	50μl DNA Längenstandard + 450μl Ampuwa + 100μl Auftragspuffer

2.1.2.5 Transfektion

Tab. 12: Materialien zur Transfektion

Utensil	Hersteller
Lipofectamine 2000	Invitrogen, Karlsruhe
Plus Reagent	Invitrogen, Karlsruhe
Opti MEM	Gibco, Cölbe
siRNA, GAPDH	Quiagen, Hilden
siRNA, RUNX2 no.1	Quiagen, Hilden
siRNA, RUNX2 no.4	Quiagen, Hilden
siRNA, scrambled	Quiagen, Hilden
Elektroporationsgerät	BIORAD, California, USA
Elektroporier-Küvetten 4mm	EQUIBIO Ltd. GB
Elektroporationspuffer	Ambion, Austin, Texas, USA

2.2 Methoden

2.2.1 Methoden der Zellkultivierung

2.2.1.1 Kultivierung der Osteosarkomzelllinie HOS 58

Da die Zelllinie HOS 58 in flüssigem Stickstoff eingefroren aufbewahrt wird, muss die zur Kultivierung vorgesehene Zellmenge aufgetaut und nachfolgend in Zellkulturflaschen ausgesät werden. Zur Kultivierung wurde Iscove-Medium mit 10% FCS, 1% Glutamin und jeweils 100 U/ml Penicillin und Streptomycin im Brutschrank bei 37°C, 95% Luftfeuchtigkeit und 5% CO₂ verwendet. Nach Erreichen eines bestimmten Konfluenzgrades konnten die Zellen, nachdem sie mit etwa 5 ml PBS (ohne CaCl₂ und MgCl₂) für ca. 30 sek gewaschen (die Zellen sollten bedeckt sein) wurden, um eine Abschwächung der Wirkung des Trypsins durch das Medium zu vermeiden, trypsinisiert und in 6-„well“-Platten ausgesät werden. Zur Trypsinierung wurden 3 ml Trypsin (0,5 g/l Trypsin und 0,2 g/l EDTA) für eine Gewebekulturflasche mit 75 cm² Fläche verwendet und für 3-4 min bei 37°C inkubiert. Die zum Aussäen gewählte Zellzahl betrug 40.000 Zellen/9,6 cm². Die genaue Lebendzellzahl wurde durch Trypanblau in einer Neubauer-Zählkammer bestimmt, wobei 10 µl der trypsinisierten Zellsuspension und 10 µl Trypanblau (0,5-prozentig) in einem Eppendorfgefäß vermischt wurden. Vitale Zellen nehmen den Farbstoff nicht auf, wohingegen tote Zellen durch Aufnahme des Farbstoffs unter einem Mikroskop blau erscheinen.

Die Zellversorgung fand zweimal wöchentlich mit vorgesehenen Nährmedien (2 ml/9,6 cm²) statt.

Bei den Transfektionsversuchen mit Lipofectamine 2000 wurden die Zellen sofort oder 24 h nach Aussaat für einen Zeitraum von 3-24 h transfiziert (s. 2.2.7.2).

Bei den Elektroporationsversuchen wurden die Zellen erst nach Transfektion, die hierbei nur Millisekunden dauerte, ausgesät (s. 2.2.7.1).

2.2.1.2 Kultivierung der primären humanen Osteoblasten

Primäre humane Osteoblasten (pHOB) konnten von Knochenproben, wie bei Siggelkow et al. beschrieben (Siggelkow et al. 1999a), in Anlehnung an die Originalmethode von Beresford (Auf'm Kolk et al. 1985, Beresford et al. 1984) gewonnen werden.

Die Knochenfragmente wurden nach der Entnahme im Operationssaal in entsprechenden Behältnissen mit steriler Kochsalzlösung (0,9% NaCl) gelagert. Nach der Entnahme bestand eine 24 stündige Frist, in der die Aufarbeitung der Knochenmaterials erfolgen sollte. Falls das Knochenfragment nicht sofort verwertet werden konnte, musste es bei 4°C gelagert werden. Zusätzlich wurde die Kochsalzlösung gegen HOB-Nährmedium ausgetauscht. Zum Aufarbeitungszeitpunkt wurde das Knochenmaterial mit Hilfe einer Pinzette und eines Skalpells von kortikalem Gewebe und Fettgewebe befreit. Im Anschluss wurde das Knochenfragment zerkleinert und nachfolgend mit PBS (CaCl_2 und MgCl_2) gewaschen. Nachdem durch mehrere Waschgänge jeglicher Blutinhalte aus dem spongiösen Material entfernt wurde, konnten die kleinen Knochenfragmente in mit 3 ml HOB-Nährmedium (DMEM Medium, 10% FCS, 58,5 µg/ml Glutamin und jeweils 100 U/ml Penicillin und Streptomycin) gefüllten Gewebekulturschalen (10 cm Durchmesser) gegeben werden. Je nach Fragmentmenge konnten 3 – 8 Gewebekulturschalen mit kleinen Knochenfragmenten gefüllt werden. Jetzt konnten die Knochenfragmente letztmalig auf ca. 1 mm Größe verkleinert und sieben Tage inkubiert werden. Die Inkubationsbedingungen lagen bei 37°C, 95% Luftfeuchtigkeit mit 5% CO_2 . Die mit Hilfe der sogenannten Explanttechnik auswachsenden Knochenzellen wurden nach den ersten sieben Inkubationstagen mit 10 ml je Gewebekulturschale (10 cm Durchmesser) HOB-Nährmedium weiter kultiviert, wobei es zweimal wöchentlich gewechselt wurde (Siggelkow et al. 1999a). Bei entsprechendem Konfluenzgrad konnten die Zellen, nachdem sie mit 5 ml PBS (ohne CaCl_2 und MgCl_2) gewaschen wurden, trypsiniert (3 ml/10 cm Gewebekulturschale) und in für Zellversuche ausgewiesene Gewebekulturschalen ausplattiert werden (s. 2.2.1.1). Auch hierbei betrug der mittlere Zellzahlwert 40.000 Zellen pro 6er “well“ (9,6 cm²). Die Bestimmung der vitalen Zellen erfolgte mittels Trypanblau (s. 2.2.1.1). Die nachfolgende Zellkultivierung fand im Brutschrank bei 37°C und unter Luftbefeuchtung von 95% mit 5% CO_2 nach einer etablierten Methode bis zu einer Kulturdauer von 35 Tagen statt (Siggelkow et al. 1999a). Die pHOB wurden zweimal wöchentlich und 24 h vor der Aufarbeitung mit 2 ml HOB-Nährmedium pro 6er “well“ (9,6 cm²) und gegebenenfalls zusätzlichen Stimulationsfaktoren versehen.

2.2.1.3 Kultivierung von Stammzellen

Die Zellen stammten aus dem Knochenmark anonymer Lebendspender und wurden von der Abteilung Hämatologie/Onkologie zur Verfügung gestellt. Diese Zellen wurden zu identischen Bedingungen wie die pHOB kultiviert (siehe 2.2.1.2).

2.2.1.4 Aufarbeitung des Zellmaterials

Die nachstehende Beschreibung der Zellaufarbeitung betrifft sowohl die Zelltypen HOS 58 und pHOB, als auch die Stammzellen. Der degradationsfreie Erhalt von RNA wird durch eine aus RLT-Puffer (RNeasy-Mini-Kit) und 2- Mercaptoethanol im Verhältnis 1 ml : 10 µl bestehenden Lösung gewährleistet, da im RLT-Puffer vorhandenes Guanidin-Isothiocyanat die sofortige Inaktivierung vorhandener RNasen bewirkt. Die Menge der Lösung steht in Proportion zur Größe der abzuerntenden Fläche. Für eine Fläche von 9,6 cm² wurden 350 µl (36,5 µl/cm²) der Lösung verwendet. Nach zweiminütigem Schwenken

konnte die Zelllösung in Eppendorfcups pipettiert werden. Jetzt konnte sofort mit der mRNA-Isolierung begonnen werden. Wenn die Isolation der mRNA zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen sollte, konnte die Zelllösung bei -80°C eingefroren werden.

2.2.1.5 Isolation der mRNA

Zur Isolation der RNA aus dem erhaltenen Zellmaterial wurde der RNeasy-Mini-Kit genutzt. Diese Standardmethode eignet sich, um RNA-Mengen bis zu 100 µg zu isolieren. Im Wesentlichen basiert die Methode auf der Bindung der RNA an eine Silika-Gel-Membran. DNA-Kontaminationen werden durch zahlreiche Waschvorgänge mit anschließenden Zentrifugationen beseitigt. Im letzten Schritt wird die RNA durch RNase freies Wasser aus der Membran gelöst. Die gereinigte RNA ist jetzt zur weiteren Verarbeitung für die RT-PCR (s. 2.2.4) geeignet.

Nachfolgend findet sich eine detaillierte Auflistung der Arbeitsschritte zur RNA-Isolation.

Alle Angaben in µl verstehen sich je Probe:

1. Das Lysat wurde aufgetaut oder direkt aufgearbeitet (s. 2.2.1.4). Falls das Lysat aufgetaut wurde, so musste es zusätzlich nach dem Auftauen 10 min bei 37°C im Wasserbad inkubiert werden.
2. Das Lysat wurde im Verhältnis 1:1 mit 70-prozentigem Ethanol vermischt und gevortext.
3. Das Gemisch wurde auf ein RNeasy spin column (enthält eine Silika-Gel-Membran) pipettiert und 15 sek bei 13.000g zentrifugiert.
4. Jetzt konnten 350 µl RW1-Waschpuffer zugegeben werden. Nachfolgend wurde erneut 15 sek bei 13.000g zentrifugiert.
5. Danach erfolgte die Zugabe von 80 µl DNase-Verdau-Lösung mit sich anschließender 15 minütiger Inkubation bei Raumtemperatur. Jetzt wurde das RNeasy spin column für 15 sek bei 13.000g zentrifugiert.
6. Auf das RNeasy spin column wurden erneut 350 µl RW1-Waschpuffer hinzupipettiert. Danach wurde es für 15 sek bei 13.000g zentrifugiert.
7. Jetzt wurden 500 µl RPE Puffer (mit 100-prozentigem Ethanol versetzt) hinzugegeben. Im Anschluss wurde das RNeasy spin column für 15 sek bei 13.000g zentrifugiert.
8. Danach musste Schritt 7 bei zweiminütiger Zentrifugation wiederholt werden. Anschließend konnte das RNeasy spin column auf ein RNase freies Epicup gesetzt werden.
9. Je nach Zellzahl wurden 20-50 µl RNase freies Wasser hinzupipettiert. Jetzt wurde das RNeasy spin column für 5 min bei Raumtemperatur inkubiert. Danach wurde es letztmalig für 2 min bei 13.000g zentrifugiert, um die an der spin column anhaftenden RNA zu lösen.

10. Jetzt befindet sich gereinigte RNA im Epicup. Das Epicup wird sofort zur Weiterverarbeitung auf Eis gelagert oder bei -80°C eingefroren.

Die folgende photometrische Quantifizierung der RNA gibt Aufschluss über den notwendigen Probeneinsatz, um in der RT-PCR je Probe 250 ng RNA einsetzen zu können.

2.2.1.6 Photometrische RNA Konzentrationsbestimmung

Nach dem Erhalt von gereinigter RNA wurde die genaue Konzentration jeder Probe ermittelt. Dazu ist es notwendig eine Verdünnung, in der Regel 1:50, der Proben herzustellen, um nicht den sämtlichen Probenanteil beim Messen zu verbrauchen. Nachdem das verdünnte Gemisch aus RNA und RNase freiem Wasser in Messküvetten pipettiert wurde, konnte im RNA Photometer die Konzentration bei einer Wellenlänge von 260 nm gemessen werden. Zur Bestimmung des Reinheitsgrades der RNA-Lösung erfolgte zusätzlich die Messung der optischen Dichte (OD) bei einer Wellenlänge von 280 nm. Der errechnete Quotient aus OD 260 nm / OD 280 nm gibt Aufschluss über den Reinheitsgrad der isolierten RNA und sollte zwischen 1,8 und 2,0 liegen. Durch die photometrische Quantifizierung der RNA-Konzentration konnten nachfolgend die einzusetzenden Volumina der entsprechenden Proben errechnet werden. In allen Versuchsreihen wurde ein zur RT-PCR erforderlicher Einsatz von 250 ng RNA je Probe gewählt.

2.2.2 Polymerase-Ketten-Reaktion

Methodik der PCR

Die Polymerase-Ketten-Reaktion (PCR) wurde erstmals von Kary B. Mullis entwickelt (Saiki et al. 1985). Es handelt sich dabei um eine molekularbiologische Standardmethode, die in der Lage ist spezifische DNA-Abschnitte mittels DNA-Polymerase selektiv zu vervielfältigen. Die DNA-Polymerase wurde ursprünglich aus dem thermophilen Eubacterium *Thermus aquaticus* BM isoliert. Im Einzelnen beinhaltet die PCR-Methode folgende Einzelschritte, wobei jeder Amplifizierungsvorgang abhängig von Primern und Zielsequenzen in Dauer und Temperatur variiert:

1. Denaturierung: Zu Beginn wird der DNA-Doppelstrang bei 90°C durch Aufbrechen der Wasserstoffbrücken in zwei antiparallele Einzelstränge getrennt (s. Abb. 4 B).
2. Annealing: Nach einem Abkühlen auf ca. 50°C binden Oligonukleotide, Primer, mit einer Länge von 15-25 Basenpaaren an eine spezifische, den Oligonukleotiden antiparallelen Sequenz (s. Abb. 4 C).
3. Polymerisation: Die jetzt gebundenen Primer dienen der DNA-Polymerase als Startpunkt, um die beiden, je in 5'-3' Richtung, durch Denaturierung entstandenen Einzelstränge zu komplettieren. Unabdingbar sind hierbei dNTP's, die entsprechend, unter Abspaltung zweier Phosphatreste der jeweiligen

dNTP's, des zugrunde liegenden komplementären DNA Stranges, eingebaut werden (s. Abb.4 D und E). Die zwei entstandenen Doppelstränge können erneut, beginnend mit der Denaturierung, diesen Zyklus durchlaufen (s. Abb.4 F und G).

Abb. 4: **PCR Reaktion.** A: DNA-Doppelhelix mit vergrößertem Ausschnitt. B: DNA-Einzelstränge nach erfolgter Denaturierung. C: Bindung der Primer an die Einzelstränge. D und E: Synthetisierung eines komplementären Tochterstranges. F: Abgeschlossene Synthetisierung des Tochterstranges nach einem Zyklusdurchlauf. G: Amplifikationsprodukte nach zweitem Zyklusdurchlauf. A;G;C;T: Basen. — : DNA-Stränge (Primer, Tochterstrang, Matrize). •••: Wasserstoffbrückenbindung. P: DNA-Polymerase.

Diese erläuterten Einzelschritte entsprechen einem Zyklus der PCR. Folglich verdoppelt sich das Nukleinsäurematerial nach jedem Zyklus (exponentielle Vermehrung). Die gewählte Zyklenanzahl lag zwischen 21 und 37 Zyklen. Bei der Wahl der Zyklenanzahl sollte darauf geachtet werden, dass die Plateauphase nicht erreicht wird, da die Vermehrung dabei zunehmend weniger effizient verläuft oder sogar gänzlich zum Erliegen kommt. Der Plateaueffekt beruht unter anderem auf dem Verbrauch der Ausgangssubstanzen wie Primer und dNTP's, der Inhibierung der Enzymaktivität durch Anstieg der

Konzentration von Pyrophosphaten, der thermischen Inaktivierung der DNA-Polymerase und einer Reduktion der Denaturierungseffektivität (Linz et al. 1990, Kainz 2000).

Die Quantifizierung des Expressionsmuster verschiedener Transkripte gelingt durch Anwendung einer semiquantitativen PCR, die, im Gegensatz zur rein qualitativen PCR, in der Lage ist, mit Hilfe eines internen Standards Genexpressionsunterschiede zu erfassen.

Semiquantitative PCR

Die Methode basiert auf dem Prinzip der kompetitiven PCR, in der zwei unterschiedliche DNA-Vorlagen gewählt werden, die um die entsprechenden Primer konkurrieren. Die eine Vorlage besteht aus cDNA (bei der RT-PCR umgewandelte RNA, s. 2.2.4) und die weitere Informationsvorlage entspricht einem internen DNA-Standard, Mimic (s. 2.2.3). Entscheidend ist hierbei, dass beide Informationsvorlagen, cDNA und DNA-Standard, die spezifische Primersequenz des zu amplifizierenden Gens beinhalten, um die Kompetitivität dieser Methode zu gewährleisten.

Primer

Die Primerlänge wird mit etwa 15-25 Basenpaaren gewählt, um sicher zu stellen, dass die gewünschte Sequenz nur einmal innerhalb der gesamten genomischen DNA auftritt, da ansonsten Ungenauigkeiten während der Amplifikation auftreten. Die maximale Länge sollte sich auf ca. 25 Nukleotide beschränken, damit die Hybridisierungszeit sich nicht zu stark verlängert. Die Primer entstammen einer Produktion der Firma MWG Biotech und wurden in einer konzentrierten Stammlösung von 100 pmol/µl geliefert, die auf 20 pmol/µl mit Aqua bidest verdünnt wurde, um Selbsthybridisierungsprozesse zu vermeiden. Lediglich die Primer für den Transkriptionsfaktor Osterix mussten auf 10 pmol/µl verdünnt werden, um ein bestmögliches Ergebnis ohne jegliche Fehlreaktionen zu erhalten.

2.2.3 Interner Standard

Der auch als Mimic bezeichnete interne Standard erhält seinen Namen aufgrund der „Imitation“ der Bindungsstelle für den sequenzspezifischen Primer. Er besitzt somit dem Target identische Bindungsstellen. Bei der Herstellung des Mimics ist darauf zu achten, dass das sich amplifizierende Produkt um eine bestimmte Anzahl an Basenpaaren von der Basenpaaranzahl des Target-Produkts differiert, in etwa 150 Basenpaare, damit sich die Auswertung bei der Visualisierung der beiden Banden durch die Gelelektrophorese (s. 2.2.5) als unproblematisch erweist. Da die eingesetzte Konzentration des Standards bekannt ist, darf bei der Auswertung auf die Expressionsintensität rückgeschlossen werden.

Synthesisierung des internen DNA-Standards für Osterix

Der PCR MIMIC TM Konstruktion Kit der Firma Clontech fand zur Herstellung des internen Standards Verwendung. Insgesamt wurden zwei PCR-Amplifikationsvorgänge durchgeführt. Für den ersten Durchlauf wurde ein neutrales in Escherichia coli kloniertes DNA-Fragment und ein durch die Firma MWG Biotech hergestelltes Composite-Primer-Paar genutzt (s. Abb. 5). Die Besonderheit des

Composite-Primer-Paars bestand in einer genspezifischen Sequenz des Gens Osterix und einer zum neutralen Fragment komplementären Sequenz, um an das Fragment zu binden. Die Sequenzen der Composite-Primer für Osterix sind nachstehend aufgeführt:

Sense: 5'-GCA GCT AGA AGG GAG TGG TGC GCA AGT GAA ATC TCC TCC G-3'

Antisense: 5'-GCA GGC AGG TGA ACT TCT TCA TTT GAT TCT GGA CCA TGG C-3'

Abb. 5: **Synthesisierung des internen Standards;** — : neutrale DNA; : genspezifische Primersequenz.

Im ersten PCR-Durchgang (s. Abb. 5 A) band der zur neutralen DNA komplementäre Teil des Composite-Primers an die neutrale DNA. Die ebenfalls eingesetzte DNA-Polymerase synthetisierte anhand verwendeter dNTP's, die jeweiligen komplementären Einzelstränge. Die entstandenen Einzelstränge wiesen zusätzlich am 5' Ende eine für den Osterix Primer spezifische Targetsequenz auf. Der gewählte Reaktionsansatz für den ersten PCR-Durchlauf wurde aus folgenden Substanzen gewählt (50 µl Gesamtvolumen):

- 34,6 µl Aqua bidest.
- 4,0 µl Desoxynukleotide (dNTP-Mix)
- 5,0 µl 10 x PCR-Puffer
- 1,5 µl Composite-Primer-sense

1,5 µl Composite-Primer-antisense
 3,0 µl neutrales DNA-Fragment (ca. 2 ng DNA)
 0,4 µl Taq-DNA-Polymerase.

Tab. 13: Zugehöriges Amplifizierungsprogramm des ersten Durchlaufes zur Mimic-Herstellung

Dauer (sek.)	Temperatur (°C)	Zyklenzahl
120	94	1
45	94	20
45	60	
90	72	
600	72	1

Anschließend wurden 16 µl des Amplifikationsproduktes mit 4 µl Auftragspuffer versetzt, in die Geltasche eines Agarosegels pipettiert und eine Agarose-Gelelektrophorese durchgeführt (s. 2.2.5). Mittels DNA-Längenstandard wurde die Größe des Amplifikationsproduktes von 546 Basenpaaren kontrolliert. Unter UV-Beleuchtung erfolgte das Ausschneiden der deutlich sichtbaren Bande, damit das Gewicht bestimmt werden konnte. Die Gewichtsbestimmung ist notwendig, um die Menge des aus dem QIAEX-Gel-Extraktionskit stammenden Lösungspuffers (300 µl QG Puffer / 100 mg Gel) zu berechnen. Die DNA Reinigung und Entfernung aus dem Agarosegel erfolgte genau nach Anleitung mit dem QIAEX-Gel-Extraktionskit. Die resultierende DNA-Lösung wurde für den zweiten PCR-Durchlauf verwendet.

Bezeichnend für den zweiten PCR-Durchgang war die Vervielfältigung der aus dem ersten PCR-Durchlauf resultierenden DNA, die sowohl eine Osterix genspezifische Primerbindungsstelle, als auch eine genau definierte Basenpaarsequenz der neutralen DNA aufwies (s. Abb. 5 B). Hierfür wurde nachstehender Reaktionsansatz pipettiert (99 µl Gesamtvolumen):

75,4 µl Aqua bidest.
 8,0 µl Desoxynukleotide (dNTP-Mix)
 10,0 µl 10 x PCR-Puffer
 2,0 µl Osterix-Primer-sense
 2,0 µl Osterix-Primer-antisense
 1,0 µl aufgereinigte DNA
 0,6 µl Taq-DNA-Polymerase.

Die Annealingtemperatur differierte vom zweiten Amplifizierungsprogramm zum ersten Amplifizierungsprogramm, da eine explizit den Osterix-Primern zugehörige Annealingtemperatur gewählt wurde.

Tab. 14: Zugehöriges Amplifizierungsprogramm des zweiten Durchganges zur Mimic-Herstellung

Dauer (sek)	Temperatur (°C)	Zyklenzahl
120	94	1
45	94	20
45	55	
90	72	
600	72	1

Es folgte erneut eine Kontrolle des zweiten PCR-Durchlaufes durch die Agarose-Gelelektrophorese. Dazu wurden 5 µl DNA der zweiten PCR mit 3 µl Auftragspuffer versetzt und in ein entsprechendes Agarosegel gegeben. Nach Begutachtung des erwünschten Ergebnisses schloss sich ein Aufreinigungsschritt der gewonnenen DNA mit Hilfe des QIAQUICK-PCR-Purifikation-Kit's an. Die photometrische Auswertung (s. 2.2.1.6) zur Konzentrationsbestimmung erfolgte, nachdem die erhaltene DNA-Lösung in 100 µl Aqua bidest. gelöst wurde (s. Abb. 5 C). Nach Berechnung der DNA Konzentration (s. Beispiel) konnte eine Stammlösung von 100 attomol/µl angesetzt werden. Von dieser ausgehend, konnte eine Verdünnungsreihe (10^2 - 10^{-6} attomol/µl) mit Glykogen (50 µg/ml) produziert und bei -20°C gelagert werden (s. Tab. 15).

Beispiel zur Berechnung der DNA Konzentration:

1 Bp entspricht in etwa 660 g/mol

$469 \text{ Bp} \times 660 \text{ g/mol/Bp} = 3,1 \times 10^5 \text{ g/mol}$

1) $0,145 \text{ µg/µl} \times 1 \text{ g/} 1 \times 10^{-6} \text{ µg} \times 1 \text{ mol/} 3,1 \times 10^5 \text{ g} \times 10^6 \text{ µmol/1 mol} \times 10^{12} \text{ amol/1 µmol} = 4,7 \times 10^5 \text{ amol/µl}$

2) $4,7 \times 10^5 \text{ amol/µl} + 4,7 \text{ ml Aqua bidest.} = 100 \text{ amol/µl}$.

Tab. 15: Konzentrationsübersicht der Verdünnungsreihe

Attomol/µl	Mimic
10^1	M ₁
10^0	M ₂
10^{-1}	M ₃
10^{-2}	M ₄
10^{-3}	M ₅
10^{-4}	M ₆
10^{-5}	M ₇
10^{-6}	M ₈

Die verwendeten internen DNA-Standards für L7, OC, RUNX2, GAPDH, AP PPAR γ 2, LPL und aP2 waren zum Zeitpunkt des Arbeitsbeginns im Labor bereits etabliert. Tab. 16 gibt einen Überblick zu Gensequenzgrößen der genannten Gene.

Tab. 16: Basenpaaranzahl der internen Standards und der zugehörigen Gene

Gen	Target	Mimic	Differenz: Mimic-Target
Osterix	359	546	187
L7	357	548	191
RUNX2	172	340	168
PPAR γ 2	390	542	152
OC	310	436	126
AP	475	569	94
GAPDH	452	260	192
LPL	276	442	166
aP2	418	597	179

2.2.3.1 Durchführung einer PCR

Bevor sämtliche Versuchsproben hinsichtlich ihrer Genexpressionsverhältnisse mittels semiquantitativer PCR ausgewertet werden, muss die Konzentration des internen Standards an die Konzentration der Proben angepasst werden. Ziel ist es in etwa äquimolare Ansätze zu schaffen. Dazu wird mit wenigen Proben des Versuchs eine Verdünnungsreihe durchgeführt, in der die eingesetzten Mimic Konzentrationen (z.B. M2-M5) bekannt sind. Die Probe und somit der cDNA Anteil wird dabei immer in gleicher Konzentration eingesetzt (0,6 µl / PCR-Ansatz). Bei der visualisierten Auswertung kann der Konzentrationsunterschied detektiert werden. Im Idealfall sollte der Quotient aus Mimic und Probe gleich 'eins' sein.

Nach dem sich die optimalen Konzentrationsverhältnisse herauskristallisiert haben, konnten alle Proben mit Hilfe der semiquantitativen PCR untersucht werden. Um Verunreinigungen während des Pipettiervorgangs auszuschließen, wurde immer ein proben- und mimicfreier Ansatz zusätzlich amplifiziert, der bei der Auswertung keinerlei Banden zeigen durfte. Im Falle einer Kontamination der Reagenzien hätte der Kontrollansatz ebenfalls Banden ausgebildet.

Zusammensetzung des Reaktionsansatzes

Der Reaktionsansatz einer Probe der semiquantitativen PCR wurde auf Eis pipettiert und setzte sich aus unten angegebenen Komponenten zusammen:

0,300 µl Sense-Primer
0,300 µl Antisense-Primer
11,020 µl Aqua bidest.
1,500 µl 10 x PCR-Puffer
1,200 µl dNTP-Mix
0,600 µl spezifischer interner DNA-Standard
0,600 µl cDNA (spezifische Probe)
0,075 µl Taq-DNA-Polymerase.

Damit die Reaktion nicht zu früh beginnt, ist darauf zu achten, dass die *Taq*-DNA-Polymerase zuletzt dem Reaktionsansatz hinzugefügt wird.

Primersequenzen und entsprechende Amplifizierungsprogramme

Die folgende Ausführung gibt eine tabellarische Übersicht mit Blick auf benötigte Sequenzen und Amplifikationsprogramme bezüglich der zu untersuchenden Gene.

Osterix (Gronthos et al. 2003)

Tab. 17

Gen	sense/antise	Primersequenz	Größe	
Osterix	sense	5'-GCA GCT AGA AGG GAG TGG TG-3'	359 Bp	
	antisense	5'-GCA GGC AGG TGA ACT TCT TC-3'		
Amplifizierungsprogramm:				
		Dauer (sek)	Temperatur (°C)	Zykluszahl
		120	94	1
		45	94	32
		40	62	
		60	72	
		600	72	1

RUNX2 (humane Sequenz aus PubMed Genbank Accession NM 004348)

Tab. 18

Gen	sense/antise	Primersequenz	Größe
RUNX2	sense	5'-CCA CCT CTG ACT TCT GCC TC-3'	172 Bp
	antisense	5'-GAC TGG CGG GGT GTA AGT AA-3'	
Amplifizierungsprogramm:			
	Dauer (sek)	Temperatur (°C)	Zykluszahl
	120	95	1
	30	95	32
	30	59	
	60	72	
	600	72	1

PPAR γ 2 (Thomas et al. 1999)

Tab. 19

Tab. 10

Gen	sense/antise	Primersequenz	Größe
PPARγ2	sense	5'-CAG TGG GGA TGC TCA TAA-3'	390 Bp
	antisense	5'-CTT TTG GCA TAC TCT GTG AT-3'	

Amplifizierungsprogramm:

Dauer (sek)	Temperatur (°C)	Zykluszahl
120	95	1
40	95	30
50	55	
50	72	
420	72	1

OC (Rickard et al. 1996)

Tab. 20

Tab. 20

Gen	sense/antise	Primersequenz	Größe
OC	sense	5'-CAT GAG AGC CCT CAC A-3'	310
	antisense	5'-AGA GCG ACA CCC TAG AC-3'	

Amplifizierungsprogramm:

Dauer (sek)	Temperatur (°C)	Zykluszahl
120	94	1
30	94	30
45	55	
90	72	
600	72	1

AP (Rickard et al. 1996)

Tab. 21

Gen	sense/antise	Primersequenz	Größe	
AP	sense	5'-ACG TGG CTA AGA ATG TCA TC-3'	475	
	antisense	5'-CTG GTA GGC GAT GTC CTT A-3'		
Amplifizierungsprogramm:				
		Dauer (sek)	Temperatur (°C)	Zykluszahl
		120	94	1
		30	94	33
		45	55	
		90	72	
		600	72	1

L7 (Hemmerich et al. 1993)

Tab. 22

Gen	sense/antise	Primersequenz	Größe	
L7	sense	5'-AGA TGT ACA GAA CTG AAA TTC-3'	357 Bp	
	antisense	5'-ATT TAC CAA GAG ATC GAG CAA-3'		
Amplifizierungsprogramm:				
		Dauer (sek)	Temperatur (°C)	Zykluszahl
		120	94	1
		60	94	22
		60	54	
		120	72	
		600	72	1

GAPDH (Mihm et al. 2004)

Tab. 23

Gen	sense/antise	Primersequenz	Größe
GAPDH	sense	5'-ACC ACA GTC CAT GCC ATC AC-3'	452
	antisense	5'-TCC ACC ACC CTG TTG CTG TA-3'	

Amplifizierungsprogramm:	Dauer (sek)	Temperatur (°C)	Zykluszahl
	120	94	1
	60	94	26
	60	64	
	60	72	
	600	72	1

LPL (Rickard et al. 1996)

Tab. 24

Tab. 27

Gen	sense/antise	Primersequenz	Größe
LPL	sense	5'-GAG ATT TCT CTG TAT GGC ACC-3'	276
	antisense	5'-CTG CAA ATG AGA CAC TTT CTC-3'	

Amplifizierungsprogramm:

Dauer (sek)	Temperatur (°C)	Zykluszahl
120	94	1
30	94	35
120	55	
120	72	
600	72	1

aP2 (Ahdjoudj et al. 2001)

Tab. 25

Gen	sense/antise	Primersequenz	Größe	
aP2	sense	5'-GTA CCT GGA AAC TTG TCT CC-3'	418	
	antisense	5'-GTT CAA TGC GAA CTT CAG TCC-3'		
Amplifizierungsprogramm:				
		Dauer (sek)	Temperatur (°C)	Zykluszahl
		60	94	1
		60	94	33
		60	63	
		60	72	
		600	72	1

“Housekeeping“ Gen L7

Das Überprüfen des Genexpressionsmusters von L7 in allen untersuchten Proben gründet auf der Eigenschaft dieses Gens. Es handelt sich um ein ribosomales Protein, dass zur Aufrechterhaltung des physiologischen Zellzyklus aller Zellen konstant exprimiert werden muss (Hemmerich et al. 1993). Von einem derartigen Referenzgen wird angenommen, dass seine Expression weitgehend unabhängig von jeglichen intra- oder extrazellulären Vorgängen erfolgt und somit keinen signifikanten Schwankungen in der Transkription unterliegt.

Alle erhaltenen Ergebnisse bezüglich der Genexpression verschiedenster Gene wurden in Proportion zu L7 gesetzt, um sicher annehmen zu können, dass die gemessenen Genexpressionsunterschiede nicht auf Konzentrationsschwankungen der eingesetzten cDNA basieren.

2.2.4 Reverse-Transkriptase-PCR

Die Methodik der Reverse-Transkriptase-PCR (RT-PCR) ist im Stande, die aus Zellversuchen gewonnene RNA in einzelsträngige cDNA zu konvertieren. Hierzu wird die Eigenschaft eines Enzyms des Moloney-Mäuseleukämievirus (M-MLV), die Reverse Transkriptase (RT), genutzt. Die M-MLV RT bietet den Vorteil, dass sie sowohl keine RNase H als auch keine DNA-Endonukleaseaktivität aufweist. Andernfalls käme es zum Abbau der RNA, sowie zur Degradation der gewonnen cDNA. Die Effizienz der Methode würde sich durch geringere cDNA Ausbeute signifikant reduzieren.

Abb. 6: **RT-PCR Schema**; a: aus Zellversuchen isolierte RNA; b: Primeranlagerung an den Poly-A-Schwanz mit beginnender Polymerisation durch die Reverse Transkriptase; c: Voranschreiten der Polymerisation des cDNA-Stranges; d: entstandene cDNA Polymerisationsprodukte; A, T, U, C, G: Basen; RT: Reverse Transkriptase.

Bevor die Reverse Transkriptase einen zur RNA komplementären cDNA Einzelstrang synthetisiert, bedarf es einer Primerbindung an die Poly-A-Sequenz der RNA (s. Abb. 6 b-c). Die RNA weist gegenüber der DNA strukturelle Unterschiede auf. Sie enthält Ribose anstelle Desoxyribose, außerdem ist die Base Thymin durch Uracil ersetzt (s. Abb. 6 a-c).

Zusammensetzung des Reaktionsansatzes

Der Reaktionsansatz einer Probe der RT-PCR setzt sich aus nachstehend angegebenen Komponenten zusammen (Gesamtansatz 40 µl):

- 0,5 µl Ampuwa
- 8,0 µl dNTP Mix
- 4,0 µl DTT
- 8,0 µl 5 x RT-Puffer
- 8,0 µl Primer p(dT)₁₅
- 0,5 µl RNase Inhibitor
- 2,0 µl M-MLV (Reverse Transkriptase)
- 9,0 µl RNA-Lösung (250 ng).

Das zugehörige Amplifikationsprogramm der RT-PCR ist folgend (s. Tab. 26) dargestellt.

Tab. 26

Dauer (min)	Temperatur (°C)	Zyklen
60	38	1
10	72	
for ever	4	

2.2.5 Agarose-Gelelektrophorese

Die Gelelektrophorese dient zur visualisierbaren Trennung von Nukleinsäuremolekülen unterschiedlicher Größe. Für das benötigte Agarosegel wurde eine 1,5-prozentige Lösung bestehend aus Agarose und 1 x TBE-Puffer (s. Tab. 11) auf 100°C erhitzt, 5 µl Ethidiumbromid hinzugegeben und nach etwa 2 minütiger Abkühlung in einen Gelträger mit Taschenkamm gegossen. Nach 40minütiger Aushärtung sind die gefertigten Agarosegele nutzbar und konnten in die mit 1 x TBE-Puffer gefüllte Gelkammer gelegt werden. Die jetzt mit 4,5 µl Auftragspuffer (s. Tab. 11) versetzten PCR Proben (15 µl) wurden in die Geltaschen pipettiert und eine zum Wandern der Moleküle notwendige Spannung von 80-90 Volt angelegt. Der Auftragspuffer dient als Erkennungsmarker, um nach etwa 5 cm Wanderungstrecke das Spannungsfeld abzuschalten. Um die Größe der Moleküle annäherungsweise bestimmen zu können, kam ein 100 Bp-Ladder als Größenstandard zum Einsatz. Nach Beendigung, ca. 60 min nach Anlegen der Spannung, wurden die Banden mittels UV-Licht aufgrund der interkalierenden Eigenschaften des Ethidiumbromids sichtbar.

Auf Thermopapier wurden die Banden des Gels fotografisch festgehalten. Zusätzlich wurden die Banden als TIFF-Datei gespeichert. Durch Messung der Ethidiumfluoreszenz konnte mit einer entsprechenden Software (Molecular Dynamics Imagequant 3.3) die Menge des Amplifikationsproduktes quantifiziert werden, indem die optische Dichte jeder einzelnen Bande ermittelt wurde.

2.2.6 Statistische Auswertung

Die optische Dichte wurde mit der Software Imagequant 3.3 ermittelt. Bei Mehrfachansätzen wurden zusätzlich der Mittelwert (MW) und der Standardfehler des Mittelwertes (SEM) berechnet. Die anschließende statistische Auswertung erfolgte mit dem Programm GraphPadPrism 3.0. Hierbei wurden die Daten mit Hilfe des Mann-Whitney-U-Tests analysiert, der einen nichtparametrischen Test, in dem zwei ungepaarte Gruppen miteinander verglichen werden, darstellt. Der p-Wert wurde bei einem Ergebnis $p < 0,01$ als hochsignifikant, $p < 0,05$ als signifikant und $p < 0,1$ als teilsignifikant eingestuft.

Die klinischen Daten wurden zudem mittels multipler Regression analysiert, um einen möglichen Einfluss von verschiedenen Parametern in Bezug auf die Histomorphometrie zu untersuchen. Während der einfache Korrelationskoeffizient zu den Regressionskoeffizienten in der einfachen linearen Regression in Beziehung steht, erlaubt diese Methode die gleichzeitige Einbeziehung von mehreren Variablen in einem Modell. Anders als Korrelationskoeffizienten können die resultierenden Regressionskoeffizienten nicht symmetrisch interpretiert werden, sondern beschreiben den Einfluss einer Regressionsvariablen auf die Zielgröße. Der Koeffizient der linearen Bestimmung $R^2 \in (0,1)$ wurde verwendet, um die Qualität der Messung zu eruieren. $R^2 = 0,8$ bedeutet, dass das Modell 80% der Wahrscheinlichkeit der Zielvariablen erklärt.

2.2.7 RNA-Interferenz

Als RNA-Interferenz (RNAi) bezeichnet man die evolutionär konservierte spezifische Suppression der Proteinbiosynthese durch “small interfering RNAs“ (siRNAs) von 21-25 Basenpaaren Länge. In der Zelle wird die siRNA durch zelleigene Enzyme aktiviert. Beispielhaft ist der antivirale Effekt der micro RNA-32 zur Abwehr des Retrovirus PFV-1 (Lecellier et al. 2005) zu nennen.

Nach der Bildung des sogenannten RNA induced silencing complex (RISC) bindet der Komplex spezifisch an die zur siRNA komplementäre mRNA (s. Abb. 8 Schritt 6). Diese wird dann entweder durch die RNase Slicer vom 3'-Ende her degradiert (s. Abb. 8 Schritt 7 und 8) (Meister et al. 2004, Liu J 2004) oder es kommt durch die Konformationsänderung der mRNA zu einem Translationsstop (Hammond 2005).

Auswahl der siRNA

Ziel dieser Methode ist es, mit Hilfe der zelleigenen RNA-Interferenz Funktionsweise Gene zu supprimieren, indem Transkriptionsprodukte durch transfizierte siRNAs degradiert werden. Eine Bedingung dafür ist das Kennen der Transkriptionssequenz. Ein weiterer Punkt ist die Bedeutung der Größe der gewählten siRNA. Bei einer zu großen oder zu kleinen siRNA besteht ein höheres Risiko für eine unspezifische Degradierung anderer Gensequenzen. Gemeint sind sogenannte “Off target effects“. Die empfohlene Basenpaaranzahl der siRNA liegt bei ca. 18 - 21 Basenpaaren. Die im Rahmen dieser Promotionsarbeit verwendeten siRNAs waren 19 Basenpaare groß. Um höchstmögliche Spezifität im Degradationsprozess zu erreichen, darf die gewählte siRNA-Sequenz nur komplementär zum anvisierten Transkriptionsprodukt sein.

Methodik der Transfektion

Ist die Wahl einer spezifischen siRNA getroffen, gilt es, sie in das Zytoplasma der Zelle einzuschleusen. Dazu sind verschiedene Methoden praktikabel. Im Rahmen dieser Arbeit wurden zwei Methoden zur Transfektion angewendet. Zum einen die Methodik der Elektroporation (s. 2.2.7.1) und zum anderen die Transfektion mittels kationischer Lipide (Lipofektamin-Transfektion, s. 2.2.7.2).

2.2.7.1 Elektroporation

Bei der Elektroporation wird durch Anlegen eines Spannungspulses an Zellen die Permeabilität der Zellmembran gesteigert, indem transiente hydrophile Poren entstehen, durch die Nukleinsäuren in die Zellen aufgenommen werden können (Zimmermann 1986, Neumann et al. 1999, Gehl 2003).

Die Effizienz dieser Transfektionsmethode hängt von folgenden Parametern ab:

- der Spannungsstärke
- der Dauer des Spannungspulses
- der Anzahl der Spannungspulse
- dem Elektroporationspuffer
- der siRNA-Konzentration

- der Zellzahl
- der Zellart
- des Elektrodenabstandes
- und der Temperatur.

Praktische Durchführung der Elektroporation

Vor der Elektroporation wurden die Zellen mit Trypsin von der Zellkulturflasche abgelöst und mit 1800 U/min (pHOB) oder 1200 U/min (HOS 58) für 10 min zentrifugiert und in 3 ml Medium resuspendiert. Nach Zellzahlbestimmung wurden 40.000 HOS 58 Zellen in ein Eppendorfgefäß pipettiert, abzentrifugiert und in 75 µl Elektroporationspuffer aufgenommen. Nach Überführen der Zellsuspension in eine Elektroporationsküvette mit 4 mm Elektrodenabstand, in der die siRNA bereits vorgelegt war, wurden die Zellen mit 150 V 4,4 ms elektroporiert. Anschließend wurden die Zellen in ein “well“ einer 6-“well“-Platte mit 2 ml komplementiertem Medium gegeben, verteilt und nach 1-7 Tagen abgeerntet, um nachfolgend die RNA extrahieren zu können.

Die pHOB-Zellen wurden nach Ablösen mit Trypsin für 10 min bei 1800 U/min abzentrifugiert. Die Zellen wurden in 3 ml komplementiertem Medium resuspendiert und nach Bestimmung der Zellzahl 100.000 Zellen in eine Elektroporationsküvette mit 1 µg vorgelegter siRNA überführt. Die pHOB-Zellen wurden mit 200 V 4,9 ms elektroporiert und in ein “well“ einer 6-“well“-Platte mit 2 ml komplementiertem Medium ausplattiert. Nach 1-7 Tagen wurde die RNA aus den Zellen extrahiert.

Tab 27. Elektroporationsparameter

	HOS 58 Zellen	pHOB
Spannungsstärke	150 V	200 V
Dauer des Spannungspulses	4,9 ms	4,4 ms
Anzahl der Spannungspulse	1	1
siRNA	1 µg	1 µg
Temperatur	RT	RT
Zellzahl	40.000	100.000
Elektrodenabstand	4 mm	4 mm

2.2.7.2 Lipofektamin-Transfektion

Lipofectamine 2000 (Invitrogen) ist ein Transfektionsreagenz aus kationischen und neutralen Lipiden. Die negativ geladenen Nukleinsäuren lagern sich in hydrophiler Umgebung an die Lipidvesikel an. Die Lipidvesikel mit den gebundenen Nukleinsäuren können, vergleichbar mit Endosomen, Zellmembranen passieren und die Nukleinsäuren im Zytosol freisetzen.

Erste erfolgreiche Transfektionsversuche mit kationischen Lipiden wurden in den 80ern publiziert (Felgner et al. 1987). Nach heutigen Vorstellungen bilden kationische Lipide mit Nukleinsäuren aufgrund ihrer konträren Ladungen so genannte “cationic lipid-nucleic acid complexes“ (CLNACs) (Dass 2004).

Dieses Gedankenmodell gründet auf der Tatsache, dass die amphiphilen Phospholipide in hydrophiler Umgebung Vesikel aus einer Lipiddoppelschicht bestehenden Membran formieren (Wasan et al. 1997). Die Lipidbestandteile der Vesikel sind zum einen kationisch und zum anderem neutral geladen (s. Abb. 7). Ein üblicherweise, wie auch in den dieser Promotionsarbeit zugehörigen Versuchen verwendetes neutrales Lipid ist Dioleoylphosphatidylethanolamin (DOPE). Die Aufgabe eines neutralen Lipids besteht in einer unterstützenden Komponente im Fusionsprozess der Lipide zum Vesikel (Hafez et al. 2001). Zusätzlich werden neutralen Lipiden wie DOPE stabilisierende Eigenschaften zugesprochen. Diese sind von besonderer Bedeutung, da sich die kationischen Lipide aufgrund der positiven Ladungen voneinander abweisen (Zuidam und Barenholz 1998). Sobald die Nukleinsäuren durch ihre Ladungsunterschiede an die Oberfläche der Vesikel andocken, beginnt eine Umorganisation der Vesikel, so dass die Nukleinsäuren an den Lipidmolekülen haften bleiben (s. Abb. 7 A und B). Die Umorganisation kann unterschiedliche Formationen aufweisen (s. Abb. 7 B und C).

Abb. 7: Entstehung von “cationic lipid-nucleic acid complexes” (CLNACs). Die anionische Nukleinsäure wird durch die positive Ladung der kationischen Lipide an die Oberfläche der Liposomen, die aus neutralen und kationischen Lipiden bestehen, angezogen (A). Im Prozess der Bindung von Nukleinsäuren an die Vesikel können die liposomalen Strukturen weitgehend beibehalten werden (B) oder sich deorganisieren (C) (modifiziert nach Dass 2004, S. 581).

Nicht nur die Ladungsverhältnisse, sondern auch hydrophobe Interaktionen scheinen bei der Bindung von Nukleinsäuren an die Oberfläche der Vesikel von tragender Bedeutung zu sein (Wong FMP et al. 1996). Nach der Bildung von CLNACs dringen sie endozytotisch in die Zelle, wo sie postmembranär als Endosomen imponieren. Intrazellulär können die CLNACs mit der Membran des Nukleus verschmelzen, so dass sich die Nukleinsäuren intranukleär ansammeln. Wahrscheinlicher aber sind lysosomale Prozesse, die die Strukturen der CLNACs auflösen, um die gebundenen Nukleinsäuren im Zytosol freizugeben (Dass und Burton 2003). Die auf dieser Weise ins Zytoplasma gelangten siRNAs beschreiten den Funktionsweg der RNA-Interferenz (s. 2.2.7), um ein Transkriptionsprodukt sekundär zu degradieren (s. Abb. 8).

Abb. 8: Theoretische Darstellung der Funktionsweise der Lipofektamin-Transfektion.

Praktische Durchführung der Transfektion mit kationischen Lipiden

Vor der Transfektion mit kationischen Lipiden wurden die Zellen mit Trypsin von der Zellkulturflasche abgelöst und mit 1800 U/min (pHOB) oder 1200 U/min (HOS 58) für 10 min zentrifugiert und in 3 ml Medium resuspendiert. Nach Zellzahlbestimmung wurden 40.000 Zellen (pHOB oder HOS 58) in 6-“well“-Platten ausgesäht. Je “well“ einer 6-“well“-Platte wurden 125 µl serumfreies und antibiotikafreies Medium (OptiMEM, Gibco) in einem Eppendorfgefäß mit 4 µl Plus-Reagenz und 1 µg siRNA gemischt und bei Raumtemperatur 15 min inkubiert. In einem zweiten Eppendorfgefäß wurden je “well“ 125 µl OptiMEM mit 5-10 µl Lipofectamine 2000 gemischt und 5 min bei RT inkubiert. Beide Ansätze wurden vereinigt und erneut über 15 min bei RT inkubiert. Das Medium von den zu transfizierenden Zellen

wurde abgesaugt, die Zellen wurden mit 2 ml PBS gespült und auf jedes “well“ 1,5 ml OptiMEM pipettiert. Der Lipofektaminansatz wurde tropfenweise in die jeweiligen “wells“ pipettiert und durch vorsichtiges Schwenken verteilt. Nach 3-24 Stunden im CO₂-Inkubator wurde das Transfektionsmedium durch serum- und antibiotikahaltiges Medium ersetzt und die Zellen für weitere 24-172 Stunden bis zur Aufarbeitung inkubiert. Nachfolgend ist exemplarisch der Transfektionsablauf über eine Kulturdauer von 9 Tagen mit zwei durchgeführten Transfektionen dargestellt.

Abb. 9: **Darstellung des Transfektionsablaufs** zweier durchgeführter RUNX2-“knock-down“-Versuche mit pHOB.

Tab 28: Ansätze für die Lipofektamin-Transfektion pro “well“/6-“well“-Platte

	HOS 58	pHOB
Ansatz A:		
OptiMEM	125 µl	125 µl
Plus-Reagenz	4 µl	4 µl
siRNA	1-2 µg	1 µg
Ansatz B:		
OptiMEM	125 µl	125 µl
Lipofectamine 2000	10 µl	5-10 µl
OptiMEM auf den Zellen	1,5 ml	1,5 ml
Mediumwechsel nach	3 h	3-24 h
Aufarbeitung nach weiteren	48 h	24-172 h

siRNA-Design

Spezifische siRNAs für die Suppression des Transkriptionsfaktors RUNX2 bzw. des konstant exprimierten “housekeeping“ Gens GAPDH wurden aus der Gene Globe-Datenbank von Qiagen ausgewählt (s. Tab. 29)

Tab. 29: siRNA-Sequenzen

Zielgen	doppelsträngige Sequenz	Qiagen-Katalognummer
RUNX2 Nr. 1	5' CCU UGA CCA UAA CCG UGU U 3' 3' AAG ACG GUU AUG GUC AAG G 5'	SI00062986
RUNX2 Nr. 4	5' GCA GCA CUC CAU AUC UCU A 3' 3' UAG AGA UAU GGA GUG CUG C 5'	SI00063007
GAPDH	5' GUC AUG UAC CAU CAA UAA A 3' 3' UUU AUU GAU GGU ACA UGA C 5'	SI00424816
“Scrambled“: kein Zielgen	5' UUC UCC GAA CGU GUC ACG U 3' 3' ACG UGA CAC GUU CGG AGA A 5'	1022076

Abb. 10: Lokalisation der Zielsequenzen der beiden verwendeten RUNX2-siRNAs in der RUNX2-mRNA.

5 nmol lyophilisierte siRNA wurde in 250 µl siRNA Suspension Puffer (Qiagen) aufgenommen, um eine Lösung mit einer Konzentration von 20 µM zu erhalten. Die gelöste siRNA wurde für 1 min auf 90°C erhitzt und 1 Stunde bei 37°C inkubiert, um hochmolekulare Aggregate zu zerstören, die sich während des Lyophilisiervorgangs gebildet haben könnten. Danach wurden die Ansätze aliquotiert und bis zur Verwendung bei -20°C eingefroren.

3 Ergebnisse

3.1 Genexpressionsverhältnisse in den pHOB

3.1.1 Genexpressionsmuster von OSX, RUNX2, OC, AP, PPAR γ 2, LPL und aP2 unter basalen und stimulierenden Bedingungen in mesenchymalen Stammzellen

Mit diesem Versuch sollte das Genexpressionsverhalten insbesondere von OSX und RUNX2 zu einem sehr frühen Zeitpunkt der osteoblastären Differenzierung untersucht werden, so dass Stammzellen mit osteogenen Stimulanzien, β -GP (10 mM), Dexamethason (10^{-8} M) und Vitamin-C-Phosphat (100 μ M) über 26 Tage kontinuierlich kultiviert wurden, wobei der Stimulationsbeginn nach Konfluenz am achten Tag begann. Die Kontrollpopulation wurde unter basalen Bedingungen über einen Zeitraum von 34 Tagen kultiviert. 24 Stunden vor der Zellaufarbeitung wurde FCS (10%) durch 0,1-prozentiges BSA ersetzt. Der Versuch wurde mit Vierfachwerten durchgeführt ($n = 4$).

Die folgenden Abb. und Tab. geben Aufschluss über erhaltene Ergebnisse.

Abb. 11: **Darstellung der Genexpression von RUNX2 in Stammzellen** mittels semiquantitativer PCR unter Kontrollbedingungen über 34 Tage und nach Stimulation ab Tag acht über 26 Tage. Die Daten repräsentieren das Ergebnis von vier parallelen Versuchsansätzen ($n = 4$), dargestellt als Mittelwerte/L7 mit entsprechenden Standardfehlern (SEM). An Tag 12, 20 und 34 unter basalen Bedingungen, d. h. an Tag 4, 12 und 26 unter stimulierten Bedingungen, sind die Genexpressionsunterschiede im Vergleich von Kontrolle zur Stimulation abgebildet. Die Sterne markieren die sich auf Tag 2 beziehenden Signifikanzen unter Kontrollbedingungen: * = $p < 0,05$. Das Kreuz steht für die Signifikanz der Genexpression von Kontrolle zur Stimulation am selben Tag: # = $p < 0,05$ (B). Unter A ist ein entsprechendes Agarosegel als Beispiel mit Vierfachwerten abgebildet (ko = Kontrolle; sti = stimuliert).

Tab. 30: Versuchsdaten zur Genexpression von RUNX2 in Stammzellen unter Kontroll- und Stimulationsbedingungen. Die Mittelwerte (MW) sind auf L7 bezogen. SEM gibt den jeweiligen Standardfehler an.

	Tag 2		Tag 8		Tag 12		Tag 20		Tag 34	
	MW/L7	SEM	MW/L7	SEM	MW/L7	SEM	MW/L7	SEM	MW/L7	SEM
Kontrolle	0,361	0,033	0,785	0,039	1,119	0,072	0,990	0,101	1,171	0,059
Stimulation					0,825	0,082	0,701	0,069	0,824	0,080

Das “housekeeping“ Gen L7 wurde unabhängig der Stimulation konstant exprimiert (nicht abgebildet). Für RUNX2 konnte von Tag 2 bis Tag 12 unter basaler Kultivierung eine um über das dreifache signifikant ansteigende Genexpression detektiert werden ($p = 0,0286$), die im weiteren Verlauf auf konstantem Niveau blieb. Auffallend war der hemmende Einfluss von osteogenen Stimulanzien auf die Genexpression von RUNX2, so dass an Tag 34 der negative Einfluss einen signifikanten Genexpressionsunterschied ($p = 0,0286$) zwischen Kontrollen und stimulierten Zellen von 30% betrug (s. Abb. 11 und Tab. 30).

Abb. 12: Darstellung der Genexpression von AP in Stammzellen mittels semiquantitativer PCR unter Kontrollbedingungen über 34 Tage und nach Stimulation ab Tag acht über 26 Tage. Die Daten repräsentieren das Ergebnis von vier parallelen Versuchsansätzen ($n = 4$), dargestellt als Mittelwerte/L7 mit entsprechenden Standardfehlern (SEM). An Tag 12, 20 und 34 unter basalen Bedingungen, d. h. an Tag 4, 12 und 26 unter stimulierten Bedingungen, sind die Genexpressionsunterschiede im Vergleich von Kontrolle zur Stimulation abgebildet. Die Signifikanzen sind mit Kreuzen markiert und beziehen sich auf den Expressionsunterschied am selben Tag: # = $p < 0,05$ (B). Unter A ist ein entsprechendes Agarosegel als Beispiel mit Doppelwerten abgebildet (ko = Kontrolle; sti = stimuliert).

Tab. 31: Versuchsdaten zur Genexpression von AP in Stammzellen unter Kontroll- und Stimulationsbedingungen. Die Mittelwerte (MW) sind auf L7 bezogen. SEM gibt den jeweiligen Standardfehler an.

	Tag 2		Tag 8		Tag 12		Tag 20		Tag 34	
	MW/L7	SEM	MW/L7	SEM	MW/L7	SEM	MW/L7	SEM	MW/L7	SEM
Kontrolle	0,560	0,250	0,533	0,284	0,762	0,233	0,466	0,105	0,114	0,029
Stimulation					2,156	0,581	2,013	0,566	3,245	0,213

Die analysierte Genexpression der AP zeigte unter basalen Bedingungen über 20 Tage einen weitgehend konstanten Verlauf. Lediglich an Tag 34 fiel die Genexpression um 80% ab. Signifikante Expressionsunterschiede ergaben die Auswertungen der stimulierten Versuchsansätze, so stieg zum letzten Zeitpunkt (Tag 34) die unter stimulierten Bedingungen gemessene Genexpression der AP im Vergleich zur basalen Kultivierung um das 28-fache an ($p = 0,0286$) (s. Abb. 12 und Tab 31).

Abb. 13: **Darstellung der Genexpression von OC in Stammzellen** mittels semiquantitativer PCR unter Kontrollbedingungen über 34 Tage und nach Stimulation ab Tag acht über 26 Tage. Die Daten repräsentieren das Ergebnis von vier parallelen Versuchsansätzen ($n = 4$), dargestellt als Mittelwerte/L7 mit entsprechenden Standardfehlern (SEM). An Tag 12, 20 und 34 unter basalen Bedingungen, d. h. an Tag 4, 12 und 26 unter stimulierten Bedingungen, sind die Genexpressionsunterschiede im Vergleich von Kontrolle zur Stimulation abgebildet. Die Signifikanzen sind mit Kreuzen markiert und beziehen sich auf den Expressionsunterschied am selben Tag: # = $p < 0,05$. Unter A ist ein entsprechendes Agarosegel als Beispiel mit Doppelwerten abgebildet (ko = Kontrolle; sti = stimuliert).

Tab. 32: Versuchsdaten zur Genexpression von OC in Stammzellen unter Kontroll- und Stimulationsbedingungen. Die Mittelwerte (MW) sind auf L7 bezogen. SEM gibt den jeweiligen Standardfehler an.

	Tag 2		Tag 8		Tag 12		Tag 20		Tag 34	
	MW/L7	SEM	MW/L7	SEM	MW/L7	SEM	MW/L7	SEM	MW/L7	SEM
Kontrolle	0,334	0,141	0,801	0,391	0,371	0,153	0,705	0,281	0,385	0,182
Stimulation					0,065	0,041	0,047	0,028	0,137	0,053

Unter osteogenen Bedingungen wurde das Expressionsverhalten von OC erheblich gehemmt. An Tag 20 war die Genexpression der stimulierten Zellen signifikant ($p = 0,0286$) um 85 % reduziert (s. Abb. 13 und Tab. 32).

In den Stammzellen war die Genexpression von OC im gewählten Kulturverlauf unter Kontrollbedingungen auf deutlich nachweisbarem Niveau verifizierbar, wobei der Mimic im Mittel 10-fach schwächer und die Zyklenanzahl im Mittel um 2 Zyklen erhöht war im Vergleich zu Versuchen mit pHOB (Tab. 33).

Tab. 33: Mimic- und Zyklenvergleich von Stammzellen zu pHOB

Zellen	Stammzellen		pHOB	
Gene	L7	OC	L7	OC
Zyklen	23	32	21	30
Mimic	2	5	2	4

Da die Zyklenzahl von L7 bei den Stammzellen im Vergleich zu den pHOB ebenfalls um 2 Zyklen erhöht war, ist die Genexpression von OC aufgrund des Mimicunterschieds in etwa 10-fach schwächer als in den pHOB. Auch bei Zugabe von osteogenen Stimulanzien lag die Genexpression von OC nahe der Nachweisgrenze. Diese Tatsachen sprechen insgesamt für eine schwache Expression von OC.

Abb. 14: **Darstellung der Genexpression von PPAR γ 2 in Stammzellen** mittels semiquantitativer PCR unter Kontrollbedingungen über 34 Tage und nach Stimulation ab Tag acht über 26 Tage. Die Daten repräsentieren das Ergebnis von vier parallelen Versuchsansätzen ($n = 4$), dargestellt als Mittelwerte/L7 mit entsprechenden Standardfehlern (SEM). An Tag 12, 20 und 34 unter basalen Bedingungen, d. h. an Tag 4, 12 und 26 unter stimulierten Bedingungen, sind die Genexpressionsunterschiede im Vergleich von Kontrolle zur Stimulation abgebildet. Die Sterne markieren die sich auf Tag 2 beziehenden Signifikanzen unter Kontrollbedingungen: * = $p < 0,05$; (*) = $p < 0,1$. Das Kreuz steht für die Signifikanz der Genexpression von Kontrolle zur Stimulation am selben Tag: # = $p < 0,05$. Unter A ist ein entsprechendes Agarosegel als Beispiel mit Doppelwerten abgebildet (ko = Kontrolle; sti = stimuliert).

Tab. 34: Versuchsdaten zur Genexpression von PPAR γ 2 in Stammzellen unter Kontroll- und Stimulationsbedingungen. Die Mittelwerte (MW) sind auf L7 bezogen. SEM gibt den jeweiligen Standardfehler an.

	Tag 2		Tag 8		Tag 12		Tag 20		Tag 34	
	MW/L7	SEM	MW/L7	SEM	MW/L7	SEM	MW/L7	SEM	MW/L7	SEM
Kontrolle	0,059	0,014	0,144	0,024	0,402	0,067	0,437	0,039	0,104	0,024
Stimulation					0,409	0,050	0,824	0,109	1,106	0,134

Die Genexpressionsanalyse von PPAR γ 2 ergab unter basalen Kulturbedingungen einen bis Tag 12 um den Faktor 6,8 signifikant ($p = 0,0286$) steigenden Verlauf, um sich zum finalen Zeitpunkt im Genexpressionsniveau dem zu Beginn gemessenen Werten wieder anzugleichen. Die Stimulation induzierte eine signifikant erhöhte Expression von PPAR γ 2 an Tag 20 und 34 ($p = 0,0286$) (s. Abb. 14 und Tab. 34).

Abb. 15: **Darstellung der Genexpression von LPL in Stammzellen** mittels semiquantitativer PCR unter Kontrollbedingungen über 34 Tage und nach Stimulation ab Tag acht über 26 Tage. Die Daten repräsentieren das Ergebnis von vier parallelen Versuchsansätzen ($n = 4$), dargestellt als Mittelwerte/L7 mit entsprechenden Standardfehlern (SEM). An Tag 12, 20 und 34 unter basalen Bedingungen, d. h. an Tag 4, 12 und 26 unter stimulierten Bedingungen, sind die Genexpressionsunterschiede im Vergleich von Kontrolle zur Stimulation abgebildet. Die Sterne markieren die sich auf Tag 2 beziehenden Signifikanzen unter Kontrollbedingungen: $*$ = $p < 0,05$. Unter A ist ein entsprechendes Agarosegel als Beispiel mit Doppelwerten abgebildet (ko = Kontrolle; sti = stimuliert).

Tab. 35: Versuchsdaten zur Genexpression von LPL in Stammzellen unter Kontroll- und Stimulationsbedingungen. Die Mittelwerte (MW) sind auf L7 bezogen. SEM gibt den jeweiligen Standardfehler an.

	Tag 2		Tag 8		Tag 12		Tag 20		Tag 34	
	MW/L7	SEM	MW/L7	SEM	MW/L7	SEM	MW/L7	SEM	MW/L7	SEM
Kontrolle	0,5493	0,065	1,253	0,2414	1,969	0,1964	1,194	0,2377	0,9188	0,1129
Stimulation					1,553	0,3682	0,8508	0,2729	0,7765	0,2279

Die Genexpression von LPL stieg unter basalen Bedingungen bis zum 12. Tag in Kultur auf etwa das 4-fache des Ausgangswertes an Tag 2 an, um im weiteren Kulturverlauf wieder auf ca. das 1,8-fache abzufallen. Die Stimulation zeigte, bezogen auf die Genexpression von LPL, zu jedem Zeitpunkt eine hemmende Tendenz (s. Abb. 15 und Tab. 35).

Abb. 16: **Darstellung der Genexpression von aP2 in Stammzellen** mittels semiquantitativer PCR unter Kontrollbedingungen über 34 Tage und nach Stimulation ab Tag acht über 26 Tage. Die Daten repräsentieren das Ergebnis von vier parallelen Versuchsansätzen ($n = 4$), dargestellt als Mittelwerte/L7 mit entsprechenden Standardfehlern (SEM). An Tag 12, 20 und 34 unter basalen Bedingungen, d. h. an Tag 4, 12 und 26 unter stimulierten Bedingungen, sind die Genexpressionsunterschiede im Vergleich von Kontrolle zur Stimulation abgebildet. Die Sterne markieren die sich auf Tag 2 beziehenden Signifikanzen unter Kontrollbedingungen: $* = p < 0,05$. Das Kreuz steht für die Signifikanz der Genexpression von Kontrolle zur Stimulation am selben Tag: $\# = p < 0,05$. Unter A ist ein entsprechendes Agarosegel als Beispiel mit Doppelwerten abgebildet (ko = Kontrolle; sti = stimuliert).

Tab. 36: Versuchsdaten zur Genexpression von aP2 in Stammzellen unter Kontroll- und Stimulationsbedingungen. Die Mittelwerte (MW) sind auf L7 bezogen. SEM gibt den jeweiligen Standardfehler an.

	Tag 2		Tag 8		Tag 12		Tag 20		Tag 34	
	MW/L7	SEM	MW/L7	SEM	MW/L7	SEM	MW/L7	SEM	MW/L7	SEM
Kontrolle	0,5335	0,1211	0,3058	0,1586	0,4255	0,1216	0,2595	0,0269	0,7108	0,2159
Stimulation					0,2695	0,0683	0,6023	0,0526	1,512	0,2588

Unter basalen Kulturbedingungen entpuppte sich der Genexpressionsverlauf von aP2 als relativ konstant. Lediglich am zwanzigsten Tag in Kultur war eine signifikante über 50-prozentige Reduktion der Genexpression in Bezug auf Tag 2 nachweisbar. Die Stimulation führte an Tag 20 und 34 zu einer mehr als verdoppelten Genexpression von aP2 (s. Abb. 16 und Tab. 36).

OSX war zu keinem Zeitpunkt sowohl unter basalen als auch bei Zusatz von osteogenen Stimulanzen detektierbar. Zusammenfassend konnte nachgewiesen werden, dass die Genexpression von RUNX2 unter basalen Bedingungen von Tag 2 zu Tag 12 anstieg. Des Weiteren verhalten sich OC und AP in diesem

frühen Zeitpunkt der Differenzierung unter stimulierenden Bedingungen konträr, so wird die Genexpression von OC signifikant gehemmt und die Expression von AP signifikant induziert. Ein ähnliches Expressionsmuster unter osteogener Stimulation zeigte die Untersuchung der Gene LPL und aP2, so wurde die Genexpression von LPL gehemmt und die Expression von aP2 stimuliert. PPAR γ 2 wurde durch osteogene Stimulanzen vergleichbar zu AP und aP2 im Expressionslevel signifikant verstärkt.

3.1.2 Genexpressionsverhalten von OSX, RUNX2, OC und der AP in Primärkulturen humaner Osteoblasten

Nach den neu gewonnenen Erkenntnissen hinsichtlich des Genexpressionsmusters osteoblastärer und adipogener Marker in Stammzellen (s. 3.1.1) war es die Intention dieses Versuches anhand von Primärkulturen auswachsende Osteoblasten zu vier verschiedenen Konfluenzgraden, 10%, 30%, 60% und 100% (s. Abb. 19) im Genexpressionsverhalten während des Differenzierungsverlaufs, in der Annahme spätere Reifestadien im Vergleich zur Kultur mit Stammzellen vorzufinden, zu untersuchen. Hierzu wurde Spongiosamaterial von sechs verschiedenen Patienten (s. Tab. 37) unter basalen Bedingungen kultiviert, so dass die auswachsenden Osteoblasten zu entsprechenden Konfluenzstadien aufbereitet werden konnten. Die folgenden Abb. und Tab. veranschaulichen detektierte Ergebnisse.

Tab. 37: Patientendaten

Patient	O.N.	S.C.	S.A.
Geschlecht	männlich	weiblich	weiblich
Alter	39	67	79
Ort der PE	Femurschaft	Tibiaplateau	Femurschaft
OP Indikation	Coxarthrose links	Gonarthrose	Coxarthrose
weitere Erkrankungen	Asthma bronchiale	art. Hypertonus, Carotisstenose links	art. Hypertonus, Adipositas, Depression
Medikamente	Theophyllin, Terbutalin, Diclofenac	Clopidogrel, Acetylsalicylsäure, Diclofenac	Acetylsalicylsäure, Lithium, Maprotilin, Bunazosin, Moxonidin, Dihydroergotoxin
Patient	K.H.	H.W.	R.J.
Geschlecht	männlich	männlich	weiblich
Alter	81	80	67
Ort der PE	Femurschaft	Tibiaplateau	Femurschaft
OP Indikation	Coxarthrose rechts	Gonarthrose links	Coxarthrose
weitere Erkrankungen	Gonarthrose bds., KHK, LWS Syndrom, Hyperlipoproteinämie, absolute Arrhythmie	Asthma bronchiale, Hyperurikämie,	KHK, Diabetes mellitus, art. Hypertonus, Z.n. Hyperthyreose
Medikamente	Furosemid, Phenprocoumon, Atorvastatin	Amitriptylin, Allopurinol, Formoterol IDEOS (Calcium + Vit. D3), Oxycodon, Pantoprazol, Temazepam, Budenosid Diclofenac	L Thyroxin, Isophan Insulin, Enalapril, Isosorbitdinitrat, Furosemid

Abb. 17: Graphische Wiedergabe der Genexpression von OSX, RUNX2, OC und der AP in pHOB unter basalen Bedingungen zu vier verschiedenen Konfluenzgraden. Abgebildet sind die auf L7 bezogenen Mittelwerte sechs unterschiedlicher Patienten mit zugehörigem Standardfehler (SEM). Die Ergebnisse wurden mittels semiquantitativer RT-PCR analysiert. Die signifikanten Werte beziehen sich auf den Konfluenzgrad von 10% (Ausnahme bei OC: ** beziehen sich auf Konfluenzgrad von 30%) und sind mit Sternen markiert: (*) = $p < 0,1$; * = $p < 0,05$; ** = $p < 0,01$.

Tab. 38: Ergebnisse der Genexpression von OSX, RUNX2, OC und der AP in pHOB aus gewonnenem Spongiosamaterial sechs verschiedener Patienten. Aufgelistet sind die MW/L7 mit den jeweiligen Standardfehlern (SEM).

Gen	Konfluenzgrad: 10%		Konfluenzgrad: 30%		Konfluenzgrad: 60%		Konfluenzgrad: 100%	
	MW/L7	SEM	MW/L7	SEM	MW/L7	SEM	MW/L7	SEM
OSX	0,847	0,164	0,822	0,221	1,568	0,148	1,231	0,190
RUNX2	1,473	0,241	2,316	0,347	3,562	0,465	3,819	0,207
OC	0,729	0,171	0,311	0,102	1,132	0,148	0,899	0,138
AP	1,957	0,326	2,380	0,511	2,380	0,452	3,147	1,093

Der Nachweis des “housekeeping“ Gens L7 blieb im gesamten Verlauf konstant (s. Abb. 18). Die Genexpression von OSX differiert in Bezug auf die ersten beiden Konfluenzgrade kaum. Zum Konfluenzstadium von 60% ist ein Anstieg der Genexpression signifikant um das 1,9-fache ($p = 0,0087$) verifizierbar. Der sichtbare Widerabfall vom 60-prozentigen Konfluenzstadium zum ausgereiften osteoblastären Zellstadium hin blieb signifikanzlos (s. Abb. 17 und Tab. 38).

Die Genexpressionsanalyse von RUNX2 ergab vom Konfluenzgrad von 10% zum Konfluenzstadium von 30% einen teilsignifikanten ($p = 0,0519$) Anstieg der Expression, der sich bei einer Konfluenz von 60% signifikant um das 2,4-fache ($p = 0,0043$) verstärkte und zum letzten Konfluenzgrad konstant blieb (s. Abb. 17 und Tab. 38).

Die Expression des Gens OC bei einem Konfluenzstadium von 30% nahm signifikant um 58% ($p = 0,0303$) im Vergleich zum 10-prozentigen Konfluenzgrad ab. Im weiteren Differenzierungsverlauf stieg die Genexpression bei einer Zelldichte von 60% auf das 3,6-fache ($p = 0,0079$) in Relation zum 30-prozentigen Konfluenzstadium an (s. Abb. 17 und Tab. 38).

Die Genexpression der AP blieb während der ersten drei Konfluenzstadien annähernd gleich. Lediglich das abschließende Konfluenzstadium von 100% zeigte einen 1,6-fachen Anstieg der Genexpression der AP im Vergleich zum 10-prozentigen Konfluenzgrad.

Abb. 18: **Darstellung der Gene OSX, RUNX2, OC, AP und L7** exemplarisch für einen Patienten als Banden auf Agarosegelen nach Durchführung einer semiquantitativen PCR und Agarose-Gelelektrophorese zu den entsprechenden Konfluenzgraden (10%, 30%, 60% und 100%).

Abb. 19: Veranschaulichung der Konfluenzgrade der Primärkulturen: A = 10%; B = 30%; C = 60%; D = 100%.

3.1.3 Genexpression von OSX, RUNX2, OC und der AP in pHOB unter basalen Kulturbedingungen

Mit diesem Versuch sollten zuvor ausgewertete Ergebnisse überprüft werden, so dass Bedingungen geschaffen wurden, die denen im Versuch mit Primärkulturen nahezu glichen. Die Reifekriterien wurden aber nicht durch den Konfluenzgrad, sondern durch die Kulturdauer bestimmt. Hierzu wurden pHOB in der zweiten Passage von fünf Patienten ($n = 5$) ausgesät und über 28 Tage unter basalen Bedingungen kultiviert. Der Versuch wurde von Kurre und Rebenstorff (Kurre 1997; Rebenstorff 1998) zu diesen Bedingungen durchgeführt, so dass im Rahmen dieser Promotionsarbeit zum Ergebniserhalt lediglich die entsprechenden Genexpressionen mittels RT-PCR gemessen werden mussten. Die folgenden Abb. und Tab. veranschaulichen detektierte Ergebnisse.

Abb. 20: **Genexpression von OSX, RUNX2, OC und der AP in pHOB** unter basalen Kulturbedingungen an Tag 4, 8, 12, 20 und 28 im Zeitverlauf analysiert mittels semiquantitativer PCR. Die Daten repräsentieren das Ergebnis von fünf Patienten dargestellt als Mittelwerte/L7 in Prozent mit zugehörigem Standardfehler (SEM). Der höchste Wert der Genexpression wurde als 100% dargestellt. Die Sterne markieren die Signifikanzen und beziehen sich auf Tag 4: * = $p < 0,05$; ** = $p < 0,01$.

Tab. 39: Versuchsdaten der Genexpressionsverhältnisse von OSX, RUNX2, OC und der AP in pHOB unter Kontrollbedingungen von fünf Patienten. Die Mittelwerte (MW) sind auf L7 bezogen. SEM gibt den jeweiligen Standardfehler an.

Gen	Tag 4		Tag 8		Tag 12		Tag 20		Tag 28	
	MW/L7	SEM	MW/L7	SEM	MW/L7	SEM	MW/L7	SEM	MW/L7	SEM
OSX	13,83	2,01	15,11	4,29	27,99	4,95	47,72	11,96	100,00	7,79
RUNX2	87,96	14,91	62,14	12,19	59,74	24,19	81,78	17,66	100,00	35,36
OC	85,17	42,75	72,08	24,96	39,77	3,99	100,00	35,75	51,07	25,62
AP	56,10	25,51	100,00	49,96	57,88	23,17	81,26	27,48	80,05	28,06

Die Ergebnisauswertung der pHOB unter basaler Kultivierung über 28 Tage zeigte mit Zunahme der Kulturdauer eine stetig ansteigende Genexpression von OSX, die zum letzten Zeitpunkt signifikant um das 6,3-fache ($p = 0,0076$) höher lag, als an Tag 4 (s. Abb. 20 und Tab. 39). Die Genexpression von L7 blieb im gesamten Kulturverlauf auf konstantem Niveau (s. Abb. 21).

Die Analyse in den unter basalen Bedingungen kultivierten pHOB hinsichtlich des Expressionsmusters von RUNX2 im Verlauf von 28 Tagen blieb weitgehend konstant. Der deutlichste nicht signifikante Expressionsunterschied zeigte sich zwischen Tag 12 und Tag 28, wobei die Genexpression auf das 1,7-fache anstieg (s. Abb. 20 und Tab. 39).

Die Genexpressionsanalysen von OC und der AP ergaben keine Signifikanzen. Im Detail nahm die Genexpression von OC vom 4. Tag zum 12. Tag um ca. 50% ab. An Tag 20 wurde die maximale Genexpression erreicht (s. Abb. 20 und Tab. 39). Die AP zeigte an Tag 8 ihre maximale Genexpression. Die Genexpressionslevel der AP waren an den übrigen Zeitpunkten auf konstantem Niveau messbar (s. Abb. 20 und Tab. 39).

Schlussfolgernd darf gesagt werden, dass zu diesem frühen Zeitpunkt der Differenzierung OSX ein äußerst niedriges Expressionsniveau aufzeigt, um mit andauernder Kultivierung signifikant um ein

Vielfaches des Ausgangswertes anzusteigen. RUNX2 hingegen weist zu diesem frühen Zeitpunkt der Differenzierung ein hohes Expressionsniveau auf und wird im weiteren Kulturverlauf konstant exprimiert. Die Gene OSX, OC und AP werden im Vergleich zu den Primärkulturen (s. 3.1.2) auf deutlich niedrigerem Niveau exprimiert (vergleiche die Konzentrationen der verwendeten Mimics: Abb. 18 und Abb. 21).

Abb. 21: **Darstellung der Genexpression von OSX, RUNX2, OC, AP und L7** exemplarisch für einen Patienten. Abgebildet sind die Banden auf Agarosegelen nach Durchführung einer semiquantitativen PCR und Agarose-Gelelektrophorese. Die Kulturdauer der pHOB betrug 28 Tage unter basalen Kulturbedingungen. Die Gele wurden bezüglich der Zusammensetzung bearbeitet, da sie in anderer Reihenfolge pipettiert wurden.

3.1.4 Systematische Untersuchung der Genexpression von OSX und RUNX2 in pHOB unter Stimulation mit Vitamin C, TGF-β1, BMP2 und Dexamethason an Tag 4 und 28

Da die Genexpression für OSX und RUNX2 unter basalen Konditionen ausführlich analysiert wurde, bestand die Intention mit diesem Versuch Informationen bezüglich des Expressionsmusters genannter Gene unter Stimulationsbedingungen zu erhalten, um die Rolle dieser beiden frühen Differenzierungsmarker systematischer zu untersuchen. Zur Stimulation kamen Vitamin C (50 µg/ml), TGF-β 1 (1 µg/ml), BMP2 (50 ng/ml) oder Dexamethason (10^{-8} M) zum Einsatz. Die Stimulation erfolgte an Tag 4 und 28 jeweils 24 Stunden vor der Zellaufarbeitung. Die folgenden Abb. und Tab. zeigen die ermittelten Ergebnisse in Bezug auf die jeweilige Genexpression an Tag 4 und Tag 28.

Abb. 22: **Darstellung der Genexpression von OSX** nach Stimulation der pHOB über 24 Stunden mit Vitamin C (Vit C), TGF- β 1 (TGF), BMP2 (BMP) und Dexamethason (Dexa) an Tag 4 und 28 mittels semiquantitativer PCR analysiert. Die Daten vermitteln das Ergebnis von vier parallelen Versuchsansätzen ($n = 4$), ausgenommen der Kontrolle ($n = 2$ an Tag 4; $n = 3$ an Tag 28), dargestellt als Mittelwerte/L7 zuzüglich des Standardfehlers. Die Kontrolle wurde gleich 'eins' gesetzt und die gleichfarbigen Säulen stellen den Genexpressionsunterschied zur Kontrolle dar. Der Stern markiert die Teilsignifikanz (*) = $p < 0,1$ bezogen auf die Kontrolle.

Tab. 40: Versuchsdaten zur Genexpression von OSX in pHOB nach Stimulation mit verschiedenen Stimulanzen an Tag 4 und 28. Die Mittelwerte (MW) sind auf L7 bezogen. SEM gibt den jeweiligen Standardfehler an.

Stimulation	Tag 4		Tag 28	
	MW/L7	SEM	MW/L7	SEM
Kontrolle	1,00	0,07	0,50	0,11
Vitamin C	1,86	0,58	0,74	0,07
TGF- β 1	1,48	0,38	0,46	0,08
BMP 2	2,16	0,34	0,94	0,15
Dexamethason	1,08	0,33	0,55	0,13

Eine Induktion um den Faktor 1,9 und 2,2 der Genexpression von OSX im Vergleich zur Kontrolle konnte durch die Stimulanzen Vitamin C und BMP2 an Tag 4 nachgewiesen werden (s. Abb. 22 und Tab. 40). Nach 28 Tagen in Kultur konnte bei der Stimulation mit Vitamin C im Vergleich zur Kontrolle ein Expressionsanstieg von OSX um den Faktor 1,5 ermittelt werden. TGF- β 1 und Dexamethason ließen an Tag 28 keinen Einfluss auf die Expressionsverhältnisse von OSX erkennen. Unter der Stimulation mit BMP2 wurde eine signifikante Tendenz ($p = 0,0571$) hinsichtlich der Induktion der Genexpression von OSX an Tag 28 auf das 1,9-fache der Kontrolle nachgewiesen (s. Abb. 22 und Tab. 40). Die Expression von L7 blieb zu beiden Zeitpunkten durch die Stimulation unbeeinflusst (nicht abgebildet).

Abb. 23: **Darstellung der Genexpression von RUNX2** nach Stimulation der pHOB über 24 Stunden mit Vitamin C (Vit C), TGF- β 1 (TGF), BMP2 (BMP) und Dexamethason (Dexa) an Tag 4 und 28 mittels semiquantitativer PCR analysiert. Die Daten vermitteln das Ergebnis von vier parallelen Versuchsansätzen ($n = 4$), ausgenommen die Kontrolle ($n = 2$ an Tag 28; $n = 3$ an Tag 4), dargestellt als Mittelwerte/L7 zuzüglich des Standardfehlers. Die Kontrolle wurde gleich 'eins' gesetzt und die gleichfarbigen Säulen stellen den Genexpressionsunterschied zur Kontrolle dar. Der Stern markiert die Signifikanz (*) = $p < 0,1$ bezogen auf die Kontrolle.

Tab. 41: Versuchsdaten zur Genexpression von RUNX2 in pHOB nach Stimulation mit verschiedenen Stimulanzien an Tag 4 und 28. Die Mittelwerte (MW) sind auf L7 bezogen. SEM gibt den jeweiligen Standardfehler an.

Stimulation	Tag 4		Tag 28	
	MW/L7	SEM	MW/L7	SEM
Kontrolle	1,00	0,16	2,00	0,99
Vitamin C	0,96	0,07	4,94	0,75
TGF- β 1	0,39	0,09	4,29	0,22
BMP 2	0,65	0,04	5,27	0,44
Dexamethason	0,86	0,16	5,13	0,69

Für die Genexpression von RUNX2 an Tag 4 nach 24 stündiger Stimulation mit TGF- β 1 und BMP2 wurde eine tendenziell signifikante Reduktion um 60 % bzw. 35 % ($p = 0,0571$) in Bezug zur Kontrollexpression verifiziert.

Alle stimulierenden Substanzen zeigten an Tag 28 eine erhebliche genexpressionsinduzierende Wirkung um mindestens das 2,1-fache der Kontrolle bei der Expressionsanalyse von RUNX2. Den größten Effekt auf die Expressivität von RUNX2 erzielte die Stimulation mit BMP2, die, bezogen auf die Kontrolle, den Faktor 2,6 betrug (s. Abb. 23 und Tab. 41). Der Verlauf der Genexpression von OC von Tag 4 zu Tag 28 zeigte als Zeichen zunehmender Differenzierung einen Anstieg um den Faktor 2,5 (nicht gezeigt).

Abschließend kann gesagt werden, dass für die Genexpression von OSX sowohl an Tag 4 als auch am 28. Tag ein nahezu identisches Expressionsmuster identifiziert werden konnte. Für Vitamin C und BMP2 wurde eine deutliche Induzierbarkeit der Genexpression bewiesen. Die Genexpression von RUNX2 unterschied sich zu beiden Zeitpunkten erheblich. An Tag 4 konnten hemmende Einflüsse von TGF- β 1 und BMP2 gemessen werden, wohingegen am 28. Tag für jede Stimulationsart erhebliche Anstiege der Genexpression von RUNX2 nachweisbar waren. Somit ist die Genexpression des Transkriptionsfaktors

RUNX2 sehr stark vom Differenzierungsstadium beziehungsweise vom Entwicklungsstadium der Zellen abhängig.

3.1.5 Differenzierungsabhängige Genexpression von OSX und RUNX2 unter osteogener Stimulation in pHOB

Nachdem im oben beschriebenen Versuch (3.1.4) die Auswirkung einzelner Substanzen auf die Genexpression von osteoblastären Markern untersucht wurde, war es Ziel dieses Versuches Zellkulturbedingungen zu schaffen, die eine maximale Stimulation der pHOB bewirken würden, um weitere Gesichtspunkte bezüglich des Expressionsmusters von OSX und RUNX2 zu gewinnen. Die Bedingungen wurden nach Owen TA et al. (1990) mit β -GP (10 mM), Dexamethason (10^{-8} M), Vitamin-C-Phosphat (10 μ M) und FCS (10%) gewählt. Die Kulturdauer betrug 29 Tage, wobei die osteogenen Stimulanzien kontinuierlich zugesetzt wurden. 24 Stunden vor der Zellaufarbeitung wurde FCS durch BSA (0,1%) ersetzt. Die Genexpression der AP steigt unter diesen Kulturbedingungen an Tag 15 um das 5-fache des Ausgangswertes an Tag 4. Im weiteren Kulturverlauf konnte eine Reduktion der maximalen Genexpression um 45% verifiziert werden. Die Genexpression von OC erhöhte sich nach 29 Tagen in Kultur unter oben angeführten Bedingungen um den Faktor 2,2 in Bezug auf die Expression an Tag 4 (Siggelkow et al. 2004). In den nachstehenden Abb. und Tab. sind wesentliche Ergebnisse aufgeführt.

Abb. 24: **Genexpression von OSX** unter osteogenen (β -GP (10 mM), Dexamethason (10^{-8} M), Vitamin-C-Phosphat (10 μ M) und FCS) Kulturbedingungen an Tag 4, 8, 15, 22 und 29 im Zeitverlauf analysiert mittels semiquantitativer PCR. Die Daten repräsentieren das Ergebnis von vier parallelen Versuchsansätzen (n = 4) dargestellt als Mittelwerte/L7 in Prozent mit zugehörigem Standardfehler (SEM). Der höchste Wert der Genexpression wurde mit 100% gleich gesetzt. Die Signifikanzen beziehen sich auf Tag 4 und sind durch Sterne markiert: (*) = p < 0,1; * = p < 0,05.

Tab. 42: Versuchsdaten zur Genexpression von OSX in pHOB unter stimulierten Bedingungen. Die Mittelwerte (MW) sind auf L7 bezogen. SEM gibt den jeweiligen Standardfehler an.

	Tag 4		Tag 8		Tag 15		Tag 22		Tag 29	
	MW/L7	SEM	MW/L7	SEM	MW/L7	SEM	MW/L7	SEM	MW/L7	SEM
OSX	100,00	19,46	36,54	5,99	33,98	10,93	13,59	2,45	17,77	2,26

Mit zunehmender Kulturdauer entpuppte sich eine signifikante Hemmung der Genexpression von OSX, wobei die maximale um 86 % betragende Hemmung ($p = 0,0286$) des Ausgangswertes an Tag 4, nach 22 Tagen in Kultur nachzuweisen war (s. Abb. 24 und Tab. 42). Weiterhin zeigte sich eine unabhängig der Stimulation konstante Genexpression von L7 (nicht abgebildet).

Abb. 25: **Genexpression von RUNX2** unter osteogenen (β -GP (10 mM), Dexamethason (10^{-8} M), Vitamin-C-Phosphat (10 μ M) und FCS) Kulturbedingungen an Tag 4, 8, 15, 22 und 29 im Zeitverlauf analysiert mittels semiquantitativer PCR. Die Daten repräsentieren das Ergebnis von vier parallelen Versuchsansätzen ($n = 4$) dargestellt als Mittelwerte/L7 in Prozent mit zugehörigem Standardfehler (SEM). Der höchste Wert der Genexpression wurde mit 100% gleich gesetzt. Die statistische Auswertung ergab keine Signifikanzen.

Tab. 43: Versuchsdaten zur Genexpression von RUNX2 in pHOB unter stimulierten Bedingungen. Die Mittelwerte (MW) sind auf L7 bezogen. SEM gibt den jeweiligen Standardfehler an.

	Tag 4		Tag 8		Tag 15		Tag 22		Tag 29	
	MW/L7	SEM	MW/L7	SEM	MW/L7	SEM	MW/L7	SEM	MW/L7	SEM
RUNX2	93,28	11,16	100,00	7,73	91,29	6,70	89,25	9,85	89,57	4,88

Während des gesamten Kulturverlaufs über 29 Tage unter kontinuierlicher Stimulation konnten keine nennenswerten Expressionsschwankungen von RUNX2 detektiert werden (s. Abb. 25 und Tab. 43).

Abschließend bleibt festzuhalten, dass die Genexpression von OSX mit zunehmender Differenzierung abnimmt (s. Abb. 24 und Tab. 42), wohingegen die Genexpression des Transkriptionsfaktors RUNX2 nicht beeinflusst wird (s. Abb. 25 und Tab. 43).

3.2 Transfektionsergebnisse

Um die Funktion der osteoblastären Differenzierungszusammenhänge präziser zu erfassen, wurden siRNA-Genexperimente durchgeführt. Da RUNX2 früher und konstanter als der Transkriptionsfaktor OSX exprimiert wird, wurde er in Transfektionsversuchen supprimiert. Bevor die Transfektionsversuche an pHOB durchgeführt wurden, musste eine Transfektionsmethode etabliert werden. Dazu wurden zwei Transfektionsmethoden, die Elektroporation und die Lipofektion, an HOS 58 und pHOB erprobt. Die nachstehenden Versuche skizzieren den Werdegang der Transfektionsetablierung bis zum endgültigen Transfektionsversuch an pHOB.

3.2.1 Initialer Transfektionsversuch mit GAPDH an HOS 58

Die Intention dieses Versuches bestand in der Testung zweier Transfektionsmethoden, der Lipofektion und der Elektroporation, um die effektivere Methode für umfangreichere Zellversuche zu optimieren. Hierzu wurden HOS 58 Zellen der 14. Passage verwendet, wobei die zur Lipofektion vorgesehenen Zellen 24 Stunden vor Transfektion ausplattiert werden mussten. Als siRNA wurden Sequenzen für GAPDH verwendet. Der Wechsel des Transfektionsmediums fand nach 3 Stunden statt (s. 2.2.7.2). Die elektroporierten Zellen hingegen wurden erst nach erfolgter Elektroporation ausplattiert (s. 2.2.7.1). Zur Transfektion der Kontrollzellen wurde eine ineffektive siRNA („scrambled“ siRNA) verwendet. Die weitere Zellkultivierung der mit unterschiedlichen Transfektionsmethoden behandelten Zellen war identisch, so dass 48 Stunden nach durchgeführter Transfektion die Zellaufarbeitung begann, um die Effizienz der Transfektion zu überprüfen. Der Versuch wurde mit 1 µg siRNA je „well“ und mit Zweifachwerten durchgeführt (n = 2).

Abb. 26 und Tab. 44 geben die ermittelten Ergebnisse wieder.

Abb. 26: Genexpression von GAPDH mit entsprechenden Agarosegelen in HOS 58 48 h nach Lipofektion (1 µg siRNA/6er „well“) und 48 h nach Elektroporation (1 µg siRNA/6er „well“) analysiert mittels semiquantitativer PCR. Abgebildet sind errechnete Mittelwerte/L7 (n = 2) zuzüglich des Standardfehlers (SEM). Die Gele wurden bezüglich der Zusammensetzung bearbeitet, da sie in anderer Reihenfolge pipettiert wurden.

Tab. 44: Daten zum Vergleich der Transfektionseffizienz nach 48 h zwischen Lipofektion und Elektroporation anhand der Genexpression von GAPDH. Dargestellt sind die auf L7 bezogenen Mittelwerte (n = 2) mit entsprechendem Standardfehler (SEM).

siRNA	Lipofektion		Elektroporation	
	MW/L7	SEM	MW/L7	SEM
Kontrolle	0,4525	0,0055	0,4130	0,007
GAPDH	0,2015	0,0545	0,3250	0,028

Es zeigte sich bei konstanter Expression des „housekeeping“ Gens L7 (nicht abgebildet) im Vergleich der beiden Transfektionsmethoden ein erheblicher Effizienzunterschied. So ließ sich die Genexpression von GAPDH durch eine Transfektion mit Lipofectamine 2000 um 56% supprimieren, wohingegen die Reduktion der Expression von GAPDH durch die Elektroporation nur um 21% gelang (s. Abb. 26 und Tab. 44).

3.2.2 Konzentrationsabhängige Lipofektion an HOS 58

Nach den Ergebnissen des initialen Transfektionsversuches (s. 3.2.1) konzentrierten sich Folgeversuche an HOS 58 auf die Optimierung der Lipofektion. Die Absicht dieses Versuches war es, eine direkte Abhängigkeit der siRNA-Konzentration zur Transfektionseffektivität zu eruieren. Das Zielgen war GAPDH und es wurden 1 µg, 1,5 µg und 2 µg siRNA pro "well" hinzugegeben. Die Kontrollzellen wurden bis auf die Transfektion einer effektlosen siRNA anstelle der siRNA gegen GAPDH zu identischen Bedingungen kultiviert. Die Lipofektion erfolgte nach Protokoll (s. 2.2.7.2). Der Transfektionsmediumswechsel erfolgte nach 3 Stunden. Der Versuch wurde mit Doppelwerten durchgeführt (n = 2). Abb. 27 und Tab. 45 zeigen die erhaltenen Ergebnisse.

Abb. 27: **Genexpression von GAPDH in HOS 58** in Abhängigkeit verschiedener, 1 µg, 1,5 µg und 2 µg siRNA-Konzentrationen mittels semiquantitativer PCR analysiert. Dargestellt sind die Mittelwerte (n = 2) mit entsprechendem Standardfehler (SEM) und Agarosegel. Die Gele wurden bezüglich der Zusammensetzung bearbeitet, da sie in anderer Reihenfolge pipettiert wurden.

Tab.45: Daten zur konzentrationsabhängigen Transfektion. Aufgelistet sind die erhaltenen Mittelwerte unter den verwendeten Konzentrationen der siRNAs. Die Mittelwerte sind auf L7 bezogen. SEM gibt den Standardfehler an.

	1µg	SEM	1,5µg	SEM	2µg	SEM
Kontrolle	0,5040	0,0560	0,3580	0,0875	0,3675	0,0365
GAPDH	0,1485	0,0325	0,1910	0,0410	0,1350	0,0180

Die Gensuppression von GAPDH lag unter konstanter Genexpression von L7 (nicht abgebildet) mit Verwendung einer Konzentration von 1 µg siRNA pro Zellansatz bei 71%. Die Transfektionseffizienz verbesserte sich nicht mit steigender siRNA-Konzentration, sondern verringerte sich sogar (Abb. 27 und Tab. 45). Aus diesen Gründen wurde für Folgeversuche eine Konzentration von 1 µg gewählt.

3.2.3 Optimierung der Lipofektion an HOS 58 unter Berücksichtigung der Transfektionsdauer

Nachdem sich 1 µg als die am besten geeignete siRNA-Konzentration erwiesen hatte, nahm die Fragestellung hinsichtlich der Transfektionsdauer in diesem Versuch eine zentrale Bedeutung ein. Bisher verblieb das Transfektionsmedium 3 Stunden auf den Zellen. Zur Verbesserung der Transfektionseffizienz wurde das Medium nicht nach 3 Stunden, sondern nach 24 Stunden entfernt. Die restlichen Bedingungen wurden zum Vorversuch (s. 3.2.2) nicht geändert. Der Versuch ist dreifach (n = 3) durchgeführt worden.

Abb. 28: **Genexpressionsmuster von GAPDH in HOS 58** mit Austausch des Transfektionsmediums nach 24 Stunden. Expression durch RT-PCR ermittelt. Abgebildet sind Mittelwerte/L7 (n = 3) mit zugehörigem Agarosegel und Standardfehler (SEM). Das Gel wurde bezüglich der Zusammensetzung bearbeitet, da es in anderer Reihenfolge pipettiert wurde.

Tab. 46: Daten zur Genexpression von GAPDH in HOS 58 nach Transfektion über 24 Stunden. Die Mittelwerte sind auf L7 bezogen und SEM gibt den Standardfehler an.

siRNA	MW/L7	SEM
Kontrolle	0,4077	0,0104
GAPDH	0,0590	0,0036

Unter diesen gewählten Bedingungen, 40000 Zellen/6er "well", 1 µg siRNA/6er "well", 10 µl Lipofectamine 2000/6er "well" und 24 h nach erfolgter Transfektion Wechsel des Transfektionsmediums, ließ sich die Genexpression von GAPDH um 85% verringern (Abb. 28 und Tab. 46). Die Zellzahl veränderte sich dabei nicht, aber auf Translationsebene kam es zu einer Hemmung um 28% (s. Abb. 29).

Abb. 29: **Darstellung der Gesamt-RNA-Ausbeute** im Transfektionsversuch mit HOS 58 nach 24 stündiger Behandlung mit Lipofectamine 2000.

Die Etablierung der Transfektionsmethode mit Lipofectamine 2000 für die Zellreihe HOS 58 war mit diesem Versuch erfolgreich.

3.2.4 Initialer Transfektionsversuch mit GAPDH an pHOB

Nach der erfolgreichen Transfektion der Zellreihe HOS 58 mit Lipofektamin, war es Ziel, eine Transfektionsmethode für die pHOB zu etablieren. Hierzu wurden exakt die gleichen Transfektionsparameter gewählt, die beim initialen Transfektionsversuch an HOS 58 verwendeten wurden (s. 3.2.1), um auch bei den pHOB die effizientere Methode, entweder die Lipofektion (s. 2.2.7.2) oder die Elektroporation (s. 2.2.7.1), zu verifizieren. Nur das Transfektionsreagenz Lipofectamine 2000 wurde vom initialen HOS 58 Transfektionsprotokoll abweichend mit 5 μl/“well“ eingesetzt. Der Versuch wurde einfach durchgeführt (n = 1).

Abb.30 und Tab. 47 geben Aufschluss über ermittelte Ergebnisse.

Abb. 30: **Genexpressionsveränderungen von GAPDH mit entsprechenden Agarosegelen in pHOB** 48 h nach Lipofektion (1 μg siRNA/6er “well“) und 48 h nach Elektroporation (1 μg siRNA/6er “well“) mittels semiquantitativer RT-PCR analysiert und als Einzelwerte/L7 dargestellt. Die Gelbande unter A entspricht der “scrambled“ siRNA. Die Gelbanden unter B entspricht der siRNA gegen GAPDH. Die Gele wurden bezüglich der Zusammensetzung bearbeitet, da sie in anderer Reihenfolge pipettiert wurden.

Tab. 47: Daten zum Vergleich der Transfektionseffizienz zwischen Lipofektion und Elektroporation anhand der Genexpression von GAPDH. Dargestellt sind die auf L7 bezogenen Werte (n = 1).

siRNA	Lipofektion	Elektroporation
	MW/L7	MW/L7
Kontrolle	1,635	0,914
GAPDH	0,137	0,603

Es zeigte sich bei konstanter Expression des “housekeeping“ Gens L7 (nicht abgebildet) beim Vergleich der beiden Transfektionsmethoden ein extremer Effizienzunterschied. Die durch Lipofektion erreichte Gensuppression von GAPDH lag bei 92%. Durch die Elektroporation ließ sich die Expression von GAPDH nur um 34% reduzieren (Abb. 30 und Tab. 47).

Es kristallisierte sich bezüglich der effizienteren Transfektionsmethodik gleiches wie bei den Transfektionsversuchen mit der Zellreihe HOS 58 (3.2.1) heraus, denn auch im Versuch mit pHOB erwies sich die Lipofektion im Vergleich zur Elektroporation als eindeutig überlegen.

3.2.5 Lipofektion an frischen pHOB im Vergleich zu aufgetauten pHOB

Nachdem die Lipofektion als Transfektionsmethode gewählt wurde, folgten zwei Versuche zur Optimierung der Transfektion. In diesem ersten Optimierungsversuch wurde die Transfektionseffizienz an frischen pHOB im Vergleich zu aufgetauten pHOB, in der Annahme, dass der Vorgang des Auftauens die Zellpermeabilität beeinflusst, überprüft. Hierzu wurde ein Teil der pHOB eines Patienten im nicht aufgetauten Zustand exakt nach den im Vorversuch (s. 3.2.4) gewählten Bedingungen transfiziert. Die nicht verwendeten pHOB wurden in flüssigem Stickstoff eingefroren, um sie nach 5 Tagen aufzutauen und zu gleichen Bedingungen wie die frischen pHOB zu transfizieren. Vom Transfektionsreagenz Lipofectamine 2000 wurde abweichend zum Vorversuch (s. 3.2.4) 10 µl/“well“ eingesetzt. Die folgenden Abb. und Tab. veranschaulichen detektierte Ergebnisse.

Abb. 31: Darstellung der Genexpression von GAPDH mit entsprechendem Agarosegel (A: “scrambled“ siRNA; B: siRNA gegen GAPDH) im Vergleich der Transfektionseffizienz mit Lipofectamine 2000 von frischen zu aufgetauten pHOB als Einzelwerte/L7. Die Ergebnisse wurden mittels semiquantitativer RT-PCR analysiert.

Tab. 48: Daten zum Vergleich der Transfektionseffizienz zwischen frischen und aufgetauten pHOB anhand der Genexpression von GAPDH. Dargestellt sind die auf L7 bezogenen Werte (n = 1).

siRNA	frisch	aufgetaut
	MW/L7	MW/L7
Kontrolle	7,196	16,868
GAPDH	0,458	1,272

Die Gensuppression von etwa je 93% wies sowohl bei den aufgetauten als auch bei den nicht aufgetauten Zellen keine Variabilität im Vergleich auf.

3.2.6 Lipofektion an pHOB in Abhängigkeit der Transfektionsdauer

Das Bestreben dieses zweiten Optimierungsversuches war es, die Transfektionseffizienz in Abhängigkeit der Transfektionsdauer zu überprüfen. Dazu wurde bei den transfizierten Zellen das Transfektionsmedium nach 3, 6, 12 und 24 Stunden gewechselt. Das Transfektionsreagenz Lipofectamine 2000 wurde mit 5 µl/“well“ eingesetzt. Die restlichen Transfektionsparameter blieben zum Vorversuch (s. 3.2.5) identisch. Der Versuch wurde einfach (n = 1) durchgeführt. In Abb. 32 und Tab. 49 sind entsprechende Ergebnisse angeführt.

Abb. 32: Genexpression mit entsprechendem Agarosegel in pHOB von GAPDH in Abhängigkeit der Transfektionsdauer mit Lipofectamine 2000 (3-24 h). Die Ergebnisse wurden mittels semiquantitativer PCR ausgewertet und als Einzelwerte/L7 dargestellt.

Tab. 49: Versuchsdaten zum Vergleich der Transfektionseffizienz hinsichtlich der Transfektionsdauer (3-24 h). Abgebildet sind die auf L7 bezogenen Werte (n = 1) der Genexpression von GAPDH.

	3 h	6 h	12 h	24 h
Kontrolle	1,635	2,804	3,124	1,303
GAPDH	0,137	0,162	0,063	0,042

Die Genexpression von GAPDH ließ sich nach 3 h um 92%, nach 6 h um 94%, nach 12 h um 98% und nach 24 h um 97% durch die Transfektion supprimieren. Um die Zellvitalität zu eruieren, wurde die Gesamt-RNA-Ausbeute gemessen und als Hinweis für die Zelltoxizität gewertet (s. Abb. 33).

Abb. 33: **Darstellung der Gesamt-RNA-Ausbeute** im Transfektionsversuch mit pHOB in Abhängigkeit der Zeit hinsichtlich der Behandlungsdauer mit Lipofectamine 2000.

Die Auswertung der Gensuppression in Abhängigkeit zur Transfektionsdauer ergab, dass sich das beste Verhältnis zwischen Zelltoxizität und Expressionssuppression nach 6 Stunden abzeichnete. Zwar war das absolute Ergebnis der Gensuppression nach 12- und 24 stündiger Transfektionsdauer am effektivsten (s. Abb. 32), aber beim Miteinbeziehen der Zelltoxizität (s. Abb. 33) kamen diese Transfektionsoptionen für Folgeversuche nicht in Betracht. Aus diesen genannten Gründen wurde für Folgeversuche eine Transfektionsdauer von 6 Stunden gewählt.

3.2.7 Vergleich von zwei verschiedenen siRNAs gegen RUNX2

Absicht dieses Versuches war es, eine möglichst optimale siRNA gegen RUNX2 zu etablieren. Hierzu wurden pHOB mittels Lipofectamine 2000 mit einer “scrambled“ siRNA und zwei siRNAs gegen RUNX2, die an zwei unterschiedlichen Punkten der mRNA angreifen, transfiziert. Das Transfektionsmedium wurde hinsichtlich der Erkenntnisse des Vorversuches nach 6 h gewechselt. Die restlichen Transfektionsparameter glichen denen zum Vorversuch (s. 3.2.6). Der Versuch wurde mit Einzelwerten (n = 1) durchgeführt.

Abb. 34: **Schematische Darstellung der Angriffspunkte der beiden siRNAs gegen RUNX2** in der mRNA-Sequenz des Gens RUNX2 (A). Genexpression mit entsprechendem Agarosegel, 48 h nach Lipofektion, von RUNX2 beim Test zweier siRNAs gegen RUNX2 mittels semiquantitativer PCR als Einzelwerte analysiert (B). scr. = "scrambled".

Tab. 50: Versuchsdaten zum Vergleich der Transfektionseffizienz hinsichtlich zweier siRNAs gegen RUNX2. Abgebildet sind die auf L7 bezogenen Werte ($n = 1$) der Genexpression von RUNX2.

	scrambled siRNA	RUNX2 siRNA Nr. 1	RUNX2 siRNA Nr. 4
MW/L7	0,993	0,201	0,088

Die parallele Testung der siRNAs gegen RUNX2 ergab für die RUNX2-siRNA Nr. 1 eine Suppression der Genexpression von RUNX2 um 79,8% und für die RUNX2-siRNA Nr. 4 eine Suppression um 91,2% (Abb. 34), so dass für Folgeversuche die RUNX2-siRNA Nr. 4 eingesetzt wurde.

3.2.8 Wirkdauer der Lipofektion an pHOB

In diesem Versuch wurde das Anhalten der Transfektionswirkung durch die siRNA gegen GAPDH und RUNX2 über einen Zeitraum von sieben Tagen untersucht. Das Wechseln des Transfektionsmediums wurde nach 6 Stunden vorgenommen. Die Transfektionswirkung wurde nach 2, 3, 4, 5, 6 und 7 Tagen überprüft. Alle weiteren Parameter entsprachen denen zum Vorversuch (s. 3.2.7). Der Versuch wurde einfach durchgeführt ($n = 1$)

Abb. 35: **Genexpression von GAPDH in pHOB** im Zeitverlauf über 7 Tage nach erfolgter Lipofektion mit einer siRNA gegen GAPDH mittels semiquantitativer PCR ausgewertet und als Einzelwerte/L7 dargestellt (B). Unter A ist ein entsprechendes Agarosegel abgebildet.

Tab. 51: Versuchsdaten zu den Ergebnissen der Genexpression von GAPDH im Zeitverlauf über 7 Tage. Aufgelistet sind die auf L7 bezogenen Einzelwerte.

	2 d	3 d	4 d	5 d	6 d	7 d
Kontrolle	1,6930	1,4500	2,0330	1,35	1,213	1,845
GAPDH	0,14	0,147	0,379	0,276	0,1960	0,3240

Die Dauer des Gen-supprimierenden Effektes der GAPDH-siRNA war im gesamten 7 tägigen Zeitintervall mit einer Mindesteffizienz von 80 % am 5. Tag nachweisbar (s. Abb. 35 und Tab. 51).

Es scheint so, als habe die siRNA gegen RUNX2 einen induzierenden Effekt auf die Genexpression von GAPDH (s. Abb. 35 A). Eine leicht toxische Wirkung der “scrambled“ siRNA ist aber wahrscheinlicher, da beim Messen der Genexpression von RUNX2 die Kontrollexpression der “scrambled“ siRNA ebenfalls unter der Kontrollexpression der siRNA gegen GAPDH lag (s. Abb. 36 A).

Abb. 36: Genexpression von RUNX2 in pHOB im Zeitverlauf über 7 Tage nach erfolgter Lipofektion mit einer siRNA gegen RUNX2 mittels semiquantitativer PCR ausgewertet und als Einzelwerte/L7 dargestellt (B). Unter A ist ein entsprechendes Agarosegel abgebildet.

Tab. 52: Versuchsdaten zu den Ergebnissen der Genexpression von RUNX2 im Zeitverlauf über 7 Tage. Aufgelistet sind die auf L7 bezogenen Einzelwerte.

	2 d	3 d	4 d	5 d	6 d	7 d
Kontrolle	1,029	0,568	1,714	1,221	1,106	0,692
RUNX2	0,216	0,334	0,799	0,541	0,281	0,348

Im siebentägigen Zeitverlauf konnte eine nennenswerte Suppression der Genexpression von RUNX2 nachgewiesen werden, die am sechsten Tag nach erfolgter Transfektion ca. 25% der Kontrollexpression entsprach. Die Genexpression von RUNX2 konnte an den Tagen drei bis fünf hingegen nur zu etwa 50% supprimiert werden. Eine mögliche Ursache für die insgesamt nicht besonders hohe Transfektionseffizienz lag zum einen an der Tatsache, dass der Versuch mit Einzelwerten durchgeführt wurde und zum anderen an individuellen patientenspezifischen Unterschieden, denn eine vergleichbar moderate Transfektionseffizienz ließ sich in keinem anderen Transfektionsversuch feststellen.

Die Analyse der Transfektionseffizienz der beiden Gene GAPDH und RUNX2 im Zeitverlauf über sieben Tage hatte zum Ergebnis, dass die Suppression bis zum 4. Tag nach erfolgter Transfektion suffizient zu sein scheint, da ab dem 4. Tag ein tendenzieller Anstieg der Genexpression von GAPDH und insbesondere von RUNX2 erkennbar war (s. Abb. 35 mit Tab. 51 und Abb. 36 mit Tab. 52). Dieses Ergebnis hatte zur Folge, dass die im anstehenden Transfektionsversuch (3.2.9) verwendeten Zellen nach 4 Tagen erneut transfiziert wurden, um eine suffiziente Gensuppression von RUNX2 über einen Zeitraum von 8 Tagen zu gewährleisten. Die zuvor überprüfte Zelltoxizität zweier Transfektionszyklen erwies sich als vernachlässigbar (nicht gezeigt).

3.2.9 1. Transfektionsversuch: Auswirkung einer Gensuppression von RUNX2 über 8 Tage auf die Genexpressionen von OC, AP, PPAR γ 2, LPL und aP2 unter basalen und stimulierenden Bedingungen

In der Absicht, das Transkriptionsprodukt des Gens RUNX2 zu hemmen, um osteoblastäre Reifungsprozesse mit einem sehr niedrigen Expressionsniveau von RUNX2 zu studieren, wurden pHOB als Vierfachwerte ($n = 4$) in 6er - Wellplatten ausgesät und über 9 Tage kultiviert, wobei die Zellaufarbeitung nach 2, 5 und 9 Tagen erfolgte. Zur Stimulation wurde Vitamin-C-Phosphat ($10 \mu\text{M}$), β -GP (10 mM), Vitamin D₃ ($4 \times 10^{-8} \text{ M}$), Dexamethason (10^{-8} M) und BMP2 (50 ng/ml ; ab der 96. Stunde nach Transfektion) verwendet. Die Transfektionsparameter, $1 \mu\text{g}$ siRNA/“well“, $5 \mu\text{l}$ Lipofectamine 2000/“well“, $4 \mu\text{g}$ Plus Reagent/“well“, Wechsel des Transfektionsmediums nach 6 Stunden und Beginn des zweiten Transfektionszyklus 96 Stunden nach der ersten Transfektion, wurden nach den Ergebnissen der Vorversuche (s. 3.2.4 – 3.2.8) bestimmt. Der erste Transfektionszyklus begann 24 Stunden nach erfolgter Zellaussaat, um ein Anwachsen der pHOB nicht zu gefährden. Die erhaltenen Ergebnisse sind in den folgenden Abbildungen und Tabellen dargestellt.

A **B**

Abb. 37: **Genexpression der osteogenen (A) und adipogenen (B) Marker nach RUNX2-knock-down.** Die Genexpressionsverhältnisse wurden mittels semiquantitativer RT-PCR 24 h, 96 h und 192 h nach Lipofektion in pHOB analysiert und als Mittelwerte/L7 (n = 4) mit zugehörigem Standardfehler (SEM) dargestellt. Die Zellen wurden zu stimulierten (gestrichelte Balken) und zu basalen (gefüllte Balken) Konditionen kultiviert. Die Signifikanzen zwischen RUNX2-siRNA und “scrambled” siRNA sind mit Sternen markiert: * = $p < 0,05$; (*) = $p < 0,1$. Die 100%-Linie entspricht dem Wert der “scrambled” siRNA.

Tab. 53: Versuchsdaten der Genexpression in pHOB von RUNX2, OC, AP, PPARγ2, LPL und aP2 nach 24 h angeführt als Mittelwerte/L7 in % mit jeweiligem Standardfehler (SEM).

Gene	scrambled siRNA		RUNX2 knock down	
	MW/L7	SEM	MW/L7	SEM
RUNX2 kontrolle	100	19,32	12	1,06
OC kontrolle	100	34,74	76	6,94
AP kontrolle	100	32,19	85	3,58
PPARγ2 kontrolle	100	13,31	92	14,74
LPL kontrolle	100	30,73	154	35,83
aP2 kontrolle	100	18,60	101	14,50

Tab. 54: Versuchsdaten der Genexpression in pHOB von RUNX2, OC, AP, PPAR γ 2, LPL und aP2 nach 96 h angeführt als Mittelwerte/L7 in % mit jeweiligem Standardfehler (SEM)

Gene	scrambled siRNA		RUNX2 knock down	
	MW/L7	SEM	MW/L7	SEM
RUNX2 kontrolle	100	5,25	36	3,71
RUNX2 stimuliert	100	3,86	22	2,75
OC kontrolle	100	17,23	46	5,55
OC stimuliert	100	2,10	124	16,84
AP kontrolle	100	18,88	49	10,67
AP stimuliert	100	18,72	59	7,42
PPAR γ 2 kontrolle	100	14,41	165	16,20
PPAR γ 2 stimuliert	100	17,54	168	14,20
LPL kontrolle	100	13,42	100	14,87
LPL stimuliert	100	17,12	150	30,70
aP2 kontrolle	100	23,34	178	25,45
aP2 stimuliert	100	9,75	280	26,08

Tab. 55: Versuchsdaten der Genexpression in pHOB von RUNX2, OC, AP, PPAR γ 2, LPL und aP2 nach 192 h angeführt als Mittelwerte/L7 in % mit jeweiligem Standardfehler (SEM).

Gene	scrambled siRNA		RUNX2 knock down	
	MW/L7	SEM	MW/L7	SEM
RUNX2 kontrolle	100	5,12	67	6,06
RUNX2 stimuliert	100	16,45	56	11,35
OC kontrolle	100	19,73	56	5,03
OC stimuliert	100	21,26	132	10,27
AP kontrolle	100	1,23	106	17,77
AP stimuliert	100	16,23	57	5,09
PPAR γ 2 kontrolle	100	7,00	448	30,16
PPAR γ 2 stimuliert	100	20,62	178	18,39
LPL kontrolle	100	32,35	192	86,83
LPL stimuliert	100	28,49	238	26,49
aP2 kontrolle	100	15,75	409	51,34
aP2 stimuliert	100	21,54	1584	247,28

Alle folgenden in % angegebenen Genexpressionsveränderungen beziehen sich auf die Genexpressionswerte der “scrambled“ siRNA. In diesem Zusammenhang sind im nachstehenden Abschnitt mit den Bezeichnungen ‘Kontrolle’, ‘Kontrollexpression’ und ‘Kontrollwert’ die Genexpressionen der “scrambled“ siRNA gemeint.

Die Genexpression von RUNX2 unter basalen Bedingungen sank auf 12% 24 h nach Transfektion, auf 36% 96 h nach Transfektion und auf 67% 192 h nach Transfektion im Vergleich zur Kontrollexpression ab. Als Folge davon reduzierte sich die Genexpression von OC um 24%, 54% und 44% entsprechend. Unter osteogenen Bedingungen stieg die Genexpression von OC nach 96 h um 24% und nach 192 h um 32% über den Kontrollwert hinaus an. Unter basalen Bedingungen fiel die Genexpression der AP in Bezug zur Kontrollexpression 24 h und 96 h nach Transfektion auf 85% und 49% ab, wobei sie nach 192 h um 6% in Relation zur Kontrollexpression anstieg. Osteogene Bedingungen ließ die Genexpression der AP nach 96 h und 192 h entsprechend um 41% und 43% sinken. Der RUNX2-knock-down führte zu einem Anstieg der Genexpression der adipogenen Marker PPAR γ 2, LPL und aP2. 96 h und 192 h nach Lipofektion stieg die Genexpression von PPAR γ 2 unter basalen Konditionen um 65% und 348%. Unter

osteogener Stimulation stieg die Genexpression von PPAR γ 2 um 68% 96 h nach Transfektion und um 78% 192 h nach Transfektion im Vergleich zur Kontrolle an. 24 h und 192 h nach Transfektion stieg die Genexpression der LPL unter basaler Kultivierung um 54% und 92%. Unter osteogenen Bedingungen erhöhte sich die Genexpression der LPL um 50% 96 h nach Transfektion und um 138% 192 h nach Transfektion. 96 h und 192 h nach Transfektion stieg die Genexpression von aP2 entsprechend um 78% und 309% unter basalen Bedingungen. Unter osteogener Stimulation erhöhte sich die Genexpression von aP2 um 180% 96 h nach Transfektion und um 1484% 192 h nach Transfektion (s. Abb. 37 und Tab. 53 - 55). Die Genexpression von L7 war konstant nachweisbar (nicht gezeigt). Die Genexpression von OSX konnte nur spurenhaf in vereinzelten Proben detektiert werden (nicht gezeigt).

Die Effekte der osteogenen Stimulation führten im Gegensatz zur basalen Kultivierung in den jeweils mit der “scrambled“ siRNA transfizierten Zellen zu einer etwa 50-fachen Induktion der Genexpression von OC, etwa 10-fachen Induktion der Genexpression der AP, etwa doppelter Induktion der Genexpression von PPAR γ 2, etwa 10-fachen Induktion der Genexpression der LPL und etwa doppelter Induktion der Genexpression von aP2 (nicht gezeigt).

Abschließend bleibt festzuhalten, dass die Genexpression von OC während der Suppression von RUNX2 unter basalen Bedingungen zu jedem Zeitpunkt unterhalb der Kontrollexpression blieb, wohingegen unter stimulierten Bedingungen die Genexpression über die Kontrollexpression hinaus anstieg. Die Genexpression der AP verhielt sich zur Genexpression von OC nahezu konträr. So blieben die mRNA-Level der AP unter stimulierten Bedingungen zu jedem Zeitpunkt unterhalb des Kontrollwertes. Bei basaler Stimulation kam es nach einem Abfall der Genexpression der AP nach 96 h nach Transfektion zu einem Anstieg der Genexpression nach 192 h nach Transfektion in etwa auf das Niveau des Kontrollwertes. Zusätzlich führte die Hemmung der RUNX2-Genexpression zur signifikanten Induktion adipozytärer Marker.

Der nächste Versuch zeigt eine identische Versuchsdurchführung, um die erhaltenen Ergebnisse zu verifizieren.

3.2.10 2. Transfektionsversuch: Auswirkung einer Gensuppression von RUNX2 über 8 Tage auf die Genexpressionen von OSX, OC, AP, PPAR γ 2, LPL und aP2 unter basalen und stimulierenden Bedingungen

Hierbei wurde eine identische Durchführung wie in dem zuvor geschilderten Versuch (3.2.9) gewählt, um die dort erhaltenen Ergebnisse zu verifizieren. Die erhaltenen Ergebnisse sind in den folgenden Abbildungen und Tabellen dargestellt.

Abb. 38: Genexpression der osteogenen (A) und adipogenen (B) Marker nach RUNX2-knock-down. Die Genexpressionsverhältnisse wurden mittels semiquantitativer RT-PCR 24-192 h nach Lipofektion in pHOB analysiert und als Mittelwerte/L7 (n = 4; OSX: n = 1-3) mit zugehörigem Standardfehler (SEM) dargestellt. Die Zellen wurden zu stimulierten (gestrichelte Balken) und zu basalen (gefüllte Balken) Konditionen kultiviert. Die Signifikanzen zwischen RUNX2-siRNA und “scrambled” siRNA sind mit Sternen markiert: * = p < 0,05; (*) = p < 0,1. Die 100%-Linie entspricht dem Wert der “scrambled” siRNA.

Abb. 39: **Darstellung der Genexpression von RUNX2, OSX, OC und AP des Transfektionsversuches mit pHOB.** Abgebildet sind die Banden auf Agarosegelen nach Durchführung einer semiquantitativen PCR und Agarose-Gelelektrophorese. Die Kulturdauer der pHOB betrug 9 Tage, wobei der Transkriptionsfaktor RUNX2 über 8 Tage mittels siRNA supprimiert wurde. Zur Kontrolle wurde eine "scrambled" (scr.) siRNA verwendet. Die Zellen des ersten Zeitpunktes wurden nur basal behandelt. Die beiden weiteren Zeitpunkte fanden zu basalen und stimulierten Konditionen statt. Die Gele wurden bezüglich der Zusammensetzung bearbeitet, da sie teilweise in anderer Reihenfolge pipettiert wurden.

Abb. 40: **Darstellung der Genexpression von PPAR γ 2, LPL, aP2 und L7 des Transfektionsversuches mit pHOB.** Abgebildet sind die Banden auf Agarosegelen nach Durchführung einer semiquantitativen PCR und Agarose-Gelelektrophorese. Die Kulturdauer der pHOB betrug 9 Tage, wobei der Transkriptionsfaktor RUNX2 über 8 Tage mittels siRNA supprimiert wurde. Zur Kontrolle wurde eine "scrambled" (scr.) siRNA verwendet. Die Zellen des ersten Zeitpunktes wurden nur basal behandelt. Die beiden weiteren Zeitpunkte fanden zu basalen und stimulierten Konditionen statt. Die Gele wurden bezüglich der Zusammensetzung bearbeitet, da sie teilweise in anderer Reihenfolge pipettiert wurden.

Tab. 56: Versuchsdaten der Genexpression in pHOB von RUNX2, OC, AP, PPAR γ 2, LPL und aP2 nach 24 h angeführt als Mittelwerte/L7 in % mit jeweiligem Standardfehler (SEM).

Gene	scrambled siRNA		RUNX2 knock down	
	MW/L7	SEM	MW/L7	SEM
RUNX2 kontrolle	100	11,87	10	3,00
OSX kontrolle	100	39,23	131	62,53
OC kontrolle	100	6,29	78	8,50
AP kontrolle	100	30,21	77	11,60
PPAR γ 2 kontrolle	100	18,73	132	20,02
LPL kontrolle	100	35,53	145	31,97
aP2 kontrolle	100	5,77	99	5,75

Tab. 57: Versuchsdaten der Genexpression in pHOB von RUNX2, OC, AP, PPAR γ 2, LPL und aP2 nach 96 h angeführt als Mittelwerte/L7 in % mit jeweiligem Standardfehler (SEM).

Gene	scrambled siRNA		RUNX2 knock down	
	MW/L7	SEM	MW/L7	SEM
RUNX2 kontrolle	100	21,04	11	1,80
RUNX2 stimuliert	100	32,42	4	1,10
OSX kontrolle	100	22,51	34	2,10
OSX stimuliert	100	28,95	150	5,97
OC kontrolle	100	14,30	35	3,81
OC stimuliert	100	17,70	34	4,55
AP kontrolle	100	15,80	30	11,23
AP stimuliert	100	10,69	34	2,19
PPAR γ 2 kontrolle	100	25,60	352	38,20
PPAR γ 2 stimuliert	100	14,22	160	19,21
LPL kontrolle	100	48,74	150	39,59
LPL stimuliert	100	20,45	232	98,83
aP2 kontrolle	100	11,83	233	19,15
aP2 stimuliert	100	14,06	449	115,39

Tab. 58: Versuchsdaten der Genexpression in pHOB von RUNX2, OC, AP, PPAR γ 2, LPL und aP2 nach 192 h angeführt als Mittelwerte/L7 in % mit jeweiligem Standardfehler (SEM).

Gene	scrambled siRNA		RUNX2 knock down	
	MW/L7	SEM	MW/L7	SEM
RUNX2 kontrolle	100	15,97	18	4,40
RUNX2 stimuliert	100	12,88	14	3,83
OSX kontrolle	100	10,76	6	0,00
OSX stimuliert	100	0,00	207	31,07
OC kontrolle	100	13,82	13	1,52
OC stimuliert	100	5,16	65	6,04
AP kontrolle	100	18,29	62	14,77
AP stimuliert	100	15,83	105	17,05
PPAR γ 2 kontrolle	100	7,11	177	5,76
PPAR γ 2 stimuliert	100	18,17	235	9,79
LPL kontrolle	100	48,96	402	83,53
LPL stimuliert	100	18,10	206	50,01
aP2 kontrolle	100	20,19	548	62,23
aP2 stimuliert	100	26,88	697	138,59

Alle folgenden in % angegebenen Genexpressionsveränderungen beziehen sich auf die Genexpressionswerte der "scrambled" siRNA. In diesem Zusammenhang sind im nachstehenden Abschnitt mit den Bezeichnungen 'Kontrolle', 'Kontrollexpression' und 'Kontrollwert' die Genexpressionen der "scrambled" siRNA gemeint.

Die Genexpression von RUNX2 unter basalen Bedingungen sank auf 10% 24 h nach Transfektion, auf 11% 96 h nach Transfektion und auf 18% 192 h nach Transfektion in Relation zur Kontrollexpression ab. Als Folge davon reduzierte sich die Genexpression von OC um 22%, 65% und 87% entsprechend. Unter osteogenen Bedingungen fiel die Genexpression von OC während der Suppression von RUNX2 nach 96 h um 66% und nach 192 h um 35% im Vergleich zur Kontrollexpression ab. Unter basalen Bedingungen sank die Genexpression der AP 24 h, 96 h und 192 h nach Transfektion entsprechend auf 77%, 30% und 62% bezüglich der Kontrollexpression ab. Osteogene Bedingungen ließ die Genexpression von AP nach 96 h um 66% sinken, wobei die Genexpression nach 192 h nahezu unverändert blieb. Der RUNX2-knock-down führte zu einem Anstieg der Genexpression der adipogenen Marker PPAR γ 2, LPL und aP2. 24 h, 96 h und 192 h nach Lipofektion stieg die Genexpression von PPAR γ 2 unter basalen Konditionen entsprechend um 32%, 252% und um 77% an. Unter osteogener Stimulation stieg die Genexpression von PPAR γ 2 um 60% 96 h nach Transfektion und um 135% 192 h nach Transfektion. 24 h, 96 h und 192 h nach Transfektion stieg die Genexpression der LPL unter basaler Kultivierung um 45%, 50% und um 302%. Unter osteogenen Bedingungen erhöhte sich die Genexpression der LPL um 132% 96 h nach Transfektion und um 106% 192 h nach Transfektion. 96 h und 192 h nach Transfektion stieg die Genexpression von aP2 entsprechend um 133% und 448% unter basalen Bedingungen an. Unter osteogener Stimulation erhöhte sich die Genexpression von aP2 um 349% 96 h nach Transfektion und um 597% 192 h nach Transfektion (s. Abb. 38 – 40 und Tab. 56 - 58). Die Genexpression von L7 war konstant nachweisbar (s. Abb. 40).

Die Genexpression von OSX stieg unter basalen Bedingungen 24 h nach Transfektion um 31% an, während 96 h nach Transfektion die Expression von OSX um 66% sank und 192 h nach Transfektion nicht mehr nachweisbar war. Unter osteogenen Bedingungen erhöhte sich die Genexpression von OSX um 50% 96 h nach Transfektion und um 107% 192 h nach Transfektion.

Die Effekte der osteogenen Stimulation führten im Gegensatz zur basalen Kultivierung in den jeweils mit der “scrambled“ siRNA transfizierten Zellen zu einer etwa 50-fachen Induktion der Genexpression von OC, etwa 10-fachen Induktion der Genexpression der AP, etwa doppelter Induktion der Genexpression von PPAR γ 2, etwa 10-fachen Induktion der Genexpression der LPL und etwa dreifacher Induktion der Genexpression von aP2 (nicht gezeigt).

Abschließend bleibt festzuhalten, dass die Genexpression von OC während der Suppression von RUNX2 unter basalen Bedingungen mit zunehmender Kulturdauer stärker supprimiert wurde, wohingegen sich die Genexpression von OC unter stimulierten Bedingungen im Kulturverlauf der Kontrollexpression wieder näherte. Die Genexpression der AP blieb während der Suppression von RUNX2 unter basalen Bedingungen unterhalb der Kontrollexpression, wobei sich die Genexpression der AP mit zunehmender Kulturdauer wieder dem Kontrollwert näherte. Unter osteogener Stimulation kam es nach einem Abfall der Genexpression der AP nach 96 h nach Transfektion zu einem Anstieg der Genexpression nach 192 h nach Transfektion in etwa auf das Niveau des Kontrollwertes.

Erwähnenswert ist die Tatsache, dass OSX in den pHOB dieses Patienten exprimiert wurde. Im identischen Versuch zuvor blieb ein eindeutiger Nachweis der OSX-mRNA aus. Relativierend muss

angemerkt werden, dass sich die mRNA-Level von OSX auch in diesem 2. Transfektionsversuch mit zunehmender Kulturdauer an die Nachweisgrenze näherten und somit teilweise nicht ausgewertet werden konnten. Dennoch waren die den aus der Gelelektrophorese gewonnenen Ergebnisse zugrunde liegenden Banden von OSX eindeutig bestimmbar (s. Abb. 39).

Da die Genexpression von OSX nicht in allen Patientenproben der zuvor durchgeführten Zellversuche nachweisbar war, stellte sich die Frage, ob das Fehlen von OSX eine klinische Bedeutung hat. Deshalb wurde im nächsten Versuch insbesondere die Genexpression von OSX aber auch die von RUNX2 in knochenmetabolisch erkrankten Patienten untersucht.

3.3 Ergebnisse der Expression von OSX und RUNX2 in pHOB gesunder Patienten im Vergleich zu knochenmetabolisch erkrankten Patienten

Nachdem eine Vielzahl von Informationen aus Kultur- und Transfektionsversuchen bezüglich der Genexpression von OSX und RUNX2 gewonnen werden konnte, stellte sich jetzt die Frage, ob möglicherweise ein Zusammenhang von physiologischen zu pathologischen knochenmetabolischen Zuständen hinsichtlich des Genexpressionsverhalten beider Transkriptionsfaktoren besteht. Zur adäquaten Bearbeitung dieser Fragestellung wurde im Rahmen dieser Dissertation Probenmaterial aus einem Modell verwendet, das zum Zeitpunkt der Versuchsdurchführung schon bestand. Ein Teil des Probenmaterials wurde histomorphometrisch untersucht. Der andere Teil des bioptisch gewonnenen Materials wurde als Primärkultur angelegt. Insgesamt wurden mit diesem Modell sämtliche dem Knochenstoffwechsel zugehörige serologische und histomorphometrische Parameter von insgesamt 15 Personen (Siggelkow et al. 2003) untersucht. 9 dieser Personen litten an verschiedenartigen Erkrankungen des Knochenstoffwechsels. Bei den restlichen 6 Personen seien keine dem Knochenstoffwechsel zugehörigen Erkrankungen nachgewiesen (Siggelkow et al. 2003). Die folgenden Abbildungen und Tabellen geben Aufschluss über sämtliche Ergebnisse.

Abb. 41: **Gegenüberstellung der Ergebnisse in pHOB** von Kontrollpatienten (n = 6) und erkrankten Patienten (n = 9) in Bezug auf die Genexpression von OSX (A) und RUNX2 (B) als Mittelwerte/L7. Die Genexpression wurde mittels semiquantitativer PCR bestimmt. Die Sterne markieren die Signifikanzen: ** = $p < 0,01$; *** = $p < 0,001$. Unter C sind die entsprechenden Agarosegele abgebildet. Das Gel des Transkriptionsfaktors RUNX2 wurde bezüglich der Zusammensetzung bearbeitet, da es in anderer Reihenfolge pipettiert wurde.

Tab. 59: Daten der Genexpressionsverhältnisse in pHOB von Kontrollen und Patienten ausgewertet als Mittelwerte/L7 der Gene OSX und RUNX2. SEM zeigt den jeweiligen Standardfehler an.

Proben	OSX		RUNX2	
	MW/L7	SEM	MW/L7	SEM
Kontrollen	0,445	0,155	0,445	0,081
Patienten	2,279	0,397	4,003	0,411

Beide Transkriptionsfaktoren warfen in ihrem Expressionsmuster beim Vergleich von Kontroll- zu Patientenproben hochsignifikante Unterschiede auf. Im Detail stieg die Genexpression von OSX und RUNX2 um den Faktor 5,1 ($p = 0,0028$) bzw. um den Faktor 9 ($p = 0,0004$) (s. Abb. 41 und Tab. 59). Aufgrund dieser hochsignifikanten Ergebnisse kamen weiterführende statistische Auswertungen zur Anwendung, in denen eine Korrelation der beiden Transkriptionsfaktoren zunächst zu histomorphometrischen Parametern durchgeführt wurde.

Tab. 60: Korrelation der Genexpression von OSX und RUNX2 zu histomorphometrischen Parametern. Rot markierte Werte sind signifikant ($p < 0,05$).

Histomorphometrie	Einheit	OSX		RUNX2	
		r-Wert	p-Wert	r-Wert	p-Wert
Anteil vom Spongiosavolumen am Gesamtvolumen	%	-0.48	0.19	0.42	0.26
Anteil vom Osteoid am Spongiosavolumen	%	-0.29	0.45	0.21	0.59
Anteil der Osteoidoberfläche zur Gesamtoberfläche der Spongiosa	%	-0.27	0.49	0.26	0.51
Anteil der mit Osteoblasten besetzten Osteoidoberfläche zur Gesamtoberfläche der Spongiosa	%	-0.27	0.47	-0.57	0.108
Anteil der mineralisierenden Oberfläche zur Gesamtoberfläche der Spongiosa	%	0.01	0.96	-0.16	0.69
Knochenanbaurate	$\mu\text{m}/\text{Tag}$	-0.87	0.01	-0.01	0.97
Anteil der Resorptionsoberfläche zur Gesamtoberfläche der Spongiosa	%	-0.19	0.63	-0.23	0.55
Anteil der mit Osteoklasten besetzten Resorptionsoberfläche zur Gesamtoberfläche der Spongiosa	%	-0.09	0.81	-0.01	0.97

Die Auswertung der Korrelation mittels multipler Regression zeigte einen signifikant negativen Zusammenhang von OSX zur Mineralappositionsrate (s. Tab. 60). Weiterhin korrelierten die mRNA-Level von OSX signifikant zum Serumlevel von Calcitriol ($r = 0,72$; $p = 0,042$; nicht gezeigt) und teilsignifikant zum PTH ($r = 0,6$; $p = 0,086$; nicht abgebildet). Für RUNX2 ergaben sich keine signifikanten Korrelationen, abgesehen von einem Parameter zur Knochenresorption (erosion depth; $r = 0,68$; $p = 0,04$; nicht aufgeführt). Um möglicherweise von OSX oder RUNX2 beeinflusste Parameter zu ermitteln, wurden bekannte, in metabolischen Knochenerkrankungen veränderte Faktoren, wie IL1, IL6, TNF α , OPG und RANKL (Siggelkow et al. 2003), des Knochenstoffwechsels mit der Genexpression von OSX und RUNX2 korreliert.

Abb. 42: Korrelation der Genexpression von OSX zu Interleukin 6 (IL6, $R = 0,75$; $p = 0,02$) und Osteoprotegerin (OPG, $R = 0,74$; $p = 0,02$) in neun Patienten mit knochenmetabolischen Erkrankungen.

Tab. 61: Korrelation der Genexpression von OSX und RUNX2 zu den Knochenstoffwechsel beeinflussenden Genen. Rot gekennzeichnete Werte sind signifikant ($p < 0,05$).

Parameter	OSX		RUNX2	
	r-Wert	p-Wert	r-Wert	p-Wert
IL6/L7	-0,75	0,02	0,51	0,17
OPG/L7	0,74	0,02	-0,08	0,84

Die mRNA-Level von OSX korrelierten negativ mit der Genexpression von IL6 ($r = -0,75$; $p = 0,019$) und positiv mit OPG ($r = 0,74$; $p = 0,023$) (s. Abb. und Tab.). Zusätzlich war die Genexpression von OSX negativ zu IL1 ($r = -0,60$; $p = 0,085$) und zu RUNKL ($r = -0,60$; $p = 0,085$) assoziiert (nicht gezeigt). Die Korrelation von OSX zu $\text{TNF}\alpha$ blieb signifikanzlos. Für RUNX2 ergaben sich keine signifikanten Korrelationen.

Die folgenden Ergebnisse hinsichtlich der Korrelation zur Knochendichte des Femurhalses und der Lendenwirbelsäule runden die durchgeführten statistischen Auswertungen ab.

Abb. 43: **Korrelation der Genexpression von OSX zur Knochendichte** der Lendenwirbelsäule (LWS T-score, $R = 0,95$; $p = 0,013$) und zum Femurhals (Femurhals T-score, $R = 0,92$; $p = 0,07$) in Patienten mit knochenmetabolischen Erkrankungen.

Tab. 62: Korrelation der Genexpression von OSX und RUNX2 zur Knochendichte der Wirbelsäule und des Schenkelhalses. Die farbigen Werte zeigen die Signifikanzen (rot = $p < 0,05$; orange = $p < 0,1$).

Parameter	OSX		RUNX2	
	r-Wert	p-Wert	r-Wert	p-Wert
LWS T-score	0,95	0,01	-0,58	0,29
Femur T-score	0,92	0,08	-0,49	0,51

Der Transkriptionsfaktor OSX korrelierte signifikant zur Knochendichte der Lendenwirbelsäule (LWS) ($r = 0,95$; $p = 0,01$) und tendenziell zur Knochendichte des Femurhalses ($r = 0,92$; $p = 0,08$) (s. Abb. 43 und Tab. 62). Die Korrelationen für RUNX2 blieben ohne Signifikanz.

Schlussfolgernd ist festzustellen, dass die ermittelten Ergebnisse Hinweise für die physiologische Funktion von OSX, einem zur osteoblastären Reifung entscheidenden Transkriptionsfaktor, liefern.

4. Diskussion

OSX und RUNX2 sind osteoblastäre Transkriptionsfaktoren, denen beim Aktivieren entscheidender Gene während des osteoblastären Differenzierungsprozesses essenzielle Bedeutung zugesprochen wird. Der Gen-“knock-out“ von OSX resultiert in einem Fehlen knochenartiger Strukturen durch eine möglicherweise unterbundene osteoblastäre Reifung (Nakashima et al. 2002). Da der Transkriptionsfaktor OSX nur in osteoblastären Zellen nachzuweisen ist, gilt er im Gegensatz zu RUNX2 als spezifischer osteoblastärer Marker. Der Transkriptionsfaktor RUNX2 hat neben seiner entscheidenden Bedeutung eine Differenzierung mesenchymaler Vorläuferzellen in Osteoblasten zu induzieren auch eine wichtige Funktionen bei der Stimulation von hypertrophen Chondrozyten inne (Nakashima et al. 2002). In RUNX2-“knock-out“-Versuchen war keine Knochenentwicklung und im Gegensatz zum OSX-“knock-out“ keine finale chondrozytäre Differenzierung nachweisbar (Komori et al. 1997). Detaillierte Differenzierungsvorgänge im humanen System bezüglich der Expression dieser beiden Transkriptionsfaktoren sind bisher nicht beschrieben.

Die hier vorliegende Arbeit hatte die Intention, das Genexpressionsverhalten von OSX und RUNX2 an unterschiedlichen humanen Zellpopulationen, den mineralisierenden pHOB und an humanen Stammzellen, zu charakterisieren. Insgesamt lässt sich diese Dissertation in drei Teile gliedern. Im ersten Teil wird die Genexpression von OSX, RUNX2 und anderen osteoblastären Markern im Zellkulturmodell mit Stammzellen und pHOB unter basalen und stimulierten Bedingungen analysiert. Der zweite Teil befasst sich mit der Interpretation der Effekte einer durch die siRNA-Methodik induzierten Suppression von RUNX2 auf osteoblastäre und adipozytäre Gene. Im letzten Teil dieser Arbeit wird eine mögliche klinische Relevanz von OSX und RUNX2 diskutiert. Zur Diskussion der Expressionsverhältnisse im Zellkulturmodell mit Stammzellen und pHOB wird das durch Siggelkow et al. (2004) modifizierte Differenzierungsmodell von Owen TA et al. (1990) als Interpretationsvorlage dienen (s. Abb. 44).

In dem von Owen TA et al. (1990) publizierten Differenzierungsmodell mit Rattenosteoblasten durchlaufen die Zellen während ihrer Differenzierung drei verschiedene Phasen, die als Proliferations-, Matrixreifungs- und Mineralisationsphase bezeichnet werden (s. Abb. 44). Jede Phase ist durch ein charakteristisches Genexpressionsmuster identifizierbar (s. 1.6). Es konnte gezeigt werden, dass sich dieses Modell in vergleichbarer Weise im humanen System mit pHOB darstellen lässt (Siggelkow et al. 1999a, Siggelkow et al. 2004) (s. Abb. 44).

Abb. 44: **Differenzierungsmodell im System für Rattenosteoblasten und pHOB** (modifiziert nach Owen TA et al. 1990, S. 422 und Siggelkow et al. 2004, S. 575).

4.1 Funktion von OSX und RUNX2 zu frühen Differenzierungszeitpunkten

Die ersten Schritte dieser Arbeit befassten sich mit Expressionsanalysen zu einem möglichst frühen Differenzierungszeitpunkt, um die Beobachtung im Mausmodell, dass OSX “downstream“ von RUNX2 liegt (Nakashima et al. 2002, Tu et al. 2006) auch im humanen Zellkultursystem zu verifizieren. Hierzu wurden zunächst humane Stammzellen in der Annahme sehr frühe Differenzierungsbedingungen zu schaffen, verwendet, wobei ein Teil der Zellen basal kultiviert und ein anderer Teil osteogen stimuliert wurde. Mit der osteogenen Stimulation sollte der Differenzierungsweg eines Osteoblasten induziert werden. Unter basalen Bedingungen konnte ein Anstieg der Genexpression von RUNX2 bis zum 12. Tag gemessen werden, wohingegen die Expression des Transkriptionsfaktors OSX sowohl unter basaler als auch bei stimulierender Kultivierung nicht nachzuweisen war. Tu et al. haben 2006 ebenfalls gezeigt, dass eine Aktivität von OSX in mesenchymalen Mäusestammzellen unter basaler Kultivierung nicht detektierbar war, während die Genexpression von RUNX2 nachgewiesen werden konnte. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die 2002 von Nakashima et al. erstmals publizierte Beobachtung, dass OSX “downstream“ von RUNX2 positioniert ist (Lian und Stein 2003, de Jong et al. 2003, Tu et al. 2006), auch im humanen System Gültigkeit haben könnte.

Wider Erwarten ließ sich in den Stammzellen unter stimulierenden Kultivierungsverhältnissen ein hemmender Einfluss hinsichtlich der Expressivität von RUNX2 und OC messen, wobei das Stimulationsmedium u.a. Dexamethason enthielt. In pHOB ist bekannt, dass zu frühen Differenzierungszeitpunkten die Genexpression von RUNX2 und im gesamten Kulturverlauf die mRNA-Level von OC durch Dexamethason supprimiert werden (Viereck et al. 2002). Auch Li et al. (2005) beobachteten in der multipotenten Knochenmarkszelllinie D1 einen hemmenden Effekt von Dexamethason bezüglich der Genexpression von RUNX2, so dass wahrscheinlich dieses Steroidhormon für den hemmenden Einfluss auf RUNX2 in den humanen mesenchymalen Stammzellen hauptverantwortlich ist. In dem im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Stammzellversuch ließ sich die

Expression von PPAR γ 2 und aP2 durch die osteogene Stimulation induzieren. Diese Ergebnisse werden durch die Publikation von Li et al. (2005) und Yin et al. (2006) unterstützt, wobei erneut Dexamethason der entscheidende Faktor zu sein scheint. Die Induktion von aP2 ist zusätzlich durch die erhöhte Genexpression von PPAR γ 2 begründbar, da Bindungsstellen im aP2-Gen für PPAR γ 2 bekannt sind (Frohnert et al. 1999, Chunlei et al. 2006). Obgleich im LPL-Gen ebenfalls Bindungsstellen für PPAR γ 2 bekannt sind (Schoonjans et al. 1996, Chunlei et al. 2006), stieg die Genexpression von LPL trotz der erhöhten PPAR γ 2 Expression unter osteogenen Bedingungen nicht an. Möglicherweise ist das Genexpressionsmuster in Stammzellen verschiedenartig als in Fettzellen, so dass weitere Signaltransduktionswege in Erwägung zu ziehen sind. Zusätzlich wurden die Stammzellen nicht adipogen stimuliert, so dass auch hier die mögliche Ursache des fehlenden LPL-anstiegs zu suchen ist. Dennoch bleibt dieses Ergebnis nicht vollends erklärbar.

Der signifikante Anstieg der mRNA-Level der AP durch die Stimulation ist als Zeichen voranschreitender osteoblastärer Differenzierung zu werten, wobei die Genexpression der AP nicht notwendigerweise mit einer ansteigenden Expression von RUNX2 einhergehen muss, da kollaterale Signaltransduktionswege die Aktivität der AP beeinflussen können. In diesem Zusammenhang konnte die Genexpression der AP in RUNX2-“knock-out“-Mäusen durch eine alleinige osteogene Stimulation induziert werden (Komori et al. 1997, Ryoo et al. 2006). Des Weiteren könnte die verstärkte Expression der AP durch Dexamethason hervorgerufen worden sein, da Dexamethason als potenter Induktor der AP zählt (Beloti und Rosa 2005). Die gleichzeitige Induktion der AP, PPAR γ 2 und aP2, also osteoblastärer wie adipozytärer Marker, deuten auf einen parallelen Verlauf des adipogenen und osteoblastären Differenzierungsweges hin. Auch unter basalen Bedingungen konnten adipozytäre (PPAR γ 2, LPL und aP2) und osteoblastäre Marker (RUNX2, OC und AP) gleichzeitig nachgewiesen werden. Die Theorie der parallelen Differenzierungswege findet durch einige Publikationen Unterstützung (Ahdjoudj et al. 2001, Ahdjoudj et al. 2004, Klüver 2005, Ponce et al. 2005). Fraglich bleibt die Tatsache der nicht messbaren Genexpression von OSX sowohl unter basalen als auch unter stimulierenden Bedingungen. Möglicherweise war die Stimulation zu diesem frühen Differenzierungszeitpunkt nicht suffizient genug, um OSX zu aktivieren. In der Literatur wird OSX als ein Faktor beschrieben, der eine Differenzierung von Präosteoblasten zu voll funktionsfähigen Osteoblasten fördert (Nakashima et al. 2002, Tu et al. 2006). Da im Stammzellmodell keine Aktivität von OSX nachzuweisen war, muss davon ausgegangen werden, dass sowohl unter basalen als auch unter stimulierten Bedingungen eine Differenzierung über den Präosteoblasten hinaus nicht erreicht wurde. Eine weitere mögliche Ursache für die fehlende Aktivität von OSX in diesen Stammzellen könnte ein stark patientenabhängiges Genexpressionsmuster sein. Insgesamt ist die in der Literatur beschriebene Charakterisierung von OSX im humanen Zellkultursystem nicht ausreichend, um die ausgebliebene OSX-Genexpression erklären zu können.

Bei der Untersuchung der Genexpression osteoblastärer Marker in Primärkulturen, dass heißt in Osteoblasten, die aus spongiösem Knochenmaterial auswuchsen, konnte davon ausgegangen werden, dass es sich um ein späteres Differenzierungsmodell als bei den Stammzellen handelt, wobei Sakaguchi et al.

(2004) nachwiesen, dass mesenchymale Vorläuferzellen und osteoblastäre Zellen, die mit Kollagenasen vorbehandelt wurden, nahezu identische proliferative und Differenzierungscharakteristika besitzen. Auch Nöth et al. (2002) beobachteten in mit Kollagenasen vorbehandelten Osteoblasten ein zu Knochenmarksstammzellen vergleichbares Differenzierungspotenzial. Zusätzlich ist bekannt, dass kaum Unterschiede zwischen Osteoblasten, die mit Kollagenasen vorbehandelt wurden und unbehandelten Osteoblasten, existieren (Jonsson et al. 1999), so dass Primärkulturmodelle und andere osteoblastäre Kulturmodelle wahrscheinlich nicht erhebliche Unterschiede im Differenzierungsverhalten als Zellkulturen mit Stammzellen aufweisen. Trotz dieser Beobachtungen zeigten die Ergebnisse, die in dieser Arbeit präsentiert wurden, ein verändertes Genexpressionsmuster beim Vergleich der Stammzellen mit Osteoblasten.

Im Primärkulturmodell stieg der Transkriptionsfaktor RUNX2 in seiner Genexpression stetig an, während sich die mRNA-Level von OSX später als bei RUNX2 erhöhten. Die Erkenntnis aus dem Stammzellversuch, dass OSX “downstream“ von RUNX2 gelegen ist, konnte im Primärkulturmodell erneut beobachtet werden, da OSX später als RUNX2 in seiner Genexpression ansteigt. Auch bei weiteren Untersuchungen in pHOB zeigte sich eine spätere erhöhte Aktivität von OSX im Vergleich zu RUNX2, so dass die These der “downstream“ gelegenen Position von OSX (Nakashima et al. 2002, Tu et al. 2006) auch in humanen Zellmodellen bewiesen wurde. Eine weitere zentrale Fragestellung hinsichtlich der gegenseitigen Abhängigkeit dieser beiden Transkriptionsfaktoren OSX und RUNX2 kann nach den bisherigen Ergebnissen nicht eruiert werden. Diese Thematik wird zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgegriffen.

Interessant war die Beobachtung einer konfluenzgradabhängigen Dedifferenzierung im Primärkulturversuch vom 10-prozentigen Konfluenzgrad zum 30-prozentigen Konfluenzstadium mit nachfolgender Redifferenzierung. Diese Ergebnisse wurden anhand des Genexpressionmusters von OC, einem späten osteoblastären Marker (Siggelkow et al. 2004), bewertet. Sie sprechen für eine starke Proliferation und Dedifferenzierung nachdem die ersten reiferen Osteoblasten aus dem Probenmaterial ausgewachsen sind, da der späte Osteoblastenmarker OC vermindert exprimiert wurde (Owen TA et al. 1990, Siggelkow et al. 2004). Die Beobachtung der Dedifferenzierung mit nachfolgender Redifferenzierung zeigte sich ebenfalls in passagierten Osteoblasten (Siggelkow et al. 1999a).

4.1.1 Unterschiede im Genexpressionsverhalten von Osteoblasten in Primärkultur und Kulturen in der 2. Passage jeweils unter basalen Bedingungen

Aus Untersuchungen von Siggelkow et al. (1998c) und Kassem et al. (1996) ist bekannt, dass sich Osteoblasten mit zunehmender Passagierung dedifferenzieren. Diese Beobachtungen können mit den Ergebnissen dieser Arbeit bestätigt werden, da der prägnanteste osteoblastäre Differenzierungsparameter OC in den Osteoblasten der 2. Passage zu jedem Kulturzeitpunkt unterhalb des Absolutwertes der Genexpression in den Primärkulturen lag. Zugleich konnte für die Genexpression von OC in den Osteoblasten der 2. Passage kein Anstieg beobachtet werden, wohingegen sich die mRNA-Level von OC in den Primärkulturen deutlich erhöhten (s. Abb. 45 C). Diese Gegebenheiten weisen auf ein vermindertes Differenzierungsverhalten bzw. auf einen dedifferenzierteren Ausgangspunkt in Kultur der passagierten

Osteoblasten hin. Das Genexpressionsverhalten der AP bekräftigt die Ergebnisse in puncto Differenzierung zwischen den Primärkulturen und den Osteoblasten der 2. Passage, da die Absolutwerte der mRNA-Level der AP in den Osteoblasten der 2. Passage zu allen Kulturzeitpunkten niedriger gemessen wurden als in den Primärkulturen und ein Anstieg der Genexpression der AP in den Osteoblasten der 2. Passage im Gegensatz zur Genexpression der AP in den Primärkulturen ebenfalls ausblieb (s. Abb. 45 D). Auch die absolute Genexpression des Transkriptionsfaktors OSX in den passagierten Osteoblasten lag zu allen Messpunkten unterhalb des Niveaus der Genexpression in den Primärkulturen (s. Abb. 45 B). Interessant waren die Ergebnisse der Untersuchung der Genexpression des Transkriptionsfaktors RUNX2, da die Ausgangsexpression in den passagierten Osteoblasten etwas oberhalb des Wertes des Ergebnisses in den Primärkulturen lag, aber insgesamt wies die Genexpression von RUNX2 in beiden Zellkulturmodellen sehr ähnliche Absolutwerte auf (s. Abb. 45 A). Diese Gegebenheit ist mit dem Wissen, dass RUNX2 ein sehr früher osteoblastärer Marker ist nicht verwunderlich, so dass in beiden Zellpopulationen ein vergleichbar starkes Genexpressionsmuster von RUNX2 zu erwarten war. Mit dieser Erkenntnis kann die in dieser Arbeit mehrmals gestellte Fragestellung bezüglich der Expressionscharakteristika der beiden Transkriptionsfaktoren OSX und RUNX2 hierbei so bewertet werden, dass RUNX2 unter basalen Bedingungen ein insgesamt konstanteres Expressionsmuster aufweist.

Abb. 45: Darstellung der Unterschiede der absoluten Genexpressionswerte von RUNX2, OSX, OC und der AP zwischen osteoblastären Primärkulturen (durchgängige Linie) und Osteoblasten der 2. Passage (unterbrochene Linie) unter basalen Bedingungen. Der Differenzierungsverlauf der Primärkulturen wurde über den Konfluenzgrad (KG) bestimmt. Die passagierten Osteoblasten wurden über 28 Tage kultiviert, wobei die Konfluenz der passagierten Zellen an Tag 28 dem 100-prozentigen Konfluenzgrad der Primärkulturen entsprachen.

4.2 Untersuchung der Genexpression von RUNX2 und OSX unter Stimulationsbedingungen in pHOB

An dieser Stelle sollen die Auswirkungen der Stimulation mit osteogenen Faktoren auf die Expression von OSX und RUNX2 diskutiert werden. Dabei werden zunächst die Effekte einer kurzzeitigen Stimulation mit einzelnen Faktoren und anschließend der Einfluss einer kontinuierlichen Stimulation mit mehreren Substanzen erläutert.

4.2.1 Kurzzeitstimulation mit Einzelfaktoren

Um die Einflüsse der Einzelfaktoren TGF- β 1, Vitamin C, Dexamethason und BMP2 auf die Genexpression von OSX und RUNX2 zu unterschiedlichen Differenzierungszeitpunkten der pHOB zu untersuchen, wurde die Kurzzeitstimulation über 24 Stunden nach 4 und 28 Tagen in Kultur analysiert.

Die Genexpression von RUNX2 zeigte unter der Stimulation mit TGF- β 1 an Tag 4 einen hemmenden und nach 28 Kulturtagen einen stimulierenden Einfluss. Die beobachteten Ergebnisse wurden von Viereck et al. (2002) ebenfalls publiziert. Auch Alliston et al. (2001) wiesen einen hemmenden Effekt von TGF- β 1 auf die Genexpression von RUNX2 zu frühen Kulturbedingungen nach. Diese zu frühen Kulturbedingungen in pHOB beobachteten Ergebnisse sind erstaunlich, da in pluripotenten mesenchymalen Vorläuferzellen und somit zu noch früheren Differenzierungszeitpunkten die Genexpression von RUNX2 durch TGF- β 1 stimulierbar war (Lee KS et al. 2000). Eine mögliche Erklärung für diese unterschiedlichen Beobachtungen liegt zum einen in der Stimulationsdauer und zum anderen am gewählten Zelltypus (Schröder et al. 2005). Der Einfluss von TGF- β 1 auf OSX war zu beiden Differenzierungszeitpunkten nicht erheblich, wobei interessanterweise an Tag 4 im Gegensatz zu RUNX2 eine stimulierende Tendenz nachgewiesen werden konnte.

Vitamin C förderte die mRNA-Level von RUNX2 zum späten Versuchszeitpunkt, während an Tag 4 kein Einfluss festzustellen war. Für OSX zeigte sich ein zur Stimulation mit TGF- β 1 vergleichbares Expressionsmuster. Der unterstützende Effekt von Vitamin C konnte zum frühen Zeitpunkt detektiert werden, während sich nach 28 Tagen lediglich eine geringfügige Stimulation nachweisen ließ.

Den stärksten stimulierenden Einfluss auf die Genexpression von OSX und RUNX2 zeigte sich bei der Stimulation mit BMP2, wobei sich dieser Effekt bei RUNX2 wiederum nur zum späten Zeitpunkt manifestierte. OSX hingegen wurde in seiner Aktivität zu beiden Differenzierungszeitpunkten gefördert. Die erheblichen stimulierenden Effekt von BMP2 auf die Expression dieser beiden zentralen Transkriptionsfaktoren der osteoblastären Differenzierung wird in zahlreichen Publikationen beschrieben (Viereck et al. 2002, Nöth et al. 2003, Lee MH et al. 2003, Celil et al. 2005, Ryoo et al. 2006).

Bei der Stimulation mit Dexamethason konnte für die Genexpression von OSX zu keinem der beiden Zeitpunkte ein Effekt beobachtet werden. Für RUNX2 ließ sich erneut nur zum späten Differenzierungszeitpunkt ein stimulierender Einfluss nachweisen. Die unbeeinflussten mRNA-Level für OSX wurden von Igarashi et al. (2004) ebenfalls beobachtet. Für die Wirkungen von Dexamethason auf die Genexpression von RUNX2 finden sich Hinweise, dass zu frühen Differenzierungszeitpunkten ein

hemmender Einfluss und zu späten Zeitpunkten ein stimulierender Effekt besteht (Viereck et al. 2002, Li et al. 2005). Die Bedeutung von Dexamethason auf die Genexpression von RUNX2 und OSX ist noch nicht abschließend geklärt. So gibt es viele Beobachtungen, die nahelegen, dass Dexamethason auf die osteoblastäre Reifung inhibierende Einflüsse besitzt (Canalis und Delany 2002, O'Brien et al. 2004, Li et al. 2005). Andererseits konnte gezeigt werden, dass Dexamethason ein potenter Differenzierungsfaktor der Osteoblasten darstellt (Shalhoub et al. 1992, Cheng et al. 1994, Viereck et al. 2002, Igarashi et al. 2004).

Insgesamt wurde der Transkriptionsfaktor RUNX2 zum frühen Untersuchungszeitpunkt durch TGF- β 1 und BMP2 tendenziell gehemmt, nach 28 Tagen in Kultur aber von allen osteogenen Faktoren positiv beeinflusst. Die Genexpression von OSX konnte zum frühen und zum späten Differenzierungszeitpunkt durch Vitamin C und BMP2 stimuliert werden, während die anderen beiden Stimulanzen keine Effekte auf die mRNA-Level von OSX besaßen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass OSX zu verschiedenen osteoblastären Reifestadien ähnlichen regulatorischen Einflüssen unterliegt, während die Aktivität von RUNX2 in Abhängigkeit zum Reifegrad der Osteoblasten verschiedenartig gesteuert wird.

4.2.2 Kontinuierliche Stimulation mit mehreren Faktoren

Nach den Erkenntnissen der Kurzzeitstimulation mit Einzelfaktoren sollte das Expressionsmuster von OSX und RUNX2 in einem von Siggelkow et al. (2004) etablierten Differenzierungsmodell durchgeführt werden, um weitere Erkenntnisse über deren Funktion zu verschiedenen Differenzierungsstadien zu gewinnen. Dieses Kulturmodell entstand in Anlehnung an das Versuchssystem mit Rattenosteoblasten von Owen TA et al. (1990), in dem der Nachweis der drei osteoblastären Differenzierungsstadien durch die Stimulation mit Vitamin-C-Phosphat, β -GP und Dexamethason erbracht wurde (s. Abb. 46).

Der Transkriptionsfaktor OSX erreichte an Tag 4 seine maximale Genexpression, um mit fortschreitender Kultivierung kontinuierlich im Expressionsniveau abzufallen. Die mRNA-Level von RUNX2 hingegen blieben im gesamten Kulturverlauf auf gleichem Niveau (s. Abb. 46). Für OSX konnte eine Abnahme der Genexpression nachgewiesen werden sobald die Genexpression von OC anstieg (Igarashi et al. 2004). Diese Ergebnisse geben Anlass zu der Annahme, dass OSX insbesondere bei frühen Differenzierungsvorgängen eine entscheidende Rolle spielt, während RUNX2 im gesamten Differenzierungsweg eines Osteoblasten benötigt wird (s. 4.1.1: Unterschiede im Expressionsverhalten von Osteoblasten in Primärkultur und Kulturen in der 2. Passage). Erstaunlich ist die Tatsache, dass die Überexpression von RUNX2 in Mäusen zu einem osteopenischen Phänotyp führte (Liu W et al. 2001, Geoffroy et al. 2002). Dennoch wird angenommen, dass gewisse RUNX2-Expressionslevel erforderlich sind, um einen osteoblastären Phänotyp beizubehalten, da im RUNX2-“knock-out“-Versuch mit Rattenkalvarienzellen eine spontane adipozytäre Differenzierung beobachtet wurde (Kobayashi et al. 2000, Komori 2005, Komori 2006, s. 4.3). Auch der essenzielle Zusammenhang zwischen RUNX2, der Genexpression spezifischer osteoblastärer Marker und einer mineralisierenden Wirkung gilt als gesichert (Ducy et al. 1997, Byers et al. 2002, Salinger et al. 2006).

Abb. 46: **Eingliederung der Transkriptionsfaktoren Osterix und RUNX2** in das osteoblastäre Differenzierungsmodell (modifiziert nach Owen TA et al. 1990, S. 422 und Siggelkow et al. 2004, S. 575).

4.2.3 Zusammenfassung der Genexpressionsverläufe von den mesenchymalen Stammzellen bis zum reifen Osteoblasten

Hierbei stellte sich zunächst die Frage, ob eine derartige Interpretation der Genexpressionsmuster zulässig sei, da die Bewertungsgrundlage den Vergleich von völlig inhomogenen Zellkulturmodellen, dem Stammzellmodell, dem Primärkulturmodell, dem Modell mit passagierten Osteoblasten und dem osteoblastären Zellkulturmodell unter osteogener Vollstimulation, beinhalten würde. Trotz dieser Bedenken wird im folgenden Abschnitt versucht, einen zusammenhängenden Verlauf aller untersuchten osteoblastärer Marker in sämtlichen Zellkulturmodellen wiederzugeben (s. Abb. 47). Dazu wurden die Absolutwerte der einzelnen Genexpressionsverläufe in den unterschiedlichen Zellkulturmodellen miteinander verglichen. Erstaunlicherweise ließen sich die Verläufe teilweise nahtlos aneinanderreihen. Die Genexpressionsverläufe an der ersten Nahtstelle zwischen den Stammzellen und den Osteoblasten der 2. Passage fügten sich gut an, wobei alle Genexpressionen in den passagierten Osteoblasten im Sinne einer voranschreitenden Differenzierung ein wenig oberhalb der Expressionslevel der Gene in den Stammzellen lagen. Zum Ende des Kulturverlaufs in den Osteoblasten der 2. Passage wird wahrscheinlich das Differenzierungsstadium des Präosteoblasten erreicht, da es zu einem merklichen Anstieg der Genexpression von OSX kommt. In der Literatur finden sich Hinweise, dass OSX die Differenzierung von Präosteoblasten zu voll funktionsfähigen Osteoblasten fördert und somit erst in dieser Phase verstärkt exprimiert wird (Nakashima et al. 2002, Tu et al. 2006). Der Übergang von den passagierten Osteoblasten zu den Genexpressionswerten der Primärkulturen zeigt für die Gene OSX und AP einen gleichmäßig ansteigenden Verlauf. Lediglich das Genexpressionsniveau von OC ist in den Primärkulturen deutlich höher angesiedelt, wobei diese erhöhte Genexpression als Zeichen zunehmender Differenzierung

anzusehen ist. Die RUNX2-Genexpression lag an der Nahtstelle in den Primärkulturen unterhalb der Werte, die in den Osteoblasten der 2. Passage gemessen wurden. Mit dem Wissen, dass RUNX2 den frühesten osteoblastären Marker darstellt, ist es nicht undenkbar, dass der Transkriptionsfaktor RUNX2 zu früheren Differenzierungszeitpunkten ein stärkeres Genexpressionsniveau aufzeigt als zu späteren Differenzierungsstadien. Der weitere Kulturverlauf im Primärkulturmodell wies zunächst eine sich dedifferenzierende Komponente auf, um anschließend erneut stetig zu reifen. Anderweitig ist der Genexpressionsverlauf des Gens OC's kaum zu werten (s. Abb. 47). Äußerst interessant gestaltete sich die Interpretation der letzten Nahtstelle im zusammenfassenden Kulturverlauf aller Zellkulturmodelle zwischen dem Primärkulturmodell und dem Differenzierungsmodell unter osteogener Vollstimulation. Zunächst fiel eine völlige Dissoziation zwischen den Genexpressionsverläufen aller Gene an diesem Übergang auf, da die Genexpressionshöhe im osteogenen Differenzierungsmodell nur etwa ein Drittel der Absolutwerte in den Primärkulturen betrug. Werden aber beide Differenzierungsmodelle ca. zur Hälfte ineinander geschoben, so ist eine durchaus problemlose Überbrückung dieser Nahtstelle erkennbar. Dabei entpuppt sich die Genexpressionshöhe der AP als nahezu deckungsgleich. Die Genexpressionslevel von OC sind im überlappenden Bereich auf beiden Seiten ansteigend, wenngleich die Absolutwerte im osteogenen Differenzierungsmodell niedriger sind. Auch die Genexpression des Transkriptionsfaktors RUNX2 zeigt im osteogenen Differenzierungsmodell eine schwächere Aktivität als im Primärkulturmodell. Diese insgesamt schwächere Genexpression unter osteoblastärer Vollstimulation im Vergleich zu den primären Zellen ist am wahrscheinlichsten durch eine passageabhängige Dedifferenzierung zu erklären (Siggelkow et al. 1998c, Kassem et al. 1996). Eine weitere mögliche Ursache für diese Ergebnisse ist in den Eigenschaften des Steroidhormons Dexamethason, das u.a. im osteogenen Differenzierungsmodell als Stimulans eingesetzt wurde, zu suchen. In diesem Zusammenhang beobachteten Viereck et al. (2002) einen hemmenden Effekt von Dexamethason auf die Genexpression von OC (allerdings nach 24 stündiger Stimulation). Li et al. (2005) wiesen eine supprimierende Wirkung von Dexamethason auf den Faktor RUNX2 nach. Der fehlende nahtlose Übergang des Faktors OSX ist aufgrund mangelnder Untersuchungen zu diesem Zeitpunkt schwierig zu interpretieren. Denkbar ist aber ein hemmender Einfluss der osteogenen Stimulanzen. Der Abschluss dieses zusammenfassenden Kulturverlaufs zeigt das für einen Osteoblasten charakteristische Expressionsmuster.

Abb. 47: Darstellung der Genexpressionsverläufe im Stammzellmodell, in den pHOB der 2. Passage, im Primärkulturmodell und im Differenzierungsmodell unter osteogener Vollstimulation. Die ersten drei Zellkulturmodelle wurden zu basalen Bedingungen durchgeführt. Abgebildet sind die Genexpressionen von OSX, RUNX2, OC und der AP. Für diese Abbildung wurden sämtliche Versuche bezüglich der Absolutwerte der jeweiligen Genexpressionswerte verglichen. Der maximale Wert aller Versuche wurde gleich 100% gesetzt.

Abschließend bleibt anzumerken, dass die Inhomogenitäten dieser unterschiedlichsten Zellkulturen mit verschiedensten Kulturbedingungen die Interpretation eines zusammenhängenden Verlaufs zweifelsfrei erschweren. Auch die patientenspezifischen Unterschiede und die Tatsache, dass der Stammzellversuch nur einfach und die Versuche mit pHOB vier- bis sechsfach durchgeführt wurden komplizieren die Interpretation. Dennoch führte die Analyse der unabhängigen Genexpressionsmuster zu einem plausiblen Ergebnis, da der osteoblastäre Differenzierungsweg von der mesenchymalen Stammzelle zum ausgereiften Osteoblasten nachvollziehbar wurde.

4.3 Auswirkung des RUNX2-“knock-down“ in pHOB auf die osteoblastäre Differenzierung

Nachdem die Genexpression der beiden Transkriptionsfaktoren RUNX2 und OSX in frühen und späten Differenzierungsmodellen untersucht wurde, stellte sich die Frage, ob die Suppression von einem der beiden Faktoren Einflüsse auf die osteoblastäre Differenzierung habe. Da RUNX2 der frühere Marker ist und die bisherigen Ergebnisse darauf hindeuten, dass er während der Reifung eines Osteoblasten konstanter exprimiert wird, wurde dieser Transkriptionsfaktor mit Hilfe der siRNA-Methodik in zwei identisch durchgeführten Versuchen in pHOB der ersten Passage unter basalen und stimulierten Bedingungen über 8 Tage supprimiert (s. Abb. 48, 49, 50 und 51). Die osteogene Stimulation erfolgte kontinuierlich nach 24 stündiger Suppression von RUNX2 mit Vitamin D₃, β -GP, Dexamethason, Vitamin-C-Phosphat und BMP2, wobei BMP2 lediglich die letzten vier Tage in Kultur zur Stimulation eingesetzt wurde. Die Ergebnisauswertung der beiden Transfektionsversuche zeigte eindeutige Unterschiede im Genexpressionsverlauf der osteoblastären Marker OSX, OC und AP während der Suppression von RUNX2 im Gegensatz zur Kontrollexpression der “scrambled“ siRNA sowohl unter basalen als auch unter stimulierten Bedingungen (s. Abb. 48, 49 und 50).

1. Transfektionsversuch

Abb. 48: **Graphische Darstellung der Genexpressionsverläufe osteoblastärer Marker in pHOB** aus dem ersten durchgeführten Transfektionsversuch unter basalen Bedingungen (A; C) und osteogener Stimulation (Vitamin-C-Phosphat, Vitamin D3, BMP2, β -GP, Dexamethason) (B; D). Unter A und B sind die Genexpressionsverläufe der “scrambled“ siRNA und unter C und D sind die Genexpressionsverläufe bei RUNX2-“knock-down“ abgebildet. Die maximale Genexpression eines spezifischen Gens wurde im Kontrollversuch (“scrambled“ siRNA) gleich 100% gesetzt. Die Genexpression des jeweiligen Gens nach RUNX2-siRNA-Transfektion (C; D) ist im entsprechenden Verhältnis zur Kontrollexpression (A; B) dargestellt.

2. Transfektionsversuch

Abb. 49: **Graphische Darstellung der Genexpressionsverläufe osteoblastärer Marker in pHOB** aus dem zweiten durchgeführten Transfektionsversuch unter basalen Bedingungen (A; C) und osteogener Stimulation (Vitamin-C-Phosphat, Vitamin D3, BMP2, β -GP, Dexamethason) (B; D). Unter A und B sind die Genexpressionsverläufe der “scrambled“ siRNA und unter C und D sind die Genexpressionsverläufe bei RUNX2-„knock-down“ abgebildet. Die maximale Genexpression eines spezifischen Gens wurde im Kontrollversuch (“scrambled“ siRNA) gleich 100% gesetzt. Die Genexpression des jeweiligen Gens nach RUNX2-siRNA-Transfektion (C; D) ist im entsprechenden Verhältnis zur Kontrolle (A; B) dargestellt.

Die in den Abb. 48 und 49 aufgezeigten Ergebnisse belegen zweifelsfrei den essenziellen Zusammenhang zwischen der Genexpression des Transkriptionsfaktors RUNX2 und der Genexpression der osteoblastären Marker OC, AP und OSX, da sich bei supprimierter Expression von RUNX2 unter basalen Bedingungen das Expressionsniveau aller untersuchten osteoblastärer Marker reduzierte. Hierzu finden sich zahlreiche Publikationen, die diesen essenziellen Zusammenhang untermauern (Ducy et al. 1997, Byers et al. 2002, Salingcarnboriboon et al. 2006, Nishio et al. 2006). Mit Hilfe der folgenden Abbildung (s. Abb. 50) sollen die Genexpressionsunterschiede übersichtlicher dargestellt werden, um sie genauer interpretieren zu können.

1. Transfektionsversuch

2. Transfektionsversuch

Abb. 50: **Graphische Darstellung der Genexpression osteoblastärer Marker in pHOB** aus zwei identisch durchgeführten Transfektionsversuchen (1. Versuch: A + B; 2. Versuch: C + D) unter basalen Bedingungen (A + C) und osteogener Stimulation (Vitamin-C-Phosphat, Vitamin D3, BMP2, β -GP, Dexamethason) (B + D). Gezeigt ist die Auswirkung der RUNX2-Suppression auf die osteoblastären Marker. Die eingezeichneten Kurven beziehen sich auf die Kontrollexpression der “scrambled“ siRNA (Kontrolle = 100%).

Während der Gensuppression von RUNX2 um mindestens 33% durch die siRNA-Methodik, zeigten sich veränderte Expressionsverhalten der charakteristischen osteoblastären Marker. Die mRNA-Level von OC lagen während der RUNX2-Suppression unter basalen Bedingungen signifikant niedriger im Vergleich zur Kontrollexpression (“scrambled“ siRNA) (s. Abb. 50 A und C). Bei gleichzeitiger osteogener Stimulation wird der supprimierende Effekt, bei 80-prozentigem RUNX2-“knock-down“, auf die Genexpression von OC nicht nur aufgehoben, sondern entpuppt sich sogar hinsichtlich der mRNA-Level von OC als induzierende Komponente (s. Abb. 50 B). Diese Beobachtung deutet darauf hin, dass RUNX2 im Sinne einer regulativen Funktion auch hemmende Einflüsse auf die Genexpression von OC besitzt. Wird aber die Expression von RUNX2 suffizienter auf ca. 90% reduziert, so konnten die mRNA-Level von OC bei basaler und osteogener Kultivierung signifikant gehemmt werden (s. Abb. 50 C und D). Es scheint bezüglich der Genexpression von RUNX2 ein Schwellenwert zu existieren, der erreicht werden muss, um die Genexpression von OC zu induzieren. Da RUNX2 in der Promotorregion von OC bindet (Geoffroy et al. 1995, Komori 2005), konnte in “knock-out“-Mäusen (Ducy et al. 1997, Salingcarnboriboon et al. 2006) und mittels Überexpressionsversuche in vitro (Byers et al. 2002, Zheng et

al. 2003) die Abhängigkeit der OC-Genexpression in Bezug auf die Aktivität von RUNX2 nachgewiesen werden.

Die Genexpression der AP wurde durch die Suppression von RUNX2 ebenfalls beeinflusst. Auch hierbei ließen sich Unterschiede bezüglich der Restexpression von RUNX2 und der Auswirkung auf die mRNA-Level der AP feststellen. Wurde die Genexpression von RUNX2 um ca. 90% gehemmt, so konnte eine signifikante Reduktion der Expression der AP unter basaler Kultivierung beobachtet werden. Eine nur 33-prozentige Suppression von RUNX2 genügte hingegen nicht, um die Genexpression der AP bei basalen Bedingungen negativ zu beeinflussen (s. Abb. 50 A und C). Die weniger starken Effekte der RUNX2-Hemmung auf die mRNA-Level der AP im Gegensatz zur Expression von OC wurden von Komori et al. (1997) in “knock-out“-Mäusen und von Harada H et al. (1999) in Überexpressionsversuchen ebenfalls nachgewiesen. Dass ein Zusammenhang zwischen dem Transkriptionsfaktor RUNX2 und der Genexpression der AP besteht, ist aber zweifelsfrei (Ducy et al. 1997, Byers et al. 2002, Salingcarnboriboon et al. 2006). Die weniger essenzielle Relevanz von RUNX2 hinsichtlich der Aktivität der AP wird durch die Ergebnisse unter stimulierenden Bedingungen untermauert, da die AP bei geringerer Suppression von RUNX2 stärker in ihrer Genexpression gehemmt wurde. Diese Gegebenheit ist, in der Annahme, dass die maximale Stimulation im 1. Transfektionsversuch bei geringerer RUNX2-Suppression und verstärkter Genexpression von OC ein spätes osteoblastäres Differenzierungsstadium induziert, nicht verwunderlich. Wird aber die Genexpression von OC und somit ein spätes osteoblastäres Differenzierungsstadium mittels suffizienter RUNX2-Suppression gehemmt, so stieg die Genexpression der AP trotz 90-prozentigem RUNX2-“knock-down“ an (s. Abb. 50 B und D). Siggelkow et al. (2004) beschrieben, dass die Genexpression der AP abfällt, sobald die durch die gesteigerte Genexpression von OC gekennzeichnete Mineralisationsphase einsetzt. Diese Ergebnisse implizieren, dass das Differenzierungsstadium der Osteoblasten im Hinblick auf die Genexpression der AP im Vordergrund zu stehen scheint, wobei dem Transkriptionsfaktor RUNX2 regulierende Bedeutung zukommt. Zusätzlich muss angemerkt werden, dass weitere Transkriptionsfaktoren bekannt sind, die erheblichen Einfluss auf die osteoblastäre Differenzierung besitzen (Komori 2005, Komori 2006).

Eine der Intentionen dieses Versuches war es, Erkenntnisse über ein mögliches Zusammenspiel der beiden Transkriptionsfaktoren RUNX2 und OSX zu erhalten. Die aktuelle Datenlage in der Literatur ist nicht ausreichend, um diese Fragestellung sicher zu erklären. In einigen Publikationen finden sich Hinweise, dass RUNX2 die Aktivität von OSX beeinflusst, da RUNX2 in einem DNA Element des OSX-Promotors bindet (Nishio et al. 2006). Auch die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten RUNX2-“knock-down“-Experimente legen einen Zusammenhang zwischen RUNX2 und OSX nahe, da unter basalen Bedingungen die Genexpression von OSX im Zuge der RUNX2-Suppression abfiel. Bei osteogener Stimulation hingegen stieg die Expression von OSX sogar über die Kontrollexpression hinaus an (s. Abb. 50 C und D). Lee MH et al. (2003) beobachteten, dass die Expression von OSX durch BMP2 und unabhängig von RUNX2 induziert werden konnte, so dass unter anderem dieser BMP2 abhängige Signaltransduktionsweg für die hier präsentierten Ergebnisse bezüglich der Genexpression von OSX unter stimulierenden Bedingungen eine mögliche Erklärung bietet, wobei die Stimulation mit BMP2 nur ab Tag

5 in Kultur durchgeführt wurde. Daher müssen weitere noch unbekannte Signaltransduktionswege existieren, die für die Induktion von OSX verantwortlich zu machen sind. Relativierend muss hinzugefügt werden, dass das Expressionsniveau von OSX in den siRNA-Versuchen dicht an der Nachweisgrenze lag und sogar in einem siRNA-Versuch nicht detektiert werden konnte. Da die Genexpression des Transkriptionsfaktors OSX hinsichtlich beeinflussender Faktoren noch unzureichend untersucht ist, bleibt die mögliche Ursache für die schwache Genexpression von OSX unklar.

Eine bemerkenswerte Beobachtung in den RUNX2-“knock-down“-Versuchen war die signifikant verstärkte Expression der adipozytären Marker unter basalen Bedingungen. Auch eine osteogene Stimulation konnte den Anstieg der adipozytären Marker nicht verhindern (s. Abb. 51). Die Faktoren RUNX2 und PPAR γ 2 scheinen sich gegenseitig zu inhibieren (Komori 2005, Enomoto et al. 2004, Jeon et al. 2003), so dass der Expressionsanstieg von PPAR γ 2 während der Suppression von RUNX2 begründbar ist. Die Expression der Gene LPL und aP2 wurden ebenfalls signifikant induziert. Da diese Gene zu den genabwärts liegenden Zielgenen des Transkriptionsfaktors PPAR γ 2 (Gimble et al. 2006) gehören, ist diese Beobachtung nicht verwunderlich, wobei die Induktion der Genexpression von LPL früher einsetzte als bei aP2. Mit zunehmendem Kulturverlauf aber stiegen die mRNA-Level von aP2 im Vergleich zu LPL höher an. Eine weitere mögliche Ursache hinsichtlich der extremen Induktion der adipozytären Marker ist das hohe Alter der Patienten, deren Knochenproben für den siRNA-Versuch verwendet wurden, da die verstärkte Produktion der adipozytären Aktivatoren und osteoblastären Inhibitoren im Alterungsprozess eines Menschen zu veränderten Differenzierungspotenzialen der mesenchymalen Stammzellen führt (Moerman et al. 2004).

Abb. 51: **Graphische Darstellung der Genexpression adipogener Marker in pHOB** aus zwei identisch durchgeführten Transfektionsversuchen (1. Versuch: A + B; 2. Versuch: C + D) unter basalen Bedingungen (A + C) und osteogener Stimulation (Vitamin-C-Phosphat, Vitamin D3, BMP2, β -GP, Dexamethason) (B + D). Gezeigt ist die Induktion der adipogenen Marker während der Suppression von RUNX2. Die eingezeichneten Kurven beziehen sich auf die Kontrollelexpression der “scrambled“ siRNA (Kontrolle = 100%).

4.4 Mögliche Rolle der Transkriptionsfaktoren OSX und RUNX2 in pathophysiologischen Prozessen knochenmetabolischer Erkrankungen

Im letzten Teil der Diskussion wird versucht die Aktivität von OSX und RUNX2 zu physiologischen und pathologischen Knochenstoffwechselsituationen zu analysieren, um ihre dortige Funktion zu interpretieren. Die dazu erforderlichen Versuchsbedingungen sind im Ergebnisteil (3.3) geschildert.

Dass den Transkriptionsfaktoren OSX und RUNX2 im Zusammenhang mit der osteoblastären Reifung essenzielle Bedeutungen zugesprochen werden, ist allgemeiner Konsens. Diese Bedeutsamkeit steht aber bis jetzt noch nicht in Relation zu Erkrankungen des menschlichen Knochenstoffwechsels. Lediglich ein Krankheitsbild, die Dysplasia cleidocranialis (CCD), ist bei fehlerhafter Genexpression von RUNX2 bekannt (Mundlos et al. 1997). Für OSX fehlen in dieser Hinsicht sämtliche Anhaltspunkte. Weiterhin zeigte sich in einigen Patientenmaterialien kein oder nur ein schwacher Nachweis von OSX, so dass sich die Frage stellte ob OSX eventuell eine Bedeutung für Patientenspezifische oder Erkrankungsspezifische Unterschiede hat.

Bei der Ergebnisauswertung fand sich eine signifikant erhöhte Expression von RUNX2 in den Proben der erkrankten Patienten im Vergleich zu den Kontrollpatienten. Aus einem Mausmodell ist bekannt, dass bei einer Überexpression von RUNX2 Osteopenien, die zu multiplen Frakturen führten, hervorgerufen wurden (Liu W et al. 2001). Interessanterweise korrelierte die Genexpression von RUNX2 positiv und signifikant mit einem knochenresorbierenden Parameter ("erosion depth"), so dass möglicherweise die Überexpression von RUNX2 eine Veränderung im Knochenstoffwechsel zu Gunsten der resorptiven Einflüsse hervorruft. In Überexpressionsversuchen von Goeffroy et al. (2002) wurden ebenfalls hohe resorptive Effekte auf den Knochen beobachtet. Andererseits könnte die erhöhte Genexpression von RUNX2 in den Patientenproben Ausdruck vermehrter chondrozytärer Transdifferenzierung oder vermehrter präosteoblastärer Stimulation sein, die mit den überprüften klinischen Parametern nicht bestimmt werden konnte.

Die Ergebnisauswertung der Genexpression von OSX im Vergleich der Patienten- zu den Kontrollproben ergab ein ähnliches signifikantes Expressionsmuster wie bei RUNX2. Die Genexpression in den Patientenproben lag im Mittel um ein Vielfaches höher als in den Kontrollproben. Die OSX-mRNA-Level korrelierten negativ zu knochenresorptiv wirkenden Zytokinen IL6 und IL1. In der Vergangenheit konnte gezeigt werden, dass eine lokal im Knochen veränderte Zytokinproduktion eine sehr zentrale Rolle bezüglich der Pathogenese von unterschiedlichen Formen der Osteoporose, beispielsweise der postmenopausalen Osteoporose (Raisz 1999, Manolagas 2000), besitzt. Auch bei sich im Knochen abspielenden metabolischen Abnormalitäten spielt ein gestörtes Zytokinmuster eine entscheidende Rolle in der Pathogenese von Knochenstoffwechselerkrankungen, wie z.B. der rheumatoiden Arthritis oder dem M. Crohn (Siggelkow et al. 2003, Hyams et al. 1997, Minne et al. 1984). Es wird angenommen, dass die drei entscheidenden Zytokine (IL6, IL1 und TNF α), die allesamt in die pathophysiologischen Vorgänge involviert sind, synergistisch wirken und gegenseitig reguliert werden (Jilka 1998). Die fehlende Korrelation zwischen der Expression von OSX zu TNF α scheint in diesem Zusammenhang nicht stimmig zu sein, da alle drei Zytokine in Abhängigkeit zueinander stehen, OSX aber nur zu zweien, IL6 und IL1,

signifikant korrelierte. Zu dieser Gegebenheit existieren Daten, die ebenfalls keine Abhängigkeit zwischen TNF α und der Genexpression von OSX in humanen Osteosarkomzellen aufwiesen (Nakayama et al. 2004).

Das Zusammenspiel von Knochenaufbau und Knochenresorption wurde durch die Charakterisierung des Glycoproteins OPG, einem löslich sekretierten Rezeptor der TNF superfamily (Simonet et al. 1997) und seinem natürlichen Liganden RANKL, der intramembranär im Osteoblasten verankert ist (Lacey et al. 1998), dargestellt. RANKL scheint die tragendste Bedeutung im Reifungs- und Aktivierungsprozess eines Osteoklasten zu besitzen. Zusätzlich wird RANKL von Faktoren stimuliert, um knochenresorptive Wirkungen anzustoßen (Yasuda et al. 1998). OPG ist befähigt die Wirkungsweisen von RANKL durch eine Bindungsreaktion zu hemmen. Es konnte gezeigt werden, dass Faktoren, die die Knochenresorption fördern, einerseits RANKL stimulieren und/oder OPG inhibieren (Hofbauer et al. 1999, Hofbauer et al. 2000). Es existieren triftige Anhaltspunkte, dass das OPG/RANKL-System ein entscheidendes, aber nicht das einzige System mit Blick auf die Regulation der Zytokine, die Einfluss auf die Knochenresorption nehmen, darstellt (Siggelkow et al. 2003, Spelsberg et al. 1999, Teitelbaum 2000). Die Genexpression von OSX war negativ mit dem RANKL-mRNA-Level in den biotisch gewonnenen Kulturen der Patienten assoziiert. Die erhobenen Ergebnisse weisen darauf hin, dass OSX einen knochenprotektiven Faktor darstellt, da nicht nur die negative Assoziation zu RANKL beobachtet wurde, sondern zusätzlich eine positive Korrelation zu OPG nachgewiesen werden konnte, einem natürlichen Antagonisten von RANKL. Diese Ergebnisse suggerieren einen eng verflochtenen Zusammenhang zwischen der Knochenentwicklung und dem Expressionsniveau von OSX. Zudem scheint OSX den pathologischen Stoffwechselvorgängen, insbesondere dem Ungleichgewicht zwischen Knochenformation und Knochenresorption in den osteoblastären Zellen entgegenzuwirken.

Um die Wertigkeit der in vitro erhaltenen Ergebnisse auch in vivo zu überprüfen, wurden histomorphometrische Parameter der Patienten in Bezug auf mögliche Assoziationen zur Genexpression von OSX und RUNX2 analysiert. Die mRNA-Level von OSX waren umso niedriger, je höher die Knochenanbaurate ("mineral apposition rate") war. Eine Assoziation zu knochenresorptiven Faktoren ließ sich nicht feststellen. Diese Gegebenheiten weisen auf eine mit zunehmender Mineralisierung abnehmende Genexpression von OSX hin. Ein vergleichbares Expressionsmuster ist für die alkalische Phosphatase, die ebenfalls im weit fortgeschrittenen Stadium der osteoblastären Differenzierung im Expressionsniveau abnimmt, in vivo (Bellows et al. 1986) und in vitro (Siggelkow et al. 2004, Owen TA et al. 1990) bekannt. Weiterhin konnte in einem Differenzierungsmodell mit fetalen Zellen der Schädelkalotte von Ratten ein induktiver Effekt von Dexamethason hinsichtlich der Expression von RUNX2 und OSX ermittelt werden, wobei sich eine Abnahme der Genexpression zeigte, als es zur Expression von OC kam (Igarashi et al. 2004). Den stimulierenden Einfluss von Dexamethason auf die Differenzierung der Osteoblasten zeigen Versuche an embryonalen Stammzellen von Ratten, in denen eine Überexpression von OSX zu osteoblastärer Reifung führte, die durch Dexamethason forciert wurde (Tai et al. 2004). Es dürfte darüber Einklang herrschen, dass in den bestehenden Differenzierungsmodellen in vitro die Genexpression von OSX in der finalen Differenzierungsphase

abnimmt. Auch in dem in dieser Arbeit präsentierten Differenzierungsmodell (kontinuierliche Stimulation) an pHOB konnte ein Abfall der OSX-Expression in der Mineralisationsphase gezeigt werden (Giesen et al. 2005).

Bei der Untersuchung von Assoziationen zwischen OSX-mRNA-Level zu knochenstoffwechselrelevanten Serumparametern fiel eine positive Korrelation zum aktiven Vitamin D₃ und ein tendenziell positiver Zusammenhang mit den Serumspiegeln des PTH's auf. Auch Tanaka et al. (2004) beobachteten im Mausmodell eine Kausalität zwischen dem Faktor OSX und dem PTH. Dabei zeigte sich, dass OSX-mRNA-Level nach Behandlung mit PTH in Mäuseosteoblasten anstiegen. Diese Ergebnisse unterstützen die Vorstellung, dass OSX an der physiologischen Regulation des Knochenstoffwechsels und der Kalziumhomöostase beteiligt ist.

Da die Genexpression von OSX positiv signifikant mit dem t-score der LWS und tendenziell signifikant mit dem t-score des Femurs korrelierte, scheint es zwischen der Aktivität von OSX und der Knochendichte ein enges Zusammenspiel zu geben. Die Ergebnisse allerdings zeigten eine erhöhte Genexpression von OSX in den Patientenproben mit knochenmetabolischen Erkrankungen im Vergleich zu den Kontrollproben, so dass scheinbar ein negativer Einfluss von OSX auf die Knochendichte besteht. In Anbetracht der physiologischen Korrelationen zu Serumparametern, histomorphometrischen Parametern, Knochendichtemessungen, knochenresorptiven und knochenprotektiven Faktoren, ist dieser Expressionsanstieg aber eher als versuchte Kompensation der unphysiologischen Prozesse zu werten. Leider fehlen bis zum jetzigen Zeitpunkt Überexpressionsversuche von OSX in Mäusen, die eventuell Aufschluss über den Zusammenhang zwischen Knochendichte und OSX-Genexpression geben könnten. Zu diesem Zeitpunkt sind weiterführende Interpretationsansätze ohne Daten von altersabhängigen und homogenen Patientengruppen kaum zulässig.

Abschließend kann gesagt werden, dass diese Ergebnisse nicht ausreichen, um die komplexen Funktionsweisen von OSX und RUNX2 zu physiologischen und pathologischen Knochenstoffwechsellagen aufdecken können. Dennoch sollten anlässlich dieser Ergebnislage die Genexpressionslevel von OSX als möglicher klinisch relevanter Parameter registriert werden.

5 Zusammenfassung

Der physiologische Knochenstoffwechsel ist in seinen komplexen Differenzierungsprozessen noch ungenügend verstanden. Die vorliegende Dissertation hat zum Ziel, zwei für den Knochenstoffwechsel essenzielle Transkriptionsfaktoren, RUNX2 und OSX, genauer zu charakterisieren, um einen Beitrag zum besseren Verständnis der osteoblastären Differenzierung zu leisten.

Im ersten Teil dieser Arbeit wurden die beiden osteoblastären Transkriptionsfaktoren OSX und RUNX2 in das mit pHOB von Siggelkow et al. (2004) reproduzierte Owen-Modell (Owen TA et al. 1990) integriert. Dabei zeigte sich, dass RUNX2 einen konstanten Genexpressionsverlauf und OSX mit zunehmender osteoblastärer Differenzierung einen abfallenden Genexpressionsverlauf besitzt. Die sich anschließende Fragestellung, welcher der beiden Transkriptionsfaktoren im humanen System frühzeitiger exprimiert wird, konnte im humanen Stammzell- und Primärkulturmodell erörtert werden. Die Ergebnisauswertung hatte zum Resultat, dass RUNX2, wie in der Literatur beschrieben, früher im Differenzierungsweg eines Osteoblasten exprimiert wird.

Im zweiten Abschnitt der vorliegenden Promotionsarbeit stellte sich die Frage, welchen Effekt eine achttägige Suppression einer der beiden Transkriptionsfaktoren, RUNX2 oder OSX, auf die osteoblastäre Reifung hat. In diesem Zusammenhang wurde die Methodik der RNA-Interferenz mit Lipofectamine 2000 im Zellsystem mit HOS 58 und pHOB etabliert. Es wurde der Transkriptionsfaktor RUNX2 supprimiert, da er im Gegensatz zu OSX früher und konstanter exprimiert wird. Unter der Suppression von RUNX2 konnte ein kausaler Zusammenhang zwischen RUNX2 und den osteoblastären und adipozytären Markern AP, OC, OSX, PPAR γ 2, LPL und aP2 beobachtet werden, wobei die Genexpression der osteoblastären Marker signifikant gehemmt und die der adipozytären Marker signifikant induziert wurde. Eine gleichzeitig osteoblastäre Stimulation scheint einige hemmende Effekte der Suppression von RUNX2 insbesondere von OC zu überlagern. Die induktiven Effekte bezüglich der adipogenen Marker blieben durch die osteoblastäre Stimulation eher unberührt.

Da die Genexpression von OSX in einigen Patientenproben nicht nachweisbar war, befasste sich der Abschluss dieser Arbeit mit der Fragestellung bezüglich einer möglicherweise direkten klinischen Relevanz von RUNX2 und insbesondere von OSX, da OSX inkonstanter exprimiert wurde. Dazu wurden sämtliche dem Knochenstoffwechsel zugehörige serologische und histomorphometrische Parameter in Knochenproben von insgesamt 15 Personen (Siggelkow et al. 2003) untersucht, wobei neun Personen an verschiedenartigen Erkrankungen des Knochenstoffwechsels litten. Die restlichen sechs Personen fungierten als gesunde Kontrollpersonen. Beide Transkriptionsfaktoren wurden in den Proben der erkrankten Personen hochsignifikant stärker exprimiert als in den Kontrollproben. Die statistische Auswertung zeigte jedoch nur für den Transkriptionsfaktor OSX signifikante Korrelationen zur Knochendichte, zu histomorphometrischen Parametern und zu Zytokinen, die am Knochenstoffwechsel

beteiligt sind. Die erhobenen Ergebnisse deuten daraufhin, dass OSX einen knochenprotektiven Faktor darstellt und sogar einem Ungleichgewicht zwischen Knochenformation und Knochenresorption durch verschiedene Expressionsmuster entgegensteuert. Insgesamt genügen diese Ergebnisse nicht, um die komplexen Funktionsweisen der Transkriptionsfaktoren OSX und RUNX2 ausnahmslos aufzudecken. Der Transkriptionsfaktor OSX aber darf als möglicher klinisch relevanter Parameter registriert werden.

Literaturverzeichnis

- Aarden EM, Burger EH, Nijweide PJ (1994): Function of osteocytes in bone. *J Cell Biochem* 55: 287-299
- Aguirre JI, Plotkin LI, Stewart SA, Weinstein RS, Parfitt AM, Manolagas SC, Bellido T (2006): Osteocyte apoptosis is induced by weightlessness in mice and precedes osteoclast recruitment and bone loss. *J Bone Miner Res* 21: 605-615
- Ahdjoudj S, Lasmoles F, Oyajobi BO, Lomri A, Delannoy P, Marie PJ (2001): Reciprocal control of osteoblast/chondroblast and osteoblast/adipocyte differentiation of multipotential clonal human marrow stromal F/STRO-1+ cells. *J Cell Biochem* 81: 23-38
- Ahdjoudj S, Fromigue O, Marie PJ (2004): Plasticity and regulation of human bone marrow stromal osteoprogenitor cells: potential implication in the treatment of age-related bone loss. *Histol Histopathol* 19: 151-158
- Akune T, Ohba S, Kamekura S, Yamaguchi M, Chung U, Kubota N, Terauchi Y, Harada Y, Azuma Y, Nakamura K et al. (2004): PPAR γ 2 insufficiency enhances osteogenesis through osteoblast formation from bone marrow progenitors. *J Clin Invest* 113: 846-855
- Alliston T, Choy L, Ducy P, Karsenty G, Derynck R (2001): TGF- β 1 induced repression of CBFA1 by Smad3 decreases cbfa1 and osteocalcin expression and inhibits osteoblast differentiation. *EMBO J* 20: 2254-2272
- Anderson HC (1989): Mechanism of mineral formation in bone. *Lab Invest* 60: 320-330
- Arnold I, Caplan PD (2005): Mesenchymal stem cells: Cell-based reconstructive therapy in orthopedics. *Tissue Eng* 11: 1198-1211
- Auf'm Kolk B, Hauschka PV, Schwartz ER (1985): Characterization of human bone cells in culture. *Calcif Tissue Int* 37: 228-235
- Bellows CG, Aubin JE, Heersche JN, Antosz ME (1986): Mineralized bone nodules formed in vitro from enzymatically released rat calvaria cell populations. *Calcif Tissue Int* 38: 143-154
- Bellows CG, Wang YH, Heersche JN, Aubin JE (1994): 1,25 dihydroxyvitamin D₃ stimulates adipocyte differentiation in cultures of fetal rat calvarial cells: comparison with the effects of dexamethasone. *Endocrinology* 134: 2221-2229
- Beloti MM, Rosa AL (2005): Osteoblast differentiation of human bone marrow cells under continuous and discontinuous treatment with dexamethasone. *Braz Dent J* 16: 156-161
- Bennett JH, Joyner CJ, Triffitt JT, Owen ME (1991): Adipocytic cells cultured from marrow have osteogenic potential. *J Cell Sci* 99: 131-139
- Beresford JN, Gallagher JA, Poser JW, Russel RG (1984): Production of osteocalcin by human bone cells in vitro. Effects of 1,25(OH)₂D₃, 24,25(OH)₂D₃, parathyroid hormone, and glucocorticoids. *Metab Bone Dis Relat Res* 5: 229-234
- Bianco P, Robey GP (2000): Marrow stromal stem cells. *J Clin Invest* 105: 1663-1668

- Boskey AL, Posner AS (1984): Bone structure, composition, and mineralization. *Orthop Clin North Am* 15: 597-612
- Byers BA, Pavlath GK, Murphy TJ, Karsenty G, Garcia AJ (2002): Cell-type-dependent up-regulation of in vitro mineralization after overexpression of the osteoblast-specific transcription factor Runx2/Cbfa1. *J Bone Miner Res* 17: 1931-1944
- Canalis E (2000): Glucocorticoid-induced osteoporosis. *Cur Opin Endocrinol Diabetes* 7: 320-324
- Canalis E, Delany AM (2002): Mechanism of glucocorticoid action in bone. *Ann N Y Acad Sci* 966: 73-81
- Celil AB, Hollinger JO, Campbell PG (2005): OSX transcriptional regulation is mediated by additional pathways to BMP2/Smad signaling. *J Cell Biochem* 95: 518-528
- Chak CW, Lee KM, Leung KS, Fung KP (1995): No change in bone-specific alkaline phosphatase activities in cultured rat osteoblastic cells under L-ascorbate and beta-glycerophosphate-induced mineralization. *Cell Biol Int* 19: 979-985
- Chambers TJ (1985): The pathobiology of the osteoclast. *J Clin Pathol* 38: 241-252
- Chambers TJ, Fuller K (1985): Bone cells predispose bone surfaces to resorption by exposure of mineral to osteoclastic contact. *J Cell Sci* 76: 155-165
- Cheng SL, Yang JW, Rifas L, Zhang SF, Avioli LV (1994): Differentiation of human bone marrow osteogenic stromal cells in vitro: induction of the osteoblasts phenotype by dexamethasone. *Endocrinology* 134: 277-286
- Chow JW, Wilson AJ, Chambers TJ, Fox SW (1998): Mechanical loading stimulates bone formation by reactivation of bone lining cells in 13-week old rats. *J Bone Miner Res* 13: 1760-1767
- Chung CH, Golub EE, Forbes E, Tokuoka T, Shapiro IM (1992): Mechanism of action of β -glycerophosphate on bone cell mineralization. *Calcif Tissue Int* 51: 305-311
- Chunlei F, Jin Y, Ying Q, Xingde W, Liping G (2006): Regulation of lipoprotein lipase expression by effect of hawthorn flavonoids on peroxisome proliferators response element pathway. *J Pharmacol Sci* 100: 51-58
- Dass CR (2004): Lipoplex-mediated delivery of nucleic acids: factors affecting in vivo transfection. *J Mol Med* 82: 579-591
- Dass CR, Burton MA (2003): Modified microplex vector enhances transfection of cells in culture while maintaining tumour-selective gene delivery in vivo. *J Pharm Pharmacol* 55: 19-25
- Date T, Doiguchi Y, Nobuta M, Shindo H (2004): Bone morphogenetic protein-2 induces differentiation of multipotent C3H10T1/2 cells into osteoblasts, chondrocytes, and adipocytes in vivo and in vitro. *J Orthop Sci* 9: 503-508
- de Jong DS, Vaes BL, Decherling KJ, Feijen A, Hendriks JM, Wehrens R, Mummery CL, van Zoelen EJ, Olijve W, Steegenga WT (2004): Identification of novel regulators associated with early-phase osteoblast differentiation. *J Bone Miner Res* 19: 947-958
- Delany AM, Dong Y, Canalis E (1994): Mechanism of glucocorticoid action in bone cells. *J Cell Biochem* 56: 295-302

- Ducy P, Desbois C, Boyce B, Pinero G, Story B, Dunstan C, Smith E, Bonadio J, Goldstein S, Grundberg C (1996): Increased bone formation in osteocalcin-deficient mice. *Nature* 382: 448-452
- Ducy P, Zhang R, Geoffroy V, Ridall AL, Karsenty G (1997): *Osf2/Cbfa1*: a transcriptional activator of osteoblast differentiation. *Cell* 89: 747-754
- Ducy P, Schinke T, Karsenty G (2000): The osteoblast: a sophisticated fibroblast under central surveillance. *Science* 289: 1501-1504
- Duque G, Macoritto M, Kremer R (2004): 1,25(OH)2D3 inhibits bone marrow adipogenesis in senescence accelerated mice (SAM-P/6) by decreasing the expression of peroxisome proliferators-activated receptor gamma 2 (PPAR γ 2). *Exp Gerontol* 39: 333-338
- Ecarot-Charrier B, Glorieux FH, Rest M, Pereira G (1983): Osteoblasts isolated from mouse calvaria initiate matrix mineralization in culture. *J Cell Biol* 96: 639-643
- Enomoto H, Shiojiri S, Hoshi K, Furuichi T, Fukuyama R, Yoshida CA, Kanatani N, Nakamura R, Mizuno A, Zanna A (2003): Induction of osteoclast differentiation by Runx2 through receptor activator of nuclear faktor- κ B ligand (RANKL) and osteoprotegerin regulation and partial rescue of osteoclastogenesis in Runx2^{-/-} mice by RANKL transgene. *J Biol Chem* 278: 23971-23977
- Enomoto H, Furuichi T, Zanna A, Yamana K, Yoshida C, Somitani S, Yamamoto H, Enomoto-Iwamoto M, Iwamoto M, Komori T (2004): Runx2 deficiency in chondrocytes causes adipogenic changes in vitro. *J Cell Sci* 117: 417-425
- Eriksen EF, Eghbali-Fatourehchi GZ, Khosla S (2007): Remodeling and vascular spaces in bone. *J Bone Miner Res* 22: 1-6
- Everts V, Delaisse JM, Korper W, Jansen DC, Tigchelaar-Gutter W, Saftig P, Beertsen W (2002): The bone lining cells: Its role in cleaning Howship's lacunae and initiating bone formation. *J Bone Miner Res* 17: 77-90
- Felgner PL, Gadek TR, Holm M (1987): Lipofection: a highly efficient, lipid-mediated DNA-transfection procedure. *Proc Natl Acad Sci USA* 84: 7413-7417
- Franceschi RT, Young J (1990): Regulation of alkaline Phosphatase by 1,25-dihydroxyvitamin D3 and ascorbic acid in bone-derived cells. *J Bone Miner Res* 5: 1157-1167
- Fratzl-Zelman N, Fratzl P, Horandner H, Grabner B, Varga F, Ellinger A, Klaushofer K (1998): Matrix mineralization in MC3T3-E1 cell cultures initiated by beta-glycerophosphate pulse. *Bone* 23: 511-520
- Friedenstein AJ, Deriglas UF, Kulagina NN, Panasuk AF, Rudakowa SF, Luria EA, Ruadkow IA (1974): Precursors for fibroblasts in different populations of hematopoietic cells as detected by in vitro colony assay method. *Exp Hematol* 2: 83-92
- Frohnert BL, Hui TY, Bernlohr DA (1999): Identification of a functional peroxisome proliferators-responsive element in the murine fatty acid transport protein gene. *J Biol Chem* 274: 3970-3977
- Fromigue O, Modrowski D, Marie PJ (2004): Growth factor and bone formation in osteoporosis: roles for fibroblast growth factor and transforming growth factor beta. *Curr Pharm Des* 10: 2593-2603

- Gartland A, Buckley KA, Dillon JP, Curran JM, Hunt JA, Gallagher JA (2004): Isolation and culture of human osteoblasts. *Methods Mol Med* 107: 29-54
- Gehl J (2003): Electroporation: theory and methods, perspectives for drug delivery, gene therapy and research. *Acta Physiol Scand* 177: 437-447
- Gehron RP, Termine JD (1985): Human bone cells in vitro. *Calcif Tissue Int* 37: 453-460
- Geoffroy V, Ducy P, Karsenty G (1995): A PEBP2 α /AML-1-related factor increases osteocalcin promoter activity through its binding to an osteoblasts-specific cis-acting element. *J Biol Chem* 270: 30973-30979
- Geoffroy V, Kneissel M, Fournier B, Boyde A, Matthias P (2002): High bone resorption in adult aging transgenic mice overexpressing cbfa1/runx2 in cells of the osteoblastic lineage. *Mol Cell Biol* 22: 6222-6233
- Gersbach CA, Byers BA, Palvath GK, Garcia AJ (2004): RUNX2/Cbfa1 stimulates transdifferentiation of primary skeletal myoblasts into a mineralizing osteoblastic phenotype. *Exp Cell Res* 300: 406-417
- Gerstenfeld LC, Chipman SD, Glowacki J, Lian JB (1987): Expression of differentiated function by mineralizing cultures of chicken osteoblasts. *Dev Biol* 122: 49-60
- Giesen M, Ponce L, Viereck V, Hennies B, Hüfner M, Siggelkow H: Expression of transcription factors Osterix (OSX and core binding factor alpha1 (Cbfa1) in two differentiating models of primary human osteoblasts in culture. In: 49. Tagung der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie, Münster, 11. März 2005; Demeter Verlag, Stuttgart 2005, P11 Nr. 140
- Gimble JM, Nuttall ME (2004): Bone and fat: old questions, new insights. *Endocrine* 23: 183-188
- Gimble JM, Morgan C, Kelly K, Wu X, Dandapani V, Wang CS, Rosen V (1995): Bone morphogenetic proteins inhibit adipocyte differentiation by bone marrow stromal cells. *J Cell Biochem* 58: 393-402
- Gimble JM, Robinson CE, Wu X, Kelly KA, Rodriguez BR, Liewer SA, Lehman JM, Morris DC (1996): Peroxisome proliferators activated receptor-gamma activation by thiazolidinediones induces adipogenesis in bone marrow stromal cells. *Mol Pharmacol* 50: 1087-1094
- Gimble JM, Zvonik S, Floyd E, Kassem M, Nuttall ME (2006): Playing with bone and fat. *J Cell Biochem* 98: 251-266
- Glowacki J, Rey C, Glimcher MJ, Cox KA, Lian J (1991): A role for osteocalcin in osteoclast differentiation. *J Cell Biochem* 45: 292-302
- Golub EE, Harrison G, Taylor AG, Camper S, Shapiro IM (1992): The role of alkaline phosphatase in cartilage mineralization. *Bone Miner* 17: 273-278
- Gori F, Thomas T, Hicok KC, Spelsberg TC, Riggs BL (1999): Differentiation of human marrow stromal precursor cells: bone morphogenetic protein-2 increases OSF2/CBFA1, enhances osteoblast commitment, and inhibits late adipocyte maturation. *J Bone Miner Res* 14: 1522-1535
- Gregoire FM, Smas CM, Sul HS (1998): Understanding adipocyte differentiation. *Physiol Rev* 78: 783-809

- Gronthos S, Chen S, Wang CY, Robey P, Shi S (2003): Telomerase accelerates osteogenesis of bone marrow stromal stem cells by upregulation of CBFA1, osteonin and osteocalcin. *J Bone Miner Res* 18: 716-722
- Grundberg CM, Hauschka PV, Lian JB, Gallop PM (1984): Osteocalcin: isolation, characterization and detection. *Methods Enzymol* 107: 516-543
- Grundberg CM, Locker AC, Nieman SD, Calvo MS (2002): Patterns of osteocalcin and bone specific alkaline phosphatase by age, gender, and race or ethnicity. *Bone* 31: 703-708
- Hafez IM, Maurer N, Cullis PR (2001): On the mechanism whereby cationic lipids promote intracellular delivery of polynucleic acids. *Gene Ther* 8: 1188-1196
- Hammond SM (2005): Dicing and slicing: The core machinery of the RNA interference pathway. *FEBS Letters* 579: 5822-5829
- Harada H, Tagashira S, Fujiwara M, Ogawa S, Katsumata T, Yamaguchi A, Komori T, Nakatsuka M (1999): Cbfa1 isoforms exert functional differences in osteoblast differentiation. *J Biol Chem* 274: 6972-6978
- Harada S, Rodan GA (2003): Control of osteoblast function and regulation of bone mass. *Nature* 423: 349-355
- Hauschka PV, Lian JB, Cole DEC, Grundberg CM (1989): Osteocalcin and matrix Gla protein: vitamin K-dependent proteins in bone. *Physiol Rev* 69: 990-1007
- Haussler MR, Haussler CA, Jurutka PW, Thompson PD, Hsieh JC, Remus LS, Selznick SH, Whitfield GK (1997): The vitamin D hormone and its nuclear receptor: molecular actions and disease states. *J Endocrinol* 154: 57-73
- Havill LM, Hale LG, Newman DE, Witte SM, Mahaney MC (2006): Bone ALP and OC reference standards in adult baboons (*Papio hamadryas*) by sex and age. *J Med Primatol* 35: 97-105
- Hemmerich P, von Mikecz A, Neumann F, Sozeri O, Wolff-Vorbeck G, Zobelein R, Krawinkel U (1993): Structural and functional properties of ribosomal protein L7 from humans and rodents. *Nucleic Acids Res* 21: 223-231
- Hock JM, Canalis E, Centrella M (1990): Transforming growth factor- β stimulates bone matrix apposition and bone cell replication in cultured fetal rat calvariae. *Endocrinology* 126: 421-426
- Hofbauer LC, Gori F, Riggs BL, Lacey DL, Dunstan CR, Spelsberg TC, Khosla S (1999): Stimulation of osteoprotegerin ligand and inhibition of osteoprotegerin production by glucocorticoids in human osteoblastic lineage cells: potential paracrine mechanism of glucocorticoid-induced osteoporosis. *Endocrinology* 140: 4382-4389
- Hofbauer LC, Khosla S, Dunstan CR, Lacey DL, Boyle WJ, Riggs BL (2000): The roles osteoprotegerin ligand in the paracrine regulation of bone resorption. *J Bone Miner Res* 15: 2-12
- Hogan BL (1996): Bone morphogenetic proteins in development. *Curr Opin Genet Dev* 6: 432-438
- Huang W, Rudkin GH, Carlsen B, Ishida K, Ghasri P, Anvar B, Yamaguchi DT, Miller TA (2002): Overexpression of BMP-2 modulates morphology, growth and gene expression in osteoblastic cells. *Exp Cell Res* 274: 226-234

- Hughes DE, Dai A, Tiffée JC, Li HH, Mundy GR, Boyce BF (1996): Estrogen promotes apoptosis of murine osteoclasts mediated by TGF-beta. *Nat Med* 2: 1132-1136
- Hyams JS, Wyzga N, Kreutzer DL, Justinich CJ, Gronowicz GA (1997): Alterations in bone metabolism in children with inflammatory bowel disease: an in vitro study [see comments]. *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 24: 289-295
- Igarashi M, Kamiya N, Hasegawa M, Kasuya T, Takahashi T, Takagi M (2004): Inductive effects of dexamethasone on the gene expression of Cbfa1, OSX and bone matrix proteins during differentiation of cultured primary rat osteoblasts. *J Mol Histol* 35: 3-10
- Inada M, Yasui T, Nomura S, Miyake S, Deguchi K, Himeno M, Sato M, Yamagiwa H, Kimura T, Yasui N (1999): Maturation disturbance of chondrocytes in Cbfa1-deficient mice. *Dev Dyn* 214: 279-290
- Itoh K, Udagawa N, Katagiri T, Iemura S, Ueno N, Yasuda H, Higashio K, Quinn JM, Gillespie MT, Marin TJ (2001): Bone morphogenetic protein 2 stimulates osteoclast differentiation and survival supported by receptor activator of nuclear factor-kappaB ligand. *Endocrinology* 142: 3656-3662
- Jeon MJ, Kim JA, Kwon SH, Kim SW, Park KS, Park SW, Kim SY, Shin CS (2003): Activation of peroxisome proliferators-activated-receptor gamma inhibits the Runx2-mediated transcription of osteocalcin in osteoblasts. *J Biol Chem* 278: 23270-23277
- Jilka RL (1998): Cytokines, bone remodelling, and estrogen deficiency: a 1998 update. *Bone* 23: 75-81
- Jilka RL (2003): Biology of the basic multicellular unit and the pathophysiology of osteoporosis. *Med Pediatr Oncol* 41: 182-185
- Jonsson KB, Frost A, Nilsson O, Ljunghall S, Ljunggren O (1999): Three isolation techniques for primary culture of human osteoblast-like cells: a comparison. *Acta Orthop Scand* 70: 365-373
- Joyce ME, Roberts AB, Sporn MB, Bolander ME (1990): Transforming growth factor- β and the initiation of chondrogenesis and osteogenesis in the rat femur. *J Cell Biol* 110: 2195-2207
- Junqueira LC, Carneiro J: Knochen und Knochenverbindungen; in: *Histologie – Zytologie, Histologie und mikroskopische Anatomie des Menschen unter Berücksichtigung der Histophysiologie*; hrsg. V. Schiebeler TH; 6. Auflage; Springer-Verlag, Berlin 2004: 91-105
- Kainz P (2000): The PCR plateau-phase – towards an understanding of its limitations. *Biochim Biophys Acta* 1494: 23-27
- Kang JS, Alliston T, Delston R, Derynck R (2005): Repression of Runx2 function by recruitment of class II histone deacetylases by Smad3. *EMBO J* 24: 2543-2555
- Kassem M, Ankersen L, Eriksen EF, Clark BF, Rattan SIS (1996): Characterisation of an in vitro model for osteoblast senescence: osteoporotic osteoblasts exhibit reduced proliferative capacity. *J Bone Miner Res* 11, Supplement 1: M595
- Kelly K, Gimble JM (1998): 1,25 dihydroxyvitamin D3 inhibits adipocyte differentiation and gene expression in murine bone marrow stromal cell clones and primary cultures. *Endocrinology* 139: 2622-2628
- Kern A, Jundt G, Vonderheid B, Groscurth P, Schulz A, (1990): Establishment and functional characterization of a human osteosarcoma cell line (HOS 58). *Calcif Tissue Int* 46: 208

- Kimura A, Katoh O, Hyodo H, Kuramoto A (1989): Transforming growth factor beta regulates growth as well as collagen and fibronectin synthesis of human marrow fibroblasts. *Br J Haematol* 72: 486-491
- Kipp DE, Grey CE, Mc Elvain ME, Kimmel DB, Robinson RG, Luckert BP (1996): Long-term low ascorbic acid intake reduces bone mass in guinea pigs. *J Nutr* 126: 2044-2049
- Klüver AM: Charakterisierung der Genexpression des Humanen Ureatransporters HUT11 im Vergleich zu der eines Adipozytenmarkers in humanen Osteoblasten und in einer immortalisierten Zelllinie. Med. Diss. Göttingen 2005
- Kobayashi H, Gao Y, Ueta C, Yamaguchi A, Komori T (2000): Multilineage differentiation of Cbfa1-deficient calvarial cells in vitro. *Biochem Biophys Res Commun* 273: 630-636
- Komori T (2005): Regulation of skeletal development by the RUNX2 family of transcription factors. *J Cell Biochem* 95: 445-453
- Komori T (2006): Regulation of osteoblast differentiation by transcription factors. *J Cell Biochem*
- Komori T, Yagi H, Nomura S, Yamaguchi A, Sasaki K, Deguchi K, Shimizu Y, Bronson RT, Gao YH, Inada M et al. (1997): Targeted disruption of CBFA1 results in a complete lack of formation owing to maturational arrest of osteoblasts. *Cell* 89: 755-764
- Kurre W: Charakterisierung humaner Knochenzellen in vitro: Prokollagen-I-Sekretion, Kollagen-I-Genexpression und Matrixbildung. Med. Diss. Göttingen 1997
- Lacey DL, Timms E, Tan HL, Kelley MJ, Dunstan CR, Burgess T, Elliott R, Colombero A, Elliott G, Scully S et al. (1998): Osteoprotegerin ligand is a cytokine that regulates osteoclast differentiation and activation. *Cell* 93: 165-176
- Lecellier CH, Dunoyer P, Arar K, Lehmann-Che J, Eyquem S, Himber C, Saib A, Voinnet O (2005): A cellular microRNA mediates antiviral defense in human cells. *Science* 308: 557-560
- Lecka-Czernik B, Gubrij I, Moerman EJ, Kajkenova O, Lipschitz DA, Manolagas SC, Jilka RL (1999): Inhibition of *Osf2/Cbfa1* expression and terminal osteoblasts differentiation by PPAR2. *J Cell Biochem* 74: 357-371
- Lecka-Czernik B, Moerman EJ, Grant DF, Lehman JM, Manolagas SC, Jilka RL (2002): Divergent effects of selective peroxisome proliferator-activated receptor-gamma 2 ligands on adipocyte versus osteoblast differentiation. *Endocrinology* 143: 2376-2384
- Lee KS, Kim HJ, Li QL, Chi XZ, Ueta C, Komori T, Wozney JM, Kim EG, Choi JY, Ryoo HM et al. (2000): Runx2 is a common target of transforming growth factor- β and bone morphogenetic protein 2, and cooperation between Runx2 and Smad5 induces osteoblasts specific gene expression in the pluripotent mesenchymal precursor cell line C2C12. *Mol Cell Biol* 20: 8783-8792
- Lee MH, Kwon TG, Park HS, Wozney JM, Ryoo HM (2003): BMP-2-induced Osterix expression is mediated by DLx5 but is independent of Runx2. *Biochem Biophys Res Commun* 309: 689-694
- Lefebvre CB, Nakashima K (2001): Regulatory mechanisms in the pathways of cartilage and bone formation. *Curr Opin Cell Biol* 13: 721-727
- Lemaire V, Tobin FL, Greller LD, Cho CR, Suva LJ (2004): Modeling the interactions between osteoblasts and osteoclast activities in bone remodelling. *J Theor Biol* 229: 293-309

- Li X, Jin L, Cui Q, Wang GJ, Balian G (2005): Steroid effects on osteogenesis through mesenchymal cell gene expression. *Osteoporos Int* 16: 101-108
- Lian JB, Stein GS (2003): RUNX2/Cbfa1: a multifunctional regulator of bone formation. *Curr Pharm Des* 9: 2677-2685
- Lian JB, Javed A, Zaidi SK, Lengner C, Montecino M, Wijnen AJ, Stein JL, Stein GS (2004): Regulatory controls of osteoblasts growth and differentiation: role of Runx/Cbfa/AML factors. *Crit Rev Eukaryot Gene Expr* 14: 1-41
- Linz U, Delling U, Rübsamen-Waigmann H (1990): Systematic studies on parameters influencing the performance of the polymerase chain reaction. *J Clin Chem Clin Biochem* 28: 5-13
- Liu J (2004): Argonaute2 is the catalytic engine of mammalian RNAi. *Science* 305: 1437-1441
- Liu W, Toyosawa S, Furuichi T, Kanatani N, Yoshida C, Liu Y, Himeno M, Narai S, Yamaguchi A, Komori T (2001): Overexpression of Cbfa1 in osteoblasts inhibits osteoblast maturation and causes osteopenia with multiple fractures. *J Cell Biol* 155: 157-166
- Locklin RM, Oreffo ROC, Triffitt JT (1999): Effects of TGF β and bFGF on the differentiation of human bone marrow stromal fibroblasts. *Cell Biol Int* 23: 185-194
- MacDougald OA, Lane MD (1995): Transkriptional regulation of gene expression during adipocyte differentiation. *Annu Rev Biochem* 64: 345-373
- MacDougald OA, Mandrup S (2002): Adipogenesis: forces that tip the scales. *Trends Endocrinol Metab* 13: 5-11
- Mahmoodian F, Gosiewska A, Peterkofsky B (1996): Regulation and properties of bone alkaline phosphatase during Vitamin C deficiency in guinea pigs. *Arch Biochem Biophys* 336: 86-96
- Major RH: Classical description of disease (3 ed). Thomas, Chicago 1945, 587
- Makhijani NS, Bischoff DS, Yamaguchi DT (2005): Regulation of proliferation and migration in retinoic acid treated C3H10T1/2 cells by TGF-beta isoforms. *J Cell Physiol* 202: 304-313
- Manolagas SC (2000): Birth and death of bone cells: basic regulatory mechanism and implications for the pathogenesis and treatment of osteoporosis. *Endocr Rev* 21: 115-137
- Marks SC Jr, Popoff SN (1988): Bone cell biology: the regulation of development, structure and function in the skeleton. *Am J Anat* 183: 1-44
- Massague J (1990): The transforming growth factor beta familiy. *Annu Rev Cell Biol* 6: 597-641
- Meister G, Landthaler M, Patkaniowska A, Dorsett Y, Teng G, Tuschl T (2004): Human Argonaute2 mediates RNA cleavage targeted by miRNAs and siRNAs. *Mol Cell* 15: 185-197
- Mihm S, Frese M, Meier V, Wietzke-Braun P, Scharf JG, Bartenschlager R, Ramadori G (2004): Interferon type I gene expression in chronic hepatitis C. *Lab Invest* 84: 1148-1159
- Miller SC (1987): The bone lining cells: A distinct phenotype? *Calcif Tissue Int* 41: 1-5
- Minne HW, Pfeilschifter J, Scharla S, Mutschelknauss S, Schwarz A, Krempien B, Ziegler R (1984): Inflammation mediated osteopenia in the rat: a new animal model for pathological loss of bone mass. *Endocrinology* 115: 50-54

- Moerman EJ, Teng K, Lipschitz DA, Lecka-Czernik B (2004): Aging activates adipogenic and suppresses osteogenic programs in mesenchymal marrow strom/stem cells: the role of PPAR- γ 2 transcription factor and TGF- β /BMP signaling pathways. *Aging Cell* 3: 379-389
- Morava E, Karteszi J, Weisenbach J, Caliebe A, Mundlos S, Mehes K (2002): Cleidocranial dysplasia with decreased bone density and biochemical findings of hypophosphatasia. *Eur J Pediatr* 161: 619-622
- Moss DW (1992): Perspectives in alkaline phosphatase research. *Clin Chem* 38: 2486-2492
- Mueller E, Drori S, Aiyer A, Yie J, Sarraf P, Chen H, Hauser S, Rosen ED, Ge K, Roeder RG, et al. (2002): Genetic analysis of adipogenesis through peroxisome proliferators-activated receptor gamma isoforms. *J Biol Chem* 277: 41925-41930
- Mundlos S, Otto F, Mundlos C, Mulliken JB, Aylsworth AS, Albright S, Lindhout D, Cole WG, Henn W, Knoll JH (1997): Mutations involving the transkriptionfactor CBFA1 cause cleidocranial dysplasia. *Cell* 89: 773-9
- Mundy GR (1991): The effects of TGF-beta on bone. *Ciba Found Symp* 157: 137-151
- Nakashima K, Crombrughe B (2003): Transcriptional mechanism in osteoblast differentiation and bone formation. *Trends Genet* 19: 458-466
- Nakashima K, Zhou X, Kunkel G, Zhang Z, Deng JM, Behringer RR, Crombrughe B (2002): The novel zinc finger-containing transcription factor osterix is required for osteoblast differentiation and bone formation. *Cell* 108: 17-29
- Nakayama Y, Kato N, Nakajima Y, Shimizu E, Ogata Y (2004): Effect of TNF-alpha on human osteosarcoma cell line Saos2—TNF-alpha regulation of bone sialoprotein gene expression in Saos2 osteoblast-like cells. *Cell Biol Int* 28: 653-660
- Neumann E, Kakorin S, Toensing K (1999): Fundamentals of electroporative delivery of drugs and genes. *Bioelectrochem Bioenerg* 48: 3-16
- Nishio Y, Yufeng D, Paris M, O'Keefe RJ, Schwarz EM, Drissi H (2006): Runx2 mediated regulation of the zinc finger Osterix/Sp7 gene. *Gene* 372: 62-70
- Nöth U, Osyczka AM, Tuli R, Hickok NJ, Danielson KG, Tuan RS (2002): Multilineage mesenchymal differentiation potential of human trabecular bone derived cells. *J Orthop Res* 20: 1060-1069
- Nöth U, Tuli R, Seghatoleslami R, Howard M, Shah A, Hall DJ, Hickok NJ, Tuan RS (2003): Activation of p38 and Smads mediates BMP-2 effects on human trabecular bone-derived osteoblasts. *Exp Cell Res* 291: 210-211
- Nuttall ME, Patton AJ, Olivera DL, Nadeau DP, Gowen M (1998): Human trabecular bone cells are able to express both osteoblastic and adipocytic phenotype: implications for osteopenic disorders. *J Bone Miner Res* 13: 371-381
- O'Brian CA, Jia D, Plotkin LI, Bellido T, Powers CC, Stewart SA, Manolagas SC, Weinstein RS (2004): Glucocorticoids act directly on osteoblasts and osteocytes to induce their apoptosis and reduce bone formation and strength. *Endocrinology* 145: 1835-1841
- Owen M (1988): Marrow stromal stem cells. *J Cell Sci Suppl* 10: 63-76

- Owen TA, Aronow M, Shalhoub V, Barone LM, Wilming L, Tassinari MS, Kennedy MB, Pockwinse S, Lian JB, Stein GS (1990): Progressive development of rat osteoblast phenotype in vitro: reciprocal relationships in expression of genes associated with osteoblast proliferation and differentiation during formation of the bone extracellular matrix. *J Cell Physiol* 143: 420-430
- Parfitt AM (1994): Osteonal and hemi-osteonal remodelling: the spatial and temporal framework for signal traffic in adult bone. *J Cell Biochem* 55: 273-286
- Parfitt AM (1995): Problems in the application of in vitro systems to the study of human bone remodelling. *Calcif Tissue Int* 56: 5-7
- Peck WA, Birge SJ, Fedak SA (1964): Bone cells: biochemical and biological studies after enzymatic isolation. *Science* 146: 1476-1477
- Pfeilschifter J (1990): Der Knochenstoffwechsel und seine Aktivitätsparameter. *Internist (Berl)* 31: 727-736
- Pittenger MF, Mackay AM, Beck SC, Jaiswal RK, Douglas R, Mosca JD, Moormann MA, Simonetti DW, Craig S, Marshak DR (1999): Multilineage potential of adult human mesenchymal stem cells. *Science* 284: 143-147
- Ponce MKA, Heinemann D, Wulf G, Frosch K, Huefner M, Siggelkow H (2005): Primary human osteoblasts express increasing adipogenic markers when cultured under osteogenic conditions. *Stem Cells (im Druck)*
- Price PA (1989): Gla-containing proteins of bone. *Connect Tissue Res* 21: 51-57
- Quarles DL, Yohay DA, Lever LW, Caton R, Wenstrup RJ (1992): Distinct proliferative and differentiated stages of murine MC3T3-E1 cells in culture: an in vitro model of osteoblasts development. *J Bone Miner Res* 7: 639-650
- Raisz LG (1999): Osteoporosis: current approaches and future prospects in diagnosis, pathogenesis, and management. *J Bone Miner Metab* 17: 97-89
- Rebenstorff K: Proliferations- und Differenzierungsverhalten der humanen Osteosarkomzelllinie HOS 58 nach multipler Passagierung und humaner Osteoblasten unter dem Einfluß von Vitamin D. Med. Diss. Göttingen 1998
- Rickard DJ, Kassem M, Hefferan TE, Sarkar G, Spelsberg TC, Riggs BL (1996): Isolation and characterization of osteoblast precursor cells from human bone marrow. *J Bone Miner Res* 11: 312-319
- Robling AG, Castillo AB, Turner CH (2006): Biomechanical and molecular regulation of bone remodelling. *Ann Rev Bio Eng* 8: 455-498
- Rodan GA (2003): The development and function of the skeleton and bone metastases. *Cancer* 97: 726-732
- Rosen ED, Spiegelman BM (2000): Molecular regulation of adipogenesis. *Annu Rev Cell Dev Biol* 16: 145-171
- Rosen ED, Walkey CJ, Puigserver P, Spiegelman BM (2000): Transcriptional regulation of adipogenesis. *Genes Dev* 14: 1293-1307

- Ross FP, Christiano AM (2006): Nothing but skin and bone. *J Clin Invest* 116: 1140-1149
- Ryoo HM, Lee MH, Kim YJ (2006): Critical molecular switches involved in BMP2-induced osteogenic differentiation of mesenchymal cells. *Gene* 366: 51-57
- Saiki RK, Scharf S, Falcoona F, Mullis KB, Horn GT, Erlich HA, Arnheim N (1985): Enzymatic amplification of beta-globin genomic sequences and restriction site analysis for diagnosis of sickle cell anemia. *Biotechnology* 24: 467-480
- Sakaguchi Y, Sekiya I, Yagishita K, Ichinose S, Shinomiya K, Muneta T (2004): Suspended cells from trabecular bone by collagenase digestion become virtually identical to mesenchymal stem cells obtained from marrow aspirates. *Blood* 104: 2728-2735
- Salingcarnboriboon R, Tsuji K, Komori T, Nakashima K, Ezura Y, Noda M (2006): Runx2 Is a Target of Mechanical Unloading to Alter Osteoblastic Activity and Bone Formation in Vivo. *Endocrinology* 147: 2296-2305
- Schmitt JM, Hwang K, Winn SR, Hollinger JO (1999): Bone morphogenetic proteins: an update on basic biology and clinical relevance. *J Orthop Res* 17: 269-278
- Schoonjans K, Peinado-Onsurbe J, Lefebvre AM, Heyman R, Briggs M, Deeb S, Steals B, Auwerx J (1996): PPAR α and PPAR γ activators direct a distinct tissue-specific transcriptional response via PPRE in the lipoprotein lipase gene. *EMBO J* 15: 5336-5348
- Schröder TM, Jensen ED, Westendorf JJ (2005): Runx2: a master organizer of gene transcription in developing and maturing osteoblasts. *Birth Defects Res C Embryo Today* 75: 213-225
- Schulz A, Battmann A, Heinrichs CM, Kern A, Tiedemann A, Bürger H, Fohr B, Hani N, Pietruck C, Busk H (1993): Properties and reactivity of a new human osteosarcoma cell line (HOS 58). *Calcif Tissue Int (Suppl 1)* 52: S8 (30)
- Shalhoub V, Conlon D, Tassinari M, Quinn C, Partridge N, Stein GS, Lian JB (1992): Glucocorticoids promote development of the osteoblast phenotype by selectively modulating expression of cell growth and differentiation associated genes. *J Cell Biochem* 50: 425-440
- Siggelkow H, Niedhart C, Kurre W, Ihbe A, Schulz A, Atkinson MJ, Hüfner M (1998a): In vitro differentiation potential of a new human osteosarcoma cell line (HOS 58). *Differentiation* 62: 81-91
- Siggelkow H, Neubauer K, Schulz H, Krüger M, Ramadori G, Hüfner M (1998b): Einfluß von Ascorbat auf das Kollagenprozessing und die Sekretion von Procollagen-I-Peptid in primären humanen Osteoblasten. *Osteologie* 7: 31
- Siggelkow H, Benzler K, Atkinson MJ, Hüfner M (1998c): The use of confluence stages does not decrease the overall variability in primary human osteoblasts but can give additional information on differentiation in vitro. *Exp Clin Endocrinol Diabetes* 106: 217-225
- Siggelkow H, Rebenstorff K, Kurre W, Niedhart C, Engel I, Schulz H, Atkinson MJ, Hüfner M (1999a): Development of the osteoblast phenotype in primary human osteoblasts in culture: Comparison with rat calvarial cells in osteoblast differentiation. *J Cell Biochem* 75: 22-35

- Siggelkow H, Schulz H, Kaesler S, Benzler K, Atkinson MJ, Hüfner M (1999b): 1,25-dihydroxyvitamin-D3 attenuates the confluence dependent differences in the osteoblasts characteristic proteins alkaline phosphatase, procollagen I peptide, and osteocalcin. *Calcif Tissue Int* 64: 414-421
- Siggelkow H, Schenck RM, Rohde M, Viereck V, Tauber S, Atkinson MJ, Hüfner M (2002): Prolonged culture of HOS 58 human osteosarcoma cells with 1,25(OH)₂-d₃, TGF-beta, and dexamethason reveals physiological regulation of alkaline phosphatase, dissociated osteocalcin gene expression, and protein synthesis and lack of mineralization. *J Cell Biochem* 85: 279-294
- Siggelkow H, Eidner T, Lehmann G, Viereck V, Raddatz D, Munzel U, Hein G, Hüfner M (2003): Cytokines, osteoprotegerin, and RANKL in vitro and histomorphometric indices of bone turnover in patients with different bone diseases. *J Bone Miner Res* 18: 529-538
- Siggelkow H, Schmidt E, Hennies B, Hufner M (2004): Evidence of downregulation of matrix extracellular phosphoglycoprotein during terminal differentiation in human osteoblasts. *Bone* 35: 570-576
- Simao AMS, Beloti MM, Cezarino RM, Rosa AL, Pizauro JM, Ciancaglini P (2006): Membrane-bound alkaline Phosphatase from ectopic mineralization and rat born marrow cell culture. *Comparative Biochem Physiol* (im Druck)
- Simonet WS, Lacey DL, Dunstan CR, Kelley M, Chang MS, Luthy R, Nguyen HQ, Wooden S, Bennet L, Boone T (1997): Osteoprotegerin: a novel secreted protein involved in the regulation of bone density [see comments]. *Cell* 89: 309-319
- Song L, Tuan RS (2004): Transdifferentiation potential of human mesenchymal stem cells derived from bone marrow. *FASEB J* 18: 980-982
- Spelsberg TC, Subramaniam M, Riggs BL, Khosla S (1999): The actions and interactions of sex steroids and growth factors/cytokines on the skeleton. *Mol Endocrinol* 13: 819-828
- Stein GS, Lian JB (1993): Molecular mechanisms mediating proliferation/differentiation interrelationships during progressive development of the osteoblast phenotype. *Endocr Rev* 14: 424-42
- Stein GS, Lian JB, Gerstenfeld LG, Shaloub V, Aronow M, Owen T, Markose E (1989): The onset and progression of osteoblast differentiation is functionally related of cellular proliferation. *Connect Tissue Res* 20: 3-13
- Stock M, Otto F (2005): Control of RUNX2 Isoform Expression: The role of promoters and enhancers. *J Cell Biochem* 95: 506-517
- Suda T, Shinki T, Takahashi N (1990): The role of vitamin D in bone and intestinal cell differentiation. *Annu Rev Nutr* 10: 195-211
- Suda T, Ueno Y, Fujii K, Shinki T (2003): Vitamin D and bone. *J Cell Biochem* 88: 259-266
- Sykaras N, Opperman LA (2003): Bone morphogenetic proteins (BMPs): how do they function and what can they offer the clinician? *J Oral Sci* 45: 57-73

- Tai G, Polak JM, Bishop AE, Christodoulou I, Buttery LD (2004): Differentiation of osteoblasts from murine embryonic stem cells by overexpression of transcriptional factor Osterix. *Tissue Eng* 10: 1456-1466
- Takamizawa S, Maehata Y, Imai K, Senoo H, Sato S, Hata RI (2004): Effects of ascorbic acid and ascorbic acid 2-phosphate, a long acting vitamin C derivate, on the proliferation and differentiation of human osteoblasts-like cells. *Cell Biol Int* 28: 255-265
- Takeda S, Bonnamy JP, Owen MJ, Ducy P, Karsenty G (2001): Continuous expression of Cbfa1 in nonhypertrophic chondrocytes uncovers its ability to induce hypertrophic chondrocyte differentiation and partially rescues Cbfa1-deficient mice. *Genes Dev* 15: 467-481
- Tanaka S, Sakai A, Tanaka M, Otomo H, Okimoto N, Sakata T, Nakamura T (2004): Skeletal unloading alleviates the anabolic action of intermittent PTH (1-34) in mouse tibia in association with inhibition of PTH-induced increase in c-fos mRNA in bone marrow cells. *J Bone Miner Res* 19: 1813-1820
- Teitelbaum SL (2000): Bone resorption by osteoclasts. *Science* 289: 1504-1508
- Tenenbaum HC, Limeback H, McCulloch CA, Mamujee H, Sukhu B, Torontali M (1992): Osteogenic phase-specific co-regulation of collagen synthesis and mineralization by beta-glycerophosphate in chick periosteal cultures. *Bone* 13: 129-138
- Thomas T, Gori F, Khosla S, Jensen MD, Burguera B, Riggs L (1999): Leptin acts on human marrow stromal cells to enhance differentiation to osteoblasts and to inhibit differentiation to adipocytes. *Endocrinology* 140: 1630-1638
- Thompson GM, Trainor D, Biswas C, LaCerte C, Berger JP, Kelly LJ (2004): A high capacity assay for PPARgamma ligand regulation of endogenous aP2 expression in 3T3-L1 cells. *Anal Biochem* 330: 21-8
- Tu Q, Valverde P, Chen J (2006): Osterix enhances proliferation and osteogenic potential of bone marrow stromal cells. *Biochem Biophys Res Commun* 341: 1257-1265
- Tuli R, Tuli S, Nandi S, Wang ML, Alexander PG, Haleem-Smith H, Hozack WJ, Manner PA, Danielson KG, Tuan RS (2003): Characterization of multipotential mesenchymal progenitor cells derived from human trabecular bone. *Stem Cells* 21: 681-693
- Urist MR (1965): Bone formation by autoinduction. *Science* 150: 893-899
- Vaes BL, Ducy P, Sijbers AM, Hendriks JMA, Someren EP, Jong NG, Heuvel ER, Olijve W, Zoelen EJJ, Decherig KJ (2006): Microarray analysis on RUNX2-deficient mouse embryos reveals novel Runx2 functions and target genes during intramembranous and endochondral bone formation. *Bone* 39: 724-738
- Viereck V, Siggelkow H, Tauber S, Raddatz D, Schutze N, Hüfner M (2002): Differential regulation of Cbfa1/Runx2 and osteocalcin gene expression by vitamin-D3, dexamethasone, and local growth factors in primary human osteoblasts. *J Cell Biochem* 86: 384-356
- Wasan EK, Fairchild A, Bally MB (1997): Cationic Liposome-Plasmid DNA Complexes Used for Gene Transfer Retain a Significant Volume. *J Pharm Sci* 87: 9-14

- Wennberg C, Hessle L, Lundberg P, Mauro S, Narisawa S, Lerner UH, Millan JL (2000): Functional characterization of osteoblasts and osteoclasts from alkaline phosphatase knock out mice. *J Bone Miner Res* 15: 1879-1888
- Wergedal JE, Baylink DJ (1984): Characterization of cells isolated and cultured from human bone. *Proc Exp Biol Med* 176: 60-69
- Wong FMP, Reimer DL, Bally MB (1996): Cationic lipid binding to DNA: characterization of complex formation. *Biochemistry* 35: 5756-5763
- Wong G, Cohn DV (1974): Separation of parathyroid hormone and calcitonin-sensitive cells from non-responsive bone cells. *Nature* 252: 713-715
- Wulf GG, Chapuy B, Trümper L (2006): Mesenchymale Stammzellen des Knochenmarks: Phänotyp, Aspekte der Biologie und klinische Perspektiven. *Med Klin* 101: 408-413
- Xiao ZS, Thomas R, Hinson TK, Quarles LD (1998): Genomic structure and isoform expression of the mouse, rat and human Cbfa1/Osf2 transcription factor. *Gene* 214: 187-197
- Yamashita A, Takada T, Nemoto K, Yamamoto G, Torii R (2006): Transient suppression of PPAR γ directed ES cells into an osteoblastic lineage. *FEBS Letters* 580: 4121-4125
- Yasuda H, Shima N, Nakagawa N, Mochizuki SI, Yano K, Fujise N, Sato Y, Goto M, Yamaguchi K, Kuriyama M et al. (1998): Identity of osteoclastogenesis inhibitory factor (OCIF) and osteoprotegerin (OPG): a mechanism by which OPG/OCIF inhibits osteoclastogenesis in vitro. *Endocrinology* 139: 1329-1337
- Yin L, Li Y, Wang Y (2006): Dexamethason-induced adipogenesis in primary marrow stromal cell cultures: mechanism of steroid-induced osteonecrosis. *Chin Med J* 119: 581-588
- You LD, Weinbaum S, Cowin SC, Schaffler MB (2004): Ultrastructure of the osteocyte process and its pericellular matrix. *Anat Rec* 278: 505-513
- Zheng H, Guo Z, Ma Q, Jia H, Dang G (2003): Cbfa1/osf2 transduced bone marrow stromal cells facilitate bone formation in vitro and in vivo. *Calcif Tissue Int* 74: 194-203
- Zhu Y, Qi C, Korenberg JR, Chen XN, Noya D, Rao MS, Reddy JK (1995): Structural organization of mouse peroxisome proliferators-activated receptor gamma (mPPAR gamma) gene: alternative promoter use and different splicing yield two mPPAR gamma isoforms. *Proc Natl Acad Sci* 92: 7921-7925
- Zimmermann U (1986): Electrical breakdown, electroporation and electrofusion. *Rev Physiol Biochem Pharmacol* 105: 175-256
- Zuidam NJ, Barenholz Y (1998): Electrostatic and structural properties of complexes involving plasmid DNA and cationic lipids commonly used for gene delivery. *Biochem Biophys Acta* 1368: 115-128

Publikationen in Zusammenhang mit dieser Promotionsarbeit

1. Im Rahmen des Kongresses „Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie“ vom 9.-12. März 2005 in Münster fand eine Posterpräsentation mit dem Titel „Expression of transcription factors osterix (OSX) and core binding factor alpha1 (Cbfa1) in two differentiating models of primary human osteoblasts in culture“ statt.
2. Ein weiterer Teil dieser Arbeit wurde auf dem Kongress „European Calcified Tissues Society“ vom 25.-29. Juni 2005 in Genf mit dem Titel „The osteoblast transcription factor osterix in osteoblasts from patients with metabolic bone diseases correlates to clinical osteoporotic markers“ vorgetragen.
3. Am 1.-4. März 2006 wurde ein weiterer Teil dieser Arbeit im Rahmen des Kongresses „Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie“ in Essen als ein Poster mit dem Titel „Impact of RUNX2 knock down on human osteoblast differentiation“ präsentiert.
4. Auf der Osteologietagung „Osteologie 2006“ vom 8.-11. März 2006 in Köln fand ein Vortrag mit dem Thema „Etablierung einer siRNA-Methode zur Reduktion der Genexpression des Transkriptionsfaktors RUNX2 in primären humanen Osteoblasten“ über die im Rahmen dieser Promotionsarbeit gewonnenen methodischen Transfektionserkenntnisse statt.
5. Große Teile dieser Arbeit wurden auf dem Kongress „European Calcified Tissues Society“ vom 10.-14. Mai 2006 in Prag als Poster mit dem Titel „Gene expression of osteoblast transcription factors RUNX2 and osterix in models of osteoblast differentiation and impact of RUNX2 knock down“ präsentiert.
6. Die klinischen Ergebnisse wurden unter dem Titel „The osteoblast transcription factor osterix in osteoblasts from patients with metabolic bone diseases correlates to clinical osteoporotic markers. Siggelkow H, Giesen M, Ponce ML, Ritz V, Eidner T, Lehmann G, Hein G, Hüfner M“ in der Zeitschrift „Journal of bone and mineral research“ eingereicht.

Danksagung

Herrn Prof. Dr. med. Michael Hüfner danke ich für die Gewährleistung der Durchführung einer Promotionsarbeit mit dem Schwerpunkt Endokrinologie in der Abteilung Gastroenterologie und Endokrinologie im Zentrum Innere Medizin.

Frau PD Dr. med. Heide Siggelkow bin ich in besonderem Maße zum Dank verpflichtet, da sie mich nicht nur in herausragender Art und Weise betreute, sondern auch ständig konstruktive Kritik zu jeglichen Zeitpunkten im Verlauf meiner Dissertation übte und für eine insgesamt äußerst harmonische Zusammenarbeit sorgte.

Zu großem Dank bin ich Frau Vera Ritz verpflichtet, die mich mit zahlreichen und hilfreichen Anregungen im praktischen und theoretischen Teil meiner Doktorarbeit unterstützte.

Herrn Jun. Prof. PD Dr. med. Gerald Wulf danke ich für die Bereitstellung von humanen mesenchymalen Stammzellen.

Ich danke Frau Jun. Prof. Dr. med. Katrin Schäfer und Frau Stephanie Minne für die Unterstützung bei der Lipofekamin-Transfektion der pHOB.

Meinen Kollegen im Labor, Jakob Triebel, Philipp Braun, Thomas Janyga und Kai Peiffer danke ich für die gute Arbeitsatmosphäre im Forschungslabor.

Frau Doris Krause und Frau Bettina Hennies möchte ich für die Einarbeitung in die Zellkultur und PCR, sowie für die ständige Hilfsbereitschaft danken.

Lebenslauf

Ich, Markus Giesen, wurde am 06.02.1980 als erstes Kind des Gynäkologen Dr. med. Viktor Giesen und seiner Ehefrau, Manuela Lopez Jimenez, in Cadiz (Spanien) geboren.

Von 1986 bis 2000 besuchte ich die Hiberniaschule in Herne, an der ich im Mai 2000 die allgemeine Hochschulreife erlangte und von 1996 – 1998 eine Ausbildung zum Elektroinstallateur absolvierte.

Im Sommer 1998 absolvierte ich in einem Camp-Hill ein Sozialpraktikum in Hudson im US-Bundesstaat New York.

Im Rahmen des Zivildienstes arbeitete ich von 2000 bis 2001 in einer integrativen Kindertagesstätte.

Im Wintersemester 01/02 immatrikulierte ich mich zum Studium der Humanmedizin an der Georg-August-Universität zu Göttingen, an der ich im August 2003 die ärztliche Vorprüfung (1. Staatsexamen) bestand. Zum Wintersemester 06/07 begann ich das praktische Jahr in der Abteilung Chirurgie im Hospital Son Dureta in Palma de Mallorca. Im Oktober 2007 werde ich zum abschließenden 2. Staatsexamen antreten.