**Aus dem Institut für Humangenetik
kommissarische Leitung Prof. Dr. Bernd Wollnik
im Zentrum Hygiene und Humangenetik
der Medizinischen Fakultät der Universität Göttingen**

Zur Charakterisierung von *Stra8* – Cre - transgenen Mäusen

**INAUGURAL - DISSERTATION
zur Erlangen des Doktorgrades
der Medizinischen Fakultät der
Georg – August - Universität zu Göttingen**

**vorgelegt von
Romy Graner
aus Heilbronn**

Göttingen 2015

Dekan: Prof. Dr. rer.nat. H. K. Kroemer

I. Berichterstatter: Prof. Dr. med. Dr. h.c. W. Engel

II. Berichterstatter/in:

II. Berichterstatter/in:

Tag der mündlichen Prüfung:

1	EINLEITUNG	- 1 -
1.1	Stammzellen und Regeneration	- 1 -
1.2	Adulte residente Stammzellen	- 1 -
1.3	Wanderung von Zellen und Stammzellen	- 2 -
1.4	Stra8	- 3 -
1.5	Fragestellung	- 4 -
1.6	Mausmodell	- 4 -
2	MATERIAL UND METHODEN	6
2.1	Chemikalien	6
2.2	Gebrauchswaren	8
2.2.1	Gebrauchswaren für die Zellkultur	8
2.3	Geräte	8
2.4	Sterilisation	9
2.5	Puffer und Lösungen	10
2.6	Gebrauchsfertige Kits	13
2.7	Vektoren	13
2.8	Bakterien	14
2.8.1	Medien für die Bakterienkultur	14
2.9	Mäusestämme	15
2.10	Eukaryotische Zelllinien	15
2.10.1	Medien für die Zellkultur	15
2.11	Antibiotika	16
2.12	Antikörper	16
2.13	Oligonukleotide	17
2.14	Molekulargewichtstandard	18
2.15	Datenbanken	18

2.16	Zellbiologische Methoden.....	18
2.16.1	Kultivierung von murinen embryonalen Stammzellen (ES-Zellen)	18
2.16.2	Gewinnung und Kultivierung von murinen embryonalen Fibroblasten.....	18
2.16.3	Auftauen und Einfrieren von eukaryotischen Zellen.....	19
2.16.4	Passagieren von eukaryotischen Zellen	19
2.16.5	MitomycinC-Behandlung von embryonalen Fibroblasten.....	20
2.16.6	Transfektion mit Lipofectamin	20
2.17	Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren	21
2.17.1	Isolierung von RNA aus Geweben.....	21
2.17.2	Herstellung von komplementärer DNA durch Reverse Transkription.	21
2.17.3	Isolierung von genomischer DNA aus Mäuseschwänzen und Gewebe (Laird et al. 1991).....	22
2.17.4	Minipräparation von Plasmid-DNA aus Bakterien	22
2.17.5	Midipräparation.....	22
2.17.6	Isolierung von DNA- Fragmenten aus Agarosegelen.....	23
2.18	Konzentrationsbestimmungen von Nukleinsäuren	23
2.19	Enzymatische Modifikation von DNA.....	23
2.19.1	Restriktionsspaltung von Plasmid-DNA	23
2.20	Polymerasekettenreaktion.....	24
2.20.1	PCR an genomischer DNA.....	24
2.20.2	RT-PCR	25
2.20.3	Sequenz - PCR.....	26
2.21	Klonierung von DNA - Fragmenten	27
2.21.1	Ligation von PCR-amplifizierten DNA-Fragmenten.....	27
2.21.2	Transformation, modifiziert nach Hanahan 1983	27
2.22	Horizontale Gelelektrophorese.....	27
2.23	Histologische Methoden	28

2.23.1	Einbettung in Kryomedium.....	28
2.23.2	Kryoschnitte	28
2.23.3	Paraffinschnitte	28
2.24	Lac-Z - Färbemethode.....	28
2.24.1	Protokoll 1 (für ganze Organe und Schnittfärbungen).....	28
2.24.2	Protokoll 2.....	29
2.24.3	Lac Z Kit der Firma InvivoGen	29
2.24.4	Protokoll 3.....	29
2.25	Immunhistologie	29
2.26	HE-Färbung (Hämatoxylin-Eosin-Färbung)	30
2.27	Messung der Luziferaseaktivität.....	30
3	ERGEBNISSE.....	31
3.1	Untersuchung und Genotypisierung der <i>Stra8</i> -Cre/R26R - Mäusen.....	31
3.1.1	Genotypisierung von <i>Stra8</i> -Cre/R26R - Mäusen durch Rückkreuzung .	31
3.2	Nachweis von LacZ - Expression durch X - Gal - Färbung.....	34
3.3	Promotoranalyse	36
3.3.1	Putative Promotoren	36
3.3.2	Erstellen des pGL3 - Konstrukts	37
3.4	Expressionsanalysen von LacZ in doppelt transgenen Mäusen	43
3.5	Immunhistologie	45
3.5.1	Testes in verschiedenen Entwicklungsstufen.....	45
3.5.2	Nachweis von LacZ in den verschiedenen Organen.....	49
3.6	Blastozystenfärbung mit LacZ - Antikörper	62
3.7	Geschlüpfte Blastozysten mit LacZ - Antikörperfärbung.....	63
3.8	Färbung von Embryonen 13,5 <i>dpc</i> mit X - Gal	64
4	DISKUSSION.....	64
4.1	Zusammenfassung	64

4.2	Folgerungen aus den Ergebnissen	66
4.3	Begründung des Verwerfens der ursprünglichen Hypothese	69
4.4	Lösungsmöglichkeit der Fragestellung	73
5	LITERATURVERZEICHNIS	75
6	DANKSAGUNG.....	83

ABBILDUNGS - UND TABELLENVERZEICHNIS

Abb. 1:	Konstruktion der <i>Stra8</i> - Cre/R26R - transgenen Maus
Abb. 2:	PCR - Analyse zur Genotypisierung des Gewebes der <i>Stra8</i> - Cre/R26R - Mäuse mithilfe ihrer Nachkommen
Abb. 3:	PCR - Analyse derselben Proben wie in Abbildung 2
Abb. 4:	Genotypisierung des Gewebes einer homozygoten männlichen <i>Stra8</i> - Cre/R26R - Maus
Abb. 5:	Genotypisierung des Gewebes einer heterozygoten weiblichen <i>Stra8</i> - Cre/R26R - Maus
Abb. 6:	Histologie des Gewebes einer <i>Stra8</i> - Cre/R26R - Maus nach X- Gal Färbung
Abb. 7:	Putative Promotorbereiche von <i>Stra8</i>
Abb. 8:	Basic Vektor
Abb. 9:	Enhancer Vektor
Abb. 10:	Promotor Vektor
Abb. 11:	Control Vektor
Abb. 12:	Testverdau pGL3 - Basic - Vektor
Abb. 13:	Testverdau pGL3 - Control - Vektor
Abb. 14:	Testverdau pGL3 - Enhancer nach Ligation
Abb. 15:	Testverdau der einzelnen Konstrukte in pGL3 - Enhancer
Abb. 16:	Luziferasemessung
Abb. 17:	Reverse Transkriptase PCR
Abb. 18:	HPRT - PCR
Abb. 19:	Immunhistologie in der Testesentwicklung der heterozygoten <i>Stra8</i> - Cre/R26R - Maus von Tag 0 bis Tag 20

- Abb. 20:** Immunhistologie in der Testesentwicklung der homozygoten *Stra8* - Cre/R26R - Maus von Tag 0 bis Tag 20
- Abb. 21:** Immunhistologie in der Testesentwicklung der *Stra8* - Cre/R26R - Maus nur mit 2. Antikörper (negativ Kontrolle)
- Abb. 22:** Immunhistologie des Gewebes der heterozygoten *Stra8* - Cre/R26R - Maus
- Abb. 23:** Immunhistologie des Gewebes der heterozygoten *Stra8* - Cre/R26R - Maus
- Abb. 24:** Immunhistologie des Gewebes der homozygoten *Stra8* - Cre/R26R - Maus
- Abb. 25:** Immunhistologie des Gewebes der homozygoten *Stra8* - Cre/R26R - Maus
- Abb. 26:** Immunhistologie des Gewebes der Rosa26 - LacZ - Maus als Positivkontrolle
- Abb. 27:** Immunhistologie des Gewebes der Rosa26 - LacZ - Maus als Positivkontrolle
- Abb. 28:** Immunhistologie des Gewebes des Gewebes der *Stra8* - Cre - Maus als Negativkontrolle
- Abb. 29:** Immunhistologie des Gewebes der *Stra8* - Cre - Maus als Negativkontrolle
- Abb. 30:** Immunhistologie des Gewebes der R26R - Maus als Negativkontrolle
- Abb. 31:** Immunhistologie des Gewebes der R26R - Maus als Negativkontrolle
- Abb. 32:** Immunhistologie des Gewebes der WT Maus als Negativkontrolle
- Abb. 33:** Immunhistologie des Gewebes der WT Maus als Negativkontrolle
- Abb. 34:** Blastozystenfärbung
- Abb. 35:** Geschlüpfte Blastozysten der *Stra8* - Cre/R26R - Maus

- Abb. 36:** X - Gal - Färbung von Embryonen 13,5 *dpc* der *Stra8* - Cre/R26R - Maus und einer WT - Maus als Negativkontrolle
- Abb. 37:** Struktur des *Stra8* - Proteins
- Tab. 1:** Auswahl keimzellspezifischer Gene, die in pluripotenten Zellen exprimiert werden

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

AK	Antikörper
AMP	Adenosinmonophosphat
ATP	Adenosintriphosphat
bp	Basenpaare
BSA	Rinderserumalbumin
°C	Grad Celsius
cDNA	komplementäre DNA
CTP	Cytidin-5'-triphosphat
d	Tag
DAPI	4',6'- Diamidino- 2-Phenylindolhydrochlorid
dATP	Desoxyadenosintriphosphat
dCTP	Desoxycytidintriphosphat
dest.	destilliert
dGTP	Desoxyguanosintriphosphat
DMEM	Dulbecco's Modifiziertes Eagle Medium
DMSO	Dimethylsulfoxid
DNA	Desoxyribonukleinsäure
DNase	Desoxyribonuklease
dNTPs	Desoxynukleotidtriphosphate
<i>dpc</i>	days post coitum
<i>dpp</i>	days post partum
dsDNA	doppelstrang DNA
DTT	Dithiothreitol
dTTP	Desoxytymidintriphosphat

E.Coli	Escherichia Coli
E-Cup	Eppendorf - Cup
EDTA	Ethylendiamintetraessigsäure
<i>EGC</i>	embryonic germ cells
<i>EGFP</i>	enhanced green fluorescent protein
EM	Elektronenmikroskop
ES-Zellen	embryonale Stammzellen
<i>ESC</i>	embryonic stem cell
et al.	et alii
EtOH	Ethanol
FKS	fötales Kälberserum
g	Gramm
x g	Erdbeschleunigung (9,81 m/s ²)
h	Stunde
HE	Hämatoxylin-Eosin
HPRT	Hypoxanthin-Phosphoribosyl-Transferase
Hrs	Herausgeber
<i>ICM</i>	inner cell mass
<i>IU</i>	international unit
kb	Kilobasenpaare
l	Liter
LB	Luria-Bertani
LIF	Leukämi inhibierender Faktor
Lsg.	Lösung
M	Molar (mol/l)
<i>maGSC</i>	multipotent adult germline stem cell
<i>MEF</i>	mouse embryonic fibroblast

min	Minute
MPI	Max - Planck - Institut
mRNA	messenger - Ribonukleinsäure
μ	mikro
n	nano
PBS	phosphatgepufferte Salzlösung
PCR	Polymerase-Kettenreaktion
PFA	Paraformaldehyd
<i>PGC</i>	primordial germ cell
pH	pH - Wert
PPi	Pyrophosphat
RNA	Ribonukleinsäure
RNase	Ribonuklease
Rpm	Rotationen pro Minute
RT	Raumtemperatur
RT-PCR	Reverse Transkriptase PCR
SDS	Natriumdodecylsulfat
SSC	spermatogonial stem cell
Std.	Stunde
SV 40	Simian - Virus 40
TBE	Tris-Borat-EDTA (-Puffer)
TE	Tris-EDTA (-Puffer)
Tris	Tris-hydroxymethyl-aminomethan
U	unit
UMG	Universitätsmedizin Göttingen
UV	ultraviolett
V	Volt

WT	Wildtyp
X - Gal	5-Brom-4-Cholr-3-indolyl- β -Galactopyranosid

Code der Nukleinsäuren

A	Adenosin
T	Thymin
G	Guanin
C	Cytosin
U	Uracil

1 EINLEITUNG

1.1 Stammzellen und Regeneration

Wir leben in einer ständig älter werdenden Gesellschaft. Folgen dieses erhöhten Lebensalters sind unter anderem eine Verschiebung der Erkrankungen hin zu degenerativen Veränderung im Körper. So ist zum Beispiel die ischämische Herzkrankheit die führende Todesursache in der Welt (Murray und Lopez 1997). Allein in Europa machen Herz-Kreislauserkrankungen 40% aller Todesfälle der unter 75-Jährigen aus (Sans et al. 1997). Trotz Verbesserung der Akutversorgung und der daraus resultierenden Minderung der Spätfolgen sind die ischämisch bedingten Schäden im Herzgewebe bisher nicht reparabel. Die Idee der regenerativen Medizin ist es nun, gezielt körpereigene Regenerationsprozesse anzusprechen und somit dem Körper mit eigenen Mitteln zur Heilung zu verhelfen und funktionsgestörte Zellen, Gewebe und Organe wieder zu reparieren. In der physiologischen Regeneration spielen Stammzellen eine wichtige Rolle. So sind beispielsweise hämatopoetische Stammzellen dafür verantwortlich, dass wir ein Leben lang unsere Blutzellen und Immunzellen erneuern können. Aber auch während der Embryonalzeit dienen Stammzellen als Ursprung aller weiteren Zelltypen, aus denen sich der neue Organismus aufbaut. Es ist daher eine innovative Idee, Stammzellen als körpereigene Ressourcen gezielt bei degenerativen Veränderungen im Körper zu nutzen und hierfür neue klinische Verfahren zu entwickeln.

1.2 Adulte residente Stammzellen

Unter all den verschiedenen Stammzelltypen sind die adulten Stammzellen für die körpereigene Regeneration am interessantesten. Obwohl diese im Gegensatz zu embryonalen Stammzellen (*ESCs embryonic stem cells*) nur noch in festgelegtes Gewebe ausdifferenzieren können, bilden sie eine unerschöpfliche körpereigene Quelle, die in den einzelnen Organen bereits vorliegt (z.B. hämatopoetische Stammzellen) und nicht wie bei *ESCs* erst generiert werden müssen. Da in Deutschland humane Embryonen unter das Embryonenschutzgesetz fallen, ist die Generierung und das Arbeiten mit pluripotenten Zellen streng gesetzlich geregelt. So ist die Gewinnung von humanen *ESCs* in Deutschland generell verboten. Es dürfen auch nur humane *ESCs* aus dem Ausland zu Forschungszwecken eingeführt werden, die vor dem 01.05.2007 generiert wurden. Ein weiteres Problem der *ESCs*

ist, dass sie sich gegenüber dem Empfänger der Zellen immunologisch unterscheiden. Dies kann bei Transplantationen zu erheblichen immunologischen Abwehrreaktionen führen, die bis hin zur Tumorbildung reichen können. Aufgrund dieser technischen und moralischen Aspekte eignen sich *ESCs* derzeit kaum bei regenerativen Einätzen. Adulte Stammzellen hingegen sind körpereigen, stimmen immunologisch mit dem Empfängerorganismus überein und führen bei autologen Transplantationen zu keinen immunologischen Fremdreaktionen. Die gewonnenen Zellen und die Empfänger sind immunologisch identisch. Hämatopoetische Stammzellen sind adulte Stammzellen, die bereits sehr ausführlich erforscht sind. Sie sind im Knochenmark angesiedelt, dienen als Ursprungszellen aller Blut - und Abwehrzellen und sorgen für die regelmäßige Erneuerung der hämatopoetischen Subpopulationen. Therapeutisch werden sie bereits bei Leukämien eingesetzt. Hierbei werden vor einer Strahlen - oder Chemotherapie dem Patienten gesunde Stammzellen entnommen und diese nach Therapie, wenn das blutbildende System stark minimiert ist, wieder zugefügt. Dieses Verfahren, das bereits vor 40 Jahren eingeführt wurde, machte eine Hochdosis Chemotherapie erst möglich.

In anderen Organen gibt es ebenfalls adulte Stammzellen. So wurden bereits Stammzellen in Haut, Leber, Gehirn und Bauchspeicheldrüse beschrieben (Gage 2000; Crosby und Strain 2001; Joannides et al. 2004; Kruse et al. 2006). Residente Stammzellen im Herzen sind ebenfalls bekannt (Beltrami et al. 2003). Jedoch werden diese Zellen bei pathologischen Zuständen, wie z.B. Myokardinfarkt, nicht ausreichend stimuliert und tragen daher kaum zur Regeneration nach Insult bei. Daher reicht ihr Potential für Reparaturmaßnahmen nicht aus. Grundlage der Überlegung dieser Arbeit ist, ob man auf andere Stammzellpopulationen des Körpers zurückgreifen kann. Dabei wären adulte Stammzellen, die wie *ESCs* Pluripotenz aufweisen, die ideale Lösung für einen therapeutischen Ansatz.

1.3 Wanderung von Zellen und Stammzellen

Zellwanderung spielt in der Embryonalentwicklung eine entscheidende Rolle. Nach der Verschmelzung der beiden Vorkerne bildet sich zunächst eine zweiblättrige Keimscheibe, bestehend aus Hypoblast und Epiblast. Zwischen Tag 6 und 7,5 der Embryonalentwicklung der Maus findet die Gastrulation statt. Dabei bildet die bis dahin zweiblättrige Keimscheibe eine zusätzliche räumliche Orientierung aus und der Epiblast differenziert sich in die drei Keimblätter: Ektoderm, Mesoderm und

Endoderm. Für die Trennung in die verschiedenen Keimblätter lösen sich Zellen aus dem epithelialen Zellverband des Epiblasten und wandern auf die Primitivrinne zu, stülpen sich nach innen und bilden zwischen Epiblast und Hypoblast eine neue Zellschicht, das Mesoderm. Am Ende der Primitivrinne befindet sich der Primitivknoten. Von dort lösen sich ebenfalls Zellen aus ihrem Verband, wandern nach kranial ab, drängen dabei den Hypoblasten nach lateral ab und bilden so das innerste Keimblatt, das Endoderm. Die verbleibende oberste (dorsale) Schicht bildet das Ektoderm. Bei der Gastrulation kommt es gleichzeitig zur irreversiblen Trennung von Keimbahnzellen und somatischen Zellen. Der Embryo hat nun eine räumliche Orientierung in alle drei Achsen und differenziert zwischen Keimbahnzellen, die die volle Erbinformation an die nächste Generation weitergeben, und zwischen somatischen Zellen, aus denen sich Zellverbände ausdifferenzieren. Im adulten Organismus tritt dieses Phänomen in abgeschwächter Form noch immer auf. So wandern zum Beispiel Immun- und Abwehrzellen an den Ort der Entzündung. Aber auch Keimbahnzellen können wandern. Derzeit ist es noch vorherrschende Lehrbuchmeinung, dass Oozyten embryologisch angelegt werden und als primäre Oozyten einen Mitosearrest in der Prophase der ersten Reifeteilung machen. Erst mit der Pubertät unter hormoneller Einwirkung reifen einzelne Oozyten heran und vollenden die erste Reifeteilung. Durch den Eisprung kommt es zur Einleitung der zweiten Reifeteilung, die mit der Befruchtung abgeschlossen wird. So sind alle Oozyten bereits embryonal angelegt und können nicht nachgebildet werden. (Green und Zuckerman 1951; Borum 1961; Peters 1970; McLaren 1984; Anderson und Hirshfield 1992) Diese Auffassung wird zur Zeit unter Fachleuten kontrovers diskutiert. Neuste Forschungsergebnisse deuten nämlich auch auf Stammzellen im Ovar hin (Johnson et al. 2004). So konnte diese Arbeitsgruppe um Johnson ein Jahr später zeigen, dass sich auch Oozyten regenerieren können. Sie konnten an einem Mausmodell Keimbahnzellen nachweisen, die aus dem Knochenmark einwandern und sich im Ovar niederlassen, um dort die Oozytenproduktion wieder aufzunehmen (Johnson et al. 2005). Auf diesen Aspekt soll später in der Diskussion noch einmal näher eingegangen werden.

1.4 Stra8

Stra8 (*stimulated by retinoic acid gene 8*) ist ein bekannter Keimbahnzellmarker, der ausschließlich in prämeiotischen Spermatogonien von adulten männlichen Mäusen und in prämeiotischen Follikeln von weiblichen Mäusen exprimiert wird. Unsere

Arbeitsgruppe konnte aus dem Hoden adulter Mäuse spermatogoniale Stammzellen (SSCs) gewinnen, die nach Kultur und Reprogrammierung *in vitro* ähnliche Eigenschaften wie ESCs aufweisen und als ‚*multipotent adult germ - line stem cells*‘ (*maGSC*) bezeichnet werden. Für die Isolierung der SSCs - enthaltenden Keimbahnpopulationen existieren in unserer Arbeitsgruppe bereits zwei transgene Mauslinien, *Stra8* - EGFP sowie *Stra8* - EGFP/Rosa26, die mit dem keimzellspezifischen Promotor (1,4kb) ausgestattet sind. Die daraus gewonnenen *maGSCs* können *in vitro* in alle drei Keimblätter differenzieren und in immundefizienten Mäusen Teratome bilden (Guan et al. 2006). Die daraus differenzierten Kardiomyozyten exprimieren myozytäre Marker, generieren Aktionspotentiale und setzen spontan Calcium aus dem noch unreifen sarkoplasmatischen Retikulum frei, was eine Eigenschaft unreifer Kardiomyozyten ist. Auch weisen die differenzierten Gefäßmuskelzellen SM - α - Aktin und SM - Myosin *heavy chain* auf und die Endothelzellen CD31, VEGF - Rezeptoren und Von - Willebrand - Faktor. Dies sind jeweils gewebsspezifische Marker (Streckfuss - Bomeke et al. 2009). Ungeklärt ist, ob *maGSCs* auch *in vivo* in Herzmuskelzellen und vaskuläre Zellen differenzieren können (Guan und Hasenfuss 2007; Cheng et al. 2012)

1.5 Fragestellung

Aus diesem Kontext heraus ergab sich nun die Fragestellung der vorliegenden Arbeit: Ist es möglich, dass Stammzellen aus dem Hoden auswandern, sich in geschädigtem Gewebe ansiedeln, ausdifferenzieren und in den Zellverband wieder integrieren können?

1.6 Mausmodell

Um die oben genannte Fragestellung zu bearbeiten, wurde eine doppelt transgene Mauslinie *Stra8/R26R* generiert, die durch die Kreuzung zweier transgener Linien erzeugt worden war, und zwar die *Stra8* - Cre - Linie und die R26R - Linie. Die beiden Linien werden im Folgenden näher beschrieben (siehe auch Abb.1). In der R26R - Linie (Soriano 1999) wird die Expression des eingebrachten beta - Galactosidase - Gens von dem ROSA26 - Promotor reguliert und im Normalfall durch die vorangeschaltete Stoppssequenz blockiert und nicht abgelesen. Diese Stoppssequenz wird von zwei loxP - Sequenzen eingeschlossen. Diese von loxP flankierte Stoppssequenz kann mit einer Cre - Rekombinase herausgeschnitten

werden, so dass es zu einer Expression von LacZ kommt. Die *Stra8* - Cre - Linie exprimiert eine solche Cre - Rekombinase unter der Kontrolle des 1,4 kb *Stra8* - Promotors. Werden nun die beiden transgenen Linien miteinander verpaart, so wird die Stoppssequenz überall dort herausgeschnitten, wo der *Stra8* - Promotor entweder gerade aktiv ist oder in Vorläuferzellen aktiv war, da die Excision nicht reversibel ist. Dieses kann dann durch den Nachweis der LacZ - Expression sichtbar gemacht werden. Als Positivkontrolle wurde eine ROSA26 - LacZ - Linie verwendet, die ein der R26R - Linie identisches LacZ - Insert hat, welches jedoch über kein LoxP - flankiertes Stoppkodon verfügt und daher LacZ ubiquitär exprimiert (Friedrich und Soriano 1991; Zambrowicz et al. 1997).

Abb. 1: Konstrukt der *Stra8* – Cre / R26R - transgenen Maus.

Das in die R26R - transgenen Mauslinien eingebrachte LacZ - Gen wird von dem ROSA26 - Promotor reguliert und durch die vorgeschaltene Stoppssequenz blockiert. Um diese Stoppssequenz sind zwei LoxP - Sequenzen lokalisiert, die durch eine Cre - Rekombinase herausgeschnitten werden können. Die *Stra8* - Cre - Maus hat eine solche Cre - Rekombinase, die unter der Kontrolle des 1,4 kb - Promotors von *Stra8* steht. Werden die Tiere nun verpaart, schneidet die Cre - Rekombinase, sobald der Promotor von *Stra8* aktiv ist, die LoxP - Sequenz der R26R - Maus heraus. In der Folge kommt es zu einer Expression von LacZ.

2 MATERIAL UND METHODEN

2.1 Chemikalien

1kb-DNA-Leiter	Invitrogen, Groningen, Niederlande
Agar	Roth, Karlsruhe
Agarose	Invitrogen, Groningen, Niederlande
Ampicillin	Roth, Karlsruhe
Ampuwa	Fresenius AG, Bad Homburg
BSA	Sigma, Deisenhofen
Collagenase	Sigma, Deisenhofen
DH5 α -kompetente Zellen	Invitrogen, Groningen, Niederlande
DMEM	PAN, Aidenbach
DMSO	Sigma, Deisenhofen
dNTPs	BioBudget, Krefeld
EDTA	Roth, Karlsruhe
Eosin	Sigma, Deisenhofen
Ethanol	T.J. Baker, Deventer, Niederlande
Ethidiumbromid	Eurobio, Frankreich
Eukitt	Fluka, Neu-Ulm
FKS	PAN, Aidenbach
Gelatine	Sigma, Deisendorf
Geneticin G418	Gibco/BRL, Eggenstein
Glutaraldehyd	Sigma, Deisenhofen
Hämatoxilin	Merck, Darmstadt
Hefeextrakt	Roth, Karlsruhe
IPTG	Applichem, Darmstadt
Isopropanol	Merck, Darmstadt

L-Glutamin	Gibco/BRL, Eggenstein
LIF	Chemicon, Temecula, USA
M2-Medium	Sigma, Deisenhofen
McCoy's 5A	Invitrogen, Groningen, Niederlande
Mitomycin C	Sigma, Deisenhofen
NaCl	Roth, Karlsruhe
Nicht-essentielle Aminosäuren	Gibco/BRL, Eggenstein
Paraformaldehyd	Sigma, Deisendorf
PBS	PAN, Aidenbach
Penicillin/Streptomycin	Gibco/BRL, Eggenstein
Platinum-Taq Polymerase	Invitrogen, Groningen, Niederlande
Proteinase K	Roth, Karlsruhe
Restriktionsenzyme	Invitrogen, Groningen, Niederlande
Reverse Transkriptase	Invitrogen, Groningen, Niederlande
RNAseA	Sigma, Deisendorf
Saccharose	Sigma, Deisendorf
SDS	Roth, Karlsruhe
SOC-Medium	Invitrogen, Groningen, Niederlande
Sodium-Pyruvat	Gibco/BRL, Eggenstein
β-Mercaptoethanol	Gibco/BRL, Eggenstein
TriReagent	MRC, Cincinnati, USA
Trypsin/EDTA	Invitrogen, Groningen, Niederlande
Tween20	Roth, Karlsruhe
Vector Shield with DAPI	Vector Laboratories, USA
X - Gal	Applichem, Darmstadt
Xylol	Roth, Karlsruhe

2.2 Gebrauchswaren

Blottingpapier GB 003	Schleicher & Schüll, Dassel
Elektroporationsküvette Gene Pulser	BioRad, München
Cuvette, 0,4 cm, gap 50	
Filterpapier 0850	Schleicher & Schüll, Dassel
Kühlzentrifugenbecher	Nalge, Rochester, USA
Nitrocellulose-Membran Hybond™-C	Amersham Pharmacia Biotech, Freiburg
Objekträger/Deckgläser	Schütt, Göttingen
Petrischalen	Greiner, Nürtingen
Pipettierspitzen	Eppendorf, Hamburg
Reaktionsgefäße	Eppendorf, Hamburg
Röntgenfilme Hyperfilm™ MP	Amersham Pharmacia Biotech, Freiburg
Sterilfilter	Sartorius, Göttingen

2.2.1 Gebrauchswaren für die Zellkultur

Auslaufpipetten	Sarstedt, Sarstedt
Kryocups	Greiner, Nürtingen
Kulturflaschen	Sarstedt oder Nunc
Kulturschalen (10+5 cm)	Nunc, Wiesbaden
6-Loch-Platten	Nunc, Wiesbaden
24-Loch-Platten	Nunc, Wiesbaden
96-Loch-Platten	Nunc, Wiesbaden
14ml Zentrifugenröhrchen	Corning, NY, USA
Pasteurpipetten	Brand, Wiesbaden
Zellschaber	Greiner, Nürtingen

2.3 Geräte

Accu-Jet	Brand, Wertheim
----------	-----------------

Automated DNA-Sequencer ABI 377	Applied Biosystems, Foster City, USA
Brutschrank IR Autoflow	Nuaire Nice, Plymouth, GB
CO ₂ Water-Jacketed-Incubator	
Cryothom	Leica, Wetzlar
Fotomikroskop BX60	Olympus, Planegg
Konvokalmikroskop LSM 510	Olympus, Planegg
Lichtmikroskop	Zeiss, Göttingen
Luminometer	BioTek, Bad Friedrichshall
Photometer	Eppendorf, Hamburg
Primus Cycler	MWG-Biotech, Ebersberg
PTC-100™ Peltier Thermal Cycler	MJ Research, BioRad
Sterilbank HERAsafe	Heraeus, Hamburg
Thermomixer 5436	Eppendorf, Hamburg
Turboblotter™	Schleicher & Schüll, Dassel
Zentrifuge Biofuge 13	Heraeus, Osterode
Zentrifuge Hettich Universal	Hettich, Tuttlingen
Zentrifuge Megafuge 1.OR	Heraeus, Osterode
Zentrifuge J2-21	Beckmann, München
Zentrifuge5415 D	Eppendorf, Hamburg

2.4 Sterilisation

Die Sterilisation von Lösungen erfolgte für 20 min. bei 121°C und 10⁵ Pa im Dampfdruckautoklaven (Webco, Bad Schwartau). Bei hitzeempfindlichen Lösungen erfolgte die Sterilisation durch Sterilfiltration (Sterilfilter, 0.2-0.45 µm Porengröße). Gebrauchswaren wurden entweder autoklaviert oder für 8 - 12 h bei 180°C hitzesterilisiert.

2.5 Puffer und Lösungen

Die Lösungen für den alltäglichen Laborbetrieb wurden nach Sambrook et al. (1989) angesetzt. Die Chemikalien wurden je nach Bedarf in deionisiertem (dH_2O), in vollentsalztem Wasser (Millipore), in bidestilliertem Wasser (ddH_2O) oder Ampuwa gelöst. Den Erfordernissen entsprechend wurden die Lösungen dampfdrucksterilisiert, sterilfiltriert, frisch angesetzt, aliquotiert und bei -20°C oder bei 4°C aufbewahrt.

Die Puffer für Enzyme und für gebrauchsfertige Kits wurden, wie vom Hersteller geliefert, nach Beipackzettel benutzt. Ebenso ist ihre Zusammensetzung aus dem entsprechenden Beipackzettel ersichtlich und daher hier nicht weiter aufgeführt.

dNTP-Lösung (25 mM)

100 mM dATP

100 mM dCTP

100 mM dGTP

100 mM dTTP

Fix A1

1,35 ml Formaldehyd

0,4 ml Glutaraldehyd

0,1 ml 10% Nonidet P40

5 ml 10xPBS

Fix A2

1 % Formaldehyd

02 % Glutaraldehyd

0,02 % NP-40

In PBS

Fix B1

1,35 ml Fomaldehyd
0,4 ml Glutaraldehyd
1 ml 10 % Nonidet P40
5 ml 10xPBS
5 ml 1 % NaDOC

Fix B2

1 % Formaldehyd
0,2 % Glutaraldehyd
0,2 % NP-40
0,1 % Sodium deoxycholate
in PBS

Färbelösung 1

2,5 ml x - Gal (20mg/ml)
0,023 g in 1 ml 250 mM
 $\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$
0,1056 g in 1 ml 250 mM
 $\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6$
1 ml 100 mM MgCl_2

Färbelösung 2

100 ml Phosphatpuffer (72 ml
A+28 ml B)
102 mg $\text{C}_6\text{N}_6\text{FeK}_3$
Kaliumhexcyanoferrat III
130 mg $\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$
gelbes Blutlaugensalz
100 μl 1 M MgCl_2
0,01 % Sodium Deoxycholate

	0,02 % Igepal Ca 630
Färbelösung 3	1 mg/ml X-gl 5 mM Potassium Ferricyanide 5 mM Potassium Ferrocyanide 2 mM MgCl_2 in PBS
Lysis Puffer	0.2 M NaOH 1 % (w/v) SDS
M/15 Phosphatpuffer	A: 9,465 g Na_2HPO_4 ad 1l H_2O B: 9,07 g KH_2PO_4 ad 1l H_2O 90 ml A + 10 ml B = M/15 Phosphatpuffer
PBS-Puffer (10x)	130 mM NaCl 7 mM Na_2HPO_4 3 mM NaH_2PO_4 pH 7.5
Stop-Mix	15 % Ficoll 400 200 mM EDTA, pH 7.4 0.1% Orange G

TBE (5x)

0.45 M Tris-HCl

0.45 M Borsäure

10 mM EDTA; pH 8.5

2.6 Gebrauchsfertige Kits

DirektPCR® Lysis Reagent (Tail)

PeqLab, Erlangen

Dual-Luciferase® Reporter Assay System

Promega, Wisconsin,
USA

DYEnamic ET-Terminator Mix

CLONTECH
Laboratories, Palo Alto,
USA

IMMOLASE™ DNA Polymerase

Bioline, Luckenwalde

LacZ Tissue Staining Kit

InvivoGen, San Diego,
USA

Montage™ PCR Centrifugal Filter Device-System

Millipore Corporation,
Bedford, USA

pGEM®T-Easy Vector System I

Promega, Wisconsin,
USA

PLATINUM®Taq DNA Polymerase-System

Gibco, BRL, Eggenstein

PureLink™ HiPure Plasmid DNA Purification Kits

Invitrogen, Groningen,
Niederlande

QIAEX II®Gel Extraktion Kit

Qiagen, Hilden

QIAquick®Gel Extraktion Kit

Qiagen, Hilden

Kryomedium

Leica Microsystems,
Nussloch**2.7 Vektoren**

pGEM-T easy

Promega, Wisconsin,
USA

pGL3- Basic

Promega, Wisconsin,
USA

pGL3-Control	Promega, USA	Wisconsin,
pGL3-Enhancer	Promega, USA	Wisconsin,
pGL3-Promoter	Promega, USA	Wisconsin,
pRL-SV40	A.Craig, Freiburg	

2.8 Bakterien

<i>Escherichia coli</i> DH5 α (Hanahan 1983)	Invitrogen, Niederlande	Groningen,
---	-------------------------	------------

2.8.1 Medien für die Bakterienkultur

LB (Luria-Bertani)-Medium (pH 7,5)	1% (w/v) Trypton
	0,5% (w/v) Hefeextrakt
	1% (w/v) NaCl

Zusätze zur Selektion	Ampicillin (0,1 mg/ml)
-----------------------	------------------------

Zusätze zur Oja-Platte	100 μ M IPTG
	0.4 % X - Gal

Agarplatten enthielten 1,5% (w/v) Agar

Die Medien wurden mit einfach destilliertem Wasser angesetzt und autoklaviert.

Stammlösung:	100 mg/ml Ampicillin in H ₂ O
	0.2 g/ml IPTG in H ₂ O
	8% X -Gal in Dimethylformamid

Die Lösung wurde sterilfiltriert und gebrauchsfertig bei -20°C gelagert. Antibiotika, IPTG und X - Gal wurden nach dem Autoklavieren den abgekühlten Medien (ca. 50°C) hinzugefügt. Platten und Flüssigmedium wurden bei 4°C gelagert.

2.9 Mäusestämme

Die Mäuse stammen aus institutseigenen Beständen, dem Max - Planck - Institut für Experimentelle Medizin Göttingen oder wurden von der Firma Charles River in Sulzfeld bezogen. Die Tiere wurden bei einem zwölfstündigen Hell-Dunkel-Rhythmus bei 22°C und 55% relativer Luftfeuchtigkeit gehalten. Gefüttert wurde mit dem Tierfutter der Firma ssniff-Spezialdiäten (Soest).

2.10 Eukaryotische Zelllinien

Zelllinie	Isoliert aus	Referenz
ES-R1	embryonalen Stammzellen	(Nagy et al. 1993)
MEF	embryonalen Fibroblasten	(Adham et al. 1997)

2.10.1 Medien für die Zellkultur

Medien und Zusätze zur Anzucht eukaryotischer Zellen wurde als sterile Lösung zugekauft (Pan, Aidenbach; Gibco BRL, Eggenstein)

ES-Kulturmedium	DMEM
	0,1 mM nicht essentielle Aminosäuren
	1 mM Natrium-Pyruvat
	1 µM β-Mercaptoethanol
	2 mM L-Glutamin
	1 mM Penicillin/Streptomycin
	20 % FKS

(1 000 U/ml LIF)

MEF-Kulturmedium

DMEM

2 mM L-Glutamin

1 mM Penicillin/Streptomycin

10 % FKS

Zur Lagerung der Zellen in flüssigem Stickstoff wurden folgende Einfriermedien verwendet:

ES-Zellen

30 % ES-Kulturmedium

50 % FKS

20 % DMSO

***MEF*-Zellen**

30 % *MEF*-Kulturmedium

50 % FKS

20 % DMSO

2.11 Antibiotika

Zur Selektion von immunkompetenten Zellen wurde Ampicillin als Antibiotikum verwendet, angesetzt in einer 50 mg/ml Stammlösung in bidest. Wasser in einer Endkonzentration 50 µg/ml. Diese wurde anschließend steril filtriert und bei -20°C aufbewahrt. Je nach Bedarf wurde die Lösung dem LB-Medium bzw. dem LB-Agar erst nach Autoklavierung und nach dem Abkühlen auf ca. 55°C zugesetzt.

2.12 Antikörper

Für die Immunhistochemie wurde als erster Antikörper anti-β-Galactosidase (Kaninchen) der Firma Abcam verwendet. Dieser wird durch den zweiten Antikörper anti-Kaninchen IgG Cy3 der Firma Sigma detektiert und konnte über Fluoreszenz sichtbar gemacht werden.

2.13 Oligonukleotide

Alle eingesetzten Primer wurden von der Firma MWG/Operon bezogen. Mit Ampuwa wurde eine Konzentration von 100µM (100 pmol/µl) eingestellt und als Stock bei -20°C gelagert. Die Primer wurden mit einer Konzentration von 10 pmol/µl eingesetzt.

- Le F 5' AAAGTCGCTCTGAGTTGTTAT 3'
- R 523 5' GGAGCGGGAGAAATGGATATG 3'
- Wong 2 5' GCGAAGAGTTTGTCTCAACC 3'
- *Stra8*-F 5' GCGCTCCTAGTGTGCCAGTTTGAT 3'
- Cre-R 5' AGTGAAACAGCATTGCTGTCA 3'
- TPF 5' AACCAGTGCAATCAGTGCACC 3'
- TPR 5' ATGGACACAGGAACTCCTGG 3'
- gK1 5' TCTGAGCCCAGAAAGCGAAGG 3'
- Luziferase R1.1 5' CGACTCTAGAATTACACGGCG 3'
- Luziferase-F1 5' GTAAAGCCACCATGGAAGACGCC 3'
- Luziferase-F2 5' GAGGAGCCTTCAGGATTACAAG 3'
- Luziferase-R2 5' GAATTACACGGCGATCTTTCC 3'
- *Stra8*pr350XhoI 5' GACTCGAGCCACAATCTACCAAACCATTTGA 3'
- *Stra8*pr350HindIII 5' CTAAGCTTCCACATCAGTTTGGCACACTACG 3'
- *Stra8*pr289XhoI 5' GACTCGAGCACCTTACTCATCCACCACC 3'
- *Stra8*pr289HindIII 5' CTAAGCTTCAAAAACAAACCAACAACCCAAAA 3'
- *Stra8*pr1,4XhoI 5' GACTCGAGGATGCAGGCCCGGGACCACC 3'
- *Stra8*pr1,4HindIII 5' CTAAGCTTGTCAGTCACTCACGGACTGCCC 3'
- 273-F1-XhoI 5' GACTCGAGGGAACCCCTTCTCTTTGTCC 3'
- 1,4-F2-XhoI 5' GACTCGAGCAAGGACAAGGCTCTCCAAG 3'
- 922-F2-BglII 5' GAAGATCTCAGCATTTGTGGGTCAGTTG 3'
- 273-R1-HindIII 5' CTAAGCTTCGAGGCATCAGTGTTAGCAA 3'
- 1,4-R1-HindIII 5' CTAAGCTTTCTGGGAGTTACGGCGATAC 3'
- 922-R1-HindIII 5' CTAAGCTTTGCTCTAGGAATCCCTGCTC 3'
- HPRT1 5' CGTCGTGATTAGCGATGATG 3'
- HPRT2 5' TATGTCCCCCGTTGACTGAT 3'
- LacZ RT-1 5' CTAATCCGAGCCAGTTTACC 3'

- LacZ RT-2 5'GGCAGATACACTTGCTGATGC 3'

2.14 Molekulargewichtstandard

DNA Längenstandard (1µg/µl): 1kb-Leiter (0.12-12.2kb)

Der DNA –Längenstandard wurde nach Herstellerangaben verdünnt und mit Stop-Mix versehen.

2.15 Datenbanken

Nukleotidsequenzen wurden mit Hilfe der Sequenzdatenbank GenBank (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov>) und mit dem BLAST-Programm (Altschul et al. 1990) analysiert.

2.16 Zellbiologische Methoden

Für die Zellkultur wurden ausschließlich adhärent wachsende Zellen in beschichteten Gewebekulturschalen im entsprechenden Medium bei 37°C verwendet. Zur Einstellung eines günstigen pH-Wertes (alle Medien enthielten NaHCO₃) wurden die Zellen unter einer Begasung mit 5% CO₂ kultiviert. Bevor sie eine 100% Konfluenz erreichten, wurden die Zellen passagiert.

2.16.1 Kultivierung von murinen embryonalen Stammzellen (ES-Zellen)

Um die ES-Zellen in undifferenziertem Zustand zu halten, ist es wichtig, dass die Zellen auf Mitose-inhibierten Maus-Fibroblasten (Feederzellen) ausplattiert werden. Zusätzlich wird das ES-Medium mit dem Cytokin LIF (Leukemia Inhibitory Factor) versetzt (Smith et al. 1988).

2.16.2 Gewinnung und Kultivierung von murinen embryonalen Fibroblasten

Für die Routinekultur sind Feederzellen unentbehrlich. Diese bestehen aus mitotisch inaktivierten Fibroblasten und werden in einer gleichmäßig verteilten Zellschicht plattiert, auf die die ES-Zellen ausgesät werden. Geeignete Feederzellen für die ES-Zellen sind STO-Fibroblasten (Ware und Axelrad 1972) und embryonale Fibroblasten (MEF). Diese werden hergestellt, indem man aus einer schwangeren Maus 13,5-15,5 Tage alte Embryonen isoliert. Die Bauchorgane der Embryonen werden entfernt, die Köpfe abgetrennt und der restliche Rumpf wird zerkleinert. Die daraus resultierende

Suspension wird mit 20 ml Trypsin/EDTA und 1 ml DNase versetzt und unter Rühren 30 min. bei 37 °C inkubiert. Anschließend wird die Zellsuspension bei 270 x g für 10 min. abzentrifugiert und der Überstand verworfen. Das Pellet wird in *MEF*-Kulturmedium erneut gelöst und in ein geeignetes Kulturgefäß transferiert. Nach etwa 24h werden nicht adhärente Zellen durch einen Wechsel des Kulturmediums ausgespült. Nach ca. 3 Tagen werden die *MEFs* im Verhältnis 1:3 geteilt und nach weiteren 3-5 Tagen in Passage 1 kryokonserviert. Durch die Behandlung mit dem Spindelgift Mitomycin C erfolgt die mitotische Inaktivierung der Zellen (Martin und Evans 1975), somit sind die Zellen nicht mehr teilungsfähig.

2.16.3 Auftauen und Einfrieren von eukaryotischen Zellen

Für die Kryokonservierung wurde eine bewachsene Platte mit PBS gewaschen und trypsinisiert. Durch das im Kulturmedium enthaltene FKS wurde das Trypsin inaktiviert und die Zellen bei 270 x g für 5 min. zentrifugiert. Der Überstand wurde abgenommen und das Pellet zuerst in 500 µl Kulturmedium resuspendiert und dann mit 500 µl des jeweiligen Gefriermediums gut gemischt. Die zuvor beschrifteten Gefrier Röhrchen wurden sofort auf Eis gestellt. Das Einfrieren von Zellen sollte möglichst langsam verlaufen. Daher wurden die Gefrier Röhrchen in einer vorgekühlten Styroporbox bei -80°C (nicht schneller als 1°C/min.) über Nacht eingefroren. Nun konnten die Röhrchen bis zu weiteren Verwendung in flüssigem Stickstoff gelagert werden.

Im Gegensatz dazu hat das Auftauen von gefrorenen Zellen rasch zu erfolgen. Die Zellen wurden im 37°C warmen Wasserbad aufgetaut und schnellstmöglich in einer großen Menge des jeweiligen Kulturmediums aufgenommen, um das DMSO entsprechend zu verdünnen. Nach Zentrifugation konnte der Überstand abgenommen und das Zellpellet zum Ausplattieren in Kulturmedium aufgenommen werden.

2.16.4 Passagieren von eukaryotischen Zellen

Abhängig von der Zelllinie und der Zelldichte sind die Zellen bereits nach zwei- bis viertägiger Inkubation konfluent und können bereits nach zwei bis viertägiger Inkubation auf mehrere Kulturgefäße aufgeteilt werden. Hierfür wurden die Zellen mit PBS gewaschen und abhängig von der Kulturgefäßgröße wurden 1-5 ml Trypsin/EDTA zugegeben. Nach 5 min. Inkubation bei 37°C konnte das Ablösen der

Zellen unter dem Lichtmikroskop beurteilt werden. Hatten sich die Zellen vollständig gelöst, wurde dieselbe Menge Kulturmedium zugegeben und resuspendiert. Dabei wird das Trypsin durch das im Kulturmedium enthaltene FKS inhibiert, so dass dieses keinen negativen Einfluss haben kann. Die Zellen wurden für 5 min. bei 270 x g zentrifugiert, der Überstand abgenommen, das Pellet in entsprechender Menge Kulturmedium aufgenommen und wiederum in Kulturgefäßen ausplattiert. Beim nächsten Mediumwechsel (ca. 24 h später) wurden die bis dahin nicht adhärenen Zellen ausgewaschen.

2.16.5 MitomycinC-Behandlung von embryonalen Fibroblasten

Das Antibiotikum Mitomycin C wurde in *MEF*-Medium mit einer Endkonzentration von 10 µg/ml aus einer 50x Stock - Lösung gelöst und auf die Fibroblasten gegeben. Nach einer Einwirkzeit von 2 h bei 37°C wurden die Fibroblasten zweimal mit PBS gewaschen und trypsinisiert. Mitomycin - behandelte Fibroblasten können nicht mehr anwachsen, daher werden sie nun auf Gelatine - beschichteten Platten ausplattiert, wodurch sie durch die Gelatine am Boden des Kulturgefäßes fixiert werden. Die Kulturgefäße wurden mit 0,1%iger steriler Gelatinelösung beschichtet und bei 37°C für mindestens 2 h inkubiert.

2.16.6 Transfektion mit Lipofectamin

Lipofectamin™ 2000 ist ein kationisches Lipid, das eine liposomenvermittelte Transfektion von eukaryontischen Zellen ermöglicht. Zur Transfektion auf 24 - Well - Platten wurden pro Well 0,4 µg der aufgereinigten Konstrukt - DNA, 0,4 µg Renilla Firefly und 50 µl OptiMEM gemischt und 10 min. bei RT inkubiert. Gleichzeitig wurden 2 µl Lipofectamin™2000 und 50 µl OptiMEM gemischt und ebenfalls 10 min. bei RT inkubiert. Anschließend wurden beide Ansätze zusammengegeben und 30 min. bei RT inkubiert und mit 400 µl OptiMEM versehen. Das Gemisch wurde auf die zuvor mit PBS gewaschenen Zellen aufgetragen und 3 h bei 37°C und 5 % CO₂ inkubiert. Anschließend wurden pro Well 400 µl OptiMEM mit 20 % FKS zugegeben und dann weiter 3 h bei 37°C und 5 % CO₂ inkubiert. Nun war die Transfektion erfolgt und die Zellen konnten nach zweimaligem Waschen in PBS in normales Kulturmedium aufgenommen werden.

2.17 Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren

Standardprotokolle für molekularbiologische Methoden wurden nach Sambrook et al. 1989 ausgeführt.

2.17.1 Isolierung von RNA aus Geweben

Die für die RNA Isolierung verwendeten Glaswaren wurden bei ca. 200 °C für mehrere Stunden sterilisiert, um sie vollständig von RNasen zu befreien. Des Weiteren wurde stets mit Handschuhen gearbeitet und alle folgenden Arbeitsschritte auf Eis durchgeführt. Zu 100 mg frischem Gewebe wurde 1 ml Lysispuffer (TriReagent von Sigma) gegeben, homogenisiert und 5 min. bei RT inkubiert. Nach Zugabe von 200 µl Chloroform wurde der Ansatz gut durchmischt, 15 min. bei RT inkubiert und anschließend 15 min. bei 15.000 x g nochmals bei 4 °C zentrifugiert. Die obere Phase, die die RNA enthält, wurde abgenommen, in ein neues Reaktionsgefäß überführt und mit 0,7 Volumen Isopropanol 10 min. bei RT gefällt. Anschließend wurde die Suspension 10 min. lang bei 4 °C und 15.000 x g zentrifugiert und mit 70 % EtOH gewaschen. Das so entstandene Pellet wurde bei RT getrocknet, in H₂O aufgenommen und 10 min. bei 55 °C inkubiert.

2.17.2 Herstellung von komplementärer DNA durch Reverse Transkription

Zur Untersuchung der Genexpression wurde die Reverse-Transkriptase PCR (RT-PCR) eingesetzt. Diese Methode benötigt eine DNA-Matrize als Substrat, damit die isolierte RNA zunächst mittels Reverser Transkription in komplementäre DNA (cDNA) umgeschrieben werden kann. Die dafür benötigte Ansatzstelle für die SuperScript-II-Reverse Transkriptase wird durch den Oligo-dT-Primer und die PolyA-Sequenz der mRNA gebildet. Für diesen Schritt wurden 5 µg RNA, 1 µl dNTP-Mix und 1 µl Oligo-dT-Primer mit sterilem H₂O auf 13 µl aufgefüllt und 5 min. bei 65 °C denaturiert. Anschließend wurden 4 µl 5x First-Strand-Puffer und 2 µl 0,1 M DTT hinzugefügt, für 2 min. bei 42 °C inkubiert und mit 1 µl SuperScript-II-Reverse-Transkriptase versehen. Auf diese Weise wurde die cDNA-Synthese gestartet und nach 50 min. durch eine 15 - minütige Inkubation bei 70°C gestoppt.

2.17.3 Isolierung von genomischer DNA aus Mäuseschwänzen und Gewebe (Laird et al. 1991)

Zur Genotypisierung von Mäusen wurden 1-2 cm lange Schwanzspitzen von 5 Wochen alten Mäusen mit 150 µl DirektPCR® Lysis Reagent (Tail) versetzt und 5 µl Proteinase K (10 mg/ml) zugegeben. Dieser Ansatz wurde über Nacht bei 55 °C im Thermomixer inkubiert und am nächsten Morgen für weitere 50 min. bei 95 °C auf dem Thermomixer belassen und anschließend bei 4 °C gelagert.

Für die Isolation von DNA aus Gewebe wurden 700 µl Lysispuffer mit 35 µl Proteinase K versetzt und über Nacht bei 55 °C auf dem Thermomixer inkubiert. Am nächsten Morgen wurde zur Präzipitierung die Zellsuspension zentrifugiert, der Überstand in ein neues E-Cup pipettiert und mit 500 µl Isopropanol gefällt. Um die DNA aufzureinigen, wurde sie mit 70 % Ethanol gewaschen und in 100 µl Ampuwa gelöst. Bis zur weiteren Analyse konnte sie nun bei 4 °C gelagert werden.

2.17.4 Minipräparation von Plasmid-DNA aus Bakterien

Die Isolierung von Plasmid-DNA im analytischen Maßstab wurde mit den Lösungen E1, E2 und E3 der Firma Quiagen mittels einer modifizierten Methode der alkalischen Lyse (Birnboim und Doly 1979) aus 5 ml LB-Übernachtskulturen mit Ampicillin durchgeführt. Die Qualität der isolierten DNA reicht für PCR-Analysen, Restriktionen und Sequenzierungen aus. Glycerinkulturen wurden aus den Übernachtskulturen für die Plasmid-Minipräparation durch Zugabe von 300 µl sterilem Glycerin zu 700 µl der Bakteriensuspension gewonnen. So konnte die Suspension nach guter Durchmischung als Stock bei -80 °C gelagert werden.

2.17.5 Midipräparation

Für die Transfektion von DNA in eukaryontische Zellen wurde das Plasmid mit dem PureLink™ HiPure Plasmid DNA Purification Kit präpariert. Dazu wurden 25 ml einer LB-Übernachtskultur mit entsprechendem Antibiotikum abzentrifugiert und mittels Lysis Puffer aufgeschlossen. Zelltrümmer, Proteine und Salzkomplexe wurde durch Filtration abgetrennt, das Lysat über eine äquilibrierte Säule gegeben, die gebundene DNA gewaschen und in einem Falcon eluiert. Nach der Präzipitation mit

10,5 ml Isopropanol wurde das Pellet mit 70 % EtOH gewaschen, luftgetrocknet und in 200 µl TE Buffer aufgenommen.

2.17.6 Isolierung von DNA- Fragmenten aus Agarosegelen

Diese Methode wurde benutzt, um DNA-Fragmente für die Sequenzierungen und die Klonierungsexperimente zu isolieren. Hierbei kamen das QIAEXII® Gel Extraktion Kit und das QIAquick® Gel Extraktion Kit zum Einsatz. Die gewünschte DNA - Bande wurde nach gelelektrophoretischer Auftrennung auf einem Transilluminator unter UV-Licht (354 nm) mit einem sterilen Skalpell herausgeschnitten, in ein steriles E-Cup überführt, gewogen und mit der jeweiligen Menge des entsprechenden Puffers versetzt. Die weitere Isolierung erfolgte nach dem jeweiligen Protokoll des Herstellers. Die DNA wurde in 20-50 µl Ampuwa aufgenommen, und zur Konzentrationsbestimmung wurde ein Aliquot auf ein Agarosegel aufgetragen.

2.18 Konzentrationsbestimmungen von Nukleinsäuren

Die Ausbeute isolierter DNA aus Geweben wurde im Vergleich mit Proben von bereits bekannten Konzentrationen auf dem Agarosegel abgeschätzt. Nach Plasmidpräparationen wurde die Konzentration mit einem Photometer (Eppendorf) bestimmt. Unter Annahme einer OD_{260} von 1 einer dsDNA Lösung von 50 ng/µl können die Konzentrationen nach Abzug des Hintergrundes des Lösungsmittels (H_2O) berechnet werden. Die Protein- bzw. Salzkonzentrationen werden dabei im Quotienten $OD_{260/280}$ und $OD_{260/230}$ widergespiegelt und sollten >1,8 bzw. 2,0 sein.

Bei dem verwendeten Photometer kann man bereits vor der Messung sowohl die Art der Nukleinsäure als auch den Verdünnungsfaktor angeben und erhält dann unmittelbar die endgültigen Konzentrationen in µg/µl, so dass keine weitere Berechnung notwendig ist.

2.19 Enzymatische Modifikation von DNA

2.19.1 Restriktionsspaltung von Plasmid-DNA

Plasmid - DNA wurde durch Restriktionsenzyme verschiedener Hersteller gespalten. Gewöhnlich wurden 10U Enzym pro 1 µg DNA über 1-2 h bei dem jeweiligen Temperaturoptimum des benutzten Enzyms eingesetzt. Zur Insert-Isolierung wurden dementsprechend 10 µg Plasmid-DNA mit 100 U Enzym (10U/µl) in Reaktionsansätzen von 100-200 µl verwendet. Für die gleichzeitige

restriktionsenzymatische Spaltung mit zwei unterschiedlichen Enzymen wurde ein mit beiden Enzymen kompatibler Puffer eingesetzt. Wenn dies nicht möglich war, wurde die DNA zwischen den beiden Reaktionen präzipitiert, um einen Pufferwechsel zu ermöglichen. Um unspezifische Reaktionen zu vermeiden, wurde dem Reaktionsansatz bei Bedarf 1 µg BSA (10 mg/ml) zugegeben. Anschließend wurde ein Aliquot auf ein Agarosegel aufgetragen, um den Verdau auf Vollständigkeit zu überprüfen.

2.20 Polymerasekettenreaktion

2.20.1 PCR an genomischer DNA

Die Polymerasekettenreaktion (PCR) wird benutzt, um DNA-Fragmente zu amplifizieren. Dabei handelt es sich um eine enzymatische *in vitro* - Methode (Saiki et al. 1988). Die Spezifität dieser Amplifikation beruht auf zwei Oligonukleotidprimern, die das gewünschte DNA-Fragment flankieren und nach einer Hitzedenaturierung an den jeweiligen Strang binden. Nun synthetisiert die hitzestabile DNA-Polymerase (Taq-Polymerase oder Immolase) des Archebakteriums *Thermus aquaticus* (Chien et al. 1976) bei ihrer optimalen Temperatur (72 °C) die DNA entlang der Region zwischen den Primern. So entsteht eine sich wiederholende Abfolge von Denaturierungen der DNA-Stränge, Anlagerung der Primer (Annealing) und DNA - Synthese (Elongation), bei der eine exponentielle Vermehrung des jeweiligen DNA - Fragments stattfindet. Die meist verwendete Immolase Taq und Platinum Taq DNA - Polymerase verfügen über einen hitzestabilen Inhibitor, der während der Denaturierung inaktiviert wird und damit die Durchführung einer *hot start* - PCR möglich macht, wodurch die Entstehung unspezifischer Amplifikate während der ersten Zyklen vermieden wird.

Für die PCR wurde ein Ansatz aus 24 µl Reagenzien der Firma Invitrogen Platinum® Taq DNA Polymerase oder der Firma bioline IMMOLASE DNA Polymerase verwendet und 1 µl DNA nach folgendem Schema pipettiert :

1 µl Primer 1

1 µl Primer 2

0,5 µl Taq

1,5 µl MgCl

0,5 µl dNTP's

2,5 µl Puffer

18 µl H₂O

Die Ansätze wurden in einem PCR Thermocycler der Firma Applied Biosystems mit folgendem Programm inkubiert:

5 min.	94 °C	Vordenaturierung	
20 sec.	94 °C	Denaturierung	} 30-35 Zyklen
30 sec.	55-68 °C	Annealing	
1-2 min.	72 °C	Elongation	
5min.	72 °C	Auffüllreaktion	

Die Annealing - Temperatur war primerspezifisch und wurde für das jeweilige Primerpaar angepasst. Für die Spezifität des Produkts wurde die Fragmentlänge des Produkts in der horizontalen Agarosegelelektrophorese ermittelt. Dabei werden 12,5 µl des fertigen Ansatzes plus 2,5 µl Stop-Mix aufgetragen.

2.20.2 RT-PCR

Um kleinste Transkriptmengen von bestimmten Genen in Zellen und Organen nachzuweisen, benutzt man die RT-PCR (Reverse Transkriptions-PCR). Hierbei wird isolierte RNA mit Hilfe von SUPERSRIPT II RNaseH, dem Reverse Transkriptase-System von Invitrogen in cDNA umgeschrieben (Erststrangynthese der komplementären DNA). Danach wird, wie unter 2.20.1 dargestellt, weiter verfahren.

2.20.3 Sequenz - PCR

Die Sequenz-PCR wurde nach dem Kettenabbruchverfahren von Sanger et al. (1977) in einer modifizierten Form durchgeführt. Die Methode beruht auf dem Prinzip der statistisch unterbrochenen DNA-Neusynthese durch den Einbau von Didesoxynukleotiden (ddNTP). Dabei wurde mit dem DYEnamic ET-Terminator-Mix der Firma Amersham Pharmacia gearbeitet. Dieser Mix enthält dNTP's, mit vier unterschiedlichen Fluroeszenzfarbstoffen markierte ddNTPs, DNA-Taq Polymerase sowie Reaktionspuffer. Bei der gelelektrophoretischen Auswertung werden Fluroeszenzfarbstoffe über Laserabtastung automatisch detektiert und können hierüber analysiert werden.

Zuerst wird eine PCR zur Amplifikation des zu sequenzierenden Fragments durchgeführt, anschließend das PCR Produkt mit einem gebrauchsfertigen MonatgePCR Centrifugal Filter Device-System der Firma Milipore Corporation aufgereinigt und ein Aliquot auf ein Testgel aufgetragen. Damit soll die einzusetzende Menge des ursprünglichen PCR Produkts für die anschließende Sequenz-PCR abgeschätzt werden.

Folgender Ansatz wurde in einem dünnwandigen 0,2 ml PCR-Reaktionsgefäß zusammenpipettiert:

0,5-1 µl PCR-Produkt (1-1,5 µg)

1 µl Primer

4 µl DYEnamic ET-Mix

Auf 10 µl mit Ampuwa auffüllen

Die Kettenabbruchreaktion wurde als PCR in einem automatischen Thermocycler standardmäßig mit folgendem Programm durchgeführt:

40 sec.	95 °C	Vordenaturierung	
20 sec.	95 °C	Denaturierung	} 25 Zyklen
25 sec.	55-68 °C	Annealing	
1 min.	72 °C	Elongation	

Nach der PCR wurde die Probe mit Wasser auf 20 µl aufgefüllt und dem Sequenzierungsservice im Institut übergeben.

2.21 Klonierung von DNA - Fragmenten

2.21.1 Ligation von PCR-amplifizierten DNA-Fragmenten

Zur Klonierung von PCR-Produkten wurde das pGEM-Teasy Vektorsystem der Firma Amersham benutzt. Das System enthält einen linearisierten Vektor mit 3'-T Überhängen, die kompatibel zu den 3'-A-Überhängen des PCR - Produkts sind, die von den meisten DNA-Polymerasen erzeugt werden (Clark 1988). Die aus dem Agarosegel isolierten PCR-Produkte wurden laut Protokoll über Nacht bei 4°C mit dem Vektor ligiert.

2.21.2 Transformation, modifiziert nach Hanahan 1983

Für die Transformation eines Ligationsansatzes wurden 50 µl kompetente *E.coli* DH5α-Zellen vorsichtig auf Eis aufgetaut, mit 2 µl Ligationsansatz vermischt und 30 min. auf Eis inkubiert. Der Ansatz wurde bei 42 °C für 1 min. einem Hitzeschock auf dem Thermomixer ausgesetzt und nach 5 min. Abkühlung auf Eis mit 950 µl SOC-Medium versetzt. Die transformierten Bakterien wurden für 1,5 h bei 37 °C auf dem Thermomixer inkubiert und anschließend in verschiedenen Verdünnungsstufen (wichtig, um die Einzelklone zu erhalten) auf Selektionsplatten ausplattiert und über Nacht bei 37 °C inkubiert. Konnte man am nächsten Tag Einzelkolonien erkennen, wurden diese mit einem sterilen Zahnstocher gepickt und damit 5 ml LB-Übernackturen für die Minipräparation angeimpft.

2.22 Horizontale Gelelektrophorese

Die horizontale Gelelektrophorese wurde zur Auswertung von PCRs, Restriktionskartierungen und Insertisolierungen benutzt. Je nach Größe der zu trennenden Fragmente wurden 0,8-2 %ige Agarose - Gele in 0,5 % TBE-Puffer hergestellt und Ethidiumbromid in einer Endkonzentration von 0,1 µg/ml zugegeben. Damit sollen die aufgetragenen Produkte später unter UV-Licht sichtbar gemacht werden. Die mit Stop-Mix versehene DNA wurde aufgetragen, elektrophoretisch aufgetrennt und danach fotografisch dokumentiert. Zur Größenbestimmung wurden die DNA-Fragmente mit der 1kb-DNA-Leiter verglichen, die Initial mit auf das Gel aufgetragen wurde.

2.23 Histologische Methoden

Die Analysen erfolgten an einem (Fluoreszenz-) Fotomikroskop (BX60, Olympus) sowie mit einem Konfokalmikroskop (LSM 510, Olympus). Durch das Konfokalmikroskop war es möglich, verschiedene Schichten einer Zellkolonie zu scannen.

2.23.1 Einbettung in Kryomedium

Diese Methode wurde genutzt, um Gewebe einzubetten, zu schneiden und erst anschließend zu färben. Hierfür wurden die Organe 2 h bei 4 °C in 4 % PFA fixiert und über Nacht bei 4 °C in 25 % Sucroselösung äquilibriert. Um das Gewebe möglichst schonend abzukühlen, wurde Isopentan in flüssigem Stickstoff solange heruntergekühlt bis es zähflüssig wurde. Darin wurde das Gewebe nun für 30 sec. eingefroren. Anschließend wurde es direkt in einen vorgekühlten Block mit Tissue Freezing Medium der Firma Jung senkrecht eingebettet und bei -80 °C tiefgefroren. 24 h später war der Block fertig zum Schneiden.

2.23.2 Kryoschnitte

Der Block wurde im Kryotom der Firma Leica in Schnitte mit einer Dicke von 5 µm geschnitten und diese wurden auf Objektträger gezogen. Nach dreimaligem Waschen in PBS konnten die Schnitte nun gefärbt werden.

2.23.3 Paraffinschnitte

Das frische Gewebe wurde drei Tage in 4 % PFA bei 4 °C fixiert und über mehrere Tage in eine Wasser-Alkohol Reihe mit steigendem Ethanolgehalt (40 %-100 %) entwässert. Zur weiteren Entfettung und Aushärtung folgte eine Xylol-Isopropanol Reihe mit ebenso steigendem Xylolgehalt. Anschließend wurden die Gewebeproben in flüssigem Paraffin eingebettet, am Mikrotom geschnitten und auf Objektträger aufgezogen. Nun konnten sie gefärbt werden.

2.24 Lac-Z - Färbemethode

2.24.1 Protokoll 1 (für ganze Organe und Schnittfärbungen)

Um das Gewebe zu fixieren, wurden entnommene Organe zuerst 20 min. bei 4 °C in Fix A.1 und anschließend weitere 20 min. in Fix B.1 gegeben. Danach wurden sie

zweimal 20 min. in PBS gewaschen und über Nacht bei RT in Färbelösung 1 inkubiert. Nach zwei weiteren Waschschritten mit jeweils 20 min. in PBS wurden die Organe direkt in Kryomedium eingebettet und geschnitten. Diese Fixierungsmethode wurde sowohl für ganze Organe als auch bei Kryoschnitten direkt auf den Objektträgern angewendet.

2.24.2 Protokoll 2

Die bei diesem Protokoll verwendete Färbemethode wurde sowohl für Organe als auch für Objektträger bei Kryoschnitten verwendet. Das Gewebe bzw. der Objektträger wurden in einem Gemisch aus 7,5 g Sucrose, 10 ml Formalin ad 100 ml M/15 Phosphatpuffer (siehe S.11) für 20 min. bei 4 °C fixiert. Nach der Fixierung wurde das Gewebe zweimal 10 min. in PBS gewaschen und anschließend lichtgeschützt bei 37 °C in 50 ml Färbelösung 2 mit 1 ml x - Gal (40 mg/ml in N,N Dimethyl Formamid) gefärbt.

2.24.3 Lac Z Kit der Firma InvivoGen

Dieses Kit wurde für ganze Organe verwendet. Dabei wurden die entnommenen Organe zuerst auf Eis in PBS/MgCl₂ - Lösung gewaschen und anschließend 30 min. auf Eis in Fixierlösung fixiert. Nach zweimaligem Waschen in PBS konnten sie nun bei 37 °C für 2-4 h in Färbelösung gefärbt werden. Zum Schluss wurden die Organe noch fünfmal in PBS gewaschen.

2.24.4 Protokoll 3

Das entnommene Gewebe wurde in PBS gewaschen und 30 min. in Fix A 2 bei 4 °C unter Schütteln inkubiert. Nach erneutem Waschen wurde es ebenfalls unter Schütteln 1 h bei 4 °C in Fix B 2 inkubiert. Vor der Färbung wurde das Gewebe erneut gewaschen und bei 30 °C lichtgeschützt über Nacht in Färbelösung 2 gefärbt. Die gefärbten Organe wurden nun in Paraffinblöcke eingebettet.

2.25 Immunhistologie

Hierfür wurden die Paraffinschnitte zunächst gewässert und dann 1 h in Blockinglösung gegeben. So wurde eine höhere Antikörperspezifität erreicht. Der erste Antikörper wurde mit einer Verdünnung 1:200 bei 4 °C über Nacht in einer feuchten Kammer im Dunkeln inkubiert und am nächsten Morgen durch dreimaliges

Waschen in PBS wieder entfernt. Anschließend wurde der zweite Antikörper mit einer Verdünnung von 1:500 für 1,5 h bei RT in der feuchten Kammer inkubiert und danach ebenfalls durch dreimaliges Waschen entfernt. Als Orientierungshilfe beim Mikroskopieren wurden die Zellkerne zusätzlich mit DAPI angefärbt und die Schnitte zum Schluss eingedeckelt und mit Nagellack versiegelt.

2.26 HE-Färbung (Hämatoxylin-Eosin-Färbung)

Zur besseren Orientierung bei LacZ - Färbungen auf Kryoschnitten wurde eine Schnittfolge erstellt, wobei der erste Schnitt mit LacZ und der zweite, unmittelbar nachfolgende Schnitt mit Hämatoxylin-Eosin gefärbt wurde. Mit dieser Methode färben sich die Zellkerne blau und das Zytoplasma rot bis blassrosa an.

Das in Kryomedium eingebettete und geschnittene Gewebe wurde nach dem Spülen in PBS für 10-15 min. in Hämatoxylin inkubiert. Darauf folgte ein 10-15 minütiges Bläuen der Zellen unter Leitungswasser, worauf sich eine Färbung mit Eosin für 10-60 sec. anschloss. Nach drei weiteren Waschschritten in PBS und einer aufsteigenden Reihe EtOH konnten die Objektträger mit Eukit (Fluka) eingedeckelt werden.

2.27 Messung der Luziferaseaktivität

Für die sensitive und quantitative Messung der Aktivität des Reporterenzym *firefly-Luziferase* (*Photinus pyralis*) in kultivierten Zellen wurde das dual-glow Luciferase Assay System der Firma Promega verwendet. Die Luziferase katalysiert folgende luminisierende Redoxreaktion:

Für die Messung wurden die Zellkulturplatten (24 Well) zweimal mit PBS gewaschen und die Zellen mit 500 µl Passiv-Lysis - Puffer lysiert. Die Flüssigkeit wurde in ein E-Cup überführt und 5 min. bei 13.000 rpm zentrifugiert. Bevor die Probe gemessen wurde, wurden 10 µl Probenlysat, 50 µl Luziferase Assay Reagenz II und 50 µl Stop & Glo-Reagenz vorsichtig geschüttelt. Die zugegebene Luziferase katalysiert die oben beschriebene Reaktion, die dann über ein Luminometer gemessen werden kann.

3 ERGEBNISSE

3.1 Untersuchung und Genotypisierung der *Stra8*-Cre/R26R - Mäusen

Im Folgenden wurden unsere doppeltransgenen Mäuse untersucht. Sie exprimieren *Stra8* unter der Kontrolle eines 1,4 kb Promotors. Dies wird über einen Nachweis einer LacZ - Expression kontrollierbar.

3.1.1 Genotypisierung von *Stra8*-Cre/R26R - Mäusen durch Rückkreuzung

Da der Integrationsort des *Stra8*-Cre - Transgens nicht bekannt ist, muss durch Rückkreuzung der transgenen Tiere bestimmt werden, ob diese für das Konstrukt homozygot oder heterozygot sind. Dazu wurden die zu untersuchenden Tiere mit Wildtyp-Mäusen verpaart und deren Nachkommen genotypisiert. Waren alle Nachkommen positiv, so konnte davon ausgegangen werden, dass die verwendete *Stra8*-Cre - Maus homozygot ist.

Die Nachkommen der *Stra8*-Cre/R26R - Maus mit einer FVB-Wildtyp- Maus wurden mittels PCR genotypisiert. Die PCR-Primersequenz wurde komplementär zu den Sequenzabschnitten des gesuchten Inserts gewählt, dem *Stra8* Promotor und dem Cre-Rekombinase-Gen, so dass eine Amplifikation nur bei Vorhandensein des Konstrukts stattfinden konnte (Abb. 2).

Um falsch negative Ergebnisse zu verhindern, wurde mit denselben Proben nochmals eine PCR durchgeführt. Es sollte geprüft werden, ob sich amplifizierbare DNA in der Probe befand (Abb. 3). Die Primer hierfür amplifizierten einen DNA - Abschnitt, der unabhängig von dem *Stra8*-Cre/R26R Konstrukt in jeder Maus vorhanden ist.

Auf diese Weise wurden mindestens 15 Nachkommen untersucht, bevor über das Elterntier eine Aussage über den Integrationsort getroffen wurde.

Abb.2: PCR-Analyse zur Genotypisierung des Gewebes der Stra8 – Cre / R26R Mäuse mithilfe ihrer Nachkommen

Zur Genotypisierung wurden Stra8 – Cre / R26R Mäuse mit FVB - Wildtypmäusen verpaart. Von diesen Nachkommen wurde eine DNA - Probe aus der Schwanzspitze gewonnen und mit Stra8 -Cre / R26R spezifischen Primern einer PCR - Analyse unterzogen. War das Konstrukt enthalten, erhielt man eine spezifische Bande von 750 bp. So wurden mindestens 15 Nachkommen untersucht, um über eine Rückkreuzung über das Elterntier eine Aussage zu treffen.

1-13: DNA aus den untersuchten Nachkommen.

Abb. 3: PCR - Analyse derselben Gewebeproben wie in Abbildung 2

Um falsch negative Ergebnisse zu verhindern, wurde mit denselben DNA - Proben aus Abbildung 2 eine weitere PCR - Analyse durchgeführt. Es sollte sichergestellt werden, dass sich überhaupt amplifizierbare DNA in den Proben befindet. Die gewählten Primer amplifizieren einen DNA - Abschnitt (Tp2), der unabhängig von dem Stra8 – Cre / R26R Konstrukt vorhanden ist.

1-13: DNA aus den untersuchten Nachkommen

Nachdem nun der Genotyp der vorhandenen Mäuse für das erste Transgen, nämlich *Stra8-Cre*, bekannt war, sollte nun auch der Genotyp für das zweite Transgen (R26R) bestimmt werden. Dies ist wesentlich einfacher, da es sich um eine sehr gut charakterisierte Maus handelt, bei der der Integrationsort des Konstruktes bekannt ist. Die Genotypisierung wurde anhand des vom ‚Jackson Laboratories‘ angegebenen Genotypisierungsprotokolls durchgeführt. Mithilfe der durch die gelelektrophoretisch Auftrennung entstandenen Banden konnte bestimmt werden, ob es sich um ein Wildtyp-, heterozygotes oder homozygotes Tier handelt. Homozygote Tiere wiesen eine Bande von 325bp auf, Wildtyp- Tiere eine Bande von 600bp und heterozygote Tiere wiesen beide Banden (Abb. 4 und 5).

Für diese PCR wurden Testes/Ovar, Leber, Milz, Niere, Herz, Gehirn, Haut, Muskel aus der *Stra8-Cre/R26R* - Maus präpariert. Ebenso wurde Knochenmark aus dem Femurknochen mit PBS ausgespült und Spermien direkt unter dem Mikroskop aus dem Epididymis mit IVF Medium ausgespült. Aus all diesen Gewebeproben wurde DNA extrahiert und untersucht.

Abb. 4: Genotypisierung des Gewebes einer homozygoten männlichen *Stra8 – Cre / R26R* - Maus

Für die Genotypisierung der Elterntiere wurde DNA aus deren Testes, Leber, Milz, Niere, Herz, Gehirn, Haut und Muskel extrahiert und mit konstruktsspezifischen Primern eine PCR - Analyse durchgeführt. Dabei zeigten homozygote Tiere eine 325 bp - Bande. Die als Kontrolle mitgeführten Mäuse vom Wildtyp zeigten eine 600 bp - Bande und die heterozygoten Tiere sowohl eine 600 bp - als auch eine 325 bp - Bande.

Abb. 5: Genotypisierung des Gewebes einer heterozygoten weiblichen *Stra8* – Cre / R26R - Maus

Für die Genotypisierung der Elterntiere wurde DNA aus deren Ovarien, Leber, Milz, Niere, Herz, Gehirn, Haut, Muskel und Knochenmark extrahiert und mit LacZ - spezifischen Primern eine PCR - Analyse durchgeführt. Dabei zeigten homozygote Tiere eine 325 bp - Bande. Die als Kontrolle mitgeführten Mäuse vom Wildtyp zeigten eine 600 bp - Bande und die vom heterozygoten Typ sowohl eine 600 bp - Bande als auch eine 325bp - Bande .

3.2 Nachweis von LacZ - Expression durch X - Gal - Färbung

Durch eine X - Gal - Färbung kann man LacZ - Expression nachweisen. Diese Färbung basiert auf einer Oxidation und resultiert in einer Blaufärbung des Gewebes.

Für die histologische Untersuchung wurden Testes/Ovar, Leber, Milz, Niere, Herz, Gehirn, Haut, Muskel aus einer *Stra8*-Cre/R26R - Maus präpariert und fixiert. Knochenmark wurde aus dem Femurknochen mit PBS ausgespült, in einem E-Cup aufgefangen und fixiert. Spermien wurden direkt aus der Epididymis isoliert und ebenfalls fixiert.

Die Proben wurden als ganze Organe gefärbt. Dabei wurde die Färbezeit variiert, aber selbst nach einer Inkubationszeit von 10 Tagen in X - Gal war nur die äußere Schicht angefärbt. Das X - Gal drang nicht in tiefere Gewebsschichten vor, auch wenn diese zuvor durch eine Kanüle perforiert worden waren. Um auch die inneren Organschichten zu erreichen, wurden die Proben in Kryoblöcke eingebettet, geschnitten und anschließend gefärbt. Aus früheren Veröffentlichungen (Oulad-Abdelghani et al. 1996) war bekannt, dass der *Stra8*- Promotor in den prämeiotischen Stadien aktiv sein muss. Daher war eine durchgehende Blaufärbung der Keimzellen zu erwarten. Es konnten jedoch entgegen den Erwartungen, trotz

Verwendung verschiedener Protokolle und einem speziellen Kit für LacZ - Färbungen, keine verlässlichen und reproduzierbaren Ergebnisse erzielt werden. So waren die Testes doppelt homozygoter Mäuse nicht immer blau, sondern glichen von Zeit zu Zeit dem einer negativen Kontrolle oder wiesen nur vereinzelt blaue Punkte auf. Selbst beim Färben einer Testesprobe derselben Maus mit demselben Chemikalienstock ließen sich keine reproduzierbaren Ergebnisse generieren. Zur Kontrolle, ob der Färbevorgang an sich funktioniert hat, wurde eine Testesprobe einer ROSA26 - LacZ - Maus als positive Kontrolle mitgefärbt.

Bei den verschiedenen Färbeprotokollen war der Testis das einzige Organ, welches zeitweise durchgehend blau wurde. Niere und Gehirn hatten nur vereinzelt feine blaue Punkte, die restlichen Organe waren gar nicht gefärbt.

Da bei der Cyroschnitttechnik die Morphologie nur noch sehr schwer zuzuordnen ist, wurde eine Schnittserie erstellt, von der der erste Schnitt mit X - Gal gefärbt wurde und der unmittelbar darauf folgende Schnitte mit einer HE - Färbung. So konnte man sich auch auf kaum angefärbten Schnitten anhand der HE - Färbung orientieren.

Abb. 6: Histologie des Gewebes einer Stra8 – Cre / R26R - Maus mit X – Gal - Färbung

Zur Überprüfung der LacZ - Expression in den einzelnen Geweben wurden histologische Schnitte angefertigt und mit X-Gal gefärbt. Dabei wird LacZ durch einen blauen Farbumschlag nachgewiesen. Als Positivkontrolle diente dasselbe Gewebe aus einer ROSA26 - Maus, die LacZ ubiquitär exprimiert. Hierbei stellte sich heraus, dass sich keine reproduzierbaren Ergebnisse generieren liessen.

3.3 Promotoranalyse

3.3.1 Putative Promotoren

Bisher wurde die Expression von *Stra8* unter einem putativen 400bp Promotor (Giulli et al. 2002) und unter einem putativen 1,4 kb Promotor (Nayernia et al. 2004) untersucht. Dabei liegt der putative 400 bp Promotor innerhalb des 1,4 kb großen putativen Promotors. Beide Promotoren wurden im Zusammenhang mit

spermatogonialen Stammzellen (SSCs) beschrieben. Laut Hypothese ließ sich mit der X - Gal - Färbung eine Blaufärbung erwarten. Es zeigte sich jedoch, dass keine verlässlichen Ergebnisse generiert werden konnten. Daher entschied ich, die Aktivität verschiedener putativer Promotorbereiche genauer zu untersuchen, um zu überprüfen, ob es einen aktiveren Promotor als den hierbei verwendeten 1,4kb - Promotor gibt.

Für *Stra8* kamen anhand der Gendatenbank von cisview (<http://lgsun.grc.nia.nih.gov/cisview/>) vier putative Promotoren in der 5'- Region des *Stra8*-Gens in Frage. Die Benennung der Promotoren richtet sich nach deren Größe.

Abb. 7: Putative Promotorbereiche von Stra8:

Anhand der Gendatenbank cisview kommen vier mögliche Promotorbereiche vor dem Open Reading Frame (ORF) für *Stra8* in Frage. Die Promotoren werden ihrer Größe nach benannt. Promotor 350bp liegt innerhalb des Promotors 1,4 kb.

3.3.2 Erstellen des pGL3 - Konstrukts

Für die Promotoranalysen wurden das pGL3 Luciferase Reporter System der Firma Promega verwendet. Dieses besteht aus vier verschiedenen Vektoren mit deren Hilfe die Promotoraktivität bestimmt werden kann. Einer dieser Vektoren (Enhancer - Vektor Abb.9) enthält das jeweilig zu untersuchende Promotorstück, die restlichen Vektoren dienen als Positiv - bzw. Negativkontrolle. Die putativen Promotorregionen wurden zuerst über eine PCR auf Wildtyp - DNA amplifiziert und nach einer Gelextraktion in pGemTeasy kloniert. Die so erhaltenen Promotorfragmente wurden durch eine Sequenz-PCR auf Mutationen untersucht. Anschließend wurde ein geeigneter Klon für die weiteren Experimente ausgewählt.

Für die Messungen der Luziferaseaktivität wurden vier Vektoren verwendet, die in ihrem Aufbau untereinander gering variieren. Der pGL3 - Basic - Vektor (4818bp) (Abb.8) hat weder Promotor noch Enhancer und diente als Negativkontrolle. Der pGL3 - Enhancer - Vektor (5064bp) (Abb.9) besitzt dagegen keinen Promotor, aber einen Enhancer. In diesen Vektor wurden die zu untersuchenden putativen

Promotoren eingefügt. In der unbearbeiteten Form diene auch er als Negativkontrolle. Der pGL3 - Promotor - Vektor (5010bp) (Abb.10) verfügt über einen Promotor, aber über keinen Enhancer und dient somit ebenfalls als Negativkontrolle. Als Positivkontrolle wurde der pGL3 - Control - Vektor benutzt (5256bp) (Abb. 11), der sowohl Promotor als auch Enhancer hat.

Abb. 8: Basic - Vektor: Für die Promotoranalyse wurden pGL3 – Luciferase - Reporter - Vektoren verwendet. Der Basic - Vektor hat weder Promotor noch Enhancer und dient als Negativkontrolle. Mit freundlicher Genehmigung von Promega Corporation, Madison, USA

Abb. 9: Enhancer - Vektor: Der pGL3 - Enhancer - Vektor besitzt keinen Promotor, jedoch einen Enhancer. In diesen Vektor wurden die zu untersuchenden Promotoren mit Hilfe der Restriktionsenzyme XhoI, BglII und HindIII eingefügt. Die unbearbeitete Form diene als Negativkontrolle. Mit freundlicher Genehmigung von Promega Corporation, Madison, USA

Abb. 10: Promotor - Vektor: Dieser Vektor verfügt über einen Promotor, aber keinen Enhancer und dient als Negativkontrolle.

Mit freundlicher Genehmigung von Promega Corporation, Madison, USA

Abb. 11: Control - Vektor: Dieser Vektor hat sowohl einen Promotor als auch einen Enhancer und dient als Positivkontrolle.

Mit freundlicher Genehmigung von Promega Corporation, Madison, USA

Im Institut waren bis auf den pGL3 - Enhancer- Vektor alle anderen Vektoren vorhanden. Der fehlende Vektor konnte jedoch aus dem pGL3 - Basic und dem pGL3 - Control - Vektor hergestellt werden. Beide Vektoren wurden mit XbaI & BamHI geschnitten. Aus dem pGL3 - Basic - Vektor wurde der Backbone (4556bp) (Abb. 12) benutzt und mit dem Enhancer + SV40 Poly A Stück (508bp) des pGL3 – Control - Vektors (Abb. 13) ligiert. Nach einer Transformation in kompetente DH5α Zellen wurde der so generierte pGL3 - Enhancer - Vektor durch eine Midipräp isoliert und über einen Testverdau kontrolliert. (Abb.14)

Abb. 12: Testverdau pGL3 - Basic - Vektor: Um einen pGL3 - Enhancer - Vektor herzustellen, wurde ein pGL3 - Basic - Vektor mit den Restriktionsenzymen XbaI und BamHI geschnitten und der Backbone zur weiteren Kontruktion benutzt.

Abb. 13: Testverdau pGL3 - Control - Vektor: Um einen pGL3 - Enhancer - Vektor zu bauen, wurde ein pGL3 - Control - Vektor mit den Restriktionsenzymen XbaI und BamHI geschnitten und der Enhancer zur weiteren Kontruktion benutzt.

Abb. 14: Testverdau pGL3 - Enhancer nach Ligation: Der aus Abbildung 12 gewonnene Backbone (4556 bp) wurde mit dem aus Abbildung 13 gewonnenen Enhancer (508 bp) ligiert und testverdaut.

Nun standen alle vier Vektoren zu Verfügung, und es konnte mit der Klonierung der putativen Promotorensequenzen begonnen werden.

Der Luziferasevektor pGL3 - Enhancer wurde durch Restriktionsenzyme (XhoI, BglII & HindIII) geschnitten und die putativen Promotoren wurde in den Vektor ligiert. Dieser Vektor wurde nun in kompetente DH5α Zellen transformiert, vervielfältigt und durch eine Minipräparation isoliert. Um das Vorhandensein des Inserts zu bestätigen, wurde ein Testverdau durchgeführt. (Abb.15)

Abb. 15: Testverdau der einzelnen Konstrukte in pGL3 - Enhancer: Der in Abbildung 14 dargestellte Luziferasevektor pGL3 - Enhancer wurde durch die Restriktionsenzyme XhoI, BglII & HindIII geschnitten und mit den jeweiligen putativen Promotoren aus Abbildung 7 ligiert. Die so entstandenen Konstrukte wurden zur Kontrolle nochmals verdaut und gelelektrophoretisch aufgetrennt.

Nachdem nun alle vier putativen Promotoren in den pGL3 - Enhancer kloniert waren, konnte mit dem eigentlichen Versuch begonnen werden. Dazu wurden alle Plasmide getrennt voneinander in ES-R1 - Zellen transfiziert und diese 5 Tage kultiviert. Die Zellen wurden anschließend lysiert und konnten mit dem Dual-Luziferase - Reporter Assay (Promega) analysiert werden. Dabei dient das Protein Firefly - Luciferase (*Photinus pyralis*) als genetischer Reporter und gibt Auskunft wie stark der jeweilige Promotor aktiv ist. Das Enzym setzt Beetle Luciferin in Oxyluciferin um, wobei Licht freigesetzt wird, welches mithilfe eines Luminometers gemessen wird. Die Genauigkeit der Ergebnisse lässt sich durch die simultan exprimierte und gemessene konstitutiv aktive Renilla Luziferase verbessern. Renilla - Luciferase (*Renilla reniformis*) setzt Coelenterazine in Coelenteramide um, wobei Licht freigesetzt wird, welches ebenfalls im Luminometer messbar ist. Werden die Messwerte der Firefly

durch die Messwerte der Renilla dividiert, werden womöglich vorherrschende verschiedene Transfektionseffizienzen normalisiert.

Abb. 16: Luziferasemessung: Die jeweiligen Plasmide aus Abbildung 15 wurden in ES-R1 - Zellen transfiziert und diese Zellen 5 Tage in Kultur genommen. Gleichzeitig wurde zur Transfektionskontrolle mit den Plasmiden eine konstante Menge eines pRLSV40 - Konstrukts mit transfiziert. Nach Lysierung wurden die Zellen mit Dual-Luziferase Reporter Assay gemessen. Dieses Kit misst gleichzeitig die Renillaaktivität des pRLSV40 - Konstrukts und die Fireflyaktivität des Luziferasekonstrukts und setzt dieses ins Verhältnis. Somit kann die Intensität der Luziferasereaktion nicht durch die Transfektionseffizienz beeinflusst werden.

Aus Abbildung 16 geht eindeutig hervor, dass der gewählte 1,4 kb - Promotor aktiv ist. Somit muss auch die β -Galactosidase in den Organen nachweisbar sein, in denen *Stra8* aktiv war. Aufgrund dieser Ergebnisse konnte nun davon ausgegangen werden, dass der verwendete Promotor in der inneren Zellmasse (Embryoblast), die das Äquivalent zu ES-Zellen darstellt, aktiv ist. Außerdem kann man davon ausgehen, dass die nicht detektierbare LacZ - Expression auf technische Probleme bei den Färbetechniken zurückzuführen ist. Dieses deutete sich ja auch schon aufgrund der schlechten Reproduzierbarkeit an.

3.4 Expressionsanalysen von LacZ in doppelt transgenen Mäusen

Um zu sehen, ob LacZ überhaupt exprimiert wird, wurde eine Reverse Transkriptase PCR durchgeführt. Die gewählten Primer amplifizieren ein Produkt von 183 bp. Aus je einer *Stra8*-Cre/R26R, ROSA26 und WT Maus wurden Testes, Leber, Niere und Herz entnommen. Aus diesen Organen wurde RNA gewonnen, diese mit Hilfe eines

Kits in cDNA umgeschrieben und durch eine PCR amplifiziert. Die verwendeten Primer binden komplementär an die LacZ - Sequenz. In Abbildung 17 sieht man, dass sowohl die Stra8-Cre/R26R - Maus als auch die ROSA26 - Maus in den untersuchten Organen LacZ exprimiert, nicht jedoch in den Organen einer WT-Maus, was die Spezifität der PCR belegt. Dieses Ergebnis war ein weiterer Hinweis darauf, dass die Ausgangshypothese wahrscheinlich ist.

Abb. 17: Reverse Transkriptase PCR: Um sicher zu gehen, dass LacZ exprimiert wird, wurde RNA verschiedener Organe der Stra8 - Cre / R26R Maus mit Hilfe einer RT - PCR für LacZ untersucht. Als Negativkontrolle dienten Organe einer Wildtypmaus, als Positivkontrolle die Organe einer ROSA26 - Maus. In Testes, Herz, Leber und Niere wird eindeutig eine 183 bp - Bande sichtbar, die sich in der Positivkontrolle bestätigt und in der Negativkontrolle fehlt.

Abb. 18: HPRT - PCR: Um falsch negative Ergebnisse zu vermeiden, wurden die in Abbildung 17 benutzten Proben durch eine weitere RT - PCR untersucht. Es sollte sichergestellt werden, dass sich überhaupt amplifizierbare cDNA in den Proben befindet. Die gewählten Primer (HPRT) amplifizieren einen DNA Abschnitt, der in jeder Maus vorhanden ist. Dabei entsteht eine Bande von 321 bp.

3.5 Immunhistologie

Nachdem nun sicher war, dass sowohl der richtige Promotor für das Konstrukt der transgenen Maus gewählt worden war, dieses auch funktioniert als auch LacZ als Detektor exprimiert wird, galt es, eine Methode zu etablieren, um LacZ zuverlässig nachzuweisen. Über Immunhistologie kann Expression auf Proteinebene mit Hilfe eines spezifischen Antikörpers gegen LacZ aufgezeigt werden.

3.5.1 Testes in verschiedenen Entwicklungsstufen

Während der Embryogenese wird *Stra8* - Expression nur in den männlichen Gonaden gefunden, in erwachsenen Mäusen ist die Expression auf die prämeiotischen Keimzellen beschränkt (Oulad-Abdelghani et al. 1996).

Daher wurden als erstes Testes von neugeborenen, 5 d, 10 d, 15 d und 20 d alten homozygoten und heterozygoten *Stra8*-Cre/R26R - Mäusen untersucht. Die Testes wurden aus genotypisierten Mäusen präpariert, fixiert und in Paraffin eingebettet. Am Mikrotom wurden 5µm dünne Schnitte hergestellt und auf Objektträger aufgezogen. Diese wurden nun mit einem LacZ - Antikörper gefärbt, welcher wiederum durch den zweiten Antikörper detektiert werden konnte. Alle Entwicklungsstadien zeigten eine positive Färbung, die nicht auf die prämeiotischen Keimzellen beschränkt war.

Um eine unspezifische Bindung des zweiten Antikörpers auszuschließen, wurde die Färbung nur mit dem zweiten Antikörper durchgeführt. Diese fiel wie erwartet negativ aus. (Abb. 21)

Die Abbildungen 19-21 zeigen Präparate, die an einem Konfokalen Laser Scanning Mikroskop bei 600 x Vergrößerung mikroskopiert wurden.

Abb. 19: Immunhistologie in der Testisentwicklung einer heterozygoten Stra8 – Cre / R26R – Maus von Tag 0 bis Tag 20: LacZ als Detektor für Stra8 wurde durch einen LacZ – Antikörper rot dargestellt. Eine ubiquitäre LacZ – Expression ist während der gesamten Testisentwicklung gegeben.

Abb. 20: Immunhistologie in der Testisentwicklung einer homozygoten *Stra8* – Cre / R26R Maus von Tag 0 bis Tag 20: LacZ als Detektor für *Stra8* wurde durch einen LacZ - Antikörper rot dargestellt. Eine ubiquitäre LacZ - Expression ist während der gesamten Testisentwicklung gegeben.

Abb. 21: Immunhistologie des Testis einer *Stra8 – Cre / R26R* - Maus nur mit 2. Antikörper (Negativkontrolle). Um eine unspezifische Bindung des zweiten Antikörpers auszuschließen, wurde die Färbung nur mit dem zweiten Antikörper durchgeführt, diese fiel negativ aus.

3.5.2 Nachweis von LacZ in den verschiedenen Organen

Für diesen Nachweis wurden Testes/Ovar, Leber, Milz, Niere, Herz, Gehirn, Haut, Muskel, Knochenmark (KM) und Spermien aus homozygoten und heterozygoten *Stra8-Cre/R26R* - Mäusen präpariert, fixiert und in Paraffin eingebettet. Am Mikrotom wurden 5µm dünne Schnitte hergestellt und auf Objektträger aufgezogen. Diese wurden nun ebenfalls mit dem LacZ - Antikörper gefärbt, über den zweiten Antikörper detektiert und fluoreszierten unter UV Licht rot. Es zeigte sich, dass alle Organe durch Immunhistologie sich mit dem LacZ - Antikörper anfärbten und ubiquitär rot fluoreszierten. Als Negativkontrolle wurden hier die äquivalenten Organe aus den einfach transgenen *Stra8-Cre*- und *R26R*- sowie aus Wildtyp- Mäusen genommen und ebenfalls durch Immunhistologie mit dem LacZ - Antikörper gefärbt. Keine der negativen Kontrollen (*Stra8-Cre*, *R26R* und Wildtyp) zeigte eine Rotfärbung (Abb. 28-33). Als Positivkontrolle wurden dieselben Organe einer *ROSA26* - Maus auf dieselbe Art und Weise gefärbt und fluoreszierten ubiquitär rot (Abb. 26-27).

Die Präparate in Abbildungen 22-33 wurden an einem Konfokalen Laser Scanning Mikroskop bei 600 x Vergrößerung mikroskopiert.

Abb. 22: Immunhistologie des Gewebes einer heterozygoten *Stra8* - Cre / R26R - Maus. LacZ als Detektor für *Stra8* - Expression wurde durch einen LacZ - Antikörper rot dargestellt. Eine ubiquitäre LacZ - Expression ist in allen Organen gegeben.

Abb. 23: Immunhistologie des Gewebes einer heterozygoten *Stra8 - Cre / R26R* - Maus. LacZ als Detektor für *Stra8* - Expression wurde durch einen LacZ - Antikörper rot dargestellt. Eine ubiquitäre LacZ - Expression ist in allen Organen gegeben.

Abb. 24: Immunhistologie des Gewebes einer homozygoten *Stra8* – Cre / R26R - Maus. LacZ als Detektor für *Stra8* - Expression wurde durch einen LacZ - Antikörper rot dargestellt. Eine ubiquitäre LacZ - Expression ist in allen Organen gegeben.

Abb. 25: Immunhistologie des Gewebes einer homozygoten *Stra8* - Cre / R26R - Maus. LacZ als Detektor für *Stra8* - Expression wurde durch einen LacZ - Antikörper rot dargestellt. Eine ubiquitäre LacZ - Expression ist in allen Organen gegeben.

Abb. 26: Immunhistologie des Gewebes einer ROSA26 - LacZ - Maus als Positivkontrolle. In dieser Maus ist LacZ ubiquitär exprimiert. Diese kann durch einen LacZ - Antikörper mit einem roten Farbumschlag nachgewiesen werden.

Abb. 27: Immunhistologie des Gewebes einer ROSA26 – LacZ - Maus als Positivkontrolle. In dieser Maus ist LacZ ubiquitär exprimiert. Diese kann durch einen LacZ - Antikörper mit einem roten Farbumschlag nachgewiesen werden.

Abb. 28: Immunhistologie des Gewebes einer Stra8 - Cre Maus als Negativkontrolle. Hier wurde an den Schnitten der Organe der Elterntiere ebenfalls ein LacZ - Antikörper eingesetzt um dessen Spezifität zu überprüfen. Dies ist aufgrund der fehlenden Rotfärbung gegeben.

Abb. 29: Immunhistologie des Gewebes einer Stra8 - Cre Maus als Negativkontrolle. Hier wurde an den Schnitten der Organe der Elterntiere ebenfalls ein LacZ - Antikörper eingesetzt um dessen Spezifität zu überprüfen. Dies ist aufgrund der fehlenden Rotfärbung gegeben.

Abb. 30: Immunhistologie des Gewebes einer R26R - Maus als Negativkontrolle. Hier wurde an den Schnitten der Organe der Elterntiere ebenfalls ein LacZ - Antikörper eingesetzt um dessen Spezifität zu überprüfen. Dies ist aufgrund der fehlenden Rotfärbung gegeben.

Abb. 31: Immunhistologie des Gewebes einer R26R - Maus als Negativkontrolle. Hier wurde an den Schnitten der Organe der Elterntiere ebenfalls ein LacZ - Antikörper eingesetzt um dessen Spezifität zu überprüfen. Dies ist aufgrund der fehlenden Rotfärbung gegeben.

Abb. 32: Immunhistologie des Gewebes einer WT - Maus als Negativkontrolle. Hier wurde an den Schnitten der Organe der Wildtypmäusen ebenfalls ein LacZ - Antikörper eingesetzt, um dessen Spezifität zu überprüfen. Dies ist aufgrund der fehlenden Rotfärbung gegeben.

Abb. 33: Immunhistologie des Gewebes einer WT - Maus als Negativkontrolle. Hier wurde an den Schnitten der Organe der Wildtypmäusen ebenfalls ein LacZ - Antikörper eingesetzt um dessen Spezifität zu überprüfen. Dies ist aufgrund der fehlenden Rotfärbung gegeben.

Durch die immunhistologischen Untersuchungen konnte man deutlich eine ubiquitäre LacZ - Expression in allen untersuchten Organen erkennen, sowohl in doppelt heterozygoten als auch in doppelt homozygoten transgenen *Stra8*-Cre/R26R - Mäusen.

Dies lässt die Vermutung zu, dass das *Stra8*-Gen während der Embryonalentwicklung sehr früh aktiv ist. Diese These wurde bereits in der Doktorarbeit von Dr. Jessica Nolte aus unserem Institut untersucht und bestätigt. Frau Dr. Nolte konnte mittels RT-PCR und Immunhistologie nachweisen, dass einerseits *Stra8* in allen Embryonalstadien im Cytoplasma nachweisbar ist und dass *Stra8* sowohl in der inneren Zellmasse von Blastozysten als auch im Trophoblasten exprimiert wird.

3.6 Blastozystenfärbung mit LacZ - Antikörper

Es wurden 3,5 dpc alte Blastozysten einer *Stra8*-Cre/R26R - Maus direkt nach der Entnahme fixiert und mit LacZ - Antikörper gefärbt. Der Uterus wurde aus einer *Stra8*-Cre/R26R - Maus präpariert und die Blastozysten wurden mithilfe einer Mundpipette und PBS aus dem Uterus ausgespült, aufgenommen und auf einen Objektträger gesetzt, fixiert und gefärbt. Als Negativkontrolle dienten Blastozysten einer Wildtypmaus und einer homozygoten einfach transgenen *Stra8*-Cre - Maus.

Die Blastozysten der *Stra8*-Cre/R26R - Maus zeigte eine durchgehende Färbung des Trophoblasten und der inneren Zellmasse, während die Negativkontrollen keinerlei Färbung aufwiesen.

Abb. 34: Blastozystenfärbung: Hier wurden ungeschlüpfte 3,5 dpc alte Blastozysten mit einem LacZ - Antikörper angefärbt. Auch hier deutet die ubiquitäre Grünfärbung auf LacZ hin.

Als Negativkontrolle wurde der Versuch mit der X - Gal - Färbung auf Wildtyp - Blastozysten (A) und homozygoten Stra8 - Cre - Maus Blastozysten (B) wiederholt.

A: Wildtyp - Blastozysten

B: Stra8 - Cre - Blastozysten

C: Stra8 - Cre / R26R - Blastozysten

3.7 Geschlüpfte Blastozysten mit LacZ - Antikörperfärbung

Um den nächsten Schritt der Embryonalentwicklung darzustellen, wurden aus *Stra8-Cre/R26R* - Mäusen gewonnene Blastozyten auf einen Objektträger mit Feederlayer gesetzt. Nachdem der Embryoblast (*ICM*) aus der Blastozysten ausgewandert war und anfang zu proliferieren (drei Tagen Inkubation bei 37 °C) wurde diese Formation mit LacZ - Ak gefärbt.

Die geschlüpfte Blastozyste zeigte ebenfalls eine ubiquitäre Expression von LacZ (Abb.35).

Abb. 35: Geschlüpfte Blastozyste einer Stra8 - Cre / R26R - Maus. Blastozysten einer 3,5 dpc schwangeren Maus wurden aus dem Uterus ausgespült und auf einem Objektträger mit Feederlayer drei Tage bei 37°C inkubiert. Nachdem der Embryoblast (*ICM*) aus der Blastozyste ausgewachsen war und anfang sich zu proliferieren, wurde diese Formation mit einem LacZ - Antikörper gefärbt. Sie zeigt eine ubiquitäre Rotfärbung. Diese Rotfärbung zeigt Zellen an, die LacZ exprimieren und somit eine Stra8 Aktivität aufweisen.

3.8 Färbung von Embryonen 13,5 dpc mit X - Gal

Um die LacZ - Expression in weitaus späteren Embryonalstadien zu betrachten, wurden Embryonen einer *Stra8-Cre/R26R* - Maus 13,5 Tage *post coitum* untersucht. Die Embryonen wurden aus dem Uterus herauspräpariert, fixiert und 10 Tage in X - Gal Färbelösung bei 37°C inkubiert. Bereits nach wenigen Tagen färbten sich die Embryonen tief blau an, am Ende der Inkubationszeit waren sie vollständig von außen blau gefärbt und weisen somit auf eine ebenfalls ubiquitäre LacZ - Expression hin.

Abb. 36: X - Gal - Färbung von Embryonen 13,5 dpc einer *Stra8 -Cre / R26R* Maus und einer WT - Maus als Negativkontrolle. Um zu zeigen, dass *Stra8* bereits in der Embryonalentwicklung aktiv ist, wurden 13,5 dpc. alte Embryonen mit X - Gal gefärbt und zeigten anhand der Blaufärbung eine ubiquitäre LacZ - Färbung. Als Negativkontrolle wurde ein ebenfalls 13,5 dpc alter Wildtypembryo mitgefärbt und zeigte keinerlei Blaufärbung.

A: geschlossene Fruchtblase

B: halbgeöffnete Fruchtblase mit Embryo

C: Embryo

D: Negativkontrolle WT

4 DISKUSSION

4.1 Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Doktorarbeit konnte *Stra8*-Expression bereits in der *ICM* (*inner cell mass*) von 3,5 dpc alten Blastozysten nachgewiesen werden, was ein Hinweis auf eine sehr frühe Aktivität des *Stra8* - Gens in der Embryonalentwicklung ist.

Stra8 (*stimulated by retinoic acid gene 8*) ist ein Keimbahnzellmarker, der ausschließlich in prämeiotischen Stadien der Spermatogenese von adulten männlichen Mäusen und in prämeiotischen Folikeln von weiblichen Mäusen exprimiert wird (Oulad-Abdelghani et al. 1996; Baltus et al. 2006; Zhou et al. 2008a, 2008b). Unsere Arbeitsgruppe konnte aus dem Hoden adulter Mäuse spermatogoniale Stammzellen (SSCs) gewinnen, die nach Kultur und Reprogrammierung *in vitro* ähnliche Eigenschaften wie ESCs aufweisen und als ‚*multipotent adult germline stem cells*‘ (*maGSC*) bezeichnet werden. Für die Isolierung der SSCs aus Maus - Testes existieren in unserer Arbeitsgruppe bereits zwei transgene Mauslinien *Stra8*-EGFP sowie *Stra8*-EGFP/*Rosa26*, die mit dem keimzellspezifischen Promotor (1,4kb) ausgestattet sind (Guan et al. 2006; siehe 4.2).

Auch in dieser Arbeit wurde dieser Promotor in einem Mausmodell (*Stra8*-Cre) als Behelfsmarker für SSCs benutzt. Es sollte damit überprüft werden, ob diese SSCs von ihrer ursprünglichen Lokalisation in den Gonaden auswandern und als Vorläuferzellen anderer Zelltypen am Ort eines Insultes (z.B. im Herzen) fungieren können.

Das verwendete Mausmodell wurde aus einer transgenen Mauslinie *Stra8*/*R26R* generiert. Es wurde durch die Kreuzung zweier transgener Linien erzeugt, und zwar die *Stra8*-Cre- Linie und die *R26R* - Linie (siehe Abbildung 1). In der *R26R* - Linie (Soriano 1999) wird die Expression des eingebrachten beta-Galactosidase - Gens von dem *ROSA26* - Promotor reguliert und im Normalfall durch die vorangeschaltete Stoppssequenz blockiert und nicht abgelesen. Diese Stoppssequenz wird von zwei loxP-Sequenzen eingeschlossen. Diese von loxP flankierte Stoppssequenz kann mit einer Cre-Rekombinase herausgeschnitten werden, so dass es zu einer Expression von LacZ kommt. Die *Stra8*-Cre - Linie exprimiert eine solche Cre-Rekombinase unter der Kontrolle des 1,4 kb *Stra8*-Promotors. Werden nun die beiden transgenen

Linien miteinander verpaart, so wird die Stopsequenz überall dort herausgeschnitten, wo der *Stra8*-Promotor entweder gerade aktiv ist oder in Vorläuferzellen aktiv war. Diese Exzision ist nicht reversibel.

Es konnte in dieser Arbeit in einem Mausmodell mithilfe der Immunhistochemie eine *Stra8*-Expression bereits in Blastozysten (3,5 dpc) nachgewiesen werden. Diese sehr frühe Promotoraktivität ist ein Hinweis auf die mögliche Funktion von *Stra8* im Pluripotenznetzwerk (siehe 4.2). In der Vergangenheit zeigte sich, dass es eine Vielzahl von keimzellspezifischen Genen gibt, die in Zusammenhang mit den pluripotenten Eigenschaften von Zellen stehen (z.B. Oct4, Nanog; Näheres siehe Tabelle Abschnitt 4.2). Tedesco et al. haben 2009 einen Shuttle des *Stra8* - Proteins zwischen Zytoplasma und Nukleus beschrieben und haben zudem auf eine Helix-Loop-Helix - Domäne und eine glutaminreiche Domäne im Protein hingewiesen. Hieraus ergeben sich zwei mögliche Aufgaben von *Stra8*: Da das Protein in pluripotenten Stammzellen überwiegend im Kern lokalisiert ist, weist die Helix-Loop-Helix - Domäne auf eine Funktion als Transkriptionsfaktor im Pluripotenznetzwerk hin. Die glutaminreiche Domäne reguliert den Eintritt der Keimzellen in die Meiose (Baltus et al. 2006), wobei *Stra8* im Testes nur als zytoplasmatisches Protein detektiert werden kann. (Siehe 4.3)

Die in der vorliegenden Arbeit durchgeführten Promotoranalysen stellten entsprechend den Ergebnissen von Guan et al. (2006) und Jaroszynski (2005) die Aktivität des verwendeten 1,4 kb - Promotors für *Stra8* als aktivsten Promotor dar. (Siehe 4.2)

Wenn *Stra8* nicht nur in pluripotenten und spermatogonialen Stammzellen exprimiert ist, sondern bereits in der *ICM* von Blastozysten, dann ergibt sich in der weiteren Entwicklung der Blastozyste und dem daraus ausdifferenzierten Gewebe eine ubiquitäre LacZ - Expression. Somit ist LacZ als Detektionsmarker für eingewanderte SSCs in testesferne Strukturen nicht geeignet, da bereits das testesferne Gewebe ebenfalls eine ubiquitäre LacZ - Expression aufweist und somit nicht zwischen ortsständigen Zellen und eingewanderten SSCs unterschieden werden kann. Aus diesem Grund konnte eine SSC-Wanderung zum Ort des Insultes in der vorliegenden Arbeit nicht analysiert werden. (Siehe 4.3)

4.2 Folgerungen aus den Ergebnissen

Spermatogoniale Stammzellen (*spermatogonial stem cells*, SSCs) liegen vereinzelt an der Basalmembran der Tubuli seminiferi im Testis. Sie sorgen sowohl durch die Fähigkeit der Selbsterneuerung (*self renewal*) als auch durch die Differenzierung für lebenslange Spermatogenese bei männlichen Individuen. Während der Embryonalentwicklung gehen SSCs aus primordialen Keimzellen (*primordial germ cells*, PGCs) hervor. Anfang der 90er Jahre gelang es sowohl Matsui et al. (1992) als auch Resnick et al. (1998) aus PGCs undifferenzierte, embryonale Keimzellen, sogenannte EGCs (*embryonic germ cells*) zu gewinnen, die sowohl *in vitro* als auch *in vivo* (Teratombildung) zu Derivaten aller drei Keimblätter ausdifferenzieren konnten und die Pluripotenzmarker Oct4 und Nanog exprimierten.

Der Anteil an spermatogonialen Stammzellen im Testis von Säugern ist mit 0,05% sehr gering (Tegelenbosch und de Rooij 1993). Bis heute wurde noch kein Marker gefunden, der ausschließlich SSCs markiert. In den Testes von neonatalen Mäusen ist der Anteil an Spermatogonien sehr viel höher als bei adulten Mäusen. Bei diesen teilt sich die Spermatogenese bereits in Spermatozyten, Spermatogonien, Spermatiden und Spermien. Kanatsu-Shinohara et al. wählten daher 2004 den Ansatz, die Hoden neonataler Mäuse für die Isolierung von SSCs zu nehmen, da diese durch den hohen prozentualen Anteil an Spermatogonien gleichzeitig eine natürliche Anreicherung an SSCs enthalten. So gelang es erstmalig, SSCs aus dem Testis neugeborener Mäuse zu isolieren.

Um eine ähnliche Anreicherung von SSCs aus adulten Testes zu erzielen, wählte unsere Arbeitsgruppe *Stra8* als Hilfsmittel. *Stra8* (*stimulated by retinoic acid gene 8*) wurde von Bouillet et al. erstmals 1995 beschrieben. Ein Jahr später zeigten Oulad-Abdelghani et al., dass *Stra8* testesspezifisch ist, wobei sich die Expression auf die prämeiotischen Stadien der Spermatogenese beschränkte. Dies bestätigte sich 2005 in der Dissertationsarbeit von Jaroszynski mit einem transgenen Mausmodell, welches EGFP unter der Kontrolle des 1,4kb - Promotors von *Stra8* exprimierte. Dieses Mausmodell war 2006 die Grundlage für die Arbeit von Guan et al.. Dort gelang es durch die Isolierung und Kultivierung EGFP positiver Zellen SSCs aus adulten Maustestes anzureichern, die nach Kultur und daraus resultierender Reprogrammierung *in vitro* ähnliche Eigenschaften wie ESCs aufwiesen und als ‚multipotent adult germline stem cells‘ (*maGSC*) bezeichnet wurden. Die *maGSCs*

können *in vitro* in alle drei Keimblätter differenzieren und nach subkutaner Injektion in immundefizienten Mäusen Teratome bilden. Zum Teil exprimieren aus *maGSCs* differenzierte Kardiomyozyten myozytäre Marker, generieren Aktionspotentiale und setzen spontan Calcium aus dem noch unreifen sarkoplasmatischen Retikulum frei, was eine Eigenschaft unreifer Kardiomyozyten ist (Guan et al. 2006)

Zur Prüfung unserer Hypothese, ob Stammzellen aus dem Hoden auswandern und sich in geschädigtem Gewebe ansiedeln, ausdifferenzieren und in den Zellverband integrieren können, schien zur Beginn der Arbeit *Stra8* als Hilfe zur Gewinnung von SSCs im Hoden ideal. Das verwendete Mausmodell war so aufgebaut, dass bei doppelt transgenen Mäusen *Stra8-Cre/R26R* die spezifische Expression von Cre in spermatogonialen Stammzellen durch die Entfernung der Stopp-Kassette die Aktivierung des Rosa26 - Promotors bewirkt. Dies sollte zu einer dauerhaften Elimination der Stopp-Kassette führen, sobald *Stra8* exprimiert wird. Dadurch sollten die SSCs im Laufe der Embryonalentwicklung markiert werden. Wenn bei adulten doppelt-transgenen Mäusen blau angefärbte, ausdifferenzierte Zellen im Herzen nachweisbar sind, würde dies zeigen, dass SSCs Vorläuferzellen der Kardiomyozyten sein können.

Bereits 2008 wurde ein *Stra8-Cre* - transgenes Mausmodell veröffentlicht (Sadate-Ngatchou et al.). Ausgehend von einer Publikation unserer Arbeitsgruppe (Nayernia et al., 2004) nutzten die Autoren ebenfalls den 1,4kb - Promotor von *Stra8*. Unter Verwendung einer LacZ/GFP-Reportermaus konnte gezeigt werden, dass die Cre-Aktivität unter der Kontrolle des *Stra8* - Promotors spezifisch in den Spermatogonien nachzuweisen ist. Dies allerdings nur, wenn das Männchen einer Verpaarung *Stra8-Cre* und das Weibchen die Reportermaus war. Daraus schlossen die Autoren, dass der *Stra8* - Promotor und damit die Cre-Aktivität spezifisch ist für männliche Keimzellen. Da endogene *Stra8*-Expression aber auch in weiblichen Keimzellen nachgewiesen werden kann (Menke et al. 2003), stellte sich für uns die Frage, ob es eventuell mehrere verschiedene aktive Promotoren für *Stra8* gibt und ob die 1,4kb eventuell spezifisch für die männlichen Keimbahn sind. Aus diesem Grund wurde eine umfassende Promotoranalyse durchgeführt (siehe nächster Abschnitt). Bei der Analyse unserer *Stra8-Cre* - Maus zeigte sich eine Diskrepanz zu der Arbeit von Sadate-Ngatchou. Mit der von uns verwendeten Reportermaus (R26R) von Soriano (1999) konnten wir eine Cre-Aktivität bereits in frühen Embryonalstadien (siehe nächster Abschnitt) nachweisen. Dies stimmt überein mit der bereits im Vorfeld

dieser Arbeit untersuchten endogenen *Stra8* - Expression. Dies ließ uns vermuten, dass die Verwendung geeigneter Reportermäusen von zentraler Bedeutung sein kann. Nach Rücksprache mit Herrn Adham (Humangenetik) und der AG Kessel (MPI), die ebenfalls Experimente mit unserer *Stra8* - Cre - Maus durchgeführt haben, lässt sich zusammenfassend sagen, dass der *Stra8* - Promotor sehr wohl in frühen Embryonalstadien aktiv ist, allerdings mit deutlich verminderter Aktivität. Dies führt dazu, dass die Menge an Cre - Rekombinase nicht bei allen Reportermäusen ausreicht, um eine Rekombination zu starten. Da in unserem Experiment der Rosa26 - Locus als Reporter dient, welcher in einem heterochromatinen Bereich auf der DNA lokalisiert ist, vermuten wir, dass die ‚Erreichbarkeit‘ der Zielsequenz ausschlaggebend für eine Wirkung der Cre - Rekombinase ist. Diese Beobachtung konnte ebenfalls von der unabhängigen Arbeitsgruppe um Bao bestätigt werden (Bao et al. 2013).

Für die Detektion einer Cre - Aktivität an unserem Mausmodell (siehe Abb.1 & Abb.4.1) benutzten wir die einfache Methode der X - Gal - Färbung. Diese Methode erwies sich jedoch wieder erwartend technisch nicht umsetzbar und es konnten keine reproduzierbaren Ergebnisse erzielt werden. Um zu klären, ob sich dieser Unterschied aufgrund eines aktiveren, als dem bisher in der Literatur beschriebenen 1,4kb - Promotor ergibt, oder, ob das verwendete Mausmodell mit einem ineffizienten Promotor arbeitet, wurde zunächst eine Promotoranalyse durchgeführt. Die Promotoranalyse ergab eindeutig, dass der bisher verwendete 1,4kb - Promotor der aktivste aller putativen Promotoren ist und somit eine eindeutige Färbung zu erwarten war. Außerdem zeigte neben der Promotoranalyse auch der Nachweis von *Stra8* in einer Expressionsanalyse mithilfe der RT - PCR in doppelt transgenen Mäusen in Testes, Herz, Niere und Leber, dass *Stra8* in dem verwendeten Mausmodell exprimiert wird. Durch den Nachweis der Expression von *Stra8* im Mausmodell war davon auszugehen, dass in diesem Modell mit der X - Gal-Färbung LacZ zumindest in Testes, Herz, Niere und Leber nachzuweisen sein sollte. Anstatt der klassischen X - Gal-Färbung wurde im Rahmen einer Methodenerweiterung ein Antikörper gegen LacZ verwendet und zunächst in der Entwicklungsreihe der Hoden und später auch in allen untersuchten Geweben ubiquitär LacZ nachgewiesen. Aufgrund des ubiquitären Nachweises von LacZ in allen untersuchten Gewebeschnitten der einzelnen Organe durch komplette Blaufärbung ist anzunehmen, dass die Cre - Aktivität unter der Kontrolle des *Stra8* - Promotors sehr

früh in der Embryonalentwicklung nachgewiesen werden kann. Um dies genauer zu untersuchen, wurden 3,5dpc alte Blastozysten, geschlüpfte Blastozysten und 13,5 dpc alte Embryonen mit X - Gal gefärbt. Es zeigte sich eine ubiquitäre LacZ - Färbung bereits bei 3,5dpc alten Blastozysten, was eine Erklärung für die komplette Blaufärbung, der aus den Blastozystenzellen stammenden Organen, zulässt.

4.3 Begründung des Verwerfens der ursprünglichen Hypothese

Stra8 wurde als testesspezifisches Gen, dessen Expression auf die prämeiotischen Stadien der Spermatogenese beschränkt ist, beschrieben (Oulad-Abdelghani et al. 1996). Das *Stra8* - Protein ist im Zytoplasma lokalisiert. Ein weitere Beschreibung der Expression von *Stra8* folgte bereits 1999 durch Sapin et al., die zeigen konnten, dass die *Stra8* - Expression nicht nur auf den Testes beschränkt ist, sondern auch in so genannten „Giant“-Zellen des Trophoblasten im Embryonalstadium 10,5-15,5 dpc darzustellen ist. Wenige Jahre später zeigte sich in den Arbeiten von Menke et al. (2003) und Zhou et al. (2008a), dass auch Ovarien in verschiedenen Embryonalstadien *Stra8* exprimieren. In unserer Arbeitsgruppe konnte Frau Kotzenberg dies bestätigen (Kotzenberg 2010). Sie konnte zeigen, dass im transgenen Mausmodell, welches ebenfalls EGFP unter der Kontrolle eines 1,4kb - *Stra8* - Promotors exprimiert, *Stra8* nicht nur im Ooplasma der Oozyte im Ovar lokalisiert ist, sondern auch *post partum* nach der Ovulation in unbefruchteten Oozyten. Darüber hinaus ist es nach ihr auch in den Präimplantationsstadien der Embryonalentwicklung auf RNA - und Proteinebene nachweisbar. Diese sehr frühe im Embryonalstadium aktive *Stra8* - Expression konnte auch in der vorgelegten Arbeit bestätigt werden.

Über die Bedeutung von *Stra8* in der Oogenese ist noch wenig bekannt. In einem Versuch mit homozygoten *Stra8* - *knockout* - Mäusen beider Geschlechter konnten Baltus et al. (2006) zeigen, dass diese infertil sind. Dies ist auf den Meiosearrest der Keimbahnzellen beider Geschlechter zurückzuführen und weist auf eine wichtige Funktion von *Stra8* sowohl in der männlichen als auch in der weiblichen Meiose hin (Anderson et al. 2008). Ein weiterer Hinweis auf die Funktion von *Stra8* während der Meiose ergibt sich aus der Arbeit von Nayernia et al. (2004), die die *Stra8* - Expression zur Gewinnung von männliche Keimzellen aus Teratokarzinomzellen nutzten, und *Stra8* wurde als Marker für den Übertritt in die frühe prämeiotische

Phase genutzt. Es gelang den Autoren, diese Zellen zu isolieren. Diese Arbeit lieferte einen weiteren Beweis für die spezifische *Stra8* - Expression in Keimzellen.

Stra8 scheint darüber hinaus noch weitere Funktionen zu haben, welche in Verbindung mit den pluripotenten Eigenschaften von Stammzellen stehen. Denn wie bereits oben erwähnt, konnten Guan et al. (2006) mithilfe des 1,4kb - *Stra8* - Promotors erfolgreich pluripotente *maGSCs* aus den multipotenten SSCs im Testis gewinnen, die in der Lage waren in alle drei Keimblätter zu differenzieren. Die Aktivität dieses Promotors konnte in der vorliegenden Arbeit durch eine Promotoranalyse ebenfalls bestätigt werden. Dies wirft in der Folge die Frage auf, ob die Expression von *Stra8* eventuell einen Einfluss auf das Pluripotenznetzwerk von Zellen hat? Es gibt eine Vielzahl von keimzellspezifischen Genen, die im Zusammenhang mit den pluripotenten Eigenschaften von Zellen stehen. Tabelle 1 zeigt eine Übersicht mehrerer keimzellspezifischer Gene, die in pluripotenten Zellen exprimiert werden.

Keimzellspezifische Gene	Referenz
Oct4	(Pesce und Scholer 2001)
Nanog	(Chambers et al. 2003)
Dppa2	(Maldonado-Saldivia et al. 2007)
Dppa3	(Saitou et al. 2002)
Dppa4	(Maldonado-Saldivia et al. 2007)
Ifitm3	(Saitou et al. 2002)
Kit	(Horie et al. 1991)
DAZIL	(Clark et al. 2004)
Sox2	(Western et al. 2005)
Zfp206	(Wang et al. 2007a+b)
<i>Stra8</i>	(Xu et al. 2011)

Tabelle 1: Auswahl keimzellspezifischer Gene, die in pluripotenten Zellen exprimiert werden (modifiziert nach Kotzenberg 2010)

Auch die Tatsache, dass *Stra8* sowohl in embryonalen Stammzellen als auch in maGSCs neben anderen Pluripotenzgenen wie Oct3/4, Nanog, Utf1, Esg1, Rex1 noch nach mehreren Passagen exprimiert wird (Nolte 2008), ist als ein weiterer Hinweis für den Einfluss der Expression von *Stra8* auf das Pluripotenznetzwerk von Zellen zu werten. Hingegen verschwand die *Stra8* - Expression im gleichen Zug wie die Expression anderer Pluripotenzgene bei der Ausdifferenzierung zu Zellen. In der vorgelegten Arbeit konnte zudem gezeigt werden, dass auch in den frühen Embryonalstadien, in denen die Zellen noch über pluri- bzw. totipotenten Differenzierungspotential verfügen, *Stra8* exprimiert wird. Eine eventuelle regulatorische Funktion im Pluripotenznetzwerk beschreibt die Arbeit von Tedesco et al. (2009), in der gezeigt wird, dass ein Shuttle des *Stra8* - Proteins zwischen Zytoplasma und Nukleus vonstattengeht, und dass das *Stra8* - Protein nicht nur zytoplasmatisch, sondern auch teilweise intranukleär lokalisiert ist. Diese teils zytoplasmatische und teils nukleäre Lokalisation konnte in der Dissertationsarbeit von Dr. Nolte (2008) aus unserer Arbeitsgruppe bestätigt werden. Betrachtet man die

Proteinstruktur von *Stra8*, die sowohl eine Helix – Loop - Helix - Domäne aufweist als auch eine glutaminreiche Domäne, wodurch *Stra8* zwei weitere Aufgaben zu haben scheint. Helix – Loop - Helix (HLH) Domänen sind charakteristisch für Proteine, die an DNA binden können und so als Transkriptionsfaktoren fungieren. Außerdem sind glutaminreiche Domänen charakteristisch für Proteine, die die Transkription anderer Gene durch Protein – Protein - Interaktionen aktivieren können. Tedesco et al. (2009) konnten in diesem Zusammenhang zeigen, dass das *Stra8* - Protein in der HLH-Domäne ein “nuclear localisation signal” (NLS) aufweist und sich stromabwärts davon drei “nuclear export signals”(NES1-3) befinden, von denen die Funktion von NLS und NES2 durch Tedesco et al. experimentell bestätigt werden konnte. Diese Arbeitsgruppe konnte somit einen aktiven Transport von *Stra8* in den Zellkern aufzeigen. Auf diese Weise kann *Stra8* an DNA binden, um Transkriptionsprozesse zu aktivieren.

Abb. 37: Struktur des *Stra8* Proteins (modifiziert nach Tedesco et al. 2009)

HLH: Helix – Loop - Helix - Domäne

GRD: glutaminreiche Domäne

NLS: *nuclear localisation signal*

NES: *nuclear export signal*

Die wichtigsten bisher bekannten Pluripotenzgene wie Oct4, Sox2 und Nanog sind gleichzeitig auch Transkriptionsfaktoren. So ist die Hypothese naheliegend, dass *Stra8* folgende zwei Funktionen haben könnte. Die Helix – Loop - Helix - Domäne weist auf die Aufgabe als Transkriptionsfaktor im Pluripotenznetzwerk hin, da das Protein in pluripotenten Stammzellen überwiegend im Kern lokalisiert ist. Die

glutaminreiche Domäne reguliert dagegen den Eintritt der Keimzellen in die Meiose (Baltus et al. 2006), wobei es im Testis nur als zytoplasmatisches Protein detektiert werden kann. Eine Schlüsselfunktion in der Aufrechterhaltung von Pluripotenz wird *Stra8* jedoch nicht haben, denn *Stra8* - *knockout* - Mäuse sind infertil, ohne weitere phänotypische Veränderungen (Baltus et al., 2006). Auch konnte Kotzenberg (2010) in ihrer Arbeit durch Blastozysteninjektion mit *Stra8* positiven ES - Zellen im Vergleich mit einer Mischpopulation von *Stra8* - positiven und negativen ES - Zellen kein eindeutiges Ergebnis hinsichtlich einer Beteiligung der *Stra8* - negativen ES - Zellen an der Chimärenbildung erreichen.

Um die Funktion von *Stra8* in pluripotenten Zellen weiter zu untersuchen, wurde in unserer Arbeitsgruppe ein *Stra8* - *knockdown* mittels synthetisch hergestellter siRNA in ES-Zellen durchgeführt. Als Reaktion hierauf zeigte sich in der Expressionsanalyse eine Hochregulation der Pluripotenzgene *Nanog*, *Oct3/4*, *Klf4* und *Zfp206*. Gleichzeitig wurden Markergene für Zelldifferenzierung geringer exprimiert. Um den Einfluss einer *Stra8* - Überexpression auf das Pluripotenznetzwerk zu untersuchen, wurden in unserer Arbeitsgruppe zwei Vektoren konstruiert. Im Kontrollvektor wird EGFP unter der Kontrolle des humanen Elongation - Faktor 1 alpha - Promotors (hEF1 alpha-EGFP) exprimiert, im Versuchsvektor hingegen wird anstatt EGFP *Stra8* unter demselben Promotor (hEF1 alpha-*Stra8*) exprimiert. Diese beiden Vektoren wurden stabil in ES - RI - Zellen transfiziert und der Effekt mittels qRT-PCR analysiert. Die *Stra8* - Überexpression resultierte in einer signifikanten Herunterregulation von Pluripotenzmarkern. Gleichzeitig konnte man eine signifikante Hochregulation der mesodermalen Differenzierungsmarker Vimentin und Eomesodermin verzeichnen. Dies deutet auf eine gerichtete mesodermale Differenzierung von ES - Zellen bei einer Überexpression von *Stra8* hin.

So scheint die *Stra8* - Expression eher Einfluss auf die Differenzierungsoption von pluripotenten Zellen zu haben als eine Schlüsselfunktion im Pluripotenznetzwerk zu besitzen.

4.4 Lösungsmöglichkeit der Fragestellung

In der vorliegenden Arbeit sollte mit Hilfe eines Mausmodells die Hypothese überprüft werden, dass spermatogoniale Stammzellen als Vorläufer für andere Zelltypen fungieren können, z.B. für Kardiomyozyten. Aufgrund der Ergebnisse, die zeigen, dass *Stra8* nicht nur in pluripotenten und spermatogonialen Stammzellen exprimiert

ist, sondern bereits in der *ICM* von Blastozysten, ist das hier verwendete Mausmodell nicht geeignet, um die Fragestellung zu beantworten. Um eine definitive Aussage machen zu können, müsste eine transgene Maus entsprechend der *Stra8* - Cre - Maus generiert werden, die statt des *Stra8* - Promotors einen SSC - spezifischen Promotor beinhaltet. Bis dato ist allerdings kein Marker - Gen bekannt, dessen Expression ausschließlich in den SSCs detektierbar ist. Somit kann die Fragestellung nach dem derzeitigen Stand der Forschung nicht abschließend geklärt werden.

5 LITERATURVERZEICHNIS

Adham IM, Nayernia K, Engel W (1997). Spermatozoa lacking acrosin protein show delayed fertilization. *Mol Reprod Dev* 46(3): 370-376.

Altschul SF, Gish W, Miller W, Myers E W, Lipman DJ (1990). Basic local alignment search tool. *J Mol Biol* 215(3): 403-10.

Anderson EL, Baltus A E, Roepers-Gajadien HL, Hassold TJ, de Rooij D G, Pelt AM van, Page D C (2008). *Stra8* and its inducer, retinoic acid, regulate meiotic initiation in both spermatogenesis and oogenesis in mice. *Proc Natl Acad Sci U S A* 105(39): 14976-80.

Anderson LD und Hirshfield AN (1992). An overview of follicular development in the ovary: from embryo to the fertilized ovum in vitro. *Md Med J* 41(7): 614-20.

Baltus AE, Menke DB, Hu YC, Goodheart ML, Carpenter AE, de Rooij DG, Page DC (2006). In germ cells of mouse embryonic ovaries, the decision to enter meiosis precedes premeiotic DNA replication. *Nat Genet* 38(12): 1430-4.

Bao J, Ma HY, Schuster A, Lin YM, Yan W (2013). Incomplete cre - mediated excision leads to phenotypic differences between *Stra8* - iCre; *Mov10l1*(lox/lox) and *Stra8* - iCre; *Mov10l1*(lox/Delta) mice. *Genesis* 51(7): 481-90.

Beltrami AP, Barlucchi L, Torella D, Baker M, Limana F, Chimenti S, Kasahara H, Rota M, Musso E, Urbanek K, Leri A, Kajstura J, Nadal-Ginard B, Anversa P (2003). Adult cardiac stem cells are multipotent and support myocardial regeneration. *Cell* 114(6): 763-76.

Birnboim HC, Doly J (1979). A rapid alkaline extraction procedure for screening recombinant plasmid DNA. *Nucleic Acids Res* 7(6): 1513-23.

Borum K (1961). Oogenesis in the mouse. A study of the meiotic prophase. *Exp Cell Res* 24: 495-507.

Bouillet P, Chazaud C, Oulad – Abdelghani M, Dolle P und Chambon P (1995). Sequence and expression pattern of the *Stra7* (*Gbx-2*) homeobox-containing gene induced by retinoic acid in P19 embryonal carcinoma cells. *Dev Dyn* 204(4): 372-82.

Chambers I, Colby D, Robertson M, Nichols J, Lee S, Tweedie S, Smith A. (2003). Functional expression cloning of *Nanog*, a pluripotency sustaining factor in embryonic stem cells. *Cell* 113(5): 643-55.

Cheng I F, Kaiser D, Huebscher D, Hasenfuss G, Guan K und Schafer K (2012). Differentiation of multipotent adult germline stem cells derived from mouse testis into functional endothelial cells. *J Vasc Res* 49(3): 207-20.

Chien A, Edgar DB, Trela JM (1976). Deoxyribonucleic acid polymerase from the extreme thermophile *Thermus aquaticus*. *J Bacteriol* 127(3): 1550-7.

Clark AT, Bodnar MS, Fox M, Rodriguez RT, Abeyta MJ, Firpo MT, Pera RA (2004). Spontaneous differentiation of germ cells from human embryonic stem cells in vitro. *Hum Mol Genet* 13(7): 727-39.

Clark JM (1988). Novel non-templated nucleotide addition reactions catalyzed by procaryotic and eucaryotic DNA polymerases. *Nucleic Acids Res* 16(20): 9677-86.

Crosby HA, Strain AJ (2001). Adult liver stem cells: bone marrow, blood, or liver derived? *Gut* 48(2): 153-4.

Friedrich G, Soriano P (1991). Promoter traps in embryonic stem cells: a genetic screen to identify and mutate developmental genes in mice. *Genes Dev* 5(9): 1513-23.

Gage FH (2000). Mammalian neural stem cells. *Science* 287(5457): 1433-8.

Giuli G, Tomljenovic A, Labrecque N, Oulad-Abdelghani M, Rassoulzadegan M, Cuzin F (2002). Murine spermatogonial stem cells: targeted transgene expression and purification in an active state. *EMBO Rep* 3(8): 753-9.

Green SH, Zuckerman S (1951). The number of oocytes in the mature rhesus monkey (*Macaca mulatta*). *J Endocrinol* 7(2): 194-202.

Guan K, Hasenfuss G (2007). Do stem cells in the heart truly differentiate into cardiomyocytes? *J Mol Cell Cardiol* 43(4): 377-87.

Guan K, Nayernia K, Maier LS, Wagner S, Dressel R, Lee JH, Nolte J, Wolf F, Li M, Engel W, Hasenfuss G (2006). Pluripotency of spermatogonial stem cells from adult mouse testis. *Nature* 440(7088): 1199-203.

Hanahan D (1983). Studies on transformation of *Escherichia coli* with plasmids. *J Mol Biol* 166(4): 557-80.

Horie K, Takakura K, Taii S, Narimoto K, Noda Y, Nishikawa S, Nakayama N, Fujita J, Mori T (1991). The expression of c-kit protein during oogenesis and early embryonic development. *Biol Reprod* 45(4): 547-52.

Jaroszynski L (2005). Expression and function analysis of *Tex18* and *Stra8* genes in male germ cells. Math.-Naturwiss. Diss. Göttingen

Joannides A, Gaughwin P, Schwiening C, Majed H, Sterling J, Compston A, Chandran S (2004). Efficient generation of neural precursors from adult human skin: astrocytes promote neurogenesis from skin-derived stem cells. *Lancet* 364(9429): 172-8.

Johnson J, Bagley J, Skaznik-Wikiel M, Lee HJ, Adams GB, Niikura Y, Tschudy KS, Tilly JC, Cortes ML, Forkert R, Spitzer T, Iacomini J, Scadden DT, Tilly JL (2005). Oocyte generation in adult mammalian ovaries by putative germ cells in bone marrow and peripheral blood. *Cell* 122(2): 303-15.

Johnson J, Canning J, Kaneko T, Pru JT, Tilly JL (2004). Germline stem cells and follicular renewal in the postnatal mammalian ovary. *Nature* 428(6979): 145-50.

Kanatsu-Shinohara M, Inoue K, Lee J, Yoshimoto M, Ogonuki N, Miki H, Baba S, Kato T, Kazuki Y, Toyokuni S, Toyoshima M, Niwa O, Oshimura M, Heike T, Nakahata T, Ishino F, Ogura A, Shinohara T (2004). Generation of pluripotent stem cells from neonatal mouse testis. *Cell* 119(7): 1001-12.

Kotzenberg L (2010). Zur Rolle von *Stra8* in pluripotenten Stammzellen. Med. Diss. Göttingen

Kruse C, Kajahn J, Petschnik AE, Maass A, Klink E, Rapoport DH, Wedel T (2006). Adult pancreatic stem/progenitor cells spontaneously differentiate in vitro into multiple cell lineages and form teratoma-like structures. *Ann Anat* 188(6): 503-17.

Laird PW, Zijderveld A, Linders K, Rudnicki MA, Jaenisch R, Berns A (1991). Simplified mammalian DNA isolation procedure. *Nucleic Acids Res* 19(15): 4293.

Maldonado-Saldivia J, van den Bergen J, Krouskos M, Gilchrist M, Lee C, Li R, Sinclair AH, Surani MA und Western PS (2007). Dppa2 and Dppa4 are closely linked SAP motif genes restricted to pluripotent cells and the germ line. *Stem Cells* 25(1): 19-28.

Martin GR, Evans MJ (1975). Differentiation of clonal lines of teratocarcinoma cells: formation of embryoid bodies in vitro. *Proc Natl Acad Sci U S A* 72(4): 1441-5.

Matsui Y, Zsebo K, Hogan BL (1992). Derivation of pluripotential embryonic stem cells from murine primordial germ cells in culture. *Cell* 70(5): 841-7.

McLaren A (1984). Meiosis and differentiation of mouse germ cells. Symp Soc Exp Biol 38: 7-23.

Menke DB, Koubova J, Page DC (2003). Sexual differentiation of germ cells in XX mouse gonads occurs in an anterior-to-posterior wave. Dev Biol 262(2): 303-12.

Murray CJ, Lopez AD (1997). Mortality by cause for eight regions of the world: Global Burden of Disease Study. Lancet 349(9061): 1269-76.

Nagy A, Rossant J, Nagy R, Abramow-Newerly W, Roder JC (1993). Derivation of completely cell culture-derived mice from early-passage embryonic stem cells. Proc Natl Acad Sci U S A 90(18): 8424-8.

Nayernia K, Li M, Jaroszynski L, Khusainov R, Wulf G, Schwandt I, Korabiowska M, Michelmann HW, Meinhardt A, Engel W (2004). Stem cell based therapeutical approach of male infertility by teratocarcinoma derived germ cells. Hum Mol Genet 13(14): 1451-60.

Nolte J (2008). Zur Pluripotenz spermatogonialer Stammzellen. Math. Naturwiss. Diss. Göttingen

Oulad-Abdelghani M, Bouillet P, Decimo D, Gansmuller A, Heyberger S, Dolle P, Bronner S, Lutz Y, Chambon P (1996). Characterization of a premeiotic germ cell-specific cytoplasmic protein encoded by *Stra8*, a novel retinoic acid-responsive gene. J Cell Biol 135(2): 469-77.

Pesce M, Scholer HR (2001). Oct-4: gatekeeper in the beginnings of mammalian development. Stem Cells 19(4): 271-8.

Peters H (1970). Migration of gonocytes into the mammalian gonad and their differentiation. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 259(828): 91-101.

Resnick JL, Ortiz M, Keller JR, Donovan PJ (1998). Role of fibroblast growth factors and their receptors in mouse primordial germ cell growth. *Biol Reprod* 59(5): 1224-9.

Sadate-Ngatchou PI, Payne CJ, Dearth AT, Braun RE (2008). Cre recombinase activity specific to postnatal, premeiotic male germ cells in transgenic mice. *Genesis* 46(12): 738-42.

Saiki RK, Gelfand DH, Stoffel S, Scharf SJ, Higuchi R, Horn GT, Mullis KB, Erlich HA (1988). Primer-directed enzymatic amplification of DNA with a thermostable DNA polymerase. *Science* 239(4839): 487-91.

Saitou M, Barton SC, Surani MA (2002). A molecular programme for the specification of germ cell fate in mice. *Nature* 418(6895): **293-300**.

Sambrook J, Fritsch EF, Maniatis T: Molecular cloning: A Laboratorial manual. 2. Auflage; Cold Spring Harbour Laboratory Press, Cold Spring Harbour N.Y. 1989

Sanger F, Nicklen S, Coulson AR (1977). DNA sequencing with chain-terminating inhibitors. *Proc Natl Acad Sci U S A* 74(12): 5463-7.

Sans S, Kesteloot H, Kromhout D (1997). The burden of cardiovascular diseases mortality in Europe. Task Force of the European Society of Cardiology on Cardiovascular Mortality and Morbidity Statistics in Europe. *Eur Heart J* 18(12): 1231-48.

Smith AG, Heath JK, Donaldson DD, Wong GG, Moreau J, Stahl M, Rogers D (1988). Inhibition of pluripotential embryonic stem cell differentiation by purified polypeptides. *Nature* 336(6200): 688-90.

Soriano P (1999). Generalized lacZ expression with the ROSA26 Cre reporter strain. *Nat Genet* 21(1): 70-1.

Streckfuss-Bomeke K, Vlasov A, Hulsmann S, Yin D, Nayernia K, Engel W, Hasenfuss G, Guan K (2009). Generation of functional neurons and glia from multipotent adult mouse germ-line stem cells. *Stem Cell Res* 2(2): 139-54.

Tedesco M, La Sala G, Barbagallo F, De Felici M, Farini D (2009). *STRA8* shuttles between nucleus and cytoplasm and displays transcriptional activity. *J Biol Chem* 284(51): 35781-93.

Tegelenbosch RA, de Rooij DG (1993). A quantitative study of spermatogonial multiplication and stem cell renewal in the C3H/101 F1 hybrid mouse. *Mutat Res* 290(2): 193-200.

Wang Z X, Kueh JL, Teh CH, Rossbach M, Lim L, Li P, Wong KY, Lufkin T, Robson P, Stanton LW (2007a). Zfp206 is a transcription factor that controls pluripotency of embryonic stem cells. *Stem Cells* 25(9): 2173-82.

Wang ZX, Teh CH, Kueh JL, Lufkin T, Robson P, Stanton LW (2007b). Oct4 and Sox2 directly regulate expression of another pluripotency transcription factor, Zfp206, in embryonic stem cells. *J Biol Chem* 282(17): 12822-30.

Ware LM, Axelrad AA (1972). Inherited resistance to N- and B-tropic murine leukemia viruses in vitro: evidence that congenic mouse strains SIM and SIM.R differ at the Fv-1 locus. *Virology* 50(2): 339-48.

Western P, Maldonado-Saldivia J, van den Bergen J, Hajkova P, Saitou M, Barton S and Surani MA (2005). Analysis of Esg1 expression in pluripotent cells and the germline reveals similarities with Oct4 and Sox2 and differences between human pluripotent cell lines. *Stem Cells* 23(10): 1436-42.

Xu X, Pantakani DV, Luhrig S, Tan X, Khromov T, Nolte J, Dressel R, Zechner U, Engel W (2011). Stage-specific germ-cell marker genes are expressed in all mouse pluripotent cell types and emerge early during induced pluripotency. PLoS One 6(7): e22413.

Zambrowicz BP, Imamoto A, Fiering S, Herzenberg LA, Kerr WG, Soriano P (1997). Disruption of overlapping transcripts in the ROSA beta geo 26 gene trap strain leads to widespread expression of beta-galactosidase in mouse embryos and hematopoietic cells. Proc Natl Acad Sci U S A 94(8): 3789-94.

Zhou Q, Li Y, Nie R, Friel P, Mitchell D, Evanoff RM, Pouchnik D, Banasik B, McCarrey JR, Small C, Griswold MD (2008a). Expression of stimulated by retinoic acid gene 8 (*Stra8*) and maturation of murine gonocytes and spermatogonia induced by retinoic acid in vitro. Biol Reprod 78(3): 537-45.

Zhou Q, Nie R, Li Y, Friel P, Mitchell D, Hess RA, Small C, Griswold MD (2008b). Expression of stimulated by retinoic acid gene 8 (*Stra8*) in spermatogenic cells induced by retinoic acid: an in vivo study in vitamin A-sufficient postnatal murine testes. Biol Reprod 79(1): 35-42.

6 DANKSAGUNG

An dieser Stelle bedanke ich mich bei Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. W. Engel für die Bereitschaft, diese Arbeit zu betreuen. Vielen Dank für die intensive Betreuung, die vielen Anregungen und die Unterstützung bei dieser Arbeit und bei der Fortführung meines Studiums.

Ein besonderer Dank gilt auch Frau Dr. J. Nolte für die Bereitstellung des Themas, für die vielen geduldigen Anregungen, ihre umfassende Unterstützung bei der Versuchsplanung und – durchführung und die gute Zusammenarbeit, die immer wieder zu meiner Motivation und zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen hat.

Mein Dank gilt auch den Kollegen aus dem Labor 107 & 105 für die gute Zusammenarbeit und die gute und ungezwungene Atmosphäre. Besonders bedanke ich mich bei den beiden TAs Frau Ullrich und Frau Fey die mir immer hilfsbereit zur Seite standen.

Ich bedanke mich natürlich auch bei allen anderen Mitarbeitern des Instituts für Humangenetik, besonders dem Team der AG Hahn und den Mitarbeitern des Tierstalls.