Aus der Poliklinik für Präventive Zahnmedizin,
Parodontologie und Kariologie
(Prof. Dr. med. dent. A. Wiegand)
im Zentrum Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
der Medizinischen Fakultät der Universität Göttingen

Prävalenz von und Risikofaktoren für dentale Erosionen
bei Göttinger Kindergartenkindern

INAUGURAL-DISSERTATION

zur Erlangung des Doktorgrades
für Zahnheilkunde
der Medizinischen Fakultät der
Georg-August-Universität zu Göttingen

vorgelegt von
Christina Müller-Pflanz (geb. Pflanz)

aus
Fulda

Göttingen 2017

Dekan: Prof. Dr. rer. nat. H. K. Kroemer

Referent/in: Prof. Dr. med. dent. A. Wiegand

Ko-Referent/in: Prof. Dr. med. K. Brockmann

Drittreferent/in:

Datum der mündlichen Prüfung: 20.03.2018

Hiermit erkläre ich, die Dissertation mit dem Titel „Prävalenz von und Risikofaktoren für dentale Erosionen bei Göttinger Kindergartenkindern“ eigenständig angefertigt und keine anderen als die von mir angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet zu haben.

Göttingen, den

Inhaltsverzeichnis

Tabellenverzeichnis.....	IV
Abbildungsverzeichnis	V
1 Einleitung.....	1
2 Literaturübersicht.....	3
2.1 Definition und klinisches Erscheinungsbild von dentalen Erosionen	3
2.2 Pathogenese	4
2.3 Ätiologie und Lokalisation	5
2.3.1 Extrinsische Faktoren.....	5
2.3.2 Intrinsische Faktoren	7
2.3.3 Biologische Faktoren.....	8
2.3.3.1 Die Interaktion von Erosion, Attrition und Abrasion.....	10
2.3.3.2 Besonderheiten im Milchgebiss	10
2.4 Epidemiologie	11
2.4.1 Erosionsindizes für epidemiologische Studien	11
2.4.2 Prävalenz bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern	14
2.4.3 Inzidenz und Progression.....	18
2.4.4 Risikofaktoren	19
3 Probanden und Methoden	24
3.1 Kontaktaufnahme und Probandengut.....	24
3.2 Untersuchung.....	24
3.3 Erosions-Indizes	24
3.4 Inter-Test-Reliabilität	26
3.5 Inter- und Intra-Untersucher-Reliabilität	28
3.6 Anamnesebogen	29
3.7 Kindergarten-Fragebogen	29
3.8 Statistische Auswertung	29

4	Ergebnisse.....	33
4.1	Ergebnisse der klinischen Untersuchung	33
4.1.1	Prävalenz der Erosionen in Abhängigkeit von Alter und Geschlecht	34
4.1.2	Prävalenz der Erosionen in Ober- und Unterkiefer und Front- und Seitenzahnbereich	34
4.1.3	Schweregrad und Lokalisation der Erosionen anhand des O'Sullivan-Index	36
4.1.4	Schweregrad und Lokalisation der Erosionen anhand des BEWE-Index.....	37
4.2	Risikofaktoren	39
4.2.1	Rolle der Kindergärten	40
5	Diskussion	41
5.1	Diskussion der Methode.....	41
5.1.1	Probandengut.....	41
5.1.2	Indizes	41
5.1.3	Klinische Untersuchung	42
5.1.4	Anamnesebogen und Kindergarten-Fragebogen	42
5.2	Diskussion der Ergebnisse.....	44
5.2.1	Ergebnisse der klinischen Untersuchung	44
5.2.1.1	Prävalenz und Schwere der Erosionen.....	44
5.2.1.2	Prävalenz und Schwere der Erosionen in Abhängigkeit vom Alter.....	46
5.2.1.3	Prävalenz und Schwere der Erosionen in Abhängigkeit vom Geschlecht	46
5.2.1.4	Prävalenz der Erosionen in Ober- und Unterkiefer und Front- und Seitenzahnbereich.....	47
5.2.1.5	Lokalisation der erosiven Läsionen auf den Zahnflächen	48
5.2.2	Anamnestische Risikofaktoren	49

5.2.2.1	Rolle der Kindergärten	52
5.3	Fazit und Ausblick	52
6	Zusammenfassung	53
7	Anhang	55
7.1	Anamnesebogen und Kindergarten-Fragebogen	55
8	Literaturverzeichnis	59

Tabellenverzeichnis

Tabelle 2.1: Erosions-Index nach Eccles 1979.....	12
Tabelle 2.2: „Tooth Wear Index“ nach Smith und Knight 1984.	13
Tabelle 2.3: Prävalenz dentaler Erosionen bei Erwachsenen in chronologischer Reihenfolge.....	16
Tabelle 2.4: Prävalenz dentaler Erosionen bei Kindern und Jugendlichen zwischen 10 und 17 Jahren in chronologischer Reihenfolge.	17
Tabelle 2.5: Prävalenz dentaler Erosionen bei Kindern bis einschließlich 9 Jahre in chronologischer Reihenfolge.....	18
Tabelle 2.6: Epidemiologische Studien bei Kindern zwischen 2 und 9 Jahren, die eine Risikofaktoranalyse enthalten (in chronologischer Reihenfolge).	22
Tabelle 3.1: Index zur Klassifizierung dentaler Erosionen im Milchgebiss nach O’Sullivan (2000).....	25
Tabelle 3.2: BEWE-Bewertungssystem nach Bartlett et al. (2008).....	26
Tabelle 3.3: Schema zur Überführung der O’Sullivan-Codierung in die entsprechende BEWE-Codierung.....	27
Tabelle 3.4: Inter-Test-Reliabilität.....	27
Tabelle 3.5: Inter-Untersucher-Reliabilität	28
Tabelle 3.6: Intra-Untersucher-Reliabilität	28
Tabelle 3.7: Statistische Verfahren.....	30
Tabelle 3.8: Risikofaktoren: Messgrößen und statistische Verfahren.	30
Tabelle 3.9: Potentielle Risikofaktoren, die als Regressoren verwendet wurden.	31
Tabelle 4.1: Prävalenz der Erosionen nach Altersgruppen.....	34
Tabelle 4.2: Anteil der Kinder mit Erosionen im Ober- und Unterkiefer je Altersgruppe.....	35
Tabelle 4.3: Betroffene Flächen von Front- und Eckzähnen.....	36
Tabelle 4.4: Betroffene Flächen von Molaren.....	37
Tabelle 4.5: Verteilung der untersuchten Kinder entsprechend der Risiko- Klassifizierung nach dem BEWE-Summenscore.	39
Tabelle 5.1: In verschiedenen Studien festgestellte Prävalenzen in den entsprechenden Altersklassen.	46

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 4.1: Übersichtskarte und Verteilungsmuster der Kindergärten, die an der vorliegenden Studie teilgenommen haben.	33
Abbildung 4.2: Prävalenz dentaler Erosionen bei allen Zähnen des Milchgebisses.	35
Abbildung 4.3: Verteilung der Erosionen entsprechend dem BEWE-Index bei allen Zähnen des Milchgebisses.	37
Abbildung 4.4: Verteilung der Erosionen in Ober- und Unterkiefer bei 3- Jährigen und 4-Jährigen.	38
Abbildung 4.5: Verteilung der Erosionen in Ober- und Unterkiefer bei 5- Jährigen und 6-7-Jährigen.	38
Abbildung 7.1: Anamnesebogen, von den Erziehungsberechtigten auszufüllen: Seite 1.	55
Abbildung 7.2: Anamnesebogen, von den Erziehungsberechtigten auszufüllen: Seite 2.	56
Abbildung 7.3: Fragebogen, von den Kindergärten auszufüllen: Seite 1.	57
Abbildung 7.4: Fragebogen, von den Kindergärten auszufüllen: Seite 2.	58

1 Einleitung

Erosionen werden als die chemische und irreversible Auflösung der Zahnhartsubstanzen durch Säuren nichtbakteriellen Ursprungs definiert. Der Prozess der Erosion zeichnet sich durch eine schichtweise Abtragung der Zahnhartsubstanzen aus. Patienten mit schweren Erosionen leiden unter Hypersensibilitäten und ästhetischen Einschränkungen. Darüber hinaus können Erosionen die Funktionalität des Gebisses beeinträchtigen und im fortlaufenden Prozess bis zum vollständigen Verlust der okklusalen Morphologie und der Anatomie des Zahnes führen (Ganss und Lussi 2014, Lussi et al. 2011). Sobald der erste Milchzahn in die Mundhöhle eruptiert, ist er einem möglichen Risiko ausgesetzt, Erosionen zu entwickeln. Da die Milchzähne kleiner als ihre bleibenden Nachfolger sind und ihre Schmelzschicht dünner ist, können Milchzähne verhältnismäßig schneller und schwerer erodieren als bleibende Zähne (Hunter et al. 2000). Es wird zudem angenommen, dass das Auftreten von dentalen Erosionen im Milchgebiss zu einem gehäufteten Auftreten von Erosionen in der bleibenden Dentition führt (Ganss et al. 2001).

Zur Prävalenz und Ätiologie von Erosionen wurden zahlreiche Studien bei Kindern und Erwachsenen aller Altersklassen durchgeführt. Die Prävalenz für Kinder im Milchgebiss wird in verschiedenen Studien mit 0,6% (Moimaz et al. 2013) bis 100% (Jaeggi und Lussi 2004) angegeben. In Deutschland wurde bisher nur eine Untersuchung bei Kindern zwischen 2 und 7 Jahren durchgeführt (Wiegand et al. 2006). International zeigt sich eine große Varianz der Studienergebnisse. Sie wird auf grundlegende Länderunterschiede und eine uneinheitliche Methodik der Untersuchungen zurückgeführt. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass die Prävalenz von Erosionen bei Kindern in den letzten Jahren insgesamt zugenommen hat (Nunn et al. 2003, Jaeggi und Lussi 2014).

Als potentielle Risikofaktoren für dentale Erosionen bei Kindern werden in der Fachliteratur vor allem der regelmäßige Konsum von Softdrinks, Fruchtsäften und sauren Nahrungsmitteln, aber auch häufiges Erbrechen, die Reflux-Krankheit und die Verwendung eines Asthma-Sprays diskutiert. Der hauptsächliche Risikofaktor scheint aber eine säurehaltige Ernährung zu sein. Salas et al. (2015) zeigen in einer aktuellen Meta-Analyse, dass besonders ein hoher

Konsum von Softdrinks mit dem Risiko einhergeht, Erosionen zu entwickeln. Eltern und Kinder sollten frühzeitig über die Entstehung und die Folgen von Erosionen aufgeklärt werden, um das Auftreten solcher Zahnhartsubstanzdefekte schon im Vorfeld erfolgreich zu verhindern. Eine genaue Kenntnis der Einfluss- und Risikofaktoren für Erosionen im Milchgebiss ist dafür unerlässlich.

Die Ziele der vorliegenden Studie waren deshalb, die Prävalenz, den Schweregrad und die Lokalisation von dentalen Erosionen bei Göttinger Kindergartenkindern zwischen 3 und 7 Jahren zu erheben und potentielle Risikofaktoren zu ermitteln.

2 Literaturübersicht

2.1 Definition und klinisches Erscheinungsbild von dentalen Erosionen

Bei dentalen Erosionen handelt es sich um einen pathologischen Zahnhartsubstanzverlust, der durch den chemischen Einfluss von Säuren oder Kalzium-Chelatoren ohne die Beteiligung von Mikroorganismen entsteht. Die Säuren können intrinsischer oder extrinsischer Herkunft sein (ten Cate und Imfeld 1996). Je nach Ätiologie, die zumeist multifaktoriell bedingt ist, können Erosionen unterschiedlich lokalisiert und individuell schwach bis stark ausgeprägt sein (Eccles und Jenkins 1974).

Der erosive Prozess beginnt auf der Schmelzoberfläche des Zahnes und schreitet flächenhaft in die Tiefe voran. Dabei ist der schichtweise Zahnhartsubstanzverlust für den Betroffenen zunächst schmerzlos und nicht sichtbar, jedoch irreversibel. Bei einem fortschreitenden Verlauf ist zumeist auch das Dentin betroffen, was sich durch Hypersensibilitäten, Verfärbungen und deutlich sichtbare Defekte zeigt (Hotz 1987). Die beginnende Erosion zeichnet sich durch den Verlust der Perikymatien aus, woraus eine glatte und seidenmatte Oberfläche des Zahnes resultiert. Im weiteren Verlauf des erosiven Prozesses zeigen sich an vestibulären und oralen Glattflächen flache und matte Konkavitäten, die breiter als tief und deren Ränder abgerundet sind. Besonders im inzisalen, aber auch approximalen Zahnschmelz von erodierten Frontzähnen beobachtet man eine gesteigerte Transluzenz (Eccles und Jenkins 1974). Am marginalen Rand der Gingiva persistiert typischerweise eine intakte Schmelzleiste, die vermutlich dadurch zustande kommt, dass die Sulkusflüssigkeit (pH 7,5 bis 8,0) die Säure unmittelbar neutralisiert (Stephen et al. 1980). Alternativ wird diskutiert, dass Plaque-Reste den zervikalen Schmelz vor Erosionen schützen könnten (Lussi et al. 2006). Bei einem progredienten Verlauf der Erosion resultieren Veränderungen der Zahnform, die sich als muldenförmige Einziehungen auf der Vestibularfläche zeigen (Zipkin und McClure 1949). Das Erscheinungsbild der okklusalen Erosion imponiert anfänglich mit schüsselförmig ausgewaschenen Höckerspitzen. Wenn Füllungen in den betroffenen Zähnen vorhanden sind, stehen die Füllungsänder über das erodierte Oberflächenniveau des jeweiligen Zahnes. Das fortgeschrittene Stadium kann zum vollständigen Verlust der okklusalen Morphologie und der Anatomie des Zahnes führen, woraus eine Re-

duktion der vertikalen Dimension resultiert (Ganss und Lussi 2014, Lussi et al. 2011).

Die Erosion zählt zur Gruppe der nichtkariösen Zahnhartsubstanzdefekte, zu der auch Abrasion, Attrition, Demastikation, Abfraktion und Resorption gehören (Imfeld 1996). Diese Defekte treten sowohl isoliert als auch kombiniert auf. Das kann dazu führen, dass die individuellen klinischen Erscheinungsbilder variieren und Diagnose und ätiologische Zuordnung erschwert sind (Putz und Attin 2002).

2.2 Pathogenese

Der Speichel ist bei neutralem pH-Wert eine an Hydroxylapatit übersättigte Lösung (Thylstrup und Fejerskov 1986). Der Hydroxylapatit des Zahnschmelzes steht mit den Kalzium- und Phosphationen des Speichels in einem chemischen Gleichgewicht. Sinkt der pH-Wert durch Zufuhr von Säure unter den für Zahnschmelz kritischen Wert von 5,3 bis 5,5 (Rytömaa et al. 1988, Thylstrup und Fejerskov 1996), ist der Speichel an Hydroxidionen untersättigt und Kalzium- und Phosphationen des Zahnschmelzes gehen entlang des Diffusionsgradienten in Lösung (Graf 1953). Komplexbildende Chelatoren (z. B. Zitronensäure), die eine Bindung mit Kalziumionen eingehen, fördern diesen Prozess und verstärken die Demineralisation (Brosowsky 1966). Innerhalb der Hydroxylapatitkristalle des Zahnschmelzes werden zuerst die Prismenscheiden, dann der Prismenkern und zuletzt die interprismatische Substanz aufgelöst (Meurman und Frank 1991). Erreicht die Erosion das Dentin, wird zuerst das peri-, dann das intertubuläre Dentin zerstört. So gehen oberflächlich die anorganischen Bestandteile des Dentins verloren, während die organische Matrix zunächst erhalten bleibt und freiliegt (Breschi et al. 2002, Ganss et al. 2010). In vitro zeigt sich eine gewisse Resistenz dieser freiliegenden und schützenden Kollagenschicht gegenüber abrasiven Vorgängen und fortschreitender Erosion (Ganss et al. 2009). Bei mechanischer Belastung resultiert in Abhängigkeit vom einwirkenden Druck aber eine Kompression der freiliegenden Kollagenschicht. Ferner degradieren Kollagenasen und andere proteolytisch wirksame Enzyme der Mundhöhle das demineralisierte Kollagen (Schlueter et al. 2010). Insgesamt handelt es sich bei dentalen Erosionen um

eine irreversible und schichtweise Abtragung der Zahnhartsubstanzen (Meurman und ten Cate 1996).

2.3 Ätiologie und Lokalisation

Die Entstehung von dentalen Erosionen kann als multifaktorielles Geschehen betrachtet werden, wobei man drei Gruppen von Faktoren klassifiziert. Man unterscheidet extrinsische, intrinsische und biologische Einflüsse (Lussi et al. 2007), die im Folgenden genauer beschrieben werden sollen.

2.3.1 Extrinsische Faktoren

Saure Nahrungsmittel und Getränke, Medikamente, berufsbedingte Säureexposition und umweltbedingte Faktoren zählen zu den extrinsischen Faktoren, die eine Erosion auslösen können (Zero 1996). Erosionen, die durch extrinsische Faktoren hervorgerufen werden, sind zumeist fazial und okklusal lokalisiert (Eccles und Jenkins 1974).

Zu den erosiven Getränken und Nahrungsmitteln gehören Softdrinks, Limonaden, saure Fruchtsäfte und Früchte, Smoothies, isotonische Sportgetränke, Wein, saure Süßigkeiten, Salatdressings und Essigprodukte (Järvinen et al. 1991, Nahás Pires Corrêa et al. 2011, Blacker und Chadwick 2013). In der Literatur werden verschiedene Schwellenwerte für den pH-Wert angegeben, wonach Substanzen mit darunterliegenden pH-Werten als potentiell erosiv gelten (Stephan 1966: 4,0; Larsen und Nyvad 1999: 5,5). Die Erosivität einer sauren Substanz ist zudem abhängig von ihrem pKs-Wert. Dieser bemisst die Protonenabgabe während einer chemischen Reaktion (Rytömaa et al. 1988). Deshalb können Nahrungsmittel und Getränke mit ähnlichen pH-Werten unterschiedlich erosiv sein. Die Konzentration von Kalzium und Phosphat in einem Nahrungsmittel oder Getränk beeinflusst ebenfalls die Erosivität. Trotz eines niedrigen pH-Wertes von ca. 3,8 verursacht Joghurt aufgrund seines hohen Anteils an Kalzium und Phosphat keine Erosionen (Larsen und Nyvad 1999).

Ein erhöhtes Risiko für Erosionen besteht bei vegetarischer, veganer und rohköstlicher Ernährung. Diese Formen der Ernährung zeichnen sich durch einen erhöhten Konsum von Gemüse und Früchten aus und gelten gemeinhin als gesunder Lebensstil. Linkosalo und Markkanen (1985) zeigten, dass Vegetarier

eine bedeutend höhere Prävalenz von Erosionen haben. Ganss et al. (1999) fanden heraus, dass Rohköstler häufiger und schwerer von Erosionen betroffen sind.

Ein Lebensstil, der sich durch ein hohes Maß an Gesundheitsbewusstsein auszeichnet, korreliert häufig auch mit einer überdurchschnittlich guten Mundhygiene (Graehn 1991). Mundhygieneprodukte, die Ethylendiamintetraessigsäure (EDTA) beinhalten oder einen niedrigen pH-Wert aufweisen, wie Listerine® und Hexetidin-Mundspüllösungen, können Erosionen begünstigen (Rytömaa et al. 1989, Pontefract et al. 2001). Der niedrige pH-Wert von fluoridhaltigen Mundhygieneprodukten stellt hier eine Ausnahme dar. Die kariespräventive Eigenschaft von Fluoriden basiert auf der Bildung einer an Kalziumfluorid reichen Deckschicht. Die Bildung dieser Kalziumfluoride hängt stark von der Verfügbarkeit von Kalzium ab. Je saurer ein Mundhygieneprodukt, desto mehr Kalzium kann aus dem Zahn oder aus dem Speichel gelöst und zur Bildung von Kalziumfluorid zur Verfügung gestellt werden. Dieses Kalziumfluorid-Präzipitat schützt die Zahnoberfläche vor Säureattacken (Attin et al. 1999).

Erosionen können auch mit der Einnahme verschiedener Medikamente assoziiert sein. Das Kauen von Acetylsalicylsäure und Vitamin-C-Präparaten kann zu Erosionen auf den Okklusalfächen führen (Sullivan und Kramer 1983). Der potentielle Zusammenhang von Asthma bronchiale und Erosionen wird in einigen Studien untersucht, da der saure pH-Wert bestimmter Asthmasprays als erosionsfördernd diskutiert wird. Während Al-Dlaigan et al (2002) und McDerra et al. (1998) einen signifikanten Zusammenhang beobachteten, konnten Dugmore und Rock (2003b) dies nicht bestätigen. Medikamente, die die Speichelfließrate herabsetzen und deshalb Erosionen begünstigen, sind: Antihistaminika, Retinoide, Diuretika, Tranquilizer, Anti-Parkinson-Medikamente, Anti-HIV-Medikamente, Anti-Migräne-Medikamente, Sympathomimetika, Antiemetika, Antidepressiva, Bronchodilatoren, Muskelrelaxantien, Zytostatika und Antihypertonika (Wynn und Meiller 2001, Scully 2003).

Zu den Berufsgruppen mit einem erhöhten Risiko für Erosionen zählen Personen, die in der Batterie-Industrie und Galvanotechnik beschäftigt und dabei regelmäßig Schwefel- oder Salzsäuredämpfen ausgesetzt sind. Kim und Douglass (2003) stellten ein hohes Risiko für Erosionen durch die Exposition

gegenüber säurehaltigen Dämpfen fest. Das Tragen von Gesichtsmasken mindert dieses Risiko. Erosionen, die durch säurehaltige Dämpfe entstehen, sind zumeist an den Labialflächen der mittleren oberen Frontzähne lokalisiert (Amin et al. 2001). Studien, die chloriertes Wasser als Risikofaktor untersuchen, zeigen bei Profischwimmern eine höhere Prävalenz für Erosionen verglichen mit den Kontrollgruppen (Centerwall et al. 1986, Buczkowska-Radlińska et al. 2013).

2.3.2 Intrinsische Faktoren

Zu den intrinsischen Faktoren zählen Magensäure und saurer Mageninhalt (Järvinen et al. 1988). Erkrankungen, die dazu führen, dass Magensaft wiederholt in die Mundhöhle gelangt, sind gastroösophagealer Reflux (*gastroesophageal reflux disease, GERD*), Essstörungen (Bulimia nervosa und Ruminatio) und chronisches Erbrechen als Folge anderer Erkrankungen oder Nebenwirkung einer Medikation (Scheutzel 1996). Ein weiterer Grund für häufiges Erbrechen ist eine Schwangerschaft. Erosionen, die durch intrinsische Faktoren hervorgerufen werden, sind vor allem auf den palatinalen und lingualen Flächen der Zähne lokalisiert (Bartlett et al. 1996, Shaw und O'Sullivan 2000).

Der pH-Wert von Magensäure liegt mit etwa 1,0 bis 1,5 weit unterhalb des kritischen Wertes für Zahnschmelz (Jones et al. 2002). Verglichen mit Erfrischungsgetränken hat Magensäure ein höheres erosives Potential und löst in vitro bei identischer Einwirkzeit mehr Kalzium aus den Zahnhartgeweben (Bartlett und Coward 2001).

Einige Studien untersuchen den Zusammenhang von gastroösophagealem Reflux und Erosionen (Benages et al. 2006, Di Fede et al. 2008, Correa et al. 2012). Benages et al. (2006) beobachteten, dass Reflux mit häufigeren und schwereren Erosionen einhergeht. Ein Symptom der Reflux-Erkrankung ist die Regurgitation (Janssens et al. 1986). Durch sie gelangt Mageninhalt aufgrund einer Ringmuskel-Insuffizienz zurück in den Ösophagus oder die Mundhöhle. Di Fede et al. (2008) stellten hingegen keinen Zusammenhang zwischen Reflux und Erosionen, jedoch zwischen Reflux und einer verminderten Speichelfließrate (Xerostomie) fest. Die Bulimie ist eine weitere Erkrankung, die im Zusammenhang mit dem Vorliegen von Erosionen diskutiert wird. Ein erhöhtes Risiko

für Erosionen bei Bulimikern stellt in erster Linie das häufige Erbrechen dar (Bartlett und Coward 2001). In klinischen Studien zeigt sich, dass Bulimia nervosa auch mit einer verminderten Speichelfließrate assoziiert ist (Rytömaa et al. 1998, Ohrn und Angmar-Mansson 2000). Ebenfalls besteht eine Tendenz zu Alkohol-Abusus (Lilenfeld et al. 2000). Es wird ein Zusammenhang von Alkoholumismus und Erosionen diskutiert. Alkoholiker konsumieren vermehrt saure Getränke und erbrechen häufiger (Robb und Smith 1990, Dukic et al. 2010).

Während einer Schwangerschaft sind Frauen einem erhöhten Risiko ausgesetzt, dentale Erosionen zu entwickeln. Bei einer Mehrzahl der Schwangeren tritt besonders in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft eine chronische Übelkeit auf, die in einigen Fällen zu häufigem Erbrechen führt (Lacasse et al. 2008). Auch gastroösophagealer Reflux kann während einer Schwangerschaft gehäuft auftreten (Naumann et al. 2012). Patienten, bei denen eine Chemotherapie Anwendung findet, leiden häufig unter Übelkeit und chronischem Erbrechen (Jordan et al. 2015). Zusätzlich tritt eine verminderte Speichelfließrate als Nebenwirkung der Chemotherapie auf (Scully 2003). Antiemetika, die zur Behandlung von CINV (*chemotherapy-induced nausea and vomiting*) eingesetzt werden, setzen ebenfalls die Speichelfließrate herab.

2.3.3 Biologische Faktoren

Zu den biologischen Faktoren zählen der Speichel, die Anatomie der Zähne, die Anatomie und Zusammensetzung der Zahnhartsubstanzen, die Okklusion und die Anatomie der oralen Weichgewebe (Zero 1996). Die Interaktion der biologischen Faktoren beeinflusst gemeinsam mit erosiven Substanzen und erosionsfördernden Verhaltensweisen im Zeitverlauf die Entwicklung erosiver Defekte (Zero und Lussi 2000).

Der Speichel gilt als wichtigster biologischer Faktor bei der Entstehung von Erosionen. Er verdünnt, neutralisiert und puffert Säuren. Üblicherweise wird die Speichelfließrate durch gustatorische Reize verstärkt (Engelen et al. 2003). Ein reduzierter Speichelfluss wird z. B. bei Personen, die mit Bestrahlung im Kopf- und Halsbereich therapiert werden, beobachtet (Dreizen et al. 1977). Klinisch zeigt sich ein Zusammenhang zwischen geringer Speichelfließrate, verminderter Pufferkapazität und der Entstehung von dentalen Erosionen (Järvinen et al. 1991, Bartlett et al. 1998, González-Aragón et al. 2016).

In der Literatur wird das Potential des Speichels zur Remineralisation von dentalen Erosionen diskutiert (Larsen und Fejerskov 1989, Attin et al. 2000, Hara et al. 2008). Erosionen sind durch den Speichel kaum remineralisierbar, da nach vollständiger Auflösung der Zahnoberfläche durch Säuren nur eine dünne remineralisierte Schicht zurückbleibt, die remineralisierbar wäre (Lussi et al. 2011).

Zudem variieren die Pufferkapazität und das Remineralisationspotential des Speichels lokal in der Mundhöhle. Der seröse Speichel der Glandula parotidea weist eine größere Pufferkapazität und ein höheres Remineralisationspotential auf, als der sero-muköse Speichel der Glandula submandibularis und der mukoseröse Speichel der Glandula sublingualis (Millward et al. 1997, Young und Khan 2002, Lussi et al. 2012).

Weiterhin ist der Speichel an der Bildung der Pellikel (*acquired salivary pellicle*) beteiligt, die sich größtenteils aus Speichelproteinen formiert und sich unmittelbar nach Zahnreinigung auf den Zahnoberflächen bildet. Neben Speichelproteinen finden sich in dieser semipermeablen Membran Proteine der gingivalen Sulkusflüssigkeit, des Blutes, der Wangenschleimhaut, der Nahrung und bakteriellen Ursprungs (Hannig und Joiner 2006). Studien zeigen, dass die Pellikel in Abhängigkeit von ihrer Dicke und Reifungszeit die Zahnhartsubstanzen bis zu einem gewissen Grad vor erosiven Säureangriffen schützen kann (Amaechi et al. 1999b, Hannig et al. 2003, Wiegand et al. 2008).

Eine weitere physiologische Einflussgröße für die Entstehung von dentalen Erosionen sind die Zusammensetzung und die Anatomie der Zahnhartsubstanzen. Der Zahnschmelz besteht zu 2 Gew.-% aus organischer Substanz und zu 98 Gew.-% aus anorganischen Mineralien, die in einem Gerüst aus hexagonalen Hydroxylapatit-Prismen verdichtet sind. Dentin setzt sich hingegen zu 20 Gew.-% aus organischen und 80 Gew.-% aus anorganischen Bestandteilen zusammen (Schroeder 2000). Die Kristalle der anorganischen Matrix sind im Dentin lockerer angeordnet und kleiner als im Zahnschmelz. Zudem weist die anorganische Matrix des Dentins mehr Verunreinigungen in Form von Carbonat-, Natrium- und Magnesium-Ionen als die anorganische Matrix des Schmelzes auf. Daraus resultiert, dass Dentin eine höhere Säurelöslichkeit zeigt als Schmelz (Shellis et al. 2014). Andererseits enthält das Dentin Kollagenfasern,

die nach Demineralisation durch Säuren zunächst erhalten bleiben und für eine gewisse Zeit vor voranschreitender Erosion schützen. Solange die freiliegenden Kollagenfasern hydriert und vital sind, stellen sie eine Diffusionsbarriere für Säuren dar. Sie verhindern, dass weitere Mineralien aus dem darunterliegenden und noch intakten Dentin herausgelöst werden (Ganss et al. 2004, Hara et al. 2005).

2.3.3.1 Die Interaktion von Erosion, Attrition und Abrasion

Attrition und Abrasion der Zahnhartsubstanzen sind bis zu einem gewissen Grad als physiologische Zahnabnutzung zu verstehen, können aber pathologische Formen annehmen. Attrition wird als Zwei-Körper-Abrieb durch Zahn-zu-Zahn-Kontakt ohne Beteiligung von Fremdkörpern, Abrasion als Drei-Körper-Abrieb durch Zahn-zu-Fremdkörper-zu-Zahn-Kontakt definiert. Abrasionen, die durch Nahrungsmittel entstehen, werden Demastikationen genannt (Imfeld 1996).

Die Attrition beeinflusst als Zahn-zu-Zahn-Kontakt die Progredienz der Erosion. In vitro zeigt sich, dass die mechanische Belastung erodierter Zahnoberflächen den Substanzverlust gegenüber der alleinigen Erosion verstärkt (Vieira et al. 2006). So können das Kauen, der Kontakt zu oralen Weichgeweben (z. B. Zunge) oder das Zähneputzen erodierter Zähne zu weiterem Zahnhartsubstanzverlust führen (Lewis und Smith 1973, Gregg et al. 2004, Wiegand et al. 2007).

2.3.3.2 Besonderheiten im Milchgebiss

Die Milchzähne unterscheiden sich im Hinblick auf ihre Größe und ihrer Anatomie des Zahnschmelzes von der bleibenden Dentition. Sie sind insgesamt kleiner als ihre jeweiligen permanenten Nachfolger und haben eine deutlich dünnere Schmelz-Schicht als die bleibenden Zähne (Grine 2005, Mahoney 2013). Histologisch finden sich im Zahnschmelz weitere Unterschiede zwischen der ersten und zweiten Dentition. Die Prismen im Milchzahn-Schmelz sind kleiner und weniger miteinander verbunden. Das lässt ihn poröser erscheinen als den Schmelz der permanenten Zähne (Shellis 1984). Der organische Anteil im Schmelz der ersten Dentition variiert zwischen 0,7% und 12%, und zeigt damit eine größere Bandbreite als der organische Anteil des permanenten Schmelzes mit 0,4% bis 0,8% (Stack 1953). Insgesamt betrachtet ist der

Zahnschmelz im Milchgebiss deutlich geringer mineralisiert und signifikant weicher als in der bleibenden Dentition (Wilson und Beynon 1989, Lussi et al. 2000, Johansson et al. 2001, Magalhães et al. 2009). Hunter et al. (2000) beobachteten in vitro, dass der erosive Prozess bei Milchzähnen schneller in das Dentin fortschreitet als bei bleibenden Zähnen.

Untersuchungen der Hypothese, dass Milchzähne anfälliger für Erosionen und Erosio-Abrasionen sind, zeigen unterschiedliche Ergebnisse. Amaechi et al. (1999a) bestätigten in vitro eine 1,5 Mal höhere Anfälligkeit für Erosionen im Milchgebiss, während Lippert et al. (2004) keinen Unterschied feststellten. Während Correr et al. (2007) durch einen Versuchsaufbau in vitro vergleichsweise stärkere Erosio-Abrasionen an Milchzähnen als an bleibenden Zähnen hervorriefen, fanden Attin et al. (2007) nur geringfügige Unterschiede.

2.4 Epidemiologie

2.4.1 Erosionsindizes für epidemiologische Studien

Zur Anwendung in epidemiologischen Untersuchungen werden seit den 1970er Jahren verschiedene Indizes für die Klassifikation von Erosionen vorgeschlagen. Laut Bardsley (2008) gelten die Indizes nach Eccles (1979, Tabelle 2.1) und Smith und Knight (1984, Tabelle 2.2) als Grundlage zur Klassifikation von nichtkariösen Zahnhartsubstanzdefekten, auf der viele weitere Indizes entwickelt wurden.

Grad	Zahnfläche	Kriterium
I		Frühe Anzeichen von Erosion; Verlust von Perikymatien, glatte Oberfläche, hauptsächlich auf den labialen Zahnflächen der Schneide- und Eckzähne im Oberkiefer
II	Fazial	Dentinbeteiligung von weniger als $\frac{1}{3}$ der Zahnfläche
		Typ 1: ovale oder halbmondförmige konkave Läsion im zervikalen Bereich, die sich deutlich von einem keilförmigen Defekt unterscheidet Typ 2: Unregelmäßige Läsion auf der gesamten Zahnfläche, die durch den Verlust von Schmelz wie ausgestanzt erscheint
IIIa	Fazial	Noch ausgedehntere Dentinbeteiligung, besonders an den Frontzähnen; häufiger ist ein Großteil der Zahnfläche betroffen, aber auch enger begrenzte Läsionen, die wie ausgewaschen erscheinen, treten auf
IIIb	Lingual/ Palatinal	Mehr als $\frac{1}{3}$ der Zahnfläche ist betroffen; Inzisalkanten werden aufgrund von Dentinverlust transluzent; das Dentin wirkt glatt und manchmal abgeflacht oder ausgewaschen; gingivale und proximale Ränder erscheinen weiß und angeätzt
IIIc	Inzisal/ Okklusal	Inzisalkanten oder okklusale Höcker sind bis in das Dentin flach oder schüsselförmig ausgewaschen, Füllungsänderer erscheinen höher als die sie umgebende Zahnoberfläche, Inzisalkanten sind aufgrund des unterminierten Schmelzes transluzent
IIId	Alle Flächen	Stark betroffene Zähne, wobei sowohl labiale als auch linguale bzw. palatinale Flächen ausgedehnt beteiligt sind

Tabelle 2.1: Erosions-Index nach Eccles 1979.

Grad	Zahnfläche	Kriterium
0	Bukkal, Oral, Okklusal, Inzisal	Kein Verlust der Oberflächenstruktur im Schmelz
	Zervikal	Kein Verlust der Kontur
1	Bukkal, Oral, Okklusal, Inzisal	Verlust der Oberflächenstruktur im Schmelz
	Zervikal	Minimaler Verlust der Kontur
2	Bukkal, Oral, Okklusal	Schmelzverlust mit freiliegendem Dentin auf weniger als $\frac{1}{3}$ der Oberfläche
	Inzisal	Schmelzverlust mit freiliegendem Dentin
	Zervikal	Defekt von weniger als 1 mm Tiefe
3	Bukkal, Oral, Okklusal	Schmelzverlust mit freiliegendem Dentin auf mehr als $\frac{1}{3}$ der Oberfläche
	Inzisal	Schmelzverlust mit tief freiliegendem Dentin
	Zervikal	Defekt von 1 bis 2 mm Tiefe
4	Bukkal, Oral, Okklusal	Kompletter Schmelzverlust oder Pulpafreilegung oder Exposition von Sekundärdentin
	Inzisal	Pulpa- oder Sekundärdentin-Freilegung
	Zervikal	Defekt ab 2 mm Tiefe mit Pulpa- oder Sekundärdentin-Freilegung

Tabelle 2.2: „Tooth Wear Index“ nach Smith und Knight 1984.

Der Index nach O'Sullivan (2000) wurde speziell für die Anwendung im Milchgebiss und der frühen 2. Dentition entwickelt. Er zeichnet sich durch eine große Genauigkeit in der Bewertung von dentalen Erosionen aus (Tabelle 3.1, Kapitel 3). Ein relativ neuer Index zur Klassifikation von dentalen Erosionen bei Kindern und Erwachsenen wird von Bartlett et al. (2008) in der Literatur vorgestellt (Tabelle 3.2, Kapitel 3). Die Autoren schlagen den BEWE-Index (*Basic Erosive Wear Examination*) als Grundlage zur Entwicklung eines international standardisierten Index vor, der die Vergleichbarkeit von Studien untereinander verbessern soll. Aufgrund seiner Einfachheit soll auch ein Vergleich mit Studien mög-

lich sein, innerhalb derer zur Klassifikation von Erosionen andere Indizes verwendet wurden.

2.4.2 Prävalenz bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern

Die Prävalenz von dentalen Erosionen bei Erwachsenen wird seit den 1970er Jahren, die Prävalenz von Kindern und Jugendlichen seit den 1990er Jahren vielfach untersucht. Aufgrund unterschiedlicher Indizes und Untersuchungsmethoden lassen sich die heterogenen Ergebnisse nur schwer miteinander vergleichen. Ein Großteil der Daten basiert auf klinischen Untersuchungen und wurde anhand der Beurteilung der gesamten Dentition oder einzelner Markerzähne gewonnen. Es wurden aber auch epidemiologische Studien auf der Grundlage von extrahierten Zähnen (Sognnaes et al. 1972), Modellen (Ganss et al. 2001) oder Fotos von Modellen (Khan et al. 2001) durchgeführt.

Im Folgenden soll der Fokus auf den Studien liegen, die zur Ermittlung der Prävalenz im Rahmen einer klinischen Untersuchung die gesamte Dentition und alle Zahnflächen bewerteten (Tabellen 2.3 bis 2.6).

Für Erwachsene wird eine Prävalenz von 5% (Järvinen et al. 1991) bis 100% (Donachie und Walls 1995, Bartlett et al. 2011) angegeben (Tabelle 2.3).

Autoren und Jahr	N	Alter	Index	Prävalenz
Xhonga und Valdmanis 1983	527	14 – 88	Eigene Kriterien	25%
Järvinen et al. 1991	100	17 – 83	Eccles und Jenkins	5%
Lussi et al. 1991	391	26 – 30 46 – 50	Lussi	35,6% 42,6%
Donachie und Walls 1995	586	45 –	TWI (Tooth Wear Index)	100%
Smith und Robb 1996	210	15 – 26	TWI	5,7%*
	195	26 – 35		3,4%*
	234	36 – 45		3,8%*
	154	46 – 55		4,6%*
	126	56 – 65		8,2%*
	88	65 –		8,8%*
Jaeggi et al. 1999	417	19 – 25	Lussi	82%
Schiffner et al. 2002	655	35 – 44	Lussi	10,7%
	1027	65 – 74		7,9%
Bartlett et al. 2011	1010	18 – 30	TWI	100%
Mulic et al. 2012	1456	18	VEDE (Visual Erosion Dental Examination)	38%
Manaf et al. 2012	150	19 – 24	BEWE (Basic Erosive Wear Examination)	68%
Vered et al. 2014	500	15 – 18	BEWE	36,6%
		25 – 28		42,0%
		35 – 38		55,8%
		45 – 48		53,1%
		55 – 60		61,9%
Zebrauskas et al. 2014	56	18 – 25	Lussi	50%
Chu et al. 2015	600	18 – 21	BEWE	44%
Kitasako et al. 2015	1108	15 – 89	Modifizierter TWI	26,1%

Tabelle 2.3: Prävalenz dentaler Erosionen bei Erwachsenen in chronologischer Reihenfolge. N = Anzahl der Probanden, Alter in Jahren, % - Prozent der Studienteilnehmer, %* - Prozent der Zahnflächen.

Für Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 17 Jahren finden sich Angaben von 1,4% (Kirthiga et al. 2015) bis 100% (Al-Dlaigan et al. 2001).

Autoren und Jahr	N	Alter	Index	Prävalenz
Al-Dlaigan et al. 2001	418	14	Modifizierter TWI	100%
Van Rijkom et al. 2002	345 400	10 – 13 15 – 16	Modifizierter Lussi	3% 30%
Arnadottir et al. 2003	278	15	Modifizierter Lussi	21,6%
Caglar et al. 2005	153	11	O'Sullivan	28%
Larsen et al. 2005	558	15 – 17	Modifizierter Lussi	14%**
Correr et al. 2009	389	12	O'Sullivan	26%
El-Aidi et al. 2010	622	11 12 13 14 15	Modifizierter Lussi	30,4% 38,3% 40,6% 42,6% 44,2%
Caglar et al. 2011	83	7 – 11 12 – 14	Lussi	47,4% 52,6%
Nahás Pirres Côrrea et al. 2011	232	2 – 20	Modifizierter Index nach O'Brien	25,4%
Kaczmarek et al. 2012	180	15	BEWE	36,1%
Kumar et al. 2013	605	11 – 14	O'Sullivan	8,9%
Zhang et al. 2014	600	12	BEWE	75%
Zebrauskas et al. 2014	76	12 – 17	Lussi	25%
Alves et al. 2015	1528	12	BEWE	15%
Muller-Bolla et al. 2015	339	14	BEWE	39%***
Kirthiga et al. 2015	2000	11 – 16	O'Sullivan	1,4%

Autoren und Jahr	N	Alter	Index	Prävalenz
Alvarez Loureiro et al. 2015	1136	12	BEWE	52,9%
González-Aragón et al. 2016	417	14 – 19	Lussi	31,7%

Tabelle 2.4: Prävalenz dentaler Erosionen bei Kindern und Jugendlichen zwischen 10 und 17 Jahren in chronologischer Reihenfolge. N = Anzahl der Probanden, Alter in Jahren, % - Prozent der Studienteilnehmer, %* - Prozent der Erosionen mit Dentinbeteiligung, % - Prozent der Studienteilnehmer mit mehr als 3 betroffenen Zahnflächen, %*** - Prozent der Studienteilnehmer mit einem BEWE-Summenscore ≥ 3 .**

Die Prävalenz von Erosionen bei Kindern bis 9 Jahre variiert zwischen 0,6% (Moimaz et al. 2013) und 100% (Jaeggi und Lussi 2004). Studien zur Prävalenz in dieser Altersgruppe, deren Ergebnisse auf der Bewertung von Milchzähnen und zum Teil der frühen zweiten Dentition basieren, werden in Tabelle 2.5 vorgestellt.

Autoren und Jahr	N	Alter	Index	Prävalenz	Bewertete Dentition
Jaeggi und Lussi 2004	42	5 – 9	Lussi	100%* 14,3%**	Milchgebiss und bleibende Zähne
Wiegand et al. 2006	463	2 – 7	O'Sullivan	32%* 0%**	Milchgebiss und bleibende Zähne
Taji et al. 2010	128	2 – 4	Modifizierter Index nach Aine	75%	Milchgebiss
Gatou und Mamai-Homata 2012	243	5 – 7	TWI	98,4%	Milchgebiss
Moimaz et al. 2013	1993	4 – 6	TWI	0,6%	Milchgebiss
Mantonanaki et al. 2013	605	5	BEWE	78,8%	Milchgebiss
Tao et al. 2015	1837	3 – 6	O'Sullivan	15,1%	Milchgebiss
Huang et al. 2015	154	2 3 4	Modifizierter TWI	0% 7% 33%	Milchgebiss

Tabelle 2.5: Prävalenz dentaler Erosionen bei Kindern bis einschließlich 9 Jahre in chronologischer Reihenfolge. N = Anzahl der Probanden, Alter in Jahren, % - Prozent der Studienteilnehmer, %* Prävalenz im Milchgebiss, % Prävalenz im bleibenden Gebiss.**

2.4.3 Inzidenz und Progression

Ganss et al. (2001) führten eine Studie zur Prävalenz und Inzidenz an Zähnen der bleibenden Dentition anhand von kieferorthopädischen Studienmodellen

durch. Sie stellten eine Inzidenz von 18,7% (Inzidenzrate: 4,1%) innerhalb von fünf Jahren fest.

Dugmore und Rock (2003a) untersuchten die bleibenden Zähne von 1308 12-jährigen Schülern. Sie ermittelten für einen Zeitraum von zwei Jahren eine Inzidenz von 28,1% (Inzidenzrate: 16,5%), und bei 26,8% der Schüler eine Progression der dentalen Erosionen.

El-Aidi et al. (2010) führten eine Studie mit 622 teilnehmenden Jugendlichen durch, deren bleibende Zähne untersucht wurden. Die Inzidenz bei 11-jährigen Kindern lag bei 26,5% (1,5 Jahre) bzw. 27,3% (3 Jahre). Dies entspricht Inzidenzraten von 20,5% bzw. 10,6%. Die Progression lag bei 36,8% (1,5 Jahre) und 56,3% (3 Jahre). Die Inzidenz bei 12-jährigen Kindern lag bei 15,8% (1,5 Jahre) und bei 20,2% (3 Jahre). Dies entspricht Inzidenzraten von 11,5% bzw. 7,5%. Die Progression lag bei 29% (1,5 Jahre) und 44,9% (3 Jahre).

Huang et al. (2015) untersuchten die Milchzähne von 154 Kindern und stellten innerhalb von 2 Jahren eine Inzidenz von 33% fest. Dies entspricht einer Inzidenzrate von 20,3%.

Lussi et al. (1991) untersuchten die bleibenden Zähne von 55 Probanden. Sie stellten in der Altersgruppe der 26- bis 32-Jährigen eine Zunahme von 5% und in der Altersgruppe der 46- bis 50-Jährigen von 18% für okklusale Dentin-Erosionen nach sechs Jahren fest. Sie zeigten, dass sich die okklusalen Dentin-Erosionen innerhalb von sechs Jahren bei den 46- bis 50-Jährigen verdreifacht hatten. Bei den 46- bis 50-Jährigen war die Progression deutlich ausgeprägter als bei den 26- bis 32-Jährigen.

2.4.4 Risikofaktoren

In den verschiedenen epidemiologischen Studien zur Prävalenz und Inzidenz bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen finden sich zumeist auch Risikofaktoranalysen zur Klärung der Ätiologie von dentalen Erosionen.

Der Konsum von Softdrinks (Järvinen et al. 1991, Al-Majed et al. 2002, Harding et al. 2003, Murakami et al. 2011, Mulic et al. 2012, Gatou und Mamai-Homata 2012) und sauren Fruchtsäften (Luo et al. 2005, Mulic et al. 2012, Zhang et al. 2014) wird oft als signifikanter Risikofaktor für Erosionen identifiziert. Der

Konsum von sauren Getränken zur Schlafenszeit (Al-Majed et al. 2002) korreliert ebenso mit dem Auftreten von dentalen Erosionen wie das Hin- und Herschwenken von sauren Getränken im Mund vor dem Schlucken (Alvarez Loureiro et al. 2015). Je länger ein saures Getränk im Mund gehalten wird, desto größer ist das Risiko, dentale Erosionen zu entwickeln (Al-Majed et al. 2002). Neben sauren Getränken werden auch Obst und Früchte (Vered et al. 2014, Kitasako et al. 2015, Alves et al. 2015), Essig (Järvinen et al. 1991, Tao et al. 2015) sowie saure Süßigkeiten (Muller-Bolla et al. 2015) als Risikofaktoren für Erosionen identifiziert.

Das Mundhygieneverhalten hat ebenfalls einen Einfluss auf die Entstehung von Erosionen. Mulic et al. (2012) und Muller-Bolla et al. (2015) stellten einen positiven Zusammenhang zwischen schlechter Mundhygiene und dem Auftreten von Erosionen fest. Mantonanaki et al. (2013) kamen in ihrer Studie zu einem entgegengesetzten Ergebnis. Wiegand et al. (2006) zeigten, dass Kinder zwischen 2 und 7 Jahren, die ihre Zähne selbst putzen und nicht von den Eltern nachgeputzt bekommen, ein höheres Risiko haben, dentale Erosionen zu entwickeln.

Al-Malik et al. (2002) und Zhang et al. (2014) untersuchten die Korrelation von Karies und dentalen Erosionen. Beide Studien zeigen, dass Probanden mit Karieserfahrung deutlich mehr Erosionen aufweisen. Der sozioökonomische Status wird in vielen Studien als potentielle Einflussgröße für Erosionen untersucht. Die Ergebnisse sind teilweise widersprüchlich. Einige Studien zeigen, dass Probanden aus einem niedrigen sozioökonomischen Umfeld signifikant mehr Erosionen haben (Harding et al. 2003, Muller-Bolla et al. 2015). Im Gegensatz dazu stellen andere Studien fest, dass ein hoher sozioökonomischer Status mit signifikant mehr Erosionen einhergeht (Millward et al. 1994, Luo et al. 2005). Mantonanaki et al. (2013) identifizierten sowohl ein niedriges Bildungsniveau der Mutter als auch ein hohes Familieneinkommen als Risikofaktor für Erosionen bei 5-jährigen Kindern.

Zahlreiche Studien kommen zu dem Ergebnis, dass das Geschlecht der Studienteilnehmer mit der Häufigkeit und dem Schweregrad von Erosionen korreliert. Jungen und Männer sind signifikant häufiger von Erosionen betroffen als Mädchen und Frauen (Bere et al. 2008, Hasselkvist et al. 2010, El-Aidi et al. 2010, Gatou und Mamai-Homata 2012). Mulic et al. (2012), Gatou und Mamai-

Homata (2012) und Alvarez Loureiro et al. (2015) zeigten außerdem, dass männliche Probanden schwerere Erosionen haben. Wenige Studien beobachteten hingegen, dass das weibliche Geschlecht signifikant häufiger von Erosionen betroffen ist (Huew et al. 2012, Picos et al. 2013).

Einige Studien zeigen, dass das Risiko für Erosionen mit steigendem Alter zunimmt (Wiegand et al. 2006, Taji et al. 2010, Murakami et al. 2011, Gatou und Mamai-Homata 2012). Ganss et al. (2001) stellten fest, dass Erosionen im Milchgebiss ein signifikantes Risiko für die Entwicklung von Erosionen im bleibenden Gebiss darstellen.

Bardsley et al. (2004) stellten Trinkwasser-Fluoridierung und den zweimaligen täglichen Gebrauch von fluoridierter Zahnpasta als signifikant protektive Einflussgröße bei der Entstehung von Erosionen fest. Die Frequenz des Milchkonsums ist ebenfalls mit einer geringeren Prävalenz für Erosionen oder weniger schweren Erosionen assoziiert (Nahás Pires Corrêa et al. 2011, Wiegand et al. 2006).

Tabelle 2.6 gibt abschließend eine Übersicht über in epidemiologischen Untersuchungen identifizierte Risikofaktoren bei Kindern zwischen 2 und 9 Jahren.

Autoren und Jahr	N	Land	Alter	Identifizierte Risikofaktoren / signifikante Ergebnisse
Millward et al. 1994	178	Groß-Britannien	4	<ul style="list-style-type: none"> • Hoher sozioökonomischer Status
Al-Malik et al. 2002	987	Saudi-Arabien	2 – 5	<ul style="list-style-type: none"> • Karies
Al-Majed et al. 2002	354	Saudi-Arabien	5 – 6	<ul style="list-style-type: none"> • Softdrinks zur Schlafenszeit • Dauer, während der Getränke vor dem Schlucken im Mund gehalten werden
Harding et al. 2003	202	Irland	5	<ul style="list-style-type: none"> • Fruchtmus, Softdrinks $\geq 1/\text{Tag}$ • Niedriges Familieneinkommen
Luo et al. 2005	1949	China	3 – 5	<ul style="list-style-type: none"> • Hoher Bildungsgrad der Eltern • Fruchtsaft via Fläschchen • Fruchtsaft zur Schlafenszeit
Wiegand et al. 2006	463	Deutschland	2 – 7	<ul style="list-style-type: none"> • Erosionen nehmen mit dem Alter zu • Jungen > Mädchen • Milch protektiv • Kinder putzen selbst Zähne ohne Nachputzen der Eltern: höheres Risiko für Erosionen
Taji et al. 2010	128	Australien	2 – 4	<ul style="list-style-type: none"> • Schwere der Erosionen nimmt mit zunehmendem Alter zu
Murakami et al 2011	967	Brasilien	3 – 4	<ul style="list-style-type: none"> • Softdrinks 2/Tag oder >3/Tag • Gastro-Ösophagealer Reflux • Erosionen nehmen mit dem Alter zu
Gatou und Mamai-Homata 2012	243	Griechenland	5 – 7	<ul style="list-style-type: none"> • Softdrinks: Prävalenz und Schwere • Jungen > Mädchen • Jungen: schwerere Erosionen • Immigranten > Griechen • Erosionen nehmen mit dem Alter zu

Autoren und Jahr	N	Land	Alter	Identifizierte Risikofaktoren / signifikante Ergebnisse
Nayak et al. 2012	1002	Indien	5	<ul style="list-style-type: none"> • Konsumhäufigkeit von Säften, roher Mango, Tamarindenfrucht, Stachelbeeren und Buttermilch • Zähneputzen $\geq 2/\text{Tag}$
Mantonanaki et al. 2013	605	Griechenland	5	<ul style="list-style-type: none"> • Gute Mundhygiene • Niedriger Bildungsgrad der Mutter • Hohes Familieneinkommen
Tao et al. 2015	1837	China	3 – 6	<ul style="list-style-type: none"> • Essig-/Kaffee-/Tee-Konsum • Hoher Bildungsgrad der Mutter • Geburtsort • Regurgitation
Huang et al. 2015	154	Australien	2 – 4	<ul style="list-style-type: none"> • Nahrungsaufnahme via Fläschchen • Erosionen nehmen mit dem Alter zu

Tabelle 2.6: Epidemiologische Studien bei Kindern zwischen 2 und 9 Jahren, die eine Risikofaktoranalyse enthalten (in chronologischer Reihenfolge). N = Anzahl der Probanden, Alter in Jahren.

3 Probanden und Methoden

3.1 Kontaktaufnahme und Probandengut

Vor der Durchführung der Untersuchung wurde die Studie von der Ethikkommission der Universität Göttingen begutachtet und unter der Nummer 8/11/14 genehmigt.

Im Rahmen der vorliegenden Studie wurden 62 Kindergärten mit insgesamt 2800 Kindergartenplätzen im Stadtgebiet von Göttingen eingeladen, an der Untersuchung teilzunehmen. Nach persönlicher Vorstellung der Untersucherin, Aufklärung über das Ziel der Studie und Information über den Ablauf der Untersuchung willigten 27 Einrichtungen ein, an der Studie teilzunehmen. Vor Beginn der klinischen Untersuchung wurden alle Eltern der 3- bis 7-jährigen Kinder über Ablauf und Ziel der Studie mündlich und schriftlich informiert; die Erziehungsberechtigten von 777 Kindern gaben Ihr schriftliches Einverständnis zur Teilnahme an der Studie.

Die Eltern wurden gebeten, auf einem pseudonymisierten Anamnesebogen Allgemeinerkrankungen, Ernährungs- und Mundhygienegewohnheiten ihres Kindes anzugeben. Die Erzieherinnen und Erzieher in den Kindergärten wurden gebeten, einen Fragebogen bezüglich Ernährung und Mundhygiene in ihrer Einrichtung zu beantworten.

3.2 Untersuchung

An der klinischen Untersuchung nahmen 777 Kinder teil. Alle Kinder wurden unter standardisierten Bedingungen von einer durch die Leiterin der Studie intensiv kalibrierten Zahnärztin unter Zuhilfenahme einer transportablen Leuchte und Mundspiegel in den Kindergärten untersucht. Die Dokumentation erfolgte durch einen ausgewiesenen Assistenten pseudonymisiert auf einem Auswertungsbogen.

3.3 Erosions-Indizes

Zur klinischen Untersuchung wurde der O'Sullivan-Index (O'Sullivan et al. 2000) herangezogen, der in seiner Anwendung einen Vergleich zu den in Göttingen erhobenen Daten von Wiegand et al. (2006) ermöglichte. Der O'Sullivan-Index (Tabelle 3.1) wurde speziell für die Anwendung im Milchgebiss und der frühen

2. Dentition entwickelt und zeichnet sich durch eine große Genauigkeit in der Bewertung von dentalen Erosionen aus. Jedem Zahn wird bei der Bewertung ein dreiteiliger Code zugewiesen, bestehend aus Fläche, Schweregrad und Größe der betroffenen Fläche.

Fläche	Kriterium
Code A	Ausschließlich labial oder bukkal
Code B	Ausschließlich lingual oder palatinal
Code C	Ausschließlich okklusal oder inzisal
Code D	Labial und inzisal/okklusal
Code E	Lingual und inzisal/okklusal
Code F	Multiple Flächen
Schweregrad	Kriterium
Code 0	Normaler Schmelz
Code 1	Seidenglänzende Schmelzoberfläche ohne Kontinuitätsverlust
Code 2	Kontinuitätsverlust der Schmelzoberfläche
Code 3	Kontinuitätsverlust der Schmelz- und Dentinoberfläche / Schmelz-Dentin-Grenze sichtbar
Code 4	Schmelz- und Dentinverlust unterhalb der Schmelz-Dentin-Grenze
Code 5	Schmelz und Dentinverlust mit Pulpafreilegung
Code 9	Nicht beurteilbar (z. B. Krone, ausgedehnte Karies oder große Restauration)
Größe der betroffenen Fläche	Kriterium
Code –	Weniger als die Hälfte der Fläche betroffen
Code +	Mehr als die Hälfte der Fläche betroffen

Tabelle 3.1: Index zur Klassifizierung dentaler Erosionen im Milchgebiss nach O’Sullivan (2000).

Neben dem O’Sullivan-Index wurde auch der BEWE-Index (*Basic Erosive Wear Examination*, Bartlett et al. 2008) zur Klassifizierung angewendet. Dies ermöglicht eine Vergleichbarkeit zu neueren und zukünftigen Studien. Das Bewertungssystem weist betroffenen Zähnen einen Code von 0 bis 3 zu (Tabelle 3.2).

Code	Kriterium
0	Keine Erosion
1	Beginnender Verlust von Oberflächenstruktur
2*	Deutliche Schädigung, Zahnhartsubstanzverlust von weniger als 50% der Zahnoberfläche
3*	Deutliche Schädigung, Zahnhartsubstanzverlust von mehr als 50% der Zahnoberfläche
*bei Wert 2 und 3 liegt häufig eine Dentinbeteiligung vor	

Tabelle 3.2: BEWE-Bewertungssystem nach Bartlett et al. (2008).

Bei der Anwendung des BEWE-Index wird das zu bewertende Gebiss in Sextanten aufgeteilt. In jedem Sextanten wird nur der am schwersten von Erosion betroffene Zahn bewertet. Der kumulative Wert aller Sextanten ergibt den BEWE-Summenscore zwischen 0 und 18.

Bei der klinischen Untersuchung der Okklusal- und Inzisalfächen wurde darauf geachtet, reine Attritionen von der Bewertung auszuschließen. Das klinische Erscheinungsbild von reinen Attritionen imponiert durch plane, glänzende Schliffacetten von Agonist und Antagonist in Ober- und Unterkiefer, die in der Protrusions- oder Laterotrusions-Bewegung exakt aufeinander führen.

3.4 Inter-Test-Reliabilität

Der BEWE-Index ist im direkten Vergleich zum O’Sullivan-Index ein aggregierteres Maß zur Klassifizierung von dentalen Erosionen und kann aus dem O’Sullivan-Index abgeleitet werden (Tabelle 3.3).

O'Sullivan			BEWE
Fläche	Schweregrad	Größe	Code
F	0	+	0
A-F	1-2	+/-	1
A-F	3-5	-	2
A-F	3-5	+	3

Tabelle 3.3: Schema zur Überführung der O'Sullivan-Codierung in die entsprechende BEWE-Codierung

Um die Inter-Test-Reliabilität zu überprüfen, wurden 656 Zähne von 33 Kindern sowohl mit dem O'Sullivan-Index als auch mit dem BEWE-Index klinisch bewertet (Tabelle 3.4). Die Klassifizierung nach O'Sullivan wurde außerdem entsprechend der in Tabelle 3.3 angegebenen Codierung in BEWE-Werte konvertiert. Danach wurden die tatsächlich erhobenen BEWE-Werte mit denen auf Basis des O'Sullivan-Index abgeleiteten BEWE-Werten statistisch verglichen. Die Übereinstimmung lag bei 98,78%, die erwartete Übereinstimmung bei 61,00%. Es ergab sich ein gewichteter Cohens Kappa-Wert von 0,969.

Aus O'Sullivan Index ab- geleiteter BEWE	BEWE-Untersuchung					
	BEWE	0	1	2	3	gesamt
	0	489	3	0	0	492
	1	3	138	1	0	142
	2	0	1	5	0	6
	3	0	0	0	16	16
	gesamt	492	142	6	16	656

Tabelle 3.4: Inter-Test-Reliabilität

Aufgrund dieser konsistenten Ergebnisse wurden die BEWE-Werte innerhalb dieser Studie systematisch aus dem O'Sullivan-Index abgeleitet und nicht tatsächlich gemessen. Dadurch konnte die Untersuchungszeit der Kinder reduziert werden.

3.5 Inter- und Intra-Untersucher-Reliabilität

Zur Überprüfung der Inter-Untersucher-Reliabilität wurden 53 Kinder mit insgesamt 1076 Zähnen sowohl von der Leiterin (der Untersucherin der Studie von Wiegand et al. 2006) als auch von der Untersucherin der vorliegenden Studie unabhängig voneinander mittels BEWE-Index untersucht (Tabelle 3.5). Die Übereinstimmung lag bei 95.35%, die erwartete Übereinstimmung bei 70.03%. Es ergab sich ein gewichteter Cohens Kappa-Wert von 0.851.

Prof. Dr. Annette Wiegand	Christina Müller Pflanz					
	BEWE	0	1	2	3	gesamt
	0	877	18	1	1	897
	1	4	115	10	8	137
	2	0	0	20	0	20
	3	1	1	6	14	22
	gesamt	882	134	37	23	1076

Tabelle 3.5: Inter-Untersucher-Reliabilität

Zur Überprüfung der Intra-Untersucher-Reliabilität wurden 33 Kinder mit 656 Zähnen jeweils an zwei verschiedenen Zeitpunkten von der Untersucherin der vorliegenden Studie mittels BEWE-Index untersucht (Tabelle 3.6). Die Übereinstimmung lag bei 94.82%, die erwartete Übereinstimmung bei 60.68%. Es ergab sich ein gewichteter Cohens Kappa-Wert von 0,753.

2. Unter- suchung	1. Untersuchung					
	BEWE	0	1	2	3	gesamt
	0	475	13	0	0	488
	1	17	127	2	0	146
	2	0	2	4	0	6
	3	0	0	0	16	16
	gesamt	492	142	6	16	656

Tabelle 3.6: Intra-Untersucher-Reliabilität

3.6 Anamnesebogen

Der von den Erziehungsberechtigten auszufüllende Anamnesebogen orientierte sich inhaltlich an den von Shaw und O'Sullivan (2000) verfassten "UK National Clinical Guidelines in Paediatric Dentistry" und an dem Anamnesebogen der Studie von Wiegand et al. (2006). In drei aufeinanderfolgenden Abschnitten wurden Allgemeinerkrankungen, Medikation, Ernährungsgewohnheiten und Mundhygienemaßnahmen erfragt, wobei besonders die in der Fachliteratur diskutierten Risikofaktoren für Erosionen berücksichtigt wurden (Abbildungen 7.1 und 7.2 im Anhang).

3.7 Kindergarten-Fragebogen

Die Erzieher/innen wurden gebeten, Angaben zu Ernährung und Zahnpflege der Kinder in ihrer Einrichtung zu machen. Zu diesem Zweck wurden die Aspekte des Anamnesebogens, welche in einem Kindergarten von Bedeutung sind, angepasst und zu einem Fragebogen zusammengefasst (Abbildungen 7.3 und 7.4 im Anhang).

3.8 Statistische Auswertung

Die statistische Auswertung wurde in Zusammenarbeit mit Herrn PD Dr. Jung, Zentrale Serviceeinheit Medizinische Biometrie und Statistische Bioinformatik, durchgeführt. Die erhobenen Daten wurden mit Methoden der deskriptiven und induktiven Statistik ausgewertet.

Für die statistische Analyse der epidemiologischen Daten zur Prävalenz fanden unterschiedliche Testverfahren Anwendung. Tabelle 3.7 gibt einen Überblick über das Verfahren in Abhängigkeit der jeweiligen Forschungsfrage.

Untersuchter Zusammenhang	Statistisches Verfahren
Abhängigkeit der Prävalenz vom Alter	Mann-Whitney-U-Test
Vergleich der Prävalenz zwischen Ober- und Unterkiefer	t-Test
Abhängigkeit des Schweregrads der Erosionen (BEWE-Summenscore) vom Alter	Spearman's Rangkorrelationskoeffizient
Vergleich des Schweregrads der Erosionen (BEWE-Summenscore) zwischen den Altersklassen und Jungen und Mädchen	Mann-Whitney-U-Test

Tabelle 3.7: Statistische Verfahren.

Für die Analyse des Einflusses potentieller Risikofaktoren wurden zwei verschiedene Regressionsmodelle geschätzt. Der Einfluss potentieller Faktoren auf das Vorliegen dentaler Erosionen wurde mit logistischen Regressionen, die ordinale Messgröße BEWE-Summenscore mit linearen Regressionen untersucht (Tabelle 3.8).

Messgröße	Skalierung	Statistisches Verfahren
Vorliegen dentaler Erosionen	0 – Kind hat keine Erosion 1 – Kind hat Erosion	Logistische Regression
BEWE-Summenscore	0 – 18	Lineare Regression

Tabelle 3.8: Risikofaktoren: Messgrößen und statistische Verfahren.

Bei beiden Regressionen wurde zur Bestimmung des finalen Modells ein schrittweises Auswahlverfahren angewendet. Einige Variablen konnten aufgrund zu weniger Beobachtungen nicht in die Analyse aufgenommen werden. Dies betraf die Faktoren „Diabetes“, „Reflux“ und „Erbrechen“ aus dem Teil „Allgemeinerkrankungen“ des Anamnesebogens. Darüber hinaus wurden Antworten zu Unterfragen, wie z. B. „Dauer der Stillzeit“ oder „Dauer der Medikation“, aufgrund zu weniger Beobachtungen nicht untersucht (Abbildungen 7.1 und 7.2 im Anhang). Die restlichen Faktoren, die als unabhängige Variablen der schrittweisen Elimination zugeführt wurden, sind in Tabelle 3.9 aufgeführt. Zur Auswertung der Fragebögen aus den Kindergärten wurden zusätzlich die Antworten

zu Ernährung und Mundhygiene aus den Kindergärten der schrittweisen Elimination zugeführt.

	Potentielle Risikofaktoren	Einteilung
Allgemeinerkrankung/ Medikation	Lungenerkrankung/Asthma	0 – nein, 1 – ja
	Therapie mittels Inhalationssprays	0 – nein, 1 – ja
	Allgemeinerkrankung	0 – nein, 1 – ja
	Regelmäßige Medikamenteneinnahme	0 – nein, 1 – ja
	Regelmäßige Fluorideinnahme	0 – nein, 1 – ja
Ernährungsgewohnheiten	Gestillt	0 – nein, 1 – ja
	Fläschchen	0 – nein, 1 – ja
	Fläschchen zum Einschlafen	0 – nein, 1 – ja
	Frequenz des Konsums von:	
	Fruchtsaft pur	1 – nie/selten, 2 – wöchentlich, 3 – täglich, 4 – 2 bis 3 mal täglich, 5 – häufiger
	Fruchtsaft verdünnt	
	Zitronentee	
	Limo/Cola	
	Sprudel	
	Stilles Wasser	
	Milch	
	Zitrusfrüchte	
	Süßigkeiten	
	Zitronensprudel	
	Häufigkeit der Getränkeaufnahme durch:	
	Becher	1 – nie, 2 – selten, 3 – manchmal, 4 – oft, 5 –immer
	Strohalm	
	Trinklernbecher	
	Flasche	

Mundhygiene- Maßnahmen	Zähneputzen:	
	Wer	1 – Kind, 2 – Eltern/Erzieher, 3 – erst Kind, dann Eltern/Erzieher
	Wie oft	Wie oft täglich: 1 – 3
	Wie lange	Minuten: 1 – 3
	Art der Zahnbürste	1 – Handzahnbürste, 2 – Hand- und elektrische Zahnbürste, 3 – elektrische Zahnbürste
	Art der Zahnpasta	0 – fluoridierte Kinder- oder Erwachsenenzahnpasta 1 – nicht-fluoridierte Kinder- oder Erwachsenenzahnpasta
	Speisen/Getränke nach Zähneputzen	0 – nein, 1 – ja

Tabelle 3.9: Potentielle Risikofaktoren, die als Regressoren verwendet wurden.

Die Auswertungen erfolgten mit der Software STATA 12.1 (StataCorp LP, TX, USA).

4 Ergebnisse

Aus 27 Kindergärten (Abbildung 4.1) nahmen 777 Kinder (371 Mädchen, 406 Jungen) im Alter von 3 bis 7 Jahren an der klinischen Untersuchung teil. Es wurden insgesamt 15523 Zähne (15052 Milchzähne, 471 bleibende Zähne) untersucht. 138 der untersuchten Kinder hatten mindestens einen bleibenden Zahn. Keiner der bleibenden Zähne zeigte Erosionen. Von den untersuchten Milchzähnen waren 161 Front- und Eckzähne und 119 Molaren fehlend oder aufgrund kariöser Läsionen, großer Restaurationen oder prothetischer Versorgungen nicht beurteilbar. Die nicht beurteilbaren Zähne wurden von der Auswertung ausgeschlossen.

Abbildung 4.1: Übersichtskarte und Verteilungsmuster der Kindergärten, die an der vorliegenden Studie teilgenommen haben.

4.1 Ergebnisse der klinischen Untersuchung

Da keiner der bleibenden Zähne Erosionen aufwies, beschränken sich die Abbildungen zur besseren grafischen Darstellung auf die Milchzähne. Des Weiteren waren nur zwei der untersuchten Kinder im Alter von 7 Jahren. Diese beiden Beobachtungen wurden daher mit den 152 Beobachtungen für die 6-Jährigen zusammengefasst.

4.1.1 Prävalenz der Erosionen in Abhängigkeit von Alter und Geschlecht

Von den 777 untersuchten Kindern wiesen 353 (45,4%) mindestens einen Zahn mit Erosionen auf. Es war ein signifikanter Anstieg des Anteils der von Erosionen betroffenen Kinder mit zunehmendem Alter zu erkennen: 3-Jährige: 14,2%; 4-Jährige: 32,9%; 5-Jährige: 58,8%; 6-7-Jährige: 71,4% (Tabelle 4.1, $p < 0,01$).

Die logistische Regression zeigte ebenfalls, dass ältere Kinder signifikant häufiger von Erosionen betroffen waren ($p < 0,001$). Außerdem zeigten Jungen mit 50% (203 von 406) eine signifikant höhere Prävalenz als Mädchen mit 40,4% (150 von 371, $p = 0,008$).

Alter	Anzahl der untersuchten Kinder (N)	Kinder mit Erosionen (N)	1-5 Zähne mit Erosionen (N)	6-10 Zähne mit Erosionen (N)	Mehr als 10 Zähne mit Erosionen (N)
3	134	19	10	7	2
4	246	81	41	18	22
5	243	143	55	45	43
6-7	154	110	24	48	38
gesamt	777	353	130	118	105
		45,4%	16,7%	15,2%	13,5%

Tabelle 4.1: Prävalenz der Erosionen nach Altersgruppen, N = Anzahl der Kinder

4.1.2 Prävalenz der Erosionen in Ober- und Unterkiefer und Front- und Seitenzahnbereich

Die steigende Prävalenz von Erosionen mit zunehmendem Alter war im Ober- wie im Unterkiefer zu beobachten (Tabelle 4.2). Es zeigte sich, dass in jeder Altersklasse der Oberkiefer signifikant häufiger betroffen war als der Unterkiefer ($p < 0,001$).

Alter	Oberkiefer	Unterkiefer
3	14,2%	7,5%
4	30,9%	17,5%
5	58,4%	34,2%
6-7	70,1%	53,9%

Tabelle 4.2: Anteil der Kinder mit Erosionen im Ober- und Unterkiefer je Altersgruppe.

Die größere Häufigkeit von Erosionen im Oberkiefer war im Besonderen für die Front- und Eckzähne zu beobachten, die im Oberkiefer meist mehr als doppelt so häufig Erosionen aufwiesen (Abbildung 4.2).

Abbildung 4.2: Prävalenz dentaler Erosionen bei allen Zähnen des Milchgebisses.

Von den 353 von Erosionen betroffenen Kindern wiesen 18,7% ausschließlich Erosionen im Front- und Eckzahnbereich auf. Eine ausschließliche Beteiligung der Molaren war in 9,9% der Fälle zu beobachten. Die große Mehrheit der Kin-

der (71,4%) zeigte erosive Läsionen sowohl an Front- und Eckzähnen, als auch an den Molaren.

4.1.3 Schweregrad und Lokalisation der Erosionen anhand des O'Sullivan-Index

Die Tabellen 4.4. und 4.5 geben die Lokalisation, den Schweregrad und die Größe der von Erosionen betroffenen Zahnflächen bei Front- und Eckzähnen und den Molaren anhand des O'Sullivan-Index wieder.

Sowohl bei den Front- und Eckzähnen als auch bei den Molaren wies der Großteil der betroffenen Flächen einen Schweregrad von 2 (Kontinuitätsverlust der Schmelzoberfläche) bis 3 (Kontinuitätsverlust bis zur Schmelz-Dentin-Grenze) auf. Dies traf mit 87,7% auf die Front- und Eckzähne und mit 91,9% auf die Molaren zu. Erosionen, die durch Schmelz und Dentinverlust mit Pulpafreilegung und einen Schweregrad von 5 charakterisiert waren, kamen sehr selten und nur bei den Front- und Eckzähnen vor (<1%).

Bei den Front- und Eckzähnen waren Erosionen am häufigsten auf die Inzisalkante (45,5%) und am zweithäufigsten auf die Inzisalkante in Verbindung mit der palatinalen oder lingualen Zahnfläche (31,5%) beschränkt. Bei den Molaren waren die Okklusalfächen (74,2%) mit Abstand am häufigsten betroffen. Bei 13,5% waren multiple Flächen betroffen.

S	N	Betroffene Flächen von Front- und Eckzähnen [%]												gesamt [%]	
		A+	A-	B+	B-	C+	C-	D+	D-	E+	E-	F+	F-	„+“	„-“
1	158	0,0	0,0	5,1	0,0	7,6	0,6	0,6	0,0	26,6	1,3	55,7	2,5	95,6	4,4
2	1147	0,0	0,1	1,0	0,1	26,5	29,5	1,0	1,5	10,5	15,4	9,5	5,0	48,5	51,5
3	513	0,0	0,0	0,8	0,4	15,4	23,6	0,6	3,7	14,4	26,5	2,1	12,5	33,3	66,7
4	61	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	4,9	3,3	4,9	26,2	29,5	4,9	21,3	39,3	60,7
5	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4	50,0	0,0	28,6	21,4	78,6
	1893	0,0	0,1	1,2	0,2	21,0	24,5	0,9	2,1	13,5	18,0	11,1	7,5		

Tabelle 4.3: S = Schweregrad nach O'Sullivan (2000), N = Anzahl der von Erosionen betroffenen Front- und Eckzähne, A+ bis F- in % = betroffene Zahnflächen, „+“ und „-“, in % = Zahnflächen, die mehr (+) bzw. weniger (-) als 50% von Erosionen betroffen waren.

S	N	Betroffene Flächen von Molaren [%]												gesamt [%]	
		A+	A-	B+	B-	C+	C-	D+	D-	E+	E-	F+	F-	„+“	„-“
1	64	0,0	0,0	4,7	0,0	32,8	14,1	1,6	0,0	10,9	0,0	34,4	1,6	84,4	15,6
2	771	0,1	0,1	1,0	0,6	8,8	71,1	2,6	1,6	1,8	2,7	7,1	2,3	21,5	78,5
3	144	0,0	0,0	0,7	0,7	4,2	52,8	1,4	6,9	0,7	7,6	6,3	18,8	13,2	86,8
4	17	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	58,8	0,0	11,8	0,0	5,9	0,0	17,6	5,9	94,1
5	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	996	0,1	0,1	1,2	0,6	9,6	64,6	2,3	2,4	2,2	3,3	8,6	4,9		

Tabelle 4.4: S = Schweregrad nach O’Sullivan (2000), N = Anzahl der von Erosionen betroffenen Molaren, A+ bis F- in % = betroffene Zahnflächen, „+“ und „-“, in % = Zahnflächen, die mehr (+) bzw. weniger (-) als 50% von Erosionen betroffen waren.

4.1.4 Schweregrad und Lokalisation der Erosionen anhand des BEWE-Index

In Abbildung 4.3 ist der Schweregrad und die Lokalisation der erosiven Läsionen anhand des BEWE-Index dargestellt.

Abbildung 4.3: Verteilung der Erosionen entsprechend dem BEWE-Index bei allen Zähnen des Milchgebisses [%].

Die Erosionen im Oberkiefer zeigten insgesamt einen höheren Schweregrad als die Erosionen im Unterkiefer. Dies war für jede Altersgruppe zu beobachten (Abbildung 4.4 und Abbildung 4.5).

Abbildung 4.4: Verteilung der Erosionen in Ober- und Unterkiefer bei 3-Jährigen (links) und 4-Jährigen (rechts) [%].

Abbildung 4.5: Verteilung der Erosionen in Ober- und Unterkiefer bei 5-Jährigen (links) und 6-7-Jährigen (rechts) [%].

Tabelle 3.3 zeigt die Verteilung über die verschiedenen Risikoklassen in Abhängigkeit vom Alter. Etwas mehr als 5% der untersuchten Kinder ließen sich der mittleren und hohen Risikoklasse zuordnen.

Risiko	BEWE-Summen-score	%	3-Jährige	4-Jährige	5-Jährige	6-7-Jährige
Kein	0-2	66,4	92,5%	78,5%	58,4%	36,8%
Niedrig	3-8	28,1	7,5%	17,5%	35,8%	50,7%
Mittel	9-13	5,0	0,0%	3,7%	5,8%	10,5%
Hoch	14-18	0,5	0,0%	0,4%	0,0%	2,0%

Tabelle 4.5: Verteilung der untersuchten Kinder entsprechend der Risiko-Klassifizierung nach dem BEWE-Summenscore (Klassifikation in Anlehnung an Bartlett et al. 2008).

4.2 Risikofaktoren

Die logistische Regression zeigte, dass in der Gesamtstichprobe ältere Kinder (Odds Ratio: 2,550, $p < 0,001$) und Jungen (Odds Ratio: 1,675, $p = 0,002$) signifikant häufiger von Erosionen betroffenen waren. Die Zufuhr von Speisen oder Getränken nach dem abendlichen Zähneputzen war signifikant häufiger mit Erosionen assoziiert (Odds Ratio: 1,444, $p = 0,043$).

Die multilinare Regression zeigte, dass in der Gesamtstichprobe ältere Kinder ($p < 0,001$) und Jungen ($p = 0,008$) auch signifikant schwerere Erosionen aufwiesen. Dies spiegelte sich einerseits in einer signifikanten Korrelation zwischen dem BEWE-Summenscore und dem Alter ($p < 0,001$), andererseits in einem signifikant höheren BEWE-Summenscore für Jungen wider ($p = 0,013$). Außerdem war der häufigere Konsum von Limo und Cola signifikant mit schwereren Erosionen assoziiert ($p = 0,001$). Dies verdeutlichte auch die signifikante positive Korrelation des BEWE-Summenscores mit der Häufigkeit des Konsums von Limo und Cola ($p = 0,005$).

Die multilinare Regression für die Teilstichprobe der von Erosionen betroffenen Kinder bestätigte den signifikanten Zusammenhang zwischen dem Alter und der Schwere der Erosionen ($p < 0,001$), sowie die Assoziation häufigeren Konsums von Limo und Cola mit schwereren Erosionen ($p = 0,013$).

4.2.1 Rolle der Kindergärten

Zur Untersuchung des Einflusses der Ernährung und der angebotenen Mundhygiene in den Kindergärten wurde das multilineare Regressionsmodell inklusive der Variablen zu den Kindergartenangaben geschätzt. Die Regressionsergebnisse bestätigten die in 4.2 identifizierten Risikofaktoren. Keine der kindergartenspezifischen Variablen zeigte einen signifikanten Einfluss.

5 Diskussion

5.1 Diskussion der Methode

5.1.1 Probandengut

Aufgrund des gleichmäßigen Verteilungsmusters der teilnehmenden Kindergärten über die verschiedenen Stadtteile von Göttingen kann davon ausgegangen werden, dass die untersuchte Stichprobe einem repräsentativen Bevölkerungsquerschnitt entspricht (Abbildung 4.1). Die Stichprobe zeichnet sich durch ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis aus.

5.1.2 Indizes

Zur klinischen Untersuchung wurde der O'Sullivan-Index (O'Sullivan et al. 2000) herangezogen. Dieser Index wird in vielen weiteren epidemiologischen Untersuchungen bei Kindern und Jugendlichen verwendet (Caglar et al. 2005, Peres et al. 2005, Wiegand et al. 2006, Correr et al. 2009, Kumar et al. 2013, Tao et al. 2015, Kirthiga et al. 2015). Durch die Anwendung des O'Sullivan-Index ist es möglich, die erhobenen Daten der vorliegenden Studie direkt mit der vor 10 Jahren durchgeführten Untersuchung zur Prävalenz von dentalen Erosionen bei Göttinger Kindergartenkindern zu vergleichen (Wiegand et al. 2006). Der O'Sullivan-Index ist auf jeden Zahn anwendbar und erlaubt aufgrund der zahlreichen Abstufungen eine sehr differenzierte Befundaufnahme.

Um die Untersuchungszeit für jedes Kind so kurz wie möglich zu gestalten, wurden die klinisch gemessenen O'Sullivan-Werte in systematisch abgeleitete BEWE-Werte konvertiert. Die Inter-Test-Reliabilität entspricht laut Greve und Wentura (1997) oder Landis und Koch (1977) einer „guten bis ausgezeichneten“ bzw. „(fast) vollkommenen Übereinstimmung“ (gewichteter Cohens Kappa von 0,969). Der BEWE-Index findet in vielen weiteren Studien Anwendung (Kaczmarek et al. 2012, Manaf et al. 2012, Mantonanaki et al. 2013, Zhang et al. 2014, Vered et al. 2014, Chu et al. 2015, Alves et al. 2015, Muller-Bolla et al. 2015, Alvarez Loureiro et al. 2015).

5.1.3 Klinische Untersuchung

In der vorliegenden Studie wurden alle beurteilbaren Zähne und Zahnflächen bewertet. Einige Studien beschränken sich auf die Untersuchung sogenannter Markerzähne, z. B. der Oberkiefer-Milchfrontzähne oder der Milchmolaren (Al-Malik et al. 2002, Al-Majed et al. 2002, Murakami et al. 2011). Andere Studien bewerten nur die Labial- und Palatinalflächen der Oberkiefer-Milchzähne (Harding et al. 2003) oder schließen die inzisalen Zahnflächen von der Beurteilung aus (Millward et al. 1994, Luo et al. 2005, Murakami et al. 2011). Im Gegensatz dazu können durch die Untersuchung aller Zähne und Zahnflächen Erkenntnisse über die Verteilung und den Schweregrad der Erosionen sowie deren Lokalisation im gesamten Gebiss gewonnen werden.

Zur Überprüfung der Güte der Befunderhebung dieser Studie wurde die Inter-Untersucher-Reliabilität zwischen der Untersucherin und der Leiterin dieser Studie (Untersucherin von Wiegand et al. 2006) bestimmt. Der resultierende gewichtete Cohens Kappa-Wert entspricht mit 0,851 einer „guten bis ausgezeichneten“ bzw. „(fast) vollkommenen Übereinstimmung“ (Greve und Wentura 1997, Landis und Koch 1977). Darüber hinaus wurde die Intra-Untersucher-Reliabilität zur Überprüfung der internen Konsistenz bestimmt. Der resultierende gewichtete Cohens Kappa-Wert von 0,753 entspricht einer „guten bis ausgezeichneten“ bzw. „beachtlichen Übereinstimmung“ (Greve und Wentura 1997, Landis und Koch 1977).

5.1.4 Anamnesebogen und Kindergarten-Fragebogen

Der von den Erziehungsberechtigten auszufüllende Anamnesebogen erfasste die Allgemeinerkrankungen, Medikation, Mundhygiene- und Ernährungsgewohnheiten der untersuchten Kinder. Seine Struktur orientierte sich an den “UK National Clinical Guidelines in Paediatric Dentistry” (Shaw und O’Sullivan 2000) und an dem von Wiegand et al. (2006) entwickelten Anamnesebogen.

In zahlreichen anderen Untersuchungen zur Prävalenz von dentalen Erosionen bei Kindern bis 7 Jahre wird die Anamnese zur Risikofaktoranalyse ebenfalls mit einem Fragebogen erhoben (Al-Malik et al. 2002, Al-Majed et al. 2002, Harding et al. 2003, Luo et al. 2005, Wiegand et al. 2006, Mantonanaki et al.

2011, Murakami et al. 2011, Gatou und Mamai-Homata 2012, Moimaz et al. 2013, Tao et al. 2015).

Aus psychologischen Motiven heraus könnten die Eltern auf Fragen zu Ernährung und Mundhygiene nicht immer wahrheitsgemäß antworten. Beispielsweise könnten Eltern von Kindern mit schweren Erosionen aus einem Schamgefühl heraus positivere Antworten, z. B. den erosiven Getränkekonsument betreffend, geben. In den Antworten der Eltern mit einem hohen Bildungsniveau könnte sich eher das Wissen um das korrekte Mundhygieneverhalten oder eine gesunde Ernährung widerspiegeln als das, was tatsächlich im Alltag praktiziert wird. So könnte die Risikofaktoranalyse allgemein einer Verzerrung unterliegen.

Um eine breite Zustimmung der Befragung innerhalb dieser Studie zu erreichen, wurde auf einen sozioökonomischen Fragen-Komplex, wie beispielsweise Fragen zum Bildungsgrad der Eltern und zum Familieneinkommen, verzichtet. Andere Untersuchungen können einen im Vorfeld vermuteten Zusammenhang zwischen der Zugehörigkeit zu einer bestimmten gesellschaftlichen Schicht und dem Vorkommen von dentalen Erosionen bestätigen, kommen dabei aber zu widersprüchlichen Ergebnissen (Millward et al. 1994, Harding et al. 2003, Luo et al. 2005, Mantonanaki et al. 2013, Tao et al. 2015, siehe 5.2.6).

Der von den Kindergärten auszufüllende Fragebogen erfasste die Ernährung und die Mundhygiene des jeweiligen Kindergartens. Die Fragen entsprachen den Fragen des Anamnesebogens für die Eltern, insofern sie für einen Kindergarten relevant waren. Die Kindergärten könnten unterschiedliche Betreuungskonzepte verfolgen, was sich in Unterschieden in der Ernährung und der angebotenen Mundhygiene widerspiegeln und einen Einfluss auf die Mundgesundheit der Kinder haben könnte. Auch die Kindergärten könnten nicht wahrheitsgemäß auf die Fragebögen geantwortet haben. Eventuell könnten angebotene Betreuungskonzepte, wie z. B. das tägliche Zähneputzen, aus Personal- oder Zeitmangel nicht so umgesetzt werden, wie im Fragebogen angegeben.

5.2 Diskussion der Ergebnisse

5.2.1 Ergebnisse der klinischen Untersuchung

5.2.1.1 Prävalenz und Schwere der Erosionen

In der vorliegenden Untersuchung wiesen 45,4% der untersuchten 3- bis 7-jährigen Kinder mindestens einen Zahn mit dentalen Erosionen auf. 63,2% der betroffenen Kinder zeigten an mindestens 6 Zähnen einen erosiven Zahnhartsubstanzverlust. Bei 59,5% erstreckte sich dieser bis in das Dentin. Wiegand et al. (2006) stellten vor 10 Jahren bei Göttinger Kindergartenkindern eine Prävalenz von 32% fest. 68,2% der Betroffenen zeigten an bis zu 5 Zähnen Erosionen. Bei 41,2% dehnten sich diese bis in das Dentin aus.

Göttinger Kindergartenkinder waren in der aktuellen Studie häufiger, schwerer und an mehr Zähnen von Erosionen betroffen als vor 10 Jahren. Andere Studien weisen ebenfalls darauf hin, dass die Prävalenz für Erosionen bei Kindern zugenommen hat (Nunn et al. 2003, Jaeggi und Lussi 2014). Der Anstieg der Prävalenz bei Göttinger Kindergartenkindern innerhalb der letzten Dekade könnte in Veränderungen von Ernährungsgewohnheiten, wie z. B. einer Zunahme des Konsums von Softdrinks, begründet sein. In einem neueren Überblick von Studien zur Prävalenz, Inzidenz und Verteilung von Erosionen kommen Jaeggi und Lussi (2014) zu dem Schluss, dass es besonders in den jüngeren Altersgruppen einen Trend hin zu einer Zunahme der Prävalenz gibt. Sie nehmen an, dass sich ändernde Ernährungsgewohnheiten und Lebensstile ursächlich sein könnten. Nunn et al. (2003) zeigen in einem Vergleich von zwei in Großbritannien durchgeführten Untersuchungen, dass die Prävalenz für Erosionen bei 3 ½- bis 4 ½-Jährigen in einem Zeitraum von 4 Jahren angestiegen ist. Der Anstieg der Prävalenz in dieser Altersgruppe ist mit dem Konsum von Getränken zur Schlafenszeit assoziiert.

Im Vergleich mit neueren internationalen Studien zeigt sich, dass die Prävalenz von 45,4% etwa dem internationalen Durchschnitt entspricht. Die Spanne der Ergebnisse variiert zwischen 0,6% (Moimaz et al. 2013) und 98,4% (Gatou und Mamai-Homata 2012). Mantonanaki et al. (2013) stellten eine Prävalenz von 78,8% für 5-jährige griechische Vorschulkinder fest. In der vorliegenden Studie waren in dieser Altersgruppe 58,8% von Erosionen betroffen. Ebenfalls in Grie-

chenland fanden Gatou und Mamai-Homata (2012) eine Prävalenz für 5- bis 7-Jährige von nahezu 100%. In Brasilien dokumentierten Moimaz et al. (2013) hingegen nur eine Prävalenz von 0,6% bei 4- bis 6-jährigen Vorschulkindern. Ebenfalls in Brasilien fanden Murakami et al. (2011) eine Prävalenz von 51,6% für 3- bis 4-jährige Kinder. Dabei waren aber 93,9% der Erosionen auf den Zahnschmelz begrenzt. Tao et al. (2015) stellten in der chinesischen Stadt Shanghai eine Prävalenz von 15,1% für 3- bis 6-Jährige fest. Davon zeigten lediglich 2,8% Erosionen mit freigelegter Schmelz-Dentin-Grenze (O'Sullivan-Schweregrad 3). Nur eins von insgesamt 1837 teilnehmenden Kindern zeigte einen Zahn mit einer bis unter die Schmelz-Dentin-Grenze ausgedehnten Erosion (O'Sullivan-Schweregrad 4). Deutlich verschieden dazu wiesen in der vorliegenden Studie 59,5% aller von Erosionen betroffenen Kinder mindestens einen Zahn mit dem O'Sullivan-Schweregrad 3 oder höher auf.

Gatou und Mamai-Homata verwendeten zur Klassifikation von Zahnabnutzungen den TWI (*Tooth Wear Index*) nach Smith und Knight (1984), so dass die Prävalenz von nahezu 100% nicht nur Erosionen, sondern auch Attritionen und Abrasionen widerspiegelt. Es lässt sich keine Aussage über die Prävalenz von rein erosionsbedingten Zahnhartsubstanzverlusten ableiten. Ein Vergleich mit den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung und anderen Studienergebnissen zur Prävalenz von Erosionen ist deshalb erschwert.

Die Divergenz in den Ergebnissen europäischer Untersuchungen und der brasilianischen Studie von Moimaz et al. (2013) könnte in grundlegenden Länderunterschieden begründet sein. Weitere Studien zu dentalen Erosionen bei 6- bis 12-Jährigen bzw. 12-Jährigen in Brasilien beobachten ebenfalls vergleichsweise geringe Prävalenzen (Peres et al., 2005: 13%; Manguiera et al. 2009: 19,9%).

Insgesamt könnten sich für die große Varianz der internationalen Ergebnisse die Anwendung verschiedener Bewertungs-Indizes und eine nicht einheitliche Methodik verantwortlich zeichnen. Ebenfalls könnten landestypische Eigenheiten, wie z. B. Gewohnheiten die Ernährung und die Mundhygiene betreffend, ursächlich sein. Deutlich verschieden sind die Ergebnisse im interkontinentalen Vergleich zwischen Europa, Ostasien und Südamerika.

5.2.1.2 Prävalenz und Schwere der Erosionen in Abhängigkeit vom Alter

In der vorliegenden Studie wurde eine Zunahme der Prävalenz mit zunehmendem Alter beobachtet. Ebenfalls wiesen ältere Kinder signifikant schwerere Erosionen auf.

Auch Wiegand et al. (2006) und Murakami et al. (2011) beobachteten eine altersabhängige Zunahme der Prävalenz (Tabelle 5.1). Taji et al. (2010) stellten fest, dass die Schwere der Erosionen mit dem Alter signifikant zunimmt. Im Gegensatz dazu zeigten die Untersuchungen von Moimaz et al. (2013) und Tao et al. (2015) keine altersabhängige Zunahme der Prävalenz oder der Schwere von Erosionen.

Der Anstieg der Prävalenz und der Schwere mit zunehmendem Alter spiegelt zum einen den physiologischen Alterungsprozess wider, dem Milchzähne durch ihre anatomische Beschaffenheit im Vergleich zu den bleibenden Zähnen besonders unterliegen. Zum anderen zeigt sich eine pathologische Abnutzung, die bei älteren Kindern durch eine im Zeitverlauf häufigere Exposition gegenüber erosiven Substanzen ausgeprägter sein könnte.

	3-Jährige	4-Jährige	5-Jährige	6-Jährige
Vorliegende Studie	14,2%	32,9%	58,8%	71,7%
Wiegand et al. 2006	22,5%	27,4%	30,5%	38,1%
Murakami et al. 2011	25,5%	32,1%	/	/
Mantonanaki et al. 2013	/	/	78,8%	/
Moimaz et al. 2013	/	0,5%	0,3%	1.1%
Tao et al. 2015	12,0%	17,1%	16,1%	12,6%

Tabelle 5.1: In verschiedenen Studien festgestellte Prävalenzen in den entsprechenden Altersklassen.

5.2.1.3 Prävalenz und Schwere der Erosionen in Abhängigkeit vom Geschlecht

In der vorliegenden Studie waren Jungen signifikant häufiger von Erosionen betroffen als Mädchen. Im multilinenen Regressionsmodell zeigte sich, dass in der Gesamtstichprobe Jungen signifikant schwerer von Erosionen betroffen wa-

ren. Wiegand et al. (2006) beobachteten ebenfalls die Tendenz, dass Jungen häufiger betroffen sind als Mädchen.

Auch internationale Studien zeigen, dass dentale Erosionen und andere nicht-kariöse Zahnhartsubstanzverluste bei Jungen häufiger auftreten als bei Mädchen (Tao et al. 2015, Gatou und Mamai-Homata 2012). Gatou und Mamai-Homata (2012) stellten zudem fest, dass Jungen schwerer von nichtkariösen Zahnhartsubstanzverlusten betroffen sind als Mädchen. Mantonanaki et al. (2013) und Moimaz et al. (2013) fanden keinen Unterschied in ihren Stichproben.

Studien zur Prävalenz von Erosionen und nichtkariösen Zahnhartsubstanzdefekten bei Jugendlichen beobachten ebenfalls einen Geschlechterunterschied (Al-Dlaigan et al. 2001, van Rijkom et al. 2002, Bardsley et al. 2004). In diesen Studien waren Jungen signifikant häufiger von nichtkariösen Zahnhartsubstanzdefekten betroffen als Mädchen. Als ursächlich werden stärkere Kaukräfte beim männlichen Geschlecht in Kombination mit sauren Nahrungsmitteln und Getränken diskutiert. Jungen könnten außerdem häufiger erosive Getränke konsumieren als Mädchen. Mulic et al. (2012) berichten, dass die Risikofaktoren für Erosionen bei Männern und Frauen differieren. Während bei den Frauen Erbrechen, Reflux und der Konsum von Fruchtsäften für das Auftreten von Erosionen verantwortlich sind, ist es bei den Männern vor allem der häufige Konsum von Softdrinks, der zu Erosionen führt. Eine Untersuchung des Max Rubner-Instituts (2008) bestätigt, dass Männer pro Kopf und Tag mehr als doppelt so viel Limonade konsumieren als Frauen.

5.2.1.4 Prävalenz der Erosionen in Ober- und Unterkiefer und Front- und Seitenzahnbereich

Die vorliegende Studie fand signifikante Unterschiede zwischen der Prävalenz von Ober- und Unterkiefer. Die Milchzähne im Oberkiefer waren mit 25% fast doppelt so häufig von Erosionen betroffen wie im Unterkiefer mit 13,5%. Ein ähnliches Bild zeigt sich in der Studie von Wiegand et al. (2006), in der der Oberkiefer mit 11,7% sogar fast dreimal häufiger als der Unterkiefer mit 3,8% betroffen ist. Auch Taji et al. (2010) stellten eine unterschiedliche Prävalenz in Ober- und Unterkiefer fest. Während 13% der Zähne im Unterkiefer betroffen waren, zeigten im Oberkiefer 34% der Zähne erosive Läsionen. Mantonanaki et

al. (2013) und Gatou und Mamai-Homata (2012) fanden ebenfalls im Oberkiefer häufiger Erosionen bzw. nichtkariöse Zahnhartsubstanzdefekte als im Unterkiefer. Möglicherweise sind die Zähne des Unterkiefers durch den Speichel der submandibulären und sublingualen Speicheldrüsen geschützt als Ihre Antagonisten im Oberkiefer. Eine Ausnahme stellen die zweiten Milchmolaren des Oberkiefers dar, die über eine anatomisch günstige Lokalisation zur Glandula parotidea verfügen.

In der aktuellen Untersuchung waren die Eckzähne am häufigsten betroffen, gefolgt von den ersten Milchmolaren und den Schneidezähnen. Die besonders hohe Prävalenz dentaler Erosionen bzw. nichtkariöser Zahnhartsubstanzdefekte im Bereich der Front- und Eckzähne sowie der ersten Milchmolaren im Oberkiefer findet sich sowohl bei Wiegand et al. (2006), wie auch in weiteren, internationalen Studien (Millward 1994; Taji et al. 2010; Gatou und Mamai-Homata 2012; Mantonanaki et al. 2013). Dass sich in der vorliegenden Untersuchung die Verteilung der Erosionen im Oberkiefer auf den anterioren Bereich konzentrierte, wohingegen im Unterkiefer dentale Erosionen vermehrt auch posterior auftraten, bestätigt die Ergebnisse von Wiegand et al. (2006), Gatou und Mamai-Homata (2012) und Mantonanaki et al. (2013).

Durch die anatomische Lage der Ausführungsgänge der Glandula parotidea im posterioren Bereich der Maxilla scheinen besonders die zweiten Milchmolaren des Oberkiefers geschützt und deshalb weniger von Erosionen betroffen zu sein als die ersten Milchmolaren und die Front- und Eckzähne. Zudem eruptieren die zweiten Milchmolaren später und könnten deshalb weniger von Abnutzung betroffen sein.

5.2.1.5 Lokalisation der erosiven Läsionen auf den Zahnflächen

Hinsichtlich der Lokalisation der Erosionen auf den Zahnflächen zeigte die vorliegende Studie, dass der erosive Zahnhartsubstanzverlust am häufigsten die inzisale bzw. okklusale Zahnfläche betraf (Front- und Eckzähne: 45,5%; Molaren: 74,2%). Dies bestätigt die Ergebnisse von Wiegand et al. (2006, Front- und Eckzähne: 51,1%; Molaren: 75,9%). International identifizierten Tao et al. (2015), Mantonanaki (2013), Moimaz et al. (2013) und Gatou und Mamai-Homata (2012) ebenfalls die inzisale bzw. okklusale Zahnfläche als am häufigsten von Erosionen bzw. anderen nichtkariösen Zahnhartsubstanzverlusten be-

troffen. Die mit der vorliegenden Studie vergleichbaren Untersuchungen zeichnen somit ein relativ homogenes Bild hinsichtlich der Lokalisation dentaler Erosionen auf den Zahnflächen.

Dass die Frontzähne des Milchgebisses als erstes eruptieren und so im Zeitverlauf öfters mit sauren Getränken Kontakt haben, könnte die Häufigkeit von inzisalen Erosionen an diesen Zähnen begründen. Zudem erscheint es wahrscheinlich, dass der Säurekontakt beim Trinken als erstes die Frontzähne betrifft. Durch den Genuss von erosiven Getränken während der Nahrungsaufnahme könnte die Okklusion mit in den Prozess der Erosion involviert sein. Besonders für die Molaren könnte dies die Häufigkeit der von Erosionen betroffenen okklusalen Flächen erklären. Auch wird diskutiert, dass sich in den teilweise tiefen Fissuren der Molaren erosive Nahrungsmittel länger halten und so die Entstehung von Erosionen auf den okklusalen Flächen begünstigen (Lussi 2006). Da zum Zeitpunkt des Zahndurchbruchs der Milchfrontzähne eine verstärkte Attrition in diesem Bereich beobachtet wird, ist es besonders im späten Stadium des Milchgebisses schwierig, die klinische Abnutzung der inzisalen Flächen ursprünglich ätiologisch zuzuordnen (Mantonanaki et al. 2013). Das klinische Bild könnte bei älteren Kindern auch einen ursprünglich durch Attrition initiierten Zustand zeigen, der im Zeitverlauf erodiert ist.

5.2.2 Anamnestische Risikofaktoren

In der vorliegenden Studie war der häufigere Konsum von Limo und Cola signifikant mit schwereren Erosionen assoziiert. Salas et al. (2015) stellten anhand einer Meta-Analyse von 13 ausgewählten Studien fest, dass besonders ein hoher Konsum von Softdrinks mit einem erhöhten Risiko für Erosionen bei Kindern einhergeht. Auch Gatou und Mamai-Homata (2012) fanden heraus, dass der Konsum von Softdrinks mit einer höheren Prävalenz und schwereren Zahnabnutzungen korreliert. Dieser Zusammenhang wird von zahlreichen weiteren internationalen Studien bestätigt (Järvinen et al. 1991, Millward et al. 1994, Correr et al. 2009, Huew et al. 2012). Andere Getränke, die in vergleichbaren Studien als signifikante Risikofaktoren für Erosionen identifiziert werden, sind Fruchtsäfte (Luo et al. 2005, Nayak et al. 2012), Buttermilch (Nayak et al. 2012) und Tee und Kaffee (Tao et al. 2015). Das erosive Potential eines Getränks wird von verschiedenen chemischen Faktoren bestimmt. Neben

dem pH-Wert beeinflussen die Pufferkapazität, die titrierbare Gesamtsäure, die Säure-Art, der pKs-Wert, die chelatisierenden Eigenschaften, die Konzentration anorganischer Elemente (Kalzium, Phosphat und Fluorid), die Temperatur und die Adhäsionsfähigkeit auf der Zahnoberfläche die Erosivität eines Getränks (Barbour und Lussi 2014).

Weitere Ernährungsgewohnheiten, die in internationalen Studien als Risikofaktoren für Erosionen bei Kindern bis 7 Jahre herausgearbeitet werden, sind der tägliche Konsum von Fruchtmus (Harding et al. 2003) und Tamarindenfrucht und Stachelbeeren (Nayak et al. 2012). Ebenfalls werden die Dauer, während der Getränke vor dem Schlucken im Mund gehalten werden (Al-Majed 2002), der Gebrauch eines Fläschchens (Huang et al. 2015) und der Konsum von Essig (Tao et al. 2015) als erosionsfördernd beschrieben. Milch wiederum wirkt sich tendenziell protektiv aus (Wiegand et al. 2006). Nahrungsmittel, die wie Milch und Käse einen hohen Gehalt an Kalzium und Phosphat aufweisen, reduzieren das erosive Potential einer Säure (Linnett und Seow 2001). Diese Ergebnisse konnten von der vorliegenden Studie nicht bestätigt werden.

Kinder, die nach dem abendlichen Zähneputzen Speisen oder Getränke zu sich nahmen, waren in der vorliegenden Untersuchung häufiger von Erosionen betroffen. Dies bestätigt die Ergebnisse von Al-Majed et al. (2002), die einen positiven Zusammenhang zwischen der Zufuhr von Nahrungsmitteln und Softdrinks zur Schlafenszeit und der Häufigkeit von Erosionen bei den oberen Schneidezähnen der ersten und permanenten Dentition fanden. Auch Luo et al. (2005) stellten fest, dass der Konsum von Fruchtsaft zur Schlafenszeit via Fläschchen mit dem Vorkommen von dentalen Erosionen positiv korreliert. In diesen Ergebnissen spiegeln sich zum einen die Erosivität von Softdrinks und Fruchtsäften und zum anderen die Folgen der Einwirkzeit dieser Getränke auf die Zähne wider. Al-Majed et al. (2002) beobachteten, dass die Anzahl bleibender Frontzähne mit palatinalen Erosionen sowohl signifikant mit dem nächtlichen Konsum von Getränken als auch mit der Dauer, mit der diese im Mund gehalten werden, assoziiert sind. Da die meisten Kinder vor dem Schlafengehen ihre Zähne putzen oder geputzt bekommen, steht in diesem Zusammenhang zur Diskussion, dass eine frisch geputzte und von Plaque befreite Zahnoberfläche anfälliger für die Entstehung von Erosionen sein könnte. Ebenfalls wird diskutiert, dass die

persistierende zervikale Schmelzleiste eines erodierten Zahnes in einer schützenden Plaque-Schicht begründet sein könnte (Lussi et al. 2006). Studien zeigen, dass die Pellikel in Abhängigkeit von ihrer Dicke und Reifungszeit die Zahnhartsubstanzen bis zu einem gewissen Grad vor erosiven Säureangriffen schützen kann (Amaechi et al. 1999b, Hannig et al. 2003, Wiegand et al. 2008). Die Pellikel wird durch das Putzen der Zähne von den Zahnoberflächen entfernt, beginnt aber unmittelbar danach, sich wieder flächendeckend aus Speichelproteinen zu bilden.

In einigen Studien wird der Einfluss des Mundhygieneverhaltens auf die Entstehung von Erosionen untersucht. Mantonanaki et al. (2013) zeigten, dass eine gute Mundhygiene das Risiko für Erosionen erhöht. Sie bestätigten damit die Ergebnisse von Nayak et al. (2012), die feststellten, dass das mindestens zweimalige oder häufigere Zähneputzen pro Tag mit Erosionen assoziiert ist. Dieser Effekt wird von den Autoren mit dem Wegbürsten der Pellikel erklärt. Wiegand et al. (2006) berichten hingegen, dass Kinder bis 7 Jahre ein höheres Risiko für Erosionen haben, wenn sie selbst ihre Zähne putzen, ohne dass die Eltern nachputzen. Es ist davon auszugehen, dass Kinder bis 7 Jahre ohne Hilfe der Eltern nur eine insuffiziente Entfernung der Plaque vornehmen können. Aus diesem Grund wird empfohlen, Kindern bis 10 Jahren die Zähne nachzuputzen (Sandström et al. 2011). Al-Malik et al. (2002) fanden einen Zusammenhang zwischen dem Vorliegen von Karies und dem Risiko, gleichzeitig auch Erosionen zu entwickeln.

Einige Studien erkennen sozioökonomische Faktoren als ursächlich für die Entstehung von Erosionen. Diese Ergebnisse sind allerdings widersprüchlich. Harding et al. (2003) zeigten, dass ein niedriges Familieneinkommen mit Erosionen assoziiert ist, während Mantonanaki et al. (2013) das Gegenteil beobachteten. Weiterhin wurden ein hoher sozioökonomischer Status und ein niedriger Bildungsgrad der Mutter als Risikofaktoren herausgearbeitet (Millward et al. 1994, Mantonanaki et al. 2013). Gatou und Mamai-Homata (2012) fanden heraus, dass die Immigranten in ihrer Stichprobe eine höhere Prävalenz für Zahnabnutzungen hatten als die griechische Vergleichsgruppe. Auch Tao et al. (2015) stellten fest, dass der Geburtsort einen signifikanten Einfluss auf das Vorkommen von Erosionen hat.

Des Weiteren wird verifiziert, dass intrinsische Faktoren signifikante Risikofaktoren für Erosionen darstellen. Es werden gastroösophagealer Reflux (Murakami et al. 2011) und die zu den Essstörungen zählende Regurgitation (Tao et al. 2015) als Risikofaktoren identifiziert. Diese Ergebnisse konnten aufgrund zu weniger Beobachtungen von der vorliegenden Studie nicht bestätigt werden. Jaeggi und Lussi (2004) und Moimaz et al. (2013) stellten in ihren Untersuchungen keine signifikanten Risikofaktoren fest.

5.2.2.1 Rolle der Kindergärten

Die Auswertung der Kindergarten-Fragebögen konnte keine kindergartenspezifischen Risikofaktoren identifizieren. Möglicherweise resultiert dies aus den geringen Unterschieden in den Angaben der Kindergärten hinsichtlich der angebotenen Ernährung und Mundhygiene.

5.3 Fazit und Ausblick

Im Rahmen dieser Untersuchung war es möglich zu zeigen, dass dentale Erosionen bereits im Milchgebiss häufig auftreten. Fast jedes zweite Göttinger Kindergartenkind war von Erosionen betroffen. Bei etwa jedem 20. Kind wurden Erosionen mit einem Schweregrad diagnostiziert, die nach den Empfehlungen von Bartlett et al. (2008) eine restaurative Behandlung erforderlich machen. Innerhalb der vorliegenden Studie konnte außerdem gezeigt werden, dass sich der Konsum kohlenensäurehaltiger Softdrinks auf die Schwere von Erosionen auswirkt. Besonders Erosionen mit einem hohen Schweregrad waren mit dem Konsum von Limo und Cola assoziiert. Die Ergebnisse dieser Studie unterstreichen somit die Notwendigkeit weiterer Forschung, speziell im Hinblick auf geeignete zahnmedizinische Präventionsmaßnahmen bei Kleinkindern und Kindern im Milchgebiss. Eltern und Kinder sollten schon früh über die Entstehung von dentalen Erosionen im Milchgebiss und die Erosivität von kohlenensäurehaltigen Softdrinks aufgeklärt werden. Kinder, die von Erosionen betroffen sind, sollten den Empfehlungen von Bartlett et al. (2008) entsprechend zahnärztlich betreut bzw. therapiert und in ein Recall-Programm aufgenommen werden.

6 Zusammenfassung

Ziel der Studie: Die Ziele der vorliegenden Studie waren, die Prävalenz, die Schwere und die Lokalisation von dentalen Erosionen bei Göttinger Kindergartenkindern zwischen 3 und 7 Jahren zu ermitteln. Außerdem wurde eine Risikofaktoranalyse durchgeführt.

Patienten und Methode: An der Studie nahmen 777 Kinder zwischen 3 und 7 Jahren teil. Zur Klassifikation der Erosionen wurden der O'Sullivan-Index (O'Sullivan 2000) und der BEWE-Index (*Basic Erosive Wear Examination*, Bartlett et al. 2008) herangezogen. Mit einem Anamnesebogen wurden Allgemeinerkrankungen, Medikation, Mundhygiene- und Ernährungsgewohnheiten erfragt. Des Weiteren wurden mit einem Fragebogen Daten zu Mundhygiene- und Ernährungsgewohnheiten in den Kindergärten erhoben.

Ergebnisse: 45,4% der 777 untersuchten Kinder wiesen mindestens einen Milchzahn mit Erosionen auf. Die Zähne der untersuchten bleibenden Dentition waren nicht betroffen. Die Prävalenz der Erosionen nahm mit zunehmendem Alter signifikant zu: 3-Jährige: 14,2%; 4-Jährige: 32,9%; 5-Jährige: 58,8%; 6-7-Jährige: 71,4%. Ebenfalls nahm die Schwere der Erosionen mit dem Alter zu. Jungen waren signifikant häufiger und schwerer von Erosionen betroffen als Mädchen. Die Verteilung der 777 Kinder entsprechend den BEWE-Risikogruppen zeigte, dass 66,4% kein, 28,1% ein niedriges, 5,0% ein mittleres und 0,5% ein hohes Risiko für Erosionen hatten. 59,5% der betroffenen Kinder zeigten Erosionen mit Beteiligung des Dentins. Die Oberkieferzähne waren häufiger (43,4%) und schwerer von Erosionen betroffen als die Unterkieferzähne (28,3%). Im Oberkiefer waren die Eckzähne mit 31,5 – 31,7% und die ersten Milchmolaren mit 30,0 – 30,2%, im Unterkiefer die Eckzähne mit 17% und die ersten Milchmolaren mit 16,5 – 17,7% am häufigsten betroffen. Der häufigere Konsum von Limo und Cola war mit schwereren Erosionen assoziiert. Kinder, die nach dem abendlichen Zähneputzen Speisen oder Getränke zu sich nahmen, waren häufiger von Erosionen betroffen. Durch Auswertung der Kindergarten-Fragebögen konnte kein weiterer Risikofaktor identifiziert werden.

Schlussfolgerung: Knapp die Hälfte der untersuchten Kinder war von erosiven Zahnhartsubstanzverlusten betroffen, wobei ein kleiner Teil der Gesamtstich-

probe ein mittleres bis hohes Risiko für Erosionen zeigte. Der Konsum von Limo und Cola sowie die Zufuhr von Speisen und Getränken nach dem abendlichen Zähneputzen konnten als Risikofaktoren für Erosionen identifiziert werden.

7 Anhang

7.1 Anamnesebogen und Kindergarten-Fragebogen

UNIVERSITÄTSMEDIZIN : UMG
GÖTTINGEN

Zentrum Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
 Poliklinik für Präventive Zahnmedizin
 Parodontologie und Kariologie

Direktorin:
Univ.-Prof. Dr. med. dent. A. Wiegand
 37099 Göttingen-Briefpost
 Robert-Koch-Straße 40, 37075 Göttingen-Adresse
 0551 / 39-22884 Telefon
 0551 / 39-12616 Fax
 annette.wiegand@med.uni-goettingen.de E-Mail
Leiterin der Studie: Prof. Dr. med. dent. A. Wiegand
Prüfzahnärztin: Christina Müller-Pflanz

Fragebogen zur Studie:

Prävalenz von und Risikofaktoren für dentale Erosionen bei Göttinger Kindergarten-Kindern

Code:

Geburtsmonat/-jahr: Geschlecht: ☐ weiblich ☐ männlich

Allgemeinerkrankungen und Medikation:

- Diabetes („Zucker“) ☐ ja ☐ nein
- Lungenerkrankungen/Asthma ☐ ja ☐ nein
 Wenn ja, nimmt Ihr Kind zur Therapie regelmäßig ein Inhalationsspray? ☐ ja ☐ nein
- Reflux („Sodbrennen“) ☐ ja ☐ nein
 Wenn ja, wie häufig? mal pro Monat
- Erkrankungen, die mit häufigem Erbrechen einhergehen ☐ ja ☐ nein
 Wenn ja, wie häufig wird erbrochen?
 mal pro Monat
- Andere Allgemeinerkrankungen ☐ ja ☐ nein
 Wenn ja, welche?

- Muss Ihr Kind regelmäßig Medikamente einnehmen? ☐ ja ☐ nein
 Wenn ja, welche?

 Und seit wann?

- Nimmt oder nahm Ihr Kind regelmäßig Fluoridtabletten ein? ☐ ja ☐ nein
 Wenn ja, welche?

 Und seit wann? von bis

Ernährungsgewohnheiten:

- Wurde Ihr Kind als Baby gestillt? ☐ ja ☐ nein
 Wenn ja, wie lange? vom bis zum Lebensmonat
- Hat Ihr Kind das Fläschchen bekommen oder bekommt es noch? ☐ ja ☐ nein
 Wenn ja, mit welchem Inhalt?

 Und wie lange? vom bis zum Lebensjahr

Universitätsmedizin Göttingen, Georg-August-Universität Stiftung Öffentlichen Rechts Vorstand Prof. Dr. Heyo K. Kroemer (Forschung & Lehre, Sprecher des Vorstands) ¹
 Dr. Martin Siess (Krankenversorgung) Dr. Sebastian Freytag (Wirtschaftsführung & Administration) Sparkasse Göttingen (260 500 01) Kto: 448

Abbildung 7.1: Anamnesebogen, von den Erziehungsberechtigten auszufüllen: Seite 1.

UNIVERSITÄTSMEDIZIN : **UMG**
 GÖTTINGEN

• Bekam oder bekommt Ihr Kind ein Fläschchen zum Einschlafen? ☐ ja ☐ nein
 Wenn ja, mit welchem Inhalt?.....

• Wie häufig nimmt Ihr Kind folgende Getränke und Nahrungsmittel zu sich:

Fruchtsäfte pur	☐ nie/selten	☐ wöchentlich	☐ täglich	☐ 2-3 mal täglich	☐ häufiger
Fruchtsäfte verdünnt	☐ nie/selten	☐ wöchentlich	☐ täglich	☐ 2-3 mal täglich	☐ häufiger
Zitronentee	☐ nie/selten	☐ wöchentlich	☐ täglich	☐ 2-3 mal täglich	☐ häufiger
Limonade / Cola	☐ nie/selten	☐ wöchentlich	☐ täglich	☐ 2-3 mal täglich	☐ häufiger
Kohlensäurehaltiges Mineralwasser	☐ nie/selten	☐ wöchentlich	☐ täglich	☐ 2-3 mal täglich	☐ häufiger
Stilles Mineralwasser	☐ nie/selten	☐ wöchentlich	☐ täglich	☐ 2-3 mal täglich	☐ häufiger
Milch	☐ nie/selten	☐ wöchentlich	☐ täglich	☐ 2-3 mal täglich	☐ häufiger
Zitrusfrüchte	☐ nie/selten	☐ wöchentlich	☐ täglich	☐ 2-3 mal täglich	☐ häufiger
Alle Arten von Süßigkeiten	☐ nie/selten	☐ wöchentlich	☐ täglich	☐ 2-3 mal täglich	☐ häufiger
Zitronensprudel	☐ nie/selten	☐ wöchentlich	☐ täglich	☐ 2-3 mal täglich	☐ häufiger

• Wie nimmt Ihr Kind oben genannte Getränke zu sich?

Aus einem Becher	☐ nie	☐ selten	☐ manchmal	☐ oft	☐ immer
Mit Strohhalm	☐ nie	☐ selten	☐ manchmal	☐ oft	☐ immer
Mit Trinklernbecher / Schnabellasse	☐ nie	☐ selten	☐ manchmal	☐ oft	☐ immer
Aus dem Fläschchen	☐ nie	☐ selten	☐ manchmal	☐ oft	☐ immer

Mundhygienemaßnahmen:

• Wer putzt die Zähne Ihres Kindes?
☐ das Kind selbst ☐ die Eltern ☐ zuerst Kind selbst, dann putzen Eltern nach

• Wie oft putzt sich Ihr Kind die Zähne / werden ihm die Zähne geputzt?
☐ 1 mal täglich ☐ 2 mal täglich ☐ 3 mal täglich ☐mal wöchentlich

• Wie lange putzt Ihr Kind / putzen Sie Ihrem Kind die Zähne?
☐ 1 Minute ☐ 2 Minuten ☐ 3 Minuten

• Welche Art Zahnbürste benutzt Ihr Kind / benutzen Sie für Ihr Kind?
☐ eine Handzahnbürste ☐ eine elektrische Zahnbürste ☐ beides

• Welche Zahnpasta benutzt Ihr Kind / benutzen Sie für Ihr Kind?
☐ fluoridierte Kinder-Zahnpasta ☐ nicht-fluoridierte Kinder-Zahnpasta
☐ fluoridierte Erwachsenen-Zahnpasta ☐ nicht-fluoridierte Erwachsenen-Zahnpasta

• Nimmt Ihr Kind abends nach dem Zähneputzen noch Speisen und/oder Getränke zu sich?
☐ ja ☐ nein
 Wenn ja, wie oft? ☐ täglich ☐ wöchentlich ☐ monatlich
 Und welche?.....

2

Universitätsmedizin Göttingen, Georg-August-Universität Stiftung Öffentlichen Rechts Vorstand Prof. Dr. Heyo K. Kroemer (Forschung & Lehre, Sprecher des Vorstands)
 Dr. Martin Siess (Krankenversorgung) Dr. Sebastian Freytag (Wirtschaftsführung & Administration) Sparkasse Göttingen (260 500 01) Kto: 448

Abbildung 7.2: Anamnesebogen, von den Erziehungsberechtigten auszufüllen: Seite 2.

Zentrum Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
Poliklinik für Präventive Zahnmedizin,
Parodontologie und Kariologie

Direktorin:
Univ.-Prof. Dr. med. dent. A. Wiegand

37099 Göttingen Briefpost
Robert-Koch-Straße 40, 37075 Göttingen Adresse
0551 / 39-22884 Telefon
0551 / 39-12616 Fax
annette.wiegand@med.uni-goettingen.de E-Mail

Leiterin der Studie: Prof. Dr. med. dent. A. Wiegand
Prüfzahnärztin: Christina Müller-Pflanz

Fragebogen zur Studie:

Prävalenz von und Risikofaktoren für dentale Erosionen bei Göttinger Kindergarten-Kindern

Name der Einrichtung:

Ernährungsgewohnheiten:

- Welche Getränke und Speisen werden für alle Kinder in Ihrer Einrichtung angeboten (inklusive Kindergeburtstagen und besonderen Anlässen wie z.B. Weihnachtsfeiern etc.)?

Fruchtsäfte pur	☐ nie/selten	☐ wöchentlich	☐ täglich	☐ 2-3 mal täglich	☐ häufiger
Fruchtsäfte verdünnt	☐ nie/selten	☐ wöchentlich	☐ täglich	☐ 2-3 mal täglich	☐ häufiger
Zitronentee	☐ nie/selten	☐ wöchentlich	☐ täglich	☐ 2-3 mal täglich	☐ häufiger
Limonade / Cola	☐ nie/selten	☐ wöchentlich	☐ täglich	☐ 2-3 mal täglich	☐ häufiger
Kohlensäurehaltiges Mineralwasser	☐ nie/selten	☐ wöchentlich	☐ täglich	☐ 2-3 mal täglich	☐ häufiger
Stilles Mineralwasser	☐ nie/selten	☐ wöchentlich	☐ täglich	☐ 2-3 mal täglich	☐ häufiger
Milch	☐ nie/selten	☐ wöchentlich	☐ täglich	☐ 2-3 mal täglich	☐ häufiger
Zitrusfrüchte	☐ nie/selten	☐ wöchentlich	☐ täglich	☐ 2-3 mal täglich	☐ häufiger
Alle Arten von Süßigkeiten	☐ nie/selten	☐ wöchentlich	☐ täglich	☐ 2-3 mal täglich	☐ häufiger
Zitronensprudel	☐ nie/selten	☐ wöchentlich	☐ täglich	☐ 2-3 mal täglich	☐ häufiger

Abbildung 7.3: Fragebogen, von den Kindergärten auszufüllen: Seite 1.

- Wie werden oben genannte Getränke konsumiert?

Aus einem Becher	☐ nie	☐ selten	☐ manchmal	☐ oft	☐ immer
Mit Strohhalm	☐ nie	☐ selten	☐ manchmal	☐ oft	☐ immer
Mit Trinklernbecher / Schnabeltasse	☐ nie	☐ selten	☐ manchmal	☐ oft	☐ immer
Aus dem Fläschchen	☐ nie	☐ selten	☐ manchmal	☐ oft	☐ immer

Mundhygienemaßnahmen:

- Findet in Ihrer Einrichtung tägliches Zähneputzen statt?

☐ ja ☐ nein

Wenn ja, wie oft? ☐ 1 mal ☐ 2 mal ☐ häufiger

- Wer putzt die Zähne der Kinder?

☐ die Kinder selbst
☐ die Erzieher/innen
☐ erst die Kinder, dann wird von den Erzieher/innen nachgeputzt

- Wie lange putzen die Kinder die Zähne bzw. werden Ihnen die Zähne geputzt?

☐ 1 Minute
☐ 2 Minuten
☐ 3 Minuten

- Welche Zahnpasta wird von den Kindern bzw. für die Kinder benutzt?

☐ fluoridierte Kinder-Zahnpasta
☐ nicht-fluoridierte Kinder-Zahnpasta
☐ fluoridierte Erwachsenen-Zahnpasta
☐ nicht-fluoridierte Erwachsenen-Zahnpasta

- Welche Art Zahnbürste benutzen die Kinder bzw. wird für sie benutzt?

☐ eine Handzahnbürste
☐ eine elektrische Zahnbürste
☐ beides

Abbildung 7.4: Fragebogen, von den Kindergärten auszufüllen: Seite 2.

8 Literaturverzeichnis

Al-Dlaigan YH, Shaw L, Smith AJ (2001): Dental erosion in a group of British 14-year-old school children. Part 1. Prevalence and influence of differing socio-economic backgrounds. *Br Dent J* 190, 145-149

Al-Dlaigan YH, Shaw L, Smith AJ (2002): Is there a relationship between asthma and dental erosion? A case control study. *Int J Paediatr Dent* 12, 189-200

Al-Majed I, Maguire A, Murray JJ (2002): Prevalence and risk factors for dental erosion in 5-6-year-old and 12-14-year-old boys in Saudi Arabia. *Community Dent Oral Epidemiol* 30, 38-46

Al-Malik MI, Holt RD, Bedi R, Speight PM (2002): Erosion, caries and rampant caries in preschool children in Jeddah, Saudi Arabia. *Community Dent Oral Epidemiol* 30, 16-23

Alvarez Loureiro L, Fabruccini Fager A, Alves LS, Alvarez Vaz R, Maltz M (2015): Erosive tooth wear among 12-year-old schoolchildren: a population-based cross-sectional study in Montevideo, Uruguay. *Caries Res* 49, 216-225

Alves LS, Brusius CD, Damé-Teixeira N, Maltz M, Susin C (2015): Dental erosion among 12-year-old schoolchildren: a population-based cross-sectional study in South Brazil. *Int Dent J* 65, 322-330

Amaechi BT, Higham SM, Edgar WM (1999a): Factors influencing the development of dental erosion in vitro: enamel type, temperature and exposure time. *J Oral Rehabil* 26, 624-630

Amaechi BT, Higham SM, Edgar WM, Milosevic A (1999b): Thickness of acquired salivary pellicle as a determinant of the sites of dental erosion. *J Dent Res* 78, 1821-1828

Amin WM, Al-Omoush SA, Hattab FN (2001): Oral health status of workers exposed to acid fumes in phosphate and battery industries in Jordan. *Int Dent J* 51, 169-174

Arnadottir AB, Saemundsson SR, Holbrook WP (2003): Dental erosion in Icelandic teenagers in relation to dietary and lifestyle factors. *Acta Odontol Scand* 61, 25-28

Attin T, Deifuss H, Hellwig E (1999): Influence of acidic fluoride gel on abrasion resistance of eroded enamel. *Caries Res* 33, 135-139

Attin T, Buchalla W, Gollner M, Hellwig E (2000): Use of variable remineralization periods to improve the abrasion resistance of previously eroded enamel. *Caries Res* 34, 48-52

Attin T, Wegehaupt F, Gries D, Wiegand A (2007): The potential of deciduous and permanent bovine enamel as substitute for deciduous and permanent human enamel: erosion-abrasion experiments. *J Dent* 35, 773-777

Barbour ME, Lussi A: Erosion in relation to nutrition and the environment. In: Lussi A, Ganss C (eds.): *Erosive tooth wear. Monograph Oral Sci.* Karger, Basel 2014, 25, 143-154

Bardsley PF (2008): The evolution of tooth wear indices. *Clin Oral Investig* 12, 15-19

Bardsley PF, Taylor S, Milosevic A (2004): Epidemiological studies of tooth wear and dental erosion in 14-year-old children in North West England. Part 1: the relationship with water fluoridation and social deprivation. *Br Dent J* 197, 413-416

Bartlett D, Ganss C, Lussi A (2008): Basic Erosive Wear Examination (BEWE): a new scoring system for scientific and clinical needs. *Clin Oral Investig* 12, 65-68

Bartlett DW, Coward PY (2001): Comparison of the erosive potential of gastric juice and a carbonated drink in vitro. *J Oral Rehab* 28, 1045–1047

Bartlett DW, Evans DF, Anggiansah A, Smith BG (1996): A study of the association between gastro-oesophageal reflux and palatal dental erosion. *Br Dent J* 181, 125-131

Bartlett DW, Coward PY, Nikkah C, Wilson RF (1998): The prevalence of tooth wear in a cluster sample of adolescent schoolchildren and its relationship with potential explanatory factors. *Br Dent J* 184, 125-129

- Bartlett DW, Fares J, Shirodaria S, Chiu K, Ahmad N, Sheriff M (2011): The association of tooth wear, diet and dietary habits in adults aged 18-30 years old. *J Dent* 39, 811-816
- Benages A, Muñoz JV, Sanchiz V, Mora F, Minguez M (2006): Dental erosion as extraoesophageal manifestation of gastro-oesophageal reflux. *Gut* 55, 1050-1551
- Bere E, Glomnes ES, Te Velde SJ, Klepp KI (2008): Determinants of adolescents' soft drink consumption. *Public Health Nutr* 11, 49-56
- Blacker SM, Chadwick RG (2013): An in vitro investigation of the erosive potential of smoothies. *Br Dent J* 214, E9
- Breschi L, Gobbi P, Mazzotti G, Falconi M, Ellis TH, Stangel I (2002): High resolution SEM evaluation of dentin etched with maleic and citric acid. *Dent Mater* 18, 26-35
- Brosowsky A (1966): Die Wirkung von organischen und Mineralsäuren auf die Zahnhartsubstanz bei verschiedenen pH-Werten. *Dtsch Zahnärztl Z* 21, 1139-1147
- Buczkowska-Radlińska J, Łagocka R, Kaczmarek W, Górski M, Nowicka A (2013): Prevalence of dental erosion in adolescent competitive swimmers exposed to gas-chlorinated swimming pool water. *Clin Oral Investig* 17, 579-583
- Caglar E, Kargul B, Tanboga I, Lussi A (2005): Dental erosion among children in an Istanbul public school. *J Dent Child* 72, 5-9
- Caglar E, Sandalli N, Panagiotou N, Tonguc K, Kuscu OO (2011): Prevalence of dental erosion in greek minority school children in Istanbul. *Eur Arch Paediatr Dent* 12, 267-271
- Centerwall BS, Armstrong CW, Funkhouser LS, Elzay RP (1986): Erosion of dental enamel among competitive swimmers at a gas-chlorinated swimming pool. *Am J Epidemiol* 123, 641-647
- Chu CH, Ng A, Chau AM, Lo EC (2015): Dental erosion and caries status of chinese university students. *Oral Health Prev Dent* 13, 237-244

Correa MC, Lerco MM, Cunha ML, Henry MA (2012): Salivary parameters and teeth erosions in patients with gastroesophageal reflux disease. *Arq Gastroenterol* 49, 214-218.

Correr GM, Alonso RC, Consani S, Puppini-Rontani RM, Ferracane JL (2007): In vitro wear of primary and permanent enamel. Simultaneous erosion and abrasion. *Am J Dent* 20, 394-399

Correr GM, Alonso RC, Correa MA, Campos EA, Baratto-Filho F, Puppini-Rontani RM (2009): Influence of diet and saliva characteristics on the prevalence of dental erosion among 12-year-old schoolchildren. *J Dent Child* 76, 181-187

Di Fede O, Di LC, Occhipinti G, Vigneri S, Lo RL, Fedele S, Lo Muzio L, Campis G (2008): Oral manifestations in patients with gastroesophageal reflux disease: a single-center case-control study. *J Oral Pathol Med* 37, 336-340

Donachie MA, Walls AW (1995): Assessment of tooth wear in an ageing population. *J Dent* 23, 157-164

Dreizen S, Brown LR, Daly TE, Drane JB (1977): Prevention of xerostomia-related dental caries in irradiated cancer patients. *J Dent Res* 56, 99-104

Dugmore CR, Rock WP (2003a): The progression of tooth erosion in a cohort of adolescents of mixed ethnicity. *Int J Paediatr Dent* 13, 295-303

Dugmore CR, Rock WP (2003b): Asthma and tooth erosion. Is there an association? *Int J Paediatr Dent* 13, 417-424

Dukic W, Dobrijevic TT, Katunaric M, Milardovic S, Segovic S (2010): Erosive lesions in patients with alcoholism. *J Am Dent Assoc* 141, 1452-1458

Eccles JD (1979): Dental erosion of non-industrial origin. A clinical survey and classification, *J Prosthet Dent* 42, 649-653

Eccles JD, Jenkins WG (1974): Dental erosion and diet. *J Dent* 2, 153-159

El-Aidi H, Bronkhorst EM, Huysmans MC, Truin GJ (2010): Dynamics of tooth erosion in adolescents: a 3-year longitudinal study. *J Dent* 38, 131-137

Engelen L, de Wijk RA, Prinz JF, van der Bilt A, Bosman F (2003): The relation between saliva flow after different stimulations and the perception of flavor and texture attributes in custard desserts. *Physiol Behav* 78, 165-169

Ganss C, Lussi A: Diagnosis of Erosive Tooth Wear. In: Lussi A, Ganss C (eds.): Erosive tooth wear. Monograph Oral Sci. Karger, Basel 2014, 25, 22-31

Ganss C, Schlechtriemen M, Klimek J (1999): Dental erosions in subjects living on a raw food diet. *Caries Res* 33, 74-80

Ganss C, Klimek J, Giese K (2001): Dental erosion in children and adolescents – a cross-sectional and longitudinal investigating using study models. *Community Dent Oral Epidemiol* 29, 264-271

Ganss C, Klimek J, Starck C (2004): Quantitative analysis of the impact of the organic matrix on the fluoride effect on erosion progression in human dentine using longitudinal microradiography. *Arch Oral Biol* 49, 931- 935

Ganss C, Hardt M, Blazek D, Klimek J, Schlueter N (2009): Effects of tooth brushing force on the mineral content and demineralised organic matrix of eroded dentine. *Eur J Oral Sci* 117, 255-260

Ganss C, Hardt M, Lussi A, Cocks AK, Klimek J, Schlueter N (2010): Mechanism of action of tin-containing fluoride solutions as anti-erosive agents in dentine – an in-vitro tin uptake, tissue loss and SEM study. *Eur J Oral Sci* 118, 376-384

Gatou T, Mamai-Homata E (2012): Tooth wear in deciduous dentition of 5-7-year-old children: risk factors. *Clin Oral Investig* 16, 923-933

González-Aragón ÁE, Borges-Yáñez SA, Lussi A, Irigoyen-Camacho ME, Angeles Medina F (2016): Prevalence of erosive tooth wear and associated factors in a group of mexican adolescents. *J Am Dent Assoc* 147, 92-97

Graehn G (1991): Acid erosions of tooth surface. 1. Influence of saliva, medicaments, fruit acids and mechanical stress. *Dtsch Stomatol* 41, 494–499

Graf F (1953): Über die Entkalkung des Zahnschmelzes durch Fruchtsäuren und Tafelgetränke. *Schweiz Monatsschr Zahnheilkd* 63, 3-32

Gregg T, Mace S, West NX, Addy M (2004): A study in vitro of the abrasive effect of the tongue on enamel and dentine softened by acid erosion. *Caries Res* 38, 557-560

Greve W, Wentura D: Wissenschaftliche Beobachtung: Eine Einführung. PVU/Beltz, Weinheim 1997

Grine FE (2005): Enamel thickness of deciduous and permanent molars in modern Homo sapiens. *Am J Phys Anthropol* 126, 14-31

Hannig M, Joiner A (2006): The structure, function and properties of the acquired pellicle; in Druckworth RM (ed): The teeth and their environment. *Monogr Oral Sci* 19, 29-64

Hannig M, Hess NJ, Hoth-Hannig W, de Vrese M (2003): Influence of salivary pellicle formation time on enamel demineralization – an in situ pilot study. *Clin Oral Invest* 7, 158-161

Hara AT, Ando M, Cury JA, Serra MC, Gonzalez-Cabezas C, Zero D (2005): Influence of the organic matrix on root dentine erosion by citric acid. *Caries Res* 39, 134-138

Hara AT, Karlinsey RL, Zero DT (2008): Dentine remineralization by stimulated saliva formulations with different Ca and P contents, *Caries Res* 42, 51-56

Harding MA, Whelton H, O'Mullane DM, Cronin M (2003): Dental erosion in 5-year-old irish school children and associated risk factors: a pilot study. *Community Dent Health* 20, 165-170

Hasselkvist A, Johansson A, Johansson AK (2010): Dental erosion and soft drink consumption in swedish children and adolescents and the development of a simplified erosion partial recording system. *Swed Dent J* 34, 187-195

Hotz PR (1987): Erosion des Zahnschmelzes. *Schweiz Monatsschr Zahnmed* 97, 219-222

Huang LL, Leishman S, Newman B, Seow WK (2015): Association of erosion with timing of detection and selected risk factors in factors in primary dentition: a longitudinal study. *Int J Paediatr Dent* 25, 165-173

Huew R, Waterhouse PJ, Moynihan PJ, Maguire A (2012): Dental erosion among 12 year-old libyan schoolchildren. *Community Dent Health* 29, 279-283

Hunter ML, West NX, Hughes JA, Newcombe RG, Addy M (2000): Erosion of deciduous and permanent dental hard tissue in the oral environment. *J Dent* 28, 257-263

Imfeld T (1996): Dental erosion. Definition, classification and links. *Eur J Oral Sci* 104, 151-155

Jaeggi T, Lussi A (2004): Erosionen bei Kindern im frühen Schulalter. *Schweiz Monatsschr Zahnmed* 114, 876-881

Jaeggi T, Lussi A: Prevalence, incidence and distribution of erosion. In: Lussi A, Ganss C (eds): *Erosive tooth wear. Monogr Oral Sci.* Karger, Basel 2014, 25, 55-73

Jaeggi T, Schaffner M, Bürgin W, Lussi, A (1999): Erosionen und keilförmige Defekte bei Rekruten der Schweizer Armee. *Schweiz Monatsschr Zahnmed* 109, 1171-1182

Järvinen VK, Rytömaa I, Heinonen OP (1991): Risk factors in dental erosion. *J Dent Res* 70, 942- 947

Järvinen V, Meurman JH, Hyvarinen H, Rytömaa I, Murtomaa H (1988): Dental erosion and upper gastrointestinal disorders. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol* 65, 298-303

Janssens J, Vantrappen G, Ghillebert G (1986): 24-hour recording of esophageal pressure and pH in patients with noncardiac chest pain. *Gastroenterology* 90, 1978-1984

Johansson AK, Sorvari R, Birkhed D, Meurman JH (2001): Dental erosion in deciduous teeth – an in vivo and in vitro study. *J Dent* 29, 333-340

Jones L, Lekkas D, Hunt D, McIntyre J, Rafir W (2002): Studies on dental erosion: An in vivo-in vitro model of endogenous dental erosion - its application to testing protection by fluoride gel application. *Aust Dent J* 47, 304-308.

Jordan K, Jahn F, Aapro M (2015): Recent developments in the prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV): a comprehensive review. *Ann Oncol* 26, 1081-1090

Kaczmarek U, Czajczynska-Waszkiewicz A, Skladnik-Jankowska J (2012): Prevalence of dental erosion in 15-year-old subjects in Lower Silesia province. *J Stoma* 65, 359-369

Khan F, Young WG, Law V, Priest J, Daley TJ (2001): Cupped lesions of early onset dental erosion in young southeast Queensland adults. *Aust Dent J* 46, 100-107

Kim H-D, Douglass CW (2003): Associations between occupational health behaviors and occupational dental erosion. *J Public Health Dent* 63, 244-249

Kirthiga M, Poornima P, Praveen R, Sakeena B, Disha P (2015): Dental erosion and its associated factors in 11-16-year old school children. *J Clin Pediatr Dent* 39, 336-342

Kitasako Y, Sasaki Y, Takagaki T, Sadr A, Tagami J (2015): Age-specific prevalence of erosive tooth wear by acidic diet and gastroesophageal reflux in Japan. *J Dent* 43, 418-423

Kumar S, Acharya S, Mishra P, Debnath N, Vasthare (2013): Prevalence and risk factors for dental erosion among 11- to 14-year-old school children in South India. *J Oral Sci* 55, 329-336

Lacasse A, Rey E, Ferreira E, Morin C, Bérard A (2008): Nausea and vomiting of pregnancy: what about quality of life? *BJOG* 115, 1484-1493

Landis JR, Koch GG (1977): The measurement of observer agreement for categorical data. *Biometrics* 33, 159-177

Larsen MJ, Fejerskov O (1989): Chemical and structural challenges in remineralization of dental enamel lesions. *Scand J Dent Res* 97, 285-296

Larsen MJ, Nyvad B (1999): Enamel erosion by some soft drinks and orange juices relative to their pH, buffering effect and contents of calcium phosphate. *Caries Res* 33, 81-87

Larsen MJ, Poulsen S, Hansen I (2005): Erosion of the teeth: prevalence and distribution in a group of danish school children. *Eur J Paediatr Dent* 6, 44-47

Lewis KJ, Smith BGN (1973): The relationship of erosion and attrition in extensive tooth tissue loss. *Br Dent J* 135, 400-404

Lilenfeld LR, Stein D, Bulik CM, Strober M, Plotnikov K, Pollice C, Rao R, Merikangas KR, Nagy L, Kaye WH (2000): Personality straits among currently eating disorders, recovered and never ill first-degree female relatives of bulimic and control women. *Psychol Med* 30, 1399-1410

Linkosalo E, Markkanen H (1985): Dental erosion in relation to lactovegetarian diet. *Scand J Dent Res* 93, 436-441

Linnett V, Seow WK (2001): Dental erosion in children: a literature review. *Pediatr Dent* 23, 37-43

Lippert F, Parker DM, Jandt KD (2004): Susceptibility of deciduous and permanent enamel to dietary acid-induced erosion studied with atomic force microscopy nanoindentation. *Eur J Oral Sci* 112, 61-66

Luo Y, Zeng XJ, Du MQ, Bedi R (2005): The prevalence of dental erosion in preschool children in China. *J Dent* 33, 115-121

Lussi A (2006): Erosive tooth wear - a multifactorial condition of growing concern and increasing knowledge. *Monogr Oral Sci* 20, 1-8

Lussi A, Schaffner M, Hotz P, Suter P (1991): Dental erosion in a population of swiss adults. *Community Dent Oral Epidemiol* 19, 286-290

Lussi A, Kohler N, Zero D, Schaffner M, Megert B (2000): A comparison of the erosive potential of different beverages in primary and permanent teeth using an in vitro model. *Eur J Oral Sci* 108, 110-114

Lussi A, Hellwig E, Zero D, Jaeggi T (2006): Erosive tooth wear: diagnosis, risk factors and prevention. *Am J Dent* 19, 319-25

Lussi A, Schaffner M, Jaeggi T (2007): Dental erosion - diagnosis and prevention in children and adults. *Int Dent J* 57, 385-398

- Lussi A, Schlueter N, Rakhmatullina E, Ganss C (2011): Dental erosion - an overview with emphasis on chemical and histopathological aspects. *Caries Res* 45, 2-12
- Lussi A, von Salis-Marincek M, Ganss C, Hellwig E, Cheaib Z, Jaeggi T (2012): Clinical study monitoring the pH on tooth surfaces in patients with and without erosions. *Caries Res* 46, 507-512
- Magalhães AC, Rios D, Honório HM, Delbem AC, Buzalaf MA (2009): Effect of 4% titanium tetrafluoride solution on the erosion of permanent and deciduous human enamel: an in situ / ex vivo study. *J Appl Oral Sci* 17, 56-60
- Mahoney P (2013): Testing functional and morphological interpretations of enamel thickness along the deciduous tooth row in human children. *Am J Phys Anthropol* 151, 518-525
- Manaf ZA, Lee MT, Ali NH, Samynathan S, Jie YP, Ismail NH, Bibiana Hui Ying Y, Wei Seng Y, Yahya NA (2012): Relationship between food habits and tooth erosion occurrence in malaysian university students. *Malays J Med Sci* 19, 56-66
- Mangueira DF, Sampaio FC, Oliveira AF (2009): Association between socioeconomic factors and dental erosion in brazilian schoolchildren. *J Public Health Dent* 69, 254-259
- Mantonanaki M, Koletsi-Kounari H, Mamai-Homata E, Papaioannou W (2013): Dental erosion prevalence and associated risk indicators among preschool children in Athens, Greece. *Clin Oral Investig* 17, 585-593
- Max Rubner-Institut: Nationale Verzehrsstudie II; Ergebnisbericht Teil 2. Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel, 2008
- McDerra EJ, Pollard MA, Curzon ME (1998): The dental status of asthmatic british school children. *Paediatr Dent* 20, 281-287
- Meurman JH, Frank RM (1991): Progression and surface ultrastructure of in vitro caused erosive lesions in human and bovine enamel. *Caries Res* 25, 81-87
- Meurman JH, ten Cate JM (1996): Pathogenesis and modifying factors of dental erosion. *Eur J Oral Sci* 104, 199-206

- Millward A, Shaw L, Smith AJ (1994): Dental erosion in four-year-old children in differing socioeconomic backgrounds. *J Dent Child* 61, 263-266
- Millward A, Shaw L, Harrington E, Smith AJ (1997): Continuous monitoring of salivary flow rate and pH at the surface of the dentition following consumption of acidic beverages. *Caries Res* 31, 44-49
- Moimaz SA, Araújo PC, Chiba FY, Garbín CA, Saliba NA (2013): Prevalence of deciduous tooth erosion in childhood. *Int J Dent Hyg* 11, 226-230
- Mulic A, Skudutyte-Rysstad R, Tveit AB, Skaare AB (2012): Risk indicators for dental erosive wear among 18-year-old subjects in Oslo, Norway: *Eur J Oral Sci* 20, 531-538
- Muller-Bolla M, Courson F, Smail-Faugeron V, Bernardin T, Lupi-Pégurier L (2015): Dental erosion in french adolescents. *BMC Oral Health* 15, 147
- Murakami C, Oliveira LB, Sheiham A, Nahás Pires Corrêa MS, Haddad AE, Bönecker M (2011): Risk indicators for erosive tooth wear in brazilian preschool children. *Caries Res* 45, 121-129
- Nahás Pires Corrêa MS, Nahás Pires Corrêa F, Nahás Pires Corrêa JP, Murakami C, Mendes FM (2011): Prevalence and associated factors of dental erosion in children and adolescents of a private dental practice. *Int J Paediatr Dent* 21, 451-458
- Naumann CR, Zelig C, Napolitano PG, Ko CW (2012): Nausea, vomiting, and heartburn in pregnancy: a prospective look at risk, treatment, and outcome. *J Matern Fetal Neonatal Med* 25, 1488-1493
- Nayak SS, Ashokkumar BR, Ankola AV, Hebbal MI (2012): Association of erosion with dietary factors among 5-year-old children in India. *J Dent Child* 79, 122-129
- Nunn JH, Gordon PJ, Morris AJ, Pine CM, Walker A (2003): Dental erosion – changing prevalence? A review of british national children’s survey. *Int J Paediatr Dent* 13, 98-105
- Ohrn R, Angmar-Mansson B (2000): Oral status of 35 subjects with eating disorders: a 1-year study. *Eur J Oral Sci* 108, 275-280

O'Sullivan EA (2000): A new index for the measurement of erosion in children. *Eur J Paediatr Dent* 1, 69-74

Peres, KG, Armenio MF, Peres MA, Traebert J, De Lacerda JT (2005): Dental erosion in 12-year-old schoolchildren: a cross-sectional study in Southern Brazil. *Int J Paediatr Dent* 15, 249-255

Picos AM, Poenar S, Opris A, Chira A, Bud M, Berar A, Picos A, Dumitrascu DL (2013): Prevalence of dental erosions in GERD: a pilot study. *Clujul Med* 86, 344-446

Pontefract H, Hughes J, Kemp K, Yates R, Newcombe RG, Addy M (2001): The erosive effect of some mouthrinses on enamel: a study in situ. *J Clin Periodontol* 28, 319-324

Putz B, Attin T (2002): Die Prävalenz von Erosionen. *Dtsch Zahnärztl Z* 57, 637-343

Robb ND, Smith BG (1990): Prevalence of pathological tooth wear in patients with chronic alcoholism. *Br Dent J* 169, 367-369

Rytömaa I, Meurman J, Koskinen J (1988): In vitro erosion of bovine enamel caused by acidic drinks and other food stuffs. *Scan J Dent Res* 96, 324-33

Rytömaa I, Meurman JH, Franssila S, Torkko H (1989): Oral hygiene products may cause dental erosion. *Proc Finn Dent Soc* 85, 161-166

Rytömaa I, Järvinen V, Kanerva R, Heinonen P (1998): Bulimia and tooth erosion. *Acta Odontol Scand* 56, 36-40

Salas MMS, Nascimento GG, Vargas-Ferreira F, Tarquinio SBC, Huysmans MCDNJM, Demarco FF (2015): Diet influenced tooth erosion prevalence in children and adolescents: Results of a meta-analysis and meta-regression. *J Dent* 43, 865-875

Sandström A, Cressey J, Stecksén-Blicks C (2011): Tooth-brushing behavior in 6-12-year olds. *Int J Paediatr Dent* 21, 43-49

Scheutzel P (1996): Etiology of dental erosion – intrinsic factors. *Eur J Oral Sci* 104, 178-190

Schiffner U, Micheelis W, Reich E (2002): Erosionen und keilförmige Zahnhalsdefekte bei deutschen Erwachsenen und Senioren. Dtsch Zahnärztl Z 57, 102-106

Schlueter N, Hardt M, Klimek J, Ganss C (2010): Influence of the digestive enzymes trypsin and pepsin in vitro on the progression of erosion in dentine. Arch Oral Biol 55, 294-299

Schroeder HE: Orale Strukturbiologie. Entwicklungsgeschichte, Struktur und Funktion normaler Hart- und Weichgewebe der Mundhöhle und des Kiefergelenks. 5. Unveränderte Auflage; Thieme, Stuttgart 2000

Scully C (2003): Drug effects on salivary glands: dry mouth. Oral Dis 9, 165-176

Shaw L, O'Sullivan E (2000): UK national clinical guidelines in paediatric dentistry. Diagnosis and prevention of dental erosion in children. Int J Paediatr Dent 10, 356-365

Shellis RP (1984): Variations in growth of the enamel crown in human teeth and a possible relationship between growth and enamel structure. Arch Oral Biol 29, 697-705

Shellis RP, Featherstone JDB, Lussi A: Understanding the chemistry of dental erosion. In: Lussi A, Ganss C (eds): Erosive tooth wear. Monogr Oral Sci. Karger, Basel 2014; 25: 163-179

Smith BG, Knight JK (1984): An index for measuring the wear of teeth. Br Dent J 156, 435-438

Smith BG, Robb ND (1996): The prevalence of toothwear in 1007 dental patients. J Oral Rehabil 23, 232-239

Sognnaes RF, Wolcott RB, Xhonga FA (1972): Dental erosion. I. Erosion-like patterns occurring in association with other dental conditions. J Am Dent Assoc 84, 571-576

Stack MV (1953): Variation in the organic content of deciduous enamel and dentine. Biochem J 54, xv

Stephan RM (1966): Effect of different types of human foods on dental health in experimental animals. J Dent Res 45, 1551-1561

Stephen KW, McCrossan J, Mackenzie D, Macfarlane CB, Speirs CF (1980): Factors determining the passage of drugs from blood into saliva. Br J Clin Pharmacol 9, 51-55

Sullivan RE, Kramer WS (1983): Introgenic erosion of teeth. J Dent Child 50, 192-196

Taji SS, Seow WK, Townsend GC, Holcombe T (2010): A controlled study of dental erosion in 2- to 4-year-old twins. Int J Paediatr Dent 20, 400-409

Tao DY, Hao G, Lu HX, Tian Y, Feng XP (2015): Dental erosion among children aged 3-6 years and its associated indicators. J Public Health Dent 75, 291-297

ten Cate JM, Imfeld T (1996): Dental erosion, summary. Eur J Oral Sci 104, 241-244

Thylstrup A, Fejerskov O: Textbook of cariology. 1. Auflage; Munksgaard, Copenhagen 1986

Thylstrup A, Fejerskov O: Textbook of clinical cariology. 2. Auflage; Munksgaard, Copenhagen 1996

Van Rijkom HM, Truin GJ, Frencken JE, König KG, Van't Hof MA, Bronkhorst EM, Roeters FJ (2002): Prevalence, distribution and background variables of smooth-bordered tooth wear in teenagers in The Hague, The Netherlands. Caries Res 36, 147-154

Vered Y, Lussi A, Zini A, Gleitman J, Sgan-Cohen HD (2014): Dental erosive wear assessment among adolescents and adults utilizing the basic erosive wear examination (BEWE) scoring system. Clin Oral Investig 18, 1985-1990

Vieira A, Overweg E, Ruben JL, Huysmans MC (2006): Toothbrush abrasion, simulated tongue friction and attrition of eroded bovine enamel in vitro. J Dent 34, 336-342

- Wiegand A, Müller J, Werner C, Attin T (2006): Prevalence of erosive tooth wear and associated risk factors in 2-7-year-old german kindergarten children. *Oral Dis* 12, 117-124
- Wiegand A, Köwing L, Attin T (2007): Impact of brushing force on abrasion of acid-softened and sound enamel. *Arch Oral Biol* 52, 1043-1047
- Wiegand A, Bliggenstorfer S, Magalhães AC, Sener B, Attin T (2008): Impact of the in situ formed salivary pellicle on enamel and dentine erosion induced by different acids. *Acta Odontol Cand* 66, 225-230
- Wilson PR, Beynon AD (1989): Mineralization differences between human deciduous and permanent enamel measured by quantitative microradiography. *Arch Oral Biol* 34, 85-88
- Wynn RL, Meiller TF (2001): Drugs and dry mouth. *Gen Dent* 49, 10-14
- Xhonga FA, Valdmanis S (1983): Geographic comparisons of the incidence of dental erosion: a two centre study. *J Oral Rehabil* 10, 269- 277
- Young WG, Khan F (2002): Sites of dental erosion are saliva-dependent. *J Oral Rehabil* 29, 35-43
- Zebrauskas A, Birskute R, Maciulskiene V (2014): Prevalence of dental erosion among the young regular swimmers in Kaunas, Lithuania. *J Oral Maxillofac Res* 5, 2
- Zero DT (1996): Etiology of dental erosion - extrinsic factors. *Eur J Oral Sci* 104, 162-177
- Zero DT, Lussi A: Etiology of enamel erosion – intrinsic and extrinsic factors; In: Addy M, Emberg G, Edgar, WM, Orchardson R (Hrsg.): *Tooth wear and sensitivity*. Martin Dunitz, London 2000, 121-139
- Zhang S, Chau AM, Lo EC, Chu CH (2014): Dental caries and erosion status of 12-year-old Hong Kong children. *BMC Public Health* 14, 7
- Zipkin I, McClure FJ (1949): Salivary citrate and dental erosion, procedure for determining citric acid in saliva – dental erosion and citric acid in saliva. *J Dent Res* 28, 613-626

Danksagung

Ich möchte mich besonders bei Frau Prof. Dr. Annette Wiegand, der Direktorin der Poliklinik für Präventive Zahnmedizin, Parodontologie und Kariologie im Zentrum Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde der Medizinischen Fakultät der Universität Göttingen, für die freundliche Überlassung des Themas und die engagierte Unterstützung und Förderung dieser Arbeit bedanken.

Ebenfalls möchte ich mich bei der Deutschen Gesellschaft für Präventivzahnmedizin für die großzügige Förderung dieser Arbeit durch den DGPZM – CP GABA Wissenschaftsfond bedanken.

Ein weiterer Dank gilt Herrn PD Dr. Klaus Jung für die statistische Beratung in der zentralen Serviceeinheit Medizinische Biometrie und Statistische Bioinformatik am Institut für Medizinische Statistik der Georg-August-Universität Göttingen.

Ich möchte mich sehr herzlich bei meinem Ehemann Dr. Stephan Müller für die tatkräftige Unterstützung bei der Durchführung der Untersuchungen in den Kindergärten und die Anregungen bei der statistischen Auswertung bedanken.

Bei Frau Dr. Claudia Tschammler aus der Poliklinik für Präventive Zahnmedizin, Parodontologie und Kariologie möchte ich mich für die kollegiale Zusammenarbeit und die Anregungen bedanken.

Ein großes Dankeschön gilt allen teilnehmenden Kindern und Kindergärten für die freundliche und entgegenkommende Kooperation.

Einen weiteren Dank möchte ich Herrn Matthias Hentschel von der Firma Hentschel-Dental aus Teningen-Nimburg für die großzügige Bereitstellung der Kinderzahnbürsten aussprechen. Die Kinder haben sich sehr über diese Präsente gefreut.