Aus der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Plastische Chirurgie
(Prof. Dr. med. W. Lehmann)
der Medizinischen Fakultät der Universität Göttingen

Evaluation neuer sonographischer Bildverfahren im Schockraum zur Erkennung von Thoraxverletzungen

INAUGURAL-DISSERTATION

zur Erlangung des Doktorgrades
der Medizinischen Fakultät der
Georg-August-Universität zu Göttingen

vorgelegt von
Söhren Dirk Brauns

aus
Kehl am Rhein

Göttingen 2020

Dekan: Prof. Dr. med. W. Brück

Betreuungsausschuss:

Betreuer: Prof. Dr. med. K. Dresing

Prüfungskommission:

Referent Prof. Dr. med. K. Dresing

Ko-Referent: PD Dr. med. J. Uhlig

Drittreferentin: Prof. Dr. hum. biol. M. Schön

Datum der mündlichen Prüfung: 11.03.2020

Hiermit erkläre ich, die Dissertation mit dem Titel
"Evaluation neuer sonographischer Bildverfahren im
Schockraum zur Erkennung von Thoraxverletzungen"
eigenständig angefertigt und keine anderen, als die von mir
angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet zu haben.

Kehl, den 02.08.2019

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	IV
------------------------------------	-----------

Tabellenverzeichnis	V
----------------------------------	----------

Abkürzungsverzeichnis	VI
------------------------------------	-----------

1 Einleitung.....	1
--------------------------	----------

1.1 Polytraumaversorgung in Deutschland.....	1
1.1.1 Skalen zur Einschätzung der Verletzungsschwere	2
1.1.2 Organisation der Polytraumaversorgung in Deutschland.....	6
1.1.3 Das überregionale Traumazentrum Göttingen-Kassel.....	7
1.2 Polytraumamanagement	8
1.2.1 Prähospital-Phase	9
1.2.2 Schockraum-Phase.....	10
1.2.3 Erste operative Phase.....	11
1.3 Diagnostisches Vorgehen im Schockraum.....	12
1.3.1 Notfallsonographie im Schockraum.....	12
1.3.2 Röntgen-Diagnostik im Schockraum.....	13
1.3.3 Computertomographie im Schockraum	14
1.4 Herleitung der Fragestellung	15

2 Material und Methoden.....	16
-------------------------------------	-----------

2.1 Beurteilung des Mediastinums im Schockraum mittels Thoraxröntgenuntersuchung	16
2.1.1 Einschlusskriterien.....	16
2.1.2 Ausschlusskriterien.....	17
2.1.3 Messverfahren.....	17
2.1.4 Quotientenbestimmung	19
2.1.5 Untersuchungsgruppen.....	19
2.1.6 Grenzwerte der Quotienten	19
2.1.7 Analyseparameter zur Früherkennung mediastinaler Verletzungen.....	20
2.1.8 Statistische Analyse.....	20
2.2 Erstdiagnostik eines Pneumo- und Hämatothorax durch eFAST und Thoraxröntgenuntersuchung im Schockraum	22
2.2.1 Einschlusskriterien.....	23
2.2.2 Ausschlusskriterien.....	23
2.2.3 Patienten- und untersuchungs-bezogene Analyseparameter	23
2.2.4 Statistische Auswertung der Testgenauigkeit von eFAST und Thoraxröntgenuntersuchung	23
2.2.5 Analyse der Konsequenzen aus eFAST und Thoraxröntgenuntersuchung	23

2.3	Analyse von Thoraxröntgenuntersuchung und CT verstorbener Schockraumpatienten	24
2.3.1	Einschlusskriterien	24
2.3.2	Ausschlusskriterien	24
2.3.3	Analysekriterien	25
2.3.4	Statistische Analyse	25
2.4	Modalitäten und Computerprogramme	25
3	Ergebnisse	27
3.1	Die Thoraxröntgenuntersuchung zur Beurteilung des Mediastinums im Schockraum	27
3.1.1	Mediastinum-Quotienten der Untersuchungsgruppen	29
3.1.2	Evaluation pathologischer Grenzwerte	30
3.2	Früherkennung mediastinaler Verletzungen	31
3.2.1	Patienten-bezogene Daten und Herz/Thorax-Quotient	31
3.2.2	Thoraxverletzungsstatus	32
3.2.3	Verletzungsursachen	33
3.2.4	Vitalparameter Unfallort und Schockraum	34
3.2.5	Maßnahmen und Medikamente	36
3.2.6	Trauma-Scores	39
3.2.7	Letalität	41
3.2.8	Übersicht Signifikanztestung	41
3.3	Vergleich bildgebender Verfahren der initialen Pneumo-/Hämatothorax-Diagnostik im Schockraum	43
3.3.1	Testgenauigkeit von eFAST und Thoraxröntgenuntersuchung	44
3.3.2	Konsequenzen aus eFAST und Thoraxröntgenuntersuchung	45
3.4	Analyse von Thoraxröntgenuntersuchung und cCT/Ganzkörper-CT verstorbener Schockraumpatienten	47
4	Diskussion	48
4.1	Die Rolle der Thoraxröntgenuntersuchung zur Beurteilung des Mediastinums im Schockraum	48
4.2	Prädiktoren mediastinaler Verletzungen	52
4.2.1	Patientenkollektiv und Herzsilhouette	53
4.2.2	Grad der Thoraxverletzung	53
4.2.3	Unfallmechanismus und Ursache	54
4.2.4	Vitalparameter Unfallort und Schockraum	54
4.2.5	Invasive Maßnahmen und Medikamente	56
4.2.6	Trauma-Scores	57
4.2.7	Letalität	58
4.3	Aussagekraft von eFAST und Thoraxröntgenuntersuchung zur Pneumo- und Hämatothorax-Diagnostik im Schockraum	60
4.3.1	Konsequenzen aus eFAST, Thoraxröntgenuntersuchung und CT	63
4.4	Stellenwert von Thoraxröntgenuntersuchung und cCT/Ganzkörper-CT bei verstorbenen Schockraumpatienten	66

4.5	Fazit.....	69
5	Zusammenfassung	70
6	Anhang.....	72
6.1	Initiale Beurteilung des Mediastinums mittels Thoraxröntgenuntersuchung im Schockraum	72
6.2	Früherkennung mediastinaler Verletzungen	74
6.3	Letalität.....	78
6.4	Fragebogen	79
7	Literaturverzeichnis	80

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1.1: Unfallursachen von Schockraumpatienten.....	2
Abbildung 1.2: Traumanetzwerk Göttingen-Kassel	8
Abbildung 1.3: Damage control und early total care.....	11
Abbildung 2.1: Messstreckenübersicht.....	18
Abbildung 3.1: Messwertverteilung der Mediastinum/Thorax-Quotienten.....	28
Abbildung 3.2: Geschlechterverteilung der Mediastinum/Thorax-Quotienten.....	28
Abbildung 3.3: Untersuchungsgruppen-bezogene Messwertverteilung der Mediastinum/Thorax-Quotienten.....	29
Abbildung 3.4: Herzsilhouettengröße der Untersuchungsgruppen.....	32
Abbildung 3.5: Untersuchungsgruppen-bezogene Verletzungsschwere des Thorax	33
Abbildung 3.6: Thoraxverletzungsursachen der Untersuchungsgruppen.	34
Abbildung 3.7: Systolische Blutdruckwerte der Untersuchungsgruppen.....	35
Abbildung 3.8: Herzfrequenzbereiche der Untersuchungsgruppen.....	36
Abbildung 3.9: Intubationsstatus der Untersuchungsgruppen	37
Abbildung 3.10: Thoraxdrainagenstatus der Untersuchungsgruppen	38
Abbildung 3.11: Katecholamin-Gabe der Untersuchungsgruppen.....	39
Abbildung 3.12: NISS-Punktwerte der Untersuchungsgruppen	40
Abbildung 3.13: RISC-II-Score der Untersuchungsgruppen	40
Abbildung 3.14: Prozentualer Letalitätsvergleich der Untersuchungsgruppen	41
Abbildung 3.15: Prozentuale Darstellung der eFAST-Befunde.....	44
Abbildung 3.16: Prozentuale Darstellung der Thoraxröntgenuntersuchungsbefunde.....	45
Abbildung 3.17: Prozentuale Verteilung der CT- und Thoraxröntgenuntersuchung	47
Abbildung 6.1: Fragebogen zur Pneumo-/Hämatothorax-Primärdiagnostik im Schockraum.....	79

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1.1: Verletzungsschwereklassifikation	3
Tabelle 1.2: Berechnung von ISS und NISS	5
Tabelle 1.3: RISC-II-Score-Zusatzkriterien	6
Tabelle 1.4: Schockraumindikationen 1	9
Tabelle 1.5: Schockraumindikationen 2	10
Tabelle 1.6: Sonographische Pneumothoraxzeichen	13
Tabelle 2.1: Übersicht angewandter Signifikanztests Teil 1	21
Tabelle 2.2: Übersicht angewandter Signifikanztests Teil 2	21
Tabelle 3.1: Definierte Grenzwerte des Mediastinum/Thorax-Quotienten Messwert 1	30
Tabelle 3.2: Definierte Grenzwerte des Mediastinum/Thorax-Quotienten Messwert 2	31
Tabelle 3.3: Ergebnisse der Signifikanztestung und Signifikanzniveau Teil 1	41
Tabelle 3.4: Ergebnisse der Signifikanztestung und Signifikanzniveau Teil 2	42
Tabelle 3.5: Alters- und Geschlechterverteilung des Patientenkollektivs	43
Tabelle 3.6: Prozentuale Testgenauigkeit von eFAST und Thoraxröntgenuntersuchung zur Pneumo-/Hämatothorax-Diagnostik im Schockraum	45
Tabelle 3.7: Konsequenzen aus initialer Schockraumbildgebung	46
Tabelle 4.1: Autorenübersicht zur Testgenauigkeit der Thoraxröntgenuntersuchung in der Pneumo-/Hämatothorax-Diagnostik	51
Tabelle 4.2: Autorenübersicht zur Testgenauigkeit von eFAST und Thoraxröntgen- untersuchung in der Pneumo-/Hämatothorax-Diagnostik	63
Tabelle 6.1: Patientendaten und Messwerte aller Patienten	72
Tabelle 6.2: Grenzwert-bezogene Ergebnisverteilung des Mediastinum/Thorax-Quotienten 1	73
Tabelle 6.3: Grenzwert-bezogene Ergebnisverteilung des Mediastinum/Thorax-Quotienten 2	74
Tabelle 6.4: Übersicht deskriptive Daten des Herz/Thorax-Quotienten und der Throaxverletzungsschwere	74
Tabelle 6.5: Übersicht deskriptive Daten der Verletzungsursachen	75
Tabelle 6.6: Übersicht deskriptive Daten der Vitalparameter	75
Tabelle 6.7: Übersicht deskriptive Daten der Polytrauma-Kennwerte	77
Tabelle 6.8: Übersicht deskriptive Daten zur Schockraumletalität	78

Abkürzungsverzeichnis

AAST	<i>American Association for the Surgery of Trauma</i>
AIS	<i>Abbreviated Injury Scale</i>
ACS COT	<i>American College of Surgeons Committee on Trauma</i>
ATLS	<i>Advanced Trauma Life Support</i>
ARDS	<i>Acute Respiratory Distress Syndrome</i>
CT	Computertomographie
DGU®	Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie
eFAST	<i>Extended Focused Assessment with Sonography for Trauma</i>
ETC	<i>European Trauma Course</i>
GCS	<i>Glasgow Coma Scale</i>
Gruppe Röt	Gruppe Röntgenthorax
Gruppe eF	Gruppe eFAST
HF	Herzfrequenz
ISS	<i>Injury Severity Score</i>
Med./Thor.-Quotient	Mediastinum/Thorax-Quotient
Neg. präd. Wert	Negativ prädiktiver Wert
NISS	<i>New Injury Severity Score</i>
OP	Operation
PACS	<i>Picture Archiving and Communication System</i>
PHTLS	<i>Pre Hospital Trauma Life Support</i>
Pos. präd. Wert	Positiv prädiktiver Wert
RISC /RISC-II	<i>Riversed Injury Severity Classification/-II</i>
RR	Riva-Rocci (Blutdruck)
SIRS	<i>Systemic Inflammatory Response Syndrome</i>
SMR	Standard-Mortalitätsrate
Sono	Sonographie
SpO ₂	Sauerstoffsättigung
TRISS	<i>Trauma and Injury Severity Score</i>
UMG	Universitätsmedizin Göttingen
ZNS	Zentrales Nervensystem

1 Einleitung

1.1 Polytraumaversorgung in Deutschland

Im Jahr 2015 haben in Deutschland 9,73 Millionen Menschen eine Unfallverletzung und 24.578 einen tödlichen Unfall erlitten (BAuA 2017). Laut Jahresbericht des TraumaRegister DGU® (2018) wurden deutschlandweit 43.289 Schockraumpatienten ins Traumaregister aufgenommen. Davon hatten 18.805 Patienten einen ISS von ≥ 16 und 4996 eine relevante Verletzung mindestens zweier Körperregionen, in Kombination mit einem physiologischen Problem (TraumaRegister DGU® 2018, Pape et al. 2014).

Das Polytrauma wurde 1987 von Tscherne definiert und bezeichnet die Verletzung von mehreren Körperregionen oder Organsystemen, wobei jede einzelne oder die Kombination mehrerer für den Betroffenen lebensbedrohlich ist. Die aktuelle Polytraumadefinition schließt zusätzlich hämodynamisch relevante und immunmodulatorische Vorgänge mit ein (Oestern et al. 2014, Niethard et al. 2014). Dies kann zum *Systemic Inflammatory Response Syndrom* (SIRS) und Multiorganversagen führen, weshalb polytraumatisierte Personen ein erhöhtes Morbiditäts- und Mortalitätsrisiko aufweisen (Butcher und Balogh 2009, Niethard et al. 2014).

Hauptursache von Polytraumen sind schwere Verkehrsunfälle und Absturztraumen. Sie stellen einen klinischen Notfall dar (ca. 1% aller Notarzteinsätze) und führen in etwa 20% zum Tod (Aschenbrenner und Biberthaler 2012).

Die führenden Unfallursachen der über den Schockraum eingelieferten Patienten, die als sogenanntes Basis-Kollektiv vom TraumaRegister DGU® zusammengefasst werden, sind in Abbildung 1.1 dargestellt. Dabei zeigt sich an erster Stelle der Sturz aus unter 3 m Höhe, an zweiter Stelle die PKW-Verkehrsunfälle, gefolgt von Stürzen aus über 3 m Höhe (siehe Abbildung 1.1).

Abbildung 1.1: Graphische Darstellung der häufigsten Unfallursachen der deutschlandweit über den Schockraum eingelieferten Patienten (Basis-Kollektiv 2017/2018). Das weiße Säulendiagramm repräsentiert die Patientenanzahl des Basis-Kollektivs 2017 mit Sturz <3m Höhe (n=8583, 26%), Verkehrsunfall-PWK/LKW (n=6907, 21%) und Sturz >3m Höhe (n=5028, 15%). Grau hinterlegt wird die Patientenzahl des Basis-Kollektivs 2018 mit Sturz <3m Höhe (n=9042, 26%), Verkehrsunfall-PWK/LKW (n=7134, 21%) und Sturz >3m Höhe (n=4943, 14%) dargestellt.

(modifiziert nach TraumaRegister DGU® 2017, TraumaRegister DGU® 2018)

Die hohe Sterblichkeit polytraumatisierter Patienten wird in eine frühe und eine späte Mortalität unterteilt. Die frühe Mortalitätsrate wird durch primäre Verletzungen des ZNS und traumatisch bedingten großen Blutverlust hervorgerufen (Keel und Trentz 2005, Meier und Habler 2007). Hierbei handelt es sich überwiegend um nicht mit dem Leben vereinbarende Verletzungen. Bei der späten Mortalität steht die Fehlregulation des Immunsystems im Vordergrund. Diese SIRS-vermittelte endotheliale Zellzerstörung kann durch Apoptose von Parenchymzellen zur Multiorgandysfunktion (MODS) bis hin zum Multiorganversagen (MOF) führen (Keel und Trentz 2005).

1.1.1 Skalen zur Einschätzung der Verletzungsschwere

Zur Vergleichbarkeit und zur Prognoseeinschätzung wurden verschiedene Scores entwickelt. Die Verletzungsschwere wird allgemein nach dem Injury Severity Score erfasst.

1.1.1.1 Abbreviated Injury Scale (AIS)

Die Abbreviated Injury Scale dient als Grundlage zur Einteilung der Verletzungsschwere (Haasper et al. 2010). Sie ist ein Klassifikationssystem, basierend auf einer rein anatomischen Beschreibung der Verletzungen. Behandlungsart, -dauer oder -qualität werden nicht berücksichtigt (Baker et al. 1974, Haasper et al. 2010, Dokov und Radoinova 2014). Innerhalb der Körperregion wird die Verletzungsschwere in sechs Gruppen eingeteilt. Der AIS-Code 1 steht für unverletzte bzw. leichtverletzte Patienten, 6 für eine hohe Mortalitätswahrscheinlichkeit (Baker et al. 1974). Bei Personen mit Mehrfachverletzungen wird der höchste bzw. maximale AIS-Code (MAIS) aller verletzten Körperregionen herangezogen, um die allgemeine Verletzungsschwere zu klassifizieren (siehe Tabelle 1.1) (Haasper et al. 2010, Schmitt et al. 2010, Dokov und Radoinova 2014).

Das Besondere am AIS ist seine weitverbreitete Akzeptanz hinsichtlich der anatomischen Einteilung und Beschreibung der Überlebenswahrscheinlichkeit von Einzelverletzungen (Baker et al. 1974, States und Viano 1990). Europaweit dient der AIS als Grundlage für die offizielle Statistik zur Verletzungsschwereklassifikation und zur Definition lebensgefährlicher Verletzungen im Verkehr (DVR 2012).

Tabelle 1.1: Veranschaulichung der Verletzungsschwereklassifikation nach den Kriterien: Behandlungsart, MAIS und ISS.

Verletzungsklassifikation:	Behandlungsart	MAIS	ISS
Leichtverletzt	ambulant	<2	<5
Schwerverletzt	ambulant/stationär, ohne Intensivstation	2 - 4	5 - 20
Schwerstverletzt	Stationär mit/ohne Intensivstation	≥3	>20

(modifiziert nach Auerbach et al. 2009)

1.1.1.2 Injury Severity Score (ISS)

Der ISS, erstmals 1974 von Baker publiziert, basiert auf der AIS-Klassifikation und beschreibt Verletzungen, die sowohl einzelne als auch mehrere Körperregionen betreffen (Lefering 2010). Es fließen der *Anatomical Localizer* (Schädel und Hals, Gesicht, Thorax, Abdomen, Extremitäten und Weichteile) und der Verletzungsgrad in die Berechnung ein, wodurch ISS-Werte von 1 bis maximal 75 Punkte ermittelt werden (Chawda et al. 2004). Punktwerte von 1 ergeben sich bei leichtverletzten, 75 bei schwerst- ggf. mehrfachverletzten Patienten. Laut Definition wird ein AIS-Code 6 nur vergeben, wenn die Verletzung einer Körperregion nicht mehr mit dem Leben zu vereinbaren ist, woraus automatisch ein ISS-Punktwert von 75 resultiert (Baker et al. 1974, Baker und O'Neill 1976). Der ISS korreliert sehr gut mit der Mortalitäts- und Morbiditätsrate sowie der Krankenhausverweildauer (Baker et al. 1974, Baker und O'Neill 1976, Lefering 2002).

Die Berechnung des ISS erfolgt über die Summe der Quadratzahlen der AIS-Codes der drei am schwersten verletzten Körperregionen ($a^2 + b^2 + c^2 = \text{ISS-Wert}$) (Copes et al. 1988, Baker et al. 1974).

1.1.1.3 New Injury Severity Score (NISS)

Bei der alten Definition des ISS konnten zeitgleich entstandene Mehrfachverletzungen wie beispielsweise eine Amputation an oberer und unterer Extremität nicht gleichzeitig berücksichtigt werden. Somit entstanden zu niedrige, nicht der tatsächlichen Verletzungsschwere entsprechende ISS-Werte. Deshalb wurde 1997 der ISS überarbeitet und erstmals als New Injury Severity Score publiziert (Osler et al. 1997). Dank der Überarbeitung konnte die zuvor angesprochene Schwäche durch Summation und Addition der drei höchsten AIS-Werte unabhängig von der Körperregion behoben werden (Osler et al. 1997, Whitaker et al. 2003). Zusätzlich zeigte sich beim NISS eine höhere Sensitivität und Spezifität bei polytraumatisierten Patienten mit multiplen Extremitätenverletzungen und eine andeutungsweise höhere Vorhersagekraft zu erwartender Komplikationen, verglichen mit dem ISS (Brenneman et al. 1998, Balogh et al. 2000, Husum und Strada 2002).

Tabelle 1.2: Darstellung der Berechnung von ISS und NISS nach den sechs vom AIS definierten Körperregionen.

Score:	AIS
Schädel und Hals	2
Gesicht	1
Thorax	2
Abdomen	3
Extremitäten	Untere: 4/Obere: 5
Weichteile	2
ISS	$(2)^2 + (3)^2 + (5)^2 = 38$ Punkte
NISS	$(3)^2 + (4)^2 + (5)^2 = 50$ Punkte

1.1.1.4 Revised Injury Severity Classification (RISC)-Score

Der RISC-Score dient der Prognose der Überlebenswahrscheinlichkeit und wurde anhand von gesammelten TraumaRegister DGU® Daten (2800 Patienten) der Jahre 1993 bis 2000 entwickelt, validiert und löste 2003 den Trauma and Injury Severity Score (TRISS) ab (Lefering 2009). Der RISC-Score kombiniert zehn Informationen sowohl der anatomischen als auch der physiologischen Verletzungsschwere und stellt diese der standardisierten Mortalitätsrate gegenüber (Ruchholtz et al. 2008).

Im September 2014 wurde ein vom TraumaRegister DGU® erneut überarbeiteter Prognosewert, der RISC-II-Score, veröffentlicht. Zur Erhebung wurden mindestens mittelschwer verletzte Europäer ($ISS \geq 4$) der Jahre 2010 bis 2011 (insgesamt 30866 Patienten) analysiert und gegengeprüft. Das Ziel war, die in den letzten Jahren entstandene Abweichung zwischen standardisierter Mortalitätsrate und errechnetem RISC-Score durch vorher nicht berücksichtigte Beurteilungskriterien auszugleichen (siehe Tabelle 1.3) (Lefering et al. 2014).

Tabelle 1.3: Darstellung der neuen RISC-II-Score-Zusatzkriterien.

RISC-II-Zusatzkriterien:	
<ul style="list-style-type: none"> • Schwerste und zweitschwerste Verletzung nach AIS-Klassifikation • Unfallmechanismus (stumpf/penetrierend) • GCS (nur motorische Komponente) • Kopfverletzungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Feinere Abstufung beim Alter • Vorauffälligkeiten (ASA vor Unfall) • INR anstatt Quick • Pupillenreaktion und Pupillenweite
Ausgeschlossen: Alter = 0; ISS <4	

(modifiziert nach Lefering 2015)

1.1.1.5 Einteilung von Thoraxverletzungen

Thoraxverletzungen können anhand des Unfallmechanismus (stumpf oder penetrierend), anatomischer Strukturen (Brust-, Lungengewebe-, Atemwegs-, Ösophagus-, Diaphragma Verletzung) und definierter Schweregrade eingeteilt werden. Die Schweregrade reichen von Grad 0 (keine Thoraxverletzung) bis Grad III (schweres Thoraxtrauma) (Bölükbas et al. 2011, Khandhar et al. 2007, Blalock und Ochsner 1966). Die einzelnen Abstufungen werden anhand der Komplikationsraten und respiratorischen Einschränkung vorgenommen. So stehen bei Grad I Thoraxwandprellungen und einfache Rippen bzw. Sternumfrakturen im Vordergrund, die keine respiratorischen Einschränkungen oder Komplikationen verursachen. Bei Grad II (mittelschweres Thoraxtrauma) kommt es zu direkten Komplikationen und einer respiratorischen Insuffizienz. Bei Grad III (schweres Thoraxtrauma) liegt eine respiratorischen Insuffizienz vor, die mittels Respiratortherapie behandelt werden muss (Encke et al. 1978).

1.1.2 Organisation der Polytraumaversorgung in Deutschland

1.1.2.1 TraumaNetzwerk DGU®

In Deutschland sind flächendeckend Traumazentren etabliert worden, die die Versorgung der Verletzten abdecken sollen. Mehrere Traumazentren haben sich zu sogenannten Traumanetzwerken zusammen geschlossen, die in den Bereichen Diagnostik, Therapie, Qualitätssicherung, Forschung, Fort- und Weiterbildung kooperieren (TraumaNetzwerk DGU® 2019a). Die teilnehmenden Kliniken werden anhand von definierten Kriterien, beispielsweise 24-stündige Facharztpräsenz

verschiedener Abteilungen, Intensivkapazität, Verfügbarkeit personeller und apparativer Diagnostik, in lokale-, regionale- und überregionale Traumazentren unterteilt (Weißbuch DGU® 2006). Insgesamt nehmen 677 Kliniken aus Deutschland, Österreich, Schweiz, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg teil, wodurch 53 zertifizierte, grenzüberschreitende Traumanetzwerke entstanden sind (TraumaNetzwerk DGU® 2019b, Sturm und Hoffmann 2016).

Die flächendeckende Telekooperation stellt einen weiteren Baustein des TraumaNetzwerks DGU® dar. Mit TKmed® entstand 2012 erstmals eine multidisziplinäre und sektorenübergreifende Vernetzung medizinischer Dienstleister, nach dem *Jeder-mit-Jedem-Prinzip*. Dies war die bislang einzige bundesweit verfügbare Teleradiologie- und Telekonsultationsplattform zur Bild- und Dokumentenübertragung (Sturm und Hoffmann 2016).

Das übergeordnete Ziel eines Traumanetzwerkes ist die Verbesserung der Versorgungsqualität von Schwerverletzten mittels optimierter Kommunikation, abgestimmter Versorgungsstandards und effizienter Nutzung regionaler und überregionaler Ressourcen (Ruchholtz et al. 2007, Ruchholtz et al. 2008).

1.1.2.2 TraumaRegister DGU®

Das TraumaRegister DGU® wurde 1993 als Instrument zur multizentrischen Erfassung von wissenschaftlichen, epidemiologischen und ökonomischen Behandlungsdaten Schwerverletzter im deutschsprachigen Raum gegründet (Nast-Kolb et al. 2000, Ruchholtz et al. 2008). Anhand der aktuellen Fall-, Behandlungs-, Operations- und Versorgungszahlen erfolgt die Klassifikation der einzelnen Kliniken (Neugebauer et al. 2012). Diese Prozessanalyse hilft den teilnehmenden Kliniken, Schwachstellen zu identifizieren, neue Behandlungskonzepte und Versorgungsabläufe zu überprüfen und ggf. zu etablieren (Ruchholtz et al. 2008).

1.1.3 Das überregionale Traumazentrum Göttingen-Kassel

Das überregionale Traumazentrum Göttingen-Kassel nimmt in Südniedersachsen und bundeslandübergreifend eine zentrale Rolle in der Versorgung schwerstverletzter Patienten ein. Die UMG zusammen mit dem Klinikum Kassel sind im Umkreis von ca. 150 Kilometer die größten Kliniken der unfallchirurgischen Maximalversorgung. In der UMG werden jährlich rund 800 Schwerverletzte im Schockraum der zentralen

chirurgischen Notaufnahme behandelt, wovon mehr als 300 lebensbedrohlich ($ISS \geq 16$) verletzt sind (UMG 2019).

Das Traumazentrum Göttingen steht aufgrund der positiven Bilanz zwischen prognostizierter und tatsächlicher Letalität sowie der hohen Fallzahl im internationalen Vergleich an einer Spitzenposition (UMG 2019).

Abbildung 1.2: Einzugsgebiet des Traumanetzwerk Göttingen-Kassel, dargestellt als graue Fläche mit insgesamt 14 registrierten Kliniken. Das Universitätsklinikum Göttingen und das Klinikum Kassel (rote markierte Punkte) stellen überregional zertifizierte Versorgungszentren dar. Die blau und grün gekennzeichneten Städte stellen regional- und lokal zertifizierte Kliniken dar.

(modifiziert nach TeleKooperation TNW® 2019)

1.2 Polytraumamanagement

Das Polytraumamanagement erfolgt anhand von Prioritäten-orientierten Abläufen präklinisch durch das *Pre Hospital Trauma Life Support* (PHTLS), im Schockraum mittels *Advanced Trauma Life Support* (ATLS) und *European Trauma Course* (ETC) (Waydhas 2012). Der frühestmögliche präklinische Behandlungsbeginn und die schnellstmögliche Einleitung einer Kausaltherapie stellen übergeordnete Ziele dar

(Fischer et al. 2016). Beim Polytraumamanagement werden verschiedene Behandlungsphasen unterteilt:

- Prähospital-Phase
- Schockraum-Phase
- Erste und zweite operative Phase

1.2.1 Prähospital-Phase

Die professionelle Behandlung des Patienten beginnt am Unfallort. Der Schwerpunkt liegt dabei laut aktueller Leitlinie Polytrauma (2016) nicht auf einem bestimmten Ablaufschema, vielmehr werden einzelne verletzungs-bezogene Aspekte fokussiert und ihren Prioritäten nach geordnet. Als Orientierungshilfen dienen Konzepte wie das *PHTLS* und übergreifende Betrachtungsweisen, wie die Empfehlungen der DGU® (Waydhas 2012, Leitlinie Polytrauma 2016). Es ist entscheidend, dass die Patienten präklinisch anhand ihrer Verletzungsschwere möglichst genau eingeteilt werden, um eine effiziente Schockraumversorgung zu gewährleisten und eine Unter- oder Übertriage möglichst zu vermeiden (Waydhas 2012). Als Anhaltspunkte zur präklinischen Beurteilung von Patienten dienen die in Tabelle 1.4 und Tabelle 1.5 aufgeführten Kriterien zur Schockraumalarmierung (Waydhas 2012).

Tabelle 1.4: Schockraumindikationen 1

Allgemeine Schockraumindikationen:	
<ul style="list-style-type: none"> • Post-traumatisch: systolischer Blutdruck <90 mmHg • Post-traumatisch: Atemstörung und Intubationspflicht • Post-traumatisch: GCS <9 • Frakturen von >als zwei proximalen Knochen • Verbrennung von 20% und Grad >2b 	<ul style="list-style-type: none"> • Amputationsverletzung proximal von Händen/Füßen • Penetrierende Verletzung der Rumpf-Hals Region • Querschnittverletzung • Offene Schädelverletzung • Instabile Thorax-/Beckenfraktur

(modifiziert nach Neugebauer et al. 2012)

Tabelle 1.5: Schockraumindikationen 2

Unfallmechanismus definierte Schockraumindikationen:

<ul style="list-style-type: none"> • Sturz aus >3 m • Verkehrsunfall mit Frontalaufprall und Intrusion von 50 – 75 cm • Fußgänger- oder Zweiradkollision 	<ul style="list-style-type: none"> • Tod oder Ejektion eines Autoinsassen • Geschwindigkeitsänderung Delta >30 km/h
--	--

(modifiziert nach Neugebauer et al. 2012)

1.2.2 Schockraum-Phase

Die Patienten werden über einen Schockraum von medizinisch geschultem Fachpersonal aufgenommen. Wichtige Aspekte stellen 1. die Diagnostik, 2. das Erstellen eines adäquaten Therapiekonzeptes und 3. die Planung der Weiterversorgung dar. Zur adäquaten Schockraumversorgung werden interdisziplinäre Teams zusammengestellt, die schon vor der Ankunft des Schwerverletzten vollzählig anwesend sein sollten (Spering et al. 2017).

In überregionalen Traumazentren wird eine ressourcenorientierte Erweiterung des Schockraum Teams, je nach Verletzungsmuster und vitaler Bedrohung durchgeführt, um die Versorgungsdauer des Schwerverletzten reduzieren zu können (Spering et al. 2017, Piek und Jantzen 2000).

Im Schockraum selbst erfolgt die initiale Patientenbehandlung mittels *primary und secondary survey*. Dabei werden innerhalb der ersten Minuten nach Ankunft im Schockraum vital bedrohliche Zustände abgeklärt. Es wird ein der Situation und Verletzungsschwere angepasstes Handeln anhand des vom *ATLS* publizierten A-(Airway), B-(Breathing), C-(Circulation), D-(Disability), E-(Exposure/Environment) Algorithmus angestrebt. Außerdem spielt bei der klinischen Untersuchung des Patienten die Bildgebung mittels Röntgen, CT und Notfallsonographie eine zentrale Rolle (Hokema et al. 2007).

1.2.3 Erste operative Phase

Thoraxtraumen stellen die zweit häufigste Verletzung von Schockraumpatienten dar (TraumaRegister DGU® 2018). Deshalb ist es wichtig, vorliegende lebenslimitierende Thoraxverletzungen wie beispielsweise eine Aortenruptur, Aortendissektion oder Herzbeuteltamponade frühzeitig zu erkennen und ggf. notoperativ zu versorgen.

Bei der operativen Versorgung kann entweder nach dem *early total care*- oder dem *damage control* -Prinzip vorgegangen werden. Beim *damage control* -Prinzip werden Operationen auf die für den Patienten überlebensnotwendigen Schritte begrenzt (Doll et al. 2010). Das Ziel ist es, Sekundärschäden zu minimieren und das Outcome der Patienten zu maximieren (Bouillon et al. 2009). Die *early total care* zielt auf eine initial definitive Versorgung der Verletzung ab. Die Untersuchung von Pape H-C et al. (2009) zur Abgrenzung des *damage control* - und *early total care* -Prinzip zieht den im Schockraum vorliegenden Patientenzustand als Entscheidungskriterium heran (siehe Abbildung 1.3).

Abbildung 1.3: *Damage control* und *early total care* im Überblick. Einteilung der Behandlungsstrategien anhand des klinischen Zustandes des Schockraumpatienten (Stabil/Grenzwertig/Instabil/Im Sterben liegend) und angepasste Weiterbehandlung auf Intensivstation oder im Operationssaal.

(modifiziert nach Pape H-C et al. 2009)

1.3 Diagnostisches Vorgehen im Schockraum

1.3.1 Notfallsonographie im Schockraum

Etabliert ist die Sonographie seit vielen Jahren im Schockraum zum Erkennen von lebensgefährlichen Blutungen. Die Sonographie ist eine nicht invasive, schnell durchführ- und erlernbare Untersuchung in Echtzeit mit hoher Auflösung und Verfügbarkeit (Koerner et al. 2008, Freeman 1999).

FAST bedeutet *Focussed Assessment with Sonography for Trauma* und stellt eine stark sensitive Methode zur Detektion freier Flüssigkeit im Abdomen dar (Lingawi und Buckley 2000). Freie intraabdominelle Flüssigkeit kann ab einem Volumen von etwa 100 ml detektiert werden (Goldberg et al. 1970). Blutungsinduzierte freie Flüssigkeit im Abdomen führt alle 3 Minuten zu einem 1%-igen Anstieg der Sterbewahrscheinlichkeit (Clarke et al. 2002). Deshalb hat das FAST einen hohen Stellenwert im Schockraum und hat sich als Standarduntersuchungsmethode bewährt (Leitlinie Polytrauma 2016).

Intraabdominelle Flüssigkeit verteilt sich entlang der Schwerkraft in die tiefsten Räume des Abdomens, dem Morison-Pouch (intraperitoneal im Bereich der rechten Niere), dem Koller-Pouch (intraperitoneal zwischen der Milz und der linken Niere) und dem Douglas-Raum (intraperitoneale Einsenkung zwischen Rektum und Uterus) (Koerner et al. 2008, Kirschning et al. 2009). Es gilt zu beachten, dass das FAST zwar eine hohe, Blutvolumen-abhängige Sensitivität zur Detektion freier Flüssigkeit besitzt, aber nur eine schwache Sensitivität zum Nachweis der ursächlichen Organverletzung (Koerner et al. 2008).

Thoraxtraumen stellen die zweit häufigste Unfallverletzungen von Schockraumpatienten dar (TraumaRegister DGU® 2018). Deshalb wurde eine Erweiterung (eFAST) der initial orientierenden Abdomensonographie (FAST) im Schockraum eingeführt, um unfall-assoziierte Krankheitsbilder im Thoraxbereich schnellstmöglich zu erkennen.

eFAST bedeutet *Extended Focussed Assessment with Sonography for Trauma* und zielt auf die Detektion freier Flüssigkeit im Thorax ab (Kirkpatrick et al. 2004, Mathis und Osterwalder 2010). Außerdem ermöglicht die Thoraxsonographie, bei fehlendem Lungengleiten einen Pneumothorax, bei echofreiem/echoarmem an das Zwerchfell grenzenden Raum einen Hämatothorax sowie Pleuraergüsse mit unterschiedlicher Sensitivität zu detektieren (siehe Tabelle 1.6) (von Ow und Osterwalder 2012, Kreuter et al. 2012).

Das eFAST beinhaltet tiefe interkostal-, subxyphoidal-, subkostal, mediane Becken- und antero-laterale Thoraxschnitte (Wastl et al. 2015).

Tabelle 1.6: Sonographische Zeichen eines Pneumothorax

Pneumothoraxkriterien:	
• Fehlendes Gleitzeichen/ <i>Power-slide</i> Zeichen	• Fehlende pulssynchrone Pleuraverschieblichkeit
• Fehlender Kometenschweifartefakt	• Fehlende präinterventionelle subpleurale Läsionen
• Nachweis von Wiederholungsechos	• Nachweis des <i>Lung point</i>

(modifiziert nach Reissig und Kroegel 2006)

Limitierende Faktoren der Thoraxsonographie stellen Emphyseme, schwere Adipositas und adhäsive Pleuraveränderungen dar (Kreuter et al. 2011, Reissig et al. 2011). Trotz steil verlaufender Lernkurve ist eine untersucher- und ausbildungs-abhängige Abweichung der Untersuchungsergebnisse und -qualität zu berücksichtigen (Potthoff et al. 2012, Rozycki und Shackford 1996, Shackford et al. 1999). Die Schallwellen-undurchlässigkeit von Knochen und die Totalreflexion von Luft führen zu einer eingeschränkten diagnostischen Beurteilung von Frakturen und Lufteinschlüssen (Kreuter et al. 2012). Eine absolute Grenze der Notfallsonographie stellt die Eindringtiefe der Schallwellen dar. Sie kann bei adipösen Patienten aufgrund der großen Gewebemasse oberhalb der Organe eine Beurteilung stark erschweren (Grau 2007).

1.3.2 Röntgen-Diagnostik im Schockraum

Das Röntgen ist eine nicht invasive und seit Langem etablierte bildgebende Diagnostik im Schockraum (Körner et al. 2009). Körperregion- und Patientenkonstitutions-abhängig wird eine unterschiedliche Strahlungsqualität bzw. -stärke verwendet (Bundesärztekammer 2007). In der Vergangenheit war die Thoraxröntgenuntersuchung das Standardverfahren in der primären Schockraum-Diagnostik, wurde aber aktuell vom CT abgelöst (Leitlinie Polytrauma 2016).

Bei der Fragestellung Hämato-/ Pneumo- bzw. Spannungspneumothorax wird im Röntgenbild des Thorax nach sichtbaren Pleuralinien, einer vermehrten Transparenz

und fehlender Gefäßzeichnung lateral der kollabierten Lunge gesucht (Traub et al. 2007, Diederich und Wormanns 2009).

Bei der Thoraxröntgenuntersuchung gilt laut Achenbach (2012), dass je kleiner, je weniger dicht und je zentraler eine Pathologie ist, umso leichter wird sie übersehen. Problematisch stellen sich außerdem technische Aspekte der Projektionsradiographie (Projektionsartefakte und Überlagerungsaspekte), die Schwierigkeiten einer orthograden Einstellung und die geringe Differenzierbarkeit geweblicher Aspekte dar. Darüber hinaus ist eine Darstellung intrakardialer Geschehen oder einer Lungenarterienembolie mittels Thoraxröntgenuntersuchung nicht möglich (Achenbach 2012).

1.3.3 Computertomographie im Schockraum

Die Computertomographie stellt den aktuellen Schockraumstandard zur radiologischen Untersuchung schwerverletzter Patienten dar (Leitlinie Polytrauma 2016). Die Computertomographie ist eine Schichtbilddaufnahme, mit der sämtliche Gewebearten sowie Lage- und Formanomalien von Organstrukturen sehr genau differenziert werden können (Farkas 1986, Tsai et al. 2003).

Mit der Einführung des Multislice-CT konnte eine neue Dimension der Volumenerfassung, der Orts- und Zeitauflösung sowie eine 3D-Rekonstruktion anatomischer Strukturen ermöglicht werden (Schoepf et al. 1999, Flohr et al. 2007). Das Multislice-CT hat sich in der Schockraum-Diagnostik etabliert und dank kontinuierlicher Bilddatenakquisition, vorprogrammierter Untersuchungsprotokolle sowie schnellerer Bildberechnung zu einer Verbesserung der Schockraum-Diagnostik geführt, bei gleichzeitig signifikant verkürzter Untersuchungszeit (Novelline et al. 1999, Linsenmaier et al. 2001, Albrecht et al. 2004, Boehm et al. 2004).

Bei schwerverletzten Patienten kommt meist das Ganzkörper-CT (Schädel, Hals, Thorax, Abdomen und Becken) zum Einsatz, der sogenannte Traumascan. Hierbei können mittels 2D- und 3D-Rekonstruktionen Lungen-, Abdominal- und Gefäßverletzungen wie beispielsweise traumatische Aortenaneurysmen oder -rupturen detektiert werden (Rieger et al. 2002). Darüber hinaus können komplizierte Frakturen des Bewegungsapparates und intrazerebrale Ereignisse wie Blutungen oder Ischämien diagnostiziert werden (Schramm 2005). Außerdem stellt das CT die Untersuchungsmethode mit der höchsten Sensitivität und Spezifität zur Pneumo- und Hämatothorax-Diagnostik dar (Reissig und Kroegel 2006).

Bei der Gefäßdarstellung im CT gilt es zu beachten, dass die Kontrastmittelgabe ggf. mit Komplikationen, wie beispielsweise einer allergischen Reaktion, einer vermehrten Nierenbelastung oder einer thyreotoxischen Krise einhergehen kann (Schönenberger et al. 2010). Außerdem geht das Multislice-CT mit einer um den Faktor 1,8 höheren Strahlenbelastung im Vergleich zum normalen Spiral-CT einher (Ruchholtz et al. 2002, Prokop et al. 2006).

1.4 Herleitung der Fragestellung

Die allgemeine Analyse diagnostisch-therapeutischer Behandlungen hat gezeigt, dass hierin ein großes Verbesserungspotential besteht (Messmer et al. 2001, Kanz et al. 2004, Ruchholtz 2004). Deshalb sollten die diagnostischen Handlungsabläufe anhand ihrer Therapierelevanz evaluiert und mittels Algorithmen zeitoptimiert vernetzt werden (Kanz et al. 1994, Ruchholtz et al. 1998).

Das Ziel dieser Arbeit ist es, zu klären:

- ob eine Optimierung des Schockraummanagements bei den bildgebenden Verfahren möglich ist;
- ob retrospektiv betrachtet, traumatisch bedingte Verletzungen des Mediastinums in der Thoraxröntgenuntersuchung z. B. durch die Bestimmung mediastinaler Quotienten erkannt werden können;
- ob eine Früherkennung mediastinaler Verletzungen anhand von präklinisch am Unfallort und klinisch im Schockraum erhobener Parameter möglich ist;
- ob sich aufgrund der Verletzung des Mediastinums ein Letalitätsunterschied zeigt;
- ob in einer 2. Phase anhand von prospektiv erhobener Parameter untersucht werden kann, ob Sonographie (eFAST) und Thoraxröntgenuntersuchung hinsichtlich der Erstdiagnose eines Pneumo-/Hämatothorax im Schockraum vergleichbar sind;
- ob sich aus einem der beiden Verfahren eFAST oder Thoraxröntgenuntersuchung mehr direkte therapeutische Konsequenzen, z. B. in Form einer Thoraxdrainage ergeben haben;
- ob sich retrospektiv betrachtet ein prozentualer Unterschied durchgeführter CT und Thoraxröntgenuntersuchungen bei im Schockraum verstorbenen Patienten zeigt;
- ob die ermittelten Daten durchgeführter CT- und Thoraxröntgenuntersuchungen verstorbener Schockraumpatienten konkordant oder abweichend sind von den im TraumaRegister DGU® dokumentierten Patienten.

2 Material und Methoden

Die Arbeit umfasst eine Studie zur Erkennung von Thoraxverletzungen mittels bildgebender Verfahren im Schockraum der Universitätsmedizin Göttingen. Unter dem Aktenzeichen DOK_121_2016 wurde die Arbeit bei der Ethikkommission registriert.

2.1 Beurteilung des Mediastinums im Schockraum mittels Thoraxröntgenuntersuchung

Zur Ermittlung geeigneter Patienten wurde die Schockraumdokumentation 2013/2014 der UMG herangezogen. Alle aufgelisteten Patienten wurden hinsichtlich der Ein- und Ausschlusskriterien überprüft und pseudonymisiert in eine Excel-Tabelle übertragen.

Anschließend wurden alle relevanten Patienten aus dem PACS (*Picture Archiving and Communication System*) aufgerufen. Die a.p. Thoraxröntgenuntersuchung wurde an einem Befundungsmonitor begutachtet und, wie in Abschnitt 2.1.3 beschrieben, ausgemessen.

Die Identifizierung mediastinaler Verletzungen erfolgte mittels ICD-10 Kodierung und diente als Basis zur Einteilung der Patienten in zwei Untersuchungsgruppen: (1) Patienten mit mediastinaler Verletzung (Gruppe *Auffällig*) und (2) ohne Mediastinalverletzung (Gruppe *Unauffällig*).

Die statistische Auswertung erfolgte mittels Excel und Statistica, siehe Abschnitt 2.1.8. Zur Früherkennung mediastinaler Verletzungen erfolgte zusätzlich eine Untersuchungsgruppen-bezogene Signifikanztestung hinsichtlich am Unfallort (Zeitpunkt A) und im Schockraum (Zeitpunkt B) erhobener Parameter.

2.1.1 Einschlusskriterien

- Patienten, die im Zeitraum vom 01.01.2013 bis 31.12.2014 über den Schockraum der UMG aufgenommen wurden.
- Im Schockraum angefertigte Thoraxröntgenuntersuchung und CT-Untersuchung mit Abbildung des Thorax (CT-Thorax/Ganzkörper-CT/Traumascan).
- Patienten mit stumpfem Thoraxtrauma.
- Stör- und artefaktfreie Thoraxröntgenuntersuchung.

2.1.2 Ausschlusskriterien

- Penetrierende Thoraxverletzungen.
- Thoraxröntgenuntersuchung mit *Spineboard* oder anderen Röntgenstrahlen- beeinflussenden Materialien.
- Andere Ein- oder Zuweisungswege als der Schockraum sowie elektiv für Operationen einbestellte Patienten.

Hinsichtlich Alter, Geschlecht und ethnischer Herkunft hat keine Limitierung stattgefunden.

2.1.3 Messverfahren

Es wurden sechs standardisierte Messstrecken gewählt, die im Folgenden beschrieben und in der Abbildung 2.1 als Übersicht dargestellt werden.

Unter Anwendung des Längenmesstools im PACS erfolgte die manuelle Bestimmung von Messstreckenansatz- und Endpunkt. Die ermittelten Entfernungen der angelegten Messpunkte wurden in der Maßeinheit Millimeter angegeben und in die pseudonymisierte Excel-Tabelle übertragen.

Breitester Herzdurchmesser (Messstrecke a)

Als breitester Herzdurchmesser wurde im Bereich der 6. bis 8. Rippe die Messstrecke a vom äußeren rechten Vorhofrand bis zum linken Ventrikelrand definiert (siehe Abbildung 2.1).

Breitester Thoraxdurchmesser (Messstrecke b)

Als breitester Thoraxdurchmesser bzw. Messstrecke b wurde die innere Thoraxapertur in Höhe der Messstrecke a definiert. Dabei wurde vom linken- bis zum rechten inneren Rippenrand der jeweiligen Thoraxseite gemessen (siehe Abbildung 2.1).

Mediastinaldurchmesser 1 (Messstrecke A)

Als Mediastinaldurchmesser 1 bzw. Messstrecke A wurde der Durchmesser der Aorta ascendens knapp oberhalb der Herzklappenebene definiert (siehe Abbildung 2.1).

Thoraxdurchmesser 1 (Messstrecke B)

Als Thoraxdurchmesser 1 bzw. Messstrecke B wurde die äußere Thoraxapertur in Höhe der Messstrecke A definiert. Dabei wurde vom linken bis zum rechten äußeren Rippenrand gemessen (siehe Abbildung 2.1).

Mediastinaldurchmesser 2 (Messstrecke A')

Als Mediastinaldurchmesser 2 bzw. Messstrecke A' wurde die Breite des Mediastinums auf Höhe des Aortenbogens definiert (siehe Abbildung 2.1).

Thoraxdurchmesser 2 (Messstrecke B')

Als Thoraxdurchmesser 2 bzw. Messstrecke B' wurde die äußere Thoraxapertur in Höhe der Messstrecke A' definiert. Dabei wurde vom linken bis zum rechten äußeren Rippenrand gemessen (siehe Abbildung 2.1).

Messstreckenübersicht

Abbildung 2.1: Thoraxröntgenuntersuchung mit Darstellung aller erhobenen Messstrecken mit Markierung der jeweiligen Messansatz- und Endpunkte. Die leicht höhenversetzte Darstellung der jeweils zueinander gehörigen Messstrecken (a-b, A-B und A'-B') erfolgte zwecks besserer Veranschaulichung.

2.1.4 Quotientenbestimmung

Der Herz/Thorax-Quotient ergibt sich aus der Messstrecke a (breitester Herzdurchmesser) und der Messstrecke b (breitester Thoraxdurchmesser).

Der Mediastinum/Thorax-Quotient Messwert 1 ergibt aus der Messstrecke A (Mediastinaldurchmesser 1) und der Messstrecke B (Thoraxdurchmesser 1).

Der Mediastinum/Thorax-Quotient Messwert 2 ergibt aus der Messstrecke A' (Mediastinaldurchmesser 2) und der Messstrecke B' (Thoraxdurchmesser 2).

Anschließend wurden alle ermittelten Quotienten in die pseudonymisierte Excel-Tabelle eingetragen.

2.1.5 Untersuchungsgruppen

Alle ausgemessenen Schockraumpatienten wurden anhand der ICD-10 Kodierung auf diagnostizierte Mediastinalverletzungen überprüft und als *Auffällig* bzw. *Unauffällig* in der pseudonymisierten Excel-Tabelle gekennzeichnet.

2.1.6 Grenzwerte der Quotienten

Die im Folgenden dargestellten Grenzwerte wurde in Anlehnung an die Untersuchung von Seltzer et al. (1981) gewählt:

1. Pathologisch vergrößertes Mediastinum $\geq 0,20$
2. Pathologisch vergrößertes Mediastinum $\geq 0,25$
3. Pathologisch vergrößertes Mediastinum $\geq 0,28$
4. Pathologisch vergrößertes Mediastinum $\geq 0,30$

Alle errechneten Mediastinum/Thorax-Quotienten wurden anhand der genannten Grenzwerte in Normalbefunde oder pathologische Befunde unterteilt. Anschließend erfolgte die Überprüfung der grenzwert-bezogenen Einteilung auf deren Reliabilität.

Die ermittelten richtig bzw. falsch positiven/negativen Ergebnisse wurden zur Berechnung der Sensitivität, Spezifität, des positiven- sowie des negativen prädiktiven Wertes herangezogen und mittels Statistica ausgewertet, siehe Abschnitt 2.1.8.

2.1.7 Analyseparameter zur Früherkennung mediastinaler Verletzungen

Die Erhebung der Analyseparameter erfolgte durch die Auswertung der Schockraumprotokolle der Jahre 2013 und 2014. Die anschließende Signifikanztestung erfolgte nach Einteilung in die Patientengruppen *Auffällig* und *Unauffällig*.

Patientendaten

- Alter am Unfalltag, Geschlecht, Patientengruppe (*Auffällig/Unauffällig*), Grad der Thoraxverletzung (Grad 0 keine bis Grad III schwere Thoraxverletzung).

Messwerte

- Mediastinum/Thorax-Quotient: Messwert 1, Mediastinum/Thorax-Quotient: Messwert 2, Herz/Thorax-Quotient (normal/vergrößert).

Unfallart

- PKW, Sturz, Sonstige.

Unfallort und Schockraum

- Blutdruck (RR), Herzfrequenz (HF), Sauerstoffsättigung (SpO₂), Intubation (Ja/Nein), Katecholamin-Gabe (Ja/Nein), Thoraxdrainage (Ja/Nein).

Traumaparameter

- NISS, RISC-II Score.

Letalität

2.1.8 Statistische Analyse

Die statistische Auswertung erfolgte anhand pseudonymisierter Excel-Tabellen mittels Statistica.

Die deskriptive Statistik erfolgte anhand von Übersichtstabellen, die folgende Parameter berücksichtigen: Mittelwert, Minimum, Maximum, Standardabweichung, 1./3. Quantil und Ges.-Patientenanzahl (n).

Die explorative Datenanalyse erfolgte mittels Boxplot, Balken- und Kreisdiagramm. Ein signifikanter Unterschied der Untersuchungsgruppen wurde mit einem * gekennzeichnet.

Die Ermittlung der Spezifität, Sensitivität, des negativen und positiven prädiktiven Wertes erfolgte durch Einteilung der Ergebnisse in richtig bzw. falsch positiv und

richtig bzw. falsch negativ. Die Berechnung der prozentualen Testgenauigkeit wurde anschließend mittels Statistica durchgeführt.

2.1.8.1 Variablen-bezogene Signifikanztestung und Anpassung des Signifikanzniveau

Nach Überprüfung auf Normalverteilung und Kategorisierung anhand des Messniveaus wurden folgende Tests den einzelnen Variablen zugeordnet und mittels Statistica auf signifikante Unterschiede überprüft.

Tabelle 2.1: Übersicht analysierter Variablen und angewandter Signifikanztests des gesamten Patientenkollektivs.

Variablen	Signifikanztest
Geschlechterverhältnis Med./Thor.-Quotient 1	Mann-Whitney-U-Test
Geschlechterverhältnis Med./Thor.-Quotient 2	Mann-Whitney-U-Test
Verhältnis Med./Thor.-Quotient Messwert 1 – Messwert 2	Mann-Whitney-U-Test

Eine Anpassung des ursprünglichen p-Wertes von $p \leq 0,05$ erfolgte mittels Bonferroni-Methode unter Berücksichtigung der drei durchgeführten Tests. Hieraus resultierte ein neues Signifikanzniveau von $p \leq 0,017$.

Tabelle 2.2: Übersicht analysierter Variablen und angewandter Signifikanztests zur Früherkennung mediastinaler Verletzungen. Unterteilung und Testung des Patientenkollektivs anhand der Untersuchungsgruppen *Auffällig* und *Unauffällig*.

Variablen	Signifikanztest
Geschlechterverhältnis	Pearson-Chi-Square-Test
Med./Thor.-Quotient 1	Mann-Whitney-U-Test
Med./Thor.-Quotient 2	Mann-Whitney-U-Test
Thoraxverletzung	Mann-Whitney-U-Test
RR Unfallort	Mann-Whitney-U-Test
RR Schockraum	Mann-Whitney-U-Test
SpO ₂ Unfallort	Mann-Whitney-U-Test
SpO ₂ Schockraum	Mann-Whitney-U-Test

NISS	Mann-Whitney-U-Test
RISC-II-Score	Mann-Whitney-U-Test
Verletzungsursache	Fisher-Exact-Test
Intubation Unfallort	Fisher-Exact-Test
Intubation Schockraum	Fisher-Exact-Test
Thoraxdrainage Unfallort	Fisher-Exact-Test
Thoraxdrainage Schockraum	Fisher-Exact-Test
Katecholamine Unfallort	Fisher-Exact-Test
Katecholamine Schockraum	Fisher-Exact-Test
Herz/Thor.-Verhältnis	Fisher-Exact-Test
HF Unfallort	t-Test
HF Schockraum	t-Test
Letalität	t-Test

Die Anpassung des ursprünglichen p-Wertes von $p \leq 0,05$ erfolgte mittels Bonferroni-Methode unter Berücksichtigung der insgesamt 21 durchgeführten Tests. Hieraus resultierte ein neues Signifikanzniveau von $p \leq 0,002381$.

2.2 Erstdiagnostik eines Pneumo- und Hämatothorax durch eFAST und Thoraxröntgenuntersuchung im Schockraum

Die Analyse der Pneumo-/Hämatothorax-Erstdiagnostik im Schockraum erfolgte mittels selbst erstellten Fragebogens, der im Anhang in Abbildung 6.1 eingesehen werden kann. Die Untersuchungsergebnisse aus eFAST und Thoraxröntgenuntersuchung wurden zusätzlich zur Schockraumdokumentation protokolliert und mittels Statistica ausgewertet, siehe Abschnitt 2.2.4.

Anschließend wurden in einem weiteren Schritt die auf dem Fragebogen vermerkten direkten Konsequenzen aus den jeweils vorangegangenen bildgebenden Verfahren (Thoraxröntgenuntersuchung/eFAST/CT) ausgewertet.

2.2.1 Einschlusskriterien

- Patienten, die im Zeitraum vom 08.06.2015 bis 08.06.2016 über den Schockraum der UMG aufgenommen wurden.
- Im Schockraum durchgeführte Thoraxröntgenuntersuchung und/oder eFAST in Kombination mit CT (CT-Thorax/Ganzkörper-CT/Traumascan).

2.2.2 Ausschlusskriterien

- Patienten mit Hautempysem.
- Penetrierende Thoraxverletzungen.
- Präklinische Anlage einer Thoraxdrainage.
- Inkomplette oder fehlerhafte Patientendokumentation.

2.2.3 Patienten- und untersuchungs-bezogene Analyseparameter

Die Erhebung der Analyseparameter erfolgte durch Auswertung des angefertigten Fragebogens:

Patientendaten

- Alter und Geschlecht.

Bestimmung der Testgenauigkeit

- Sensitivität, Spezifität, positiv und negativ prädiktiver Wert.

Prozentuale Gegenüberstellung der direkten Konsequenzen aus

- eFAST, Thoraxröntgenuntersuchung und CT.

2.2.4 Statistische Auswertung der Testgenauigkeit von eFAST und Thoraxröntgenuntersuchung

Die Differenzierung der Testgenauigkeit erfolgte durch Einteilung der Untersuchungsergebnisse in richtig bzw. falsch positiv und richtig bzw. falsch negativ. Anschließend wurde die Berechnung der Parameter Sensitivität, Spezifität, positiv und negativ prädiktiver Wert für Thoraxröntgenuntersuchung und eFAST mittels Statistica durchgeführt.

2.2.5 Analyse der Konsequenzen aus eFAST und Thoraxröntgenuntersuchung

Die Auswertung der untersuchungs-bedingten Konsequenzen erfolgte in tabellarischer Form anhand von folgenden Untersuchungsgruppen:

- Gruppe eF 1 (eFAST und CT)
- Gruppe eF 2 (eFAST, Thoraxröntgenuntersuchung und CT)
- Gruppe Röt 1 (Thoraxröntgenuntersuchung und CT)
- Gruppe Röt 2 (Thoraxröntgenuntersuchung, eFAST und CT).

Sowie der Darstellung der Gesamtzahl durchgeführter Untersuchungen:

- eFAST
- Thoraxröntgenuntersuchung
- CT.

Anschließend erfolgte für jede der zuvor genannten Untersuchungsgruppen die Darstellung der

- Anzahl aller untersuchten Personen (n);
- Anzahl untersuchungs-bedingter Konsequenzen;
- Gesamtzahl durchgeführter Konsequenzen.

In einem letzten Schritt erfolgte die prozentuale Berechnung der direkt aus eFAST, Thoraxröntgenuntersuchung und CT eingeleiteten Konsequenzen, gemessen an der Gesamtzahl aller durchgeführten Konsequenzen.

2.3 Analyse von Thoraxröntgenuntersuchung und CT verstorbener Schockraumpatienten

Die Detektion aller im Schockraum verstorbener Patienten erfolgte anhand der ICD-10 Kodierung. Alle relevanten Patienten wurden mittels PACS aufgerufen und die zu analysierenden bildgebenden Verfahren in einer pseudonymisierten Excel-Tabelle aufgelistet.

2.3.1 Einschlusskriterien

- Patienten, die im Zeitraum 01.01.2013 bis 31.12.2014 primär oder sekundär nach Verlegung über den Schockraum der UMG eingeliefert wurden.
- Patienten, die noch im Schockraum oder maximal 30 Tagen nach Aufnahme über den Schockraum in der Klinik verstorben sind.
- Thoraxröntgenuntersuchung oder CT im Schockraum der UMG.

2.3.2 Ausschlusskriterien

- Extern angefertigte Thoraxröntgenuntersuchung oder CT.

- Kein Bildmaterial im PACS.

2.3.3 Analysekriterien

Alle den Einschlusskriterien entsprechenden Patienten wurden hinsichtlich folgender durchgeführter bildgebender Untersuchungen analysiert:

- CT (cCT/Ganzkörper-CT/Traumascan)
- Thoraxröntgenuntersuchung.

2.3.4 Statistische Analyse

Die patienten-bezogenen Daten (Geschlecht und Durchschnittsalter) wurden zur deskriptiven Analyse des Patientenkollektivs herangezogen.

Anschließend wurde die prozentuale Verteilung im Schockraum durchgeführter Thoraxröntgenuntersuchung und CT (cCT/Ganzkörper-CT/Traumascan) einander gegenübergestellt.

2.4 Modalitäten und Computerprogramme

Röntgen

Fabrikat: Siemens, Ysio Systemversion VB10 (Healthcare Siemens, Erlangen Deutschland).

Computertomographie

Fabrikat: Siemens, Somatom AS Plus (Healthcare Siemens, Erlangen Deutschland).

Sonographie

Fabrikat: Siemens XCLASS, AcusonX300 premium Edition (Siemens Medical Solutions, California USA).

Computerprogramme

- Graphpad Prism 5 for MAC OS X, Version 5 (La Jolla, CA USA).
- Microsoft Excel for MAC 2011, Version 14.3.4 (130416), Update 14.3.4 (Microsoft, Redmond, Washington USA).

- PACS-Software GE Healthcare.
- STATISTICA, Version 12.7 (StatSoft, Tulsa, Oklahoma USA).

3 Ergebnisse

3.1 Die Thoraxröntgenuntersuchung zur Beurteilung des Mediastinums im Schockraum

Das Patientenkollektiv bestand aus 267 Patienten. Insgesamt wurden 205 männliche und 62 weibliche Patienten im Alter von 0 bis 92 Jahren und einem Altersdurchschnitt von 49 ± 21 Jahren analysiert. Aufgeteilt in die Untersuchungsgruppen zeigten sich 27 Patienten mit mediastinaler Verletzung (Gruppe *Auffällig*) und 240 Patienten ohne mediastinale Verletzung (Gruppe *Unauffällig*). Von den 27 *auffälligen* Patienten waren 23 männlich und vier weiblich. Von den 240 als *unauffällig* befundeten Patienten waren 182 männlich und 58 weiblich. Sämtliche erhobenen Mediastinalverhältnisse der Untersuchungsgruppen wurden hinsichtlich der Parameter Mittelwert, Standardabweichung, Gesamtanzahl (n), 1. und 3. Quantil analysiert und im Anhang in Tabelle 6.1 aufgeführt.

Geschlecht- und Messwertanalyse

Initial wurden alle erhobenen Mediastinum/Thorax-Quotienten (Messwert 1 und 2) einander gegenübergestellt. Hierbei zeigte sich ein Durchschnittswert für den Messwert 1 von $0,298 \pm 0,006$ und $0,307 \pm 0,006$ für den Messwert 2, siehe Abbildung 3.1.

Die Signifikanztestung ergab keinen signifikanten Unterschied zwischen den Mediastinum/Thorax-Quotienten Messwerte 1 und 2 ($p=0,2$). Die weitere Auswertung der im Boxplot dargestellten Werte kann im Anhang in Tabelle 6.1 eingesehen werden.

Abbildung 3.1: Boxplot-Darstellung der Mediastinum/Thorax-Quotienten-Verteilung (n=267) nach Messwert 1 und 2.

In einem zweiten Schritt wurden die Mediastinum/Thorax-Quotienten (Messwert 1 und 2) anhand des Geschlechts der Patienten verglichen. Es zeigte sich ein um 0,02 abweichender Median (0,28 bis 0,3), siehe Abbildung 3.2.

Die Signifikanztestung ergab weder zwischen der Untersuchungsgruppe Männlich M1 und Weiblich M1 ($p=0,536$) noch zwischen der Analysegruppe Männlich M2 und Weiblich M2 ($p=0,323$) einen signifikanten Unterschied.

Abbildung 3.2: Boxplot-Darstellung des Mediastinum/Thorax-Quotienten nach Messwert Männlich M1 und M2 sowie Messwert Weiblich M1 und M2 (männlich n=205, weiblich n=62).

3.1.1 Mediastinum-Quotienten der Untersuchungsgruppen

Die Untersuchungsgruppe *Auffällig* setzte sich aus 27 Patienten (85% männlichen und 15% weiblichen) mit einem Altersdurchschnitt von 49 ± 19 Jahren zusammen. Es wurden 13 Aortenverletzungen und 14 Perikardtamponaden als Mediastinalverletzungen zusammengefasst. Die zweite Untersuchungsgruppe *Unauffällig* bestand aus 240 Patienten (77% männlichen und 23% weiblichen) mit einem Altersdurchschnitt von 49 ± 21 Jahren.

Die Untersuchungsgruppen *Auffällig* und *Unauffällig* wurden, wie in Abbildung 3.3 dargestellt, anhand der Mediastinum/Thorax-Quotienten Messwert 1 und 2 einander gegenübergestellt. Die einzelnen Durchschnittswerte der aufgeführten Untersuchungsgruppen *Auffällig* M1, *Unauffällig* M1, *Auffällig* M2 und *Unauffällig* M2 weichen jeweils nur geringfügig von 0,3 ab. Die Maximalwerte der Mediastinum/Thorax-Quotienten lagen bei der Untersuchungsgruppe *Unauffällig* bei 0,52 (M1) und 0,55 (M2). Bei der Vergleichsgruppe *Auffällig* zeigten sich Maximalwerte von 0,43 (M1) und 0,47 (M2). Die genauen Zahlenwerte der Boxplot Daten können im Anhang in Tabelle 6.1 eingesehen werden.

Die Signifikanztestung zeigte weder bei der Analyse der Untersuchungsgruppe *Auffällig* M1 – *Unauffällig* M1 ($p=0,2426$) noch bei der Untersuchungsgruppe *Auffällig* M2 – *Unauffällig* M2 ($p=0,9236$) einen signifikanten Unterschied.

Abbildung 3.3: Boxplot-Darstellung des Mediastinum/Thorax-Quotienten nach den Untersuchungsgruppen *Auffällig* Messwert 1 und 2 sowie *Unauffällig* Messwerten 1 und 2 (*Auffällig* $n=27$, *Unauffällig* $n=240$).

3.1.2 Evaluation pathologischer Grenzwerte

Die ermittelten Mediastinum/Thorax-Quotienten Messwert 1 und 2 aller 267 Patienten wurden entsprechend den definierten Grenzwerten ($\geq 0,2$ / $\geq 0,25$ / $\geq 0,28$ / $\geq 0,3$) eingeteilt.

3.1.2.1 Messwert 1

Für den Mediastinum/Thorax-Quotienten Messwert 1 kann die errechnete grenzwert-bezogene prozentuale Testgenauigkeit in Tabelle 3.1 eingesehen werden.

Bei einem als pathologisch definierten Grenzwert von $\geq 0,2$ waren 97% der Messwerte 1 verbreitert. Hieraus konnte eine Sensitivität von 92,6% und eine Spezifität von 2,9% errechnet werden.

Bei einem Grenzwert von $\geq 0,3$ waren 39% der Messwerte 1 verbreitert, und es konnte eine Sensitivität von 70,4% sowie eine Spezifität von 57,1% errechnet werden.

Die genaue Aufteilung der einzelnen Mediastinum/Thorax-Quotientenbereiche anhand der richtig bzw. falsch positiven/negativen Befunde können im Anhang in Tabelle 6.2 eingesehen werden.

Tabelle 3.1: Definierte Grenzwerte des Mediastinum/Thorax-Quotienten Messwert 1 (n=267) und Darstellung der grenzwert-bezogenen prozentualen Testgenauigkeit.

Grenzwerte:	$\geq 0,2$	$\geq 0,25$	$\geq 0,28$	$\geq 0,30$
Sensitivität	92,6%	81,5%	70,4%	70,4%
Spezifität	2,9%	22,5%	43,3%	57,1%
Pos. präd. Wert	9,7%	10,6%	12,3%	15,6%
Neg. präd. Wert	77,8%	91,5%	92,9%	94,5%

3.1.2.2 Messwert 2

Für den Mediastinum/Thorax-Quotienten Messwert 2 kann die errechnete grenzwert-bezogene-prozentuale Testgenauigkeit in Tabelle 3.2 eingesehen werden.

Bei einem als pathologisch definierten Grenzwert von $\geq 0,2$ waren 99,6% der Messwerte 2 verbreitert. Es konnte eine Sensitivität von 100% und eine Spezifität von 0,4% berechnet werden.

Bei einem Grenzwert von $\geq 0,28$ waren 62% der Messwerte 2 verbreitert und es konnte eine Sensitivität von 63% sowie eine Spezifität von 38% errechnet werden.

Die genaue Aufteilung der einzelnen Mediastinum/Thorax-Quotientenbereiche anhand der richtig bzw. falsch positiven/negativen Befunde kann der Tabelle 6.3 im Anhang entnommen werden.

Tabelle 3.2: Definierte Grenzwerte des Mediastinum/Thorax-Quotienten Messwert 2 (n=267) und Darstellung der grenzwert-bezogenen prozentualen Testgenauigkeit.

Grenzwerte:	$\geq 0,2$	$\geq 0,25$	$\geq 0,28$	$\geq 0,30$
Sensitivität	100%	85,2%	63,0%	44,4%
Spezifität	0,4%	16,7%	38,3%	52,9%
Pos. präd. Wert	10,2%	10,3%	10,3%	9,6%
Neg. präd. Wert	100%	90,9%	90,2%	89,4%

3.2 Früherkennung mediastinaler Verletzungen

Die Untersuchungsgruppen *Auffällig* und *Unauffällig* wurden hinsichtlich patientenbezogener Daten, Unfallmechanismus, unfallort- und schockraumbezogener Daten (Vitalparameter und invasive Maßnahmen), Trauma-Scores und der Letalität verglichen.

3.2.1 Patienten-bezogene Daten und Herz/Thorax-Quotient

Das gesamte Patientenkollektiv wurde in die Untersuchungsgruppen *Auffällig* und *Unauffällig* unterteilt und hinsichtlich des Geschlechtes einander gegenübergestellt. Die Signifikanztestung ergab keinen signifikanten Unterschied ($p=0,27523$). Weitere deskriptive Untersuchungsparameter können der im Anhang aufgeführten Tabelle 6.1 entnommen werden.

Beim Vergleich des Herz/Thorax-Quotienten ergab sich eine durchschnittliche Herzsilhouettenbreite des gesamten Patientenkollektivs von $136,5 \pm 23,8$ mm, bei der Untersuchungsgruppe *Auffällig* von $139,5 \pm 26,2$ mm und $136,2 \pm 23,5$ mm bei der Vergleichsgruppe *Unauffällig*.

Bei der Untersuchungsgruppe *Auffällig* hatten sechs Patienten (22%) einen verbreiterten und 21 Patienten (88%) einen normalen Herz/Thorax-Quotient, siehe Abbildung 3.4.

Bei der Versuchsgruppe *Unauffällig* zeigte sich bei 62 Patienten (26%) ein vergrößerter und bei 178 Patienten (84%) ein normaler Herz/Thorax-Quotient.

Die Signifikanztestung ergab einen nicht signifikanten Unterschied ($p=0,44256$). Weitere Analysedaten können im Anhang der Tabelle 6.4 entnommen werden.

Abbildung 3.4: Balkendiagramm zur Darstellung der prozentualen Personenverteilung der Untersuchungsgruppen *Auffällig* (schwarzer Balken: $n_{\text{vergrößert}}=6$, 22%; $n_{\text{normal}}=21$, 78%) und *Unauffällig* (weißer Balken: $n_{\text{vergrößert}}=62$, 26%; $n_{\text{normal}}=178$, 74%) nach definitionsgemäß vergrößertem und normalem Herz/Thorax-Quotient.

3.2.2 Thoraxverletzungsstatus

Die Untersuchungsgruppen wurden hinsichtlich der in vier Schweregrade (0 keine, I leicht, II mittelschwer, III schwer) eingeteilten Thoraxverletzungen miteinander verglichen. Es zeigte sich, dass mit zunehmender Verletzungsschwere des Thorax die Anzahl der Patienten aus Gruppe *Unauffällig* nahezu kontinuierlich abnahm (Ausnahme mittelschwere Thoraxverletzung). Die meisten Patienten der Untersuchungsgruppe *Unauffällig* befanden sich in der Kategorie keine und leichte Thoraxverletzungen, siehe Abbildung 3.5.

Bei der Vergleichsgruppe *Auffällig* zeigte sich, dass mit zunehmender Verletzungsschwere des Thorax die Patientenzahl anstieg. Von den elf dokumentierten Thoraxverletzungen der Untersuchungsgruppe *Auffällig* waren drei Patienten (27%) bei den mittelschweren- und acht Patienten (73%) bei den schweren Thoraxverletzungen zu finden.

Bei der Signifikanztestung zeigte sich ein signifikant unterschiedlicher p-Wert ($p=0,000005$). Genauere Angaben zur Patientenverteilung können im Anhang in Tabelle 6.4 eingesehen werden.

Abbildung 3.5: Balkendiagramm zur Darstellung der prozentualen Personenverteilung der Untersuchungsgruppen *Auffällig* (schwarzer Balken: $n_{\text{mittel}}=3$, 27%; $n_{\text{schwer}}=8$, 73%) und *Unauffällig* (weißer Balken: $n_{\text{keine}}=95$, 49%; $n_{\text{leicht}}=35$, 18%; $n_{\text{mittel}}=46$, 24%; $n_{\text{schwer}}=18$, 9%) nach der Verletzungsschwere des Thorax. Signifikanter Unterschied ($p \leq 0,002381$) mittels * gekennzeichnet.

3.2.3 Verletzungsursachen

Die Untersuchungsgruppen wurden hinsichtlich der häufigsten Verletzungsursachen (Verkehrsunfall, Sturz, sonstige: Stich-, Schlag-, Treppensturz-, Explosions-, Brand-, unklare Verletzung) miteinander verglichen. Es zeigte sich, dass insgesamt 135 Patienten (10 aus Gruppe *Auffällig* und 125 aus Gruppe *Unauffällig*) einen Verkehrsunfall erlitten haben, siehe Abbildung 3.6.

Die Signifikanztestung ergab einen nicht signifikanten p-Wert ($p=0,154$). Die Darstellung der Patientenanzahl der einzelnen Verletzungsursachen kann in Tabelle 6.5 im Anhang eingesehen werden.

Abbildung 3.6: Balkendiagramm zur Darstellung der prozentualen Personenverteilung der Untersuchungsgruppen *Auffällig* (schwarzer Balken: $n_{\text{Verkehrsunfall}}=10$, 67%; $n_{\text{Sturz}}=3$, 20%; $n_{\text{sonstige}}=2$, 13%) und *Unauffällig* (weißer Balken: $n_{\text{Verkehrsunfall}}=125$, 61%; $n_{\text{Sturz}}=72$, 35%; $n_{\text{sonstige}}=8$, 4%) nach den dokumentierten Ursachen der Thoraxverletzung.

3.2.4 Vitalparameter Unfallort und Schockraum

Die Analyse von Blutdruck (RR), Herzfrequenz (HF), Sauerstoffsättigung (SpO_2), Intubations-, Thoraxdrainage- und Katecholaminstatus fand zu zwei unterschiedlichen Erhebungszeitpunkten statt, einmal präklinisch am Unfallort (Zeitpunkt A) und einmal klinisch im Schockraum (Zeitpunkt B).

3.2.4.1 Systolischer RR

Die Untersuchungsgruppe *Auffällig* (Unfallort/Schockraum) und *Unauffällig* (Unfallort/Schockraum) wurden, wie in Abbildung 3.7 dargestellt, hinsichtlich des auf den Schockraumbögen dokumentierten RR verglichen.

Die Analyse der Untersuchungsgruppen zeigte bei der Gruppe *Auffällig* einen durchschnittlichen systolischen RR am Unfallort von $133 \pm 39,4$ mmHg und im Schockraum von $122 \pm 32,6$ mmHg. Bei der Untersuchungsgruppe *Unauffällig* ergab sich am Unfallort ein durchschnittlicher RR von $134 \pm 25,3$ mmHg am Unfallort und $126 \pm 28,6$ mmHg im Schockraum. Das 1. Quantil der Untersuchungsgruppe *Auffällig* im Schockraum lag bei 100 mmHg.

Die Signifikanztestung ergab weder zum Zeitpunkt A ($p=0,7125$) noch zu Zeitpunkt B ($p=0,598$) einen signifikanten Unterschied der Untersuchungsgruppen. Weitere deskriptive Daten der Abbildung 3.7 können im Anhang der Tabelle 6.6 entnommen werden.

Abbildung 3.7: Boxplot-Darstellung der systolischen Blutdruckwerte in mmHg der Untersuchungsgruppen *Auffällig* ($n_{\text{Unfallort}}=12$, $n_{\text{Schockraum}}=14$) und *Unauffällig* ($n_{\text{Unfallort}}=189$, $n_{\text{Schockraum}}=196$) nach Zeitpunkt A (Unfallort) und Zeitpunkt B (Schockraum).

3.2.4.2 HF-Werte

Die Untersuchungsgruppen *Auffällig* (Unfallort/Schockraum) und *Unauffällig* (Unfallort/Schockraum) wurden ebenfalls, hinsichtlich der auf den Schockraumbögen dokumentierten HF-Werte verglichen, siehe Abbildung 3.8.

Bei der Analyse ergab sich für die Gruppe *Auffällig* eine durchschnittliche HF am Unfallort von $101 \pm 33/\text{min}$ und im Schockraum von $90 \pm 30/\text{min}$. Bei der Untersuchungsgruppe *Unauffällig* wurde am Unfallort eine durchschnittliche HF von $88 \pm 21/\text{min}$ und $85 \pm 22/\text{min}$ im Schockraum gemessen. Die maximal gemessene HF der Untersuchungsgruppe *Unauffällig* betrug am Unfallort 199/min und im Schockraum 195/min, die minimale HF am Unfallort bei 16/min bzw. 18/min im Schockraum.

Die durchgeführte Signifikanztestung zeigte weder zum Zeitpunkt A ($p=0,0376$) noch zum Zeitpunkt B ($p=0,5$) einen signifikanten Unterschied. Weitere deskriptive Analysedaten der Abbildung 3.8 können im Anhang der Tabelle 6.6 entnommen werden.

Abbildung 3.8: Boxplot-Darstellung der dokumentierten Herzfrequenz pro Minute der Untersuchungsgruppen *Auffällig* ($n_{\text{Unfallort}}=13$, $n_{\text{Schockraum}}=14$) und *Unauffällig* ($n_{\text{Unfallort}}=186$, $n_{\text{Schockraum}}=198$) nach Zeitpunkt A (Unfallort) und Zeitpunkt B (Schockraum).

3.2.4.3 SpO₂-Sättigung

Im Folgenden wurden die Untersuchungsgruppen *Auffällig* und *Unauffällig* hinsichtlich der auf den Schockraumbögen dokumentierten SpO₂-Sättigung verglichen.

Aufgeteilt in die Untersuchungsgruppen ergab sich bei der Gruppe *Auffällig* eine durchschnittliche SpO₂-Sättigung von $88 \pm 11\%$ am Unfallort und $95 \pm 5\%$ im Schockraum. Bei der Untersuchungsgruppe *Unauffällig* zeigte sich am Unfallort eine durchschnittliche SpO₂-Sättigung von $93 \pm 9\%$ und $96 \pm 6\%$ im Schockraum.

Die Signifikanztestung ergab weder zum Zeitpunkt A ($p=0,0316$) noch zum Zeitpunkt B ($p=0,2834$) einen signifikanten Unterschied. Weitere deskriptive Daten sowie die genaue Zusammensetzung der Untersuchungsgruppen können im Anhang in Tabelle 6.6 eingesehen werden.

3.2.5 Maßnahmen und Medikamente

3.2.5.1 Intubation

Es wurden die Untersuchungsgruppen *Auffällig* und *Unauffällig* hinsichtlich des dokumentierten Intubationsstatus miteinander verglichen, siehe Abbildung 3.9. Hierbei

zeigte sich, dass die Zahl der Intubationen bei der Patientengruppe *Auffällig* mit 47% stattgefundenen Intubationen zu den Zeitpunkten A und B identisch waren. Bei der Patientengruppe *Unauffällig* wurde bei 38% der Patienten am Unfallort und bei 11% der Patienten im Schockraum eine Intubation durchgeführt.

Die Signifikanztestung zeigte zum Zeitpunkt A (Unfallort) einen nicht signifikanten ($p=0,18991$) und zum Zeitpunkt B (Schockraum) einen signifikanten Unterschied ($p=0,00135$) zwischen den Untersuchungsgruppen *Auffällig* und *Unauffällig*.

Abbildung 3.9: Balkendiagramm zur Darstellung der prozentualen Verteilung der Untersuchungsgruppen *Auffällig* (schwarzer Balken: $n_{\text{Intubation-Unfallort}}=7$, 47%; $n_{\text{Intubation-Schockraum}}=7$, 47%) und *Unauffällig* (weißer Balken: $n_{\text{Intubation-Unfallort}}=76$, 38%; $n_{\text{Intubation-Schockraum}}=22$, 11%) nach am Unfallort und im Schockraum durchgeführten Intubationen. Kennzeichnung des signifikanten Unterschiedes ($p \leq 0,002381$) mittels *.

3.2.5.2 Thoraxdrainage

Als zweite invasive Maßnahme wurden die Untersuchungsgruppen *Auffällig* und *Unauffällig* hinsichtlich des dokumentierten Thoraxdrainagestatus miteinander verglichen, siehe Abbildung 3.10. Bei der Patientengruppe *Auffällig* waren bei 20% Thoraxdrainagen am Unfallort (Zeitpunkt A) und 47% im Schockraum (Zeitpunkt B) gelegt worden. Bei der Vergleichsgruppe *Unauffällig* wurden 4% der Thoraxdrainagen am Unfallort und 7% im Schockraum gelegt.

Die Signifikanztestung ergab zum Zeitpunkt A einen nicht signifikanten ($p\text{-Wert}=0,02696$) und zum Zeitpunkt B einen signifikanten Unterschied ($p\text{-Wert}=0,00015$) der Analysegruppen.

Abbildung 3.10: Balkendiagramm zur Darstellung der prozentualen Verteilung der Untersuchungsgruppen *Auffällig* (schwarzer Balken: $n_{\text{Thoraxdrainage-Unfallort}}=3$, 20%; $n_{\text{Thoraxdrainage-Schockraum}}=7$, 47%) und *Unauffällig* (weißer Balken: $n_{\text{Thoraxdrainage-Unfallort}}=7$, 4%; $n_{\text{Thoraxdrainage-Schockraum}}=14$, 7%) nach durchgeführten Thoraxdrainagen am Unfallort und im Schockraum. Kennzeichnung des signifikanten Unterschiedes ($p \leq 0,002381$) mittels *.

3.2.5.3 Katecholamine

Die Untersuchungsgruppen *Auffällig* und *Unauffällig* wurden hinsichtlich der dokumentierten Katecholamin-Gabe verglichen, siehe Abbildung 3.11. Es zeigte sich, dass 40% der Patienten aus Untersuchungsgruppe *Auffällig* sowohl am Unfallort als auch im Schockraum Katecholamine erhalten haben. Bei der Patientengruppe *Unauffällig* wurden 9% der Patienten am Unfallort und 11% im Schockraum Katecholamine verabreicht.

Die Signifikanztestung zeigte am Unfallort einen signifikanten ($p\text{-Wert}=0,002380$) und im Schockraum einen nicht signifikanten Unterschied ($p\text{-Wert}=0,00569$).

Abbildung 3.11: Balkendiagramm zur Darstellung der prozentualen Verteilung der Untersuchungsgruppen *Auffällig* (schwarzer Balken: $n_{\text{Katecholamine-Unfallort}}=6$, 40%; $n_{\text{Katecholamine-Schockraum}}=6$, 40%) und *Unauffällig* (weißer Balken: $n_{\text{Katecholamine-Unfallort}}=17$, 9%; $n_{\text{Katecholamine-Schockraum}}=22$, 11%) nach Verabreichung von Katecholaminen am Unfallort und im Schockraum. Kennzeichnung der Signifikanz ($p \leq 0,002381$) mittels *.

3.2.6 Trauma-Scores

3.2.6.1 NISS

Die Untersuchungsgruppen *Auffällig* und *Unauffällig* wurden hinsichtlich des errechneten NISS verglichen, siehe Abbildung 3.12. Aufgeteilt in die einzelnen Untersuchungsgruppen ergab sich für die Untersuchungsgruppe *Auffällig* ein NISS-Durchschnittswert von 39 ± 18 Punkten und für die Untersuchungsgruppe *Unauffällig* von 28 ± 15 .

Die Verteilung der NISS-Punktwerte reichte bei der Untersuchungsgruppe *Auffällig* von 15 bis 75 Punkten. Die Vergleichsgruppe *Unauffällig* zeigte eine Verteilung von 3 bis 75 Punkten. Das 3. Quantil lag bei der Untersuchungsgruppe *Auffällig* bei einem Punktwert von 50 und bei der Vergleichsgruppe *Unauffällig* bei 34 Punkten.

Die Signifikanztestung ergab einen nicht signifikanten Unterschied ($p=0,01663$). Weitere deskriptive Analysedaten können der Tabelle 6.7 im Anhang entnommen werden.

Abbildung 3.12: Boxplot-Darstellung der NISS-Punktwert-Verteilung nach den Untersuchungsgruppen *Auffällig* (n=15) und *Unauffällig* (n=206).

3.2.6.2 RISC-II-Score

Die Untersuchungsgruppen wurden hinsichtlich des RISC-II-Score verglichen, siehe Abbildung 3.13. Bei der Untersuchungsgruppe *Auffällig* zeigte sich eine durchschnittliche Überlebenswahrscheinlichkeit von $73 \pm 32\%$, bei der Untersuchungsgruppe *Unauffällig* von $88 \pm 22\%$. Das 1. Quantil der Patientengruppe *Auffällig* lag bei 35% und das der Vergleichsgruppe *Unauffällig* bei 91%.

Die Signifikanztestung zeigte einen nicht signifikanten Unterschied ($p=0,01517$). Weitere Analysedaten können der Tabelle 6.7 im Anhang entnommen werden.

Abbildung 3.13: Boxplot-Darstellung der prozentualen Verteilung des RISC-II-Score nach den Untersuchungsgruppen *Auffällig* (n=15) und *Unauffällig* (n=194).

3.2.7 Letalität

Es wurden die Untersuchungsgruppen *Auffällig* und *Unauffällig* hinsichtlich der Letalität verglichen, siehe Abbildung 3.14. Es zeigte sich bei der Untersuchungsgruppe *Auffällig* eine Letalität von 15% und bei der Vergleichsgruppe *Unauffällig* von 7,5%.

Die Signifikanztestung ergab einen nicht signifikanten Unterschied ($p=0,203$). Die genauen Patientendaten können im Anhang in Tabelle 6.8 eingesehen werden.

Abbildung 3.14: Balkendiagramm zur Darstellung der prozentualen Letalität nach den Untersuchungsgruppen *Auffällig* (schwarzer Balken: $n_{\text{verstorben}}=4$, 15%) und *Unauffällig* (weißer Balken: $n_{\text{verstorben}}=18$, 7,5%).

3.2.8 Übersicht Signifikanztestung

Tabelle 3.3: Darstellung analysierter Variablen, angewandter Signifikanztests sowie angepassten Signifikanzniveaus und p-Werts.

Variablen	Signifikanztest	Signifikanzniveau	p-Wert
Verhältnis Med./Thor.-Quotient Messwert 1 – Messwert 2	Mann-Whitney-U-Test	$p \leq 0,017$	0,2
Geschlechterverhältnis Med./Thor.-Quotient M1	Mann-Whitney-U-Test	$p \leq 0,017$	0,536
Geschlechterverhältnis Med./Thor.-Quotient M2	Mann-Whitney-U-Test	$p \leq 0,017$	0,323

Tabelle 3.4: Darstellung analysierter Variablen, angewandter Signifikanztests sowie angepasstem Signifikanzniveau und p-Wert. Signifikanz mittels * gekennzeichnet.

Variablen	Signifikanztest	Signifikanzniveau	p-Wert
Geschlechterverhältnis	Pearson-Chi-Square-Test	$p \leq 0,002381$	0,27523
Med./Thor.-Quotient 1	Mann-Whitney-U-Test	$p \leq 0,002381$	0,2426
Med./Thor.-Quotient 2	Mann-Whitney-U-Test	$p \leq 0,002381$	0,9236
Herz/Thor.-Verhältnis	Fisher-Exact-Test	$p \leq 0,002381$	0,44256
Thoraxverletzung	Mann-Whitney-U-Test	$p \leq 0,002381$	0,000005 *
Verletzungsursache	Fisher-Exact-Test	$p \leq 0,002381$	0,154
RR Unfallort	Mann-Whitney-U-Test	$p \leq 0,002381$	0,7125
RR Schockraum	Mann-Whitney-U-Test	$p \leq 0,002381$	0,598
HF Unfallort	t-Test	$p \leq 0,002381$	0,0376
HF Schockraum	t-Test	$p \leq 0,002381$	0,50
SpO ₂ Unfallort	Mann-Whitney-U-Test	$p \leq 0,002381$	0,0316
SpO ₂ Schockraum	Mann-Whitney-U-Test	$p \leq 0,002381$	0,2834
Intubation Unfallort	Fisher-Exact-Test	$p \leq 0,002381$	0,18991
Intubation Schockraum	Fisher-Exact-Test	$p \leq 0,002381$	0,00135 *
Thoraxdrainage Unfallort	Fisher-Exact-Test	$p \leq 0,002381$	0,02696
Thoraxdrainage Schockraum	Fisher-Exact-Test	$p \leq 0,002381$	0,00015 *
Katecholamine Unfallort	Fisher-Exact-Test	$p \leq 0,002381$	0,002380 *
Katecholamine Schockraum	Fisher-Exact-Test	$p \leq 0,002381$	0,00569
NISS	Mann-Whitney-U-Test	$p \leq 0,002381$	0,01663
RISC-II-Score	Mann-Whitney-U-Test	$p \leq 0,002381$	0,01517
Letalität	t-Test	$p \leq 0,002381$	0,203

3.3 Vergleich bildgebender Verfahren der initialen Pneumo-/Hämatothorax-Diagnostik im Schockraum

Der Stellenwert der bildgebenden Verfahren Sonographie und Thoraxröntgenuntersuchung wurde hinsichtlich der initialen Pneumo-/Hämatothorax-Diagnostik im Schockraum und den daraus abgeleiteten Maßnahmen verglichen. Insgesamt wurden 141 Patienten untersucht. Davon waren 93 männliche und 48 weibliche Patienten. Unterteilt in die einzelnen Untersuchungsgruppen ergab sich für das eFAST eine Verteilung von 90 untersuchten Männern (65%) und 48 Frauen (35%). In der Untersuchungsgruppe Thoraxröntgenuntersuchung ergab sich eine Verteilung von 23 Männern (67%) und elf Frauen (33%). Insgesamt wurden 20 Pneumo-/Hämatothorax detektiert, von denen elf eine sofortige Drainage benötigten. Weitere deskriptive Daten können der Tabelle 3.5 entnommen werden.

Tabelle 3.5: Alter und Geschlecht des gesamten Patientenkollektivs (n=141) nach bildgebenden Verfahren eFAST und Thoraxröntgenuntersuchung unterteilt.

eFAST:	Geschlecht	Thoraxröntgen- untersuchung:	Geschlecht
Männlich	65%	Männlich	67%
Weiblich	35%	Weiblich	33%
Ges.-Anzahl (n)	138	Ges.-Anzahl (n)	34
eFAST	Alter	Thoraxröntgen- untersuchung:	Alter
Durchschnitt	48,5 y	Durchschnitt	49 y
Minimum	0,4 y	Minimum	18 y
Maximum	93 y	Maximum	89 y
Standardabweichung	±21,2	Standardabweichung	±19,2
Ges.-Anzahl (n)	138	Ges.-Anzahl (n)	34

3.3.1 Testgenauigkeit von eFAST und Thoraxröntgenuntersuchung

Die Analysegruppe eFAST setzte sich aus insgesamt 138 Patienten mit einem Durchschnittsalter von $48,5 \pm 21$ Jahren zusammen. Die Verteilung ergab 16 positive und 122 negative eFAST Befunde, die prozentual in Abbildung 3.15 dargestellt wurden. Die Validierung gegen den Goldstandard CT zeigte, dass alle 16 positiven eFAST Ergebnisse einen Pneumo- oder Hämatothorax aufwiesen. Bei den 122 negativen Ergebnissen wurden vier positive Ergebnisse als negativ detektiert. Mittels dieser Werte konnte eine Sensitivität von 80% (siehe Tabelle 3.6) als Testgenauigkeit für das eFAST zur Pneumo-/Hämatothorax-Diagnostik berechnet werden.

Abbildung 3.15: Prozentuale Darstellung aller analysierter eFAST Befunde unterteilt in Pneumothorax positive (hellgrau: $n=16$, 12%) und negative Ergebnisse (dunkelgrau: $n=122$, 88%).

Die Analysegruppe Thoraxröntgenuntersuchung setzte sich aus insgesamt 34 Patienten mit einem Altersdurchschnitt von 49 ± 19 Jahren zusammen. Die Verteilung zeigte zwei positive und 32 negative Pneumo- bzw. Hämatothorax Befunde der Thoraxröntgenuntersuchung, siehe Abbildung 3.16. Die Validierung der Ergebnisse gegen den Goldstandard CT zeigte, dass beide Testergebnisse richtig positiv waren. Von den 32 negativen Ergebnissen waren neun falsch negativ eingestuft. Mittels dieser Werte konnte eine Sensitivität von 18% (siehe Tabelle 3.6) für die Thoraxröntgenuntersuchung zur Pneumo-/Hämatothorax-Diagnostik berechnet werden.

Abbildung 3.16: Prozentuale Darstellung aller Befunde der Thoraxröntgenuntersuchung unterteilt in Pneumothorax positive (hellgrau: n=2, 6%) und negative Ergebnisse (dunkelgrau: n=32, 94%).

Die nachfolgende Tabelle 3.6 zur Testgenauigkeit der Pneumo- und Hämatothorax-Diagnostik zeigt für das eFAST eine Sensitivität von 80% und einen negativ prädiktiven Wert von 97%. Bei der Thoraxröntgenuntersuchung konnte eine Sensitivität von 18% und ein negativ prädiktiver Wert von 71% errechnet werden.

Tabelle 3.6: Prozentuale Darstellung der Testgenauigkeit von eFAST und Thoraxröntgenuntersuchung zur initialen Pneumo-/Hämatothorax-Diagnostik im Schockraum.

Untersuchung:	eFAST	Thoraxröntgenuntersuchung
Sensitivität	80%	18%
Spezifität	100%	100%
pos. prädiktiver Wert	100%	100%
neg. prädiktiver Wert	97%	71%

3.3.2 Konsequenzen aus eFAST und Thoraxröntgenuntersuchung

Die nachfolgende Tabelle 3.7 veranschaulicht die Anzahl direkt aus der initialen Schockraum-Diagnostik eingeleiteten Konsequenzen. Insgesamt wurden 141 Patienten analysiert. Weitere deskriptive Daten können der Tabelle 3.5 entnommen werden.

3.3.2.1 eFAST

Das eFAST wurde bei insgesamt 138 Patienten durchgeführt. Aufgeteilt in die Untersuchungsgruppen setzte sich die Gruppe eF 1 (eFAST und CT) aus 107 Patienten und Gruppe eF 2 (eFAST, Thoraxröntgenuntersuchung und CT) aus 31 Patienten zusammen. Insgesamt wurden 64% aller initiierten Konsequenzen direkt als Folge aus dem eFAST eingeleitet.

3.3.2.2 Thoraxröntgenuntersuchung

Die Thoraxröntgenuntersuchung wurde insgesamt bei 34 Patienten durchgeführt. Die Gruppe Röt 1 (Thoraxröntgenuntersuchung und CT) bestand aus drei Patienten, die Gruppe Röt 2 (Thoraxröntgenuntersuchung, eFAST und CT) aus 31 Patienten. Es wurde weder aus Gruppe Röt 1 noch aus Gruppe Röt 2 eine Konsequenz aufgrund der Thoraxröntgenuntersuchung eingeleitet.

3.3.2.3 CT

Das CT stellte das Validierungsmedium der von eFAST und Thoraxröntgenuntersuchung erhobenen Befunde dar. Es wurden alle 141 analysierten Patienten noch im Schockraum mittels CT untersucht. Es zeigten sich insgesamt elf entlastungswürdige Befunde, wovon sieben (64%) durch das eFAST diagnostiziert und behandelt wurden. Vier Patienten (36%) mit entlastungswürdigem Befund wurden weder vom eFAST noch der Thoraxröntgenuntersuchung als pathologisch erkannt.

Tabelle 3.7: Darstellung der Konsequenzen aus der initialen Schockraumbildgebung aufgeteilt nach den einzelnen Untersuchungsgruppen.

Untersuchungsgruppen:	Ges.-Anzahl untersuchter Patienten (n)	Untersuchungsbedingte Konsequenzen	Ges.-Anzahl durchgeführter Konsequenzen	Untersuchungsbedingte Konsequenzen
eFAST gesamt:	138	7	11	64%
- Gruppe eF 1	107	2	4	50%
- Gruppe eF 2	31	5	7	71%
Thoraxröntgenuntersuchung gesamt:	34	0	7	0%
- Gruppe Röt 1	3	0	0	0%
- Gruppe Röt 2	31	0	7	0%
CT gesamt:	141	4	11	36%

3.4 Analyse von Thoraxröntgenuntersuchung und cCT/Ganzkörper-CT verstorbener Schockraumpatienten

Im Jahr 2013 und 2014 sind 13% aller über den Schockraum der UMG eingelieferten Patienten verstorben. Von diesen insgesamt 184 verstorbenen Patienten waren 63% männlich und 27% weiblich. Der Altersdurchschnitt der Patienten lag bei 75 ± 15 Jahren bei einer Altersverteilung von 17 bis 99 Jahren.

Es zeigte sich, dass noch vor dem Ableben bei 76% (139 Patienten) eine CT-Diagnostik (cCT/Ganzkörper-CT) und bei 41% (74 Patienten) eine Thoraxröntgenuntersuchung durchgeführt wurde, siehe Abbildung 3.17.

Abbildung 3.17: Balkendiagramm zur Darstellung der prozentualen Verteilung durchgeführter Thoraxröntgenuntersuchungen (grauer Balken: $n=74$, 41%) und CT (weißer Balken: $n=139$, 76%) nach im Schockraum der UMG verstorbenen Patienten.

4 Diskussion

4.1 Die Rolle der Thoraxröntgenuntersuchung zur Beurteilung des Mediastinums im Schockraum

Schwere Thoraxverletzungen sind bei polytraumatisierten Patienten mit einer hohen Mortalitäts- und Morbiditätsrate verbunden (Liener et al. 2006). Rupturierte Aortenaneurysmen beispielsweise kommen in 90% der Fälle im hämorrhagischen Schock in die Klinik und müssen schnellstmöglich erkannt und operativ versorgt werden (Johansen et al. 1991, Keßler et al. 2002). Ein mögliches Diagnosemittel thorakaler Verletzungen ist die Thoraxröntgenuntersuchung. Dabei können über mediastinale Hämatomzeichen, wie eine anormale Aortenkontur, eine Verschattung des aortopulmonalen Fensters, eine Verlagerung des Beatmungstubus und ein linksseitiger Hämatothorax, auf eine mediastinale Veränderung hinweisen (Uffmann et al. 1998). Darüber hinaus wird in der Thoraxröntgenuntersuchung eine verbreiterte obere Mediastinalweite von >8 cm und ein Mediastinum/Thorax-Quotient von $>0,25$ als hochgradig lazerationsverdächtig angesehen (Marsh und Sturm 1976, Müller et al. 2001).

Die hier vorgestellte Studie hat die Aussagekraft und Repräsentativität der Thoraxröntgenuntersuchung hinsichtlich vorliegender traumatisch bedingter Mediastinalverletzungen hinterfragt.

Die Messwerte 1 und 2 der berechneten Mediastinum/Thorax-Quotienten zeigen eine nur geringe Abweichung der Durchschnittswerte von M1 0,298 und M2 0,307 mit minimaler Standardabweichungen sowie einem nicht signifikanten Unterschied. Daraus lässt sich ableiten, dass sowohl der auf Herzklappenebene (M1) als auch der auf Höhe des Aortenbogens (M2) ermittelte Mediastinum/Thorax-Quotient den von Müller et al. (2001) genannten Grenz-Quotienten von $>0,25$ deutlich überschreiten und formal als pathologisch verbreitert anzusehen sind. Dies würde bedeuten, dass fast alle über den Schockraum eingelieferten Patienten eine auffällige Thoraxröntgenuntersuchung aufweisen. Bei der deutschlandweit allgemein eher geringen Häufigkeit mediastinaler Verletzungen erscheint dies als suspekt und wirft Fragen bezüglich des gewählten Grenzwertes auf.

Um eine eigenständige Aussage hinsichtlich eines pathologischen Grenzwertes treffen zu können, erfolgte die Aufteilung aller Messwerte in die Untersuchungsgruppen *Auffällig* und *Unauffällig* anhand gesichert vorliegender Mediastinalverletzungen. Eine weitere Messwertaufteilung der Untersuchungsgruppen anhand des Geschlechtes wurde bei vergleichbarer Messwertverteilung und nicht signifikantem Unterschied als wenig sinnvoll erachtet (siehe Abbildung 3.2).

Bei der Aufteilung in die Untersuchungsgruppen konnten bei der Patientengruppe *Auffällig* weder höhere Maximalwerte des Mediastinum/Thorax-Quotienten noch ein signifikanter Unterschied zur Patientengruppe *Unauffällig* festgestellt werden. Somit kann weder bei extrem hohen noch bei vom allgemein gültigen Grenzwert $>0,25$ abweichenden Mediastinalquotienten automatisch auf eine vorliegende Mediastinalverletzung geschlossen werden (Müller et al. 2001).

Zur weiteren Analyse erfolgte die Unterteilung der einzelnen Messwerte 1 und 2 anhand definierter Mediastinum/Thorax-Quotienten-Grenzwerte unter Berücksichtigung tatsächlich vorliegender Mediastinalverletzungen. Dabei zeigt sich für Messwert 1 bei einem Mediastinum/Thorax-Quotienten von 0,30 und für Messwert 2 bei 0,28 eine vertretbare, aber eher schwache maximale Sensitivität von 70% (M1) und 63% (M2). Gleichzeitig konnte eine nicht zufriedenstellende Spezifität von 57% für M1 und 38% für M2 festgestellt werden. Eine solche Spezifität ist vergleichbar mit einer 50-prozentigen Ratewahrscheinlichkeit, bei der eindeutig zu viele unauffällige Patienten fälschlicherweise als auffällig detektiert werden.

Aufgrund der nicht zufriedenstellenden Relation zwischen Sensitivität und Spezifität sowie der nicht aussagekräftigen Maximalwerte des Mediastinum/Thorax-Quotienten ist eine valide Beurteilung pathologischer Mediastinalverhältnisse durch die Thoraxröntgenuntersuchung im Schockraum als äußerst fragwürdig anzusehen.

Die von Seltzer et al. (1981) veröffentlichte Studie zu Aortenrupturen bei stumpfen Thoraxtraumen berücksichtigt ebenfalls in der Thoraxröntgenuntersuchung ermittelte Mediastinum/Thorax-Quotienten. Bei einem pathologischen Grenzwert von 0,28 konnte eine maximale Sensitivität von 85% und eine Spezifität von 100% detektiert werden (Seltzer et al. 1981). Hinterfragt man diese doch deutlich höhere Spezifität und Sensitivität, so stellen die geringere Personenanzahl, die passend gewählten kleineren Kontrollgruppen, aber auch die schlechtere Bildqualität und technischen Möglichkeiten von 1981 Ergebnis-beeinflussende Faktoren dar. Auch spielt die Variation der

Entfernung zwischen Röntgenröhre und zu durchleuchtendem Objekt eine entscheidende Rolle. Diese wurde zwar von Seltzer et al. (1981) in jeder Untersuchungsgruppe intern standardisiert angewandt, variiert jedoch zwischen den einzelnen Vergleichsgruppen. Dies schwächt die Aussagekraft des Gruppenvergleichs und der Testgenauigkeit deutlich ab. Darüber hinaus gilt es bei dem von Seltzer et al. (1981) in Bezug auf die 2. Kontrollgruppe detektierten signifikanten Unterschied zu berücksichtigen, dass sich diese ausschließlich aus *unauffälligen*, nicht hospitalisierten Patienten zusammensetzt. Außerdem wurden die Thoraxröntgenuntersuchungen nicht im Liegen, sondern stehend in p.a.-Projektion durchgeführt und sind somit nicht auf die Schockraumsituation übertragbar. Zusätzlich zeigt die von Hehir et al. (1990) angefertigte Studie, dass die im Liegen und Stehen durchgeführte Thoraxröntgenuntersuchung sich hinsichtlich der Sensitivität zur Detektion von Thoraxverletzungen um 20% (liegend 58,3%; stehend 78,7%) zugunsten der Aufnahmen im Stehen unterscheidet. Somit ist ein Vergleich von Patienten mit unterschiedlich durchgeführten Thoraxröntgenuntersuchungen als nicht repräsentativ zu werten.

Auch Marnocha et al. (1984) beschreiben in einer retrospektiven Studie keinen zufriedenstellenden klinisch brauchbaren Zusammenhang der Sensitivität und Spezifität erhobener Mediastinum/Thorax-Quotienten und vorliegenden Aortenrupturen. Somit können weder mit der hier angefertigten noch mit der von Marnocha et al. (1984) durchgeführten Untersuchung die von Seltzer et al. (1981) erhobenen Ergebnisse nachvollzogen werden.

Die Tatsache, dass sowohl 1984, damals ohne CT, bis heute allenfalls eine vage Aussage mittels Thoraxröntgenuntersuchung möglich ist, verdeutlicht den geringen Nutzen des Röntgen und unterstreicht den hohen Stellenwert des CT im Schockraum zur Detektion von Thoraxverletzungen.

Auch Uffmann et al. (1998) verweisen unter Berücksichtigung der von Woodring 1990 angefertigten Sammlung aus 52 Papern zu stumpfen thorakalen Gefäßverletzungen (1953 bis 1990) darauf, dass eine Mediastinalverbreiterung im Röntgen nur eine sehr geringe Sensitivität von 10 bis 20% aufweist.

Dies deckt sich auch mit den Aussagen von Raptopoulos et al. (1992), Hunink und Bos (1995) und Ho et al. (2002), dass die Sensitivität einer Verbreiterung des Mediastinums in der Thoraxröntgenuntersuchung unzureichend für eine initiale Beurteilung im

Schockraum ist. Deshalb werden sensitivere Verfahren wie beispielsweise das CT als Bildgebung befürwortet.

Auch die *American Association for the Surgery of Trauma* (AAST) betont den klaren Vorteil des CT zur Detektion von mediastinalen Gefäßverletzungen bei stumpfen Thoraxtraumen. Dabei stützt sich die AAST auf eine prospektiv multizentrische Vergleichsstudie, ohne die Thoraxröntgenuntersuchung als mögliche Detektionsmethode überhaupt zu berücksichtigen (Demetriades et al. 2008).

Tabelle 4.1: Autorenübersicht mit Aussagen zu Thoraxröntgenuntersuchung-bezogener Testgenauigkeit.

Autor	Jahr	Patienten-anzahl	Aussage
Marnocha et al.	1984	54	Der Mediastinum/Thorax-Quotient aus Thoraxröntgenuntersuchung besitzt eine unzureichende Sensitivität und Spezifität, um eine Aortenruptur zu bestätigen oder auszuschließen.
Hehir et al.	1990	100	Sensitivitätsunterschied von 20% der Thoraxröntgenuntersuchung zur Detektion von Thoraxverletzungen zugunsten der Aufnahmen im Stehen.
Raptopoulos et al.	1992	326	Sensitivität einer Verbreiterung in der Thoraxröntgenuntersuchung des Mediastinums ist als unzureichend zu werten.
Hunink und Bos	1995	462	
Ho et al.	2002	77	
Uffmann et al.	1998	656	Mediastinalverbreiterung in der Thoraxröntgenuntersuchung hat eine sehr geringe Sensitivität.
Woodring	1953 bis 1990		

In der hier vorliegenden Studie wurden, um mögliche Messungenauigkeiten und fehlerhafte Messergebnisse auszuschließen, die Mediastinalverhältnisse an zwei unterschiedlichen Stellen ermittelt. Hierbei konnte auf beiden Höhen ein nur geringfügig voneinander abweichender Durchschnittswert von $0,298 \pm 0,006$ für M1 und

$0,307 \pm 0,006$ für M2 festgestellt werden. Dies bestätigt die Vergleichbarkeit und schließt gleichzeitig große Messungenauigkeiten aus. Geräte-bezogene Abweichungen sind aufgrund während des Untersuchungszeitraums unveränderter Röntgenapparatur und gleichem Untersuchungsablauf als unbedeutend zu erachten. Kritisch ist jedoch die Zusammensetzung der Untersuchungsgruppen zu betrachten. Eine weitere Aufteilung des Patientenkollektivs in mehrere gleich große Kleingruppen unter Berücksichtigung von Alter, Körperstatur und Grunderkrankungen wäre bei einer erneuten Testung empfehlenswert.

Anhand der durchgeführten Studie konnte gezeigt werden, dass die Ausmessung der Thoraxröntgenuntersuchung von Schockraumpatienten weder eine sichere Diagnose noch einen sicheren Ausschluss mediastinaler Verletzungen zulässt. Die Thoraxröntgenuntersuchung ist hinsichtlich der Fragestellung pathologischer Verbreiterungen des Mediastinums in der Primärphase des Schwerverletzten-managements im Schockraum nicht aussagekräftig und daher als nicht mehr zeitgemäß anzusehen. Diese Feststellung wird durch die 2016 erschienene Leitlinie Polytrauma bestätigt. Es wird angeraten die Thoraxröntgenuntersuchung im Schockraum nicht mehr primär sondern nur bei Nichtverfügbarkeit des CT einzusetzen (Leitlinie Polytrauma 2016).

4.2 Prädiktoren mediastinaler Verletzungen

Mediastinale Verletzungen können auf vielfältige Weise entstehen, wobei für traumatische Ursachen hauptsächlich stumpfe, direkte Anprall- bzw. Dezellerations-traumen verantwortlich sind (Linsenmaier und Schueller 2010). Bereits 1960 wurde in einer Publikation von Zehnder eine deutliche Zukunftsprognose gegeben, dass bei zunehmend motorisierter Verkehrsdichte die unfall-bedingten traumatischen Aorten-rupturen an Bedeutung gewinnen werden. Auch Hermanutz und Bücheler (1974) beschreiben, dass mit zunehmender Schwere der Verkehrsunfälle die Häufigkeit von Aortenrupturen zunimmt. 1991 wurde dann explizit der Zusammenhang von PKW-Unfällen und Aortentraumen durch Gurt- und Lenkradverletzung als gesicherter Unfallmechanismus vorgestellt (Frobenius 1991). Wie im Einleitungsteil (siehe Abbildung 1.1) dargestellt, gehören Verkehrsunfälle mit zu den häufigsten Unfallursachen über den Schockraum eingelieferter Patienten. Deswegen ist die Auseinandersetzung mit direkt assoziierten Krankheitsbildern, wie traumatischen

Mediastinalverletzungen, indiziert und stellt eine aktuelle Problematik dar (TraumaRegister DGU® 2017, TraumaRegister DGU® 2018).

Um Prädiktoren mediastinaler Verletzungen zu evaluieren, wurden personen-bezogene Daten, Unfallmechanismus, Schweregrad der Thoraxverletzung, Unfallort und Schockraum Daten, Trauma-Scores und Letalität, mit dem Ziel einer möglichst schnellen Therapieeinleitung analysiert.

4.2.1 Patientenkollektiv und Herzsilhouette

Patienten-bezogene Daten wie Alter und Geschlecht stellen Standardparameter dar, die auch im Jahresbericht der DGU® veröffentlicht werden. Die Geschlechterverteilung des untersuchten Patientenkollektivs zeigt mit 77% ein männerlastiges Patientenkollektiv im Alter von 49 ± 21 Jahren. Diese Geschlechterverteilung stimmt laut Jahresbericht des TraumaRegister DGU® (2018) mit den deutschlandweit dokumentierten Schockraumpatienten (70% männlich) nahezu überein. Die Signifikanztestung der Geschlechterverteilung zeigt keinen signifikanten Unterschied, weshalb bei Verdacht auf mediastinale Verletzungen das Geschlecht nicht als Entscheidungsparameter zur Therapieeinleitung herangezogen werden kann.

Bei Blutungen von im Mediastinum liegenden Gefäßen kann es zur Ausbildung eines Hämatothorax oder Perikarderguss kommen (Heberer 1968). Zusätzliches Blutvolumen im Mediastinum kann zu einem pathologischen Thoraxbild im Röntgen führen (Freyschmidt und Hahn 2007). Bei der Untersuchungsgruppe *Auffällig* zeigen sich trotz einer durchschnittlich etwa 3 mm breiteren Herzsilhouette prozentual weniger Patienten mit einem pathologischen Herz/Thorax-Quotient (22% *Auffällig* zu 26% *Unauffällig*). Zusammen mit den negativen Ergebnissen der Signifikanztestung lässt sich folgern, dass weder über die Herzsilhouettengröße noch den Herz/Thorax-Quotienten auf eine mediastinale Verletzung geschlossen werden kann.

4.2.2 Grad der Thoraxverletzung

Bei nahezu jedem über den Schockraum eingelieferten Patienten wird der Verletzungsgrad der verschiedenen Körperregionen dokumentiert. Im Jahresbericht des TraumaRegister DGU® (2018) zeigen sich Thoraxverletzungen im Zeitraum von 2015 bis 2017 mit 45% deutschlandweit als zweit häufigstes Verletzungsmuster von Schockraumpatienten, in Bezug auf das Basis-Kollektiv.

Die Untersuchungsgruppen wurden hinsichtlich der in vier Schweregrade (keine, leicht, mittelschwer, schwer) eingeteilten Thoraxverletzungen miteinander verglichen. Dabei zeigt sich eine Korrelation zwischen der Verletzungsschwere und der Häufigkeit mediastinaler Verletzungen bei zusätzlich signifikantem Unterschied. Somit kann davon ausgegangen werden, dass je schwerer die Thoraxverletzung ist, desto mehr mediastinale Verletzung liegen vor. Die damit assoziierte negative Patientenprognose wird in der Literatur mit der ebenfalls zunehmenden Wahrscheinlichkeit einer Lungenkontusion in Verbindung gebracht (Peters et al. 2007). Die Mitverletzung der Lunge trägt dabei zur hohen und oftmals ARDS vermittelten Letalität stumpfer Thoraxtraumen bei (Regel und Pape 2000, Peters et al. 2007). Dies unterstreicht den letalitätssteigernden und sich negativ auf die Prognose des Patienten auswirkenden Einfluss von Thoraxverletzungen. Somit ist es gerechtfertigt den Schweregrad der Thoraxverletzung als wichtigen Prädiktor mediastinaler Verletzungen zu berücksichtigen und ihn bei der Entscheidung einer frühzeitigen Therapieeinleitung mit einzubeziehen.

4.2.3 Unfallmechanismus und Ursache

Bei Aortenverletzungen spielen Anprall- bzw. Dezelerationstraumen, wie sie bei Verkehrsunfällen und Sturzgeschehen vorkommen, eine wichtige Rolle (Zehnder 1974). Trotz zunehmender Motorisierung und Verkehrsdichte mit steigender Gefahr und Häufigkeit mediastinaler Verletzungen, konnte beim Unfallmechanismus Verkehrsunfall, zwischen beiden Untersuchungsgruppen *Auffällig* und *Unauffällig* kein signifikanter Unterschied festgestellt werden. Verkehrsunfälle stellen zwar laut Jahresbericht des TraumaRegister DGU® (2018) deutschlandweit eine führende Unfallursache von Schockraumpatienten dar, sind aber nicht automatisch mit einer mediastinalen Verletzung assoziiert. Eine frühzeitige Therapieeinleitung allein aufgrund des typischen Unfallmechanismus ist nicht zu rechtfertigen.

4.2.4 Vitalparameter Unfallort und Schockraum

Vitalparameter sind standardmäßig präklinisch und klinisch erhobene Messwerte, die zur Überwachung des Patienten benutzt werden.

Bezogen auf den RR spricht man definitionsgemäß ab einem systolischem RR <90 mmHg und vermindertem Herz-Zeit-Index von $<2,2$ von einem kardiogenen Schock (Adams et al. 2001). Ebenso ist bei vorliegender Verletzung des Mediastinums eine

kardiale Einschränkung denkbar. Hinsichtlich der berechneten Durchschnittswerte zeigten sich bei beiden Untersuchungsgruppen sowohl präklinisch als auch im Schockraum keine Wert <120 mmHg. Bei der Untersuchungsgruppe *Auffällig* liegt ein insgesamt zu beiden Erhebungszeitpunkten durchschnittlich geringerer systolischer RR vor, wobei nur $<25\%$ der Werte <100 mmHg liegen. Deshalb ist nicht generell von einem Schockzustand mit kardialer Einschränkung auszugehen. Der sowohl am Unfallort als auch im Schockraum nicht signifikante Unterschied beider Untersuchungsgruppen zeigt, dass der systolische RR zu keinem Zeitpunkt eine eindeutige Vorhersagekraft hinsichtlich mediastinaler Verletzungen besitzt und deshalb keine Relevanz bei der Einleitung therapeutischer Maßnahmen besitzt.

Eine Beeinträchtigung der kardialen Auswurfleistung kann zu einer kompensatorischen Veränderung der Herzfrequenz führen. Tachykarde Herzfrequenzen durch sympatho-adrenerge Gegenregulation können als Kompensationsmechanismen des Herzens angesehen werden, um Durchblutung und Sauerstoffversorgung mittels gesteigertem Herzzeitvolumen aufrecht zu erhalten (Brambrink und Noppens 2001). Am Unfallort zeigten sich bei der Untersuchungsgruppe *Auffällig* durchschnittlich tachykarde HF Werte von 101/min. Ursachen hierfür können sowohl eine Einschränkung der kardialen Auswurfleistung als auch die durch Aufregung und Stress am Unfallort-bedingte massiv erhöhte adrenerge Hormonausschüttung sein (Sefrin et al. 1980). Die zu beiden Erhebungszeitpunkten deutlich höheren Maximalwerte der HF der Untersuchungsgruppe *Unauffällig* zeigen, dass anhand von extrem von der Norm abweichender Werte nicht automatisch auf eine vorliegende Mediastinalverletzung geschlossen werden kann.

Fasst man zusammen, so zeigt sich aufgrund des nur knapp oberhalb der Tachykardiegrenze liegenden Durchschnittswert der Patientengruppe *Auffällig* sowie fehlende bradykarde HF-Werte und nicht signifikanten Unterschied, dass die HF weder eine Relevanz als Prädiktor zur Früherkennung mediastinaler Verletzungen noch zur frühzeitigen Therapieeinleitung besitzt.

Die Sauerstoffsättigung ist ein von der Auswurfleistung und Funktionstüchtigkeit des Herzens abhängiger Parameter zur Darstellung des peripheren arteriellen Sauerstoffgehalts im Blut. Der sigmoide Verlauf der Sauerstoffbindungskurve zeigt ab einer peripheren SpO_2 Konzentration von $<90\%$ einen rapiden Abfall der Sauerstoffsättigung des Blutes, weshalb 90% als Hypoxiegrenze definiert wird (Lindemann 1998).

Die zu beiden Erhebungszeitpunkten durchschnittlich niedrigeren und am Unfallort sogar unterhalb der Hypoxiegrenze befindlichen SpO₂-Werte der Untersuchungsgruppe *Auffällig* könnten entweder auf eine verminderte kardiale Auswurfleistung oder auf eine pulmonal eingeschränkte Oxygenierung hinweisen (Gestel und Teschler 2015). Dennoch müssen die ermittelten SpO₂-Werte allgemein hinterfragt werden, da die präklinisch und klinisch angewandten SpO₂-Sensoren eine starke kälte-, höhenmeter- und verschmutzungs-bezogene Störanfälligkeit aufweisen (Storck und Girwidz 2016, Domej et al. 2011). Unter Berücksichtigung der Störanfälligkeit der SpO₂-Sensoren und des nicht signifikanten Unterschiedes der Untersuchungsgruppen ist die peripher gemessene Sauerstoffkonzentration als nicht richtungsweisend hinsichtlich mediastinaler Verletzungen und einer frühzeitig einzuleitenden Therapie zu werten.

4.2.5 Invasive Maßnahmen und Medikamente

Die Schockraumdokumentation beinhaltet neben den Patientendaten und Vitalparametern auch durchgeführte Maßnahmen und die Medikamentengabe.

Die Intubation und die Anlage einer Thoraxdrainage stellen invasive Maßnahmen am Unfallort und im Schockraum dar. Die zu beiden Zeitpunkten mit 47% gleichbleibenden und um 9% am Unfallort und 36% im Schockraum höheren Intubationszahlen der Untersuchungsgruppe *Auffällig* zeugen von dem hohen Stellenwert der pulmonalen Unterstützung bei Patienten mit mediastinalen Verletzungen. Dies befürwortet auch die prospektive Studie von Trupka et al. (1995), in der eine signifikante Reduktion der Letalitätsrate schwerer Thoraxtraumen durch frühzeitige Intubation festgestellt werden konnte. Zusätzlich konnte hinsichtlich des Intubationsstatus im Schockraum ein signifikanter Unterschied festgestellt werden.

Der Thoraxdrainagestatus ist bei der Untersuchungsgruppe *Auffällig* prozentual gesehen am Unfallort um das Fünffache und im Schockraum um das Sechsfache höher als bei der Vergleichsgruppe *Unauffällig*. Diese deutlich höhere Interventionsrate der Untersuchungsgruppe *Auffällig* unterstreicht den hohen Stellenwert der thorax- und lungenentlastenden Maßnahme bei vorliegenden Mediastinalverletzungen. Zusätzliche das Mediastinum belastende Zustände wie ein Pneumo-/Hämato-/ oder Spannungspneumothorax bedürfen einer sofortigen Behandlung (Kopp et al. 2008). Außerdem können laut Kopp et al. (2008) über die Menge (>500 ml Blut) und die Beschaffenheit des Drainageinhaltes Rückschlüsse auf zentrale Gefäßverletzungen gezogen werden.

Die Signifikanztestung zeigt für den im Schockraum erhobenen Thoraxdrainagestatus einen signifikanten Unterschied.

Unter Berücksichtigung der Auswertung beider invasiver Maßnahmen (Intubation und Thoraxdrainage) spiegeln die deutlich höheren Prozentzahlen durchgeführter Interventionen der Untersuchungsgruppe *Auffällig* deren hohen Stellenwert bei Mediastinalverletzungen wider. Aufgrund des signifikanten Unterschiedes im Schockraum kann die Notwendigkeit einer Intubation oder einer Thoraxdrainage als Hinweis auf das Vorliegen einer mediastinalen Verletzung fungieren. Deshalb sollten weitere Untersuchungen, beispielsweise ein CT-Thorax zur Analyse des Mediastinums folgen, um eine frühzeitige Therapieeinleitung genauestens zu evaluieren.

Bei der Katecholamin-Gabe zeigt sich in der vorliegenden Studie bei der Untersuchungsgruppe *Auffällig* zu beiden Erhebungszeitpunkten mit 40% eine vierfach höhere Prozentzahl an Katecholamin-bedürftigen Patienten als bei der Vergleichsgruppe *Unauffällig* (10% Patienten mit Katecholaminen). Präklinisch weist die Signifikanztestung einen minimal (10^{-6}) unterhalb der Signifikanzgrenze von 0,002381 liegenden p-Wert auf. Problematisch stellt sich die Zuordnung der verabreichten Katecholaminart dar, was anhand der Dokumentation nicht nachvollziehbar ist. Zusammenfassend ist aufgrund der nur schwachen Signifikanz und der nicht nachvollziehbaren Katecholamin-Substanzgruppe der Katecholaminstatus als ein lediglich schwacher und vernachlässigbarer Hinweis auf eine vorliegende mediastinale Verletzung zu werten.

Eine weiterführende Studie zur Untersuchung der Beziehung von Mediastinalverletzungen und dem Einsatz verschiedener Katecholamin-Substanzgruppen in Form einer prospektiven Verlaufsstudie würde sich zur genaueren Evaluierung des vorliegenden Untersuchungsergebnisses eignen.

4.2.6 Trauma-Scores

Der NISS und RISC-II-Score dienen der Klassifizierung und Beurteilung von Verletzungsschwere und Überlebenswahrscheinlichkeit schwerverletzter Patienten.

Der durchschnittliche NISS der Patientengruppe *Auffällig* ist mit 39 Punkten um elf Punkte höher und beim 3. Quantil sogar um 16 Punkte höher als bei der Vergleichsgruppe *Unauffällig*. Auch hinsichtlich des niedrigsten NISS zeigt sich bei der Patientengruppe *Auffällig* mit 12 Punkten eine 9 Punkte höhere Verletzungsschwere

verglichen mit der Untersuchungsgruppe *Unauffällig*. Sowohl die höhere 75% Grenze (3. Quantil) als auch der deutlich über 20 Punkte liegende mittlere NISS der Untersuchungsgruppe *Auffällig*, spiegeln im deutschlandweiten Schockraumpatientenvergleich von 2015 bis 2017 (durchschnittlich 18 NISS Punkte) die gravierende Verletzungsschwere und den dringlichen Therapiebedarf mediastinaler Verletzungen wider (TraumaRegister DGU® 2018).

Der RISC-II-Score der Patientengruppe *Auffällig* weist mit durchschnittlich 73% eine um 15% niedrigere und somit deutlich reduzierte Überlebenswahrscheinlichkeit auf. Auch das 1. Quantil (<35.3%) bestätigt, dass bei Untersuchungsgruppe *Auffällig* prozentual mehr Patienten eine deutlich schlechtere Überlebenswahrscheinlichkeit aufweisen als die der Patientengruppe *Unauffällig* (1.Quantil bei 90%).

Die p-Werte beider Trauma-Scores (NISS und RISC-II) zeigen keine signifikanten Unterschiede, weshalb sie zwar individuell stark aussagekräftig sind, aber sich nicht als allgemeine Prädiktoren mediastinaler Verletzungen oder zur Evaluation einer frühzeitigen Therapie eignen.

4.2.7 Letalität

Die Letalität des gesamten Patientenkollektivs liegt bei 8%. Dies ist vergleichbar mit den im Jahresbericht des TraumaRegister DGU® (2018) veröffentlichten Werten der deutschlandweiten Sterberate von 10,8% aller im TraumaRegister DGU® gelisteten Schockraumpatienten. Die Letalität stellt einen praxisrelevanten Parameter dar, um Kliniken untereinander zu vergleichen. Unterteilt in die Untersuchungsgruppen zeigt sich prozentual eine mit 15% fast doppelt so hohe Letalitätsrate der Patienten mit mediastinaler Verletzung (Gruppe *Auffällig*). Dies veranschaulicht trotz nicht signifikantem Unterschied beider Untersuchungsgruppen den dringlichen Behandlungsbedarf und die Notwendigkeit einer möglichst frühen Behandlung zur Senkung der Letalität.

Mediastinale Gefäßverletzungen gehen oftmals ohne äußere Verletzungen einher und werden deshalb vom Notfallpersonal nicht sofort erkannt (Kirsh et al. 1976, Barcia und Livoni 1983). Deshalb sind Untersuchungen am Unfallort bzw. im Schockraum und die initiale Bildgebung im Schockraum wichtige Bestandteile der Diagnostik mediastinaler Verletzungen.

Den Untersuchungen zufolge lassen weder patienten-bezogene Daten, der Unfallmechanismus noch präklinisch durchgeführte Maßnahmen oder erhobene Vitalparameter einen Rückschluss auf vorliegende mediastinale Verletzungen zu. Dies beschreibt auch die Studie von Zehnder (1960) in der postuliert wird, dass sich die klinischen Symptome beispielsweise einer Aortenruptur sehr variabel darstellen können und sich nicht zur Sicherung der Diagnose eignen. Das *American College of Surgeons Committee on Trauma* (ACS COT) geht sogar so weit, die deutliche *Over Triage Rate* von 30 bis 50% auf initial am Unfallort erhobene Parameter zurückzuführen, was die präklinisch erhobenen Parameter nicht nur bei mediastinalen Verletzungen, sondern generell in Zweifel zieht (Hinkelbein et al. 2013).

Die von Blackmore et al. (2000) angefertigte Studie zur Optimierung der Bildgebungsstrategie und Ermittlung der Risikowahrscheinlichkeit traumatischer Aortenverletzungen befasst sich mit vermeintlich signifikanten Parametern wie Alter, Hypotension (<90 mmHg) und vorliegendem Pneumothorax. Dabei stimmen die hier als signifikant detektierten Unterschiede hinsichtlich vorliegendem Pneumothorax überein. Die sowohl von Blackmore et al. (2000) als auch von Kram et al. (1987) berücksichtigte Hypotension von <90 mmHg kann anhand der hier erhobenen Daten wegen fehlender Unterteilung und Signifikanz der RR-Werte weder bestätigt noch widerlegt werden. Dennoch ist es ein interessanter Ansatzpunkt für weitergehende Forschung und könnte im Rahmen einer erneut retrospektiven Untersuchung getestet werden.

Kritisch müssen die Dokumentations- und Übertragungsprozesse des TraumaRegister DGU® betrachtet werden. Die Daten werden primär per Hand im Schockraum erhoben und manuell in die Online-Datenbank des Traumaregisters eingepflegt, was eine potentielle Fehlerquelle darstellt. Außerdem können die hektische Schockraum-atmosphäre und der starke Zeitdruck im Schockraum zu einer lückenhaften Datenerhebung führen. Deshalb stehen bei den Untersuchungsgruppen *Auffällig* und *Unauffällig* teilweise nicht alle 27 bzw. 240 Patienten als Vergleichspopulation zur Verfügung. Neben der Datenerhebung muss auch die Auswertung kritisch betrachtet werden. Die Signifikanztestung des Patientenkollektivs erfolgte anhand variierender Patientenzahlen die auf Dokumentationslücken oder Übertragungsfehler zurückzuführen sind. Die Anpassung des p-Wertes auf 0,017 bzw. 0,002381 zielt darauf ab, die Wahrscheinlichkeit zufällig signifikanter Unterschiede zu minimieren. Dabei wurde auch die Aussagekraft der Signifikanzen anhand der Differenz zur p-Wertgrenze berücksichtigt. Kritisch ist auch die unterschiedliche Größe der Untersuchungsgruppen

zu betrachten wodurch die einzelnen Signifikanzen in ihrer Aussagekraft abgeschwächt werden.

Beim Jahresbericht des TraumaRegister DGU®, der als Bezugsgröße deutschlandweit dokumentierter Schockraumpatienten dient, gilt es zu berücksichtigen, dass lediglich ein als Basis-Kollektiv definierter Patientenstamm dargestellt wird. Dieses Kollektiv klammert leichtverletzte Patienten aus und setzt sich aus schwerverletzten Patienten mit einem MAIS 3+ sowie allen Patienten mit einem MAIS 2, die entweder verstorben sind oder auf Intensivstation lagen, zusammen (TraumaRegister DGU® 2018).

Zusammenfassend ist eine typische Symptomatik für mediastinale Verletzungen nur schwer zu beschreiben. Bezogen auf Aortenverletzungen ist der klinische Befund abhängig vom Ausmaß der Unterbrechung der Aortenwand, der Schwere des Thoraxtrauma und den nicht thorakalen Begleitverletzungen (Kopp et al. 2008). Patienten-bezogene Daten, der Unfallmechanismus und präklinisch erhobene Parameter konnten hierbei keine aussagekräftigen Werte liefern, die auf eine Mediastinalverletzung hinweisen.

Klinisch im Schockraum zeigen sich hingegen Parameter, wie der Schweregrad der Thoraxverletzung, der Intubations- und Thoraxdrainagestatus, als richtungsweisend. Diese sind mit erhöhter Wahrscheinlichkeit mit mediastinalen Verletzungen vergesellschaftet, weshalb bei vorliegendem Befunden ein besonderes Augenmerk auf die weitere diagnostische Abklärung gelegt und an eine frühzeitige Therapieeinleitung gedacht werden sollte.

4.3 Aussagekraft von eFAST und Thoraxröntgenuntersuchung zur Pneumo- und Hämatothorax-Diagnostik im Schockraum

Die Thoraxsonographie ist ein diagnostisches Mittel zur Detektion thorakaler Verletzungen mit der Möglichkeit sofort therapeutische Schritte zu veranlassen (Kreuter et al. 2012). Beispielsweise führt in den Pleuraspalt eingedrungene Luft zu einem fehlenden Lungengleiten in der Thoraxsonographie (Michels et al. 2014). Auch die Thoraxröntgenuntersuchung wird zur Diagnose eines Pneumothorax eingesetzt. Pathologien fallen in Form sichtbarer Pleuralinien, vermehrter Transparenz und fehlender Gefäßzeichnung lateral der kollabierten Lunge auf (Diederich und Wormanns 2009).

Die angefertigte Studie zielt auf eine genaue Differenzierung der Aussagekraft von eFAST und Thoraxröntgenuntersuchung ab. Dabei hat sich eine bei 80% liegende und vierfach höhere Sensitivität des eFAST gezeigt, wodurch die Überlegenheit des eFAST verglichen mit der Thoraxröntgenuntersuchung (18% Sensitivität) verdeutlicht wird. Die bei beiden Untersuchungen mit 100% identische Spezifität ist zu vernachlässigen, da sie sich auf die Detektion *unauffälliger* Patienten bezieht und keine Relevanz für die Fragestellung nach einem Pneumo-/Hämatothorax besitzt.

Die Studie von Kirkpatrick et al. (2004) konnte bei vergleichbarer Spezifität von 99,2% eine bei 49% liegende und insgesamt 29% höhere Sensitivität des eFAST, verglichen mit der Sensitivität der Thoraxröntgenuntersuchung, feststellen. Auch diese Daten zeigen die Überlegenheit des eFAST in der Pneumo-/Hämatothorax-Diagnostik. Der deutliche Sensitivitätsunterschied des eFAST im Vergleich zur hier durchgeführten Studie kann durch den technischen Fortschritt heutiger Ultraschallgeräte oder möglicherweise fehlende Untersucherexpertise erklärt werden. Hinsichtlich der Studiendurchführung zeigen sich bis auf eine längere Studiendauer seitens der Studie von Kirkpatrick et al. (2004) deutliche Parallelen zur hier veröffentlichten Untersuchung in Durchführung, Ablauf, Patientenzahl und –kollektiv.

In der von Zhang et al. (2006) publizierten prospektiven Studie zeigt sich mit 27,6% eine deutlich niedrigere Sensitivität der konventionellen Thoraxröntgenuntersuchung im Vergleich zur 86,2%-igen Sensitivität des eFAST. Bei vergleichbarem Untersuchungsaufbau und -durchführung unterstreichen diese Ergebnisse die deutlich überlegene Aussagekraft des eFAST zur Pneumo-/Hämatothorax-Detektion. Zusätzlich nennt Zhang et al. (2006) eine signifikante Zeitersparnis als weiteren Vorteil des eFAST.

Auch von Nagarsheth und Kurek (2011) wird im *American Surgeon* die Empfehlung der Nutzung des eFAST aufgrund der höheren Sensitivität gegeben. Diese Empfehlung basiert auf einer mit 81,8% insgesamt 50% höheren Sensitivität des eFAST im Vergleich zur Thoraxröntgenuntersuchung (31,8%) (Nagarsheth und Kurek 2011).

Laut Hyacinthe et al. (2012) hat sich aufgrund hoher Sensitivität, schneller Durchführbarkeit und leichter Erreichbarkeit des eFAST im Schockraum die Beurteilung von Thoraxtraumen verbessert. Deshalb sollten auch hämodynamisch- und respiratorisch instabile Patienten einer Thoraxsonographie unterzogen werden. Dieses Zugeständnis bei maximal schwerverletzten Patienten unterstreicht den hohen und

aussagekräftigen Stellenwert des eFAST in der initialen Schockraumbehandlung und bestätigt die hier veröffentlichten Untersuchungsergebnisse.

In der Literatur zeigen sich schwankende Werte der eFAST Sensitivität, die durch eine unterschiedlich stark ausgeprägte Luftansammlung im Pleuraspalt, beispielsweise bei einem Spitzen- oder Mantelpneumothorax, zu erklären sind (Kirkpatrick et al. 2004). Die Detektion solch minimaler Luftmengen im Pleuraspalt ist oftmals mit dem eFAST nicht möglich und nur durch die als Goldstandard angesehene Computertomographie feststellbar (Reissig und Kroegel 2005). Ebenso kann sich ein Pneumothorax im Verlauf größenprogredient darstellen, wodurch sich die Luftansammlung erst zu einem späteren Zeitpunkt demaskiert.

Trotz schwankender Prozentzahlen stimmen die Studien in der Erkenntnis einer deutlich höheren Sensitivität der Thoraxsonographie überein und teilen das Untersuchungsergebnis der hier durchgeführten Studie. Somit ist das eFAST der konventionellen Thoraxröntgenuntersuchung zur Pneumo-/Hämatothorax-Diagnostik im Schockraum vorzuziehen.

Die wechselnde Durchführung und Auswertung von eFAST, Thoraxröntgenuntersuchung und CT durch Personal der Unfallchirurgie bzw. Radiologie sollte kritisch betrachtet werden. Hierbei können sich Ausbildungsstand-abhängige Unterschiede zeigen, die sich ggf. auf die Befunde auswirken. Die Dokumentation erfolgte durch ein an die Schockraumbögen angehefteten Fragebogen, der sowohl von studentischem Hilfspersonal als auch von Ärzten der chirurgischen Notaufnahme ausgefüllt wurde. Eine personell vereinheitlichte Erhebung, Dokumentation, Auswertung und Untersuchungsdurchführung würde zu einer verbesserten Studienqualität führen, ist im Klinikalltag jedoch nur schwer realisierbar. Während des kompletten Untersuchungszeitraums wurde an der bildgebenden Apparatur nichts verändert, weshalb diesbezügliche Verfälschungen zu vernachlässigen sind. Als verbesserungswürdig könnte eine striktere und einheitlichere Durchführung aller drei Untersuchungsmodalitäten bei Schockraumpatienten mit Thoraxtrauma angedacht werden sowie ein längerer, prospektiver Untersuchungszeitraum, um mehr relevante Patienten zu detektieren.

Tabelle 4.2: Autorenübersicht zur prozentualen Sensitivität von eFAST und Thoraxröntgenuntersuchung in der Pneumo-/Hämatothorax-Diagnostik.

Autor	Jahr	Patientenanzahl	Sensitivität der Pneumothorax-/Hämatothorax-Diagnostik	
Kirkpatrick et al.	2004	225	eFAST	49%
			Thoraxröntgen	20%
Zhang et al.	2006	135	eFAST	86,2%
			Thoraxröntgen	27,6%
Nagarsheth und Kurek	2011	125	eFAST	81,8%
			Thoraxröntgen	31,8%
Hyacinthe et al.	2012	119	eFAST soll wegen hoher Sensitivität und schneller Durchführbarkeit auch bei hämodynamisch und respiratorisch instabilen Patienten angewandt werden.	

Das eFAST ist der Thoraxröntgenuntersuchung in der Notfall-Diagnostik von Schwerverletzten im Schockraum mit einer vierfach höheren Sensitivität bei der Pneumo- und Hämatothorax-Diagnostik weit überlegen. Sie ist als aussagekräftigere Untersuchung anzusehen. Aufgrund des deutlichen Vorteils der Thoraxsonographie wird empfohlen, die Thoraxröntgenuntersuchung durch das eFAST im primären Schockraum-Algorithmus zur Pneumo-/Hämatothorax-Detektion bei Thoraxtraumen zu ersetzen. Darüber hinaus kann die höhere Detektionsrate des eFAST in Kombination mit der von Zhang et al. (2006) postulierten Zeitersparnis genutzt werden, um das klinische Schwerverletztenmanagement im Schockraum zu optimieren.

4.3.1 Konsequenzen aus eFAST, Thoraxröntgenuntersuchung und CT

Ein Pneumothorax kann über die aufgehobenen Adhäsionskräfte der Pleurablätter zum Kollabieren der betroffenen Lunge mit Einschränkung der Sauerstoffaustauschfläche führen. Die schwerwiegendste Form stellt der Ventil-/Spannungspneumothorax dar, der durch einen Überdruck in der Lunge zur Mediastinalverschiebung mit ggf. hämodynamischer Problematik führt (von Wichert 2004). Im Schockraum müssen Patienten mit einem Pneumothorax möglichst schnell und mit hoher Sensitivität erkannt

werden, um lungenentlastende Maßnahmen mittels Thoraxdrainage einleiten zu können (Kopp et al. 2008).

In der hier vorgestellten Untersuchung konnte durch das eFAST mit sieben (64%) der insgesamt elf entlastungswürdigen Befunde weitaus mehr pathologische Zustände diagnostiziert und direkt mittels Thoraxdrainage therapiert werden. Aus der Thoraxröntgenuntersuchung hingegen konnte laut Dokumentation keine einzige Konsequenz gezogen werden. Somit spiegeln sich auch in diesem Ergebnis der deutlich höhere Stellenwert und die höhere Aussagekraft des eFAST wider.

In den restlichen 36% der Fälle wurde die notwendige Konsequenz weder aus dem eFAST noch aus der Thoraxröntgenuntersuchung gezogen. Erst mithilfe des CT konnte die Pathologie erkannt und therapiert werden. Das CT stellt aufgrund der höchsten Sensitivität den Goldstandard in der Pneumothorax-Diagnostik dar und ist sogar dem eFAST überlegen (Reissig und Kroegel 2005).

Über die genauen Gründe, warum in 36% der Fälle das eFAST die pathologischen Befunde nicht erkannt hat, lässt sich nur spekulieren. Dabei könnten eine variierende Anwenderexpertise, der Zeitdruck und situations-bedingter Stress im Schockraum oder eine Adipositas-bedingte verbreiterte thorakale Gewebsschicht eine fehlerprovozierende Rolle spielen. Der Zeitfaktor beeinflusst das Untersuchungsergebnis ebenfalls, da sich die Luftansammlung im Pleuraspalt mit zunehmender Behandlungszeit und durch umlagerungs-bedingte Manöver ggf. progredient darstellen kann.

Dies wäre ein interessanter Ansatzpunkt für weitere Untersuchungen, die sich unter zusätzlicher Berücksichtigung der zeitlichen Komponente mit auf den Pneumothorax auswirkenden Faktoren beschäftigt. Dabei könnte die Aussagekraft der Thoraxsonographie zu drei Schockraumzeitpunkten untersucht werden. Initial vor dem Umlagern auf die Schockraumtrage, direkt danach und anschließend nach dem zweiten Umlagern auf den CT-Tisch. Der Untersucher sollte dabei nicht gewechselt werden. Somit könnte eine Aussage zur zeitlichen und umlagerungs-bedingten Entwicklung eines Pneumothorax getätigt werden.

Auch Reissig und Kroegel (2005) konnten in einer Post-interventionsstudie zum Pneumothoraxausschluss den deutlichen Vorteil des eFAST hinsichtlich schnellerer, früherer und einfacherer Durchführung im Vergleich zur Thoraxröntgenuntersuchung zeigen. Die Thoraxröntgenuntersuchung ist dabei lediglich zur Einteilung der Größe des

Pneumothorax sowie bei einer Diskrepanz zwischen klinischem- und eFAST Befund in Erwägung zu ziehen (Reissig und Kroegel 2005).

Sowohl bei der hier vorgestellten Studie als auch bei Reissig und Kroegel (2005) kann aufgrund eines positiven eFAST Befund mit großer Wahrscheinlichkeit von einem vorliegenden Pneumo-/Hämatothorax ausgegangen werden.

Bei negativem eFAST-Befund muss die im Vergleich deutlich niedrigere Sensitivität der Thoraxröntgenuntersuchung bedacht werden. Außerdem zeigt die von Hyacinthe et al. (2012) veröffentlichte Studie, dass die Kombination aus klinisch auffälligem Befund und Thoraxröntgenuntersuchung eine geringere Sensitivität aufweist als das eFAST alleine. Deshalb ist bei negativem eFAST mit allenfalls sehr geringer Wahrscheinlichkeit von einem widersprüchlichen Pneumothorax darstellenden Röntgenbefund auszugehen.

An der von Reissig und Kroegel (2005) durchgeführten Studie ist der nur gering zugunsten des eFAST ausfallende Sensitivitätsunterschied kritisch zu hinterfragen. Diese Tatsache ist der geringen Anzahl vorliegender Pneumothorax bzw. Hydropneumothorax geschuldet, die alle vier vom eFAST und nur einer von der Thoraxröntgenuntersuchung nicht erkannt wurde.

Dennoch unterstützen sowohl Reissig und Kroegel (2005) als auch Hyacinthe et al. (2012) die Feststellung der höheren Sensitivität des eFAST, verglichen mit der Thoraxröntgenuntersuchung. Somit spiegelt die deutlich höhere Konsequenzrate des eFAST indirekt auch deren höheren Stellenwert im Schockraummanagement zur Pneumothorax-Diagnostik wider.

Basierend auf dem Vorteil des eFAST zur initialen Schockraum- und post-interventionellen Pneumothorax-Diagnostik wäre eine weitergehende Untersuchung der Pneumothorax-Detektion nach zentraler Venenkatheter-Anlage interessant. Hierbei könnte nach Punktion der V. jugularis interna oder der V. subclavia die Aussagekraft der Thoraxsonographie zu definierten Zeitabschnitten post-interventionell untersucht werden.

Bei dem hier vorgestellten Studienablauf muss berücksichtigt werden, dass die Untersuchungen, Auswertungen und Dokumentation von eFAST, Thoraxröntgen und CT durch variierendes Personal der Unfallchirurgie bzw. Radiologie durchgeführt wurden. Eine personell standardisierte Erhebung, Dokumentation, Auswertung und Untersuchungsdurchführung würde zu einer verbesserten Studienqualität führen, ist im

Klinikalltag jedoch nur schwer realisierbar. Während des kompletten Untersuchungszeitraums wurde an der bildgebenden Apparatur nichts verändert, weshalb Untersuchungsgerät-spezifische Abweichung zu vernachlässigen sind. Hinsichtlich der Anzahl detektierter Pneumo-/Hämatothorax gilt zu berücksichtigen, dass bei der Untersuchung insgesamt 20 Befunde festgestellt wurden. Davon wiesen nur elf ein entlastungswürdiges Ausmaß auf, sodass nur diese berücksichtigt wurden.

Das eFAST ist der Thoraxröntgenuntersuchung hinsichtlich der Detektion traumatisch und post-interventionell entstandener Pneumothorax in Sensitivität und der Einleitung notwendiger Maßnahmen deutlich überlegen. Deshalb ist das eFAST als initial wichtigste *first look*-Untersuchung im Schockraum zur Pneumothorax-Diagnostik bei Patienten mit Thoraxtrauma anzusehen.

4.4 Stellenwert von Thoraxröntgenuntersuchung und cCT/Ganzkörper-CT bei verstorbenen Schockraumpatienten

Um die Wertigkeit der verschiedenen diagnostischen Verfahren bei letztendlich letal schwerverletzten Patienten zu analysieren, wurden die bildgebenden Verfahren CT (cCT/Ganzkörper-CT) und Thoraxröntgenuntersuchung evaluiert. Die anschließende Gegenüberstellung der bildgebenden Verfahren mit den Daten des TraumaRegister DGU® zielt auf einen deutschlandweiten Vergleich strahlenbelastender Bildgebung bei schwerverletzten Schockraumpatienten ab.

Die festgestellte fast doppelt so hohe Prozentzahl durchgeführter cCT/Ganzkörper-CT Untersuchungen (76%) im Vergleich zur Thoraxröntgenuntersuchung (40%) spiegelt den deutlich höheren Stellenwert der Computertomographie bei verstorbenen Schockraumpatienten wider. Verglichen mit den Jahresberichtsdaten des TraumaRegister DGU® (2017) und (2018) zeigt sich mit 34% und 30% durchgeführter Thoraxröntgenuntersuchung zu 78% bzw. 79% durchgeführter CT-Untersuchungen ebenfalls eine stärkere Präsenz des CT bei Schockraumpatienten.

Diese Feststellungen werden von den im 3-Jahres-Trend (2015 bis 2017) kontinuierlich steigenden Zahlen durchgeführter CT (77% auf 79%) und fallender Anzahl Thoraxröntgenuntersuchung (36% auf 30%) im Schockraum gestärkt (TraumaRegister DGU® 2017, TraumaRegister DGU® 2018).

Auch die Gesamtzahl durchgeführter Bildgebungen der vergangenen 10 Jahre verdeutlicht mit 39% Thoraxröntgenuntersuchung zu 76% cCT/Ganzkörper-CT den insgesamt deutschlandweit höheren Stellenwert der Computertomographie im Schockraum (TraumaRegister DGU® 2018).

Kritisch muss hierbei betrachtet werden, dass es sich bei dem TraumaRegister DGU®-Jahresbericht um ein Basis-Patientenkollektiv mit nicht nur verstorbenen Patienten handelt. Es werden auch überlebende schwerverletzte Patienten mit einem MAIS 3+ sowie Patienten mit einem MAIS von 2, die auf Intensivstation gelegen haben, berücksichtigt, was die Vergleichbarkeit einschränkt. Dennoch handelt es sich sowohl bei den analysierten verstorbenen Schockraumpatienten als auch den Patienten des TraumaRegister DGU® um ein schwerverletztes Patientenkollektiv.

Der Vergleich durchgeführter bildgebender Verfahren hat ein deutlich zugunsten der Computertomographie ausfallendes Ergebnis gezeigt. Dank übereinstimmender Zahlen (Jahresbericht TraumaRegister DGU® (2018) und vorliegende Studie) kann die Aussage getätigt werden, dass das CT die deutschlandweit wichtigste Untersuchung bei schwerverletzten Schockraumpatienten ist.

Weiterhin zeigen CT-bezogene Studien wie die von Huber-Wagner et al. (2009), dass die Integration des Ganzkörper-CT in der frühen Traumaversorgung für eine signifikant höhere Überlebenswahrscheinlichkeit polytraumatisierter Patienten sorgt. Standardverfahren wie Sonographie oder Röntgen sollen deswegen nicht abgeschafft, sondern als Ergänzung bzw. Reserve im Falle eines CT Ausfalls verwendet werden (Huber-Wagner et al. 2009). Anhand dieser Empfehlung zeigt sich der deutlich höher einzuschätzende Stellenwert des CT im Schockraum verglichen mit anderen bildgebenden Verfahren.

In einer weiteren von Huber-Wagner et al. (2013) veröffentlichten Untersuchung konnte durch Anwendung des Ganzkörper-CT sowohl bei hämodynamisch instabilen als auch stabilen schwerverletzten Traumapatienten eine signifikante Senkung der standardisierten Mortalitätsrate (SMR) festgestellt werden. Damit ist die Anwendung des Ganzkörper-CT bei schwerverletzten Patienten eine sichere, durchführbare und gerechtfertigte Untersuchung (Huber-Wagner et al. 2013). Deshalb ist das CT als unverzichtbar in der Behandlung schwerverletzter Patienten anzusehen und ein Garant hoher diagnostischer Qualität im Schockraum.

Aufgrund des höheren Stellenwertes der CT-Diagnostik und die favorisierte Durchführung im Schockraum muss auch die höhere Strahlenbelastung diskutiert werden. Das Ganzkörper-CT stellt mit einer Effektdosis zwischen 5 bis 20 mSv im Vergleich zum konventionellen Röntgen (Wirbelsäule, Thorax, Becken) mit 5,46 mSv eine nahezu identische bis maximal vierfach höhere Strahlenbelastung dar (Brenner und Elliston 2004, Hara et al. 2009, Loewenhardt et al. 2012, Martinsen et al. 2012, Noël et al. 2013). Zusätzlich zeigt sich neben der vergleichbaren Strahlendosis und dem größeren Nutzen des Ganzkörper-CT bei polytraumatisierten Patienten auch eine signifikante Zeitverringerung, die bereits bei CT-Effektdosen von 10,2 bis 12,7 mSv möglich ist (Heyer et al. 2005).

Der Zeitfaktor spielt in der Polytraumaversorgung eine wichtige Rolle, da bereits ab einem verlängerten Schockraumaufenthalt von 3 Minuten die Letalität um 1% ansteigt (Clarke et al. 2002). Ein kürzerer Schockraumaufenthalt beeinflusst dabei die Intensiv- und Gesamtaufenthaltsdauer im Krankenhaus positiv, unabhängig von der Verletzungsschwere des Patienten (Prokop et al. 2006). Unter Berücksichtigung der verkürzten Diagnosedauer und besseren Darstellungsmöglichkeiten (3D Rekonstruktion) kann, laut Prokop et al. (2006), die einmalig höhere Strahlenbelastung des CT bei schwerverletzten Schockraumpatienten in Kauf genommen werden.

Es gilt zu beachten, dass bei den UMG-Daten ausschließlich im System registrierte und per Einsicht überprüfte Thoraxröntgenuntersuchung und cCT/Ganzkörper-CT berücksichtigt wurden. Beim Vergleichskollektiv des TraumaRegister DGU® (2017) und (2018) handelt es sich um gesammelte, handschriftlich dokumentierte Daten, die im Internet eingepflegt und nicht nochmals gegengeprüft wurden. Darüber hinaus muss berücksichtigt werden, dass die als Vergleichsgruppe gewählten bildgebenden Verfahren CT, entweder ein cCT oder ein Ganzkörper-CT beinhalten. Sollte ein Patient sowohl ein cCT als auch ein Ganzkörper-CT erhalten haben, so wurde dies als eine Untersuchung gewertet.

Der Vergleich von Thoraxröntgenuntersuchung und cCT/Ganzkörper-CT bei schwerverletzten und im Schockraum verstorbenen Patienten unterstreicht den hohen und deutschlandweit übertragbaren Stellenwert der CT-Diagnostik in der Schockraumbehandlung. Die hohe diagnostische Aussagekraft, der Zeitgewinn im Schockraumablauf und die letalitätssenkende Wirkung bei hämodynamisch instabilen Patienten sind Gründe, weshalb dem CT eine zentrale Rolle auch in der aktuellen Leitlinie Polytrauma

(2016) zugesprochen wird (Huber-Wagner et al. 2013). Im aktuellen Schockraumalgorithmus stellt das CT den diagnostischen Goldstandard dar und ist in der Bildgebung schwerverletzter Patienten nicht wegzudenken (Leitlinie Polytrauma 2016).

4.5 Fazit

Die Verletzungsschwere des Thorax sowie eine durchgeführte Intubation oder Thoraxdrainage im Schockraum sind als richtungsweisende Faktoren einer notwendigen weiteren diagnostischen Abklärung von Mediastinalverletzungen und einer ggf. frühzeitig einzuleitenden Therapie anzusehen.

Die Analyse im Schockraum etablierter bildgebender Verfahren hat gezeigt, dass bei schwerverletzten Patienten die Thoraxröntgenuntersuchung weder zur Beurteilung der Mediastinalverhältnisse noch zur Pneumo-/Hämatothorax-Diagnostik eine relevante Aussagekraft besitzt und somit als nicht mehr zeitgemäß anzusehen ist.

Die deutlich höhere Sensitivität des eFAST zur Pneumo-/Hämatothorax-Diagnostik sowie die prozentual höhere Konsequenzrate, verglichen mit dem konventionellen Röntgen, bestätigen die deutliche Überlegenheit und den Vorteil der Thoraxsonographie bei der initialen Bildgebung von Thoraxtraumen im Schockraum.

Zusammenfassend ist eine Optimierung des Schockraummanagements bei Thoraxtraumen durch den initialen Einsatz des eFAST anstelle der Thoraxröntgenuntersuchung zur Pneumo-/Hämatothorax-Diagnostik möglich.

Bei der Gegenüberstellung von Thoraxröntgenuntersuchung und CT verstorbener und schwerverletzter Schockraumpatienten spiegeln die ermittelten und mit dem TraumaRegister DGU® verglichenen Daten eine höhere und tendenziell steigende Prozentzahl durchgeführter cCT/Ganzkörper-CT Untersuchungen wider. Deshalb wird das cCT/Ganzkörper-CT, auch laut aktueller Leitlinie Polytrauma (2016), als diagnostischer Goldstandard bei schwerverletzten Schockraumpatienten angesehen.

5 Zusammenfassung

Die Relevanz bildgebender Verfahren im Schockraum bei Thoraxverletzungen wurde mit dem Ziel, eine möglichst hohe Qualität im Schockraummanagement zu gewährleisten, analysiert.

Die Aussagekraft der Thoraxröntgenuntersuchung zum Ausschluss mediastinaler Verletzungen wurde mittels retrospektiver Betrachtung der Jahre 2013 und 2014 analysiert. Das Mediastinum des gesamten Patientenkollektivs aus 267 Patienten wurde an zwei definierten Stellen (Herzklappenebene und Aortenbogen) ausgemessen und in Relation zum Thoraxdurchmesser gesetzt. Die Einteilung der Ergebnisse erfolgte anhand von vier definierter Grenzwerte ($\geq 0,2$ / $\geq 0,25$ / $\geq 0,28$ / $\geq 0,30$). Die Testgenauigkeit wurde anschließend unter Berücksichtigung zweier Patientengruppen *Auffällig* (Patienten mit Mediastinalverletzung, n=27) und *Unauffällig* (Patienten ohne Mediastinalverletzung, n=240) ermittelt. Eine maximale Sensitivität und Spezifität konnte auf Herzklappenebene (Mediastinum/Thorax-Quotient Messwert 1) bei einem Grenzwert von $\geq 0,3$ und auf Höhe des Aortenbogens (Mediastinum/Thorax-Quotient Messwert 2) bei $\geq 0,28$ ermittelt werden. Insgesamt zeigte sich jedoch keine ausreichend hohe und zufriedenstellende Testgenauigkeit. Deshalb hat die Thoraxröntgenuntersuchung hinsichtlich der Fragestellung pathologischer Verbreiterungen des Mediastinums in der Primärphase des Schwerverletztenmanagements im Schockraum an Aussagekraft und Relevanz verloren.

Zur Detektion prädiktiver Faktoren mediastinaler Verletzungen wurde das zuvor genannte Patientenkollektiv (*Auffällig* n=27; *Unauffällig* n=240) hinsichtlich patientenbezogener Daten, präklinisch und klinisch erhobener Parameter sowie Trauma-Scores und Letalität auf signifikante Unterschiede untersucht. Es zeigte sich ein signifikanter Unterschied bei zunehmender Thoraxverletzungsschwere, durchgeführter Intubation und Thoraxdrainage im Schockraum sowie Katecholamin-Gabe am Unfallort. Deshalb sollte bei diesen Parametern ein besonderes Augenmerk auf die weitere diagnostische Abklärung mediastinaler Verletzungen gelegt werden. Somit könnte der doppelt so hohen Letalität der Patienten mit mediastinaler Verletzung (*Auffällig*) durch eine frühzeitige Therapieeinleitung entgegengewirkt werden.

Die Gegenüberstellung von eFAST und Thoraxröntgenuntersuchung zur Pneumothorax-/Hämatothorax-Diagnostik zielt auf die Ermittlung der jeweiligen Testgenauigkeit ab. Es wurden prospektiv über zwölf Monate alle Schockraumpatienten, die eine Untersuchungskombination aus CT + eFAST und/oder Thoraxröntgenuntersuchung erhalten haben, analysiert. Dabei konnte gezeigt werden, dass mit einer Sensitivität von 80% das eFAST der konventionellen Thoraxröntgenuntersuchung mit 18% weit überlegen und somit als valides und wichtigeres Untersuchungsmittel bei Thoraxtraumen anzusehen ist.

In einem zweiten Schritt wurde anhand des gleichen Patientenkollektivs die Anzahl direkt aufgrund vorangegangener Bildgebung eingeleitet invasiver Maßnahmen (Thoraxdrainage) untersucht. Es zeigte sich, dass das eFAST mit 64% direkt initiierten Interventionen der Thoraxröntgenuntersuchung mit 0% eingeleiteter Maßnahmen deutlich überlegen ist.

Abschließend wurden in einer retrospektiven Erhebung der Jahre 2013 und 2014 alle noch im Schockraum oder spätestens 30 Tage nach Aufnahme über den Schockraum verstorbenen Patienten hinsichtlich der stattgefundenen strahlenbelastenden Bildgebung (cCT/Ganzkörper-CT und Thoraxröntgenuntersuchung) analysiert. Der anschließende Vergleich mit den deutschlandweit im TraumaRegister DGU® dokumentierten Schockraumpatienten zielt auf eine deutschlandweite Übertragbarkeit des Ergebnisses ab. Es zeigte sich, dass sowohl bei den analysierten 184 verstorbenen Schockraumpatienten als auch bei den vom Traumaregister DGU® (2018) dokumentierten Patienten das CT mit 76% (Studie) bzw. 79% (TraumaRegister) deutlich häufiger durchgeführt wurde als die Thoraxröntgenuntersuchungen mit 40 (Studie) bzw. 30% (TraumaRegister). Somit wird der hohe und deutschlandweit übertragbare Stellenwert der CT-Diagnostik in der Schockraumbehandlung schwerverletzter Patienten zum Ausdruck gebracht.

6 Anhang

6.1 Initiale Beurteilung des Mediastinums mittels Thoraxröntgenuntersuchung im Schockraum

Tabelle 6.1: Patientendaten und Messwerte aller analysierter Patienten (n=267).

<i>Auffällig:</i>	Geschlecht	<i>Unauffällig:</i>	Geschlecht
Männlich	85%	Männlich	77%
Weiblich	15%	Weiblich	23%
Ges.-Anzahl (n)	27	Ges.-Anzahl (n)	240
<i>Auffällig:</i>	Alter	<i>Unauffällig:</i>	Alter
Durchschnitt	49 y	Durchschnitt	49 y
Minimum	16 y	Minimum	0 y
Maximum	89 y	Maximum	92 y
1. Quantil	26 y	1. Quantil	33 y
3. Quantil	59 y	3. Quantil	65 y
Standardabweichung	±19,8	Standardabweichung	±21,2
Ges.-Anzahl (n)	27	Ges.-Anzahl (n)	240
<i>Auffällig:</i>	Messwert 1	<i>Unauffällig:</i>	Messwert 1
Durchschnitt	0,302	Durchschnitt	0,298
Minimum	0,18	Minimum	0,18
Maximum	0,43	Maximum	0,52
1. Quantil	0,27	1. Quantil	0,25
3. Quantil	0,34	3. Quantil	0,34
Standardabweichung	± 0,06	Standardabweichung	± 0,06
Ges.-Anzahl (n)	27	Ges.-Anzahl (n)	240

<i>Auffällig:</i>	Messwert 2	<i>Unauffällig:</i>	Messwert 2
Durchschnitt	0,302	Durchschnitt	0,306
Minimum	0,21	Minimum	0,18
Maximum	0,47	Maximum	0,55
1. Quantil	0,27	1. Quantil	0,26
3. Quantil	0,33	3. Quantil	0,35
Standardabweichung	$\pm 0,06$	Standardabweichung	$\pm 0,06$
Ges.-Anzahl (n)	27	Ges.-Anzahl (n)	240

Tabelle 6.2: Ergebnisverteilung der Grenzwerte des Mediastinum/Thorax-Quotienten 1.

Grenzwert:	$\geq 0,2$	$\geq 0,25$	$\geq 0,28$	$\geq 0,3$
Ges.-positiv	258	208	155	103
Richtig positiv	25	22	19	15
Falsch positiv	233	186	136	88
Ges.-negativ	9	59	112	164
Richtig negativ	7	54	104	152
Falsch negativ	2	5	8	12

Tabelle 6.3: Ergebnisverteilung der Grenzwerte des Mediastinum/Thorax-Quotienten 2.

Grenzwert:	$\geq 0,2$	$\geq 0,25$	$\geq 0,28$	$\geq 0,3$
Ges.-positiv	266	223	165	125
Richtig positiv	27	23	17	12
Falsch positiv	239	200	148	113
Ges.-negativ	1	44	102	142
Richtig negativ	1	40	92	127
Falsch negativ	0	4	10	15

6.2 Früherkennung mediastinaler Verletzungen

Tabelle 6.4: Übersicht Herz/Thorax-Quotient und Throaxverletzungsschwere unterteilt in die Untersuchungsgruppen *Auffällig* und *Unauffällig*.

<i>Auffällig:</i>	Herzsilhouette	<i>Unauffällig:</i>	Herzsilhouette
Durchschnitt	139,51 mm	Durchschnitt	136,19 mm
Standardabweichung	$\pm 26,2$	Standardabweichung	$\pm 23,5$
Verbreitert	22%	Verbreitert	26%
Normal	88%	Normal	84%
Ges.-Anzahl (n)	27	Ges.-Anzahl (n)	240
<i>Auffällig:</i>	Thoraxverletzung	<i>Unauffällig:</i>	Thoraxverletzung
Keine	0%	Keine	49%
Leicht	0%	Leicht	18%
Mittel	27%	Mittel	24%
Schwer	72%	Schwer	9%
Ges.-Anzahl (n)	11	Ges.-Anzahl (n)	194

Tabelle 6.5: Übersicht der analysierten Verletzungsursachen unterteilt in die Untersuchungsgruppen *Auffällig* und *Unauffällig*.

<i>Auffällig:</i>	Verletzungsursache	<i>Unauffällig:</i>	Verletzungsursache
Verkehrsunfall	67%	Verkehrsunfall	61%
Sturz	20%	Sturz	35%
Sonstige	13%	Sonstige	4%
Ges.-Anzahl (n)	15	Ges.-Anzahl (n)	205

Tabelle 6.6: Vitalparameter Unfallort und Schockraum unterteilt in die Untersuchungsgruppen *Auffällig* und *Unauffällig*.

<i>Auffällig:</i>	RR Unfallort	<i>Unauffällig:</i>	RR Unfallort
Durchschnitt	133 mmHg	Durchschnitt	134 mmHg
Minimum	60 mmHg	Minimum	75 mmHg
Maximum	190 mmHg	Maximum	220 mmHg
1. Quantil	124 mmHg	1. Quantil	120 mmHg
3. Quantil	150 mmHg	3. Quantil	150 mmHg
Standardabweichung	$\pm 39,4$	Standardabweichung	$\pm 25,3$
Ges.-Anzahl (n)	12	Ges.-Anzahl (n)	189

<i>Auffällig:</i>	RR Schockraum	<i>Unauffällig:</i>	RR Schockraum
Durchschnitt	122 mmHg	Durchschnitt	126 mmHg
Minimum	70 mmHg	Minimum	47 mmHg
Maximum	164 mmHg	Maximum	200 mmHg
1. Quantil	100 mmHg	1. Quantil	109 mmHg
3. Quantil	158 mmHg	3. Quantil	145 mmHg
Standardabweichung	$\pm 32,6$	Standardabweichung	$\pm 28,6$
Ges.-Anzahl (n)	14	Ges.-Anzahl (n)	196

<i>Auffällig:</i>	HF Unfallort	<i>Unauffällig:</i>	HF Unfallort
Durchschnitt	101/min	Durchschnitt	88/min
Minimum	50/min	Minimum	16/min
Maximum	166/min	Maximum	199/min
1. Quantil	80/min	1. Quantil	78/min
3. Quantil	127/min	3. Quantil	100/min
Standardabweichung	±33,2	Standardabweichung	±21,4
Ges.-Anzahl (n)	13	Ges.-Anzahl (n)	186
<i>Auffällig:</i>	HF Schockraum	<i>Unauffällig:</i>	HF Schockraum
Durchschnitt	90 /min	Durchschnitt	85/min
Minimum	18/min	Minimum	18/min
Maximum	136/min	Maximum	195/min
1. Quantil	68/min	1. Quantil	72/min
3. Quantil	100/min	3. Quantil	96/min
Standardabweichung	±29,6	Standardabweichung	±21,6
Ges.-Anzahl (n)	14	Ges.-Anzahl (n)	198
<i>Auffällig:</i>	SpO ₂ Unfallort	<i>Unauffällig:</i>	SpO ₂ Unfallort
Durchschnitt	88%	Durchschnitt	93%
Minimum	60%	Minimum	30%
Maximum	100%	Maximum	100%
1. Quantil	85%	1. Quantil	92%
3. Quantil	96%	3. Quantil	98%
Standardabweichung	±11,2	Standardabweichung	±9,9
Ges.-Anzahl (n)	14	Ges.-Anzahl (n)	176

<i>Auffällig:</i>	SpO ₂ Schockraum	<i>Unauffällig:</i>	SpO ₂ Schockraum
Durchschnitt	95%	Durchschnitt	96%
Minimum	81%	Minimum	35%
Maximum	100%	Maximum	100%
1. Quantil	91%	1. Quantil	96%
3. Quantil	99%	3. Quantil	100%
Standardabweichung	±5,7	Standardabweichung	±6,4
Ges.-Anzahl (n)	12	Ges.-Anzahl (n)	181

Tabelle 6.7: Polytrauma-Kennwerte unterteilt in die Untersuchungsgruppen *Auffällig* und *Unauffällig*.

<i>Auffällig:</i>	NISS	<i>Unauffällig:</i>	NISS
Durchschnitt	39 Pkte.	Durchschnitt	28 Pkte.
Minimum	12 Pkte.	Minimum	3 Pkte.
Maximum	75 Pkte.	Maximum	75 Pkte.
1. Quantil	22 Pkte.	1. Quantil	17 Pkte.
3. Quantil	50 Pkte.	3. Quantil	34 Pkte.
Standardabweichung	±18,6 Pkte.	Standardabweichung	±15,1 Pkte.
Ges.-Anzahl (n)	15	Ges.-Anzahl (n)	206

<i>Auffällig:</i>	RISC-II-Score	<i>Unauffällig:</i>	RISC-II-Score
Durchschnitt	75%	Durchschnitt	87%
Minimum	14,2%	Minimum	4,7%
Maximum	99,8%	Maximum	99,9%
1. Quantil	35,2%	1. Quantil	90,9%
3. Quantil	98,7%	3. Quantil	99,6%
Standardabweichung	±32,2%	Standardabweichung	± 22,1%
Ges.-Anzahl (n)	15	Ges.-Anzahl (n)	194

6.3 Letalität

Tabelle 6.8: Letalität Schockraumpatienten unterteilt in die Untersuchungsgruppen *Auffällig* und *Unauffällig*.

Letalität:	<i>Auffällig</i>	<i>Unauffällig:</i>
Männlich	4	14
Weiblich	0	4
Prozent	15%	18%
Durchschnittsalter	46,5y	65,8y
Minimum	22	20
Maximum	63	89
Standardabweichung	18,4	± 23,8
Ges.-Anzahl (n)	27	240

6.4 Fragebogen

Thoraxröntgenuntersuchung vs. eFAST

Patienten - Etikett

Röntgenthorax durchgeführt ☐

eFAST durchgeführt ☐

eFAST nicht durchgeführt wegen Weichteilemphysem ☐

eFAST Befunde:

Unauffällig ☐

Hämatothorax ☐

Pneumothorax ☐

Andere:

Röntgen Befunde:

Unauffällig ☐

Hämatothorax ☐

Pneumothorax ☐

Andere:

Vom eFAST divergierende Befunde:

Aufgrund von eFAST eingeleitete Maßnahmen:

Thoraxdrainage: Rechts ☐ Links ☐

Andere/weitere Maßnahmen:

Bemerkungen:

Abbildung 6.1: Darstellung des angefertigten Fragebogens zur Primärdiagnostik eines Pneumo-/Hämatothorax im Schockraum durch eFAST und Thoraxröntgenuntersuchung.

7 Literaturverzeichnis

Achenbach T (2012): Röntgenthorax–Indikationen, Limitationen, Befundung. *Lege Artis* 2, 258–263

Adams H, Baumann G, Gänsslen A und, Janssens U, Knoefel W, Koch T, Marx G, Müller-Werdan U, Pape H, Prange W, et al. (2001): Definitionen der Schockformen. *Anesthesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther* 38, 140–143

Albrecht T, von Schlippenbach J, Stahel P, Ertel W, Wolf K-J (2004): Die Rolle der Ganzkörper-Spiral-CT bei der Primärdiagnostik polytraumatisierter Patienten-Vergleich mit konventioneller Radiographie und Abdomensonographie. *RöFo* 176, 1142–1150

Baker SP, O’neill B (1976): The injury severity score: an update. *J Trauma Acute Care Surg* 16, 882–885

Baker SP, O’Neill B, Haddon Jr W, Long WB (1974): The injury severity score: a method for describing patients with multiple injuries and evaluating emergency care. *J Trauma Acute Care Surg* 14, 187–196

Balogh Z, Offner PJ, Moore EE, Biffl WL (2000): NISS predicts postinjury multiple organ failure better than the ISS. *J Trauma Acute Care Surg* 48, 624–628

Barcia TC, Livoni JP (1983): Indications for angiography in blunt thoracic trauma. *Radiology* 147, 15–19

Blackmore CC, Zweibel A, Mann FA (2000): Determining risk of traumatic aortic injury: how to optimize imaging strategy. *Am J Roentgenol* 174, 343–347

Blalock JB, Ochsner JL (1966): Management of thoracic trauma. *Surg Clin North Am* 46, 1513–1524

Boehm T, Alkadhi H, Schertler T, Baumert B, Roos J, Marincek B, Wildermuth S (2004): Einsatz der Mehrschicht-Spiral-CT beim traumatologischen Notfall und ihre Auswirkungen auf den Untersuchungs-und Behandlungsalgorithmus. *RöFo* 176, 1734–1742

Bölükbas S, Ghezel-Ahmadi D, Kwozalla AK, Schirren J (2011): Diagnostic assessment and treatment concepts for thoracic trauma. *Chirurg* 82, 843–849

Bouillon B, Rixen D, Maegle M, Steinhausen E, Tjardes T, Paffrath T (2009): Damage control orthopedics. *Unfallchirurg* 112, 860–869

Brambrink AM, Noppens R (2001): Der Notfallpatient im Schock. *Notf Rett Med* 4, 4–15

- Brenneman FD, Boulanger BR, McLellan, Barry A, Redelmeier DA (1998): Measuring injury severity: times for a change. *J Trauma Acute Care Surg* 44, 580-582
- Brenner DJ, Elliston CD (2004): Estimated radiation risks potentially associated with full-body CT screening. *Radiology* 232, 735-738
- Butcher N, Balogh ZJ (2009): The definition of polytrauma: the need for international consensus. *Injury* 40, 12-22
- Chawda M, Hildebrand F, Pape HC, Giannoudis PV (2004): Predicting outcome after multiple trauma: which scoring system. *Injury* 35, 347-358
- Clarke JR, Trooskin SZ, Doshi PJ, Greenwald L, Mode CJ (2002): Time to laparotomy for intra-abdominal bleeding from trauma does affect survival for delays up to 90 minutes. *J Trauma Acute Care Surg* 52, 420-425
- Copes WS, Champion HR, Sacco WJ, Lawnick MM, Keast SL, Bain LW (1988): The Injury Severity Score revisited. *J Trauma Acute Care Surg* 28, 69-77
- Demetriades D, Velmahos GC, Scalea TM, Jurkovich GJ, Karmy-Jones R, Teixeira PG, Hemmila MR, O'Connor JV, McKenney MO, Moore FO, et al. (2008): Diagnosis and treatment of blunt thoracic aortic injuries: changing perspectives. *J Trauma Acute Care Surg* 64, 1415-1419
- Diederich S, Wormanns D (2009): Radiologische Diagnostik der Pleura. *Radiol Up2date* 9, 167-185
- Dokov W, Radoinova D (2014): Applicability of the abbreviated injury scale in forensic medical practice in Bulgaria. *Scr Sci Med* 46, 51-54
- Doll D, Müller T, Ruchholtz S, Kühne CA (2010): Damage Control – prioritätenorientiertes Behandlungsmanagement schwerstverletzter Patienten. *Orthop Unfall Up2date* 5, 87-96
- Domej W, Haditsch B, Schaberger G (2011): Kritische Beurteilung der O2-Versorgung des Organismus durch Pulsoxymetrie. *Alpinmed Rundbrief* 44, 14-15
- Encke A, Lüllig H, Ullrich F (1978): Das geschlossene und offene Thoraxtrauma. *Unfallchirurgie* 4, 23-29
- Farkas ML: Querschnittanatomie zur Computertomographie. Springer, Berlin Heidelberg 1986, 3-9
- Fischer M, Kehrberger E, Marung H, Moecke H, Prückner S, Trentzsch H, Urban B (2016): Eckpunkt Papier 2016 zur notfallmedizinischen Versorgung der Bevölkerung in der Prähospitalphase und in der Klinik. *Notf Rett Med* 19, 387-395

- Flohr TG, Ohnesorge BM, Becker CR, Knez A, Reiser MF: Multi-slice and Dual-source CT in Cardiac Imaging. 2. Auflage; Springer, Berlin Heidelberg New York 2007, 41-69
- Freeman P (1999): The role of ultrasound in the assessment of the trauma patient. *Aust J Rural Health* 7, 85–89
- Freyschmidt J, Hahn D: Handbuch diagnostische Radiologie. Kardiovaskuläres System; Springer, Berlin Heidelberg 2007, 118
- Frobenius H: Unfallmechanismen und ihre typischen Verletzungen. Fachkundenachweis Rettungsdienst; Springer, Berlin Heidelberg 1991, 189–192
- Goldberg BB, Goodman GA, Clearfield HR (1970): Evaluation of ascites by ultrasound. *Radiology* 96, 15–22
- Grau T: Ultraschall in der Anästhesie und Intensivmedizin. Lehrbuch der Ultraschall-diagnostik. Deutscher Ärzte-Verlag, Köln 2007, 79–80
- Haasper C, Junge M, Ernstberger A, Brehme H, Hannawald L, Langer C, Nehmzow J, Otte D, Sander U, Krettek C, et al. (2010): Die Abbreviated Injury Scale (AIS). *Unfallchirurg* 113, 366–372
- Hara AK, Paden RG, Silva AC, Kujak JL, Lawder HJ, Pavlicek W (2009): Iterative reconstruction technique for reducing body radiation dose at CT: feasibility study. *Am J Roentgenol* 193, 764–771
- Heberer G (1968): Beurteilung und Behandlung von Verletzungen des Brustkorbes und der Brustorgane im Rahmen der Mehrfachverletzungen. *Langenbecks Archiv für klinische Chirurgie* 322, 268–284
- Hehir M, Hollands M, Deane S (1990): The accuracy of the first chest x-ray in the trauma patient. *Aust N Z J Surg* 60, 529–532
- Hermanutz K, Bücheler E (1974): Traumatische, nichtperforierende Verletzungen der thorakalen Aorta und der intrathorakalen Aortenbogenäste. *RöFo* 120, 156–163
- Heyer CM, Rduch G, Kagel T, Lemburg SP, Theisinger A, Bauer TT, Muhr G, Nicolas V (2005): Prospektive, randomisierte Evaluation eines modifizierten Mehrdetektor-CT-Protokolls in der Initialdiagnostik beim Polytrauma. *RöFo* 177, 242–249
- Hinkelbein J, Faymonville C, Hackenbroch M, Burst V, Böttiger B (2013): Interdisziplinäre Schockraumversorgung polytraumatisierter Patienten. *Notf Med Up2date* 8, 177–192
- Ho RT, Blackmore CC, Bloch RD, Hoffer EK, Mann FA, Stern EJ, Wilson AJ (2002): Can we rely on mediastinal widening on chest radiography to identify subjects with aortic injury. *Emerg Radiol* 9, 183–187
- Hokema F, Donaubauer B, Busch T, Bouillon B, Kaisers U (2007):

Schockraummanagement nach dem ATLS®-Algorithmus. *Anästhesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther* 42, 716–723

Huber-Wagner S, Lefering R, Qvick L-M, Körner M, Kay MV, Pfeifer K-J, Reiser M, Mutschler W, Kanz K-G, Society WG on P of the GT, et al. (2009): Effect of whole-body CT during trauma resuscitation on survival: a retrospective, multicentre study. *Lancet* 373, 1455–1461

Huber-Wagner S, Biberthaler P, Häberle S, Wierer M, Dobritz M, Rummeny E, van Griensven M, Kanz K-G, Lefering R, et al. (2013): Whole-body CT in haemodynamically unstable severely injured patients: a retrospective, multicentre study. *PloS One* 8, e68880

Hunink M, Bos JJ (1995): Triage of patients to angiography for detection of aortic rupture after blunt chest trauma: cost-effectiveness analysis of using CT. *Am J Roentgenol* 165, 27–36

Husum H, Strada G (2002): Injury severity score versus new injury severity score for penetrating injuries. *Prehosp disast Med* 17, 27–32

Hyacinthe A-C, Broux C, Francony G, Genty C, Bouzat P, Jacquot C, Albaladejo P, Ferretti GR, Bosson J-L, Payen J-F (2012): Diagnostic accuracy of ultrasonography in the acute assessment of common thoracic lesions after trauma. *Chest* 141, 1177–1183

Johansen K, Kohler TR, Nicholls SC, Zierler RE, Clowes AW, Kazmers A (1991): Ruptured abdominal aortic aneurysm: the Harborview experience. *J Vasc Surg* 13, 240–247

Kanz KG, Eitel F, Waldner H, Schweiberer L (1994): Entwicklung von klinischen Algorithmen für die Qualitätssicherung in der Polytraumaversorgung. *Unfallchirurg* 97, 303–307

Kanz K-G, Körner M, Linsenmaier U, Kay M, Huber-Wagner S, Kreimeier U, Pfeifer K-J, Reiser M, Mutschler W (2004): Prioritätenorientiertes Schockraummanagement unter Integration des Mehrschichtspiralcomputertomographen. *Unfallchirurg* 107, 937–944

Keel M, Trentz O (2005): Pathophysiology of polytrauma. *Injury* 36, 691–709

Keßler U, Bergert H, Ockert D, Saeger HD (2002): Ergebnisse und Komplikationen in der Behandlung des rupturierten abdominalen Aortenaneurysmas. *Zentralbl Chir* 127, 664–668

Khandhar SJ, Johnson SB, Calhoon JH (2007): Overview of Thoracic Trauma in the United States. *Thorac surg Clin* 17, 1–9

- Kirkpatrick AW, Sirois M, Laupland KB, Liu D, Rowan K, Ball CG, Hameed SM, Brown R, Simons R, Dulchavsky SA, et al. (2004): Hand-held thoracic sonography for detecting post-traumatic pneumothoraces: the Extended Focused Assessment with Sonography for Trauma (EFAST). *J Trauma Acute Care Surg* 57, 288–295
- Kirschning T, Brenner F, Stier M, Weber CF, Walcher F (2009): Präklinische Notfallsonographie bei traumatologischen Patienten. *Anaesthesist* 58, 51
- Kirsh MM, Behrendt DM, Orringer MB, Gago O, Gray Jr LA, Mills LJ, Walter JF, Sloan H (1976): The treatment of acute traumatic rupture of the aorta: a 10-year experience. *An Surg* 184, 308
- Koerner M, Krotz MM, Degenhart C, Pfeifer K-J, Reiser MF, Linsenmaier U (2008): Current Role of Emergency US in Patients with Major Trauma 1. *Radiographics* 28, 225–242
- Kopp R, Andrassy J, Czerner S, Weidenhagen A, Weidenhagen R, Meimarakis G, Reiser M, Jauch K (2008): Traumatische thorakale Aortenruptur. *Anaesthesist* 57, 782
- Körner M, Reiser M, Linsenmaier U (2009): Multidetektor-CT zur Diagnostik traumatologischen Notfälle. *Radiologe* 49, 510–515
- Kram HB, Wohlmuth DA, Appel PL, Shoemaker WC (1987): Clinical and radiographic indications for aortography in blunt chest trauma. *J Vasc Surg* 6, 168–176
- Kreuter M, Eberhardt R, Wenz H, Schmitteckert H, Heussel C, Herth F (2011): Diagnostische Wertigkeit der thorakalen Sonographie vergleichend zur Thoraxübersicht beim Nachweis eines postinterventionellen Pneumothorax. *Eur J Ultrasound* 32, E20–E23
- Kreuter M, Herth F, Wenz H, Mathis G (2012): Sonographische Notfalldiagnostik des Thorax. *Pneumologie* 9, 436–443
- Lefering R (2002): Trauma Score Systems for Quality Assessment. *Eur J Trauma* 28, 52–63
- Lefering R (2009): Development and validation of the revised injury severity classification score for severely injured patients. *Eur J Trauma Emerg Surg* 35, 437–447
- Lefering R: Abschätzung der Gesamtzahl Schwerstverletzter in Folge von Strassenverkehrsunfällen in Deutschland. Bundesanst Für Strassenwesen BASt 2010 http://www.dvr.de/download2/p2196/2196_1.pdf
- Lefering R (2015): Ein neuer Prognose-Score im TraumaRegister DGU®(RISC II). *Orthop Unfallchir* 4, 80–81

- Lefering R, Huber-Wagner S, Nienaber U, Maegele M, Bouillon B (2014): Update of the trauma risk adjustment model of the TraumaRegister DGUTM: the Revised Injury Severity Classification, version II. *Crit Care* 18, 476
- Liener U, Sauerland S, Knöferl M, Bartl C, Riepl C, Kinzl L, Gebhard F (2006): Operative Versorgung von Thoraxverletzungen innerhalb der ersten Operationsphase. *Unfallchirurg* 109, 447–452
- Lindemann H (1998): Respiratorische Insuffizienz und Sauerstofftherapie. *Kinderheilkunde* 146, 896–903
- Lingawi SS, Buckley AR (2000): Focused Abdominal US in Patients with Trauma. *Radiology* 217, 426–429
- Linsenmaier U, Schueller G (2010): Schockraum-Management. *Notf Rett Med* 13, 436–444
- Linsenmaier U, Kanz K-G, Mutschler W, Pfeifer K (2001): Radiologische Diagnostik beim Polytrauma: Interdisziplinäres Management. *RöFo* 173, 485–493
- Loewenhardt B, Buhl M, Gries A, Greim C-A, Hellinger A, Hessmann M, Rathjen T, Reinert M, Manke C, Bernhard M (2012): Radiation exposure in whole-body computed tomography of multiple trauma patients: Bearing devices and patient positioning. *Injury* 43, 67–72
- Marnocha K, Maglinte D, Woods J, Goodman M, Peterson P (1984): Mediastinal-width/chest-width ratio in blunt chest trauma: a reappraisal. *Am J Roentgenol* 142, 275–277
- Marsh DG, Sturm JT (1976): Traumatic aortic rupture: roentgenographic indications for angiography. *Ann Thorac Surg* 21, 337–340
- Martinsen ACT, Sæther HK, Hol PK, Olsen DR, Skaane P (2012): Iterative reconstruction reduces abdominal CT dose. *Eur J Radiol* 81, 1483–1487
- Mathis G, Osterwalder JJ: Notfallsonographie am Thorax. *Bildatlas der Lungen-und Pleurasonographie*; Springer, Berlin Heidelberg 2010, 249–253
- Meier J, Habler O (2007): Die Behandlung auf der Intensivstation. *Anesthesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther* 42, 724–730
- Messmer P, Jacob AL, Fries E, Gross T, Suhm N, Steinbrich W, Frede K, Schneider T, Regazzoni P (2001): Technologieintegration und Prozessmanagement Konzept und Implementierung einer neuartigen Plattform für einzeitige Diagnostik und Therapie des akut Kranken und Verletzten sowie für elektive computerassistierte Chirurgie (CAS). *Unfallchirurg* 104, 1025–1030

- Michels G, Breitzkreutz R, Pfister R (2014): Stellenwert der Lungensonographie in der Notfall-und Intensivmedizin. *Deutsche Medizinische Wochenschrift* 139, 2301–2307
- Müller S, Bonatti J, Hellweg G, Pachinger O (2001): Erkrankungen der thorakalen Aorta: klinische Symptomatik, elektrokardiographische, röntgenologische und echo-kardiographische Diagnostik. *Austrian J Cardiol* 8, 5–10
- Nagarsheth K, Kurek S (2011): Ultrasound detection of pneumothorax compared with chest X-ray and computed tomography scan. *Am Surg* 77, 480–484
- Nast-Kolb D, Ruchholtz S, Oestern H-J, Neugebauer E (2000): Das Traumaregister der Arbeitsgemeinschaft Polytrauma der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie. *Notfallmed Rettungsmed* 3, 147–150
- Neugebauer EA, Waydhas C, Lendemans S, Rixen D, Eikermann M, Pohlemann T (2012): The Treatment of Patients With Severe and Multiple Traumatic Injuries. *Dtsch Arztebl Int* 109, 102–108
- Niethard FU, Pfeil J, Biberthaler P: *Duale Reihe Orthopädie und Unfallchirurgie*. Thieme Verlag, Stuttgart 2014, 339–343
- Noël PB, Renger B, Fiebich M, Münzel D, Fingerle AA, Rummeny EJ, Dobritz M (2013): Does Iterative Reconstruction Lower CT Radiation Dose: Evaluation of 15,000 Examinations. *PLoS one* 8, e81141
- Novelline RA, Rhea JT, Rao PM, Stuk JL (1999): Helical CT in Emergency Radiology. *Radiology* 213, 321–339
- Osler T, Baker SP, Long W (1997): A modification of the injury severity score that both improves accuracy and simplifies scoring. *J Trauma Acute Care Surg* 43, 922–926
- Pape H, Lefering R, Butcher N, Peitzman A, Leenen L, Marzi I, Lichte P, Josten C, Bouillon B, Schmucker U, et al. (2014): The definition of polytrauma revisited: An international consensus process and proposal of the new ‘Berlin definition’. *J Trauma Acute Care Surg* 77, 780–786
- Pape H-C, Tornetta P, Tarkin I, Tzioupis C, Sabeson V, Olson SA (2009): Timing of Fracture Fixation in Multitrauma Patients: The Role of Early Total Care and Damage Control Surgery. *J Am Acad Orthop Surg* 17, 541–549
- Peters S, Heyer C, Lemburg S, Mohr P, Muhr G, Nicolas V (2007): MDCT-Diagnostik nichtvaskulärer Thoraxverletzungen beim Polytrauma. *RöFo* 179, 21
- Piek J, Jantzen J-P (2000): Empfehlungen zur Erstversorgung des Patienten mit Schädel-Hirn-Trauma bei Mehrfachverletzung-Verabschiedet durch die DIVI am 5. November 1999. *Op J* 16, 105–110

- Potthoff A, Gebel M, Rifai K (2012): Diagnostische und interventionelle Abdomensonographie. *Internist* 53, 261–270
- Prokop A, Hötte H, Krüger K, Rehm KE, Isenberg J, Schiffer G (2006): Multislice-Spiral-CT zur Diagnostik beim Polytrauma. *Unfallchirurg* 109, 545–550
- Raptopoulos V, Sheiman R, Phillips D, Davidoff A, Silva W (1992): Traumatic aortic tear: screening with chest CT. *Radiology* 182, 667–673
- Regel G, Pape H-C: Lungenkontusion; in: Tscherne Unfallchirurgie; Springer, Berlin Heidelberg 2000, 251–272
- Reissig A, Kroegel C (2005): Accuracy of transthoracic sonography in excluding post-interventional pneumothorax and hydropneumothorax: comparison to chest radiography. *Eur J Radiol* 53, 463–470
- Reissig A, Kroegel C (2006): Sonographische Diagnostik des post-interventionellen Pneumothorax und Seropneumothorax–Prospektive Studie an 100 Patienten. *Praxis* 95, 617–624
- Reissig A, Copetti R, Kroegel C (2011): Current role of emergency ultrasound of the chest. *Crit Care Med* 39, 839–845
- Rieger M, Sparr H, Esterhammer R, Fink C, Bale R, Czermak B, Jaschke W (2002): Moderne CT-Diagnostik des akuten Thorax- und Abdominaltraumas. *Radiologe* 42, 556–563
- Rozycki GS, Shackford SR (1996): Ultrasound, what every trauma surgeon should know. *J Trauma Acute Care Surg* 40, 1–4
- Ruchholtz S (2004): Das externe Qualitätsmanagement in der klinischen Schwerverletztenversorgung. *Unfallchirurg* 107, 835–843
- Ruchholtz S, Zintl B, Nast-Kolb D, Waydhas C, Lewan U, Kanz K, Schwender D, Pfeifer K, Schweiberer L (1998): Improvement in the therapy of multiply injured patients by introduction of clinical management guidelines. *Injury* 29, 115–129
- Ruchholtz S, Waydhas C, Schroeder T, Piepenbrink K, Kühl H, Nast-Kolb D (2002): Stellenwert der Computertomographie in der frühen klinischen Behandlung schwer verletzter Patienten. *Chirurg* 73, 1005–1012
- Ruchholtz S, Kühne C, Siebert H, Weißbuch AU (2007): Das traumanetzwerk der deutschen gesellschaft für unfallchirurgie. *Unfallchirurg* 110, 373–380
- Ruchholtz S, Lefering R, Paffrath T, Oestern HJ, Neugebauer E, Nast-Kolb D, Pape H-C, Bouillon B (2008): Rückgang der Traumaletalität. *Dtsch Arztebl* 105, 225–231

- Schmitt K-U, Niederer PF, Muser MH, Walz F: Trauma-Biomechanik: Verletzungen in Straßenverkehr und Sport. Springer, Heidelberg Dordrecht London New York 2010, 30–32
- Schoepf U, Becker C, Brüning R, Hong C, Rust G-F, Helmberger T, Leimeister P, Stadie A, Niethammer M, Klingemann B, et al. (1999): Computertomographie des Abdomens mit der Mehrzeilen-Detektor Spiral-CT. Radiologe 39, 652–661
- Schönenberger E, Mühler M, Dewey M (2010): Komplikationen durch die Kontrastmittelgabe. Internist 51, 1516–1524
- Schramm P (2005): CT-Diagnostik bei akuter zerebraler Ischämie. Radiologe 45, 420–429
- Sefrin P, Appel E, Palm D: Sympatho-adrenerge Regulation in der Frühphase des traumatisch-hämorrhagischen Schocks. In: Brückner JB (Hrsg.): Kreislauf. Springer, Heidelberg New York 1980 217-221
- Seltzer S, D’orsi C, Kirshner R, DeWeese J (1981): Traumatic aortic rupture: plain radiographic findings. Am J Roentgenol 137, 1011–1014
- Shackford SR, Rogers FB, Osler TM, Trabulsy ME, Clauss DW, Vane DW (1999): Focused abdominal sonogram for trauma: the learning curve of non radiologist clinicians in detecting hemoperitoneum. J Trauma Acute Care Surg 46, 553–564
- Spering C, Roessler M, Kurlmann T, Dresing K, Stürmer KM, Lehmann W, Sehmisch S (2018): Optimierte Ressourcenmobilisation und Versorgungsqualität Schwerstverletzter durch eine strukturierte Schockraumalarmierung. Unfallchirurg 121, 1–8
- States JD, Viano DC (1990): Injury impairment and disability scales to assess the permanent consequences of trauma. Accident Anal Prev 22, 151–159
- Storck T, Girwidz R (2016): Pulsoximetrie im Physikunterricht. Phys Did A 1, 1–13
- Sturm J, Hoffmann R (2016): Die Akademie der Unfallchirurgie (AUC). Unfallchirurg 119, 164–172
- Traub M, Stevenson M, McEvoy S, Briggs G, Lo SK, Leibman S, Joseph T (2007): The use of chest computed tomography versus chest X-ray in patients with major blunt trauma. Injury 38, 43–47
- Oestern H-J, Trentz O, Uraneus S: Polytrauma: pathophysiology, priorities, and management. General Trauma Care and related Aspects; Springer, Berlin Heidelberg 2014, 69–76
- Trupka A, Waydhas C, Nast-Kolb D, Schweiberer L (1995): Effect of early intubation on the reduction of post-traumatic organ failure. Unfallchirurg 98, 111–117

- Tsai C-C, Tsai C-S, Ng K-K, Lai C-H, Hsueh S, Kao P-F, Chang T-C, Hong J-H, Yen T-C (2003): The impact of image fusion in resolving discrepant findings between FDG-PET and MRI/CT in patients with gynaecological cancers. *Eur J Nucl Med Mol Imaging* 30, 1674–1683
- Tscherne H, Regel G, Sturm JA, Friedl HP (1987): Degree of severity and priorities in multiple injuries. *Chirurg* 58, 631–640
- Uffmann M, Fuchs M, Herold C (1998): Radiologie des Thoraxtraumas. *Radiologe* 38, 683–692
- van Gestel AJR, Teschler H: *Physiotherapie bei chronischen Atemwegs- und Lungenerkrankungen. Evidenzbasierte Praxis*; Springer, Berlin Heidelberg 2015, 241–242
- von Ow D, Osterwalder J (2012): Sonographisches Schockraummanagement beim Trauma–Etabliertes Verfahren beim Traumamanagement. *Kliniker* 41, 23–27
- von Wichert P (2004): Pneumothorax. *Internist* 45, 549–554
- Wastl D, Helwig K, Dietrich CF (2015): Untersuchungskonzepte und Untersuchungsabläufe in der Notfallsonographie. *Intensivmed Notfallmed* 110, 231–242
- Waydhas C (2012): Präklinische polytraumaversorgung: S3-leitlinie. *Unfallchirurg* 115, 8–13
- Whitaker IY, Gennari TD, Whitaker AL (2003): The difference between ISS and NISS in a series of trauma patients in Brazil. *Assoc Adv Automot Med* 47, 301–309
- Woodring JH (1990): The normal mediastinum in blunt traumatic rupture of the thoracic aorta and brachiocephalic arteries. *J Emerg Med* 8, 467–476
- Zehnder MA (1960): Unfallmechanismus und Unfallmechanik der Aortenruptur im geschlossenen Thoraxtrauma. *Thoraxchirurgie* 8, 47–65
- Zehnder MA (1974): Unfallmechanismen und Unfallmechanik zur traumatischen Aortenruptur. *Langenbecks Arch Surg* 337, 325–328
- Zhang M, Liu Z-H, Yang J-X, Gan J-X, Xu S-W, You X-D, Jiang G-Y (2006): Rapid detection of pneumothorax by ultrasonography in patients with multiple trauma. *Crit Care* 10, R112

Internetquellen:

Aschenbrenner I, Biberthaler P.: <http://www.dgu-online.de/en/patienteninformation/haeufige-diagnosen/schwerverletzte/polytrauma.html>; Zugriff am 21.07.2019

Auerbach K, Otte D, Jänsch M, Lefering R.: https://bast.opus.hbz-nrw.de/opus45-bast/frontdoor/deliver/index/docId/277/file/medizinische_folgen_von_unfaellen.pdf; Zugriff am 28.07.2019

BAuA.: https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitswelt-und-Arbeitsschutz-im-Wandel/Arbeitsweltberichterstattung/Gesamtunfallgeschehen/Gesamtunfallgeschehen_node.html; Zugriff am 28.07.2019

Bundesärztekammer.: http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/LeitRoentgen2008Korr2.pdf; Zugriff am 28.07.2019

TraumaRegister DGU®: http://www.traumaregister-dgu.de/fileadmin/user_upload/traumaregister-dgu.de/docs/Downloads/TR-DGU-Jahresbericht_2017.pdf; Zugriff am 03.07.2019

TraumaRegister DGU®: http://www.traumaregister-dgu.de/fileadmin/user_upload/traumaregister-dgu.de/docs/Downloads/TR-DGU-Jahresbericht_2018.pdf; Zugriff am 03.07.2019

DVR: <https://www.dvr.de/download/beschluesse/2012-praezisierung-der-definition-der-neuen-kategorie-lebensgefaehrlich-verletzt.pdf>; Zugriff am 03.07.2019

Leitlinie Polytrauma: http://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/012-019l_S3_Polytrauma_Schwerverletzten-Behandlung_2017-08.pdf; Zugriff am 28.07.2019

TeleKooperation TNW®: <http://map.telekooperation-tnw.de/maps/#zoom=14&lat=52.09878&lon=8.89349&layers=BTF>; Zugriff am 03.07.2019

TraumaNetzwerk DGU®: http://www.traumanetzwerk-dgu.de/de/auditierung_zertifizierung.html; Zugriff am 03.07.2019a

TraumaNetzwerk DGU®: http://www.traumanetzwerk-dgu.de/de/startseite_tnw.html; Zugriff am 03.07.2019b

UMG: <http://cuop-umg.de/klinik/schwerpunkte/polytrauma>; Zugriff am 03.07.2019

Weißbuch Schwerverletzten-Versorgung DGU®: http://www.dgu-online.de/uploads/media/DGU_Weissbuch_A4_Internetendgueltige_version_1_.pdf; Zugriff am 28.07.2019

Danksagung

Ein besonderer Dank gilt meinem Doktorvater Herrn Prof. Dr. med. Klaus Dresing für die Überlassung des Dissertationsthemas sowie für den geduldigen Umgang und die Unterstützung während des gesamten Entstehungs- und Entwicklungsprozesses der hier veröffentlichten Arbeit.

Bedanken möchte ich mich auch bei Herrn Dr. med. Christopher Spering. Durch dessen Engagement zwei Ergebnispräsentationen (2016 und 2017) auf dem Deutschen Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie in Berlin realisiert werden konnten.

Curriculum vitae

Am 28. Januar 1990 wurde ich als Sohn von Heike Rapp-Brauns und Dr. Dirk Sven Arthur Brauns in Kehl am Rhein geboren. Den deutsch-französischen Kindergarten besuchte ich in Kehl am Rhein. Die Grundschule in Leutesheim und von 2000 bis 2009 das Einstein-Gymnasium in Kehl. Im Juni 2009 erlangte ich dort das Abitur.

Während des Wehrersatzdienstes 2009/2010 arbeitete ich zunächst als Rettungshelfer, anschließend von 2010 bis 2017 nach abgeschlossener Rettungssanitäter-Ausbildung beim Deutschen Roten Kreuz, Rettungsdienst Ortenau gGmbH.

2010 begann ich mit dem Studium der Zahnmedizin an der Universität Leipzig bis 2012 und absolvierte dort 2011 die Naturwissenschaftliche Vorprüfung. Im Jahr 2012 erfolgte der Studium- und Fakultätswechsel zur Humanmedizin an die Georg-August-Universität Göttingen. Während des Studiums arbeitete ich im studentischen Rufdienst der Unfallchirurgie der Universitätsmedizin Göttingen sowie im Rufdienst der Unfall- und Viszeralchirurgie des Evangelischen Krankenhauses Göttingen-Weende. Im Jahr 2015 erhielt ich ein Stipendium der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie für die Berliner Jahrestagung. Während des Praktischen Jahres sammelte ich Erfahrungen sowohl in Häusern der Maximalversorgung in Deutschland als auch grenzüberschreitend in der Schweiz.

Im November 2017 wurde ich als Arzt approbiert und arbeite seit Januar 2018 als Assistenzarzt im Klinikverbund SRRWS Spital Altstätten, Abteilung Orthopädie.